





# إدوار غَالِبُ الموسُوعَةِ

# فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

٢٤٢٠ صفحۃ • ٣١٤٦٤ مِلَّة  
٦٩٦٢ رَسْمًا • ٢٤ لَوْحَة مِلَوْنَة

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْجَيُولُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



مَشْهُورَاتُ :  
دَارُ الْمَشْهُورَاتِ ش.م.م  
ص.ب. : ٩٤٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان



الْمُتَوَضِّعُ :  
الْمَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَّةُ - سَاعَةُ الْجَمْعَةِ  
ص.ب. : ١٩٨٦ - بَيْرُوت ، لُبْنَان









الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان فرطياوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

المواد المكتوبة في مجلدات الطبعة

١٠١٠٤ مواد

٢٠٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

# الأوزان غالب

مهندس زراعي


## الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور  
والجراثيم والأراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها  
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجولوجية والطبيعة والجغرافيا  
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على سائر المصطلحات باللغات :  
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابِل الإنفلاق Fissile, Fissile (F).  
Fissile (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان يحتمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابِل الانهضام Digestible (F).  
ما كان هضمه هيناً كاملاً .

٢١٣٧٢ - قابِل التمثيل Assimilable (F).  
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابِل القسمة Divisible (F).  
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابِلِيَّة ، استعْدَاد Aptitude (F).  
ميل طبيعي أو اقتباسي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابِلِيَّة الإنطال ، بَطْلاَن Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).  
هو انتقاص عقد بسبب فقدان أحد الشروط الجوهرية أو الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابِلِيَّة الاغْتِيَاء Faculté nutritive (F).  
Nutritive faculty (E).  
هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - قابِلِيَّة الانثاش ، خاصِيَّة الانثاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).  
هي المقدار اللبني الى ما ينشئ من عدد بزور معين . فاذا

نثشت سبعون برة من اصل مائة برة يقال ان قابلية الانثاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قَاب ، قَيْب Rayon (F). Radius (E).  
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قَابَ Troisième année (F).  
القَابَ اسم للسنة الثالثة بعد الحاضرة . يقال انك لا تستغل ارضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - قَابَة Couvi (F).  
القَابَة والقَابَة : بيضة الطير المحفونة .

٢١٣٦٤ - قَابِس Récepteur (F). Receiving (E).  
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلغراف والتلفون .

٢١٣٦٥ - قَابِض ، عَقْص Astringent  
القَابِض من العلوم ما يتقبض اللسان منه . والقَابِض من الادوية ما يجبس الفضلات المتدفقة من المعدة .

٢١٣٦٦ - قَابِض ، مُقَلِّص Contractif (F).  
Contractive (E).  
ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - قَابِض ، مُتَسَلِّم Accipiens (F).  
هو من يقبض المقتود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قَابِعَات الأسنان Pleurodonte (F).  
Pleurodontes (E).

نعت تعريفي تصوف به العظام من ذوات الأسنان القابعية المرتزة في الحالة الداخلية من الفك . يقابلها شارفات الأسنان .

٢١٣٦٩ - قَابِل An prochain (F). Next year (E).  
اسم العام المقبل بعد العام الحاضر .



Rénégé primaire, Flèche (F). ٢١٣٩٢ - قادمة  
Wing primary (E).  
ريشة من أرياش مقدم الجناح. ج قوام. والأشعار  
والعواشر هي القوام.

Trémie (F), Hopper (E). ٢١٣٩٣ - قادوس  
هو عين الطاسون. ثقب أو فرسة أو شق يلقى الحب  
الذي يمر به شيئاً فشيئاً.

Albatros ٢١٣٩٤ - قادوس  
طائر بحري كبير القد مشهور باسم قطرس، اطلبه.

Asphalte (F), Asphalt (E). ٢١٣٩٥ - قار  
هو الزفت أو الاسفلت، نوع من الحجر المنسج الاسود  
الناع. يستعمل في ترصيف الطرقات.

Carya (S), Caryer (F), Hickory (E). ٢١٣٩٦ - قار  
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الجوزيات.  
انواعه عديدة اعطائها البلاد الحارة. جميعها كبيرة القد،  
دائمة. اوراقها مركبة، عابلة. ازهارها الذكورية ابطية  
الارتكاز، سنبلية التجميع، دقيقة متدلية. ازهارها  
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع، ثمارها جزوية،  
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || اعرف انواعه  
واسهرها ما يتبع.

Carya aquatica (S). ٢١٣٩٧ - قارة المتابع \*  
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E), Sum-  
phickorybaum (D), Caria palustre (I).  
نوع من القار ثمرته كبيرة القد فارشة تملو من ٢٥ الى  
٣٠ سم. وريقاتها كبيرة القد وثرية التجميع براوح  
عددها بين ٩ و ١٣. نصلها اهليجي الشكل ذلق الزام  
الاخير وهو يارز العروق سنن الحافة || ثمارها بيضية  
مقطوعة عادمة الجناح.

٢١٣٩٨ - قارة بيضاء، قارة بيضية  
Carya alba, C. ovata (S), Caryer blanc (F), White  
hickory (E).  
نوع من القار ثمرته سبروتية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم.  
براعمها متراكبة الخرافش الجزوية اللون. اوراقها كبيرة  
القد. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض  
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية، ولوزها صغير القد،  
مستحب الطعم.

٢١٣٩٩ - قارة زيتونية \*  
Carya pacan, C. olivaeformis (S), Caryer pacanier,  
Noyer pacan (F), Pecan-nut tree (E), Pekanbaum (D),  
Caria (I).  
نوع من القار ثمرته كبيرة القد فارشة تملو من ٢٥ الى  
٥٠ سم. براعمها عادمة الخرافش. اوراقها كبيرة القد.  
وريقاتها وثرية التجميع براوح عددها بين ١١ و ١٧  
وهي اهليجية الشكل معقنة، نصلها يطول من ٨ الى  
١٥ سم. ويعرض من ٣ الى ٦ سم. وهو سنن الحافة  
مزغير العروق. ثمارها بيضية الشكل مقطوعة العقب  
تطول من ٣ الى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند الادرار  
عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لباها ابيض اللون مستحب  
الطعم والنكهة.

٢١٣٩٨ - قابلية التصرف، قابلية التملك  
Aliénabilité (F), Alienability (E).  
صفة قانونية عاقلة بما يمكن نقل ملكيته بمحض او بلا  
عرض.

٢١٣٩٩ - قابلية النقل، قابلية العزل  
Amovibilité (F), Removability (E).  
تقال عن موظف يجوز نقله او استبدال وظيفته او عزله  
بقرار.

٢١٣٩٠ - قابلية الانهضام  
Digestibilité (F), Digestibility (E).  
مقدور الشيء على الانهضام. وهو ما يسبب فوارق  
الانهضام في الاغذية.

٢١٣٨١ - قابليق  
Kapoquier (F).  
هو الكايك، اطلبه.

٢١٣٨٢ - قات \*، شاي العرب، حرايبه مأكولة  
Catha edulis, Celastus edulis (S), Célastré comestible,  
Cathé comestible, Gat (F), Cafca, Khât, Kât,  
Arabian tea plant (E), Katpflanze (D), Catha (I).  
نوع من الحرايبه وهي جنبة برية وزراعية من فصيلة  
القناتيات. ساقها فرعا تملو نحو ٣ اثار. اوراقها معقنة،  
متقابلة، اهليجية النصل، يقال انها طيبة. ازهارها  
صفوية، طرفية الارتكاز، خضراء اللون، صفراء الموالج،  
خاسية الفصل والبتلات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة  
حارزة الطعم مأكولة || تزور في اليمس والحيضة حيث  
يمضون اوراقها المنبة المنهضة ويستخرجون من تقطير  
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الاعصاب.

٢١٣٨٣ - قاتل ابيه  
Arbousier (F).  
هو القنطلب، اطلبه.

٢١٣٨٤ - قاتل اخيه  
Orchis (F).  
هو السحلب، اطلبه.

٢١٣٨٥ - قاتل البق  
Cimicaire (F).  
هو الاقني المنقودة، اطلبه.

٢١٣٨٦ - قاتل البقر  
Cligü des marais (F).  
هو الشوكران السام، اطلبه.

٢١٣٨٧ - قاتل الحشرات، حاشور  
Insecticide  
كل مادة تصلح للقضاء على الحشرات.

٢١٣٨٨ - قاتل الكتب  
Colchique d'automne (F).  
هو سورجان الخريف، اطلبه.

٢١٣٨٩ - قاتل النسر  
Aconit napal (F).  
هو الاكونيت اهرمي، اطلبه.

٢١٣٩٠ - قاتليات  
Celastraceae (S), Célastracées (F), Célastracées (E).  
هي الحرايبات فصيلة نباتية من ذرات الفلقين. اشهر  
اجناسها الحرايبه ونها القات.

٢١٣٩١ - قاحل  
Asperme (F), Asperous (E).  
القاحل من النبات العادم البذور.



قات



- ... -



قارة زيتونية (البار)

*Carya tomentosa* (5).

٢٠ الى ٢٥ م. براعمها

٢١٤٠١ - قَارَة مُرَّة ، قَارَة قَلْبِيَّة

أنواع من القار شجرته سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م.

Coin (F). Corner tooth (E). ٢١٤٠٢ - قارح

Cniquier (F). ٢١٤٠٣ - قنارح

17. *Staphylococcus aureus*

هو العرم نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٢١٤٠٥ - قَارِض، قَاصِم. Rongeur (F), Rodent (E).

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Acaratoxique, Acaricide (F), Acaricide (E).

لَا تَقْرَأُ فِيهِ إِلَّا مَقْرُونًا

Roller on water (F) 8.4.14 - 211.5

Glass receiver (E).

Manuscript (F)  $\frac{3}{2} \sqrt{2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{2} = \frac{3}{2} \sqrt{2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{2}$

Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).

٧ أعطاهم مياه المتوسط والأطلسي . جميعها كبيرة القدر

بحو ١٢ كيلو. اثوابها الى الصهبة الفضية المواج يعلموها

الشواطئ الصخرية . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات .

ذلك في الشتاء فتسأ وتعود الى البحر في الربيع وهو

وہاں سے آکر اپنے گھر پہنچا۔

١٠٠٠

**Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine**

نوع من القاروس . سمكة بحرية بيوض من فصيلة القرشيات .



وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفحة ، بحري  
اللون شذائي القصعة الصلبة النازعة . ازهارها خافتة العرف .  
ثمآرها قرمزية || يستخرج من سآتها عصارة صمغية حمرآ  
اللون شآلة الاستعمال .

٢١٤٣١ - قاطر عطر  
Dracena fragrans (S).  
Dragonnier balsamique, D. odorant (F).  
شجرة زيتية تعلق من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها سنآية  
الشكل تطول نحو ١٠٠ سم. نصلها احسن الصفحة . فسقي  
الحفسار اللامع . ازهارها فواحة العرف العطري . ثمآرها  
كرزية ارجوانية اللون || تزرع في المآركن والمصاري  
ترغب في الآرية الدبالية .

٢١٤٣٢ - قاطع  
Interruptif (F). Interruptive (E).  
عمل قانوني يعطل مقعول عمل آخر .

٢١٤٣٣ - قاطع  
Interrupteur (F).  
اداة يقطع بها التيار الكهربائي .

٢١٤٣٤ - قاطع  
Sécante (F). Secant (E).  
خط مستقيم يقطع الدائرة .

٢١٤٣٥ - قاطع ، حاسم  
Péremptoire (F).  
نمت الحكم الفيصل الذي لا يقبل الجدل .

٢١٤٣٦ - قاطع التسمآ  
Cosécante (F).  
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطع التزف ، حاسس الدم  
Hémostatique (F). Haemostatic (E).  
كل دواء يقطع النزف او السيلان .

٢١٤٣٨ - قاطعة  
Incisive (F). Incisor (E).  
هي احدى الاسنآ الامامية في كل من الفكين . والقواطع  
عند الخيل ثلاث ست اسنان : ثنيتان وروبعيتان وقارحان .

٢١٤٣٩ - قاطوب موشع  
Anthrribus nebulosis (S). Anthrrib nebleux (F).  
Anthrribus nebulosis (E).

حشرة واشمة قانصة واثمة من فصيلة القاطوبيات وربة  
مفصلات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر  
الايض المتوسط . تألف اجراج الصنوبر . خنافسها  
واشمة تعيش على ازهار النباتات البرية تقضم البلات  
والكؤوس والمآبر . يرقآها قانصة تعيش على ما تقترسه  
من اليرقات الخاشية التي تمرى الصنوبر والشرين ||  
جسمها صغير القد يطول من ٢ الى ٤ سم. ثوباها الى  
السواد القمحي يعلوه خل اشهب ينعكس عليه النور  
فيبدو كأنه موشع . رأسها معتدل الهرم ، قصير الخطم .  
عينها كبيرتان . زناهاا خيطيان . فكاهما ذريان .  
غدهاا شديدتا الصلابة ، متباعدتان التحزيز . ارساها  
ثلاثية المقل || الانثى اكبر قدآ من الذكر وابنت ثوبا  
منه واقصر زناهاا || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة الجملآة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف .  
تسرح في النهار وبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||  
الطور البري يستمر نحو ٣٦ اسبوعا . واليرقة عند ادراكها  
الكآال الجسومري تطول نحو ٦ م . جسمها يشي الشكل ،  
مستطيل القدم ، مستطيل المؤخر . ثوباها الى الخفطي  
الاصفر المواج . رأسها ورواجها وبديها وشرجها الى  
السورة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع



قاط امود

٢١٤٣٣ - قاضييم  
Rongeur (F).  
Gnawing, Biting (E).  
هو القارض ، آلقبه .

٢١٤٣٤ - قاضي ، حاصم  
Ester en Justice, Agir en Justice  
التبآ الى القضاء

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل  
Agave (F).  
هو الحروزن ، آلقبه وبته الازرق والاغير .

٢١٤٣٦ - قاط  
Elacates (S).  
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط .  
جنس اسمآا بحرية من فصيلة الاسقمريات شآلكآت  
الزغائف . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطأها بحار  
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل . رؤوسها  
اسفينية ذلقة . اشداهاها كبيرة . عيونها صغيرة . مآصة  
زعانفها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره فتقدمها  
بعض المناخن الحادة . زعانفها الذيلية مقعرة || لحوبها  
متوسطة الصنف ، مآكولة .

٢١٤٣٧ - قاط أسود \*  
Elacates nigricans (S).  
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط . سمكة بحرية بيوض . اعطأها البحر  
الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من  
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوباها الى السورة السوداء يعلوها خطوط  
فضية ، قاطية ، مستعرضة || رأسها معتدل الهرم ، ذلق  
الخطم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شفها  
رعب الانفراج . عينها صغيرتان صغيرتان ، مآصتان .  
زعنفها الظهرية مستطيلة فتقدمها ثمانية منآخن حادة .  
زعنفها الشرجية تقابل الظهرية . وثمانها شكلا . زعنفتها  
الذيلية مقعرة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مآكل .

٢١٤٣٨ - قاطر \* ، دم الشين ، دم الثعالب  
Dracena (S). Dragonnier (F). Dragon tree (E).

جنس اشجار وجنبات برية وزيتينة من سبط الحليويات  
وفصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطأها البلاد  
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر . بعضها يشي  
التخل . اوراقها طرفية الاذتكاز يكثر فيها الشكل السني .  
ازهارها عشكولية التصبع ، تاجية الاذتكاز ، يضاء اللون .  
ثمآرها كرزية القد والشكل ، ورقالية اللون او حمرآ .  
من خصائصها انها لا تضر قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر .  
يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حمرآ  
تتحول بعد تجفيفها ويحفها الى دقيق احمر اللون كبير  
الاستعمال الصنآي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٤٣٩ - قاطر أرجواني  
Dracena terminalis (S). Dragonnier pourpre (F).

جنبه زيتينة صغيرة القد ، مثبوبة ، بطيئة النمو ، ليفة  
الجدع . اوراقها سيفية الشكل مستطيلة . نصلها احسن  
الصمغة ارجوانية اللون || منبها الصين . تزرع في المآركن  
ترغب في الآرية الدبالية .

٢١٤٣٠ - قاطر جبآار ، دم الآخوين  
Dracena draco, Pleomele draco (S). Dragonnier

sang-dracón, D. gigantesque, Sang-dracón (F).  
Dragon's-blood tree (E). Drackenbaum, Blutbaum  
(D). Dragone, Dragoncello, Sangue di drago (I).  
شجرة افريقية جبارة تنمو نحو ٢٠ م . قطر جذعها يبلغ  
٤ امتار . اوراقها سيفية الشكل تطول نحو ٦٥ سم .



قاطر

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦. اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخذ البها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخذ ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصيح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ وهو المطلوب .

٢١٤٤٩ - قَاعِدَةُ المثلث (F). Base de triangle (E).  
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - قَاعِدَةُ الموشور (F). Base de prisme (E).  
السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥١ - قَاعِدِي ، اَسَاسِي (F). Basilaire, Basique (E).  
صفة الجسم الذي يحوي خاصة القاعدة . ونعت تعريفي يطلق على كل ملح حوى شططا من القاعدة .

٢١٤٥٢ - قَاعِدِيَّة (F). Basicité (E).  
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيماوية .

٢١٤٥٣ - قَافِرَات الذئب (F). Collemboles (F).  
هي الكهديات . اطلبها .

٢١٤٥٤ - قَافِرَةُ القطن (S). Lepidocyrtinus incertus (S).  
هي كهدل القطن ، اطلبه .

٢١٤٥٥ - قَافِرَةُ الموز (F). Drépanure du bananier (F).  
هي كهدل الموز ، اطلبه .

٢١٤٥٦ - قَاقُور ، قُفُور (F). Spathe (F).  
هو الكافور ، وعاء طلع النخل .

٢١٤٥٧ - قَاق (F). Corneille cendrée (F).  
هو الغرباب الابيض . يعتبر من الطيور المؤذية .

٢١٤٥٨ - قَاق البَحْر (F). Corbeau de mer (F).  
سمكة بحرية تدعى قرية سوداء ، اطلبها .

٢١٤٥٩ - قَاق الماء (F). Cormoran (F).  
هو الغاق ، اطلبه .

٢١٤٦٠ - قَاقُل ، قَاقَالِيَا \* (F). Cacialia (S). Cacialie (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية . وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وزرني . اوراقه متناوبة ، لاقطاسية الشكل . ازهاره عذقية التجميع ، بيضاء اللون . يزوره مهدية ، اهدائها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - قَاقُل سِرْمَكِي الورق (F). Cacialia atriplicifolia (S). Cacialie à feuilles d'arroche (F).  
نوع من القاقل وهو جنية معمرة تعلق من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، عادمة التنين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . اعدائها مستعرة ، لاقطاسية التركيب . ازهارها بيضاء . اوراقها خشنة الشكل ذائقة ؛ نصلها يطول من آتب الى ثشرين الاول .

٢١٤٦٢ - قَاقُل طَبِي ، قَاقَالِيَا بُوَصْرِيَّة الورق (F). Cacialia verbascifolia (S). Cacialie sacrée (F).  
نوع من القاقل وهو جنية طيبة صغيرة معمرة تعلق من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضبة الشكل ذائقة ؛ نصلها يطول

٢١٤٤٠ - قَاطُونِيَّات (S). Anthribidae (S).

٢١٤٤٠ - قَاطُونِيَّات (E). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسعة دائمة قانصة وانجحة من رتبة غديات الاجنحة || اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المتدثرة الحرارة . تألف الاجراج وتميش على المواد النباتية المنحلة وعلى ما تقتصره من يرقات الحشرات الخائشة || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكالها قرينة الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اعطاسها مستعرضة وقصيرة . زباناها حيطية نحيلة وقد تنتهي بفصل صقبة متطاولة . كواسلها لاقطاسية الشكل . اغمارها لاحفة . جرازمها نسيطة . ارساغها ثلاثية العقول || اشهر اجناسها القاطوب والطعانة .

٢١٤٤١ - قَاطُور العنب (F). Tordeuse de la grappe (F).

حشرة مؤذية تمرى عقائد العنب تدعى ادويس اطلبها .

٢١٤٤٢ - قَاق (F). Tordeuse de la grappe (F).

القاق : ارض سهلة منطنة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - قَاعِدَةُ (F). Base (F).

هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - قَاعِدَةُ (F). Règle (F). Rule (E).

الخطوط الواجب اتباعها لوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - قَاعِدَةُ ، نَظَرِيَّة (F). Théorie (F). Theory (E).

٢١٤٤٦ - قَاعِدَةُ السَّنَوَات السَّابِقَةِ (F). Règle de la pénultième année (F).

٢١٤٤٧ - قَاعِدَةُ السَّنَوَات المسيحية والمجرية (F). Règle de la pénultième année (F).

هي القاعدة التفرعية المتبعة لمعرفة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .

١) السنة الهجرية =  $X + \frac{X}{2}$  = السنة المسيحية - ٦٢٢

٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية -  $\frac{33}{2}$  = السنة الهجرية - ٣٣

٢١٤٤٨ - قَاعِدَةُ القَمَر (F). Epacte (F). Epact (E).

خذ القاعدة الحالية وقدعها ٢٧ منذ اول اذار ١٩٦٥ واضف اليها علامة الشهر كما تراء اذناه ثم اخذ عدد يوم الشهر الشمسي المراد معرفة ما يقابله من القمري فان كان المجموع اقل من ثلاثين فهو المطلوب وان زاد فاسقط منه ثلاثين والباقي يكون المطلوب || وعده علامات الاشهر :

اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول كانون الثاني شباط

٩ ١٠ ١١ ١٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

واعلم ان العدد الواجب اضافته ابتداء من اول اذار في كل سنة هو ١١ وان قاعدة السنة القابلة ستكون ٨ كاهمين :

١١+٢٧=٣٨-٣=٣٥=٨م || فلو شئت معرفة



قَاقُل

Moule (F). Mould (E).

٢١١٧٤ - قَالِب

الجهاز الخاص بالسبك .

Fibrophage (F).

٢١١٧٥ - قَالِف

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور النبات والياهاها .

Maclura (S).

٢١١٧٦ - قَانَة ، مَكْلُورَة

Maclura, Maclure (F). Osage tree (E).

جنس اشجار وعجيرات معمرة قراء من فصيلة التوتيات . انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فرعها شائكة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها يبيض الصفحة الكاملة او ثلاثي التفتيص . ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها عشوية التجميع اما الانثوية نطقية . احشاشها قوية ، عتيقة ، لينه ، لوها الى الصغار الحنطلي ، تستعمل في صناعة القسي || اشهر انواعها القانة البرتغالية .



قائم ، هرمن

٢١١٧٧ - قَانَة بَرْتُغَالِيَّة \* ، مَكْلُورَة بَرْتُغَالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Maclura oranger, Oranger des Osages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القانة وهي شجرة سبروتية قراء داخلة تعلق من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تعلق من ٧ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة الالامعة البشرة ، بارز العروق الباعثة اللون . ازهارها يستمر من سزيران الى تموز . ثمارها مأكولة يعني برتغالية الشكل والحجم واللون .

Gésier (F). Gizzard (E).

٢١١٧٨ - قَانَصَة

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي حنة دون القبة تعرف بالانطافة والجربنة والحوصل والحوصلة والفرغة والقنصة والمشفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَانُون

مجموعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يركز على التاميم السابوية وبعضها يماري الحقوق الطبيعية والعرف والتقاليد والقانون المدني .



قانة برتغالية

Loi (F). Law (E).

٢١١٨٠ - قَانُون ، شَرِيعَة

القانون او الشريعة بالتوسع معناها مجموعة القواعد القانونية التي سبها المشرع || والقانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الاجتماعية الثابتة التي تسنها السلطة العامة وتكفل القوة تنفيذها .

Code (F). مجموعة القوانين

اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون ونصومه التشريعية المنسقة والمجموعة في ابواب ومواد .

٢١١٨٢ - قَانُونِ الاحْوَالِ الشَّخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى الوفاة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاخلاقية والخصائص .

Code de commerce (F). قَانُونِ التِّجَارَةِ

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصفحة ، بارز العروق المتوازية . اعناقها صغيرة القند خماسية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١١٦٣ - قَاتِل عَطْرِي

Callia suaveolens, Synosma suaveolens (S). Calce odoriférante (F).

نوع من القاتل وهو جنبه معمرة القند معمرة تعلق من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل مجنحة المماثل ، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعناقها كبيرة القند ، لاقياسية التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١١٦٤ - قَاتِل كَلْبِي الْوَرَق

Callia reniformis (S). Calce réniforme (F).

نوع من القاتل وهو جنبه معمرة تعلق من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها السفل كوكبية الشكل ، كبيرة القند تعرض نحو ٦٠ سم . اوراقها العليا اهليلجية مستطيلة . نصلها خضر الصفائح المسننة الحتار . اعناقها صغيرة القند ، خماسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١١٦٥ - قَاتِلَة ، قَاتِلِي

هي الهال ، اطليه .

٢١١٦٦ - قَاتِلَة تَيْسِ الْفِيل

هي الهال الجوزي ، اطليه .

Amome de Madagascar

٢١١٦٧ - قَاتِلَة حَبَشِيَّة

هي الهال الحبشي ، اطليه .

Mélégueffe (F).

٢١١٦٨ - قَاتِلَة ذَكْرِيَّة

هي الهال الذكر ، اطليه .

Cardamome petit (F).

٢١١٦٩ - قَاتِلَة صَغِيرَة

هي الهال الصغير ، اطليه .

٢١١٧٠ - قَاتِلَة عُنُقُودِيَّة

هي حال حما ، اطليه .

Amome cardamome (F).

٢١١٧١ - قَاتِلَة مُجْتَمَعَة

هي حال جاوا ، اطليه .

Cardamome allé de Java (F).

٢١١٧٢ - قَاتِلَات

Amomaceae (S). Amomacées (F). Amomaceae (E).

هي الهاليات سبط من فصيلة الزنجبيلات . نباتاتها جمجورية ، صفولية ، معمرة . بعضها طبي وبعضها عطري وزراحي وزييني .

٢١١٧٣ - قَاتِم \* ، قَاتُوم ، هَرْمِين

Ictis erminea, Putorius erminea (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من السراييب اعطانه البلاد الجبلية العالمية . ثوبه الصيني الى الجلود المايقة . اما التنوير فاييخ اسفر او ابيض يقن الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجوزي يطوه ملوح اسود . جسمه اهيف القند ، قصر الجرامز ، طوله يراوح بين ٢١ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم . وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ، يدور على الارض وينسلق الانجار . قوته القزاع والارنب والطير والزحافات على اختلافها من الاناعي الى العظام . انشاء تقسم مرة في الحول من جروين الى ثمانية . فروته جيدة الصنف ثينة القند .

القد، تشوبه مستبلة، مخدوعة، بارزة الصلوع، لونها الى الصفرة || يرغب في الازرة المروية الخفيفة الغنية بالناصر العسوية .

٢١٤٩٨ - قاروون المير هو اليعطين الأقرع، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قاروون هندي \*

Cucumis anguria (S). Angurie, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West indian gherkin (E). Birnurgurke, Anguriengurke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات المحلية، غروبها عديدة منها الربة والزراعية، اعطائها البلاد الحارة. جميعها مدادة ومتسلقة. اوراقها كفية ثلاثية التفتيص، حية النصل على صفحتيه. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المعاليق، ريفية الشكل والحجم، مضلمة القشور الثلولية الشاذية. الوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاخضر والاصفر والجنح والموشم والاغير.

٢١٥٠٠ - قاوية Coccomyces

جنس فطور مجهرية من الرغبات وفصيلة المشاريات. يتميز بصدائه المائرة وفي نيمته الرحية. يوه خيطي او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او اسجين، إشلانه كينيدي وكنائده عسبة الشكل. يوفاته كيفية التجميع شفاقة خيطية مستقيمة او منمققة || انواعه قليلة منها واحد مؤ يدعى قاوية الكرز.

٢١٥٠١ - قاوية الكرز \*

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemale (S). فطر مجهرى يركب افناد الكرز واوراقه وأمن ثماره. مظهره الخارجى على الاوراق رقة كيفية، لونها الى الجؤوة تركب صفحة النصل العليا وتجنب الضلع والمروق. قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ مم. وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والاحبال الباكر بعد ان يوقف التبادل النسفي قبل زمن الركد الطليعي. وهو على الامن يقع صغيرة مبكرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف اللسج الواصلة وتعزل نقل النسغ الى الثمار فتجهم وتسقط || اما على الفروع والافناد فهو يقع قرحية وسادية الشكل متوسطة الكثافة مبكرة بدون انتظام تركب البشرة وتغترف اللحاء فتخلد الاوسية وتعطها وتمتعا عن القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وترويديه نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تنفض الانجبار على مرتين او ثلاث مرات. الاول على اثر العقد والثانية بعد الاول بأسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع.

٢١٥٠٢ - قالد Alkaid (F). Alkaid (E).

القائد آخر نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

٢١٥٠٣ - قالفة Morphologie interne (F).

Internal morphology (E). هي درس تركيب الاجسام وعينها الداخلية في الحيوان والنبات.

٢١٥٠٤ - قائمة Membre (F). Member (E).

٢١٥٠٥ - قابض Troquer (F). To truck (E).

استعاض سلعة بسلعة .

٢١٤٩٤ - قانون الحراج ، قانون الأجرأج

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الأجرأج وصيانتها واستغلالها الى آترو .

٢١٤٩٥ - قانون الصناعة Droit industriel (F).

Industrial law (E). هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .

٢١٤٩٦ - قانون الضرائب Droit fiscal (F).

Fiscal law (E). هو القانون الذي ينظم الضرائب على الاعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويعين طرق جبايتها .

٢١٤٩٧ - قانون الطرق Code de la route (F).

Rule of the road (E). هو القانون الذي ينظم السير على الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E). مجموعة القواعد القانونية التي قررها العرف .

٢١٤٩٩ - قانون العقوبات Code pénal (F).

Penal law (E). هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

٢١٤٩٠ - قانون المحكمة Lex fori

صفة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

٢١٤٩١ - قانون زراعي Droit rural (F).

Rural law (E). هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويعمى الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus صيغة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

٢١٤٩٣ - قانون موقع المال Lex rei sitae

صفة لاتينية تستعمل في القانون الدولي الخاص للدلالة على قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يسري على الاموال الخاصة جماعا .

٢١٤٩٤ - قانوني Légal (F). Legal, Lawful (E).

نمت يستعمل للدلالة على مطابقة القانون او على صدور المنعوت به عن القانون .

٢١٤٩٥ - قاروند Martin-pêcheur (F).

هو القرد ، اطلبه .

٢١٤٩٦ - قاروند شائع Martin-pêcheur vulgaire

هو القرد الشائع ، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قاروون سبطاوي

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santawi melon (E). Santavische melon (D). Melone santavi d'Egypte (I).

نوع من الثمار الزراعي المأكول ، وهو من ثبوت البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره ريفية الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قاوية الكرز



## Tetraophsis (S).

Tétraophase (F). Tetraophasis (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . نواع المعروفان يعيشان في جبال التبت . شكله قريب الشبه بالفرغس . جسمه متوسط القد . ثوبه الى السمره النمره بالافغير . زوره اسود مطوق بالابيض . ذنبه متوسط الطول ، مستدير الطرف . منقاد ورجلاه الى الجوزة السمره .



قَبْ

## ٢١٥١٥ - قَبَّاح

القَبَّاح طرف عظم المقعد مما يلي المرفق .

## ٢١٥١٦ - قَبَّاح

Ours (vieux) (F). Bear (old) (E).

القَبَّاح : الدب الحرم .

## ٢١٥١٧ - قَبَّار

Claprier commun (F).

هو الكبر الشائك ، اطلبه .



قَبَّار

## ٢١٥١٨ - قَبَّاسَة

Monogénie (F). Monogeny (E).

القَبَّاسَة منفع تناسل قوامه ان الاجسام المغضا تنتج اجساما تنفصل عنها وتستقل بذاتها .

## ٢١٥١٩ - قَبَّاع \* ، قَبَّع ، قَبَّال البُوص

Aulacodus (S). Aulacode (F). Gane rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من فصيلة الدافيات . انواعه عديدة قروية . الشبه من الجردان . اجسامها ربة قوية تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذناها من ١٤ الى ٢٢ سم . رورسها صغيرة . مقامها قصيرة وعريضة . اذناها نصف مستديرة . جزامها قصيرة خمسة الاصابع . اطرافها قوية منجلية الشكل ، اذناها حليلة الشعر شاذكة || اوتيا عند الصهبة السمره تعقب مع اقترابها من الظهر وتبيض . عند البطن . صوفها غثن لللس قبل الكفافة || موطنها بعض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى . تألف مختلف الاقاليم الزراعية . اجبرتها افاحيص تنفضها في الادغال والمقاصب وبين الصخور القريية من الخول المزودة . قوتها الفستق وسائر النباتات الصغولية وقصب السكر والخيزران .



قَبَّاع

## ٢١٥٢٠ - قَبَّاع

صوت الخنزير .

## ٢١٥٢١ - قَبَّان

Bascule (F). See-saw (E).

جهاز توزن به الاشياء .



قَبَّاع

## ٢١٥٢٢ - قَبَّيب \*

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الزنبقيات ، انواعه عديدة مهداة البلاد الحارة . اربوبها ضخمة ، جذوعها منتصبه ، اوراقها عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها هامة الارنكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكلي || اشهر انواعه ما يلي .

## ٢١٥٢٣ - قَبَّيب أَحْمَر

Cordylina rubra (S).

Cordylina rouge (F).

نوع من القيب وهو شجيرة تربيتية سرونية ، تطلع من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اوراقها عصفية الشكل معتقة . نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو جامد الصفعة المائلة ، شديد الخضار . علفها صغير القد ، اطحل الشمرع . ازهارها الى الحمرة يعلمها موج بنفسجي .



قَبَّيب

## Telson

## ٢١٥٠٦ - قَبَّيب

اخر حلقة من بطن القشريات .

## Sécher (F). To dry (E).

## ٢١٥٠٧ - قَبَّيب

قب النبات : ييبس .

## Apside (F). Apsis (E).

## ٢١٥٠٨ - قَبَّاب

كل طرف من طرفي فلك المحور الاكبر في الكواكب الخس اي السيارة .

## Pleurotomaria (S).

Pleurotomaria (F). Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة القبايات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاولى ، واربة انواع معاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة ، عتفية ، رقيقة ، سابعية الدورة الخلزونية التي تضيق مع الاقتراب من المقب .

## Polyprion (S).

Cernier (F).

## ٢١٥١٠ - قَبَّاب ، قَبَّاب

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات شاذكات الزعانف . انواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط . جميعها كبيرة القد ، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . فلونها مستديرة ، نجمدة ، متراكبة . زعانفها شاذكة مستطيلة . اوتياها الى السرة البنية يعلمها تبيج ابيض . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة للعلم .

## ٢١٥١١ - قَبَّاب أَسْمَر \* ، كَعْبَد ، دَبَّع

Polyprion cernium (S). Cernier brun (F).

Brown Stone-bass (E).

نوع من القباب . سمكة بحرية يبيض من فصيلة الصرانيات . كانت ، في التصنيف السابق ، تتبع فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اطيحي الشكل ، كبير القد ، يطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . حراشفا صغيرة ، معنية ، مسنة الحواشي . ثوبا الى السرة البنية يعلمها تبيج ابيض || رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخط . شدقها واسع الانفراج . فكها الاسفل يتقدم الاعل . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نائزتان || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنخضية الشاذكة ومنها المفصلية السرحة || لحمها جيد الصفت ، مرغوب فيه الا في زمن مرض المرجان الذي يمتد من شباط الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني .

## ٢١٥١٢ - قَبَّابِيَّات

Pleurotomaridae (S). Pleurotomaridae (F). Pleurotomaridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها معاصر || اصداها متفاوتة الاحجام والاشكال معظمها مستغلط الخلزاة التي تبدو كأنها قباب متراكبة || اعرف اجناسها واشهرها القباب والشرمة .

## ٢١٥١٣ - قَبَّاسَة ، قَبَّاسَة

عشبة تنبت في اللط لا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاصع او اقل ترعاها الموالي (١ م) . ج قبا .

منقاره الى السرة الزيتونية || مولته خضاب وسهل الشرق الاوسط واروبة . يكثر في العراق || انشاء تبويض من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بعدها ثلاثة اسابيع .

### ٢١٥٣٠ - قَبْرَة ، قَبْرَة ، قَبْرَة

*Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).*

ج . قبر وقنابر . جنس طير من فصيلة القبريات ، انواعه عديدة ، اعطائها فصيلة الارباء تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها نافعة . اجسامها صغيرة اللد تطلو من ١٤ الى ٢٠ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . اذناها فارقة . اوتابها موشة مرقوشة || قوتها الحشرات واليدور البرية . اشهر انواعها مايلي .

### ٢١٥٣١ - قَبْرَة الحقل \* ، قَبْرَة مَعْرُوفَة

*Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).*

نوع من القبرية وهو طائر صغير اللد ، طوله نحو ١٨ سم . ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظواهره الى الكعبة الموشة بالاسود والاصهب والافبر . بطنه وخوافيه الى البياض الاغبر تملو رقة سراء . حنار عينه الاصل مستطيل الشكل اشقر اللون . عيناه جوزيتان . منقاره الى السرة . يئن في التربة بين الزروع وفي المراعي والنتاق . انشاء تبويض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حفتها تشمل اربع بيضات او خمس ، اما الحفن فيدوم ١٤ يوما تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٢ - قَبْرَة الغياض \*

*Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lule, A. des bois (F). Wood lark (E).*

نوع من القبرية ، وهو طائر صغير اللد نحو ١٥ سم . ثوبه ثوب قبرة الحقل ، لكنه اصنع بيضا واشقر صهية . يألف اليرير والمخضب والغياض والمبشرة الاشجار ، يرغب في مراتع الملح والصعر . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة والحفن يكون بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٣ - قَبْرَة سَمَرَة \* ، قَبْرَة ، عَلْبَعْلَة

*Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrelle (F).*

نوع من القبرية ، صغيرة اللد تطلو نحو ١٤ سم . ثوبها ثوب قبرة الحقل الا انه اشد سرة . وهي اطول جناحا من قبرة الغياض واكثر رسا منها || تألف الاراضي الكلسية والرملية . انشاء تبويض ثلاث مرات في السنة . بيضها اصهب اللون تملو رقة خطية .

### ٢١٥٣٤ - قَبْرَة مَنُوجَة \*

*Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochevis, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E).*

نوع من القبرية ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم . رأسها مستطيل القزعة . ظوهرها اسمر اللون ، وبداي المواج ، حنار ريش رأسها وظوهرها وجناحها الى الصهبة الخطية . صدرها وبطنها وخوافيها الى البياض الاصهب تملو رقة مستطيلة سوداء اللون . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق الوعرية والمراعي والحقول المزروعة ويؤانف البورات . قوتها الحشرات والموام واليدور والجوب || تدن عشها في التربة بين الاعشاب او تحت التلع . وهي لا تبويض اكثر من مرتين في الحول . حفتها تألف من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى بمناوبة الذكر .

### ٢١٥٣٤ - قَبْب الجنب (S).

*Cordylina australis (F).*

نوع من القتب وهو شجرة سريوية برية وتزيينية تملو من ١٠ الى ١٢ سم . ساقها فراء . اوراقها تشبه اوراق البوكا . نصلها يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . وهو مالم البشرة جبل الخضار الزاهي يملو نوتيم اخضر او احمر . ازهارها الى البياض الاغبر . اذلقها كبيرة اللد متوسطة الكثافة . ازهارها ينظم من اذار الى نيسان .

### ٢١٥٣٥ - قَبْب كثيف الزهر

*Cordylina dense (S). Cordylina dense (F).*

نوع من القتب وهو جنبة تزيينية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها نحيلة فراء . اوراقها تطلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة احسن الزام الاخير ، لونه الى الخضار المايق || شراخها الزهري قرمزي اللون ، عذقا كثيف التجميع ، ازهارها ليكية .

### ٢١٥٣٦ - قَبْرَة

*Azha* النقة بعض نجوم كوكبية الاكليل الجنوبي . سميت قبة لاستوائها . ومن العرب من يسميها ادعى النعام لانها على جنوب النعامين .

### ٢١٥٣٧ - قَبْرَة ، قَبْرَة ، حَفْث

*Feuillet (F). Third stomach of ruminants (E).*

هي من الفم واسماها هن ذات الطباق متصلة بالكرش وهي البواء الذي يتنأى اليه الفرث .

### ٢١٥٣٨ - قَبْشُور \* ، جَعْل مُكَرَّم

*Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F). Ateuchus laticollis (E).*

حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورثة عدييات الاجنحة . يألف المزارع والبراري يعيش على الخبي والروث واليرير . مأواه يدعى كبرتل يتألف من نفق او نفقين وسجيرة فسيحة لسكانه ولايؤام القمموة التي يعيش عليها || جسمه متوسط اللد يطول من ١٦ الى ٢٢ سم . ثوبه الى السواد اللامع . رأسه صغير الجرم ، قصير الخط . زبانه صغيران دقيقان . عيناه صغيرتان ماصحتان . ظواهره محجوب الشكل ، بالغ التخديف القندي ، مقطوم المؤخر ، لا يلفح كابل البطن || الانثى اصغر قدما من الذكر واهت ثوبا منه واكثر سريا || له جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تتساق في حزيران . تمتع مكنة واحدة في القمموة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطلو نحو ٢٢ سم . جسمها غليظ البطن والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الراجب ، ضليح التأثير ثوبها الى القبرة السراء . رأسها اسود اللون ، احمر المواج . تعيش في اربل عهدها على المواد العضوية الموجودة في القمموة ثم على الزبل حتى زمن الاكمال .

### ٢١٥٣٩ - قَبْج \* ، قَبْج ، حَجَل أُونْد ، حَجَل عِرَاقِي

*Sterna (S). Sterne, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham's (E).*

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجعليات وفصيلة الطيوريات . واحدته قبجة للذكر والانثى ، وهي طائر ربع الجفنة ، متوسط اللد ، طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى الردة الرصاصية النضبية المواج يملوها تجنيد نوتيم وتبويض .



قَبْشُور



قَبْج



قَبْرَة الحقل



قَبْرَة الغياض



قَبْرَة سَمَرَة



قَبْرَة مَنُوجَة

الحافة . شراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم .  
ازهارها الى الصفار المابق يملوه توشم حنطلي يستقر عند  
الختار || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٥٤٣ - قَبَس ٥  
Type  
هو النموذج المثالي الذي يجمع الملامح الشكلية الرئيسية  
المائدة الى الضرب او السلالة او العرق .

٢١٥٤٤ - قَبَس \* ، بُولْمُوِيَم  
Polemonium (S). Polémoine (F).  
جنس نباتات برية وزراعية ترابية من فصيلة القبسيات  
انواعه عديدة جميعها عشبية معمرة . اوراقها متعاقبة ،  
مركبة ، مستطيلة . ازهارها عنقودية او عكولوي التجميع .  
اشهر انواعه الزراعية الترابية ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قَبَس اُزْرُق  
Polémoine bleue (F).  
هو حشيشة المغرب ، اطليا .

٢١٥٤٦ - قَبَس بَهِي  
Polemonium pulcherrimum (S). Polémoine  
superbe (F).  
عشبة معمرة صغيرة القد زياه . تملو نحو ٢٥ سم . سوقها  
فرماة منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريية التجميع  
عدها رايوح بين ١٧ و ٢٧ عناقدها الزهرية متصلة  
الكثافة . ازهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها  
الازرق والابيض ومنها الازرق والابيض الموشم بالاحمر .  
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٧ - قَبَس حُوقِي  
Polemonium lanatum (S). Polémoine laineuse (F).  
عشبة معمرة صغيرة القد . مهدا البلاد الباردة . تملو من  
١٠ الى ٢٥ سم . سوقها واوراقها وازهارها زغبية البشرة .  
سوقها نمجلة . اوراقها قليلة العدد . وريقاتها وريية التجميع  
تألفت من ١٧ الى ١٩ او ٢١ وريقة . ازهارها لبدة  
زرقاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٨ - قَبَس قَلِيل الزَهْر  
Polemonium pauciflorum (S). Polémoine pauci-  
flore (F).  
عشبة معمرة زياه الفروع تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . ساها  
منتصبه . اوراقها نظامية . وريقاتها ٢٧ عنقودها  
الزهرية قليل الازهار . ازهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٤٩ - قَبَس مُسَطَح  
Polemonium reptans (S). Polémoine couchée (F).  
عشبة معمرة صغيرة القد . تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . سوقها  
منبطحة . اوراقها مرطاه النصل صغيرة الحجم . وريقاتها  
وريية ، خماسية او سباعية او تساعية العدد . عناقدها  
الزهرية رطلة التجميع ، ازهارها الى الزرقه اليلكية || ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٥٠ - قَبَسِي ٥  
Endémique (F). Endemic (E).  
نمت تعريفني يطلق على النباتات والامراض التي تعيش  
وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قَبَسِي ٥  
Monogénique (F).  
Monogenic, Monogenetic (E).  
نمت تعريفني يطلق على كل ما هو عائله الى القبسية .

٢١٥٣٥ - قَبَرِيَّات  
Alaudidae (S).  
Alaudidés (E). Alaudidae (E).

فصيلة القبر ، من الجوامع المحرطيات المناقر . اجناسها  
عديدة منها البقرة واللعل والمكاه والرهذل والرهذل والقوقيس .  
معظمها من القواطع وبعضها آله || جميعها تألف الحفيس  
اكثر من الاجواء والاشجار . اجناسها ربعة . رؤسها  
كبيرة ، مناقيرها لا قياسية . اجنحتها مستطيلة ، اذناها  
قصيرة || قوتها الحشرات والبرور البرية .

٢١٥٣٦ - قَبَرِيَّة \* ، قَبَر  
Corydalis (S). Corydalle (F). Corydalis (E). Klee-  
terder (D). Coridalide (I).

جنس نباتات برية وترابية من فصيلة الحشخاشيات  
انواعها عديدة معظمها جذموري وبعضها دوصي . اوراقها  
جذعية الارتكاز او قرصية ، نصلها كثير التفريش  
والتشريح . ازهارها عنقودية التجميع تركز حل شراخ  
يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قَبَرِيَّة جَوْفَاء  
Corydalis cava (S).  
Corydalle creuse (F).

عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية جفواء . ساها  
شراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ينهي بالعتود الزهري .  
ازهارها حر او بيض || ازهارها يستمر من اذار  
الى ايار .

٢١٥٣٨ - قَبَرِيَّة سُدَايَّة الْوَرَق  
Corydalis rutecfolia (S). Corydalle à feuilles  
de rue (F).

عشبة جذمورية معمرة . جذورها دوفسية مفلطحة جامدة  
اللباب . اوراقها سدايية الشكل . ازهارها وريية كبيرة  
القد . شراخها يعلو نحو ١٥ سم . || ازهارها يستمر  
من نيسان الى ايار .

٢١٥٣٩ - قَبَرِيَّة صَفْرَاء  
Corydalis lutea (S).  
Corydalle jaune (F).

عشبة جذمورية معمرة . اوراقها متوسطة التفريش  
والتشريح ، مالة البشرة . شراخها الزهري يعلو من ٢٥  
الى ٣٥ سم . ازهارها ذهبيية اللون ، بزورها خمسية لامة .  
ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٥٤٠ - قَبَرِيَّة قَبَعُونِيَّة الْوَرَق  
Corydalis cheillantifolia (S). Corydalle à feuilles de  
cheillant (F).

عشبة جذمورية معمرة . اوراقها قبعيةية الشكل ، مالة  
البشرة تطول نحو ٢٠ سم . شراخها الزهري يعلو نحو  
٢٥ سم . ازهارها كثيرة العدد ، جيلة الصفار القاتم .  
ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قَبَرِيَّة مُرْعَبِيَّة  
Corydalis tomentosa (S). Corydalle tomenteuse (F).

عشبة نجمية نمجلة . اوراقها قرصية الانتشاب ، نصلها  
يطول من ١٠ الى ١٨ سم . وهو متباعد التفريش ، كثير  
التشريح ، مزفر الصنف . ازهارها الى الصفار الكبيرتي .  
شراخها يعلو نحو ٢٠ سم || ازهارها يستمر طوال  
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قَبَرِيَّة نَيْسِلَّة  
Corydalis nobilis (S).  
Corydalle noble (F).  
عشبة جذمورية معمرة . اوراقها متباعدة التشريح ، مسنة



قَبَرِيَّة



قَبَس

**٢١٥٦٠ - قُبَّيَّات** (S). Dermochelidae (F). Dermochelidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو القُبَّيَّس || يتميز القُبَّيَّس بفقاره وصلوه الطويلة غير الممتلئة بالذبل. وبذيله المركب من صفائح صغيرة متتالية تنقسم في السفن. ويخلو من السهف القطني المادة الذي يكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشراق حيث تقع في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلقة تنفق بعد وضعها بنحو تسعة اسابيع. والقُبَّيَّس فور نفقه يتوجه توتاً نحو البحر.

**٢١٥٦١ - قَبِط** (F). Mélanger (F).

To mix, To mingle (E). قبط الشيء: خلطه جيداً. يقال قبط الاسمدة الكيماوية.

**٢١٥٦٢ - قَبِيع** (F). Aulacode (F).

هو القباغ حيوان لبون قاضم، اطلبه.

**٢١٥٦٣ - قَبِيعَة** (F). Alouette calandrelle (F).

هي القبرة السراة. صفور ابقع ارض تكثر اقامته قرب اجوار الجردان فاذا فرغ اتبع فيها.

**٢١٥٦٤ - قَبِيعَة \*** (F). Petasites (S). Pécasite (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه عديدة منها البرية والطيبة والتريبيية. اوراقها جذعية معتقة متراكبة فارشة النصل المستدير او القلبي الشكل. ازهارها سبلي التجميع رأسي الارتفاع قاعدته مخراج غليظ متصطب تكسو الحراش. ازهارها متعددة الالوان. اشهر انواعه ما يتبع.

**٢١٥٦٥ - قَبِيعَة بَيْضَاء** (S). Petasite albus (S).

**٢١٥٦٥ - قَبِيعَة بَيْضَاء** (F). Petasite blanc (F). عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها كبيرة فارشة طولها نحو ٧٠ سم. وعرضها ٥٠ سم. نصلها ازغب البشرة اطحل اللون اخضر العروق السفلى. شمراخها الزهري يملو نحو ٨٠ سم. حراشقه خضر، ازهاره صفر.

**٢١٥٦٦ - قَبِيعَة نَلْجِيَّة** (S). Petasite niveus (S).

**٢١٥٦٦ - قَبِيعَة نَلْجِيَّة** (F). Petasite neigeux (F). عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها كبيرة، مثلكة الزوايا، نصلها خشن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى العلماة اللون. شمراخها يملو نحو ٦٠ سم. ازهارها الى البياض الثلجي.

**٢١٥٦٧ - قَبِيعَة عَطْرَة** (F). Petasite fragrans (S). Nardosmia fragrans (S).

**٢١٥٦٧ - قَبِيعَة عَطْرَة** (F). Petasite odoriférant, Hélliotrope d'hiver (F). عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها صغيرة، كلوية الشكل، خضراء النصل على صفحتيه، مسنة الحافة. ازهارها بنفسجية اللون عطرة. عرفها يشبه الزنبلا. تزدهج للزئين. ازهارها شوي.

**٢١٥٦٨ - قَبِيعَة مَخْرَنْبِيَّة** (F). Petasite officinal (F).

هي حشيشة القرصان، اطلها.

**٢١٥٥٢ - قَبَسِيَّات** (S). Polemoniaceae (S). Polémoniacées (F). Polemoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها واتواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني.

**٢١٥٥٣ - قَبَسِيَّة \*** (F). Monogénisme (F).

**٢١٥٥٣ - قَبَسِيَّة \*** (E). Monogenism (E). وحدة الاصل والذرية. نظرية علمية، ركيزتها التسلسل المنطقي، توضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد.

**٢١٥٥٤ - قَبَسْرَة \*** (F). Gonomoarrhénie (F).

تصاب فرزي تكون انث انثاله عاقرة اما ذكوره فنائرة.

**٢١٥٥٥ - قَبَس، قَبْص** (F). Fourmillière (F).

**٢١٥٥٥ - قَبَس، قَبْص** (E). Ant-hill, Ant's nest (E). مجتمع النمل الكبير الكثير. وهو ما يدعى قرية ونملة.

**٢١٥٥٦ - قَبَسَة \*** (S). Truxalus (S).

**٢١٥٥٦ - قَبَسَة \*** (E). Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E). حشرة قاضمة نطاطة من فصيلة الجراديات. اعطائها جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحرارة من العالم القديم || جسمها كبير القدي يملو من ٣٥ الى ٤٠ سم. عند الذكر ويملو من ٥٥ الى ٦٠ سم. عند الانثى. قوتها الى الكهبة الثوراء يملوها موج اخضر ويجذع امر. زباناها قلاوبا الشكل، مستطبة الخط. اجنتها شفافة ملونة حراء القاعدة، وردية الشعاع، منطية الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اضراها زهيدة لانها قليلة العدد.

**٢١٥٥٧ - قَبْص** (F). هو الاخذ، اطلبه.

**٢١٥٥٨ - قَبْص \*** (F). Dermatochelys coriacea, Dermochelys coriacea (S).

**٢١٥٥٨ - قَبْص \*** (F). Dermatochelys coriacea (S). Dermatochélyde, Dermochélide, Tortue-luth, Tortue-cuir géante, Sphargis (F). Leather turtle (E). سلخانة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القَبْصِيَّات. كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة الجيثيات || اعطائها معظم بحار العالم. قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان. لا تقرب من الشطوط الا في زين الاشراق. محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج واليابازيل || جسمها كبير القد، يملو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم. وزنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو. ذبلها سفى المادة والتركيب، سباعي الاكطار القاطبة المستعرضة عند قواعدها، الضيقة والقصبة التجميع عند اطرافها. زعفاها منبسطة الصفحة. رأسها معتدل الجرم، شبه افعس. عنقها غليظ، معتدل الطول. قوائمها مبطلية، زعنفية الشكل، عادمة المقابض. قائمتها الاماميتان كبيرتان، سليمتان، منحورنا الى مقلتين مجدافيتين لا يقل طولها عن ٣٠٠ سم. ولا يتجاوز ٣٦٠ سم. || عويلها عند اقتنائها زعاق صاعب شديد النقع || لحمها مأكول.

**٢١٥٥٩ - قَبْصَان \*** (S). Strombus lambis (S).

**٢١٥٥٩ - قَبْصَان \*** (F). نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يجحف فيكون منه اظفار الطيب.



قَبْصَة



قَبْص



قَبْصَان



قَبْصَة



قبب

وحيدات الأجهزة وفصيلة القبويات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. تعيش على الصخور المقنورة قرب الشواطئ || اصداؤها مخروطية قببة الشكل. اجسامها تأخذ اشكال الاصداف. رؤوسها بيضاء. افواهها مستعرضة تنتهي باعظام متفاوتة الطول. لولاسها مستطيلة ذلقة. عيونها تحت قواعد اللولاس. خياشيمها وحيدة الصف تملأ الحثار الاناسي من الرداء قرب المنق. ارجلها وحيدة، كبيرة وريفة.

٢١٥٧٧ - قُبُولِيَّات ٥  
Capulidae (S).  
Capulidés (F). Capulidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وحيدات الأجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || تتميز باصداؤها المخروطية التي يكثر فيها الشكل القبي وبافواهها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القبوة والبابوبية والمقنة والوفس.



قبب

٢١٥٧٨ - قَبُول . Vent d'Est (F). Easterly wind (E). القبول : ريح الصبا.

٢١٥٧٩ - قَبُول . Acceptation (F). Acceptance (E). هو الرضا بما يعرض.

٢١٥٨٠ - قَبُول ، مَوَافَقَة . Acquiescement (F). Acquiescence, Compliance (E). هو الرضا بعمل تم أو حكم صدر.

٢١٥٨١ - قَبُول اِخْتِيَار . Levée d'option (F). عقد يقصص فيه من كان مختاراً في الشراء يبعد مكتوب عن قبول الشراء بالشروط التي توافق عليها الطرفان.

٢١٥٨٢ - قَبُول الكَفِيل (F). Réception de caution. قبول كفالة شخص عنه المدين الى الدائن.

٢١٥٨٣ - قَبُول اِهْبَاء . Acceptation de donation (F). تصريح الموهوب له في العقد بقبول الهبة.

٢١٥٨٤ - قَبُول تَرَكَة ، قَبُول وَصِيَّة . Acceptation de succession, A. d'un legs (F). هو قبول الوارث أو الموصى له بما لها أو عليها.

٢١٥٨٥ - قَبُول شَرْطِي ، قَبُول مَعْتَق . Acquiescement conditionnel (F). هو اظهار الرضا أو القبول بشرط ان يؤدي الراعي أو الفريق الآخر عملاً معيناً.

٢١٥٨٦ - قَبُول صَرِيح . Acquiescement exprès (F). هو القبول الذي يقره القابل صراحة.

٢١٥٨٧ - قَبُول ضَمِيح . Acquiescement implicite (F). قبول يدل عليه تفويت الأجل المحددة لظمن في مقد أو طلب أو حكم.

٢١٥٨٨ - قَبُول مَسْكُوت عَنْهُ . Acquiescement tacite (F). قبول تدل عليه ، لزماً ، بعض التصرفات ان كان مصدرها صاحب الشأن أو غيره.

٢١٥٦٩ - قَبِيب ٥

Anatina (S).  
Anatine (F). Anatina (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصليحات الخياشيم وفصيلة القفاليات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصداؤها متباينة الاحجام ، لاقائية الشكل ، قبابية ، فارطة ، رقيقة ، ماسية ، شفاقة ، عادمة الخلزنة والتخديد.

٢١٥٧٠ - قَبُول ، مَرْب . Cave (F). Cellar, Vault (E). بناء او دهليز وما اشبه يصلح لحفظ بعض الخواصيل الزراعية الصناعية كالخمر والخبز والحبوب.

٢١٥٧١ - قَبْرَات . Fressure (F). Pluck, Harslet (E). هي القبط مجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حباب اللحم القائم كالقلب والسرور والطحال والكروش، الخ.

٢١٥٧٢ - قَبُول ، قَبُول ، مَرَاة . Blottissement, Blottissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E). هو ابتداء دور الذبول في الثمار وقد يكون ذلك بعد فوط الايناع || وهو في الارواق دور الذبول بعد الاثر باب.


٢١٥٧٣ - قَبْرُوط \* . Antaxilus pedestris (S). Sauterelle des champs (F).

جنس جنادب من فصيلة القبويات. انواعه خمسة. انوعها الى السمرة البنية المخضرة المرقطة. طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ سم. انفاؤها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ سم. اغمارها عند الذكور نحو ٤ سم. وعند الاناث نحو ٢ سم. مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ سم. حذافرها هليية ، كواسلها لاحقة. اسراك ذكورها مقلطحة مسنة الصفحة الداخلية. تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف.

٢١٥٧٤ - قَبْرُوط اخْضَر \* ، تَقَطَّاط اخْضَر . Homorocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F). نوع من القبويات اخضر اللون تحيل الجسم يطول من ٣ الى ٥ سم. رأسه مخروطي الشكل. رواشه كبيرة ، رقيقة ، شفاقة. زبانا دقيقان مستطيلان. اشتره تطول نحو ٢٢ سم. تألف المراعي والمغول المزروعة. يرغب في النباتات التجيلية ومنها الزروع.

٢١٥٧٥ - قَبْرُوطِيَّات . Phasgonuridae, Tettigonidae (S). Phasgonuridae, Tettigonidae (F). Phasgonuridae, Tettigonidae (E). Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Katyids (E). Laubheuschrecken (D). فصيلة حشرات من مستطيات الأجنحة. اجناسها عديدة اشهرها القبوط. اجسامها متباينة الاحجام والالوان. قرونها الاستشارية طويلة. ارجلها الخلفية قاذفة. اراسها رباعية المقل. قرونها الشرجية لا عقدية. اشراها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة. ملاسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث.

٢١٥٧٦ - قَبْرُوعَة ٥ . Pileopsis (S). Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل



قبوة

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقباح الغابرة . جميع أنواعها المعاصرة يمية قل ما تقترب من الشطوط . أسرابها وأفرقة العدد . زعانفها رقيقة شفافة متفارقة الانفلاق عادمة التفصيص الشفائي . أصدافها كلسية المادة رقيقة الصلصات || اعرف اجناسها وأشهرها القتاية والصلصلة والدوامة .

٢١٥٩٨ - قَتَات ، قَتَاد (F). Acacia du Sénégal . هو سبط السنغال ، اطلبه .

٢١٥٩٩ - قَتَاد الصَّمغ (F). Astragale gommifère . هو الاسطراغالوس الدبق ، اطلبه .

٢١٦٠٠ - قَتَار (S). Neocosmospora . جنس فطور مجهرية من السناجيات وفصيلة المشويات اصحابها سطحية الارتكاز جر الششاء، تكاثرها غروبية الشكل تحضن بوضاً مستديراً اسمر اللون || انواعها عديدة جميعها حيودة كانوا يعتقدون انها مفسرة ويعطون اليها بعض امراض الفطرن والبطيخ والتخيل .

٢١٦٠١ - قَتَال (F). Orque . هو الاركة ، اطلها .

٢١٦٠٢ - قَتَب (F). Bât . هو الاكاف او الرجل .

٢١٦٠٣ - قَتَب (F). Intestin, Boyau . هو المى . وقال ابو عبيده : « القتب ما تحوى من البطن اي ما استدار منه وفي الحوايا واما الامعاء فهي الاقصاب » . ج . آتاب .

٢١٦٠٤ - قَتْرَة ، يَقْلُوم (F). Affût . ناموس الصائد الذي يشيده ليستر فيه عند الصيد .

٢١٦٠٥ - قَتْرَال (S). Calurus resplendens . طائر من فصيلة الطرغوثيات . موطنه بعض مناطق المكسيك وامريكة الوسطى . يألف الاحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منها ٨٠ سم . للذنب و ٢٠ للجسم . ثوبه متداخل الالوان الساطعة . رداؤه وصدره الى الخفصة اللحية المواج . بطنه الى الحمرة القريزية القائمة . عينه كستنية اللون . حواجه سود . متقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنبه محبنا الاطراف || قوته الثار البرية والبرور والحشرات والدويبات الصغيرة || يذئن عشه في صدور الاشجار الحمرة . الاثنى تبقيش من ٤ الى ٥ يبيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢١٦٠٦ - قَتَع الإِجَاص \* ، حَقَار سَاتِي الشَفَاح (F). Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzère, Z. du polier, Z. de l'olivier, Z. du marronnier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohner, Blausiepe, Rosskastanienbohner, Apfelbohner (D).

حشرة من فصيلة القتييات حيفاء القد طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى البياض الاغبر . رواشها غيرة اللون تعلوها رقعة حنطية سوداء المواج . ريقها تقول نحو ٥ سم . ثوبها اغبر

٢١٥٩٩ - قَيْب (E). Foin (F). Hay (E). هو القش ، ما ييس من الخيش وجمع واخترن كملف .

٢١٥٩٠ - قَيْبِيض (F). Jusant (E). القيبض حركة العياجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه وايابه .

٢١٥٩١ - قَيْبُط \* (S). Polyplectron (S). Eperonier (F). Asiatie pea-cock (E).

جنس طير من فصيلة الطريريات انواعه المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزايج والهند الصينية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . ايسابها قرية الشبه من التدرج ، اذيالها مستطيلة منقطة كاذيال الطالويس . تتميز بصيص اصاغها التي يراوح عددها بين ٢ و ٦ . قنارها تاجية منتصبة . اؤلؤها عديدة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاريد الحنطي الالافري البقيش والتوشيح || انائها قضع من ١٢ الى ١٦ يفضة تحضنها وسدها في افاحيص رصمها بالقرش والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

٢١٥٩٢ - قَيْبُط (E). Mimeux (F), Mirmous (E). نعت تعريفي يطلق على كل نبات تنقبض اوراقه من المس .

٢١٥٩٣ - قَيْبِيْعَة ، قَيْبِيْعَة ، قَيْبِيْعَة (F). Narine du porc (F). Nostril of the pig (E). هي ثغرة فتضية الخنزير .

٢١٥٩٤ - قَيْبِل (S). Calypte Helenae (S). Calypte Hélène (F).

طائر من فصيلة الفريريات . اعطاه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يعتبر اصغر عصفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الالوان الزاهية ، فيه الرمادي والاحمر والاصفر والاعضر . متقار وقيق مستطيل || قوته الذباب والحوام وريحق الازامر . يذئن عشه في الادغال . انشاء تحضن من مرة الى مرتين في الحول . حشنتها من ٣ الى ٤ يبيضات تربطها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢١٥٩٥ - قَت (F). Luzerne sauvage (F). هي الفصة البرية ، اطلها .

٢١٥٩٦ - قَتَابَة \* (E). Cavolinia (S). Cavolinie, Hyale (F). Cavolinia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القتايات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ، وعشرة انواع من متحجرات الاراضي الميسانية واليبسانية || اجسامها صغيرة اللد ، مكورة الصفة البطنية ، ثلاثية الاسنان او الحماث ، كبيرة الزعانف القمية الغليظة التفصيص ، لونها الى الصفرة يملوها موج يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنفسجي اشهر انواعها قتاية البحر الاخر الثلاثة الانياط الحادة .

٢١٥٩٧ - قَتَابِيَّات (E). Cavolinidae (E). Cavolinidae (F). Cavolinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل .



قَيْبُط



قَتَابَة



قَتْرَال



قَتَع الإِجَاص





قَتَّعِ البَصَل

اللون تشوبه حمرة ارجوانية ورشفة سوداء. رأسها ودقاتها الصدرية والشرجية كسنتية اللون. وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والسفرجل والزيتون والورداء... فتفتخروا وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز. الذكر منها اصفر قداماً من الانثى. زمن كرمها يدوم نحو الشهر ينتهي بنج الممكن على السوق ثم يتفت الملك بعد ذلك بضعة ايام من يرقات دقيقة تباشر عملها التخريبي فور اصلاحها الآول.

#### ٢١٦١٢ - قَتَقُوتْ

هو يحمل الصخور، اعطيه.

#### ٢١٦١٣ - قَتَمَم

الواحدة قَتَمَة. راجع ميرسين.

#### ٢١٦١٤ - قَتَمَة

الفتحة نبات كزبرة الرائحة. (يحيط المحيط).

#### ٢١٦١٥ - قَتَمِيَّات

هي الميرسينيات، اعطياها.

#### ٢١٦١٦ - قَتْن ٥

Xérophile (F). Xerophilous (E). نعت تعريبي يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة.

#### ٢١٦١٧ - قَتْن \* ٥

Gerres (S). Gerre (F). Gerres (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة القناتيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بحار البلاد الحارة اغصها البحر الاحمر وشواطئ الهند وسريلانكا. اجسامها مبطلة، مرفوعة، قدر راحة الكف. زعانفها بارزة اغصها الظهيرة الشائعة المقدم والشرجية الفارقة.

#### ٢١٦١٨ - قَتَنِيَّات

Gerridae (S). Gerridae (F). Gerridae (E).

فصيلة اسماك مبطلة من شائكات الزعانف اجنتها وانواعها عديدة. اعطانها بحار البلاد الحارة. اعرف اجنتها واشهرها القتن.

#### ٢١٦١٩ - قَتْرَابَة ٥ ، قَتَامَة ٥

Anemopaegma miranda, Catuaba (S). Catuaba (F). Folhas catuaba (E). Katuaba (D).

جنية برية طيبة معمرة من فصيلة البتونيات. مهدها بعض اصقاع البرازيل || ساقها تملو نحو ٣ امتار. فروعها مستغلفة فناء. اوراقها ابيدة، متعاقبة، منعقة، ستانية التصلب الجامد العابق الخضار. ازهارها عنقودي التجميع، طرفي الارتركار. ازهارها جريسية الشكل، وردية اللون، مرفطة بالابيض والاصفر. ثمارها كاليسر شكلها وقد لا لكنها لا تؤكل || اشتهرت بانها اقوى منط نباتي وضادة للسرطان.

#### ٢١٦٢٠ - قَتُون ٥

Pteroptus (S). Pteropte (F). جنس قراد من فصيلة القناتيات. انواعه قليلة جميعها عياد. صغيرة القدر يبيضية الشكل مبطلة طرفها نحو مليمت واحد. انوارها الى الصفرة. الخنطية مبطلة يملو بعض الزراكش الجوية. يركب الطير والخفاش.

#### ٢١٦٢١ - قَتِين \*

Glyphiphagus (S). Glyciphage (F). Glyciphagus (E).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات. انواعه المعروفة ثمانية. اجسامها مبطلة تملو من ٣ الى ٥ اعشار المليمتر. اعطائها ثابتة ماصة. ظهورها منشفة هلب دقيق مستطيل. قوائمها اربعة أزواج. انوارها تراوح من الفقرة السوداء الى السمرة الخنطية الملوحة || تركب جمع المواد العضوية والغذائية والبيوع عند تحه وبعد تحه والقطر والجلابة. وقد تصيب الانسان في يديه ورجليه فتسبب له

اللون تشوبه حمرة ارجوانية ورشفة سوداء. رأسها ودقاتها الصدرية والشرجية كسنتية اللون. وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والتفاح والسفرجل والزيتون والورداء... فتفتخروا وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز. الذكر منها اصفر قداماً من الانثى. زمن كرمها يدوم نحو الشهر ينتهي بنج الممكن على السوق ثم يتفت الملك بعد ذلك بضعة ايام من يرقات دقيقة تباشر عملها التخريبي فور اصلاحها الآول.

#### ٢١٦٠٧ - قَتَّعِ البَصَل \* ، دَسْبُوسَة البَصَل

Dyspessa utula, Endagria utula (S). Dyspessa des olignons (F).

حشرة من القناتيات صغيرة القدر طرفها نحو ١٠ م. وبسطها ٢ م. ثوبها ابيض اللون حنطي الملوحة. ورشاتها الامايبان الى الياض الاطحل يملوها يتيج حنطي واصفر. ورشاتها الخلفيان سمر العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب. لها جيلان في الحول. رقتها صغيرة القدر سمر اللون تركب مختلف انواع بصل الزنبقيات. يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي ايلول.

#### ٢١٦٠٨ - قَتَّعِ الجَفَنَة \*

Paropota paradoxa (S). Paropota paradoxal (F).

حشرة من القناتيات. فراشها متوسطة القدر سمر اللون مبقية الراش والمهابة. رقتها قصيرة، غليظة، حنطية اللون جوية الملوحة تركب الجفنة فتسربها تحت القشور.

#### ٢١٦٠٩ - قَتَّعِ السَّاق \* ، حَقَّارِ السَّاق

Cossus cossus, C. ligniperda, Trypanus cossus (S). Cossus gâte-bois, Gâte-bois (F). Goat-moth (E). Weidenbohner (D).

حشرة من القناتيات، فراشها خضعة غليظة سمر اللون. ورشاتها حنطية يملوها يتيج وردي، وقشور، ويتجسس سمر. رقتها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جوية الثوب، سمر الظفر، حنطية اللدب. تركب سوق واصقان واناد بعض الاشجار المشعة والخرجية فتفتخروا وتعلبها، سها الاجاص والتفاح والكرز والخوخ والمشمش واللوز والاكينديا والربان والزيتون والسنديان والحور والصفصاف.

#### ٢١٦١٠ - قَتَّعِ الصَّفَصَاف \*

Cossus henleyi (S). Cossus du saule (F).

حشرة من القناتيات. فراشها صغيرة القدر تملو نحو ٢٥ م. اما بسلها فتتراوح بين ٤٢ و ٤٥ م. ثوبها الى الوردية الطلحة ورشاتها الامايبان الى الكهبة الخنطية الملوحة تتخللها عروق سمر. ورشاتها الخلفيان افتح لوناً من جسمها || رقتها مستطيلة الشكل، تبلع، عند كمال دورها الحياتية، نحو ٦ سم. ثوبها في اول عهدا يدور وردي اللون ثم يتصرف تدريجياً نحو الجؤوة تشوبه صفرة شاملة وبقع سود رابعة تملو جميع حلققات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاول || وهي تركب الصفصاف والسنت والائل والحور. تحفر السوق في شكيرها تحت القلف فتؤذيها اشد الاذى.

#### ٢١٦١١ - قَتَعِيَّات

Cossidae, Zeuzeridae (S). Cossidae, Zeuzeridae, Carpenter moths (E). Holzbohner (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجنتها وانوارها زهاء ٦٥٠ معظمها جويي السرح. اجسامها لا قياسية القدر. ورشاتها كبيرة. الوانها عديدة يغلب فيها



قَتَّعِ الجَفَنَة



قَتَّعِ السَّاق



قَتَّعِ الصَّفَصَاف



قَتْن



قَتِين

٢١٦٢٧ - **فَتَاءٌ ثُعْبَانِيَّةٌ \* ، زَهْرَةٌ شَعْرِيَّةٌ**  
Thrichosanthes angula (S). Thrichosanthe serpent, Patole, Serpent végétal (F). Snake gourd, Serpent gourd, Viper gourd (E). Haarblume, Sinesischer kürbis (D). Serpentine, Zuccetta cinese (I).

نوع من قرق الحشش وفصيلة القرعيات وهو نبات عشبي حولي عاشر ساقه تنطوي نحو ه انتار. أوراقه ثلاثية أو خماسية التفتيس، أزهاره جميلة الشكل مهدبة البتلات البيضاء، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة بملكة طويلا براوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ الى ٥ سم. لوها في أول عهدها الى الخضار البحري يملوه تسليج ابيض، ثم ينحرف تدريجيا الى ان يستقر عند النضج على الاصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كاللوبيا وغيرها من البقول.

٢١٦٢٨ - **فَتَائِيَّاتُ الْبَحْرِ**  
Holothurides  
رتبة حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات.

٢١٦٢٩ - **قَتَد**  
Concombres (F).  
هو الخيار وأحدته قتدة.

٢١٦٣٠ - **قَتَرْد**  
Moignon sec (F). Dry stump (E).  
الفتاء اليابس في أصل الشجرة والكروية.

٢١٦٣١ - **قَتْعَب \* ، قَتْعَبَان**  
Lixus (S).  
Lixe (F).

جنس حشرات قارضة ناعرة من فصيلة السويات. أنواعه نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مقطعة، طويلا براوح بين ٨ و ٢٢ سم. أوتابها عديدة يكثر فيها الاسود والاسمر والحطلي يملوها طيل أصفر أو اسقم. رقابها دقيقة غبراء اللون مسنجة الظهر تميش داخل السراويل التي تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمروعية التي تركبها اصغها الشوذر والمفوف والتبع والبوسم والنقل الخ.

٢١٦٣٢ - **قَتْعَبٌ مُسْتَطِيل**  
Lixe elongé (F).  
حشرة تدعى لكسون مستطيل، أطولها.

٢١٦٣٣ - **قَتِيت ، وَدِيَّة**  
Pousse (jeune) (F).  
Shoot (young) (E).  
الفصيلة الفتية جاز اقتلاعه عن اروعها.

٢١٦٣٤ - **قَتِيعَةُ الْبُوط**  
Phragmatiphila typhae, Nonagria typhae (S).  
Phragmatiphile des massettes (F). Phragmatiphila typhae (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها يحد من الشرق الاقصى الى اوروبية وافريقية الشمالية. الفرائسة جارية قوتها رحيق الازهار. السرقة خاضلة كيمنة تميش في أول عهدها على أوراق النباتات المنقعية ثم على البوط والقصيب فتفتق سلاحياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو ٢٣ سم. يسطها نحو ٢٦ سم. رأسها حطلي اللون يملو منخس قرني المادة. عينها كبرتان. زباناها خيطيان. جوشها وبطنها الى الحطلي الصنابي المواجه || رواشها صغيرة الحجم. الأزواج الانامي، عند الشقن، الى الحطلي الصنابي المواجه يملوه تمشيع وتفتيق وتنطيق كسني. رواشها الخلفيان الى الحطلي الانثى المواجه يسمر بعض

حكاكا مزعيا يبيع بشرة جلده. يقضى على الحكاك باستعمال الكمون عيار ٧٥.

٢١٦٢٢ - **فَتَاء ، قَتِي ، مِقَتِي ، قَقُوس ، قُشْعُر**  
Cucumis sativus flexuosus (S). Concombre serpent, C. flexueux, Melon serpent (F). Snake cucumber, Curving cucumber (E). Schlaugengurke (D). Cocomero serpente, C. di turchia (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصغرامه اربعة اوجه سقوها مدادة. أوراقها طويلة الزناد مفصصة. ثمارها اسطوانية، مستطيلة، حلقة البشرة في أول عهدها. طويلا براوح بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ الى ٨ سم. لوها الى الخضار العابق ومنها البحري ولاغبر الاصفر. طعمها بين الحيار والكويو || تكثر زراعتها في البلاد الحارة. ترغب في الاثرية المتوسطة الاندماج والرطوبة.

٢١٦٢٣ - **فَتَاءُ الْبَحْرِ \* ، خِيَارُ الْبَحْرِ ، ذُبُ الْبَحْرِ**  
Holothuria (S).

Holothurie, Biche de mer (F). Holothurian, Sea-Slug, Sea-cucumber (E).

جنس حيوانات بحرية من فتائيات البحر. انواعه عديدة جميعها اسطوانية ععدة الجسم المستطيل، مدنية الطرف، مخنوقة العنق، فارسة الحواس القمية التي براوح عدها بين ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعها واشهرها. الثلاثة التالية:

Holothuria tubulosa (S).  
فتاء البحر الأنبوبي  
يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صفور الشواطئ.

Holothuria edulis (S).  
فتاء البحر المأكول  
يكثر في بحار الصين واسترالية والخليج الفارسي والبحر الاحمر.

Holothuria intestinalis (S).  
فتاء البحر المصرائي  
موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم الدقيق.

٢١٦٢٤ - **فَتَاءُ الْحَيَار**  
Ecbale (F).  
هو الفتاء البري نبات يحمل ثمرأ كالفتاء. مز الطعم كربه الرائحة يسقط بخصارته للبرقان الاصفر فيقتد من الانفاد مادة صفراء يزول البرقان باستفراغها. (ا. م.).

٢١٦٢٥ - **فَتَاءُ الْهَنْد**  
Bel indien (F).  
هو الايكل أو البيل، أطولها.

٢١٦٢٦ - **فَتَاءُ بَرِّي \* ، فَتَاءُ الْحِمَار ، قَقُوسِ أَتْمِير ، عَوَزُور ، أَطْرِيُون**

Ecballium elaterium, Momordica elaterium, Elaterium officinale, E. agreste (S). Ecbale, Cornichon d'âne, Concombre sauvage, Giclet (F). Squirting cucumber (E). Echte Springgurke (D). Cocomero asinino, Eelaterio, Poonocini salvatici (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات. يعيش في المواق الرطبة. أوراقه تشبه أوراق الفتاء والخحير تطلبها وتأكلفها. ثماره رنية، مستطيلة، حجمها حجم بيض الوز، تنفصل عن الساق عند نضجها وتقتد بزورها بعيدا عند الضغط عليها وهي سامة يستخرج من صغبرها مادة فعالة تدعى ايلاتريوم تعتبر من المسهلات المنقية وها استعمالها الطبي المعروف.



فتاء البحر



فتاء بري



فتاء ثعبانية



قَتْعَب



قَتِيعَةُ الْبُوط



قجاج

Houppier (F). ٢١٦٤٥ - قَحْمَصَة ، بِقَاص

Crown (E). الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة . ج ققام ويقوع .

Maroute (F). ٢١٦٤٦ - قَحْرَان

هو الاقحوان الحُسن ، اطلبه .

Décrépitude (F). ٢١٦٤٧ - قَحْوَمَة

Decrepitude (E). القحومة حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .

\* ٢١٦٤٨ - قَحْيَقَة \*

Cranla (S). جنس سمك بحري من فصيلة الاسبوريات الشائكات

Cranie (F). Cranie (E). الزعانف . انواعه نحو ١٥ اطلانها بحار البلاد الحارة .

اجسامها بيضية الشكل مبطلة طولها يراوح بين ٢٥ و ٧٥ سم . زعانفها كبيرة ، الشرجية منها فارقة . فلوها رقيقة مسننة . ألوانها متداخلة الالوان ، ظهورها ودية أو مرجانية ، بطونها فضية . طولها قليلة العلم مرغوب فيها || اشهر انواعه :

Cranidae (S). ٢١٦٤٩ - قَحْيَقِيَّات

Cranidés (F). Cranidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل .

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الارضية الاول وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية . اما الانواع المعاصرة قليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها ملتحمة باصدانها ، عادة السويقات العلوية || اعرف اجناسها واشهرها الحقيقية والقنومة .

Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E). ٢١٦٥٠ - قَدَّ

جنس سمك صغيرة القد مسطحة الشكل من فصيلة الطريخيات الشائكات الزعانف || انواعه عديدة منها البحرية والبرية . جميعها تعيش في المسق . طولها دون المادي .

Chabot (F). ٢١٦٥١ - قَدَّ بَحْرِي

Short-spined (E). نوع من القد موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ المصرية المسقية النور . جسمه اهليجي الشكل مستطيل الزعانف الشائكة . رأسه كبير القد طوله يمازي الزام الاول من الجسم . ثوبه متراكب الالوان فيه الالبيض والاسمر والجزوي والاشقر || اشواك زعانفه حادة مؤذية يحاشها الصيادون .

Cottus gobic (S). ٢١٦٥٢ - قَدَّ تَهْرِي

Chabot (F). Father-lasher (E). نوع من القد يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة القد ، كثيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة . ثوبه متداخل الالوان المراكبة . لحمه كرهه العلم لا يؤكل .

Arôme (F). Aroma (E). ٢١٦٥٣ - قَدَّآ

الرائحة الطيبة . يقال ناع قَدَّآ .

Fleurs de bigaradier (F). ٢١٦٥٤ - قَدَّاح

Flowers of a Seville-orange tree (E). القداح هو زهر النارجون أو القشاش . ومنهم من قال نور

النبات قبل ان يتفتتح . وأطراف الثبت الغض .

الشيء عند اقترابه من الحمار الحاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أواخر ايلول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تقطع نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، عاجي اللون ، تنبي المواج يملوه بغض الحلب القصير الاغبر . رأسها اسود مذهباً ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي داخل سلامة البروط أو القصب .

\* ٢١٦٣٥ - قُجَّاج \*

Pagrus (S). جنس اسمك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات

Pagre (F). Braize, Porgy (E). الزعانف . انواعه نحو ١٥ اطلانها بحار البلاد الحارة . اجسامها بيضية الشكل مبطلة طولها يراوح بين ٢٥ و ٧٥ سم . زعانفها كبيرة ، الشرجية منها فارقة . فلوها رقيقة مسننة . ألوانها متداخلة الالوان ، ظهورها ودية أو مرجانية ، بطونها فضية . طولها قليلة العلم مرغوب فيها || اشهر انواعه :

Pagrus vulgaris (S). القجاج المذلول

Pagre commun (F). سمكة شبيهة بالمرجان . شائعة في المتوسط .

Pagrus orphus (S). Pagre orphe (F). القجاج الارفي

سمكة متوسطة القد مستطيلة الخنم تكثر في شمالي المتوسط وعلى شواطئ الاطلسي .

٢١٦٣٦ - قُجَّاب

سمال الخيل .

٢١٦٣٧ - قُجَّار

سمال الابل .

٢١٦٣٨ - قُجَّال

هو السيل الجارف .

٢١٦٣٩ - قُجَّالَة

Benne préneuse (F). جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان

Grab-bucket (E). الى مكان .

٢١٦٤٠ - قُجَّال

داه يصيب الغنم تنجف جلودها .

٢١٦٤١ - قُجَّامَة

Catabolisme (F). علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

Catabolism (E). ٢١٦٤٢ - قُجَّط

Orontium (S). جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات .

Oronce (F). Floating arum (E). انواعه قليلة اطلانها منافع وخصاف بحيرات البلاد الحارة

اخضها ضفاف العاصي . اوراقها قرصية الانتساب

منقطة اهليجية . فصلها يطول من ١٢ الى ٣٠ سم .

ويمرض من هـ الى ١٢ شمراخها الزهري يعلو نحو ٥٠ سم .

٢١٦٤٣ - قُجَّفن

Crâne (F). القحف هو الجمجمة أو عظמה .

٢١٦٤٤ - قُجَّفل

Aspermie (F). التعلل اندام الحيوانات المنوية في المذي واندام البزور

Aspermatism, Aspermia (E). في ثمار النبات .



قَدَّ



قَدَّ بحري



قَدَّ سهري

Altise du tabac (F).

٢١٦٦٥ - قَدَادُ التَّبَاقِ

راجع التيز التبغ .

Altise des céréales (F).

٢١٦٦٦ - قَدَادُ الزَّرْعِ

راجع التيز الزروع .

Altise de la vigne (F).

٢١٦٦٧ - قَدَادُ الْكَرْمَةِ

راجع التيز الكرمة .

Chaton (F). Setting of a gem (E).

٢١٦٦٨ - قَدَقَةٌ

هي المهرمة ، نظام بهمة يرتكز على سنبلة مركبة من ازهار  
وحيدة الشق .

Gobelet, Vase (F).

٢١٦٦٩ - قَدَحْ \*

شكل من اشكال التقليم في الاشجار .

Goblet, Vase (E).

٢١٦٧٠ - قَدَرٌ

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E).

٢١٦٧١ - قُدْرَةٌ

هي القوة على الشئ ، والتمكن منه .

Interligne (F).

٢١٦٧٢ - قُدْرَةٌ

Interlining, Space-line (E).  
هي الفراغ اي المسافة بين الرزق والرزق في الفرس  
المنسق .

Kadsura (S).

٢١٦٧٣ - قَدَصُورَةٌ

Kadsura, Kadsoura (F).  
جنس جنبات برية ويزينية من فصيلة الغنجليات . انواعه  
عديدة منها الشرق الاقصى . سوقها فراء تملو من ١٠٠  
الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعققة . ازهارها  
فردية التجميع ، ابطية الارتكاز . ثمارها نورية ثلثولية  
القشور || اشهر انواعه واعمالها زراعة القدصوره اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدَصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ \*

Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).

نوع من القدصوره الزراعية واليزينية وهي جنبة جاحدة  
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعطليجية ذرية ،  
تصلها جامد الصفحة مالمس البشرة . ازهارها الى البياض  
الاخضر يعلو موج اصفر . ثمارها الى الحمرة القرمزية .  
اقتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . نقيم افنانها  
واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الدهنية .

Anthèse (F).

٢١٦٧٥ - قَدَفٌ ٥

نمن فخر الزهرة اي زمن افتتاح فجرة الطلع .

Caranx trachurus (S).

٢١٦٧٦ - قَدَقْدُ

نوع من الشيم وهو سمكة بحرية تستطيلة الشكل طولها نحو  
٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها  
مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E).

٢١٦٧٧ - قَدُورٌ

السلالة المنتخبة من صرم معرف الصفات الشوذية .

Piophilá (S). Piophile (F).

٢١٦٧٨ - قَدُورُوح ٥

جنس حشرات صغيرة القد ثنائية الجناح من فصيلة  
القدورحيات . انواعه عديدة اهلها الى السمرة الالامه ،

Astragale (F).

٢١٦٥٥ - قَدَادٌ

هو الاسطراغالوس . اطلبه .

Cricetus (S). Cricet (F).

Cricetus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من الفأريات . انواعه عديدة  
موطنها العالم ، منها ١٣ مهدا العالم القديم . اجسامها ربعة .  
رؤوسها مخروطية . مقاضمها مقنطرة . آذانها متوسطة القد .  
جراميزها واذنانها قصيرة . اهلها مختلفة الالوان . ديبها ناعم  
قصير ، صوفها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

Cricetus nigricans (S).

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في  
جبال لبنان من علو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠  
سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الزبد السمر . يعلو موج اسود ،  
ظهوره اعين من بطنه || يألف الاحراج والادغال قوته  
المواد النباتية والعفوية .

Cricetus arenarius (S).

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفقاس واروية .  
ثوبه الى الزبد السمر . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف  
المناطق الرملية والجرف الدغلة المذبة .

٢١٦٥٩ - قَدَادُ هَمْسْتَر ، قَدَادُ اَلْمَآنِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الاصفر  
الحطبي يعلو موج اخضر . مقضمه ابيض . جبهته موشجة  
مخط اسود . خذاه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنابية .  
بطنه الى السمرة الباقية || موطنه بعض المناطق الاروبية  
اخضها المائي والذئرك الى جحره رطب الأرجاء يقيم في  
الهوم على عمق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف  
من حجرة وسطى فسجة ونفق مستطيل لتعرضه من البين  
والثبات عدة دهاليز مستطيلة يحزن فيها ما تبه من حنطة  
وفيرا من الحبوب || انشاء قنص من ٤ الى ٨ ادراع  
ترضعها ثلاثة اسابيع .

Cricétinés (F).

٢١٦٦٠ - قَدَادِيَات

عمارة حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات اجناسها  
وانواعها كثيرة موطنها العالم . انواعها الامريكية فقط تم  
٨٢ جميعها ربعة الجسم قصيرة الجرامز والذنب . قوتها  
الحبوب ومائر المواد النباتية .

Vanne (F). Water-gate (E).

٢١٦٦١ - قُدَاس

القُداس حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية انسيابه .

Altise (F).

٢١٦٦٢ - قَدَانٌ

هي الاليز جنس حشرات من النصاريات .

Altise bleue (F).

٢١٦٦٣ - قَدَانُ اَزْرَقٌ

راجع التيز زرقاء .

Altise potagère (F).

٢١٦٦٤ - قَدَانُ الْبَقُولِ

راجع التيز البقول .



قَدَادٌ



قَدَحْ



قدصوره يابانية

Occipital ٢١٦٩٠ - قَدَّالِي ، قَفَّي  
نمت تمريني يطلق كل ما هو مختص بالقدال .

#### ٢١٦٩١ - قَدَّانِيَّات ٥

Aphaniptères, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).

رَبَّة حشرات صغيرة القند من طبقة عديمات الجناح . فصائلها خمس إما اجناسها وانواعها ٥٠٠ || اجسامها خافتة الجوانب المصفولة ، هليبة الزغب المنحج الى الوراء . رؤوسها صغيرة القند ، عويناتها بسيطة . قرونها الاستشعارية تحيلة مركبة من ثلاث فواصل . متاك اغطالها ثاقبة ماصة . ارجلها قوية مدة القفز || وتتميز افراد بعض فصائلها بصف او صفين من الانسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون عدي او سدري الارتكاز . ذكروها اصفر من انثاها تحمل عدة الكوم في قميصاتها المنقطة نحو العلاء || اشهر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

Vexille (F). Vexillum (E). ٢١٦٩٢ - قَدَّة ٥

القدة نصل الريشة . وهما قذتان ، القدة الوحشية اي الخارجية والقدة الانسية اي الداخلية .

Ejaculation ٢١٦٩٣ - قَدَف ٥

راجع اندفاق .

Balistique (F). Ballistic (E). ٢١٦٩٤ - قَدَفِيَّة ٥

القذفية علم يبحث في رمي القذائف اي في ضبط حساب مدى المرمى وتسديده .

٢١٦٩٥ - قَر ٥ هو حبل القتر .

Froid (F). Cold (E). ٢١٦٩٦ - قَر ٥

هو البرد الشديد .

Poussin (F). Chick (E). ٢١٦٩٧ - قَر ٥

صغير الدجاج . هو الصوص والكتكوت .

٢١٦٩٨ - قَرَّة ، وِدَاق ٥

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).

مدة استحرام انثى الحيوان او زمن ودقائها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

— بستة ايام عند الفرس

— بعشرين يوماً عند البقرة

— باربعين يوماً عند الخنزيرة

— باربعة او ستة اشهر عند الشاة

عند الانثى غير الحامل

كل ٢٥ يوماً عند الفرس

كل ٢٠ يوماً عند البقرة

كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة

من ١٥ الى ٢١ يوماً عند الشاة

Caranx Korab (F). ٢١٦٩٩ - قُرَاب ٥

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، اطلبها .

Gaine ovarique (F). ٢١٧٠٠ - قُرَاب بَيْضِي ٥

Ovaric sheath (E).

عضو من سوار انثى الطير والخرشوات وهو وعاء جراي

الشكل يتكون فيه البيض

جميعها هوائية نائلة تركب مختلف المواد العضوية اخصها الجبن والذهن || اشهر انواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٧٩ - قَدُّوح الجبن ٥ \* Plophilidae (S).

Plophile du fromage, Mouches du fromage (F).

نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القند طولها نحو ٣ م . ثوبها الى السرة السوداء ، مقدمها وارجلها الى الصهبة ، عويناتها حر . تتجمع مكانها في الجبن فينتفخ عن رقات دقيقة تحيلة تعيش على الجبن فتتخره وتعلميه .

٢١٦٨٠ - قَدُّوحِيَّات ٥ Plophilidae (S).

Plophilidae (F). Plophilidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها قليلة ، جميعها من الذباب الملوكة النائل الصغير القند المستطيل الارجل || رقاتها تعيش على المواد العضوية المتخرسة وعلى الحوم المتفددة والجبن والاسماك ...

Cottidae (S). ٢١٦٨١ - قَدِّيَّات ٥

Cottidae (F). Cottidae (E).

فصيلة اسماك من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد تقسم الى قسمين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك النهرية التي تعيش في المياه العذبة . جميعها من الاسماك المسنجة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الاجسام المستدقة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصف .

٢١٦٨٢ - قَدِّيَّات ٥

فصيلة نباتية تعرف بالمرديات ، اطلبها .

Viande desséchée (F). ٢١٦٨٣ - قَدِيد ٥

Dried meat (E).

لحم مقدد .

٢١٦٨٤ - قَدِّيَّسيَّات ٥

هي القردديات ، فصيلة نباتية ، اطلبها .

Lamarkia (S). ٢١٦٨٥ - قَدِّيَّيُون ٥ ، لَامَرْكِيَّة ٥

Lamarkie, Codion, Eléodendron (F).

جنس نباتات عشبية برية من التنبليات المكشيات . انواعه المعروفة عديدة منها براري حوض البحر الابيض المتوسط || اوراثها صغيفة النصال المسطحة . ازهارها سبيل التجميع . سبيلاتها صغيرة .

Branchipus (S). ٢١٦٨٦ - قَدَّة ٥ \*

Branchipe (F). Branchipus (E).

دويبة من القشريات الدنيا عيشيات الاطراف . تعيش في المياه العذبة . جسمها عادم الحواف ، مستطيل الشكل ، بطول نحو ١ م . عيناها مزندتان . زباناها مستطيلان عند الذكر . قوائمها الصدرية صفيحية الشكل . تموم على ظهورها .

Brachyne (F). ٢١٦٨٧ - قَدَّالَف ٥

هي الرمانة ، اطلبها .

٢١٦٨٨ - قَدَّالَف أَحْمَرُ الرَّاس ٥

Brachyne crépissant (F).

هو الرمانة الحمراء الرأس ، اطلبها .

٢١٦٨٩ - قَدَّال ، قَفَّال ٥ Nuque (F). Nape (E).

جامع مؤخر الرأس وقيل ما بين فقرة القفا الى الاذن والقدال من الفرس معقد المذار خلف الناحية . ج قذل وأقذله .



قَدَّة

٢١٧١٤ - قَرَّاص هو البراد، اطلبه .

٢١٧٠١ - قَرَابَة هي العصادة ، اطلبها .

٢١٧١٥ - قَرَّاص ، قَرَبِص ، حُرْبِق ، أَشْجَرَة

Urtica (S). Ortie (F). Nettle (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القَرَابِيَّات  
أنواعها المعروفة ٣٠ . أصلها البلاد المعتدلة الحارة . سورها  
منصبية فراء . أوراقها معنقة متعاقبة أو متعاقبة . نصلها  
مزينة الحاد زغبها حليبي دقيق يفرز عصارة حمرة تركز  
على الحامض التل وهو يشب بحد يسميه فيبيج الجلد  
وبلهبه || أضراره خضراء وحيدة أو ثنائية المسكن .  
يزورها طيبة عديدة الفوائد مثيرة للرغبة الجنسية وقد تضاعف  
في العطارة إلى أكثر الأدوية المنبهة المستعملة لهذه الغاية .  
والقراص الجاف يفتقر الخواص اللاحقة بعد اختلال الحامض  
التل || أعرف أنواعه وأشهرها الكاري والكبير والمحرق .

٢١٧١٦ - قَرَّاص كَذِب Lamier blanc (F).

هو اللابيون الأبيض ، اطلبه .

٢١٧١٧ - قَرَّاص كَارِ \* ، قَرَبِص رُوماني ،

نبات النار Urtica pilulifera (S).

Ortie à pilules, O. romaine (F). Roman nettle (E).  
Pillennessel (D). Ortica romana (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يكثر  
في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زب . أوراقه معنقة ،  
متعاقبة ، أحليبية ؛ نصلها حشن البشرة ، سنن الحافة ،  
كثيف الحلب الشائك . أضراره وحيدة المسكن خضراء اللون .

٢١٧١٨ - قَرَّاص كَبِير \*

Urtica dioica (S). Ortie dioïque, Grande Ortie,  
Ortie puante (F). Stinging nettle, Large nettle (E).  
Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D). Ortica  
grande, O. maschia, Orticone (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يكثر  
في البور وقرب السياجات . ساقه فراء عالية . أوراقه  
مستطيلة الزام الأخير ، سنن الحافة ؛ نصلها كثيف  
الحمل اللينق مبهر الحلب المستطيل . أضراره ثنائية  
المسكن .

٢١٧١٩ - قَرَّاص مُحَرَّق \* ، قَرَبِص العَجُوز

Urtica urens (S). Ortie brûlante, Petite ortie (F).  
Small nettle, Dwarf stinger (E). Kleine Nessel (D).  
Piccola ortica, Ortica ardente (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يعيش  
أينما كان وفي أي تربة كانت . ساقه قصيرة فراء زب .  
أوراقه بيضيه الشكل منشارة الحافة نصلها لبد الحمل  
الحليبي الشائك . أضراره وحيدة المسكن .

٢١٧٢٠ - قَرَّاصِيَّات \* Prunus cerasifera (S).

Prunier cerise (F).

نوع من الفروع شجرته صغيرة اللقد تلو من ٣ إلى ٤ أمتار .  
ساقها فراء . أوراقها أحليبية النصل شديدة الخضار العابق .  
ثمارها مأكولة وهي كرزوية الشكل واللقد ، بنفسجية اللون ،  
خضراء المواج .

٢١٧٢١ - قَرَّاصِيَّات Urticaceae (S).

Urticacées, Urticées (F). Urticaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللقطين عادمة اللقعات أجناسها  
وأنواعها عديدة معظمها نباتات عشبية وجنبية وبعضها  
شجري . جميعها عادمة الحلباب . أوراقها حليية النصل .  
أضراره رباحية أو خاسية التركيب . ثمارها فقيرة أو  
نوعية ، صغيرة اللد .

٢١٧٠٢ - قَرَّاح ، قَرُوح Guéret (F).

Ploughed but unsown land (E).

أرض حرثت ولم تزرع ولم تفرس . وقيل المزرعة التي  
ليس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الأرض الخلسة لزراع  
أو لغرس .

٢١٧٠٣ - قَرَاد ، قَرَاد ، حَلَم Tique (F). Tick (E).

اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معتم أنوع اللحليات .  
الواحدة قرادة وحلمة .

٢١٧٠٤ - قَرَاد الجَرَب \* Symbiote

جنس قراد يحدث جرباً في الخيل والمجترات .

٢١٧٠٥ - قَرَادِيَّات ، حَلَمِيَّات

Acariens (F). Spiders (E). Milben (D).

رتبة حشرات من التكنوبيات فصائلها وأجناسها وأنوعها  
كثيرة العدد . جميعها صغيرة اللد . أجناسها عادمة الفواصل  
والخلفات . رؤوسها وصدرها وبطنها منديجة . مضغها  
أزب الجلد . ملابها الفككية لانياسية الشكل منها الملقطة  
والبيضة ... غاططها قارضة أو ثاقبة ماصة . أرجلها  
ثمانية في الحشرات الكاملة . سداسية في البرقات وهي معجنية  
الاطراف أو غليية || أشهر فصائلها : الارغشيات  
والبرانيات والجربيات والحاشيات والسكيات والشيشيات  
والطلحات والنشيات والكهديات .

٢١٧٠٦ - قَرَار Arrêté (F). Order in council (E).

هو آخر ما استقر عليه الرأي في تعين الاجراءات التي  
يقضها نشر القوانين وتنفيذها || أما السلطات التي  
يؤمها القانون حق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء  
والوزير والمخلف والبلدية .

٢١٧٠٧ - قَرَار Décision (jur.) (F). Decision (E).

هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم  
منطوقه ومن الطليات التصريح بها .

٢١٧٠٨ - قَرَار الائتِهَام Réquisitoire (F).

Lest of charges, Indictment (E).

هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - قَرَار الإحَالَة Ordonnance de renvoi (F). Sending ordinance (E).

هو القرار الذي يصدره قاضي الإحالة .

٢١٧١٠ - قَرَار التَحْصِيل Mise en recouvrement

قرار تصدده الادارة أو مصلحة الضرائب يحمل قسام  
التحصيل نافذة منذ صدورها .

٢١٧١١ - قَرَار الرَّفْض Décision de rejet (F).

Carrying decision (E).


هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .

٢١٧١٢ - قَرَار تَحْصِين التَّالِف Arrêté de cessibilité (F). Transferability order (E).

قرار تعين فيه الادارة المقارات التي ستزوع ملكيتها من  
أصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المنفعة العامة .

٢١٧١٣ - قَرَار نَالِف Décision exécutoire (F).

Executory decision (E). هو القرار الواجب تنفيذه .



قراد الجرب



قَرَّاص كَارِ



قَرَّاص كَبِير



قَرَّاص مُحَرَّق



قَرَّاصِيَّات



معظم أنواعها عصارة حبابية حراء اللون سريمة الجفاف تستعمل استعمال الكينو والكاشو .

Cornouiller (F).

٢١٧٣٢ - قُرَانِيَا

هي القرونس ، اطلبه .

Cornacées (F).

٢١٧٣٣ - قُرَانِيَّات

هي القرونسات ، اطلبها .

٢١٧٣٤ - قُرْبَة

هي الزق ، اطلبه .

Corvina (S).

٢١٧٣٥ - قُرْبَة

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات || أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متفارقة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم . اطيافها متباينة الالوان يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحمها جيدة الصنف مأكولة || اعرف انواعها واشهرها القرية السوداء .

٢١٧٣٦ - قُرْبَة سَوْدَاء \* ، قَاقِ الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeau de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القرية . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٨ الى ٣٥ سم . ثوبها الى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها فضي . زعانفها الى السواد الارزق المواج يعلو تنطبق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها متعادلان . شدتها معتدل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشرتان . زعانفها متباينة الاشكال . الظهريه الارزق محزومة . الظهريه الثانية مستطيلة . الصدرية مجذافية . الخوضية قديرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية مجوفة الطرف || لحمها جيد الصنف ، ودغوب فيه .

٢١٧٣٧ - قُرَّت الْجِلْد . Kératose (F). Keratosis (E).

علة في الجلد تنشط الطليقة القرينية تتخفن وتتصلب .

٢١٧٣٨ - قُرَّة \* ، قُرَّة الْعَيْن

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تعيش على سطح الماء سوتها عشية . اوراقها منقعة ، مركبة ، ثلاثية الوربيات . ازهارها عشوية النجم ، بيضاء اللون . فروعها واوراقها وازهارها مأكولة ، نائمة (راجع جداول الفيتامين).

٢١٧٣٩ - قُرُنْج

Cyclostrema (S).

Cyclostrem (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة القرنفريات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصدافها صغيرة القد قرصية ، محزونة ، متدلة الانحناء ، جانبية القوطة المستديرة كالوق . لونها الى البياض الاخير تملو زخرفة جؤوية متناسقة تمتد من القوطة والقاعدة الى القمة .

٢١٧٤٢ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ Acaláphes (F).

رئة من المحفوات تنتمي الى صف الهيدرات اللوسية . فصائلها واجناسها عديدة تتميز بشكلها القمي التركيب تملو اعداب شائكة اذا لامست الجلد ألمته كما يفعل القراص . اعطائها جيع بحار البلاد الحارة والمعتدلة تعيش على الصخور .

٢١٧٤٣ - قُرَامَة \*

Karatas (S). Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-towplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربينية من فصيلة الانناسيات . اوراقها لحية ليفية مستطيلة طحلاء اللون شائكة الاطراف والمقصية . ازهارها جميلة الشكل والالوان ، سلبية التجميع || انواعها قليلة اشهرها ما يتبع .

٢١٧٤٤ - قُرَامَة سَانْ دُومِنْجْ

Karata de St. Domingue

نوع من القرامطة اوراقها صناعية نسجية وقد تستعمل تنج الجذور بعد سحقها في تدويج السلك لصيده .

٢١٧٤٥ - قُرَامَة غُويَان ، شَجَرَة الْفَتَالِيل

Karata de la Guyane, Bois de mêche

نوع من القرامطة لها كالمصوفات يستعمل استعمال الفتاليل . ثمارها صغيرة القد ريفية الشكل تدمي ليمون الارض لانها حازنة الطعم وتنضج في التربة .

٢١٧٤٦ - قُرَاع ، قُرَاع ، قُرَاع

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر يحجم الدورار يتسلق جذوع الاشجار وينقرها لاستخراج الديد من ثغورها . راجع نقار .

٢١٧٤٧ - قُرَاع

Dermatomyecosis (S).

Dermatomyecose (F).

مرض جلدي سببه القراد .

٢١٧٤٨ - قُرَاقَة

Ecorce (F). Bark (E).

هي اللحاء يوجه عام وفي التخصص لحاء سوق النباتات الحولية والحرولة .

٢١٧٤٩ - قُرَام

هو البشته المعقدة نبات عشبي علني من التيجليات .

٢١٧٥٠ - قُرَام \*

Rhizophora (S).

Rhizophore, Manglier (F). Mangrove tree (E).

Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rizofora (I).

جنس اشجار منتقية من فصيلة القراميات . انواعه ٥ اشجارها كبيرة القد . اوراقها معققة ، متقابلة ، جلدية التصل للاع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خذروفية الشكل ، مأكولة اللب . يستخرج من عصارة ثمارها بعد تحميرها مشروب خري لا بأس به .

٢١٧٥١ - قُرَامِيَّات

Rhizophoraceae (S).

Rhizophoracées (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات . اجناسها ٥ وانواعها ٥٠ اعطائها المناطق الاستوائية . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها منقعة ، متقابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابضية الارتكاز او تاجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق



قُرَامَة



قُرَام



قُرَة سَوْدَاء



قُرَة

ازهاره عنقودية التجميع، كبيرة القد، تبدو بيضاء اللون ثم تتحرف شيئاً فشيئاً الى الاحمر || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

### ٢١٧٥٢ - قُرْدَبُ الْمَنَاقِعِ

Renouée à feuilles de patience (F).  
يعرف بالبدنار، اطلبه.

### ٢١٧٥٣ - قُرْدَبُ شَرْقِي

Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient, Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).  
نوع من القردب التريبي شروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقه كبيرة القد، نصلها يبيضي الشكل، ذلق الزايم الاخير. ازهاره سنبلية التجميع، طرفية الارتكاز وبحورية، مستطيلة الزنناد متدلية، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الابيض والوردي والاحمر والموشح || ازهارها يستمر من آب الى ايلول.

### ٢١٧٥٤ - قُرْدَبُ صَوِي

Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).  
نوع من القردب التريبي ساقه زباء، لعله، ملحاء اللون. سنبلية، نصلها خلي الصفحة القضية الموج. ازهارها سنبلية التجميع، متبادعة، بيضاء اللون او وردية. ازهارها يستمر طوال شهر ايلول.

### ٢١٧٥٥ - قُرْدَبُ صِينِي

Polygonum chinense (S). Renouée de Chine (F).  
نوع من القردب التريبي ساقه فروعاً تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه اغليجية مستطيلة، نصلها قصير الملق، سنن الحافة، اخضر البشرة او احمر. ازهاره عنقودية التجميع، تاجية الارتكاز، قمرية اللون. ازهارها يستمر طوال الصيف.

### ٢١٧٥٦ - قُرْدَبَةُ

Guenon (F). She-monkey (E).  
انثى القرد.

### ٢١٧٥٧ - قُرْدُوحُ

Papion (F).  
هو القردوح، اطلبه.

### ٢١٧٥٨ - قُرْدُوعُ، تَمَّ

Philopterus (S). Philoptère (F). Philoptère (E).  
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النمنمات. انواعه عديدة جميعها مقلطة الجسم. مستطيلة الرأس. طولها براوح بين ١ و ٤ م. ألوانها الى الخنثى يسمر او يصفر مع الانواع. وهي من الحشرات المؤذية، تركب الطير فتضيقه بامتصاصها الدم.

### ٢١٧٥٩ - قُرْدُوعُ أُسْمَرُ

Philopterus atratus (S). Philoptère noir (F).  
نوع من القردوع طوله نحو ٢ م. جسمه يبيضي الشكل، كثيف الغلب المستطيل. ثوبه الى السمره يطغى بتيقج مثلث الزوايا حنثي اللون || يركب الغربان اخضها البداف.

### ٢١٧٦٠ - قُرْدُوعُ الْبَطِّ \*، تَمَّ الْبَطِّ

Anaticola anseris (S). Anaticole des ansérades (F).  
نوع من القردوع طوله براوح بين ٢ و ٣ م. جسمه ضيق الشكل. ثوبه الى الصفار الخنثي. هليه صغير القد، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذي.

### ٢١٧٤٠ - قُرْطِيَّات

Cyclostrematidae (S). Cyclostrematidés (F). Cyclostrematidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل حشفيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في منظر بحار العالم اخضها بحار البلاد الحارة والممتدة الحارة || اسدهاها مغطاة او شفافة، عادمة المادة القلوية، متبادنة الاحجام، يكثر فيها الصفر. جميعها قمرية محلونة، قليلة الارتفاع، مستديرة القوية الاجنانية الارتكاز القرنية المادة || اشهر اجناسها القرع.

### ٢١٧٤١ - قُرْطَانَةُ

ضرب من الكدابة. ج. قرحان. والقرحان يبيض صفار ذوات رؤوس كروئوس القطر.

### ٢١٧٤٢ - قُرْطَحَةُ، قُرْطَحَةُ

Ulcère (F). Ulcer (E).  
تريده نسيجي لاتيبي الشكل والشان يحل في الاجسام الحيوانية والنباتية فيعطبها.

### ٢١٧٤٣ - قُرْطَحَةُ الْغَنَمِ، قُرْطَحَةُ الْمَرَاشِفِ

Becqueriau du mouton, Chancres des lèvres (F).  
مرض عضال يصيب الغنم. مظهره الخلاري يشور بقع مقروحة تملو مراشفت الحيوان المصاب.

### ٢١٧٤٤ - قُرْطَحَةُ الْفَقَا

Mal de nuque (F).  
عارض يصيب الخيل.

### ٢١٧٤٥ - قُرْدُ، سَعْدَان

Singe (F). Ape (E).  
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات. كنيته ابو خاله وابو حبيب وابو خلف وابو رية وابو قشة. جمه قردو وقردة. والاثني قردة جمها قرد. وتسمى لفة ودحية.

### ٢١٧٤٦ - قُرْدُ الْمَغْرِبِ

Magot (F).  
هو الشديم، اطلبه.

### ٢١٧٤٧ - قُرْدُ الْهِنْدِ الْمُقَدَّسِ

Singe saint des hindous (F).  
هو هبار التلوس، اطلبه.

### ٢١٧٤٨ - قُرْدُ امْرِيَكِي

Saki (F).  
هو الساي، قرد كك الذنب واللحية.

### ٢١٧٤٩ - قُرْدُ مُقَدَّسٍ

Semnopitèque (F).  
هو الهبار، اطلبه.

### ٢١٧٥٠ - قُرْدَبُ، عَصَا الرَّاعِي

Polygonum (S). Persicair, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة البطباطيات. انواعه عديدة منها البرية والتريبية والعشبية والجنسية والعارشة. سوقها عقدية، اوراقها لانياسية الشكل، ازهارها عنقودية التجميع او سنبلية، اشهر انواعه ما يلي.

### ٢١٧٥١ - قُرْدَبُ التُّرْكْمَنِيَّانِ \*

Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).  
نوع من القردب التريبي. ساقه عارشة تملو من ٥ الى ٨ امتار، فروصها رطلة، اوراقها اغليجية الشكل، قلبي القاعدة، نصلها مالمس البشرة، سنن الحافة.



قرد التركمن



قردب شرقي



قردب صوفي



قردع اسير



قردع البط

## ٢١٧٦٩ - قُرْدُوعُ شَحَوْت ، رُبَّاحُ أَبُو اَهْلٍ ، وَهَاب

Papio sphinx (S).  
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القردايع كبير الجثة افضل الزقروم . موطنه يمتد من النيل الى النيجر والكنغو. ثوبه الى الجؤرة الباهتة يمتد مع اقترابه من شج الظهر ونقرة الرأس . حاجبه اولف الشعر الابيض . اذنه متوسطة القد موداه . صوته يشبه قباغ الخنزير || جاعته متوسطة العدد .




قردع الحام

قردع الجوام

## ٢١٧٧٠ - قُرْدُوعُ خَشْنَبْرِي ، شَحْمَةُ

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).

اكبر القردايع جثة واسطوا زلقيا وهو عادم الفقرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهبة السمره يطولها موج اخضر . حنجر حار كله ابيض اللون وشعر حاجبه ١٠٠ يالفت الحجاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة تعد بعض العشرات .



قردع النور

قردع الزنج

## ٢١٧٧١ - قُرْدُوعُ مَزْوَاج ، مَيْمُون

Mormon malmion (S). Papion mandrill (F). Papio malmion, Mandrill (E).

نوع من القردايع ويواشع القرد وادها واقبحا واسهلها وانسحقا واشرسها خلقا واشدعا بأسا . موطنه البلاد الافريقية يكثر في القابون والكنغو || جسمه صموري يطول نحو ١٠٠ سم . ويعلو ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . قوائمه شديدة التشط . رأسه متوسط الحجم . زلقوه مستطيل مقطوم . عيناه غائرتان . انفه احمر اللون . كتابته مخددة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السمره الزرقية الخفيفة الموج ، يمتد عند الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة تعد بعض العشرات .



قردع الحبشة

## ٢١٧٧٢ - قُرْدُوعُ يَمَسِي ، رَبَّاح

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tartarin (F). Hamadryas (E).

اعرف واشهر انواع القردايع . موطن الحبشة والسودان والجزيرة . قد قد الكلب الكبير الفليظ . ثوبه الى الكهبة الغصية . وجهه حنطي اللون . كتابته زاوية اخمرة . قوائمه غليظة وقوية ، ذنبه بالغ الطول جثلي الطرف || الذكر منه يتحمل بغيرة كثيفة مستطيلة الشعر تحمقظ الرأس والعتق والصدر ونصف الظهر .



قردوح بيوان



قردوح خنزيري

## ٢١٧٧٣ - قُرْدُوعُ \* Lipeurus (S). Lipeure (F).

جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة التسناتيات انواعها عديدة جميعها دقيقة. طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ سم . روبروسها مستطيلة ، حليها نحيل وكثيف . اثنائها الى التيرة الطعلاء . تركيب الدجاجيات على اختلاف انواعها فتتباين لانها تفتص الدم .

## ٢١٧٧٤ - قُرْدُون Chardon (F).

هو الحرفش ، اطليه .

## ٢١٧٧٥ - قُرْدِيّ Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتعلق بالقرد .

## ٢١٧٧٦ - قُرْدِيَّات Simiens (F). Simians (E).

مرتبة القردة وهي حيوانات لينة من الرئيسات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

## ٢١٧٦١ - قُرْدُوعُ الْجَوَائِمِ \* ، تَمَّءُ الْجَوَائِمِ

Philopterus subflavescens (S). Philoptère des passerseaux (F).

نوع من القردة طولها يراوح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الصفار الخنطي . جسمه كثيف الحلب الدقيق || يركب الجوام اغصان الشروبيا .

## ٢١٧٦٢ - قُرْدُوعُ احْتِمَام \* ، تَمَّءُ احْتِمَام

Columbica columbae (S). Colombicole (F).

نوع من القردة طول ذكوره نحو ٢ م . واناثه ٣ م . جسمه ورأسه وزبانه وعليه الى الاستطالة . ثوبه حنطي اللون ، اصفر الموج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

## ٢١٧٦٣ - قُرْدُوعُ الزُومَج \* ، تَمَّءُ الزُومَج

Degeriella ornata (S). Dégérie ornée (F).

نوع من القردة طولها نحو ٢ م . رأسه غمري الشكل . جسمه يضيى مفلطح . حليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يعلوه توشيح متعرض اسمر || يركب الزنج وزنج الماء .

## ٢١٧٦٤ - قُرْدُوعُ النُّسُور \* ، تَمَّءُ النُّسُور

Esthiopterum monile (S). Esthioptérme (F).

نوع من القردة يطول نحو ٤ م . ثوبه الى الحنطي الاسمر . زبانه عادية الاطراف ، حليه صغير القد ، متوسط الكثافة || يركب النسور على اختلاف اجسامها وانواعها .

## ٢١٧٦٥ - قُرْدُمَاتَا

هي الحسرة ، اطلبها .

## ٢١٧٦٦ - قُرْدُوعُ ، قُرْدُوح Papio (S). Papion.

Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس قرد من فصيلة البهرسيات . انواعه ٩ تتميز بقبحها منظرا وسفالة اخلاقها وديارها وقذارها واحتياها . اجسامها صمورية ، عضلاتها قوية ، ووبروسها ضخمة ، اغصانها زلقوية الشكل مقطوعة . اذانها صغيرة . قوائمه قصيرة وقوية تمكها من العدو السريع وتحول دون خفة التسلق . اذانها لاقياسية الشكل والطول || موطنها فسح الارجاد . يعم نصف القارة الافريقية وكامل الجزيرة العربية . تآلف المناطق البويرة تتجنب الاسراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والثار والجذور والحشرات والظا وبيض الطير || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢١٧٦٧ - قُرْدُوعُ احْتِمَشَة \* ، قُرْدُوعُ دُجِيرَة

رُبَّاحُ ذِيَنِي Papio doguera (S). Papion doguera (F). Doguera baboon (E).

نوع من القردايع موطنه يمتد من الجفة الى الكنگو . ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوائمه سود . فقرة ذكره عابقة اللون يطولها موج اسمر || يالفت المناطق الجبلية البعيدة عن كل غران . جاعته متوسطة العدد .

## ٢١٧٦٨ - قُرْدُوعُ بَبُون \* ، بَبُون ، رُبَّاح

Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F). Baboon (E).

نوع من القردايع العادم المعرفة والكتاب . موطنه الحبشة وجوراجا . ثوبه الى الصفار الخنطي يمتد عند الظهر ويغير عند الرأس والبلبل || يالفت الاماكن القريبة من الحقول المزروعة اغصان حقول الذرة والدخن || يعيش جماعات تعد بعض العشرات .



قردوح يمي

من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عيناه كيرتان. زباناها خطياني. جوشها ويطها إلى الحطلي الاسمر الموالج || روشنها الامانيات إلى الحطلي الجوزي الموالج تملو مجموعات من الزراكش والازراق الجوزية. روشنها الخلفيان إلى الحطلي الاسمر الموالج. اهدائها إلى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحول. تنظر القراشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتدح المكن لعلها على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة تقول نحو ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يملو في السكة العاشرة تنو هربي. ثوبها إلى الخضار الاصفر تملو جده قاطية سوداء يتخللها تنقيط ابيض ويمجدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يملو تمشيش اصفر. مدهيا ورواجها إلى الخضار الدايق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تنغمن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

### ٢١٧٨٥ - قُرْس، نَجْرُس، نَقْرُس

Simulium (S), Simulie (F), Simulium (E).  
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القرسيات تملو الذباب. انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تألف الاساكن الرملية. ذكورها تعيش على الازهار. اناتها لاسمة تمتص الدم.

### ٢١٧٨٦ - قُرْس اَحْمَر الرَّاس

Simulium erythrocephalum (S).  
Simulie à tête rouge (F).  
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عيناه متقاربتان. زباناها اسطوانيان، قصيران. روشنها كيرتان شفافان. رأسها احمر. صدرها إلى السرة البنية. يطها اصفر الزام الاول والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بنية سمراء. تظهر الحشرة الجلجلة من ايار إلى تموز. الذكر يعيش على رقيق الازهار. الانثى لاسمة، ماصة، تهاجم كل حيوان ولا تمف عن الانسان. تقتحم بنوع خاص الالاف والعين والاذن والوجه.

### ٢١٧٨٧ - قُرْس الخَيْل

Simulium equinum (S). Simulie du cheval (F).  
نوع من القرس طوله يراوح بين ٢ و ٤ سم. اناته تلصع الدواب انحصا الخيل وقد لا تمف عن الانسان قترضه وتقله || يكالغ باستمال الا د د ت. واثامها من الادوية التي لا تؤذي الانسان والحيوان.

### ٢١٧٨٨ - قُرْسَة

Crasatella (S).  
Crasatella (F). Crassatella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة القرسليات. انواعها المعروفة تناهر المنة، اكثرها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها المعاصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداقها متنوعة الحجم، مخرجة الشكل، ثنائية المصاريح المتساوية. مزخرفة السلوح الخارجية المالة.

### ٢١٧٨٩ - قُرْسِيَّات

Crasatellidae (S).  
Crasatellidae (F). Crassatellidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد

مجموعة قردو العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرين. ومجموعة قردو العالم الجديد المعروفة بالخمارات او الفطاسيات ٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّات

### ٢١٧٧٨ - قُرْدِيَّات

Cardina (S).  
Cardine (F). Caridine (E).  
جنس دويبات مائية من القشريات، عشاريات الارجل، طول الدليل، وفصيلة القريدسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد، بعضها نهري يعيش في المياه العذبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند. صدرها مستطيل المتك. مؤخرها معتدل الخانة والتبسط. تنصير عمتاشها المغائية الاطراف || اشهر انواعه واكبرها قد القرديس الهندي (C. fossarum) الذي يكثر وجوده في نهر جنس.

### ٢١٧٧٩ - قُرْدَة

Ochradenus (S). Ochradène (F).  
جنس نباتات برية جليلة معمرة من فصيلة الخزاميات. انواعها المعروفة قليلة مدهما بعض مناطق حوض البحر المتوسط. سوقها مشتبكة الفروع مستشيكها. اوراقها غريزة النصل او غليظة، قليلة العدد، متباعدة الاوتكاز. ازهارها عادمة القملات. خاسية او سداسية الفصلى، لا نظامية الابدية التي يراوح عددها بين ١٠ و ١٥.

### ٢١٧٨٠ - قُرْزُح

Atraphaxis (S). Atraphace (F).  
الواحدة قرزوة. جنس نباتات جنبية معمرة صغيرة القند من فصيلة البطيانيات. انواعه قليلة. اوراقها بضيصة، كاملة، صغيرة، جلدية النصل. فصل ازهارها الداخلية تقول وتتلون بعد التئور || اعرف انواعه ما يلي.

### ٢١٧٨١ - قُرْزُح سَنَانِي

Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lancéolée (F).  
نوع من القرز وهو جنبية سرطوية سريعة تملو من ١٠ إلى ١٥٠ م. اوراقها سنانية الشكل، صغيرة القند، بحرية اللون. ازهارها إلى البياض الناصع || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

### ٢١٧٨٢ - قُرْزُح شَالِك

Atraphaxis spinosa (S).  
Atraphace épineux (F).  
نوع من القرز وهو بجلية سرطوية شائكة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها وطرفها غير اللهاء. اوراقها صغيرة القند، سميكة النصل، بحرية اللون، ازهارها وردية || ازهاره يستمر من ايار إلى آب.

### ٢١٧٨٣ - قُرْزُح شَمَشْدَاي

Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).  
نوع من القرز وهو بجلية صغيرة سريعة تملو من ٥٠ م. اوراقها بضيصة تششادية الشكل والتسج. ازهاره يستمر من ايار إلى حزيران.

### ٢١٧٨٤ - قُرْزُومَة هَرْمِيَّة

Amphipyra pyramidea (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramide (E).  
حشرة من فصيلة السقيات حشرغيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المناخنة. قراشها واشعة قوتها رقيق الازهار. سرتها خاضعة تمش على اوراق الاجمار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٠ م. بسطها قراوح



قردو



قرديس



قرزوح




قرزومة هرمية



قرس الخيل

مسكها مدرن القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .  
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها  
زيت مرغوب فيه .



قُرْشْ أَسْهَد

٢١٧٩٤ - قُرْشْ شَالِك \* ، كَلْبْ بَحْرْ شَالِك  
Squalus acanthias (S). Aiguillat (F).  
Picked dog-fish, Hound-fish, Spiny dog-fish (E).

مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي ||  
تعتبر من الاسماك البنية . مسرحها الاغواط والثقاف ||  
جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي  
الشوذن ، معتدل التبليط ، ذلق الخط المستدير الطرف .  
اسنانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين  
تكثر فيها الاطراف المشارية الحادة || ثوبها الى العنق  
السمره يعلوها موانج ازرق يبق عند الظهر . جانبها الى  
الطلحة الموشة بالازرق تنير مع الاقتراب من البطن  
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمختص  
الصلب القرني المادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاولى  
والثانية || الاثنى متناثرة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠  
جمرًا || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .  
مسكها مرغوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد  
شائع الاستعمال .



قُرْشْ خَنْزِيرِي



قُرْشْ شَالِك

٢١٧٩٥ - قُرْشَامُ \*  
Hoplocampa (S).  
Hoplocampe (F).

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة المشاريات . انواعه  
المعروفة ١٦ جميعها وحيدة الجبل الحولي اثوابها ملوقة  
تكثر فيها السورة . رواشها شفاة . رقاتها جارية تركيب  
الثار وتعلها || اشهر انواعه واضرها قرشامة التفاح  
والاجاص والمخوخ .



قُرْشَامَةُ الْاجَاص

٢١٧٩٦ - قُرْشَامَةُ الْاجَاص \*  
Hoplocampa brevis (S). Hoplocampe des poires (F).  
Pear sawfly (E). Birnensäggespe (D).

حشرة من القرشام طولا براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها  
حنطي اللون تعلوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار ملوقة  
اناثها تمتع الممكن على زهر الاجاص فينتف عن رقات  
دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عنه بدء تكوينها فتقرض المبيض  
وتقرب الانغلاص .



قُرْشَامَةُ التَّفَاح

٢١٧٩٧ - قُرْشَامَةُ التَّفَاح \*  
Hoplocampa testudina (S). Hoplocampe des pommes (F). Apple sawfly (E). Apfelsäggespe (D).

حشرة من القرشام . طولا براوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها  
ورزبانها ورجوها الى الصفرة تعلوها رقعة سوداء . بطنها  
اسود اللون ملووق بالاصفر || رقاتها حنطية لونها الموانج ،  
كريمة الرائحة تركيب ثمار التفاح قشرها سطحيا تحت  
القشور ثم تنفخها باتجاه الحزور .



قُرْشَامَةُ الْخَوْخ

٢١٧٩٨ - قُرْشَامَةُ الْخَوْخ \*  
Hoplocampa minuta (S). Hoplocampe des prunes (F).  
Plum sawfly (E). Schwarze Pflaumensäggespe (D).

حشرة من القرشام طولا براوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى  
السمره السوية . اناثها تمتع الممكن داخل قشور الثار  
فينتف عن رقات دقيقة تنابع الثقب والنخر حتى يبلوغ  
العجالت .

الحارة || اصداها متشاكسة ، مألوسة ، مزخرفة ، شبه  
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، عادمة المادة اللؤلؤية ||  
اعرف اجناسها واشهرها القرسة .

٢١٧٩٠ - قُرْشِيَّات  
Simuliidae (S).  
Simuliidés (F). Simuliidae, Sand flies, Buffalo  
gnats (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
كثيرة العدد عينة الانتشار . جميعها صغيرة القد طولها  
براوح بين ٢ و ٦ مم . اجسامها غليظة الشكل . خلية  
المرشاش المستندة ، رؤوسها وجواشها كبيرة . قرونها  
الاستعارية قصيرة ، ارجلها قوية ، رواشها شفاة  
كبيرة || ذكورها تعيش على رحيق الازهار . اناثها  
لاسعة مختص الدم ، لدغها مؤلم يؤدي ، لعابها ييج البثرة  
وقد يسبب عدة امراض وحيات تنقلها الحشرات من الاجسام  
المریضة الى السليمة .

٢١٧٩١ - قُرْشْ ، كُونْسْجْ ، لَحْمْ ، بُهْبَكْ ،  
كَلْبْ الْبَحْرْ  
Squales (S).  
Requin (F). Shark (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة  
٣٥ جميعها كبيرة القد مستطيلة الشكل ، مفترسة لا تمر  
بشيء الا اقتصته بانسانها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرْشْ أَسْهَد \*  
Centrophorus squamosus (S). Centrophore  
squaméux, Requin chagrin (F). Porpoise (E).

مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البنية .  
مسرحها الاغواط والبجارج ولا تقترب من الهامح الا نادرا  
جداً || جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٥٠ سم . رأسها  
معتدل الجرم ، مستطيل الخطم الذلق . فها سفلي الارتكاز ،  
صغير القد ، معتدل الشدق ، متباين الانسان بين الفكين  
السلوي والسفلي . ثوبها الى الطلحة السبورية الموانج يسمر  
ويبقى عند الظهر ويغير ويبيض عند البطن || تتميز  
بمسكها المبعثر السهف اللافياسي الحجم والترتيب وبانعدام  
الزعنفة الشرجية وبالمختص الصلب الدرب الذي يتقدم  
كل من الزعنفتين الظهرين || الاثنى متناثرة تقع في فصل  
الصيف نحو ٧٠ جمرًا || مسكها شائع الاستعمال . لحمها  
كامن الصنف قل من يرغب فيه . ويستخرج من كبدها  
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرْشْ خِنْزِيرِي \*  
Oxynotus centrina (S). Centréne, Humantin,  
Cochon de mer (F). Seahog (E).

مسكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها  
البحر الأبيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البنية .  
مسرحها الاغواط واعالي البجارج ولا تشاهد قرب الهامح  
الا نادراً || جسمها شبه وشي الشكل ، مستضخم الخوض ،  
يطول نحو ١٢٠ سم . رأسها معتدل الجرم ، مبسط المقدم  
والخطم القصير . فها سفلي الارتكاز ، قصير الشدق  
الغريض ، متباين الانسان بين الفكين السلوي والسفلي .  
اعكاسها الخيشوية خامية الفلوج الضيقة . ثوبها الى  
الحمرة القريدية تبق عند الظهر وتغير عند البطن .  
زعنفاتها الظهرية ثمانية الشكل ، كبريتا القد ||  
الاثنى متناثرة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جمرًا ||

المتوسطة الارتفاع. ساقه ليفية دقيقة فراء عادمة الاوراق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه جلدية الانتشاب متراكبة، نصلها متموج الصفحة الجامدة المفروشة الشائكة الاستان. ازهاره علقية التجميع، تاجية، زرقاء اللون || اوراقه مأكولة وقد تتخلل.

#### ٢١٨٠٨ - قُرْصُفَةٌ \*

Cyclostoma (S).  
Cyclostome (F). Cyclostoma (E).  
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الاجرل وفصيلة القرمصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القرمصة المحددة (C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. صدفها صغيرة، بطينة، مخزنية، قصيرة العقب، بترقالية اللون.

#### ٢١٨٠٩ - قُرْصُفِيَّاتٌ \*

Cyclostomidae (S).  
Cyclostomidés (F). Cyclostomidae (E).  
فصيلة حيوانات برية من الرخويات معديات الاجرل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعمرة المعروفة عديدة. جميعها برية تعيش على الارض في المواقع الرطبة || اصداقها شبه خذروفية الشكل، متباينة الخلطة، صغيرة الاققاب، اسطوانية الفوهات، كلسية الاسقاط || اعرف اجناسها واشهرها القرمصة.

#### ٢١٨١٠ - قُرْصُوعٌ \*

Cerianthus (S).  
Cérianthe (F). Cerianthus (E).  
جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القرمصيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع. حوافها مستطيلة، عصفية الشكل كاوراق التنبليات || اشهر انواعها قرصوع المتوسط (Cérianthe de la Méditerranée).

#### ٢١٨١١ - قُرْصُوعِيَّاتٌ \*

Ceriantidae (S).  
Cérianthidés (F). Ceriantidae (E).  
فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية، مستطيلة، عريضة أو مغلفة، تنتهي بحوائق متعاقبة اللوامس || اعرف اجناسها واشهرها القرصوع.

#### ٢١٨١٢ - قُرْصِيٌّ

Discoide (F). Discoid (E).  
نعت تعريفي توصف به الاجسام القرصية الشكل كالثاير وغيرها.

#### ٢١٨١٣ - قُرْصِيَّاتٌ

Discomycètes (F).  
فصيلة الفطور القرصية تعرف بالفشاريات، اطبلها.

#### ٢١٨١٤ - قُرْصٌ، تَحَاتٌ

Erosion  
اختنا جوف جزء من ثيء سببه العوامل القارضة كالحياه التي تقرض التربة وتجرفها.

#### ٢١٨١٥ - قُرْصٌ، عَارَةٌ، عَارِيَّةٌ

Prêt (F).  
Lending (E).  
عقد يدفع به المرء الى غيره متفوقاً أو عتياً أو شيئاً معيناً ليستعمله زمناً محدداً ثم يرد. فدافع القرص قارض أو معير وآخذ مستقرض أو مستعير.

#### ٢١٧٩٩ - قُرْشُومٌ

Paederia (S). Pédérie (F).  
جنس جنبات عارضة ملتفة معمرة من فصيلة الفويات انواعها قليلة اصطناعها البلاد الحارة. سورها تطول من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها عابلة منعقة متعاقبة. نصلها يفيش الشكل، ذاتي الزايم الاخير وهو خلي الصفحة السفلى، كرهية الزائفة عند المس. ازهارها عشقودية التجميع، خلية البشرة، كرهية الزائفة، انايبها وردية اللون، ابواقها الى البياض الاخضر الموحج.

#### ٢١٨٠٠ - قُرْشِيَّاتٌ

Squalidae (S).  
Squalidés (F). Squalidae (E).  
فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاخ. اجناسها وانواعها عديدة، اجسامها مستطيلة وشحية الشكل. اسناتها ذلقة، شارقة. اسناتها حادة مشاربة تقطع كل شيء. زعانفها كبيرة. اعطائها بحار البلاد الحارة وقد تجوب انوار الانهر العميقة الغور.

#### ٢١٨٠١ - قُرْصٌ

Gaufre, Rayon (F).  
Honeycomb (E).  
مجموعة مخاريط السطح الواحد في خلية النحل.

#### ٢١٨٠٢ - قُرْصٌ

Pincement (F). Nipping (E).  
هو القتر أي قطع رؤوس الاغصان أو الانثان الطرية.

#### ٢١٨٠٣ - قُرْصَاقٌ

Renard corsac (F).  
هو الثلب التري، اطبله.

#### ٢١٨٠٤ - قُرْصَانَةٌ

Myletes (S). Mylète (F).  
جنس اسماك نهريه من مفتوحات اللثانة وفصيلة القرمصيات انواعها المعروفة خمسة منها نوعان يعيشان في انهر الهند وسيام وبنيتام، وثلاثة انواع تعيش في انهر امريكا الاستوائية || اجسامها متوسطة القد، بيضية اللون، مسطحة، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. رؤوسها صغيرة. زعانفها الظهرية كبيرة ورفية يتبعها زعنفتان شحمية صغيرة. زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة. زعانفها الذيلية منفرجة القوس، قريبة الشبه بالحلل. اثوابها الى الخصار الاطحل المتفاوت المآجات || لحوبها مأكولة، متوسطة الصنف.

#### ٢١٨٠٥ - قُرْصَانِيَّاتٌ \*

Characidae (S).  
Characidés, Characinidés (F). Characidae (E).  
فصيلة اسماك نهريه من مفتوحات اللثانة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقيايسية الشكل والقد. حراشفها صغيرة متراكبة. رؤوسها عريضة فكوكها مرصوفة الاستان الصغيرة الحادة. زعانفها الظهرية والذيلية لانفاضة || اعرف اجناسها واشهرها القرصانة والمقردون والمسلين والينفوش والوقوف.

#### ٢١٨٠٦ - قُرْصَةٌ

Scrofolaire du désert (F).  
هي خنازيرية الصحراء، اطبلها.

#### ٢١٨٠٧ - قُرْصَعَنَةٌ \*

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicut de Crète (F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I).  
نوع من الشنداب وهو نبات عشبي بري يكثر في الجبال



قرصنة



قرصفة



قرصع



قرط



قرط موز



قرطب الزرع



قرطب البط



قرطب الدجاج

٢١٨٢٦ - قَرَطُ، قَرَصَ، جَتَمَ (F). Pincement (F).  
Nipping (E).

قطع رؤوس الاغصان أو الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قَرَطُ مَوْزَ \* ، طَرَحَ مَوْزَ

Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).

هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدلية التي يتألف منها حل الموزة .

٢١٨٢٨ - قَرُطَبْ

Melampyrum (S).

Mélapyre (F).

جنس نباتات برية عشبية حولية من فصيلة الحمازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباح منتصبه فناء . أوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قرطب الزرع .

٢١٨٢٩ - قَرُطَبْ الزَّوَرُ \*

Melampyrum arvense (S). Mélapyre des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القرطب يعتبر من النباتات الضارة لانه يكثر في زروع الحنطة فينبش جذوره في جلوده ويقاسمها الغذاء . يزوره الى السرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .

٢١٨٣٠ - قَرُطَبْ

Ménopon (F). Menopon (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة القرطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركب الطير قضيه || اعرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قَرُطَبْ الاَوَزِ

Menopon pectinatum (S). Ménopon des oles (F). نوع و القرطب وهو حشرة صغيرة القد طويلا يراوح بين ١ الى ٢ سم . رأسها مستعرض الشكل ، مقر القفص . ثوبها الى الرتبة يعلوها تشويش اشقر . تركب الاوز وتؤذيه .

٢١٨٣٢ - قَرُطَبْ البَطِّ \*

Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F). نوع من القرطب يركب البط فيؤذيه . جسمه الى الرتبة السمره بطول من ٤ الى ٥ سم . رأسه مثليث الزوايا المستديرة . جشته وبطنه متساويان في الطول والشكل ، ترجأت بطه بجفحة بالحظي .

٢١٨٣٣ - قَرُطَبْ الدَّجَاجِ \*

Menopon gallinae (S). Ménopon des poules (F). نوع من القرطب وهو حشرة صغيرة القد طويلا نحو ٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، كيف الحب اللينق . رأسها محدب القفص ، مقر القفص ، رباعي الحب المستطيل . ثوبها الى الرتبة الصفراء المواجه || تركب جميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قَرُطَبِيَّات

Menoponidae (S).

Ménoponidés (F). Menoponidés (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها صغيرة القد اجسامها مغلطمة ، يبقية الشكل او اهليجية . طويلا يراوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثلكة الزوايا . ارساغها مسطعية خادشة .

٢١٨١٦ - قَرِصُ ، سِلْفَة (F). Emprunt (F).  
Borrowing (E).

عقد تبرم به صفة قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى احد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشروط يفتق عليها . والقرص اشكال منها :

قرص جبري او الزامي (F). Emprunt forcé (F).  
Forced borrowing (E).

قرص طويل الأجل (F). Emprunt à long terme (F).  
Long-dated borrowing (E).

قرص قصير الأجل (F). Emprunt à court terme (F).  
Short-dated borrowing (E).

قرص مجدد (F). Emprunt consolidé (F).  
Funded borrowing (E).

قرص مقدور الاستهلاك (F). Emprunt amortissable (F).  
Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قَرِصُ الْمُعَامَرَةِ

Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E). قرص يسري حل اشياء معرضة لخطر البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما هلك منها .

٢١٨١٨ - قَرِصُ يَفَايِدَةٍ

Prêt à intérêt (F). Lending in interest (E). نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب اي ان المستير يدفع الى المعير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قَرِصُ زِرَاعِي

Crédit agricole (F). هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قَرِصَابْ

Xérophage (F).

Xerophagous (E).

نعت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قَرِيبْ

ما يبقى في الغريال رمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قَرِيبْ

قشر الرمان يستعمل في الدباغة .

٢١٨٢٣ - قَرِيشَة

القريشة ج . قرشي . « من غريب شجر البر شكك ولونا زهره اشد صفرة من الورس . قال ابو حنيفة : « القرشي » يتلف بالشجر وينبت في اصل السرة والعرفط وزهره اشد صفرة من الورس وورقه لطاف رقاق » .

٢١٨٢٤ - قَرِطُ \* ، ثَوْبُ مَعْصَرِ

Allium schaenoprasum (S). Ciboulette, Cive (F). نبات دوفسي معمر من فصيلة الزنبقيات . فصوصه خلبية الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانشباب . دقيقة ، ضيقة ، جفء النصل ، منتصبه ، تطول نحو ٢٠ سم . شاربجه الزهرية تملو نحو ٣٠ سم . ازهارها حراء اللون ، هامية الانكسار ، صيوائية التجميع .

٢١٨٢٥ - قُرْطُ

Mélilot à petites fleurs (F).

هو الحنطوق الصغير الزهر . نبات مروجي تنطفه الدواب بشهوة .

Panellus (S).

٢١٨٤٢ - قُرْطُوب ٥

Panelle (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها تتركب جذوع الاشجار وغطائها دون أن تؤذيها. تتميز بسوقها القصيرة وبكثافتها الفارشة، المكفوفة الاطراف، الدبقة أو الخملية السطح || اعرف انواعه واشهرها القربوب الحلو والقربوب المشخار.

٢١٨٤٣ - قُرْطُوب حُلُو ٥ \*  
Panellus mitis (S).  
Panelle douce (F).

نوع من القربوب. يعيش على جذوع الصنوبر دون أن يؤذيها. مجموعته لا تقتل عن ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع. ساقه شديدة القصير. نكته فارشة لزجة دافئة مكفوفة الاطراف، طلاء اللون الكاساك، قطرها يراوح من ١ إلى ٢ سم. اطراسه دقيقة، هلامية المادة || خيته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٤ - قُرْطُوب مِشْخَار ٥ \*

Panellus serotinus (S). Panelle tardive (F).

نوع من القربوب. يعيش على جذوع وغطان الاشجار العروا اخصها السنديان. مجموعته تتألف من ثلاث الى خمس وحدات. ساقه شديدة القصير. نكته فارشة، مكفوفة الاطراف، خلية السطح في اول عهدها ثم لزجة. قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٥ - قُرْطُوزَة ٥  
Cortusa (S).

Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيديات. معقود التعريف على اسم العلامة «قرطوزي». ينبتا بعض جبال الشرق الاقصى واروپة. اوراقها جذرية الاثنا عشر، معققة، كبيرة القد، مفصصة ومسننة المختار. ازهارها شبه صيواني التجميع، يرتكز على سترار يرتفع من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها صغيرة القد، وردية اللون، قصيرة المالحق || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢١٨٤٦ - قُرْطُوط ٥ \*  
Euchoreutes (S).

Euchoreute (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة البير بويجات موطنه يمتد من إيران الى تركستان || جسمه صغير القد. يتميز باستطالة اذنيه وفتحيته الخلفيتين. اما اذنه فبانع اللون. ثوبه الى الشبهة ويلبغها مواج اشجع يسمر في الرأس والظهر ويشقر في الصدر والبطن. ذنبه اسود الزام الاخير الذي ينتهي بالابيض.

٢١٨٤٧ - قُرْط  
Acacia arabique (F).

هو السنت العربي الواحدة قرطة.

٢١٨٤٨ - قَرَع  
Teigne (F). Tinea (E).

علل جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتقضي على اصوالها وورثها ورشها. اسبابها فطور مجهرية تتركب الجلد وبصل الشعر والريش.

٢١٨٤٩ - قَرَع البَقَر  
Teigne des bovins (F).

Cattle tinea (E).

نوع من القرع يركب رؤوس البقر واعانها.

انواعها تختلف باختلاف الانجاس والانواع يكثر فيها الرمادي الاصفر المواج.

٢١٨٣٥ - قُرْطَف بقلة وقيل ثمرة الرث.

٢١٨٣٦ - قُرْطُم، قُرْطُم، اِحْرِيش، بَهْرَم،

بَهْرَمَان، مَرَبَق

Carchamus (S).

Cartame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنية، برية وزراعية، طبية وصيائية من سبط الهبشريات وفصيلة المركبات. انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعمرة. سوقها منتصبه. اوراقها متعاقبة مستطيلة لا تغل من الحنف. ازهارها نارية اللون، سرفشة التركيب. بزورها مضلعة بيضاء اللون طبية يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢١٨٣٧ - قُرْطُم الصَّبَاغِيْن \*، تَرَبَاص، عَصْفَر

Carchamus tinctorius (S). Carthame officinal, C. des teinturiers, Safran bâlard, S. d'Allemagne (F). Safflower, Bastard saffron, False saffron (E). Färber-safflor, Bastardsafran (D). Cartamo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القرم الحولي أو المحول يزرع للزئسن أو لاستخراج القرمطين، مادته الغلظة الصبائية الصفراء اللون. ساقه منتصبه سرسة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه يفيضة الشكل مستطيلة الزام الاخير. نصلها بارز المرق، سن الحافة، قصير الحنف. ازهاره برتقالية اللون ذهبية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٨٣٨ - قُرْطُم بَرِّي \*، قُرْطُم صُوِي، شَوَارِب

عَنْتَر

Carthamus lanatus, Kentrophyllum lanatum (S). Carthame laineux, Chardon jaune, Kentrophyll (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceceprete, Scardicione salvatico (I).

نوع من القرم الحولي البري الطيب. ساقه منتصبه زيا تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصارته حراء اللون، كرية الرائحة، جللة الخضاب الزاهي. اوراقه مقشرة، نصلها غدي الصفعة، لرح البثرة. ازهاره الى الصفار البرتقالي. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢١٨٣٩ - قُرْطُم جَنْسِيْ

Carthamus arborescens (S). Carthame arborescent (F).

نوع من القرم البروتي المعمر. جنينه تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها خشوشية. اوراقها سنانية مستعرجة القاعدة. نصلها جبل الخضاب الزاهي، سن الحافة الشاذكة. ازهارها الى الصفرة الوردية المواج || ازهاره يستمر طوال شهر آب.

٢١٨٤٠ - قُرْطُمَان

Avoine cultivée (F).

هو الحطافل الزراعي، اطليه.

٢١٨٤١ - قُرْطُوب

Orang-outan mâle (F).

He orang-utan (E).

ذكر السامي ارتفاعه واقفاً على رجله يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.



قرط الصباغين



قرط بري



قرطوب حلو



قرطوب مشخار



قرطوب



## ٢١٨٥٧ - قَرَعُ طَوِيل \* ، ذُبَابٌ ، كَرْتِيبٌ ، ضَرْفٌ

Lagenaria vulgaris (S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القَرَع الحلوي ، ضروبه عديدة منها البرية والزراعية المأكولة والتزيينية . سَوْفَ مدادة عارشة . أوراقها كبيرة القد لا قياسية التفصيص والتفرع . ثماره مختلفة الاشكال والأحجام منها الاسطوانية والمفلطحة والبرصية والقارورية والمردنية ، الخ .



قَرَعُ اسود البزور

## ٢١٨٥٨ - قَرَعُ كَبِير \* ، يَقْطِينٌ مُضَلَّعٌ

Cucurbita maxima (S). Potiron, Citrouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Speisekürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirona (I).

ويدعى قرع حلو وقرع مائل . نوع من القَرَع الزراعي المشهور . ضروبه عديدة أوزنها قدر واشكال ثمارها الصلابة المستديرة المفلطحة التي يراوح قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . ووزنها من ٤ الى ٦٠ كيلو . لهاها جامد المكسر عادم الالياف يحوي نحو :

٩٥,٦٠ % من الماء

١٠,٦٠ % من المواد الازوتية

١٢,٠١ % من المواد الدهنية

٦٧,٣٢ % من المواد الاستخلاصية

## ٢١٨٥٩ - قَرَعُ مَسْكِي \* ،

Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismkürbis (D). Cetriolo muschiato (I).

نوع من القَرَع الزراعي الشائع الاستعمال . ضروبه عديدة . سَوْفَ مدادة طويلة . أوراقه مستديرة ، خلية النصل ، لا قياسية التفريغ . ثماره مستطيلة مخنوقة الوسط يبلغ طولها في بعض الضروب نحو ١٠٠ سم . ووزنها ٢٠ كيلو . لهاها اصفر اللون ، قليل الالياف ، مسكي الرائحة .



قَرَعُ طَوِيل

## ٢١٨٦٠ - قَرَعَاءٌ Céraste (F).

هي الحاربة من اعشب الحيات .

## ٢١٨٦١ - قَرَعْبَلٌ

« دوية عريضة مخبضة الظهر والبطن (السان) .

## ٢١٨٦٢ - قَرَعَةٌ ، يَقْطِينَةٌ

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القَرَع او اليقطين اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع .



قَرَعُ كَبِير

## ٢١٨٦٣ - قَرَعُوسٌ ، قِرْعُوسٌ ، قَرَعُوشٌ

هو الفالغ جل ذو سنانين .

## ٢١٨٦٤ - قَرَعِيٌّ Pépionifère (F). Pepo (E).

نمت وصفي يدل على ما شكله القرع الشكل المستدير .



قَرَعُ مَسْكِي

## ٢١٨٦٥ - قَرَعِيَّاتٌ ، يَقْطِينِيَّاتٌ

Cucurbitaceae (S). Cucurbitacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القلعات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . سَوْفَها مدادة او عارشة . أوراقها متعاقبة ، حوالقها مقشمة . ازهارها وريدة المسكن ، خالصة الاكام . ثمارها لياينة مختلفة الاشكال والاحجام . اشهر انواعها القَرَع والبطيخ والشام والخيارد والقضاء والحظلل ، الخ .

## ٢١٨٥٠ - قَرَعُ الخَيْل Teigne du cheval (F).

نوع من القَرَع يركب صهوة الفرس وحنقه وكفله .

## ٢١٨٥١ - قَرَعُ الغنم Teigne du mouton (F).

نوع من القَرَع يركب الضأن والماعز فيسبب اعماض اسوافها وقد يتركز غالباً في اعناقها .

## ٢١٨٥٢ - قَرَعُ شَهْدِيّ Teigne favosa (F).

نوع من القَرَع يركب الطير والارانب والسنانير والكلاب .

## ٢١٨٥٣ - قَرَعٌ ، يَقْطِينٌ Cucurbita (S).

جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سَوْفَها مستطيلة مدادة او عارشة . أوراقها متعقبة كبيرة القد متصبية الزناد الاجوف . نصلها قلمي القاعدة لا قياسي التفصيص . حوالقها مقشمة . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة القد ، صفراء اللون . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام || اشهر انواعه الزراعية ، المأكولة الثمار ، ما يتبع .

## ٢١٨٥٤ - قَرَعُ اسود البزور \* Cucurbita ficifolia (S).

Courge à graines noires (F). نوع من القَرَع الزراعي المعمر . ساقه ليفية ، دقيقة ، مستطيلة ، عارشة ، فرعاء . أوراقها خماسية التفصيص ، نصلها عايق الخضار يلوذ تمسح وتسنج اصفر . ثماره بضية الشكل كالبطيخ قشورها صلبة خضراء اللون تعلوها رقتة بيضاء . لهاها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبيه يشمل :

٩٠,٩٠ % من الماء

٢٢,١٠ % من المواد الدهنية

١٤,٢٣ % من المواد الازوتية

١٤,٠٦ % من السليولوز

٣٤,٠٩ % من الرباد

٥٩,٤٠ % من المواد الاستخلاصية

بزوره سوية اللون الاسود لهاها يحوي ما قدره

٨٠,٢٣ % من المواد الدهنية

٩٥,١٨ % من المواد الازوتية

## ٢١٨٥٥ - قَرَعُ الحنثش Trichosanthe (F).

جنس نباتات عارشة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . اعطائها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استراليا . سَوْفَها عشبية او ليفية مستطيلة . أوراقها كبيرة مقشمة . ازهارها عديدة البتلات . ثمارها وزورها لا قياسية الشكل والحجم . اشهر انواعه القنقا الثمبانية ، الطلها .

## ٢١٨٥٦ - قَرَعُ رُومِي \* ، قَرَعُ مغربيّ عَمَاسَة Cucurbita pepo (S).

Courge pépion, Giraumon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Giramonte. Zucca Indiana (I).

نوع من القَرَع الزراعي ضروبه عديدة منها المكور والمستدير والمخيطيل والتعبي والصغير والكبير والمالسي والفصلع والحنجد || لهاب ثماره جيد الصنف عسادم الالياف .

المواج . ازهارها عذقي التجميع . محوري وطرفي الارتكاز . ثمارها عنبية ، لاصقة التخت والكم ، لذينة الطعم ، قطرها نحو ١٠ م. || قرفها سمراء اللون . غبراء المواج ، جيدة الصنف . يستخرج منها ومن الاوراق والازهار والثمار طيوب وادهان فاخرة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَذَابَة  
Fausse cannelle (F).  
هي دريس بجلان ، اطليه .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَبَّار \* ، سَادَج  
Cinnamomum citriodorum (S). Cannellier de Malabar (F). Malabar cinnamon (E). Malabarischer Zimmetbaum (D). Cannella di Malabar (I).

شجرة زراعية من الافاوية . مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي . ثمرتها صغيرة اللد ، فراء . يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فعادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفُونِيَّة  
هي الغلويس الفلسطيني ، اطليه .

٢١٨٧٧ - قَرْفُول \*  
Caryophyllia (S).  
Caryophyllie (F).  
جنس حويئات بحرية من الرجان عنفة المدائح ، مستديرة التبرجات المفروسة || اشهر انواعه القرفول الجملي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - قَرْفِيَّات  
Cannellaceae (S).  
Cannellacées (F). Cannellaceae (E).  
فئة من فصيلة الغاريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٩ - قَرْفِيَّات  
Manidae (S).  
Manidés (F). Manidae (E).  
فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْق  
Gloussement (F). Clucking (E).  
صوت الدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْق  
Liège (F).  
هو القلين ، اطليه .

٢١٨٨٢ - قَرْقَب  
Mésange (F).  
هو القرقف جنس طير من الجواثم .

٢١٨٨٣ - قَرْقَد  
Apocyn (F).  
هو الخوشان ، اطليه .

٢١٨٨٤ - قَرْقَدَان  
Guilmauve jaune (F).  
هو الابوتيلين الاسرح ، اطليه .

٢١٨٨٥ - قَرْقَدَن ، قَرْقَدُون ، قَرْقُصُون ،

جَرْدَة سَنَجَابِي  
Myoxus (S). Loir (F).  
Dormouse (E). Siebenschläfer, Bilch (D).  
جنس حيوانات قانسة من فصيلة القرقديات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اناؤها سوية اللون . اذانها جيلات الصوف . رؤوسها اسنينية الشكل . سالها طويلة قانسة . عيونها كبيرة . اذانها مستديرة رجة . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها النار والباطوط

٢١٨٦٦ - قَرْف  
Ecimage (F).  
هو المصف ، اطليه .

٢١٨٦٧ - قَرْف  
Ecorce (F). Bark (E).  
لحاء الشجر ، وكل قشر قرف ومنه قرف الرمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَالِد ، قَرْفِيَف  
Epamprage (F). Lopping off, Pruning (E).  
تقليم الغصينات او السروع الزائدة في الكرمة .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة  
Brou (F). Husk, Peel (E).  
هي غلاف بحال الثمرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة  
Cannelle, Cannellier (F).  
Cinnamon-tree (E).  
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة الغاريات . انواعه عديدة منهاها البلاد الاسيوية . سورها منتسبة فراء . اوراقها ابيدة معتقة . ازهارها صغيرة اللد لاقياسية التجميع والارتكاز || جميعها من الافاوية

ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سورها وروصها وجنودها عطرية للمادة ، لذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . يعي تقيده الملعلة والكبد ، تلبه الاعصاب وتقتشها وتنهش بها . ومن منافها انها مفادة للتشنج . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْضَاء  
Cannelle blanche (F).  
Canella (E).  
هي البيلون ، اطليه .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة سَرْدَنْب \* ، قَرْفَة سِيلَان ،  
دَارْصِينِي

Cinnamomum Zeylanicum (S). Cannellier de Ceylan, Cinnamon (F). Common cinnamon tree, Cinnamon (E). Zimmetbaum, Zimmet, Zimmetrinde, Kaneel (D). Cannella, C. del Ceylan, Cinnamon (I).  
شجرة زراعية من الافاوية مهدا سرنديب (سيلان) ساقها منتسبة فراء تملو نحو ١٠ اطار . فروصها متقابلة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها معتقة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، ابيدة ؛ نصلها جامد النسيج ، مالمش البشرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى ، ثلاثي المروق الرئيسية || ازهارها صغيرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الاسدية ، سداسية البلات . ازهارها عنقودية التجميع ، تاجي الارتكاز . ثمارها عنبية لاصقة التخت والكم . جمع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتعتبر من الافاوية الفاخرة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صِينِيَّة \* ، دَارْصُوص ، سَكِيخَة  
تَجَب

Cinnamomum obtusifolium, C. cassia (S). Cannellier casse, C. de Chine, C. d'Annam, C. du Tonkin, Laurier casse (F). Chinese cinnamon tree, Cassia tree (E). Kassien Zimmetbaum (D). Cinnamo cassia, Lauro cassia, Cassia lignea (I).  
شجرة زراعية من الافاوية . اعضاءها فسيحة الاجزاء تمتد من اللاتم الى الصين وتتش حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر || ساقها منتسبة تملو من ١٣ الى ١٧ م. اوراقها ابيدة اهليلجية متقابلة معتقة . نصلها جامد الصفحة ، ثلاثي المروق الرئيسية . لونه الى الخضار البحري || ازهارها صغيرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قرفة سرنديب



قرفة صينية



قرفة ملبار



قرفول



قِرْقَفَنُ الْبَلُوط



قِرْقَفَنُ شَاةٍ



قِرْقَسْ



قِرْقَسَةُ دِقَّةِ الشَّكْلِ



قِرْقَسَةُ التَّسْبِطِ



قِرْقَفُ الزَّرَق

شديد الصغر، متكاثف الحلب، يطول من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها إلى الكلسة. زباناها مطوقان بالاسود والابيض. وروشناها كبيراً القند، متكاثفا الخليل || ظهور الحشرة الجلجلة لا ينقطع طوال السنة، وهي مبلولة في كل مكان من الغابات إلى المساكن الملوثة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر. تنجع مكنتها في كل مكان مظلم رطب. ينقث المكان بعد متحه بأسبوعين عن قيرقات مستطيلة، بسيطة المقدم والمؤخر، حنطية اللون، حلبيّة الجسد والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال.

#### ٢١٨٩٥ - قِرْقَسَةُ الْمُسْتَوَسَّطِ \*

*Phlebotomus papatasi* (S).  
*Phlébotome papatasi* (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقسيات. جسمها صغير الجرم، يطول من ٢ إلى ٥ سم. ثوبها إلى الصفار الباهت، خلي القشار. رأسها مخروطي الشكل. خطمها معتدل القند، صدرها بيضي القلب. بطنها اسطواني. زباناها كثيفا الحلب النقي. عيناها صغيرتان. وروشناها كبيرتان، مهيان || تنفجر الحشرة الجلجلة من نيسان إلى تشرين الثاني. تألف جميع المواقع الرطبة والشلطوط الرملية. تسرح في الليل وتختبئ في النهار وراء كل شيء. لانها تخشى وقع النور || تنجع الاثنى مكنتها في كل مكان مظلم رطب وتحت الانفاض والحجارة. ينقث المكان بعد متحه بمدة ثلث اربع من اسبوعين إلى ثلاثة || البرقة مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل، حلبيّة الجسد، خضراء اللون، سمراء الرأس، يطولها في مؤخرها زوج من الحلب الجلجا المستطيل. تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال.

#### ٢١٨٩٦ - قِرْقَسِيَّاتٌ، سَكْبِيَّاتٌ

*Psychodidae* (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E).  
فضيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها واواها عديدة جميعها صغيرة القند زباناها الجسم والرواشن والقرون الاستشعارية || اشهر اجناسها القرقس.

*Loir* (F).

#### ٢١٨٩٧ - قِرْقَفَنُ

هو القرقف، اطبله.

#### ٢١٨٩٨ - قِرْقَفُ، قِرْقَفُ، قِرْقَبُ

*Parus* (S).

*Mésange* (F). *Tit* (E).

جنس طير من فصيلة القرقفيات انواعه كثيرة العدد اعطاهما العالم. اجسامها صغيرة القند. مناقيرها مخروطية الشكل، جالس، قصيرة، قوية. اجنحتها متوسطة القند. اذانها مقطوعة او فارقة. ارسافها صغيرة حبيبية الخلل || تألف الغابات والحدائق. قوتها الحشرات ومكثها وقرقاتها والبروز البرية والثار || اناثها تخضع مرتين في العام، الاولى في نيسان والثانية في تموز. عدد بيض الحفنة يراوح بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ إلى ١٥ يوماً. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

*Parus ceruleus* (S).

*Mésange bleue*, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E).  
نوع من القرقف، طوله يراوح بين ١١ و ١٢ سم. ثوبه جميل الالوان. قرة رأسه وجناحاه وذنبه إلى الزرقاء السنجابية يطولها في الجناحين يتبعج ابيض. ظهره زيتوني، بطنه اصفر، في سمراء إلى البياض الناصع. طوق عنقه اسود اللون ازرق المواج || وهو طائر آبه يألف الاحراج والحدائق والجنان.

والجوز والبلندق والكستنة وبيوض العصافير ... || اجسامها اوكان ترتبها بين شقوق الصخور او في صدور الاشجار. اناثها تضع من ٤ إلى ٦ ادراس تبصر وتكتسي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعه ما يلي.

#### ٢١٨٩٩ - قِرْقَفَنُ الْبَلُوط \*

*Myoxus nitedula* (S). *Loir dryade* (F).

نوع من القرقف، طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٨. ظهره اريد احمر. بطنه ابيض اغبر || موطنه يمتد من نيج الصجر إلى اربوة. يألف احراج السديان لان ركة قوته البلوط.

#### ٢١٨٩٧ - قِرْقَفَنُ اَنْبِقِ

*Myoxus elegans* (S).

*Loir élégant* (F).

نوع من القرقف، موطنه اليابان. طوله نحو ١٥ سم. وذنبه ٤. ثوبه إلى الصهبة الصنابية يمتد مع اقترابه من نيج الظهر. رأسه جزوي المواج، بطنه وسواي جرازه إلى الصفر || قوته البار على اختلافها.

#### ٢١٨٩٨ - قِرْقَفَنُ شَاةٍ \*

*Myoxus glis* (S). *Loir commun* (F).

نوع من القرقف. طوله نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤. ظهره إلى الصهبة الزبداء يطولها مواج اسود. بطنه وسواي جرازه إلى البياض الفضي. خداه وصنقه واسفل ذنبه بيض. موطنه فسح الارياض يمتد من الشرق إلى اطراف اربوة. يوجد في لبنان وسورية.

#### ٢١٨٩٩ - قِرْقَفَنِيَّاتٌ، قِرْقَفَنِيَّاتٌ

*Myoxidae* (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فضيلة حيوانات لبونة قافسة من مرتبة قرقفنيات الشوزب ورتبة القواضم. اجناسها ثلاثة القرقفون والزغبة والقرفب. موطنها العالم القديم || اجسامها صغيرة القند مستطيلة الشكل والذنب. براطمها العليا مفقوفة، جرازها قصيرة. جميعها شاذرة تسرح في الليل. قوتها البار والحشرات. يابها الششوي يدوم نحو ستة اشهر.

#### ٢١٨٩٠ - قِرْقَفَنِيَّاتُ الشَّوْزَبِ

مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القواضم تشمل خمس فصائل القرقفنيات والفأريات والحلديات والجوبيسيات والبريوصيات

#### ٢١٨٩١ - قِرْقَفَنُ قَدَرٍ

*Putois féte* (F).

هو ابن عرس مثن، اطبله.

#### ٢١٨٩٢ - قِرْقَسْ

*Curcas* (F).

هو الدند البري، اطبله.

#### ٢١٨٩٣ - قِرْقَسْ \*

*Phlebotomus* (S).

*Phlébotome* (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقفيات. انواعه عديدة جرهما صغيرة القند، طولها يراوح بين ٢ و ٥ سم. اجسامها وروشناها وروشناها والاستشعارية حلبيّة الغشاء، صفراء اللون، حنطية المواج. اعطاهما البلاد الحارة. ذكورها تعيش على رشح الاثعار والافرازات السكرية النباتية. اناثها تمتص الدم حيثما تستطيع. لسنتها مزججة يقال انها تنقل الحصى الباردة وجبة حلب.

#### ٢١٨٩٤ - قِرْقَسَةُ اُرْبِيَّةِ الشَّكْلِ \*

*Psychoda phalsenoides* (S).

*Psychode phalénoidé* (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقسيات. جسمها

## ٢١٩٠٨ - قُرُفَات

Alcedinidae (S).  
Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).  
فصيلة طير من الجواثم المصصقات الأصابع تتميز بصغر  
جرمها وسددة بصرها وسرعة اختطافها. رؤوسها غليظة.  
اجسامها ربعة منكشة. مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة.  
اجنحتها متوسطة القد. أذيانها وأرأسها قصيرة. أثوابها  
قزحية الألوان الزاهية || اجناسها وألوانها عديدة تتجمع  
الى عمارتين القرليات والمأزوريات.

## ٢١٩٠٩ - قُرُفَات، قَاتُود

Alcedo (S).  
Martin-pêcheur (F). Pied kingfisher, Ceryle rudis (E).  
جنس طير من القرليات. أنواعه ٣٠ موطنها العالم. ذكر  
في المناطق الحارة والمعتدلة. تتميز باستطالة مناقيرها السود.  
اجنحتها متوسطة القد مستدرة. أذيانها وأرأسها قصيرة.  
أثوابها قزحية الألوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه :  
طائر حزموم يهوى بأحدى عينيه الى قمر الماء طمعاً في  
ما يصيده ويرفع الأخرى حذراً عما يصيبه منه المثل « هو  
اسزم او احذر من قري ان رأى خيراً تدل وإن رأى  
شراً توله » || وذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستل  
يعمله انقض عليه كالسهم المرسل فاصرخ من قمر الماء  
وإذا ابصر في الجو كاسراً دخل الى البر هرباً بسرعة النبله.  
اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

## ٢١٩١٠ - قُرُفَات، قَاتُود

Alcedo cyanotis (S).  
Martin-pêcheur bleuâtre (F).  
طائر من القري. ثوبه الى الزرقه الجميلة الخضراء الملاج.  
مناقير اسود. رجلاه الى الجؤرة. موطنه افريقيه القريه.  
اخلاقه اخلاق القري الشائع .

## ٢١٩١١ - قُرُفَات، قَاتُود

Alcedo bengalensis (S).  
Martin-pêcheur bengalais (F).  
طائر من القري. ثوبه قزحي اللون المارقة الجمال.  
موطنه يمتد من الهند الى اقصى الشرق. ارياشه عزرة،  
ثمينه، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القري الشائع .

## ٢١٩١٢ - قُرُفَات، قَاتُود

Alcedo isipda (S). Martin-pêcheur vulgaire (F).  
Common kingfisher (E).  
طائر من القري. مناقره اسمر. رأسه مرطف. زوره واعل  
عنقه الى البياض العاجي. يحسره الى الصهبة القاذية.  
ظهوره لائزودي. قنقه وجناحاه الى الزرقه الخضره الملاج.  
صدره وبطنه الى الشهبه الصفعا. ذنبه الى الزرقه الخلفه  
الملاج. رجلاه الى الجؤرة || موطنه يمتد من الهند الى  
بلاد فارس والشرق الاوسط واروبه وافريقيه الشماليه.  
يألت جرف مجاري الماء وصفصاف الصفصاف. قوته  
الاسماك والقفرقيات والحشرات || اثناء تبيض من ٦  
الى ٨ يبيض تحضنها وحدها من ١٩ الى ٢١ يوماً .

## ٢١٩١٣ - قُرُفَات، قَاتُود

Alcedo cristata (S). Martin-pêcheur huppé (F).  
طائر من القري. ثوبه قزحي اللون الجميلة. رأسه قزحي  
الريش. موطنه افريقيه الشرقيه والشماليه || اخلاقه  
اخلاق القري الشائع .

## ٢١٩١٤ - قُرُفَات

Alcedinini (F).  
عمارة طير من القرليات تشمل القري والقراف وغيث  
الماء. جميعها صغيرة الجرم، زاهية الألوان المتراكبة.

## ٢١٩٠٠ - قُرُفَات الْمَقَاصِبِ

Mésange des roseaux (F).  
طائر من القرقيات يدعى مسبال، اطلبه.

## ٢١٩٠١ - قُرُفَات، قَاتُود

Parus cristatus (S).  
Mésange huppée (F).  
نوع من القرفق، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم. رأسه  
قنبري الريش الاسود المنق بالاكيب. ظهوره الى الصهبة  
الرماء. بطنه الى الصهبة الغراء الصفراء الملاج. زوره  
اسود، عنقه مطوق بالاسود والابيض. يحسره الى البياض  
الاغبر تملو رقشة سماء || يألت احراج الصنوبر.

## ٢١٩٠٢ - قُرُفَات، قَاتُود

Parus major (S).  
Mésange charbonnière, Mésangère (F). Great  
titmouse, Ox-eye (E).  
نوع من القرفق، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. ثوبه  
متراكب الألوان. ظهوره الى الخضار الزيتي يعلو مواج  
اصفر. بطنه الى الصفرة الباهتة يعلو خط قاطب اسود  
يمتد من طوق العنق الى اواسط البطن. رأسه وعنقه الى السواد  
اللامع، يحسره وقنقه ببيض، جناحاه وذنبه الى الزرقه  
الربادية. قوامه يبيض الحمار || يألت الحدائق والجنائن  
والغابات والأدغال.

## ٢١٩٠٣ - قُرُفَات

Fauvette orphée (F).  
طائر من الدخائل. الملب دخله غريفة.

## ٢١٩٠٤ - قُرُفَات

Paridae (S).  
Paridés (F). Paridae (E).  
فصيلة طير من الجواثم الخروطيات المناقير، اجناسها  
واراسها كثيرة العدد. اعطائها العالم. معظمها غريه  
ذكورها واناثها متشابهة. تعيش على الاشجار. قوتها  
الحشرات وبكثها ويرقاتها والبارز والبرور || تدن في  
تجاويف الاشجار وارواق الصنوبر والابنية المهجورة.  
اوكنها كروية الشكل تحببها بمهارة وتفرشها بالوبر  
والصوف.

## ٢١٩٠٥ - قُرُفَات

Calendule officinale (F).  
هو الاذرين الحزني، اطلبه.

## ٢١٩٠٦ - قُرُفَات

Pristipoma stridens (S).  
Pristipoma strident (F).  
سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة القرقيات. طولها نحو  
٥٠ سم. ثوبها الى الكهبة القضيض الملاج. حراشها مهدية.  
زعانفها كبيرة، الظهرية مستطيلة شائكة والشرجية فارقة.  
يكثر وجوده في المتوسط والبحر الاحمر.

## ٢١٩٠٧ - قُرُفَات

Coriscus rostratus (S).  
Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).  
Coriscus rostratus (E).  
سمكة بحرية يبيض من فصيلة الكيديات. اعطائها البحر  
الابيض المتوسط. مسرهما حشاش المهاد والاعواط ||  
جسمها اهليلجي اللون يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها  
الى الخضار الخشن الملاج يعلو تمشيع وردي واصفر.  
راسها مخروطي، ذلق القلم المنق. زعنفتها الظهرية  
مستطيلة تنتهي بمسوى الشرجية. زعنفتها الشبيهة شبه  
مقلوبة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



قُرُفَات قنبراني



قُرُفَات كبير



قُرُفَات



قُرُفَات



قُرُفَات اذرق



قُرُفَات شائع




قُرُفَات قنبراني



قرمطة البرازيل



قرمزة استرالية



قرمزة البرتقال البيضاء



قرمزة البرتقال السوداء



قرمزة التفاح



قرمزة الثوت

المواج . مكانها غدد الصفحة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قرمزية اللون مزامسة السنف . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من اذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركب الحفصيات والورد والسند والغار واللوبياء والبطاطا || تكافح عند نفث مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

### ٢١٩٢١ - قُرْمِزِيَّةُ الْبُرْتُقَالِ الْبَيْضَاءُ \* . مَغْفِرِيَّةُ الْحَفْصِيَّاتِ الدَّقِيقِيَّةِ ، كُوشَنِيلُ الْبُرْتُقَالِ الْاِيبِضِ

*Pseudococcus citri*, *Dactylopius citri* (S). *Cochenille blanche de l'oranger*, *C. farineuse de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . انتاها سمراء اللون ، حراء المواج، يضيء الشكل ، منشارية الخار، تقول من ٦ الى ٣٠ م. جسمها مثنى بمادة دقيقة بيضاء. مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || ايجالها الحولية يراوح بين ٤ و ٥ تركب الحفصيات والكروية والتين والخروبون والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والاغصان والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم عناية خاصة قوامها التطهير بالمزادات السامة . وقد عر الآلات استعمال الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصانها الكريبتولاموس (*Cryptolemus*) .

### ٢١٩٢٢ - قُرْمِزِيَّةُ الْبُرْتُقَالِ السَّوَدَاءُ \* ، قُمَّلَتُهُ الْبُرْتُقَالِ السَّوَدَاءُ ، حَشَرَةٌ قَشْرِيَّةٌ سَّوَدَاءُ ، كُوشَنِيلُ الْبُرْتُقَالِ السَّوَدَاءُ

*Aspidiotus aspidum*, *Parlatoria ziziphi* (S). *Cochenille noire de l'oranger*, *Aspidiot de l'oranger* (F). حشرة من القرمزيات . درقها مسطحة الشكل قائمة الزوايا تقول نحو ١ م. ستة خطوط وتعرض نحو ٦ خطوط. ثوبها الى السواد اللامع . مكانها تخرومي الشكل ينجح الخار الايبض يحوي نحو ٣٠ مكنة ريفية الشكل، بنفسجية اللون || ايجالها الحولية من ٢ الى ٣ تركب الحفصيات دون غيرها وهي لا تقرب الثياب ابدأ في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكالغ باستعمال مزيج من الزيوت النباتية والبيضاء .

### ٢١٩٢٣ - قُرْمِزِيَّةُ التَّفَاحِ \* ، عَفَثٌ حَمَارِي ، مَغْفِرِيَّةُ التَّفَاحِ الْمَدْلِيَّةِ ، كُوشَنِيلُ التَّفَاحِ ، كُرْمِسُ التَّفَاحِ ، دَسْبُوسُ التَّفَاحِ

*Lepidosaphes ulmi*, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diaspis pomorum* (S). *Cochenille du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diaspine du pommier* (F). *Mussel scale* (E). حشرة من القرمزيات فاصلية الشكل ، دقيقة . طولا من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى الخفي الابرسم تغلف مادة شمعية بيضاء . مكانها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة خطية اللون || يجلبها الحول واحد وهي تركب التفاح واللاجاص والحوخ والمشمش والجوز والزيتون والازدرخت والحوخ والصنفساط ... تكافح على ان نفث المكان وقد يكون ذلك في حزيران .

### ٢١٩٢٤ - قُرْمِزِيَّةُ الثُّوتِ \* ، قُمَّلَتُهُ الثُّوتِ ، دَسْبُوسُ الثُّوتِ

*Diaspis pentagona*, *Pseudaulacaspis pentagona* (S). *Cochenille du mûrier*, *Diaspine du mûrier* (F). حشرة من القرمزيات . درقها صابجية قفها يراوح من

زروسها غليظة . مناقيرها حادة مستطيلة . ارساغها قصيرة . تألف شطوط البحار ويرف الانهار وضفاف البحيرات . قوتها الاسماك والقشريات والخرشوات || تدفن في افاحيص تحضرها في الامكان الربعية المشرقة على مجاري الماء .

### ٢١٩١٥ - قُرْم \* « نبت كالدب غلظاً وبياضاً » نبت في جوف البحر \* (السان) .

### ٢١٩١٦ - قُرْم \* الفحل الكريم من الابل الذي ترك للحملة لا يمس حبل ولم يحمل عليه || وقيل السيد العظيم على التشبيه بالفحل . قال المتنبي : ولكننا ندادب منسلق فرواً تراجمت القروم له حقائقا

### ٢١٩١٧ - قُرْمَاط \* *Curimatus* (S). *Curimate* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات الحافة وفضيلة السلمونيات. انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اصطناعها المياه المذبة الامريكية اغصانها امريكية الجنوبية || اجسامها اهلالية الشكل، متوسطة القد . تتميز باصطناعها الحادة الاطراف الدرية القاطعة وبفكرتها الخالية من الاسنان || اشهر انواعها قرمطة البرازيل .

### ٢١٩١٨ - قُرْمَاطَةُ الْبِرَازِيلِ \* *Curimatus laticeps* (S). *Curimate à large tête*, *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القرمات . مهدا اهر البرازيل وبحيراته وقد شاعت تربيتها في اكثر مسامك العالم لانها سبروتية قليلة التطلبات ، جيدة اللحم || جسمها اهلالي الشون يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غزروفي الشكل ، مستعرض القاعدة . ثوبها الى الخضار الغضبي يبق مع اقترابه من ثوب الظفر ويغزو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراعية الشكل يثبتها في مؤخر الظهر جذعة ففروية . زعنفتها الشريعية تقابل الجذعة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

### ٢١٩١٩ - قُرْمِزِيَّةٌ ، مَغْفِرِيَّةٌ ، حَشَرَةٌ قَشْرِيَّةٌ ، قُمَّلَتُهُ النَّبَاتِ ، كُرْمِسٌ ، كُوشَنِيلٌ ، مَغْفِرٌ

*Cochenille*, *Kermès*, *Céroplaste* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف انواع القرمز والمغفر وهي حشرات صغيرة القند تنتمي الى فصيلة المغفرات. تركب الاشجار المثمرة وغيرها من النباتات الزراعية والحرجية فتؤذيها وتوقع بها الاضرار || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

### ٢١٩٢٠ - قُرْمِزِيَّةٌ أَسْتَرَالِيَّةٌ \* ، كُوشَنِيلُ أَسْتَرَالِيٍّ ، إِيْقَتَار

*Icerya purchasi*, *Pericarya purchasi* (S). *Cochenille australienne*, *Icerya* (F).

حشرة من القرمزيات طول الذكر فيها يراوح بين ١ و ٢ م. ثوبه الى الحمرة، جناحها الى البياض الشفاف . الاثني تقول من ٤ الى ٥ م. ومكانها يطول من ٣ الى ٤ م. جسمها وردي اللون تغشاها خيوط زغبية شمعية فضية

شعاعية الشكل ، بيضاء اللون . مكانها يحوي نحو ٥٠ مكنة كروية الشكل حطية اللون || جيلها الحولي واحد . تركب افاد وافنان واوراق السديان فتؤذيها وقد تقضي عليها .

**٢١٩٢٩ - قرمزية الصبار ، كوشنيل الصبار**  
Diaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).  
حشرة من القرمزيات . درقها صابية الشكل قطرها نحو ٢ م . انثاها مستعرة ، مبطلة ، ثوبها الى الحفرة السوداء . ايجالها الحولية ثلاثة . تركب نباتات الصبار على اختلاف اجناسها وانواعها || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة على عدة دفعات متتالية فترتها تراوح من ١٠ الى ١٢ يوما .

**٢١٩٣٠ - قرمزية القرونوس**  
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).  
حشرة صغيرة من القرمزيات . انثاها بيضية الشكل مبطلة ، طولها نحو ٦ م . وتعرض ٤ م . ثوبها الى الجوة الالامية . زيانها سباجية الفواصل . مكانها يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة تنفخ بعد متعها باسبوسين اذا كان ذلك في حزيران او في تموز || وهي من الحشرات البهية المؤذية . تركب القرونوس والكروية والخوخ والدارق والجوز والبنيق والورد والسديان والليمونة . تصطب الانراه وتجنس الثار وتسبب العثان || تكافح في الشتاء باستعمال سائل الكروبيتل المركز من ٤ الى ٥ ٪ وتكافح في الصيف من تموز الى آب باستعمال مركبات الباراثيون او احد الحواشير الفعالة او الزيوت البيضاء المركزة من ١ الى ٢ ٪ على ان يتجه النضج من اسفل الى اعل ليم جميع صفحات الاوراق السفلى .

**٢١٩٣١ - قرمزية الكرم القبراء ، كوشنيل الكرم القبراء**  
Heliooccus hystrix, Phenacoccus hystrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).  
حشرة من القرمزيات . طولها نحو ٤ م . لونها وردي . زفها الشمعي يلحف الظهر دون سواء . مكانها وشعي يحوي من ٤٠ الى ٦٠ مكنة رقيقة الشكل حراء اللون . ايجالها الحولية ثلاثة . تركب الكرمه والعنب .

**٢١٩٣٢ - قرمزية الكرمه البيضاء ، دمة بيشاف**  
Dactylopius vitis (S).  
Cochenille blanche de la vigne (F).  
حشرة من القرمزيات . جسمها بيضي مفلطح . ذكرها مجنح يطول نحو ١ م . لونه الى الصفرة . انثاها عديمة الجناح ، تطول نحو ٤ م . لها الى الجوة الصفراء . تفرز مادة شمعية بيضاء اللون تنشها بكاملها . تمتص مكها على صفحة النصل السفلي في خلال حزيران فينتفخ من رقات همة تمحص عصارة الاوراق ولا تغف من العنب . ثم تقضي حياتها الشري في شقوق لها الجوة وعند انتفاخها الجدر في التربة || تكافح بكشط الحاء القديمة اليابسة وبطرش الجدر بماء الكلس او بسائل سلفات الحديد المحلل ١٠ ٪

**٢١٩٣٣ - قرمزية الكرمه الحمراء ، قرمزية الكرمه الطوطية ، كوشنيل طوطي**  
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (E). Wollige Rebenschildlaus (D).  
حشرة من القرمزيات . درقها بيضية الشكل تطول من ٤ الى

٢ م . وعطيل الى ٢ م . واربعه خطوط . ثوبها الى البياض الاغبر . الذكر يطول نحو ١ م . وخسة خطوط وهو يرتقالي اللون ، شفلات الجناح . سريع الحركة . الانثى مستعرة الشكل ، صفراء اللون . ايجالها الحولية ثلاثة . مكها اصفر اللون تتمتع على السوق والاصغان والافنان ابتداء من اواخر نيسان فينتفخ ابتداء من اواخر ايار || تركب الثوت والدارق والشمش والوز والكشمش والياسين والصفصاف || تكافح باستعمال الحشرات المفاداة او بعض الحواشير الفعالة اخصها المواكين الشوية كالزيوت النباتية المركزة بمعدل ٢ ٪ .

**٢١٩٢٥ - قرمزية الحمضيات ، وعف الحمضيات ، وعف ارجواني**

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).  
حشرة من القرمزيات . درقها مبيدة الشكل ثوبها الى السرة . حطارها اغبر ، غلافها شمعي للمادة خلي التركيب . طولها يراوح من ٢ م . وخسة خطوط الى ٤ م . وخسة خطوط . عرضها نحو ٢ م . مكانها مستطيل الشكل يحوي من ٣٠٠ الى ٤٠٠ مكنة وشعية الشكل حطية اللون . ايجالها الحولية تراوح من ثلاثة الى اربعة . تركب اوراق افنان وثمار الحمضيات اخصها البرتقال واليوسفي وليومس الجنة || تكافح باستعمال الغازات السامة لان الحواشير والزيوت البيضاء لا تقضي عليها تماما فطرأ لكثرة وجودها على صفحات الاوراق العليا .

**٢١٩٢٦ - قرمزية الخرنوب ، كوشنيل الخرنوب**  
Chionaspis ceratoniae (S).  
Cochenille du caroubier (F).  
حشرة من القرمزيات ، اجاصية الشكل مفلطحة . الذكر عاجي اللون طوله نحو ١ م . الانثى يرتقالية اللون تطول نحو ٣ م || يقال ان جيلها الحولي واحد ، تركب اوراق الخرنوب والدغل والزيتون || تكافح باستعمال الزيوت النباتية والبيضاء .

**٢١٩٢٧ - قرمزية الزيتون السوداء ، لبودة الزيتون المخططة ، كرميس الزيتون**  
Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécane de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).  
حشرة من القرمزيات . درقها بيضية الشكل تطول من ٢ الى ٤ م . وتعرض من ٢ الى ٣ ثوبها الى السرة الفسجية . مكانها مكور الشكل يحوي من ١٠٠٠ الى ١٦٠٠ مكنة رقيقة ، حطية اللون || جيلها الحولي واحد . تمتص مكها ابتداء من ايار ويستمر الى اواخر تموز . اما التفت فينتدق بعد المتع بنحو ثلاثة اسابيع || تركب الزيتون والحمضيات والدفليات والسيكاس ... فتسبب العثان الاسود بالإضافة الى اضرارها || تكافح باستعمال الحشرات المفاداة او الزيوت الشوية البيضاء او الحواشير الفعالة الصيفية .

**٢١٩٢٨ - قرمزية السديان ، كرميس السديان**  
Lecanium ilicis (S).  
Cochenille du chêne vert, Lécane du chêne vert, Kermès du chêne (F).  
حشرة من القرمزيات . درقها مستدرة ، سودا القرمص ، صفراء الجسم ، مرتفعة الختان تحقوه مادة شمعية لزجة ،



قرمزية الحمضيات



قرمزية الخرنوب




قرمزية الزيتون السوداء



قرمزية الكرم القبراء



قرمزية الكرمه البيضاء



قرمزية الكرمه الحمراء



قمرية اللوز



قمرية النخيل



قمرية الورد



قمرية فناكة



قمرية قمره



قمره

باستعمال احد الحواشير الفعالة موزعاً بالزيت الابيض .  
وقد تجري لمكافحة على عدة مرات ابتداء من زمن القملة .

### ٢١٩٣٨ - قمرية قمره \* ، مقبرية مذنية ، وعف صيني

*Lepidosaphes gloweri* (S). Serpette (F).

حشرة من القمريات . مقضية الشكل سمراء الثوب طولها  
ينبتسب من ٣ م . الى ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها  
من خطين الى ثلاثة خطوط غشاء بطنها شمعي المادة ،  
نخيل النسيج ، ابيض اللون . مكنتها يحوي نحو ٢٠٠  
مكنة رقيقة الشكل ، وردية اللون || ابيها الحولية  
ثلاثة . تركب اوراق الحنفيات والكاميلية . تكافح  
مكافحة قمرية الحنفيات .

### ٢١٩٣٩ - قمرية قمره ، مقبرية ، كرميات Coccidae (S). Coccidae (F). Coccidae, Scale Insects (E). Schildläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الانجثة . اجتماعها  
وانواعها كثيرة المدد جنبها فصيلة اللد ، مزدوجة الشكل ،  
لا نظامية التناسل منها البيوضة والبيضة والسرولة || ذكورها  
مستطيلة الشكل مجنحة . اجتماعها شائعة ، ثنائية العروق  
القائمة . اناتها عادمة الجناح ، مستعرة مبطلة . وروصها  
وجواشها مندخمة ، متاكها ثاقبة ماصة . قوائمها قصيرة ،  
ارباعها وسيدة المقلدة ، مقاطها فردية ، مدبية . اغشية  
اجسادها غدية تفرز بعض المواد الزاكية كالشمع والصلع  
واللغن والحرير وما اشبه || اشهر اقسامها القمريات والكاميلية .

### ٢١٩٤٠ - قمريل Chameaux (F). Camels (F).

الابل الصغار الكثيرة الاوبار ذات السنامين .

### ٢١٩٤١ - قمرية Capselle (F).

نبات عشبي بري يلقى كيس الراسي . اطبله . ج . قمريل .  
٢١٩٤٢ - قمرود \*  
*Tragelaphus selousi* (S).

*Tragelaphe de Selous* (F). Sitatunga (E).  
نوع من الجبل قدره قدر الغلب . ثوبه اشبه احمر يعلو  
تجذع وتقيج || يألث المنافع ويقيم كئاسه بقرها .  
ج . قراميد . والاني قمرية .

### ٢١٩٤٣ - قمرود ، أفحوص Nid in terre (F). Nest in land (E).

وكر الطائر حيث يفحص في الارض .

### ٢١٩٤٤ - قمرود \* ، سلور النيل Clarias anguillaris (S). Clarias commun, C. du Nil (F). Common catfish (E).

نوع من السلور يكثر ويسود في النيل وهو قريب الشبه  
بالنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم .  
ثوبه الى السمرة الزيتونية يعلو موج اخضر || لحمه  
عادي الصنف والمذاق .

### ٢١٩٤٥ - قمرية Bouquetin femelle (F). She ibex (E).

هي انثى الوط . ج . قراميد .  
٢١٩٤٦ - قمرية  
Tuile (F). Tile (E).

صفيحة من السلمان الجاد او المصنع المشوي .

### ٢١٩٤٧ - قرن Accouplage, Accouplement, Attelage (F). Coupling, Harnessing, Yoking (E).

هو شد او ربط البهائم للحرث او للجر ...

ه . م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة العافية .  
مكنتها كبير القدر طولي المادة اللصقة البيضاء يحوي  
من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رقيقة الشكل ، سمراء اللون ،  
جذوية الموج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكنتها من  
اواخر ايار الى اواخر تموز فينتفخ في تموز وآب .  
تركب الكريمة والنيل والثلث . تكافح كثيرا من القمريات  
باستعمال احد الحواشير الفعالة .

### ٢١٩٣٤ - قمرية اللوز \* ، كوشيل اللوز Lecanium amygdali (S). Cochenille de l'amygdier, Lécane de l'amandier (F).

حشرة من القمريات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م .  
ورخسة خطوط . ثوبها الى الرمادي . افرازها لزج اسمر .  
مكنتها مركزي ، اطحل اللون ، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة  
وشمية الشكل ، حنطية اللون || جيلها الحولي واحد .  
تركب اثنان واربعة جميع الاشجار اللوزية اصعبها اللوز .  
تكافح في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنيانبي  
المركب بمعدل ٢٪ .

### ٢١٩٣٥ - قمرية النخيل \* ، وزمة النخيل ، كوشيل النخيل

*Parlatoria blanchardi*, *Websteriella blanchardi* (S).  
*Cochenille du dattier* (F).

حشرة من القمريات . اعطائها تشمل نخيل العالم . الذكر  
دقيق نخيل ابيض اللون يطول نحو ١ م . الانثى بنفسجية  
اللون رمعية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط .  
ردتها سمراء اللون يحويها حاد من الرزب شمعي المادة اطحل  
اللون . مكنتها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية  
الشكل وردية اللون || ابيها الحولية ثلاثة او اربعة .  
تركب نخوص النخيل فتؤذي اشد الاذى || تكافح  
باستعمال الزيوت النباتية او بعض الحواشير الفعالة المجربة .

### ٢١٩٣٦ - قمرية الورد \* ، ديسوس الورد ، قملة الورد ، كرميس الورد ، كوشيل الورد

*Diaspis rosae*, *Aulacaspis rosae* (S). Cochenille du  
rosier, Diaspis du rosier, Kermes du rosier, Pou  
du rosier (F).

حشرة من القمريات . ردتها صاجية الشكل قطرها اراوح  
من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجذوة حادها ابيض . الذكر  
خري اللون . ابيض الجناح ، يطول نحو ١ م . الانثى  
مستطيلة الشكل حراء اللون . مكنتها جراب مستعرض  
يحوي نحو ١٠٠ مكنة رقيقة الشكل خرية اللون || جيلها  
الحولي واحد . تركب الورد والرموس . تكافح باستعمال  
الزيوت البيضاء مزوجة بالزيوت النباتية بمعدل ١,٥ ٪ .

### ٢١٩٣٧ - قمرية قناكة \* ، قملة سنان جوزهره ، كوشيل سنان جوزهره

*Aonidiella perniciososa*, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). Pou de San José,  
Cochenille de San José (F).

حشرة من القمريات . ردتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ م .  
ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الانثى سرلوة  
سمراء اللون ، حنطية الموج تنفخ بطرف سنة اربع  
ما قدره ٤٠٠ رقة || ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٤  
تركب التفاح والاباصم والدراق والخوخ والمشمش  
والكرز والصبرية والقرنوس والورد ... || تتركز على  
سوق وافصان ويزرع النبات حيث تنحصر السبع || تكافح

حيات سامة من فصيلة الافاعي لها نتوان صغيران في رأسها كأنهما قرنان . انواعها اربعة جميعها خبيثة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراکش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تنس في الرمل فاذا مر بها احد لدغته || انواعها : ابن قرة ، حادية ، قرناء مصرية ، قصرى .

٢١٩٥٦ - قَرْنَبُوش *Lotier cultivé (F).*  
هو اصابع العروس ، راجمه .

٢١٩٥٧ - قَرْنَبِي *Capricorne, Longicorne (F). Longicorn, Long horned beetle (E).*  
جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه كثيرة العدد تتميز باجسامها الكبيرة القلدة المخدبة الظهر وبجرارمها وقرونها الاستشعارية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية ويعلها :

الا يا عباد الله قلبي ممتع  
ياحسن من صل واتجهم بعل  
ينام اذا ناست حل عكناها  
ويلم فساداً كالسلافة او احل  
يدب الى احشائها كل ليلة  
دييب القرني بات يعلو نقاً سهلا

٢١٩٥٨ - قَرْنَبِي الدُّب \* *Xystrocera globosa (S). Xystrocère globuleux (F).*  
حشرة من القرنبيات . رفيعة الشكل ، مبدية الظهر . طولها نحو ٢٢ مم . ثوبها الى البني تشوبه حرة قائمة واخاذيد خضرة تملو الاغداد || يرقاتها تركب الدلب والنسب والليخ فتختر السوق وتمطلها .

٢١٩٥٩ - قَرْنَبِي السنديان \* *Cerambyx cerdo (S). Capricorne (le grand), Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).*  
حشرة من القرنبيات . طولها ٥٠ سم . ثوبها الى السمره ، ماجتها حنطية لامة . زباناها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القلدة تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قَرْنَبِي الصَّفصاف \* ، لاميَّة الصَّفصاف *Lamia textor (S). Lamie des saules (F).*

حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٧ مم . ثوبها الى البوداد الفضي || يرقاتها نحيلة القلدة تركب جذوع وسوق الصففاف والودور فتسرد وتطمطلها .

٢١٩٦١ - قَرْنَبِي صَغِيرَة \* *Cerambyx scopolii (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).*  
حشرة من القرنبيات طولها نحو ٢٢ مم . ثوبها الى السمره الداكنة . تعيش على ازهار الورديات والطيخيات والبلسان . تسرح في النهار || يرقاتها تركب سرق الاشجار المرجية ولا تمتع عن الاشجار المثمرة اعصها التفاح والكرز والتين .

٢١٩٦٢ - قَرْنَبِي مِسْكِيَّة *Aromie musquée*  
هي الاروية المسكية ، اطلبا .

٢١٩٤٨ - قَرْن - هو السفة ، اطلبا .

٢١٩٤٩ - قَرْن *Corne (F). Horn (E).*  
ج قرن . والقرن بوارز قاسية مختلفة الاجسام والاشكال تنشأ على رؤوس بعض الحيوانات كالبقير والغنم والظباء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قَرْن اسْتِشْعَارِي ، زُبَانِي ، زُبَان *Antenna (F). Antenna (E).*  
عضو مفصل متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا . وهما قرنان وزبانيان تستعملهما الحشرات للحس كما في الجراد او الشوك في الذباب او للسمع كما في البومض او للتفاهم كما في النمل || والقرن الاستشعارية عديدة الاشكال مختلفة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . اشهرها :  
ارنسي *Aristée (F). Aristate (E).*  
عيطي *Filiforme (F). Filiform (E).*  
رأسي *Capitulée (F). Capitata (E).*  
رليشي *Pennée (F). Pinnate (E).*  
شوكي *Sétacée (F). Setaceous (E).*  
صيني *Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E).*  
صويطاني ، صي *Calviforme (F). Calviform (E).*  
قلادي ، سبيحي *Moniliforme (F). Moniliform (E).*  
غزاري *Stylée (F). Stylate (E).*  
مرفقي *Coudée (F). Bent (E).*  
مشطي ، عالي *Pectinée (F). Pectinate (E).*  
مشطي مزدوج *Bipectinée (F). Bipectinate (E).*  
منشاري *Serrulée (F). Serrate (E).*

٢١٩٥١ - قَرْن الأَرُوس *Platycerium bifurcatum (S). Platycerium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Gewelhfarn (D). Alcidorne (I).*  
نبات عشبي يساهي بمعر من السرخسيات يزرع للزينة . اوراقه قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الفلج ، منشبة كقرون الاروس .

٢١٩٥٢ - قَرْن الأَكِيل *Coronope (F).*  
هو لسان الحمل القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٣ - قَرْن الغَرَال *Lotier corniculé (F).*  
هو اللولس القرني ، اطلبه .

٢١٩٥٤ - قَرْنَاء *Ceratocephalus (S). Cératocephale (F).*

جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المتدلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فروع . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كفية ، مقرونة ومشرقة . ازغارها صغيرة صفراء اللون ، خماسية التركيب ، قليلة الاسدية ، مفترية ، يحرسها النمل || تنويعها ربيعي || اشهر انواعها القراء المبذولة والمنجلية .

٢١٩٥٥ - قَرْنَاء \* ، حَرِيْش *Cerastes (S). Céraste (F). Ceraste, Horned viper (E).*  
ويدعوها مقردة وذات القرنين وذات الزبطين . جنس



قرومط



قرناء



قَرْنِي الدلب



قَرْنِي السنديان



قَرْنِي الصففاف



قَرْنِي صَغِيرَة



الى ٤٠ سم. أوراقه شديدة الخضار، خالصة العروق. ازهاره الى الحمرة الزنجفريه، كأسها تطول نحو ٢٥ سم. وقطر بتلاتها ايضا || ازهاره يستمر من تموز الى آب.



قَرْنُفَلُ

#### ٢١٩٦٩ - قَرْنُفَلُ أَرْمِيرِيَّة \*

*Dianthus armeria* (S). *œillet velu*, *O. armeria* (F). *Armeria pink*, *Deftord pink* (E). *Rauhe Nelke* (D). *Armeria*, *Garofano peloso*, *Viola da lepre* (I).

نوع من القرنفل ضروبوه وهما جة عديدة، سوقها فروع خلية تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. أوراقها الجذعية ضيقة مستطيلة. أوراق سوقها وفروعها أقصر من سلاحياتها، نصلها ثلاثية العروق، بحرية اللون. ازهارها صغيرة القد، وبيدة، ملونة الريقة || يرغب، مع سائر ضروبوه، في الازتربة الرملية. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.



قَرْنُفَلِ احمر زنجفري

#### ٢١٩٧٠ - قَرْنُفَلُ أَزْرَق

*Dianthus caesius*, *D. gratianopolitanus* (S). *œillet bleu* (F).

نوع من القرنفل ساقه فروع مسطحة. أوراقه صلبة بحرية اللون، نصلها مسن الحافة، ثلاثي العروق. ازهاره عطرية العرف؛ بتلاتها وبيدة اللون، مسنة الخواارجي، قطرها يتفرج من ٢٠ الى ٢٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

#### ٢١٩٧١ - قَرْنُفَلُ أَسْفَق

*Dianthus ferrugineus* (S). *œillet ferrugineux* (F).

نوع من القرنفل مهد ايطاليا. ساقه منتصبه فروع تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه الجذعية ضيقة. أوراقه الساقية والفرعية أقصر من السلاحيات؛ نصلها عايق الخضار البحري || ازهاره صغيرة القد؛ بتلاتها ثنائية التفصيص، ثلاثية السنين، صفراء الصفحات الخارجية، سمر الداخعية، سفح المواجه || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.



قَرْنُفَلِ ارميريه

#### ٢١٩٧٢ - قَرْنُفَلُ البَلْشَكان، قَرْنُفَلُ بَنَيسِي

*Dianthus Panceli* (S). *œillet de Pancel* (F).

نوع من القرنفل مهد البلقان. ساقه فروع تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه خيطية، ضيقة؛ نصلها مالمش البشرة، سيمك الصفحة، بحري اللون. ازهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، أرجوانية اللون، سمر المواجه. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.



قَرْنُفَلِ الزَّهَارَيْنِ

#### ٢١٩٧٣ - قَرْنُفَلُ الرِّمَالِ

*Dianthus arenarius* (S). *œillet des sables* (F).

نوع من القرنفل منته الرمال. ساقه قليلة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٥ سم. أوراقه قصيرة النصل الضيق الاخضر. ازهاره فردية التجمع، متوسطة القد، بتلاتها الى البياض الناصع تملو شمة وسطى خضراء || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

#### ٢١٩٧٤ - قَرْنُفَلُ الزَّهَارَيْنِ \*

*Dianthus caryophyllus* (S). *œillet des fleuristes*, *O. flamand*, *O. remontant*, *O. perpétuel*, *O. fantaisie* (F). *Carnation*, *Clove pink*, *Picotee* (E). *Gartennelke*, *Gartennelken gefüllte*, *Nelke* (D). *Garofano dei fioristi*, *G. scempro* (I).

نوع من القرنفل التزييني المشهور. ضروبوه وامراده كثيرة العدد. سوقها فروع. أوراقها بحرية، نصلها جاند الصفحة. ازهارها مكسية، فواحة العرف العطري،

#### ٢١٩٦٣ - قَرْنُفَلَات، زُعْفُفَات

*Cerambycidae* (S). *Cérámbycidés*, *Capricornes*, *Longicornes* (F). *Cerambycidae*, *Longicorns*, *Long-horned beetles* (E). *Bockkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الجناح، عماراتها واجناتها وانواعها تعد نحو ٢٠ ألف. اجسامها مستطيلة، اشكالها مختلفة، اطولها تمتد من ١٠ الى ٨٠ م. اثنائها عديدة الالوان. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكر اطول ما هي عليه في الاناث. ارساها خاسية اما تيم كاتها رباعية لان خاسها صدير القد لاسمى الارتكاز. غناها حادة. تطير في الليل او في النهار. قوتها الازهار وجميع المواد النباتية. جيلها يمتد من سنتين الى اربع سنوات. مكنتها لاقياسي الشكل، اصفر اللون، تمتد الاثني في لحاء النبات او تحت قشوره او ترزه في التربة قرب الجذوع || رقاتها مردنية الشكل، غليظة الرووس والمنطقة الصدرية، تحلة الاطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد اللينة والخشبية، تسردب الافاد والفروع والقصون والنوق والجذوع والجذور. حورياتها تلتمس بغشاة خشنة تصنعها من فتات الخشب المعجون بالاروال في آخر سرداب حفرته عند آخر السلاخ.

#### ٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلُط \*، قَرْنُفِلُط

*Brassica oleracea botrytis* (S). *Chou-fleur* (F). *Cauliflower* (E). *Blumenkohl* (D). *Cavolfiore*, *Cavolfiore* (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الصليبيات. ترغب في الازتربة المسقوة التركيب الحكسي، المعتدلة الاندماج، المعيفة الغور، اللينة بالمواد الازتوية والمضوية. تتكاثر بالبذر. تنقل الشتول من الاكواد الى المستقل عند بلده نشوء المادة اللينة وتفرس على ابعاد تراوح من ٦٠ الى ٧٠ سم.

#### ٢١٩٦٥ - قَرْنُفَل

حجر من اللوين الصوف وهو اصطب الاجسام بعبد الناس. انواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صيغ المادن.

#### ٢١٩٦٦ - قَرْنُفَلَة

*Mue des oiseaux de proie* (F). *Moulting* (E).

القرقة زين تحبير الريش عند الجوارح.

#### ٢١٩٦٧ - قَرْنُفَل

*Dianthus* (S). *œillet* (F).

*Pink* (E). *Nelke*, *Sommernelke* (D). *Garofano* (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفليات. انواعه البرية والزراعية نحو ٨٠٠ اما ضروبوه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جيمها زراعية تزيينية. سوقها عقدية فروع. اوراقها خاضنة متعاقبة. نصلها سنائي الشكل ثخين الصفحة البحرية اللون. ازهارها بجلة الشكل، تاجية الارتكاز، مختلفة التجمع والالوان؛ عطرية العرف الفواح. بزورها صغيرة القد، مستدرة الشكل، رقيقة الجرم، سمره اللون || يتكاثر بالبذر والمقل. يرغب في الازتربة المتوسطة الاندماج والرطوية اللينة بالمواد المضوية والمنسوبة للعناصر المعدنية || اشهر انواعه الرئيسية ما يتبع.

#### ٢١٩٦٨ - قَرْنُفَلِ احمر زنجفري \*

*Dianthus cinnabarinus* (S). *œillet rouge cinabre* (F).

نوع من القرنفل مهد اليونان، ساقه فروع تملو من ٣٠

## \* ٢١٩٨١ - قرنفل صيني

*Dianthus chinensis* (S). *Œillet de Chine*, O. *régence* (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indischs Nagelein* (D). *Garofano della Cina*, *G. della reggenza* (I).

نوع من القرنفل المحول. مهدد الصين. ضروب عديدة سيقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار البحري. أزهارها بسيطة أو مكسبة، بتلاتها مهدبة الختار. الوانها مختلفة منها السوية والبياض والمocha والموشة والموشة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

## \* ٢١٩٨٢ - قرنفل منتصب

*Dianthus strictus* (S). *Œillet dressé* (F).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة، قليلة، ضروب مستطيلة السلاحيات النحيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقها ضيقة النصل، بحرية اللون. أزهار فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة المالحق، خافتة العرف. بتلاتها يضاء اللون منفصلة الانتشاب مقرضة الاطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

## \* ٢١٩٨٣ - قرنفليات

*Caryophyllaceae* (S). *Caryophyllées*, *Dianthées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القنالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة اسباب: السيلانيات والفلقيات والخنثيات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبفسها محول وسولي. ومنها ايضا البرية والطيبة والصناعية والزربية.

## \* ٢١٩٨٤ - قرنفل

*Eugenia aromatica*, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Girofler*, *Gérofler* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolide*, *Chido flore* (I).

جنية معمرة من فصيلة الآسيات. مهدا البلاد الحارة ساقها واغصانها سرحة. أوراقها متقابلة، نصلها جامدة، ريشية العروق. أزهارها صفيرة القند، كؤوسها رباعية التفصيص، بتلاتها ثمانية، اسديتها كثيرة العدد، مبيض مدتها ثنائي الخياء المنظم، ثمارها نوية متوتجة، يزورها قليلة. تزود لازهارها الطريقة الشائعة الاستعمال المعروفة باسم « كيش القرنفل ».

## \* ٢١٩٨٥ - قرنوس

*Chorinus* (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس دوبيات بحرية من القرشيات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الجيحات. انواعه المعروفة ستة، اعطتها بحار البلاد الحارة ١٠ اجسامها صفيرة شبه ريمية الشكل. سناكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتشاب. قوائمها الامامية ملقطة الاطراف، لامتناوية الطول والسمانة. الوانها نباتية الالوان تكثر فيها الجؤرة والسمره الحديدية المالح.

## \* ٢١٩٨٦ - قرنوس

*Cornus* (S). *Cornel-tree* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات. انواعه المعروفة نحو ٢٥ منها الاشجار والشجيرات. واجلنتها ولاعشاب. أوراقها كاملة عابلة. أزهارها

كبيرة القند، قطرها ينبلج من ٦ إلى ١٢ سم. الوانها عديدة تغلب فيها السوية.

## \* ٢١٩٧٥ - قرنفل الشاعر

*Dianthus barbatus* (S). *Œillet barbu*, O. *de poète*, *Bouquet parfait*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tuft*, *Sweet William* (E). *Barnetke*, *Samtnelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazzetto perfetto* (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبة فراء، دقيقة السلاحيات المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سانية النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار المالحق، أزهارها كثيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسن. الوانها مختلفة متداخلة عديدة || أزهارها يستمر من ايار إلى آب.

## \* ٢١٩٧٦ - قرنفل الصخور

*Dianthus petraeus* (S). *Œillet des rochers* (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجراول. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة نصلها ثلاثي العروق، اخضر اللون، مدبب المقصبة الشالكة. أزهاره وردية، صغيرة القند، فردية التجميع، عادمة العرف. يوجد منه في لبنان || أزهاره يستمر من ايار إلى تموز.

## \* ٢١٩٧٧ - قرنفل الهند

*Tagete touffu* (F). هو الخملية الجليية، اطلمها.

## \* ٢١٩٧٨ - قرنفل برتي

*Dianthus sylvestris* (S). *Wood pink* (E). *Steinnelke*, *Œillet sauvage* (F). *Wild Nagelein* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القرنفل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها جامدة النصل الاخضر المدبب الطرف، أزهاره عادمة العرف، فردية التجميع، بتلاتها مسنة الختار الخاربي، وردية اللون او حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

## \* ٢١٩٧٩ - قرنفل بهي

*Dianthus superbus* (S). *Œillet superbe*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superba* (I).

نوع من القرنفل، ضروبها عديدة سيقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تطول من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ م. نصلها ثلاثي العروق، اخضر الصلصة. أزهارها عديدة، متوسطة القند، فواحة العرف، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٤٠ م. الوانها سوية مختلفة منها الالبيض والليكي والوردي والاحمر والبنيسمي || أزهاره يستمر من ايار إلى ايلول.

## \* ٢١٩٨٠ - قرنفل ريشي، قرنفل عطري

*Dianthus plumarius* (S). *Œillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Federnelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofanini* (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبة فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها لينة تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة مدبب المقصبة، ياحت الخضار البحري. أزهاره فواحة العرف المطري قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها مستطيلة التثريم مختلفة الالوان السوية || أزهارها يستمر من ايار إلى آب.



قرنفل الشاعر



قرنفل برتي



قرنفل صيني



قرنفل



قرنوس

## ٢١٩٩٣ - قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

*Cornus macrophylla*, *C. brachypoda* (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها رابعة التضلع. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٨ سم. نصلها مظهر البشرة على صفحتيه. عروقها سداسية أو ثمانية الاضلاع. أزهارها بيض. ثمارها إلى السواد الأزرق المالح.

٢١٩٩٤ - قُرْنُوسٌ كَنْدَا (F). *Cornus canadensis* (S). Cornouiller du Canada (F).

عشبة سبروتية معمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفلى لاطئة متقابلة أما العليا فمضغية ثلاثية. أزهارها نورية التجميع، بيض اللون، خضر المالح. ثمارها شتوية الشكل، حامضة الطعم، مأكولة || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

## ٢١٩٩٥ - قُرْنُوسٌ مُحْبِرٌ

*Cornus controversa* (S). Cornouiller discuté (F). شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها زياد اللحم. أوراقها متعاقبة مستندرة القاعدة، نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض ٨ سم. عروقها شتوية سداسية أو ثمانية الاضلاع. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زيتونية الشكل واللذذ، سواد اللون، زرقاء المالح، حامضة الطعم، مأكولة. أخشابها شديدة الصلابة، ناعمة الرقة، فاخرة الصنف.

## ٢١٩٩٦ - قُرْنُوسِيَّاتٌ، قَرْنَائِيَّاتٌ

*Cornaceae* (S). *Cornacées* (F). *Cornaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة المغالات، أجناسها وأنواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الأشعاب والجنات والأشجار. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الارتكاز منها المتقابلة والمتعاقبة. أزهارها خشوية، صويانية أو عقدوية التجميع. ثمارها نورية صميرة القند مأكولة. أخشابها شديدة الصلابة، صناعية، مرغوب فيها؛

٢١٩٩٧ - قُرْنُونٌ هو الشوكة الصفراء، اطلبا.

٢١٩٩٨ - قَرْنِيّ *Cératoide* (F). *Ceratoid* (F). نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالقرن.

## ٢١٩٩٩ - قَرْنِيَّاتٌ، قَطْلَانِيَّاتٌ

*Leguminosae* (S). *Légumineuses* (F). *Leguminosae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة المغالات، أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاثة أسباط: القرنائيات والمشميات والسطيات || نباتاتها مختلفة الاشكال والأحجام فيها الأشعاب والجنات والأشجار. أوراقها مركبة لا تقياسية الارتكاز. أزهارها خشوية. أزهارها عقدوية || وهي تشمل العديد من النباتات الزراعية الخذاثية والعلفية أشهرها الفول والعدس والحاص والموالب والبرسيم والنفل والبيقية والنبيل والسنط.

٢٢٠٠٠ - قَرْنِيَّة *Cornée* (F). *Cornea* (E). الجزء الخاربي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قَرْهَب *Taureau corpuient* (F). *Stout bull* (E). الثور المسن الضخم. وقيل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قَرْهَد ولد البومل ج. قراهد.

خشوية، رابعة التركيب، صغيرة القند، صمويانية التجميع. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دعنية يستخرج منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون أخشابها شديدة الصلابة، صناعية || أشهر أنواعه ما يتبع.

٢١٩٨٧ - قُرْنُوسٌ أَيْبُص *Cornus alba* (S). Cornouiller blanc (F).

جنية سبروتية تملو من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ م. أثمارها مرجانية اللون أو صفراء. أوراقها بيضيه، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٧ سم. نصلها خلي الصفحة السفلى. عروقها خماسية أو سداسية الاضلاع. أزهارها غبراء اللون. ثمارها حمضية القند والشكل، بيضاء اللون، حامضة الطعم، مأكولة.

٢١٩٨٨ - قُرْنُوسٌ السُّوَيْدِ *Cornus suecica* (S). Cornouiller de Suède (F).

عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها لاطئة متقابلة. أزهارها نورية التجميع، جؤوية اللون تحضها أربع قنايات بيض. ثمارها صميرة القند حامضة الطعم مأكولة. أزهارها يستمر طويلا شهر حزيران.

## ٢١٩٨٩ - قُرْنُوسٌ ذَكَرٌ، قُرْنُوسٌ مَبْدُولٌ

*Cornus mas* (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgeiller (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (E). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbeern, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من مترين إلى خمسة أمتار. أثمارها حطيطية اللحم مبدولة الزغب. أوراقها متقابلة، صميرة القند، مائلة للبشرة، خماسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها صفراء التبرجات، خضر القنايات. ثمارها حامضة مأكولة، رقيقة الشكل تطول نحو ١٥ م. لونها إلى الحمرة.

## ٢١٩٩٠ - قُرْنُوسٌ عُنُقُودِيٌّ

*Cornus racemosa* (S). Cornouiller à grappes (F). جنية تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ م. أثمارها وأغصانها حطيطية اللون، سرحة. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٣ سم. نصلها خلي الصفحة السفلى، عروقها رابعة الاضلاع. أزهارها عقدوية هري. أزهارها وثمارها بيض.

## ٢١٩٩١ - قُرْنُوسٌ فُلُورِيدَا، قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

*Cornus florida* (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowing dog-wood (E). Blumen Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).

شجرة سبروتية تملو من ٥ إلى ١٢ م. أوراقها متقابلة تطول نحو ١٤ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها ذات الزام الأخير، مذهب المقصعة، خلي الصفحة السفلى، سداسي العروق المزدوجة. أزهارها ودية اللون، كبيرة القنايات الحامضة. ثمارها زيتونية القند والشكل، جؤوية اللون، حامضة، مأكولة.

## ٢١٩٩٢ - قُرْنُوسٌ قَلِيلُ الْعُرُقِ

*Cornus paucinervis* (S). Cornouiller paucinerve (F). جنية صميرة تملو نحو ٢٠٠ م. أثمارها رابعة التضلع، زياد اللحم. أوراقها متقابلة، صميرة، ضيقة، نصلها يطول نحو ٥ سم. عروقها ثنائية أو ثلاثية الاضلاع، خلية البشرة من الجهة السفلى. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حمضية القند، جراء القشرة واللباب، حامضة الطعم، مرة المذاق.



قُرْنُوسٌ

٢٢٠١٤ - قُرَيْس - هي الصابونة ، اطلمها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْسِيَّات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطلمها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْص - Ortie (F). هو القراص ، اطلمه .

٢٢٠١٧ - قُرَيْص أَحْمَر - Lamier pourpre (F). هو اللاميون الارچواني ، اطلمه .

٢٢٠١٨ - قُرَيْص الْعَجُوز - Ortie brûlante (F). هو القراص المحرق ، اطلمه .

٢٢٠١٩ - قُرَيْص رُومَانِي - Ortie à pillules (F). هو القراص الكاوي ، اطلمه .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْص \* ، يُونَيْتَا - Urena (S). Urena, Herbe aux paniers (F). Indian mallow (E). Urena (D). Urena (I).

جنس نباتات جنينية ليفية من فصيلة الخبازيات . اعطائها بلاد الشرق . انواعها المزروعة اربية ، سرقها منتسبة . اوراقها معققة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خماسي الفصوص . جامد الصفحة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، خاصة التركيب || ذرع لايافها الخشنة المثنية الشاملة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْق - Coryphaena (S). Coryphène (F). Dolphin, Dorado (E).

جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحارة . جميعها من الاسماك اليمية || اجسامها اهليلجية الشكل ، كبيرة القد ، تقطل من ٨٠ الى ١٦٠ سم . اولها متداخلة الالوان المتباينة تكثر فيها الرعدة القصبية المنشقة بالانخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية فارقة او بعيدة الفلقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْق مَوَاكِب \*

Coryphaena pompilus (S). Coryphène pompile, Lampuge, Sourcil d'or (F). Pompil (E).

نوع من القريق . سمكة بحرية بيوض . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشبهة الزيتية المنشقة بالانخضر والاصفر الذهبي . ظهرها الى الخضار الالاسف الملاج . رأسها معدل الجرم ، قصير الخلف المستدير . عيناها كبيرتان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة وصيقة . الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْن - Cornicule (F). Cornicle (E). هو السرك ، اطلمه .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْتَا - Ambrevade (F). هي الكنجوس الهندي ، اطلمه .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْشَة - هي الماروسية الزراعية ، اطلمها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

الخنقة للمساء الطويلة التي انجد كرهاج . قراريج .

٢٢٠٠٤ - قُرُوة المَلْفُوف \* ، فَيْق المَلْفُوف

Plasmiodiophora brassicae (S). Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitale, Gros pied (F). Clubroot of cabbages (E). Kohlhernie, Kohlkropf (D).

وصم فطري يترى معظم السليبيات واعصها الملقوف . شتم مركب من الجذور فيسبب فتح النجج وارتفاعها . الموالل التي تنشط انتشاره وفكته : تربة متدجة وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٦٠ ٪ || يكاثف بظهور البذار والتربة ويستبدال الارربة المتدجة والمواقع الرطبة بغيرها اقل اندساجاً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْبِيَّة \* ، أَقْرَام القُرُود

Hapalidae (S). Arctopithèques, Hapalides (F). Arctopitheci, Hapalidae (E). Krallentaffen (D).

فصيلة قرد من الحيات موطأ امريكة الوسطى والجنوبية . انواعها المعروفة ٢٨ تنضم الى جلسين : الميلاس والهلبال . اجسامها مسنونة القند ريمة . اذنانها جللة مستطيلة . اولها سوية الالوان ، وافرقة الشعر الوثير المستطيل . تميش حياة السناجب . جماعها كبيرة العدد . قوتها الثار والحشرات اناثها تضع من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُود ذَيْلَانَة ، قُرُود مَذْئَبَة

Cercopithecidae, Cercopithèques (F). Cercopithe- cidae, Cercopithecus, Tailed apes (E). Meer- katzen (D).

هي المجرسيات فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشمل ستة اجناس : المجرس والحودل والملاكك والشديم والقشة والقدروح .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس - Bar (F). هي القاروس سمكة مأكولة من الفرغيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُول - Loubine vulgaire (F). سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطلمها .

٢٢٠٠٩ - قُرَيْة التَمَل - Fourmière (F). Ant-hill (E). هي جرثومة التمل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن الغذاء . وتسمى ايضاً للزربة والمنسلة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث - Anguille (F). هو الانقليس ، اطلمه .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَكَل - Anguilliforme (F). Anguilliform (E).

نعت تعريفى يطلق على كل حيوان مائي او قازب شكله كالقُرَيْث اي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدَس - Crevettes (F). هو الاربيان ، اطلمه .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدَسِيَّات - Carididae (S). Caridides (F). Carididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اعطائها بحار الدمام . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منعقة المؤخر .



قُرُوة الملقوف



قُرَيْص



قُرَيْق مَوَاكِب

Bombyx

## ٢٢٠٣٧ - قَرِينَة ، بُمْبِيكْس

جلس حشرات فراشية من فصيلة القزريات . أنواعها عديدة معظمها ضار وبعضها اقتصادي نافع كدودة القز . أشهر أنواعها ما يلي .



قَرِينَة الحرير

## ٢٢٠٣٨ - قَرِينَة الحرير \* ، قَرِينَة الثَوْت

Bombyx mori, Sericaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E).  
فراشة من القزريات متوسطة القد لا قدرة لها على الطيران تعيش نحو عشرة أيام . تساقط بعد اليوم الرابع . أنثى تبيض بعد السقاة بنحو ٢٤ ساعة . زين متحيا يشتر من يومين إلى ثلاثة أيام . عدد مكباتها لا يقل عن ٥٠٠ يعرف عنه المربين (بالدور) || جسمها نحني حشني . طولها نحو ٣ سم . ويسهلها ٤ سم . زياهاذا مشطية مزدوجة . الجناحين الامامين بعض الخطوط المتفرعة السوداء اللون . لا فارق خارجي بين الذكر والانثى سوى الحجم فالانثى اكبر واغظ من الذكر . مكباتها كروي الشكل يبدو اصفر اللون . عند متحه ، ثم ينحرف إلى اليسار ويسود قبيل التفت || البرقة تعرف بدودة الحرير ، أطبلها ، يراوح طولها عند تمام انسلخاتها من ٧ إلى ٩ سم . جسمها مالمس البشرة . رأسها صغير القند اسود اللون . قربها الشرجي دقيق ويهدب . ثوبها إلى الياض الاغبر . يملو حلقات جسمها من جانبيها سمات سود تدعى سمام التسم وتغطيها التنفس || غزوها عديدة فوارقها الحجم والتوب وقدر الشرنقة ولونها وشكلها .



قَرِينَة الخوخ

## ٢٢٠٣٩ - قَرِينَة الخروع ، بُمْبِيكْس الخروع ، دَوْدَة حرير آريا

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).  
موطنها البلاد الحارة اعصها الاسيرية . تربى على ورق الخروع . صليجتها متوسطة الحجم والصف . حريرها اغبر اللون .



قَرِينَة السِّنْدِيَان

## ٢٢٠٤٠ - قَرِينَة الخوخ \* ، بُمْبِيكْس الخوخ

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à soie du prunier (F).  
موطنها بلاد امريكا الجنوبية . تربى على ورق الخوخ ، والزيتون . صليجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي الخيط ، غليظ ، اسمر اللون .



قَرِينَة السِّنْدِيَان الجَرَّارَة

## ٢٢٠٤١ - قَرِينَة السِّنْدِيَان \* ، قَرِينَة البتلوط ، بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان

Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chêne, Ver à soie du chêne (F).  
موطنها الهند . تربى على ورق السنديان . صليجتها صغيرة القند مستطيلة . حريرها براق الخيط متوسط الصلابة .

## ٢٢٠٤٢ - قَرِينَة السِّنْدِيَان الْجَرَّارَة \* ، بُمْبِيكْس السِّنْدِيَان الْجَرَّار

Cnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chêne (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D).  
حشرة ملولوة توجد في جميع البلاد المعتدلة الحارة . يرتقا سمره اللون . كثيفة الهلب . لسها يبيح الجله كالقراص . تركب اوراق السنديان على اختلاف انواعه فتقرضها وتؤذيها .

## ٢٢٠٢٦ - قَرِينَة ، شَبَهَة

Adminicule, Présomption, Contexte (F). Presumption, Context (E).  
عنصر من عناصر الاثبات قد لا تقوم به الحجة تماماً ولكنه يساعد .

## ٢٢٠٢٧ - قَرِينَة عَدَم التَّمْيِيز

Présomption de non-discrimination (F). Presumption of not discernment (E).

قَرِينَة قانونية يستدل بها ما اذا كان القاصر الذي اقترف جريمة يمي او لا يمي مسؤولية جرمه . وفي القانون اللبناني اذا لم تتجاوز سن القاصر المحرم ثلاث عشرة سنة عوقب بتأديبه وراقبته .

## ٢٢٠٢٨ - قَرُوح

مرض يصيب القدم فيزولها ويذهب بجلدها .

## ٢٢٠٢٩ - قَرُوحِي \* ، Iridescent (F). Iridescent (E).

نمت تعريف يوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

## ٢٢٠٣٠ - قَرُوحِي ، قَرُوحِي

نمت تعريف يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

## ٢٢٠٣١ - قَرُوحِيَة

راجع حذقة .

## ٢٢٠٣٢ - قَرُوح

نوع من السحاب الهيبد البعيد الارتفاع . وهو من الغيوم الماطرة . القطعة منه قزعة .

## ٢٢٠٣٣ - قَرُوح \* ، Deverra (S). Deverre (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبات بعض سواحل البحر الابيض المتوسط || سوقها فروعاً قليلة الاوراق او عادتها . والاوراق ، عند وجودها ، في بعض الانواع تكون متعاقبة ، مركبة ريشية التفصيل . ازهارها صيوانية التجميع . ازهارها متباينة الالوان منها الابيض والبنّي والاصفر والاعضر الاصفر . تنويرها ربيعي .

## ٢٢٠٣٤ - قَرُول \* ، Polypier de Corail (F).

Polypary of Coral (E).  
القزول زركبة البسد ، اي المرجان ، حيث تنشب اللديفة .

## ٢٢٠٣٥ - قَرُوي

Séricicole (F). Silk-producing (E).  
نمت تعري يطلق على ما هو مختص بتربية دود القز .

## ٢٢٠٣٦ - قَرَبَات

Bombycidae, Liparidae (S). Bombycidae, Liparidae (E).

فصيلة حشرات من حشريات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فراشاتها متوسطة الحجم ، غليظة الجسم ، عديدة الخيط ، مقمرة الحياة ، لا تتنلى . اجناسها كثيفة الحراشف الزباء . رواشها إلى الياض الاغبر تملو رشفة سمره خفيفة . قرنها الاستعمارية مشطية مزدوجة || مكباتها كروي الشكل ، فري المنح ، رقاتها كبيرة القند لملاء الجلود وحيدة القرن الشرجي . خادراتها تقتلف بشرانق حرارية المحيط || أشهر اجناس القرية .

المائل || البرقة تطول من ٢٢ إلى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الملب القصر، مبهر الملب الطويل القسي التجميع. اطلال اللون، اربد الموج، يملوه خط ثنجي ابيض وخطان جانبيان اسمران وخطان متعلقات اصفران. رأسها جوزي اللون. مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلصلة تحبكه على النبات المائل.

٢٢٠٤٧ - قُرْبَةُ الْكَرَزِ \* ، بُمْبِيكْس الْكَرَزِ  
Porthesia similis (S). Bombyx cul doré (F).  
Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزليات رقتها شرقة تركب اوراق الكرز والتفاح فتفرضها وقد تقضي عليها.

٢٢٠٤٨ - قُرْبَةُ شَارِدَةِ \* ، بُمْبِيكْس شَارِدِ  
Liparis dispar, Lymantria dispar (S). Bombyx disparae, Spongieuse (F). Gipsy moth, Gypsy moth (E). Schwammspinner (D).

حشرة من القزليات رقتها همة تركب اوراق الاجنار الحرجية والشمرة اصخها السنديان والصفصاف والتفاح.

٢٢٠٤٩ - قُرْبَةُ مُبْرِقَةِ \* ، بُمْبِيكْس مُبْرِقِ  
Liparis monacha (S). Bombyx nonne, Nonne, Bombyx moine (F). Nun moth, Black arches moth (E). Nonne, Fichtenspinner (D).

حشرة مذيلة موطنها البلاد المعتدلة الحارة. رقتها همة تركب اوراق عدة نباتات اصخها اجنار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قُرْبَةُ يَمَامَايَ ، بُمْبِيكْس يَمَامَايِ  
Bombyx yamamai (S). Bombyx yamamai (F).

حشرة من القزليات موطنها الصين. ترى على ورق السنديان، صلجتها متوسطة القد، حررها جيد الصنف ثخن الخيط.

٢٢٠٥١ - قُسَابَةُ رَدِي الثمر.

٢٢٠٥٢ - قَسَاحَةُ  
Rétractilité (F). Retractility (E).

القساحة قابلية الانقباض.

٢٢٠٥٣ - قُسْبَارِيَّاتُ  
Cuspariées (F).

سبط من فصيلة السبائيات. اجناته وانواعه عديدة جميعها اجنار وجنيات. اعطائها البلاد الحارة اصخها امريكية الجنوبية. بعض انواعه طبي دافع للحميات.

٢٢٠٥٤ - قُسْبَارِيَّةُ الْحَمِي \* ، قُسْبَارِيَّةُ قَنْزَوِيلا  
Cusparia febrifuga (S). Cusparie (F). Cusparia (E). Cuspabum (D). Cusparia (I).

شجرة من القسباريات. ساقها منتصبه فروعها تملو من ٧ الى ١٥ م. اوراقها عابطة، معققة، متعاقبة، مركبة، ثلاثية الوريقات. ازهارها عنقودية التجميع، يضاء اللون، خاسية الثلات، حيلة الشكل، مستحبة العرف. يزورها سود احادية || لحاء الشجرة عطري الرائحة غزير المركبات الفعالة يستخرج منه مادة القسبارين التي تعتبر من المقويات المرموقة ومن دوائف الحميات المشهورة.

٢٢٠٥٥ - قُسْتُ \* ، قُسْتُسْ  
Costus (S). Costus (F). Costus, Kust-root (E). Kostuspflanze (D). Costo (I).

جنس نباتات جذمورية عشوية برة وزراعية من فصيلة الزنجبيليات. انواعه المعروفة ١٥ منهاها المناطق الحارة.

٢٢٠٤٣ - قُرْبَةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ \* ، بُمْبِيكْس الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارِ  
Cnethocampa pityocampa (S). Bombyx processionnaire du pin (F). Pine processionary caterpillar (E). Pinien-Prozessionsspinner (D).

حشرة شديدة الاذى. رقتها كثيفة الملب تركب بتناقل واهداب الصنوبر فتقضي عليها.

٢٢٠٤٤ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ \* ، بُمْبِيكْس الصَّيْفِ  
Euproctis phaeorrhæa, Porthesia chrysorrhæa (S). Bombyx chrysorrhæe, Cul brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger goldafter (D).

حشرة من القزليات رقتها همة تركب معظم الاجنار الشمرة وتغريها من الورق.

٢٢٠٤٥ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ السَّمَرَاءِ الذَّكَبِ  
Euproctis phaeorrhæa, E. chrysorrhæa, Nygmia phaeorrhæa (S). Bombyx chrysorrhæe, Cul-brun (F). Browntail moth (E). Braunschwänziger Goldafter (D).

حشرة من القزليات حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط واروبة المعتدلة الحارة. فراشتها عيفة تعيش على مخزونها الامعاني. سرفتها تعيش على اوراق الاجنار الشمرة والحرجية اصخها الزعرور والنوخ والتفاح والسنديان والقطلب || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ م. بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ م. رأسها ابيض. عينها كبيرتان. زباناها مشطيان مزودبان جوشها ابيض. بطنها ابيض الثلث الاول، جوزي اللون في الثلثين الاخيرين || رواشتها عند الشقين، صغرة الحجم، يضاء اللون، تبنية الزنزين، متراكبة الحراشف الدقيقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بأربعة ايام وتبريق المكان لطفاً واحدة على فصل النبات المائل || البرقة تطول من ٣٠ الى ٣٥ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الملب اللين القصير مبهر الملب الطويل. اكهب اللون يملوه خطان ابيضان من جانبي الظهر يتوسطها خط ثنجي احمر. رأسها الى الجفوة. مدنها ورواجها الى السرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلصلة تحبكه البرقة بين اعناق الارواق والافنان.

٢٢٠٤٦ - قُرْبَةُ الصَّيْفِ الْمُدْهَبَةِ الذَّكَبِ  
Porthesia chrysorrhæa, P. similis, P. auriflua (S). Bombyx cul-doré (F). Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزليات حرشفيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاذن واروبة وافريقية الشمالية. فراشتها تعيش على مخزونها الامعاني. سرفتها تعيش على اوراق الاجنار الشمرة والحرجية || جسمها متوسط القد يطول من ١٣ الى ١٦ م. بسطتها تراوح من ٣٦ الى ٤٢ م. رأسها ابيض. عينها كبيرتان. زباناها مشطيان مزودبان. جوشها ابيض. بطنها حنطلي اللون مذهب الموج || رواشتها عند الشقين يضاء اللون، تبنية الزنزين يعلوها في الزوج الامعاني بقعة طرية اللون || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتمتع المكان ميمادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات



قُرْبَةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَّارَةِ



قُرْبَةُ الصَّيْفِ



قُرْبَةُ الْكَرَزِ



قُرْبَةُ شَارِدَةِ



قُرْبَةُ مُبْرِقَةِ



قُسْبَارِيَّةُ الْحَمِي



قُسْتُ

اوراقها لمبية ، لاطنة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللد ، تاجية الارزكاز ، لا قياسية التجميع منها النورية والسلفية . جذاميرها بطيية ، كانت ولا تزال تستعمل في الترياق .

Ciste (F).

قُسُوس

هو اللادن ، اطلبه .

Ciste ladanifère (F).

قُسُوس لاذني

هو اللادن الاسياني ، اطلبه .

Sisymbre (F).

قُسُوس بَرِّي

هو السبارة ، اطلبه .

Aunée grande (F).

قُسُوس شامي

هو الرأس الطبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُطان ، قوس قُرح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).

ويدهي أيضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في أثناء سقوط المطر أو تنجم الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي التانث الى موشور زجاجي ويتحلل الى ألوان الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاحضر والازرق والتلي والبنفسجي . ويشاهد القسطن أيضاً في بعض الليالي القسيرة السبب نفسه .

Irisé (F).

قُسُطاني

راجع قزحي .

Bétoine (F).

قُسُطْران

هو البطيخا ، اطلبه .

Châtaignier (F).

قُسُطل

هو الكتنة ، اطلبه .

Jacinthe orientale (F).

قُسُطل الأرض

هو الجوزن الشرقي ، اطلبه .

Macre (F).

قُسُطل الماء

هو العكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُطل هندي

هو القندلي المينول ، اطلبه .

Châtaigne (F).

قُسُطلة

هي الكتنة شجرة الكتنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُطُورَة ، قُسُطُورِيوم ، قُسُطُورِيون

Castoréum (F).

هو الجندبادستر ، اطلبه .

Ciste (F).

قُسُوس

هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُطُوس اقريطشي

Ciste de Crète (F).

هو اللادن الاكريتي ، اطلبه .

Echiostoma (S).

قُسُطُوسَة

Echiostome (F). Echiostoma (E).

جنس اسماء بحيرية من مفتوحات المائة وفصيلة الرعايات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والنج . تتميز بجهازها

الفسفوري المشي || اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرعاس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطوعة الاطعام ، كبيرة الاشداد ، سننة الفكين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة المدية . عيونها جاحظة . قشورها مائل الصلحة . زعانفها الظهرية وسيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الارزكاز ، تقابل الشرجية ومثلها قداماً وشكلاً . زعانفها الحوضية والبطنية غليظة الشكل ، مستطيلة . زعانفها الذيلية صغيرة فارقة . اثوابها الى السرة السوداء يعلوها موج اسفح .

٢٢٠٧٢ - قُسُطُوسَة ، مَهْرُ الجَنَّة

Iris oratoria (S). Iris orateur (F).

حشرة غاصلة من مستقيبات الاجنحة وفصيلة السرعوفيات اعطائها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والاذن واروبة الغربية وافريقية الشالية . تألف البراري والمواقع الدغلة || جسمها مستدق نحيل يطول نحو ٤ سم . ثوبه الى السرة الاخضراء الموج . رأسها صغير مستعرض . عيناها جاحظتان . زباناها دقيقتان مستقيبان . قوائمها مستقيمة . الزوج الامامي مستنخم ضليح . اجنبها متدلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلتف البطن عند الذكر ولا تلحف عند الانثى . الانثى اكبر قدماً من الذكر وابت لولاً منه ، ترز مكها في التربة قرب جذوع النبات .

٢٢٠٧٣ - قُسُطاس

نبت كالكرس اخضر عيب الريح ينبت في سيل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسَل

Técanos (F).

هو الكزاز ، مرض غيبث ، اطلبه .

Division, Embranchement (F). قِسْم

Division (E).

يأتي القسم في التصنيف العام بعد المملكة وهو يتألف من صفوف والصوف من طوائف والطوائف من سب والسب من طبقات والطبقات من رتب والرتب من مراتب والمرتبات من فصائل والفصائل من اسباط والاسباط من عمارات والعمارات من اجناس والاجناس من انواع والانواع من ضروب والضروب من اصرام وسلالات وعروق .

Lotir (F).

٢٢٠٧٦ - قِسَم ، عَصَا

To divide Into lots (E).

جزأ الملك الى عدة عقارات تهيئاً لبيته .

Division

٢٢٠٧٧ - قِسْمَة

Partage (F). Sharing (E).

٢٢٠٧٨ - قِسْمَة

عملية يقرر بها ملاكو اموال على الشيوع ازالة حالة المشاع وتخصيص حصص مميزة لكل مالك بنسبة ما كان يملكه في عموم الاموال المقتسوة || وهذه القسمة قد تكون وقتية او نهائية وودية او قضائية .

Cosmos

٢٢٠٧٩ - قُسُوس \* ، رُبْنَة

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات الشمامية . انواعها عديدة جميعها زراعية تريبية . اوراقها متعاقبة المربعة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والنج . تتميز بجهازها



قسطوة



قُس

٢٢٠٩٢ - قَشَّاب ٥ Toxifère, Toxicophore (F).  
Toxiferous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو سكة أو طائر  
ياكل مواد سامة فلا تؤذيها إنما تؤذي الإنسان إن أكل  
من لحمه.

٢٢٠٩٣ - قَشَار Pellicule, Tégument (F).  
Pellicle, Tegument (E).  
بشرة جلد الحية وسائر الزحافات التي تسلك مرة كل عام.

٢٢٠٩٤ - قَشَامَة ٥ Relief  
هي التواء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة.

٢٢٠٩٥ - قَشَب، نَكْسِين، ذَيْفَان Toxine (F).  
Toxin (E).  
كل مادة سامة، مها كانت عناصرها، تفترزها الميكروبات  
او البكتريات.

٢٢٠٩٦ - قَشَب Kerria (S). Kerrie, Corète (F).  
جنس نباتات برية وزراعية ترينين من فصيلة الورديات  
مهدها الشرق الاقصى. اوراقها متعاقبة، معنقة. ازهارها  
لاقياسية التجميع، كبيرة القد، جميلة الشكل || اشهر  
انواعها الترينية قشب اليابان.

٢٢٠٩٧ - قَشَب اليابان \* Kerria japonica (S).  
Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon,  
Corchorus (F). Jew's-mallow, Summer-rose (E).  
Japanscher Ranunkelstrauch (D). Kerria japonica (J).  
نوع من القشب وهو جنبة معمرة صغيرة القد تملو من ١٠٠  
الى ٢٠٠ سم. جلورها مدادة، فروها جالسة، متنبسة،  
سرسعة، لامة البشرة الخضراء. اوراقها متعاقبة، فصلها  
يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ وهو لامع البشرة، جميل  
الخضار الزاهي. ازهارها فردية التجميع، ذهبية اللون،  
تحورها فصل وريقة الشكل تستقيت اخضار || ازهاره  
يستم من نيسان الى ايار.

٢٢٠٩٨ - قَشْبَة \*، قَشْبَة Ashbia gossypii, Nemastopora coryli, Spermoph-  
thora gossypii, Eramothecium ashbyii (S). Stigma-  
tomycese (F).  
وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والارج واليوسفي  
والبنودة والفاصوليا والصوجه سبه فطر مجهرى من  
الغريات يدخل نسج الثمار على اثر ونز بعض الحشرات  
فيعطها ويعضها.

٢٢٠٩٩ - قَشَة Guenuche (F).  
Young she-monkey (E).  
هي النحية الصغيرة اي القردة الاثني الفتية.

٢٢١٠٠ - قَشَة \* Cynopithecus niger (S).  
Cynopithecus nègre, Singe à toupet (F).  
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات. مركزه  
بين المالاك والقرود. جسمه يطول نحو ٦٥ سم. ويرتفع  
٥٥ سم. ذنبه جدمة طولا ٢٢ سم. ثوبه الى السواد القاتم، شعرة  
قصير، ناعم، اجمد. وجهه جزوي اللون. راسه مكمل  
بشفقة متنبسة هدبية الشعر || قوته الثار والحبوب والجذور  
والحشرات. اثناء تقص جروا واحدا ترضعه نحو ٦ شهور.

٢٢١٠١ - قَشْدَة، قَشْطَة، كَشَا، قَلْسَة، كَدَاكَة Crème (F). Cream (E).  
مادة سنية في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - قُسُسُ جُؤُوي، اُصَالِيَا كُسْمُسُ  
Cosmos atrosanguineus (S). Cosmos rouge-brun,  
Dahlia zlmapani (F).  
عشبة ترينينية سرودية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. جلورها  
جني غليظ، ساقها متنبسة فراءه. اوراقها فردية التشرم.  
ازهارها عشكولية التجميع، تحورها الزهرية جؤوية الطباب.  
ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٢٠٨١ - قُسُسُ كَبْرِيّ Cosmos sulphureus (S). Cosmos jaune soufre (F).  
جملة ترينينية سرودية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.  
ساقها فراءه زباه. اوراقها سنانية التشرم مهدبة. ازهارها  
فردية متنبسة. تحورها الزهرية كبريية الطباب والسينات.  
ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.

٢٢٠٨٢ - قُسُسُ مُذَوَّج الرئش Cosmos bipinnatus (S). Cosmos bipenné (F).  
عشبة ترينينية سرودية حولية تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم.  
ساقها متنبسة فراءه ناعم. اوراقها مزدوجة التشرم الرشي.  
ازهارها فردية التجميع. تحورها الزهرية صفر الطباب،  
وردية اللسينات قفراها نحو ٦ سم. || ازهاره يستمر  
من تموز الى ايلول.

٢٢٠٨٣ - قَسِيل Lionceau (F). Young lion (E).  
ولد الاسد لم يبلغ الحول.

٢٢٠٨٤ - قَسُور \* Chasmanthère (F).  
جنس نباتات برية طيبة عارضة من فصيلة القمريات.  
انواعه عديدة اعطائها البلاد الاستوائية والحارة. سوقها  
متسلقة تطول من ٣ الى ٧ امتار. اوراقها معنقة، كفية،  
خالصة التخصيص. ازهارها عشوية سداسية التركيب.  
جلورها طيبة يستخلص منها بعد التجفيف والسحق مادة  
الكولين ومادة البر برين. واحدة قسورة.

٢٢٠٨٥ - قَسُورس Iris à l'ail (F).  
هو السون المنتر، اطليه.

٢٢٠٨٦ - قُسُوس هو شاي المروج، اطليه.

٢٢٠٨٧ - قَسُوس مُتَسَلِّق Lierre commun (F).  
هو الشقة المبذولة، اطليه.

٢٢٠٨٨ - قَسِيج Rétractile (F). Retractable (E).  
نمت تعريفي توصف به الاعضاء القابلة الانتشار  
والانقباض.

٢٢٠٨٩ - قَسِيمَة ضَامِمَة هي سند الحزن، اطليه.

٢٢٠٩٠ - قَشّ Paille (F). Straw (E).  
هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح تبناً بعد درسه.

٢٢٠٩١ - قَشّ السُّت Glui (F).  
Straw for thatching (E).

هو قصب السلت اليابس يستعمل كراباط. وقد يستعمل  
في تغطيت قناني الخمر وما اشبه لحفظها من المطب عند  
الصدم.



قور



قشب اليابان



قشبة



قشة






قَشَّة



قَشَّةٌ سَهْفِيَّة



قَشَّةٌ شَائِكَةٌ



قَشَّةٌ شَيْكِيَّة



قَشَّةٌ شَرِيمُولِيَا

وقشورها عديدة المنافع والقوائل الصحية || أنواعها الزراعية المأكولة الثَّار نحو ١٢ أشهرها ما يتبع :

#### ٢٢١١٦ - قَشَّةٌ سَهْفِيَّةٌ \* ، قَشَّةٌ سَكَاوُونَا

Anona squamosa (S). Attier, Anone écailluse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckeraffel (D). Anona scalliosa, Pomo cannella, Mela cannella (I).

نوع من القشَّة، تصنفيه يأتي بعد الشريموليا. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وقالباً وهي تملو نحو أربعة أمتار. أوراقها بيضبة النصل مستطيلة، أزهارها مفتحة اللون. ثمارها كأكواز الصنوبر، لبها أبيض المادة غزير العصارة السكرية. يزورها سود كبيرة.

#### ٢٢١١٧ - قَشَّةٌ شَائِكَةٌ \*

Anona muricata (S). Corossolier, Anone hérissée, Corossol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Sauresobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Casimenteria (I).

نوع من القشَّة، ثمرته متوسطة الحجم. أوراقها مستطيلة، ملساء، لامعة، شديدة الخضار، فواحه العرف. أزهارها قصيرة القد، غليظة الشكل. ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناشرة مرفوعة شائكة. أطول الثمرة فيراوح من ٢٥ إلى ٣٠ سم. وزنها من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ غرام. قشورها صميكة، ورائحة العرف، حامزة المذاق. لبها أبيض اللون، حلو العلم لا يخلو من الحموضة المشبعة.

#### ٢٢١١٨ - قَشَّةٌ شَيْكِيَّةٌ \*

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bua (I).

نوع من القشَّة، تصنفيه يأتي بعد السكاوونا. ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار. أوراقها مستطيلة زغبية الصفحة السفلى، أزهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها خيم، من الخضار. ثمارها كبيرة القد، قليلة الشكل. قشورها إلى الصغار الناري. لها جامد المادة، متوسط الصنف، أبيض اللون أو أحمر.

#### ٢٢١١٩ - قَشَّةٌ شَرِيمُولِيَا \*

Anona cherimola (S). Chérimoller, Chirimoyer (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimola (I).

نوع من القشَّة وهو أجودها صنفاً، ثمرته صغيرة القد تملو نحو حبة أمتار. أوراقها بيضبة فضاء، زبابة، جميلة الخضار. أزهارها محورية متدلية، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفحة العليا الداخلية، خضر السفلى الخارجية. ثمارها رداء اللون حجمها حجم البرتقال. لبها عاجي المادة، غزير العصارة، عذب المذاق، لذية العلم، فواح العرف المستحب.

#### ٢٢١٢٠ - قَشَّةٌ مُنْبِغِيَّةٌ \*

Anona palustris (S). Corossolier des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasserapfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشَّة يحدود في الاماكن الرطبة. ثماره صغيرة القد قليلة الشكل، عادية الصنف، غبراء الالباب الغزير العصارة الممتلئة الحلاوة.

نظراً لغتها السيئة. وهي دسمة، للذبة العلم، بيضاء اللون. ومنها تستخرج الزبدة بعد غصها.

Cavequi (F).

#### ٢٢١٢١ - قَشَّةٌ هِنْدِي

هي البرسام الهندي، أطلها.

Annonacées (F).

#### ٢٢١٢٢ - قَشَّةٌ يَات

هي القشطات فصيلة نباتية، اطلها.

Ebossage (F).

#### ٢٢١٢٣ - قَشَّر

هو تقشير الحبوب لاساً بالزور.

Ecorces (F). Barks (E).

#### ٢٢١٢٤ - قَشِير، حِخَاء، قِرْف، قِلْت

هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجذور والسوق والاغصان والاوتنان.

Lacté (F).

#### ٢٢١٢٥ - قَشِير

جنس اسماك نهري تدعى لاطس.

Cascarille (F).

#### ٢٢١٢٦ - قَشِير عَشِير

هو الكركون العنبري، اطله.

Ailes de sauterelles (F).

#### ٢٢١٢٧ - قَشِيرَان

Wings of the locust (E). جناح الجراد الرقراق كالنفاش الشفاف.

Pellicule (F). Pellicle (E).

#### ٢٢١٢٨ - قَشِيرَة

غشاء الشيء، حلقه أو عرساً. ج قشر وقشور.

Cortical

#### ٢٢١٢٩ - قَشِيرِي

نمت تمرني يطلق على كل ما له صلة بالقشور أو يشبهها.

Crustacea (S).

#### ٢٢١٣٠ - قَشِيرَات

Crustacés (F). Crustacea (E). صف حيوانات مفصليّة مائية عديدة الرتب والفصائل والجناس، التي تنتم إلى طائفتين: حشريات الصدف ولبينات الصدف.

#### ٢٢١٣١ - قَشِيرَات دُنْيَا

Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشريات الصدف».

#### ٢٢١٣٢ - قَشِيرَات عَلِيَا

Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E). طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «لبينات الصدف».

Crème (F). Cream (E).

#### ٢٢١٣٣ - قَشَّة

هي القشدة، المادة السنية في الحليب.

Anona (S).

#### ٢٢١٣٤ - قَشَّة \* ، قَشَّة

Annone, Anone (F). جنس نباتات بوية زراعية من فصيلة القشطات. أنواعها نحو ٥٠ هـ جميعها أجار وشجيرات وجنات. أوراقها متعاقبة، مفتحة، بيضبة أو اهليلجية. نصلها جامد الصنعة، بارز العروق. أزهارها فردية محورية أو جامعية ناجية. ثمارها كوزية لحمية || معظم أنواعها البرية طمي. أوراقها

تركب جلود وسوق النجيليات اغصانها الشعر والشوفان والذئبن والذرة .

## ٢٢١٢١ - قَشَطِيَّاتٌ ، قَشَدِيَّاتٌ

Anonaceae (S). Annonacées, Anonacées (F).  
Anonaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقطين عديدة الفلوات . اجناسها المعروفة ٩٠ نوعها نحو ٣٢٠ . اعطائها البلاد الحارة . منها الاجنار والشعيرات والجنبات . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة . ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خبيرة ، بزورها دهنية .



قشام ارش

## ٢٢١٢٢ - قَشَبَانٌ اَرْبَعِيّ

*Dascillus pubescens* (S). *Dascille pubescent* (F).  
*Dascillus pubescens* (E).

حشرة واشية خاضعة من فصيلة القشباتيات ورقة مغمدات الاجنحة . تآلف المواعق القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصوانيات . يرقاتها تركب جلود النباتات التي تنمو في الاراضي الرطبة || جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . ثوبها الى الريدة الخطفية المواج . رأسها صغير الحجم . فكها ضليمان . عينها صغيرتان زباناها غيطيان ، مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللامع ، بين التخذيد الغندي القاطب . ارساغها خاسية المعق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تصافد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكان تحت الجملانة والعلل وبين اشطاء العشاب الحولية || البرقة عند بلوغها الادراك الجسوري تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مردي الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغبر اللون اصفر المواج ، اسمر الرأس ، ضليع التأثير الفكية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة او تحت ارومات النباتات الشبية .

## ٢٢١٢٣ - قَشَطَامٌ ، قَشَبَانٌ

Gyps جنس طير من الكواسر وفصيلة النسيات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤوسها مستطيلة غفيرة ، محاسرها ضلع . عينها سود المقل ، صفر الاسحاق . مناسرها قصيرة ، غليظة ، منمقة الهر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سواقها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة || والقشام شرس الاخلاق قوي الشكبة جسور يسطو على جميع انواع النور التي تنابه وتغشاه . طيرانه معتدل الشوط يفوق سرعته سرعة جميع النور لكنه لا يجاري العقبان . يآلف الحياة الجابية ، سره يمد من ١٠ الى ٥٠ قوته الجيف . مأواه الجبال النائية .



قشام اكلف

## ٢٢١٢٤ - قَشَطَامٌ اَرْبَعِيّ ، قَشَبَانٌ

*Gyps rupellii* (S). *Gyps de Ruppell, Vautour-épervier* (F).

طائر من القشام طول نحو ١٥٠ سم . يسلمته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى السمرة الزاهية . عنقه اصهب ، طوق جوثوبه طويل الزغب اغبر اللون ، ظهوره وبطنه وباطن سقلطه ونمطه الى السمرة . ظاهر سقلطه الى الرقعة الموشة يعلوها تجذيع ابيض مترص || موطنه البلاد الافريقية . يندن وكرو في اوتاب الصخور الفسيحة . الانثى تبيض رقة واحدة تخضها بمنواة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يعد من ٤٠ الى ٥٠ .

## ٢٢١٢٥ - قَشَبَانِيَّاتٌ

*Dascillidae* (S). *Dascillidés* (F). *Dascillidae* (E). فصيلة حشرات من غمديات الاجنح اجناسها وانواعها عديدة جميعها ست عوارات . اعطائها العالم جميعا تاربة خاضعة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

## ٢٢١٢٦ - قَشَبَانٌ

*Concombre serpent* (F). *قَشَبَانٌ* هو القشاه ، اعطيه .

## ٢٢١٢٧ - قَشَطَامٌ اَكْلَتٌ ، حَقَقٌ

*Gyps fulvus* (S). *Gyps fauve, Vautour fauve, Griffon* (F). *Griffon-vulture* (E).

طائر من القشام طول نحو ١٢٠ سم . يسلمته ٢٧٠ سم . ثوبه الى الكلفة الغبراء زرهو في الظهر وتبعق في البطن . سقلطه راقل كبير تعرضه خطوط بيض || اعطانه فسيحة الارباب تمتد من اشد الى الروبة وافريقية الشمالية والشرقية || يندن وكرو في سدوع الصخور الشائعة الموشة . الانثى تبيض رقة واحدة تخضها بمنواة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يعد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطع .



قشام هندي

## ٢٢١٢٨ - قَشَطَامٌ هِنْدِيّ ، هَرَّزَبٌ

*Gyps indicus* (S). *Gyps des Indes* (F).

طائر من القشام طول نحو ١١٠ سم . يسلمته نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرة القائمة . عنقه اصهب . سقلطه مجذمان بالحطبي ويعطوها غط ابيض مترص . ذنبه مجذع بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رقة واحدة . سره يعد نحو ٢٠ .



قشبان

## ٢٢١٢٩ - قَشَقُوشٌ ، حَسَّاسُ الْمُتَوَسِّطِ ، هِفَّةُ الْمُتَوَسِّطِ ، تَرِيكٌ

*Atherina hepsetus* (S). *Athérine de la Méditerranée, Saulet* (F). *Silviride, Sand smelt* (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الحسانيات شاكاتكا الزعانف اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتبر من اسماك التفاف . مسرحتها الجتاح والشطوط || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشبهة يعلوها في جانبيها تمشيش ازرق مواج فقي يسر في الظهر ويبر ويبيض في البطن || رأسها معتدل الحجم ، يرسمي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحظتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

## ٢٢١٣٠ - قَشَلْبٌ

*Cladanthus* (S). *Cladantha* (F). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . سوقها فرعاء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . قرونها متعاقبة فوقة . اوراقها مفردة ضيقة التصل على فصعته . ازهارها رؤسية ، عطرية العرف ، صفر الطياب واللبينات الثنائية الصف || اشهر انواعه قشلب الجزيرة .

## ٢٢١٣١ - قَشَبَانٌ

*Dascillus* (S). *Dascille* (F). جنس حشرات من فصيلة القشباتيات انواعه ١٢ اجسامها اهليلجية الشكل مفلطحة ، قرونها الاستشمارية خيطية ، مسنة ، مركبة من ١١ فاصلة . سدافرها ضيقة . بطونها خمسية الاقسام . انوثها سوية الالوان يكثر فيها الاسمر الرادي . اعادها مخددة خلية || خنافسها ورققات



قشقوش

## ٢٢١٣٢ - قَشْبُ الجَزِيرَةِ ، أَفْحُونُ الجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, Anthemis arabica, A. prolifera (S). Cladanthus d'Arable (F).

نوع من القشيب الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتقايلة الفرقة . اوراقه لسنة التفريضة . خلية النصل . ازهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٢٢١٣٣ - قَشْمُ

Lit d'un ruisseau (F). Brook bed, Stream bed (E).

القشم مجرى النهر ومنهم من قال مسيله .

## ٢٢١٣٤ - قَشْنِيْزَةُ

Chicorée endive (F).

واحدة القشيز ، بقلة مشهورة تعرف بالهندب ، اطليه .

## ٢٢١٣٥ - قَشْوَةُ

هي القنوة ، اطلبها .

## ٢٢١٣٦ - قَشِيعُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القشيع ج ثُثُ هي البقول الناشفة . القشيع منها كالبايما او الهبي كالفلو والعنيس والحمص والفاصوليا .

## ٢٢١٣٧ - قَصْ ، قَصَصُ

Sternum هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القفص الجوشي .

## ٢٢١٣٨ - قَصَابَةُ

Boucherie (F).

هي سمنة القصاب اي الجزار . Butcher's shop (E).

## ٢٢١٣٩ - قَصَابَةُ

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الحليقات الملازمة لخلات اقبائها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية المادة او رملية او غشائية .

## ٢٢١٤٠ - قِصَارُ الْأَعْمَادِ

Brachélytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من غديات الجناح اغداها تلحف جزءا من بطونها فقط .

## ٢٢١٤١ - قِصَارُ الْأَلْسِنَةِ

Brévilingues (F).

Brevilingual (E).

رتيبة من المفاتيح اجناسها وانواعها عديدة تجتمع الى فصليتين السقنوريات والصغريات . دويباتها تتميز بقصر السنبا وصغر قوائمها وقرب شهبها من الحيات .

## ٢٢١٤٢ - قِصَارُ الدَّلِيلِ

Brachyours (F).

Brachyurous (E).

رتيبة من القشريات المشاريات الارجل ، اشهر اجناسها السرطان .

## ٢٢١٤٣ - قِصَارُ السَّرَاقِطِ

Brachyptères (F).

Brachyptera (E).

رتيبة من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيجمع طيورها مائية قوتها الاسماك . اشهرها البطريق والطرسوع والنفاس والنفاس ...

## ٢٢١٤٤ - قِصَارُ الْقُرُونِ

Brachycères (F).

اطلب قصيرات القرون .

## ٢٢١٤٥ - قُصَاصُ ، قُصَاصُ

هو القصة الشجرة ، اطلبها . الواحدة قصاصة وهو نبات معثري تجرسه النحل فيقال لسلها عسل قصاص .

## ٢٢١٤٦ - قُصَاعَةُ

Epinastie (F). Epinasty (E).

حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباطني منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقمرة الصفعة العليا المحدودة السفل .

## ٢٢١٤٧ - قُصَاعَةُ

Coniocybe (S).

جلس فلور مجهرية من الرطوبات وفصيلة الحشاريات . يتميز بنكهته القلنسوية التي تملو اوسها . تكاته مستطيلة يوضعها قرصي الشكل ثنائي الخلية . تكاته غطيلة مفصيلة تشابع التكاث || له نوع واحد مؤدى يعض قصاصة الكرمه .

## ٢٢١٤٨ - قُصَاعَةُ الْكُرْمَةِ

Coniocybe pallida, Pilacre pallida, Rosleria hypogaea, Coniocybe nivea (S).

فطر مجهرى يصيب جذور الكرمه وقد يصيب عرضاً وفي ظروف بيئية خاصة جذور الاجناس والفاصوليا والذرايق والخبوخ والورد والقشيب والملث || مظهره الخارجي على الكرمه في اضعائها الهوائية ، وهو في الجذور عفن خفي في النمو وتجمع في الاوراق . وهو في الجذور عفن خفي ناشف اصهب اللون يلحف الجراة فيسبب تمزيقها وتفجير طربوها المكاثية || لم يكاثج حتى الآن لان قوته وانتشاره منوطان بعدة عوامل بيئية منها الرطوبة الموسمية ، وعدم التهوية ، وترتيم التربة وقصاصها .. لذلك فالاعمال الحثرية والعناية بالترية هي انجع علاج له .

## ٢٢١٤٩ - قُصَايَةُ

Aphélie (F). Aphelion (E).

القصاية البعد الاقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الاضوية تكون في قصايتها في اول شهر تموز من كل عام .

## ٢٢١٥٠ - قَصْبُ ، تَرْبِيعُ ، تَحْتُ

Equarrissage (F). Squaring (E).

هو قطع الشيء وتقريبه وترتيبه كالحجارة وجذور الاشجار الخ .

## ٢٢١٥١ - قَصْبُ \* ، بُوْصُ

Arundo phragmites (S). Roseau, R. commun, R. à balais (F). Common reed, Ditch reed (E). Deckrohr, Teichrohr (D). Canna, C. a spazzola, Spazzole (I).

ويسمى غاب وقصب المكاس . نبات كمبروري من فصيلة النجيليات ، ساقه قصيبة ، جامدة ، متناوبة السلاخات الجوفاء . اوراقه عصفية كبيرة القد مفصلة متناوية . ازهاره مجموعة عقائيد عالية ترتكز على سراج واحد .

يكثر في المنافع وعلى ضفاف الماء . يستعمل للحواجز وفي صناعات السلال والمكاس .

## ٢٢١٥٢ - قَصَبُ الدَّرِيْرَةِ

هو عود الوج ، اطلبه .

## ٢٢١٥٣ - قَصَبُ الرِّمَالِ \*

Arundo arenaria (S).

Arunde, Goubet (F). Cane, Reed grass (E). Pfahbrohr, Rohr (D). Cannuccia marina (I).

نبات كمبروري قصبي من فصيلة النجيليات . اعطاله البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر ويؤوده في الرمال الرطبة وفي المنافع . سوف تستعمل في عدة صناعات زراعية اغصنها البواوير .



قَصَاةُ الْكُرْمَةِ



قَصْبُ



قَصْبُ الرِّمَالِ

## ٢٢١٥٤ - قَصَبَ الرَّمْلِ \* ، غَرْجَار

Calamagrostis (S). Calamagrostide (F). Small reed, Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgrass (D). Calamagrostis (I).

جنس نباتات كمبودية قصبة من فصيلة النجيليات. أنواعه نحو ٨٠. أصلها البلاد الحارة والمتندلة. ترفع في الأراضي الرملية ولا تنحش المناطق البحرية. بعضها يستعمل في تثبيت رمال الكثبان القاحلة لأنه لا ينحش العشب.



قصب الرمل

## ٢٢١٥٥ - قَصَبَ السُّكَّرِ \* ، مَصَّان ، بَرْسُوم

Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Cannamelle (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D). Canna da zucchero, Cannamelle (I).

نبات زراعي من فصيلة النجيليات مهدد بالانقراض في بعض البلدان. كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل عصارته في صناعة السكر. أما الآن فالصالحه لزراعته فهي مهددة والتي لا ينمغنض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠° سغ. ساقه منتصبه معقولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. سلامياتها تطول من ١٠ الى ٣٠ سم. وقطرها يراوح من ٣ الى ٨ سم. ألوانها الخارجية خشية التركيب جامدة تغلفها مادة شمعية يفياء اللون. أما الألياف الداخلية فأسننية النسيج غزيرة العصارة السكرية. أوراقه متعاقبة، عسقية الشكل، حاشية. تصلها بطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وهو جامد الصفحة مسن الحافة. أزهاره عنقودي التجميع، هامي الارتكاز. أزهاره صغيرة الحجم، فضية اللون، ثنائية، متعاقبة، كثيفة الأزغب المستطيل || ثماره برّ نجيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة أشهرها وأهمها ما يلي :

قصب أزرق ، قصب حمايك

Canne bleue, C. jamaïque (F).

ضرب سبروني قوي المناعة يتحمل العطش وهو متوسط

القد والإنتاج السكري .

قصب أسود

Canne noire (F).

ساقه صلبة جذوية اللون سمر المواج متوسطه المصارة

السكرية . تكثر زراعتها في ملقا وجزيرة موريس .

قصب أصفر ، قصب صيني

Canne chinoise, C. de Penang (F).

متوسط القد ، أصفر اللون ، أخضر المواج ، كثيف

المادة الشمعية غزير العصارة السكرية تكثر زراعتها في

الصين وفورموزا وجزر البنجاب .

قصب الصين

Canne de Chine (F).

صغير القد ، حنطي اللون ، أصفر المواج متوسط المصارة

السكرية لكنه سبروني وقوي المناعة ضد الأمراض الفطرية .

تكثر زراعتها في الصين والهند والهند الصينية .

قصب الكوكوشين

Canne de Cochinchine (F).

ساقه غليظة خضراء اللون متوسطه المصارة السكرية .

قصب الهند

Canne guinghan (F).

كبير القد يطول نحو ٤ أمتار . يملك التربة ويستزف

عناصرها الغذائية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء

اللون مجتمعة بالبنفسجي .

قصب بتافيا

Canne de Batavia (F).

أصرامه عديدة سيقانها كبيرة القصد ، مجتمعة بالألوان

الدايقة والفاحة ، غزيرة المصارة السكرية .

## قصب بوربون ، قصب أوتايتي

Canne de Bourbon, C. d'Otaïti (F).

ساقه كبيرة مستطيلة خضراء اللون غزيرة العصارة السكرية .

والقصب يجود في جميع الأتربة المروية الغنية بالمواد العضوية

والعناصر الغذائية شرط أن لا تنفتقر إلى الكلس وأن لا

تكون كثيرة الانساج || أما كمية السكر الممكن

استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ إلى ١٥ ٪ من وزن العود .

## ٢٢١٥٦ - قَصَبَ النِّيل

Roseau canne (F).

هو القصب الروبي ، أطله .

## ٢٢١٥٧ - قَصَبَ بَلَكْدِي

Canne de Provence (F).

هو القصب الروبي ، أطله .

## ٢٢١٥٨ - قَصَبَ دَرَاكُو

Jonc de l'Inde (F).

هو أسل الهند ، أطله .

## ٢٢١٥٩ - قَصَبَ ذَهَبِي

Lysimaque commune (F).

هو السراجية ، أطله .

## ٢٢١٦٠ - قَصَبَ رُؤْمِي \* ، قَصَبَ بَلَكْدِي ، قَصَبَ النِّيل

Arundo donax (S).

Canne, Canne de Provence, Roseau canne (F). Giant reed-cane (E). Ehtespfahrohr Grosses-schiff (D).

Canna comune, Canna di giardino (I).

نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وجوده في المناطق

المتندلة وإحارة وفي الأماكن الرطبة أخضها خضاف الأنهر

حيث يفلط ويوجد تماماً || يستعمل كسائر أنواع القصب.

## ٢٢١٦١ - قَصَبَ قَارِسِي ، بُوْض قَارِسِي

Arundo islaca (S). Canne de Perse (F). Persian cane (E). Persianische Pfahlrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القد . يكثر في المناطق وعلى

خضاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف

الصناعات القصية .

## ٢٢١٦٢ - قَصَبَ مَرِّ

هو السمروبا ، أطله .

## ٢٢١٦٣ - قَصَبَات

Bronches (F). Bronchia (E).

هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي توين الاتصال

بين الحويصلات الرئوية والرغامي فتفسح المجال للدخول

الهواء وغروجه .

## ٢٢١٦٤ - قَصَبَة

Bronche (F). Bronchi (E).

اسم تعريبي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي

الذي يوصل الرغامي أي قصبه الرئة بالحويصلات الرئوية .

## ٢٢١٦٥ - قَصَبَة

Paspale (F).

هي أبو بيض ، أطله .

## ٢٢١٦٦ - قَصَبَة

Roseau (F). Reed (E).

وأسدة القصب .

## ٢٢١٦٧ - قَصَبَة ، قَلَم

Chaume (F). Thatch (E).

ساق النجيليات كالحنطة والشعير والشوفان والدرة وغيرها .

وهي مجوفة مركبة من عدة سلاميات وعقد ينشأ عليها المصنف

أي الورق .

## ٢٢١٦٨ - قَصَبَة الْأَنْفِ

Chanfrein (F).

Forehead (E).

جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينيها إلى منخرها .



قصب السكر



قصب روبي

٦٠ سم. أوراقه اهليلجية قلبية القاعدة نصلها خشن  
الملس أزغب البشرة. أزهاره وردية اللون زرق المواج.  
ثمارة ثاقحية الشكل حقية التركيب.

Frangible (F). **قَصِف** ٢٢١٨١

Frangible, Breakable (E).

نمت تعريفي يطلق عل ما كان سهل الانكسار أو  
الانخلع.

٢٢١٨٢ **قَصَف** هو اليا ، اطلبها .

Brize (F).

٢٢١٨٣ **قَصَفَة** هي البريزه ، اطلبها .

Conceptacle (F). **قَصَمَة** ٢٢١٨٤  
حق يحضن اعضاء التناسل في بعض اجناس الفطور .

ج قصم .

Ostéoclaste (F). **قَصِيل** ٢٢١٨٥  
Osteoclasty (E).

وعن يصيب العظم في الحيوانات اخضعها الحربة فتهش ويسهل  
انضاعها وكسرها .

Cirsium (S). **قُصَوَان** \* ٢٢١٨٦

Circe (F). Horse-thistle (E).

جنس نباتات شائكة ميلولة برية من فصيلة المركبات .  
انواعه عديدة منها الخولية والمحولة والمعمرة . سوقها اسطوانية  
تعمل من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة شائكة .  
رؤوساتها كبيرة القد . أزهارها انبوية . قباياها مهدبة  
الاطراف . بزورها مغلفة مستطيلة || اعرف انواعه  
واشهرها ما يتبع :

Cirsium afrum (S).

Circe d'Afrique (F).

**قُصَوَان الحقل** (F). C. arvense (S). Circe des champs (F).

**قُصَوَان المَنَاح** (F). C. oleraceum (S). Circe potager (F).

**قُصَوَان سنائي** (F). C. lanceolatus (S). Circe lanceolé (F).

**قُصَوَان شَكس** (F). C. ferox (S). Circe féroce (F).

**قُصَوَان كبير الشوك** (F). C. spinosissimum (S).

**قُصَوَان كثير الشوك** (F). Circe très épineux (F).

**قُصَوَان لُبْنَانِي** (F). C. libanoticum (S). Circe du Liban (F).

**قُصَوَان مصوف** (F). C. eriophorum (S). Circe laineux (F).

٢٢١٨٧ **قُصَوَان الحَيَال** هو الملاح ، اطلبه .

٢٢١٨٨ **قُصُوص** ٥

Textor (S).

Alecto (F). Textor (E).

جنس طير من فصيلة التوتويات . انواعه المعروفة قليلة

العدد موطنها بعض مناطق افريقية البسل والجنوبية .

تألف المراعي والاحراج البعيرة الانجار . لحمها الحياتي

جاعي افواجاها قليلة البدن || اجسامها متوسطة القد تعول

من ٢٢ الى ٢٦ سم. مناقبها كبيرة مخروطية الشكل .

اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلفة الاطراف أو مستديرة ||

قوتها الحشرات والديدان وبعض البذور البرية || اعرف

انواعه واشهرها قصوص احمر المشقاد .

٢٢١٨٩ **قُصُوصُ أَحْمَرِ الْبَيْقَادِ** ٥

Textor erythrorhynchus (S).

Alecto à bec rouge (F).

طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

٢٢١٩٠ **قَصَبَةُ الرِّثَةِ ، وَخَامِي**

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).

النفس في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشعبي القصبة .  
وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخلاً او خارجاً .

Tubiform (F).

Tubiform, Tubular (E).

ما كان شكله كالقصبة او الانبوب .

٢٢١٩١ **قَصَبِيَّات** (F). Tracheates (E).

هي المفصليات التي تتحلل بجهاز تنفسي انبوبي يقابله جهاز  
تنفسي شعبي .

Petite centauree (F).

٢٢١٩٢ **قَصَة الحَيَة** هي مرارة الحفش ، اطلبها .

Ronce (F).

٢٢١٩٣ **قَصَد** القصد الموج . وقصد الموج فروعه الثابتة .

٢٢١٩٤ **قَصْدِير** (F). Etain (F). Tin (E).

معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر  
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق المواج .

يصهر في ٢٢٨° سغ ويغل في ١٢٠٠° سغ. رمزه (Sn-).

وزنه الذاتي ١١٨,٧ ثقله الذوي ٧,٢٩ اوصاليته

الكهربائية في ٢١° سغ. تبلغ في ١١,٤٥ || وهو اطرى

من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر

بالخامس النباتية والعضرات العضوية || يوجد في الطبيعة

عل هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassiterite .

Oxyde d'étain .

٢٢١٩٥ **قَصِيرَة ، دَسِج** (F). Base du cou (F).

قاعدة العنق أو ممرز العنق في الكاهل .

Gemmule (F).

٢٢١٩٦ **قَصْرَة** هي الباردة ، اطلبها .

Cerastes cornutus (S).

٢٢١٩٧ **قُصْرَى** القصرى والقصرى نوع من القرزاء صغيرة القد خيشة

تنس في الرمال .

٢٢١٩٨ **قَصَبَةُ الْمَاءِ ، سَرَّةُ الْبَحْرِ ، هَيْدْرُوكَيْتِل**

Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).

Marsh pennywort, Sheep's-bane, White-rot (E).

Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella

d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الخبياتية تكثر

في المناطق وفي المواق المستنعية الرطاب . انواعها عديدة.

سوقها مدادة . أوراقها ثنائية الالتشاب ، مستطيلة الزناد،

دقيقة النصل المستدير العادم الانقسام . أزهارها صغيرة

خامسة البتلات .

٢٢١٩٩ **قُصْل ، قُصْلُ** (F). Scorpion

هو القرب . وقيل ولدا .

٢٢١٩٠ **قَصِين** \* (F). Salvia pommifera (S).

Sauge pommifère (F). Sage apple (E). Salbeiäpfel (D).

Salvia baccifera, S. Spilea (I).

نوع من القوية . يقال ان منافعه الصحية عديدة . يكثر

في الاراضي البرية المصحاة . ساقه فروعاً تعمل من ٣٠ الى



قصة الماء



قصبين



قُصَوَان

٢٢٢٠١ - قُصْبُص نبت ينبت في اصول الكماء (أ. م).

٢٢٢٠٢ - قُصْبَصَة Pygidium  
هي آخر مفصل بطني من جسم الحشرة .

٢٢٢٠٣ - قُصْبِيع ، لُقْبِيس ، مِثْخَار Tardif (F).  
Tardy, Late (E).  
هو ما كان بطيء النمو او ما طال زمن نموه ان في الحيوان  
ام في النبات . م. قصيبة .

٢٢٢٠٤ - قُصْبِيع ٥ Epinaste (F).  
نمت تعريفني يطلق على كل نبات او جزء منه اصابت به  
القصاصعة .

٢٢٢٠٥ - قُصْبِيعَة \* Biscutella (S).  
Biscutelle (F). Biscutella (E).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السليبيات . انواعها  
المعروفة قليلة العدد . منها ما ينبت في بعض مناطق حوض البحر  
الايبيس المتوسط || بعضها فراء منتصب . اوراقها متعاقبة .  
متصالها لمعقبة ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة  
الخيار . ازهارها طرفي . ازهارها صفراء اللون . ثمارها  
قصيمية الشكل .  
اعرف انواعها واشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيعَة العمود ، قُصْبِيعَة جَبَل طَارِق Biscutella columnae (S).  
Biscutelle de Gibraltar (F).  
اوراقها الجذعية لمعقبة الشكل ، مستطيلة النصال ،  
متعاقبة التسنين . اما الساقية والفرعية فرمحية الشكل  
متقاربة الاسنان . تنويرها ربيبي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيعَة حَقِيقَة Biscutella genuina (S). Biscutelle vraie (F).  
منبتها بعض المناطق الجافة في لبنان وسوريه . اوراقها  
الجذعية متراكبة ، اما الساقية والفرعية فقليلة العدد  
متعاقبة التسنين . تنويرها ربيبي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيعَة مُسَنَّنة Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F).  
منبتها بعض المناطق اللبنانية . تتميز بكثرة عدد اوراقها  
الساقية والفرعية ويكثر استنابها الحادة الشائكة . تنويرها  
ربيبي .

٢٢٢٠٩ - قُصْبِيعَة ٥ Patella (S).  
Patelle (F). Patella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل  
اماميات الخياشيم المحففة وفضيلة القصيمات . انواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على  
الصخور المنورة || اصداقها جلونية او مساجية او  
مظلية او اهليلجية . جميعها وسيدة المصاريع ، مالة  
الفتاش الداعل التلوي الماددة ، مخددة الفتاش الخارجي  
المتباين الالوان ، مسننة الخيار || اجسامها متباينة  
الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم . اردتها رمية  
فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية اللواس الميونة القواعد  
الخارجية . خياشيمها مجموعات متساوية الترتيب تطلق  
الجسم تحت الرءاء || جميع انواعها مأكولة مستحبة العلم .

الشرقية . يالفت المراعي وفضات مجاري الماء حيث تكثر  
تطعان البقر الرعشي والظباء . ملجئة الحيواني جماعي ،  
فويجه يد من ١٠ الى ٣٠ زوجا || جسمه متدلل القد  
يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد الفحمي . قوادم  
جناحه بيض الحامض الخارجية . متفاد مرجاني اللون .  
حدقة عينه كستنية . رساء الى السرعة الحنطية || قوته  
الخشرات والديدان والبلود ويلتقط القراد والطلع من على  
ظهور الظباء والابقار || يدثن عشه في السط المشواك .  
عشه غارق الرخابة والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله  
كالصاج يملوه طوق يرتفع نحو ١٥ سم . الاثنى تضع من  
٥ الى ٧ بيضات تحضنها متباوية الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢١٩٠ - قُصُوع ، إِذْبَاس Levée (F).  
Gathering (E).  
خروج الزرع من الارض او ظهور وادر البزور على  
سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيب \* Phragmites (S).  
Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).  
نبات جذموري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه  
قصيبة ، متتابة السلاحيات والكماير ، تطول نحو ٣  
امتار . اوراقه غمدية ، حاشية ، عصفية النصل الجامد ،  
المسنن الحافة ، البحري اللون || ازهاره عالمي الارتكاز ،  
يشكل مجموعة من السنايل المتتابة . ازهاره بنفسجية اللون ||  
منبتة جميع الاصقاع المتعددة الحرارة من العالم القديم .  
يكثر وجوده في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء ||  
ويدعى في مصر والسودان « الحنطة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيب Tube  
هي في بعض النباتات انبوبة الزهرة التي ترتكز عليها  
البتلات . ج. قصاب .

٢٢١٩٣ - قُصْبِيب الجَذْع Brévicaque (F).  
Brevicaque (E).

٢٢١٩٤ - قُصْبِيب الجِنَاح Brévipenne (F).  
Brevipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصْبِيب الرُسْع Court-jointé (F).  
Short-patterned (E).  
من كان رسنه دون المدلل الوسط وهو من عيوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصْبِيب العُمُر Brachybiote (F).  
نمت تعريفني يطلق على كل حيوان قصير العمر من اي  
جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصْبِيب القَدَم Brépède (F).  
Brevipède (E).

٢٢١٩٨ - قُصْبِيب المِنَقَار Brévirostre (F).  
Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصْبِيبَات القُرُون Brachycera (S).  
Brachycères (F). Brachycera (E).  
لثة خشرات من ذوات الجناحين فصائلها واجناسها وانواعها  
نحو ٢٥٠٠٠ اعطتها جميع اصقاع العالم || اشهر  
فصائلها : اللبابيات والبريات والعنبريات والبريات  
والهبيات .

٢٢٢٠٠ - قُصْبِيبَة القَلَم Brachystylée (F).  
نمت تعريفني يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيب



قُصْبِيبَة



قُصْبِيبَة



قُصَب أَحْمَرُ اللَّحْدَاءِ

٢٢٢١٧ - **قُصَب لَبْنَانِي** (S). *Vinca libanotica* (S).  
**Pervenche libanaise** (F). *Lebanon Periwinkle* (E).  
 نوع من القُصَب. عشية طيبة معمرة. منبهاً يمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجاذرة. أوراقها متعاقبة، حاشنة، مستطيلة الأضلاع، نصلها شبه قلبية الشكل، جملة الخضار، جرداء البشرة. أزهارها محورية الإزهار، منعقة، خماسية البتلات، زرقاء اللون، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || أرواقها الخضراء والجلقة لا تخلو من المنافع الطبية أعصمها في السيلان وانقطاع الطمث. وقد تحوي بعض الفيتامينات الكثيرة النفع.

٢٢٢١٨ - **قُصَب مُسَطَّح** (S). *Vinca herbacea* (S).  
**Pervenche herbacée** (F).  
 عشية برية معمرة تلبّل وتذوي في الشتاء. ساقها مسطحة تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أرواقها أحليجية مهدبة الختار. أزهارها إلى الزرقاء البنفسجية || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.



قُصَب صَغِير

٢٢٢١٩ - **قُصَب وَرْدِي** (S). *Vinca rosea* (S).  
**Pervenche rose, P. de Madagascar** (F).  
 نوع من القُصَب العمر وقد يُزرع كحولي في البلاد المعتدلة الحارة. ساقه مستقيمة ليفية تطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها أحليجية مقبولة القاعدة. أزهارها متوسطة القد، وردية اللون || أزهارها يستمر من الربيع إلى الخريف.

٢٢٢٢٠ - **قُصَبَة** (F). *Vollis* (F). **Lop and top** (E).  
 الاغصان والأفئدة المفصولة عن الشجرة.

٢٢٢٢١ - **قُصَاعَة \*، تَلَبّ الماء، قُنُس** (S). *Lutra* (S). **Loutre** (F). **Otter** (E).  
 جنس حيوانات لبونة من السعوييات ورتبة الأوسم. أنواعه ثمانية موطنها ضفاف وجرف بعض الأنهار الآسيوية والأوروبية والأمريكية. جميعها قازية. قوتها الأسماك. أجسامها مستطيلة، رؤوسها عريضة، قوائمها قصيرة، حظ أصابعها تمينا على الباسا. أذنانها طويلة. ألوانها كهيئة الوبر القصير. ألوانها إلى الجؤرة موانجة يختلف باختلاف الأنواع.



قُصَب كَبِير

٢٢٢٢٢ - **قُصَاعَة، هَيْج** (F). *Etiolation* (F).  
**Etiolation, Sickness** (E).  
 اصفرار النبات وتحوله من جراء فقدان الخضيب سببه الظل أو الطمر أي قلة النور أو انعدامه.

٢٢٢٢٣ - **قُصَام** (F). *Judiciaire* (F). **Judiciary** (E).  
 ثبت من الحمض وقيل هو الطحاش.

٢٢٢٢٤ - **قُصَانِي** (F). *Luzerne* (F).  
 كل ما هو مختص بالقضاء.

٢٢٢٢٥ - **قُصَب** (F). *Recéper* (F).  
 هو القصة. اطلبها.

٢٢٢٢٦ - **قُصَب** (F). *To cut down close* (E).  
 قُصَب الكرّم. قطع اغصانه أيام الربيع.

٢٢٢٢٧ - **قُصَبَة \*** (S). *Dendrochélidon* (S).  
**Dendrochélidon** (F).  
 جنس طير من الجواثم مشروب الماء المتأخر وقصيلة البانيات. أنواعه المعروفة خمسة. أعطانها تمتد من الهند إلى جزر

٢٢٢١٠ - **قُصَبِيَّات \*** (S). *Patellidæ* (S).  
**Patellidés** (F). *Patellidæ* (E).  
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الأبرجل أمابيات الخياشيم الحلقية. أجسامها قليلة العدد أما أنوعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المغسورة قرب الشواطئ || أعرف أجسامها وأشهرها القصبيّة والشكلية.

٢٢٢١١ - **قُصِيل** (S).  
 زرع الشمر يحرق أخضر لعلّ الدواب.

٢٢٢١٢ - **قُص \*، قُصَص، قُصَة** (F). *Gravier pour béton* (F). *Gravel of concrete* (E).  
 حصى صغيرة القد متساوية الحجم حادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - **قُصَب أَحْمَرُ الْمُتَقَادَة \*** (S). *Xiphorhynchus procureus* (S).  
**Falcirostre à bec en sabre** (F).  
 طائر من فصيلة الطيوريات. موطنه

بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأغصها الغويان. يألف الأراجيح الجبلية حيث يكثر الرق والوقل || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه المنقاد الذي يبلغ ٧ سم. يتميز بمنقاده المستطيل الأحمر كالحسام العربي وبذيله المستطيل السدير الطرف. ثوبه متداخل الألوان. رفاقه ويطنه إلى السمرة الزيتية الموحج. زوره أبيض. رأسه وصفه وصدره إلى البياض الأصفر يعطو تشريح مستطيل احمر. جناحاه وذنبه إلى الجؤرة. حدة عينه كسنتية اللون. منقاده وساقه إلى الشقعة السوداء || طائرانه خفيف الحركة، قصير الطول. قوته البندان وإساريع الحشرات يتلصصها إنّا كانت بواسطة منقاده المستطيل || يدبّ عنده في تجاويف الأشجار. الآن تقع من بيضتين إلى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

٢٢٢١٤ - **قُصَب، عُنَابِيَّة، وَنْكَا** (S). *Vinca* (S). *Pervenche* (F). *Periwinkle* (E). *Sinngrün* (D). *Pervinca* (I).  
 جنس نباتات عشية ومخشوشة من فصيلة الدفليات. أنواعه ١٢ معظمها بري وبعضها زراعي زُرّبي. أرواقها متعاقبة منعقة كاملة. أزهارها أبليّة فردية طويلة الزناد قعيّة الكأس خماسية البتلات، يكثر فيها اللون الأزرق. أشهر أنواعه ما يتبع:

٢٢٢١٥ - **قُصَب صَغِير \*** (S). *Vinca minor* (S). *Petite pervenche, Violette des serpents* (F).  
 نوع من القُصَب للممر ضرره عديده. سوقها مخشوشة فراءه تعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أرواقها سنجة بالابيض أو بالأصفر. أزهارها عادية أو مكسبة منها الابيض والأزرق والبنفسجي والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من شباط إلى حزيران.

٢٢٢١٦ - **قُصَب كَبِير \*** (S). *Vinca major* (S).  
**Grande pervenche, Violette des sorciers** (F).  
 نوع من القُصَب للممر. ساقه مخشوشة فراءه تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه صغيرة القد، نصلها سنائي الشكل، قلبية القاعدة، مسنجة الصلصة أو مطوق الختار بالأصفر. أزهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لوها إلى الزرقاء الجبلية || أزهارها يستمر من آذار إلى حزيران.



قُصَاعَة

S. sempervirens (S). **قَضْبِيب الذهب الدائم الخضار**  
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). **قَضْبِيب الذهب العريض الورق**  
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). **قَضْبِيب الذهب العصي الورق**  
Verge d'or à feuilles de graminée (F).

S. multiflora (S). **قَضْبِيب الذهب الكبير الزهر**  
Verge d'or multiflore (F).

S. canadensis (S). **قَضْبِيب الذهب الكندي**  
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). **قَضْبِيب الذهب المتخار**  
Verge d'or tardive (F).

S. virga-aurea (S). **قَضْبِيب الذهب المبدول**  
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). **قَضْبِيب الذهب المنحني**  
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). **قَضْبِيبَات**  
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القضيبي . خلاياها  
أسطوانية مستقيمة تنقسم عمودياً وباتجاه واحد . أجناسها  
ثلاثة : البكتيريوم والبسيلوس والذوائف . أما الانواع  
فمديدة وهي مذكورة في مواقعها التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). **قَضْبِيَة**  
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة .

Affaire en état (F). **قَضْبِيَة مُعَدَّة للحكم**  
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات .

Chat (F). **قَطَا**  
هو السنور ، أظليه .

Serval (F). **قَطَا - تَغِير**  
هو البج ، أظله .

Gangas, Pterocles (F). **قَطَا**  
Pterocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجوبيات وأحد قَطَا وقَطَا . انواعه  
عديدة جميعها قريبة الشبه من الحام تتميز باستطالة ودة  
ريشتين من أفنيكها تكشفتان الذنب . وهي سريعة  
الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء .  
تألف الغيائي ، قوتها الحبوب والبرور ونواحي بعض  
النباتات . تعيش اسراباً كبيرة . تدفن في افصوص ترصمه  
بالقش والوبر . اناها تحضن أربع بيضات صغيرة القذ  
مرقطة || وتوصف القطا بالهادية والعرب تضرب بها المثل  
في ذلك . ومن قول الشاعر :

« الناس اهدى في القبح من القطا  
واضل في الحسن من الغربان »

وقيل في وصفها :

« اما القطا فاني سوف انتها  
نمتاً يوافق معنى بعض ما فيها »

« سكا مخضوبة في ريشها طرف  
سود قوادها صهب غوائها »

اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

الزرايع وبعض الاقاليم الافريقية || اجسامها صغيرة تطول  
من ٢٠ الى ٢٢ سم . اجنحتها ضيقة مستطيلة . اذناها  
قارئة . رانها بالغة الطول . اثوابها الى السواد الاسع يملو  
مواج اغفر او بنسجي . محاسرها مخططة بالابيض .  
صدورها وبطنها الى البياض الاغبر || ملاحنها الحياتية  
جماية . تدفن عشائها في قم الانجار الباسقة . الاثني  
تحضن من بيضة الى بيشتين ثلاث مرات في الحول .

٢٢٢٢٨ - **قَضْبِيَة - سَرَح - طَرَبَح**  
Cadaba (S). Cadaba (F). Esel-wood (E). Ezelbaum  
(D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه قليلة .  
جميعها مجبريات ونباتات سرحة او شائكة . اوراقها كاملة  
متقابلة ، تلتصلا جانبا للشيخ ، بحري اللون . ازهارها  
فردية ، محورية وتاجية . ثمارها قرنية اسطوانية ، لوها  
الى الخضار البحري ، لبابها جانبا المكسر غزير العصاره  
الحامزة المرة || يقال ان عصارها تلثم الجرح وتطرد  
الديدان المعوية .

٢٢٢٢٩ - **قَضْبِيَة**  
نبت من الحنص ينبت في السهل . ج قضات .

Terrain peu caillouteux (F). **قَضْبِيَة**  
Pebbley ground (E).  
هي التربة القليلة الحصى . اما التربة الكثيرة الحصى  
فتدعى حصية .

Pépins de raisin sec (F). **قَضْي**  
هو بزر الزبيب اني العنب الجفيف . Raisins-stones (E).

Pénis (F). Penis (E). **قَضْبِيب**  
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). **قَضْبِيب**  
كل نبت من الاغصان يقضب . ج قضب وقضبان .

Ente (F). **قَضْبِيب التظعيم**  
Graft, Branch bearing a graft (E).

قضبب او غصن دقيق له من زيمة واحدة الى ثلاث زيمات  
وهو يصلح لتظعيم وقد يستعمل لعملاً للشرة .

٢٢٢٣٥ - **قَضْبِيب الحَمَل**  
Courson, Coursonne (F). Shoot cut down to three-  
or four eyes (E).  
كل قضيب قلم وتركه على ثلاث الى اربع براعم ثمرية .

٢٢٢٣٦ - **قَضْبِيب الذهب \* عَصَا الذهب**  
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod,  
G. wings (E). Goldrute (D). Solidago, Verga  
aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشماعية الزهر .  
انواعه نحو ٦٠ معظمها عشبي وبعضها جبني . اوراقها  
متقابلة ريمية . ازهارها ضمية شمعية متتالية جميلة الشكل  
صفراء اللون || اعرف انواعه واشهرها :

S. glabra (S). **قَضْبِيب الذهب الأجرد**  
Verge d'or glabre (F).  
قَضْبِيب الذهب الثنائي اللون  
S. bicolor (S).  
Verge d'or bilocore (F).  
قَضْبِيب الذهب الجامد  
S. rigida (S).  
Verge d'or rigide (F).



نَضْبَة



قَضْبِيب الذهب





قطاة كدرية

## ٢٢٢٥٢ - قُطَّاس \* ، قُوتَّاش ، خُشَقَّاء ، يَّاك

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقريات أنواعه المعروفة اثنتان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ إلى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر || والقُطَّاس حيوان كبير الخلف يعلو من ١٦٠ إلى ١٨٠ سم. وزنه من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور. رأسه كُرَّاس الثور إلا أنه مخدب القحف، مستطيل القرون المنصبة. خنثيتاه متباعدتان، عيناها كيرتبان، أذناه مستطيلتان. قوائمها قوية. ثوبه إلى السرة المايقة السوية تملؤها رَقْعة صهباء. خطمه وذعره وزممة ذنبه بيض. ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبون فيه العلم. قوته الاعشاب. سربه كثير المدد. انثاه تضع مقغوراً واحداً في الحول يسير وراء أمه فور وضعه || أما ثوباء فيها:

P. mutus (S). Yack muet (F).

القُطَّاس الاخضر

القُطَّاس الاخضر (F). Yack commun (F). وهناك القُطَّاس الداجن وهو ضرب من الاخضر يشمل بعض الفروق. يستعمل في الجر والنقل والحراثة. حليب انثاه غزير المادة السكرية، مستحب الحرف.

Secteur, Domaine (F).

## ٢٢٢٥٣ - قُطَّاع

Sector, Domain (E).

Coupe (F). Cutting (E).

## ٢٢٢٥٤ - قُطَّاعة

## ٢٢٢٥٥ - قُطَّاف ، خِرَاف ، صِرَاف

Cueille (F). Gatching (E).

اجتباء الثمر أو غلافه من الانتاج النباتي عند الادراك.

## ٢٢٢٥٦ - قُطَّاف الكَرَمَة

Vendange (F).

Vintage, Grape-gathering (E).

اجتباء عناقيد العنب أو وزن قطاف العنب.

## ٢٢٢٥٧ - قُطَّامة °

Polyandrie (F).

Polyandry (E).

القُطَّامة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة.

## ٢٢٢٥٨ - قُطَّامِي \* ، قُطَّامي

Rostrhamus (S).

Rostrhame (F).

جنس طير من حمارة الحذاء وفصيلة الصقرات. أنواعه ثلاثة موطنها البلاد الحارة. وهو عزيز الوجود، كبير الجفء، يبتدر من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف البحيرات وبحاري الماء. يطن عشه في الاشجار القريبة من الماء. انثاه تبيض وتحضن من رفقتين إلى ثلاث وفئات مستطيلة الشكل مغطاة اللون.

## ٢٢٢٥٩ - قُطَّانيَّات

Légumineuses (F).

هي الفريزات فصيلة نباتية، اطلمها.

Henné (F).

## ٢٢٢٦٠ - قُطَّب

هو الحناء، اطلمها.

Pôle (F). Pole (E).

## ٢٢٢٦١ - قُطَّب

القُطَّبان، جغرافياً، هما طرفا محور الارض الذي يمر بمركز الكرة الارضية، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وتبلغ المسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو عشرة الاف كيلومتر. اما القطر القطبي للارض فهو



قطاي

Catapodium (S).

## ٢٢٢٤٣ - قُطَّاب °

Catopode (F). Catapodium (E).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. يألف اليرال البحرية. يبتدر من النباتات الطوعية في لبنان.

## ٢٢٢٤٤ - قُطَّاة الرمال، دَئِمَة

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

أكبر أنواع القُطَّاء. طوله نحو ٣٥ سم. ثوبها إلى الصهباء الحمراء يعلو توشيح رمادي واسفر. بطنها عاني اللون. متقاربا اسود. موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية إلى رمال افريقية.

## ٢٢٢٤٥ - قُطَّاة شَرْقِيَّة ، جُونِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القُطَّاء. طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه إلى الصهباء الخفيفة يعلو توشيح ابيض ارقط. صدره إلى الجؤزة الباهتة، يعلو إلى السرة، متقاربا وبطن جناحيه وقواديه إلى السواد. موطنه فياني الشرق الأدنى.

## ٢٢٢٤٦ - قُطَّاة صَحْرَاوِيَّة ، غُطَّاط

Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).

طائر من القُطَّاء متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه إلى الصهباء الخفيفة تملو رَقْعة إلى الجؤزة الفاتحة الزاهية. صدره ويعلو إلى الصفرة الموشمة بالاسمر || سربه متوسط المدد. موطنه الصحاري.

## ٢٢٢٤٧ - قُطَّاة كُدْرِيَّة \* ، كُدْرِيَّة

Pterocles alchata (S). Ganga cata (F). Large painted sandgrouse (E).

طائر من القُطَّاء. طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه إلى البهرة ارقش الظهر والبطن. اسفر الخلق. اسود الحنار. موطنه فياني صحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية والقرية. اُسرابه كثيرة العدد.

## ٢٢٢٤٨ - قُطَّاة مُرَقَّطة

Pterocles senegallus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القُطَّاء. صغير القد طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه إلى الصهباء المرقطة بالاسمر والاخر || موطنه رمال السنغال والصحراء الكبرى.

## ٢٢٢٤٩ - قُطَّاة مُكَلَّتَة

Pterocles coronatus (S). Coronetted sandgrouse (E).

طائر من القُطَّاء. صغير القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه إلى الصهباء الغبراء تملو رَقْعة حمراء. رأسه ناشز بعض الريش الذي يبدو كالأكليل. سربه متوسط المدد. موطنه المناطق الاستوائية افريقية.

## ٢٢٢٥٠ - قُطَّاة مُوَشَّحة ، دَلِيم

Pterocles lichtensteinii (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القُطَّاء متوسط القد، طوله نحو ٢٨ سم. ثوبه إلى الصهباء الغبراء يعلو توشيح اسمر يقطب السواطع والذيل. صدره اطلل ارقش. يعلو وزمكا إلى البياض التي. سربه متوسط المدد. موطنه افريقية الاستوائية.

## ٢٢٢٥١ - قُطَّارَة ، مَشْفَاف

Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مذهب الطرف المستدق يستطاع بواسطته تنقيط الحواد السائلة نقطة نقطة.

نشوية مأكولة. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أزهارها عاجية البتلات، صفر الاسدية. أوراقها قرصية الانتشاب، كبيرة القد، زنادها يطول نحو المتر. أزهارها صيني.

### ٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِمَة، سَهْمُ الماء العالم

*Sagittaria natans* (S). *Sagittaire flottante* (F). عشية سبروتية ترينية معمرة تعيش في الأكواريوم. شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها قرصية الانتشاب، طويلة الزناد، نصلها لا قياسي الشكل والحجم يوم عل سطح الماء. أزهارها ضئيلة التجميع، بتلاتها بيضاء اللون شفاقة || أزهارها صيني.

### ٢٢٢٧٦ - قُطْبَة تَجْلِيَّة، سَهْمُ الماء التجلي

*Sagittaria graminea* (S). *Sagittaire graminée* (F). عشية ترينية زهرة. شراخها دقيق تحيل يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها قرصية فالقرصية مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عايق الخضار أما الشراخية الهوائية فضيقة النصل اللاطخي الباهت الخضار. أزهارها ملاقية. اسديتها كبيرة رافعة الجسم، حليلة البتلة. أزهارها صيني.

### ٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَاتِكَة، سَهْمُ الماء الهاتيك

*Sagittaria heterophylla* (S). *Sagittaire hétérophylle* (F). عشية جادسة معمرة مهددا أمريكية الشالية. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أزهارها السفلى لاطقة مربعة، أزهارها العليا منعقة مجدية. أوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد. نصلها هاتك الشكل والحجم واللون. أزهارها صيني.

### ٢٢٢٧٨ - قُطْبَرُوس

*Catabrosa aquatica* (S). *Catabrose aquatique* (F). نبات عشبي يري حولي من فصيلة النجيليات. منيته ضفاف مجاري الماء. يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان.

### ٢٢٢٧٩ - قُطْبِي

نبات يصنع منه حبل مرم وهو خير من الكنبار (اللسان)

### ٢٢٢٨٠ - قُطْبِي

نمت تعريتي يطلق على كل ما له صلة بالقطب. خاصة اتجاه الايزة المنقطة الى القطب.

### ٢٢٢٨٢ - قُطْبَة

التيققة من البليغ وغيره. تقول هات قُطْب من البليغ.

### ٢٢٢٨٣ - قُطْر

خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين. وهو في مساحته ثلث المحيط. وقطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال.

### ٢٢٢٨٤ - قِطْرَاس حَقْلِي

*Lycocoris campestris* (S). *Lycocoris champêtre* (F). حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات. جسمها صغير القد

اقصر من قطرها الاسوائي بنحو ٤٣ كيلومتراً. والقطبان مغنطيسياً يتجاذبان اذا كانا مختلفين، موجب وسالب، ويتنافران اذا تشابه.

### ٢٢٢٦٢ - قُطْب جَنُوبِي

*Pôle sud* (F). *South pole* (E).

### ٢٢٢٦٣ - قُطْب حَيَرَاكِي

*Pôle animal* (F). *Animal pole* (E).

### ٢٢٢٦٤ - قُطْب سَالِب

*Cathode* (F). *Negative pole* (E).

### ٢٢٢٦٥ - قُطْب تَحَلِي

*Pôle nord* (F). *North pole* (E).

### ٢٢٢٦٦ - قُطْب مُتَوَلَّد

*Pôle conséquent* (F). *Consequent pole* (E).

### ٢٢٢٦٧ - قُطْب مَغْنَطِيسِي

*Pôle magnétique* (F). *Magnetic pole* (E).

### ٢٢٢٦٨ - قُطْب مُرْجِب

*Anode* (F). *Positive pole* (E).

### ٢٢٢٦٩ - قُطْب نَبَاتِي

*Pôle végétal* (F). *Vegetal pole* (E).

### ٢٢٢٧٠ - قُطْبَان \*

*Brachypodium* (S). *Brachypodium*, *Brome chiendent* (F). *False brome grass* (E). *Kurzstamm*, *Zwenke* (D). *Paleo*, *Pennacchi* (I).

نبات عشبي يري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من المكروش يكثر في البور وفي الاراضي الموحدة يرعا المال ويسمن عليه. وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي المزروعة استوجب الابادة.

### ٢٢٢٧١ - قُطْبَة ٥

هي الخوزن، طائر من البويات.

### ٢٢٢٧٢ - قُطْبَة \*، سَهْمُ الماء

*Sagittaria* (S). *Sagittaire*, *Fléchière* (F). *Adder's tongue*, *Arrow-head* (E). *Pfeilkraut* (D). *Sagittaria*, *Barba silvana* (I).

جنس نباتات عشبية، جذمورية، مائية، معمرة، من فصيلة الزمباريات. انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة. أوراقها سهمية الشكل، مستطيلة الزناد قرصية الانتشاب. أزهارها ثلاثية التجميع والتجميع يعلب فيها اللون الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه ما يتبع.

### ٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَالَعَة، سَهْمُ الماء الشالغ

*Sagittaria sagittifolia* (S). *Sagittaire commune*, *Sagette*, *Flèche d'eau* (F).

عشبة ترينية سبروتية معمرة مبلولة في المناقع والاحواض. تعلمو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها قرصية وشراخية فالقرصية طويلة الزناد كبيرة القد مستعرضة أما الشراخية الهوائية فضيقة السنان عادمة الزناد. أزهارها ضئيلة، ثلاثية أو خماسية التجميع. بتلاتها شفاقة النسيج، بيضاء اللون، وردية الحمار || أزهارها يستمر من ايار الى آب.

### ٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِيْنِيَّة، سَهْمُ الماء الصيني

*Sagittaria sinensis* (S). *Sagittaire de Chine* (F). عشبة ترينية سبروتية معمرة مهددا الصين. جذميرها



قطبان



قطبة

Lagocle (F).

## ٢٢٢٩٠ - قَطْرَب

نبات عشبي بري ، طبي ، من السكبيات يدعى لغوثيا ، اطلبا .

## ٢٢٢٩١ - قَطْرَب

القطرب ، ويدعى ارطيون ، نبات شائك الازهار ، ينشب بمن يمر به . راجع ارطيون .

Clibanarius (S).

## ٢٢٢٩٢ - قَطْرَبَة

Clibanarius (F). Clibanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الاربيل طوال الذيل وفصيلة الباغوريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاغوار قرب الشواطئ . ملجأها الحيائي جاعي ، جامعاها متوسطة العدد || اجسامها تطول من ٤ الى ٦ سم . اوتها زاهية الالوان الجميلة وبعضها مجلح .



قطرب

Alkalurops

## ٢٢٢٩٣ - قَطْرَبُوس

القطربوس نجم من كوكبة المواء مركزة على رأس البقار اي المواء .

Diomedea (S).

## ٢٢٢٩٤ - قَطْرَس \*

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار الجنوبية من جهتي خط الاستواء . انواعها سبعة جميعها كبيرة الحجم ، عظيمة القد ، طولها يراوح من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . وبسالتها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . وهي طيور فصلي وتقوم قشرب وتسرع وتنطس فتجيد ذلك . اوتها الى البياض باستثناء اجنحتها السوداء اللون او اللحماء . مناقيرها كبيرة القد ، منمنقة المنسر ، حنطية اللون ، صفر المولج || قوتها الاسماك والقشريات والجليف البحرية . تدنن في افصوص ترصه بالقتل . حفنتها بيضة واحدة ترخمها نحو حصة اسابيع .

## ٢٢٢٩٥ - قَطْرَس مُرْتَبِك \*

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٤ م . رأسها صغير الحجم ، اسود . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها دقيقتان ، مبرتا . الحلب . كوسلها اسود وحجبتها كذلك . ظهرها لاسن يتجاوز البين بزرايين . بطنها الى السرة السوداء . قوائمها الى الشقحة السوداء || تألف الموائع التي يتكرر فيها الحور والصفاصفا . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتصه من حشرات .



قطرس

Anthocoridae (S).

## ٢٢٢٩٦ - قَطْرِسيات \*

Anthocoridae (F). Anthocoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة لطيفة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، معتدلة التبيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة . اعطالها نشطة ، لثلاثية الاجزاء . عيونها جانبية ، ناشزة . قوتها الاستعمارية رباعية الفصيل . كوسلها محبة . حنطتها صغيرة . ظهرها وروانها لاصقة في معظم الانواع . حناجب ظهرها لثاقبة ، تكثر فيها الاسطالة . قوائمها صغيرة || الحشرة الجميلة مفترسة في

يطول نحو ٤ م . رأسها محرمس ، جزوي اللون . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها دقيقتان ، مهابان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج . حنطتها صغيرة . ظهرها لا يلحف كامل البطن ، حنطتها بلون الكوسل بعلوها تدبج حنطي ونعثة سمراء . بطنها الى الحقرة الباهتة . قوائمها حنطية || تألف الغابات . قوتها الحشرات الصغيرة والهوام .

Goudron, Poix (F).

## ٢٢٢٩٥ - قَطْران ، قير

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالتقطير من اشعاب الصنوبر والتنوب والسرو وغيرهما . ومن الفحم الحجري .

Goudron de bois

قطران الخشب

Goudron de houille, Coal tar

قطران الفحم الحجري

يجمد في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

## ٢٢٢٩٦ - قَطْراني

هو التنوب الجليل ، اطلبه .

Sapin de Cilicie (F).

## ٢٢٢٩٧ - قَطْراني اصْفَر

هو التنوب الاناضولي . اطلبه .

## ٢٢٢٩٨ - قَطْرَب

جاء في كتاب الجاحظ : « القطرب طائر يحول الليل كله لا ينام . وقالوا اجول من قطرب واسهر من قطرب » .

Colobus (S).

## ٢٢٢٩٩ - قَطْرَب \* ، قَطْرَب

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها افريقية تألف غابات واسراج المناطق الاستوائية وما جاورها || اجسامها رشيقة القوام تطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . تتميز بالعدم اهم ايديها . اوتها جطة الشعر . الوانها تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والابلق والاسمر والاصهب . اذناها تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجلود . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ . اناها تقع جروا واحدا ترصه نحو ٥ اشهر || اما انواع القطراريب فهي :

C. palliatus (S).

قطرب ابيض الناصب

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قطرب انكولا

C. ferrugineus (S).

قطرب حديدي اللون

C. ferrugineus (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قطرب دني

C. kirki (S). C. de Zanzibar (F).

قطرب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قطرب ساتان

C. guereza (S). C. guérez (F).

قطرب غروزي

C. vellerosus (S). C. à fourrure (F).

قطرب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قطرب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قطرب تنبراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قطرب كتي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قطرب مردن

قليلة العدد . تألفت الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه العذبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية . رؤوسها مبطلعة الجرم ، شبه مخروطية الشوذن . جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القطروس والتقطور .

### ٢٢٣٠٣ - قَطَرُورٌ \* Chotorhea (S).

Chotorhé (F). Chotorhea (E). طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الغنثائيات . موطنه يمتد من الهند الى جزر الزابج . يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم . يتميز بكون منقاده الصليح اللبنة غرورية الشكل وباستطالة سباله التي تمتد حتى الزور . جناحاه معتدلا الطول . ذنبه عشاري الرقال ، مستدير الطرف . ثوبه العلوي الى الخضار الالامس . رأسه احمر . بحمره الى الزرق . عيناه كبرتان ، مملوكتان بالاخر . سدقة عينه ذهبية اللون . عنقه وأعلى صدره الى الزرق المرقوشة بالابيض . بطنه وافيئكه الى الخضار الاصفر المواج . منقاده ورصفا واصابعه الى الطحلة السمر . قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض البُار اعصها العنبيية وبعض البلور || يذئن افحومه في حجر يحفره في التربة . الانثى تبيض ٣ الى ٤ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

### ٢٢٣٠٤ - قَطَرِيّ Diamétral (F). Diametrical (E).

ما كان تابعا للقطر ككوكب خط قطري .

### ٢٢٣٠٥ - قَطَع ، قَطْل Abbattre, Coupe (F). Felling (E).

فصل الاشجار من اربامها وطرحها على الارض .

### ٢٢٣٠٦ - قَطْع الودج Jugulation

احدى طرائق جزر الماشية .

### ٢٢٣٠٧ - قَطْع طولي Section longitudinale (F). Longitudinal section (E).

### ٢٢٣٠٨ - قَطْع مَعْرُوطِي Section conque (F). Conic section (E).

### ٢٢٣٠٩ - قَطْع تاليس Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطَعَاوَات هي عديمات الارجل ، اطلبها .

٢٢٣١١ - قِطْعَة Parcelle (F). Parcel, Portion (E). هي القطعة من الارض التي تولدت في مفهوم المساحة وحدة عقارية .

### ٢٢٣١٢ - قِطْعَة الفرس ، فرَس صَغير Petit cheval (F). Equuleus (E).

قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاظم || نجومها قليلة العدد منها اربعة مزدوجة ونجمان مثلثان . اشهرها « ثير قطعة الفرس » .

### ٢٢٣١٣ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، اختَفَرَف ، خَرَفَت ، جَتَى Cueillir (F).

To gather, To cull, To pluck (E). اقتطف الانتاج من صدره كالثمار من الاشجار والازهار من السوق والاغصان والاوراق من النبات ، الخ .

جمع الانواع . اما البرقة فانها تعيش على النبات وتحت لها الاجنحار حيث تقترس ما تستطيع من حشرات ودويبات .

### ٢٢٢٩٧ - قَطَرَم Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F). جنس نباتات عشبية عطرية برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٠٠ معظمها افرقي المنبت . يتكرر في البراري الرطبة . سوقها مستقيمة فراء . اوراقها متقابلة معنفة يضيية الشكل ، نصلها سنن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها فواحة العرف الاخاذ لونها الى الزرق المتبينة المواج || اعرفها واشهرها ما يتبع .

### ٢٢٢٩٨ - قَطَرَم اهر \* ، حَضِيْشَة اهر ، قَالْدَنْج جبَلِيّ Nepeta cataria (S). Népète cataire, Herbe aux chats (F). Catmint, Catnip, Nep (E). Echten Katzenkraut, Nept (D). Cataria comune, Erba gattaja, Gattala (I).

نوع من القطرم المميز يعيش في الموائل الرطبة . ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه عطرية الرائحة ، زيا النصل . عناقيد لينة . ازهاره صغيرة القد ، يبيض اللون زرقاء المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

### ٢٢٢٩٩ - قَطَرَم بَنْفَسْجِي \* ، زَهْر مَرِيَم Nepeta mussini (S). Cataire violet, C. de Mussini (F). Violet catmint (E). Neptepflanze (D). Cataria violacea (I).

نوع من القطرم . ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم . فرونها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جميعها خلية الباه ، طحلاء اللون . اوراقه يضيية الشكل ، قلبية القاعدة . نصلها غشن اللمس اعرض الصفحة العليا ، خلى السفلى الغبراء اللون . عناقيد ازهاره رهلة . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

### ٢٢٣٠٠ - قَطَرَم كبير الزهر Nepeta grandiflora (S). Cataire à grandes fleurs (F).

نوع من القطرم ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه كبيرة القد مزينة النصل . عناقيد رهلة . ازهاره كبيرة زرقاء اللون فواحة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٢٣٠١ - قَطَرُوس Proteus anguinus (S).

Protée anguillard (F). حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القطروسيات ورتبة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوغوسلافية واعصها دلماية || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسه مبطل الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكم . ثوبه الى البياض الوردى الباهت ، خصله الخيشومية حمراء اللون || قوته الديدان والدويبات الصغيرة .

### ٢٢٣٠٢ - قَطَرُوسِيَّات Proteidae (S).

Protéidés (F). Proteidae (E). فصيلة حيوانات قازية من الصفدييات ورتبة السرفويات وقتة مستقرات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قطرم اهر



قطرم بنفسجي



قطرُوس

## ٢٢٣١٤ - قُطُنْ، إغْتِرَافْ، جَتِيْ

Cueillage, Cuellaison (F). Gathèring, Gathering-time (E).

هو اقتطاع الثَّار من الأشجار وهو أيضاً اغتراف والقطف والصَّرام وأجزاء أي وقت القطف .

Grappe (F). Bunch (E).

٢٢٣١٥ - قُطُنْ  
المنقود ساعة يقطف .

٢٢٣١٦ - قُطُنْ \*

Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (S). Baumier de Kataf (F). Balsam of Kataf (E). Kataf Myrrhenbaum (D). Balsamo di Kataf (I).

نوع من البلسان ينتمي إلى فصيلة البخوريات . شجرته متوسطة القد ورائحتها العسارة يستخرج منها صمغ وادعان عطرية شائعة الاستعمال . اشباهها متينة ، صناعية .

Arroche (F).

٢٢٣١٧ - قُطُنْ  
هو السرق ، اطلبه . الواحدة قطفة . ومنه الايض والبحري .

Pluvian (F).

٢٢٣١٨ - قُطُنْطُاف  
هو التودوم ، طائر يدخل في التسلح فيأكل ما فيه من اللود .

٢٢٣١٩ - قُطُنْقُطَة  
صوت القطا .

Blanc étoc, Blanc estoc (F).

٢٢٣٢٠ - قُطُلْ  
فelling clear (E).

قطف شجر الحرجة من اصلها قُطُلًا كاملاً .

٢٢٣٢١ - قُطُنْب ، قُطُنْب ، بِيْجْ ، قَاتِلْ أَبِيْه

Arbutus (S). Arbousier (F). Arbutus (E).

جنس نباتات حرجية من فصيلة الخثليات ، أنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات . سوقها منتصبه فراء . أوراقها ابيدة ، شبه بيضيه ، مستطيلة ، مسنة الحافة ؛ تصلها مائل البشرة ، لآص الصفحة العليا اخضر اللون ، أحمل السفلى . وأوراقها هذه تصلح للدباغة لأنها غزيرة المادة العافصة . ازهارها جلجلية الشكل . ثمارها عنبية ناشفة وهي بطيئة التسج حامزة المذاق ، للذية الطعم || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٢٣٢٢ - قُطُنْب شَالَعْ \* ، عَصِير الدُّبْ ،

جِنَاءْ أَخْشَرْ

Arbutus unedo (S).

Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbutus, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albatro, Corbezzolo, Brichello (I).

نوع من القُطُنْب المبلول في الاحراج اللبنانية . شجرته تملو من ٣ الى ١٠ أمتار . ساقها وأغصانها حمر اللحاء .

أوراقها متناقصة منقطة ، تصلها جامدة الصفحة اللامعة المسننة الاطراف . ازهارها عتقودية التجميع وريدة اللون . ثمارها شكلية الشكل ارجوانية تطول نحو ٢ سم . لبانها ناشف اللادة .

٢٢٣٢٣ - قُطُنْب عُنْكَوِيْ

Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نوع من القُطُنْب ، مهدد الشرق الاوسط . شجرته تملو من ٥ الى ١٢ م . ساقه وأغصانه جزوية اللحاء . أوراقه بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، جامدة التصل . ازهاره عتقودية التجميع . ازهاره فسقية اللون . ثماره قمرزية .

٢٢٣٢٤ - قُطُنْب مَنَزِيْس

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F).

نوع من القُطُنْب ، مهدد البلاد الأمريكية . شجرته تملو من ١٥ الى ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد . ازهارها عتقودية التجميع . ازهارها بيض . ثمارها وريدة تطول نحو ٣ سم .

٢٢٣٢٥ - قُطُنْلَه ، مَلَاعِقِيَه \*

Cattleya (S).

Cattleya (F). Cattleya (E).

جنس نباتات محبلة من الجولليات . أنواعها المعروفة عديدة ، منها أمريكية الاستوائية || أوراقها مستطيلة التصل المتساكنة المقعرة كالملاقح . نصلها جملة الخضار البحري . ازهارها كبيرة البتلات الغارشة المتجمعة || تزرع في المراكن لكثافتها تحشى البرد .

Orgasme (F). Orgasm (E).

٢٢٣٢٦ - قُطْمْ  
حالة الشيق ، أي الانعاط المطلق التي تعقب الفج وتسبق الرجز .

٢٢٣٢٧ - قُطْطَار

Hille (F). Hilum (E).

هو الفتحة التي في الثؤلة وهي نكتة بيضاء مقدرة الانبات .

٢٢٣٢٨ - قُطْمِير

Tégmen, Tégumen (F).

Tegment (E).

هو السيرا أي الوشاح الباطني الذي يلف البويضة والبردة .

٢٢٣٢٩ - قُطُنْ

Croupion (F). Parson's nose (E).

هو منبت ذنب الطائر راجع زك . ج قُطَان .

٢٢٣٣٠ - قُطُنْ ، حَقْوْ

Lombes (F). Lumbar (E).

٢٢٣٣١ - قُطُنْ ، بَرُسْ ، طُوْطْ ، عُطْبْ ، كُرْسُفْ

Gossypium (S).

Cotonnier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D).

Cotone (I).

جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة الجازاريات .

أنواعه عديدة منها شجرية معمرة تعيش عدة أعوام ومنها حولية تعيش بعض الشهور إلى أن تم دورتها الحياتية وتيس .

تعريفه - القطن الزراعي ، يوسه عام ، يتصف بالتحلية التالية : جنبة فنواء ترتفع من ٨٠ إلى ٢٠٠٠ سم . تزكز

على جثث مستقيم تملو ساق ليفية ثم خشبية التركيب تنفرع منها الفتود والافان || أوراقها معتقة كفية

مفصصة براوح عدد فصوصها من ٣ إلى ٩ || ازهارها فردية ، كبيرة القد ، جرسية الشكل تزكز على مائيق

محورية . ألوانها متباينة اعمها الاصفر والاحمر والايض . والزهرة كاملة التركيب ، خشوية ، خشية القعالات

والبتلات ، عديدة الاسدية والمقات . خدرا يحوي من ثلاثة إلى خمسة مصاريح يتألف منها المبيض الثلاثي أو

الحماشي الفلق || ثمارها ارجوانية اللون تدعى عقازة ثم كسج . والمغارة بعد تكوين برورها وبانها التيلية تنفتح

عن ثلاثة أو خمسة أبراج ملوذة بالتيل يعمل كل منها من خس إلى عشر زور ودية الشكل سود الفلوات ينشأها

الزغب اللاصق بها . أما نسبة التيل إلى الزور فتتراوح من ٢١ إلى ٤٢ % . والتيلية هذه هي للمادة الصناعية الخام التي تصبح بعد غزلها ونسجها تلك الأقمشة القطنية المشهورة التي تبلغ نسبة استعمالها في العالم نحو ٧٠ % . من بين أن سائر الأقمشة الأخرى من حريرية وصوفية وغيرها لا يزيد استعمالها عن ٣٠ % .



قُطُنْ



قُطُنْ شَالَعْ



قُطُنْ



قُطُنْ

تنتمي الى ثلاثة عناصر رئيسية هي الازوت والفسفور والبوتاس . افضلها القطن تلك التي تركيبها يشمل ما يحتاج اليه القطن دون نقص او زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من اعتماد صيغة وسطية يميز فيها التعديل وفقاً لحالة التربة . والصيغة الفضل الممكن اعتمادها تتكون من ١/٢/١ اي واحد ازوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يميز تجويزها اما بزيادة الازوت من واحد الى اثنين او بتخفيض البوتاس من واحد الى ثلاثة ارباع الواحد || اما الكمية اللازمة للدم الواحد فتراوح من ٧٠ الى ١٠٠ كيلو .

حراثة — يجب ان تكون الارض المعدة لزراعة القطن خالية من الاعشاب ، معدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا مدر || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الاوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والعوامل الجوية .

زراعته — من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسهر الدائم . ومن الواجب ان لا تكون كثيفة لان الكثافة تعوق النمو وتقتل الشوابل والادسام وتسبب التخلص الانزهار والكناج .

مهاد الزراعة — ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه او جاوزه كان نصيبه الاخفاق . ولكن لزراعة من اي نوع كانت اوقات ملائمة لا يميز الاستعداد بها . وحيث ان القطن يتطلب الكثير من الحرارة للوصول الى كامل انتاجه ، وهو يخشى امطار الخريف وصقيعه . لذلك يحسن مده باكراً للاستفادة من الاحوال الجوية الملائمة اطول فترة ممكنة . وانسب وقت لبدئه براح من ٢٠ اذار الى ٢٠ نيسان || وان يذر باكراً في العقد الاول من اذار وكانت زراعته تقرأ لا بد من تعطية البزور بالرمل ممناً لمساك التربة

تحديد المسافات — لتحديد المسافات شروط عديدة اولها الصرم المستحب ثم طريقة البذر ان آية او يدوية ثم حالة التربة وظروفها الخاصة ثم الاقليم وعوامله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة ان مروية او غير || لذلك فانسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ الى ٧٠ سم . ولا تقل فساتها البيئية في الخط الواحد من ٤٠ سم .

البذر — يبذر القطن اما نثراً او لقطاً او نثراً فالبذر نثراً لا يلائم اقاليم البلاد العربية ومواصلها الجوية وطرق دما وظروف زراعتها || اما اللقط على فرشة التلم او بواسطة المبادر الآلية فهو عملية شائعة ومرتبة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تابعة قلاً يقوم بها المزارع || اما طريقة البذر نثراً بعد التخطيط فهي الاحسن اما يجب ان تكون التفر اما في فلق التلم ان كانت الزراعة يدوية او في الربع الاخير من سقمه اذا كانت الزراعة نصف مروية او على غارب التلم اذا كانت مروية || وكيفما كانت الطريقة المثمرة فلا بد من الانتباه الكلي لوضع البزور في التربة على العمق الانسب لانهاياتها ونشوتها لان البزور العميقة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء وينقل فيها الفطاه فتضوت من العفن . والبزور الطائشة يحف عليها النطام ويكثر حواها الهواء ويحف عنها الرطوبة فيتسبب بعد الانتاش ولا لا تنبت اصل || اما البزور التي صار طمرها على العمق الانسب وهو نحو ٤ سم . فانها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بعيدة عن تأثيرات العوامل الجوية والعناية معن الطيور التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهلكها .

تاريخه — من المؤرخين من قال ان القطن ازين من التاريخ . ومنهم من يقول انه قدم العهد غير ان قديمه لا يتعدى اعتاب العصور الفرعونية . والدليل على ذلك عدم استعماله في اقطه القراصة بينها كانوا يستعملون الكتان والقنب || لكن صدقوا او موهوا فالهند والفرس عرفوه فزروه واستعملوه وكذلك العرب منذ ان استولوا ما بين البحرين . والعرب هم الذين نقلوه الى سورية فصر فالجزائر فصقلية فالاندلس . ومن الذين عرفوه جميع شعوب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الاوروبيين فلانهم المختلفة بلقطة العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة — ينمو القطن في جميع الاقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الخصري وادراك ثماره عن ١٨ او ٢٠ درجة مغ . بشرط ان لا تكون فوارق الحرارتين القصوى والحدية كبيرة وبنائية . وهو يخشى الصقيع في نيسان وايار ويهاب الخريف اليارد المساطر . وكل زراعة تخرج عن نطاق هذه القنوس المناخية تعتبر من المغامرات الخطرة هذا ان لم يتوصل العلم في الآتي القريب الى استنباط مهاد جديد سرعة النمو الخصري والدورة الحياتية تفوق بتكثيرها وادراكها الاصرام المعروفة حالياً .

زهره — يميز القطن في الآتية الطبيعية الزولية والرملية الطبيعية التي لا تقتصر الى الكلس والتي يربو غورها عن ١٠٠ سم . لان معظم جذور القطن وشرورها يلحق هذا القاع || وقد تلازمه ايضاً كل تربة عيقة الغور قليلة الاندماج بشرط ان لا تنفذ منها الرطوبة بسرعة || وحيث انه من النباتات المفروص فيها سرعة النمو والادراك لا يستحسن زهره في الآتية المندجة المسكة خوقاً من تاخير نموه واستطالة دورته الحياتية || اما الاراضي الرملية والقلبية التي لا تحتفظ برطوبة الري اكثر من ستة ايام فانها لا تصلح ايدياً لزراعة القطن وكذلك الآتية الكثيرة المحصى لان المحصى تمتع التربة من استيعاب كامل مقدورها من الحرارة الضرورية .

تسميده — يمتد القطن من النباتات الفرة التي تجهد التربة وتستنزف خواصها . فتكاد زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الاولى والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن اجمع طرق الاغصاف واتباع افضلها حفاظاً على التربة وزراعتها || وحيث ان الدورة الزراعية والتسميد هما المبدأان الاساسيان اللذان يرتكز عليهما محور الحسب . فنقول في الدورة الزراعية انها ضرورية جداً بشرط ان لا تكون ثنائية لانها تصبح قليلة الفائدة . اما الدورة الثلاثية التي تلج لتربة الوقت اللازم لتعزيز نشاط جراثيمها وتجنيد بعض ما فقدته من العناصر . فانها اصلح الدورات || اما التسميد والغاية منه اعادة العناصر التي صدرتها التربة مع حاصلها فهو على شكلين عضوي ومعدني .

١ — **الاسمدة العضوية** : الاسمدة العضوية اشهر من ان تعرف وهي شائعة الاستعمال اهمها غني البقر والجاموس قروت الخيل وشار الدواب فيبر اللحم والماغز || والخي الذي يعتبر من الاسمدة الباردة يستعمل في الآتية الثقيلة الاندماج لانه يخفف من مقدور استيعابها للحرارة ويقوي فيها خاصة الاندماج وينشط على الجراثيم المفيدة وحيث البيئة الدالية الاندماج للحسب فضلاً عما يتركه من غذاء عصري للنبات || اما الروث فيستعمل في الآتية المندجة لانه يمدد بحرارة ويخفف من انساجها ورطوبتها بمد ايضاً على التقيام بجميع اعلاها الجرثومية والكأوية .

ب — **الاسمدة المعدنية** : الاسمدة المعدنية كما هو معروف

تربية - تظهر عادة بؤادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصاحبه إلى التفرع بعد ظهور البؤادر بيويون ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة سقيمة ضئيلة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض .

حفظه - الحف أو التفريد عملية لا بد منها لتزاحم النباتات على الغذاء وتنشيط النمو والانتاج . وقد تم على مرحلتين في الأول وذلك بعد ظهور البؤادر بنحو ٢٠ يوماً ينزع من التفرعة كل ما هو ضعيف ويزيد من التلابة . وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنزع النباتات الضعيفة ولا يترك في التفرعة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الحف عن الزمن المعلن خوفاً من الزراعة الناشئة من الضعف والسقم || وإذا كانت التفرعة تليقاً فلا موجب لحفها على مرتين بل يباشر تقريدها عندما يرايح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم .

ريه - ليس للري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يهين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وجفاف ويتخير ورطوبة جوية نسبية وضوح وضوء... ومن المستحسن ري القطن بعدد يدره بنحو ٢٠ يوماً إلا في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات . الري الأول بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب توقيت الري خوفاً من تجريد النمو الخضري الذي يؤثر الإدرار ويمرض النواحي الخفيفة إلى فتك الدودة القرنفلية التي تكثر في هذه الأونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجة ماسة إلى الماء ولا خوف عليها من الدودة القرنفلية فلا مانع من ردها عن جديد .

٢ - معاد الجني : يستمر الجني عادة من أواسط آب إلى أواسط تشرين الأول وهو منوط بعوامل كيفية وموضعية تسير عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز أبداً جني الكتان قبل أسوداد زهورها لان الاطشان التي يتخللها زهر احمر يمن عن عدم اكتمال نضجها لا يمكن اعتبارها من الاصفات الجيدة المعادة الشوائب .

٣ - طرق الجني : يحني القطن انا باليد أو آلياً بواسطة القطافات . لذلك فطرق جنيه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه بإمكانات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ .

١ - طريقة الجني الشامل . انما لا شك اهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك المغطة حتى اكتمال نضج جميع ثمارها فيصار اذا ذلك إلى جني وجمع كل ما تفتح من الكتان وما سقط منها على الارض فتنتقل إلى مكان الفرز حيث تنظف من القشور والبقايا والفصوص المبرومة . يجب هذه الطريقة عديدة لان كثرة تقليب القطن في أثناء مختلف عمليات الفرز لاترغب الفصوص المبرومة والقشور والبقايا بسبب التلف الفصوص الجيدة وتلوئها بجراثيم الففن الاسود الموجود في الفصوص المبرومة فتنتج من ذلك ذب القطن فيفسد منه وتقل اتاوته .

ب - طريقة الجني المتتابع - قوامها جني الكتان تباعاً . وهي عملية موفقة تزيد من وزن المحصول لانها تبعد البتلة عن أشعة الشمس اللاذعة ومن مقابيل السدى والذئب المفرسة فتصفها من انحطاط صفحتها الرئيسية . اللون والشفافية وتحول دون سقط الكتان على الارض .

ج - طريقة الجني الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها القطافات الآلية لكنها تقع بالحدائق عنها التي ذكرناها في طريقة الجني الشامل

د - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد جنيه في المكان المد لفرزه وهذا المكان قد يكون اما ثابتاً ويصنع المستودع أو نقلاً ويصنع المنطة . والمطة كالمنشوع يجب ان تكون نظيفة مفروشة بالخيش منة من تلوئها القطن بشئ الاقذار . يتبنى عملية الفرز عند وصول القطن إلى المكان اذا كان القطن من جني الصباح الباكر ولا يزال رطباً من الندى فممنعا يقتضي نشره بعض الوقت ردها بحيث يتم يفرز || يفرز القطن عادة اما بالأيدي أو بواسطة .

تربية - تظهر عادة بؤادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصاحبه إلى التفرع بعد ظهور البؤادر بيويون ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة سقيمة ضئيلة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض .

حفظه - الحف أو التفريد عملية لا بد منها لتزاحم النباتات على الغذاء وتنشيط النمو والانتاج . وقد تم على مرحلتين في الأول وذلك بعد ظهور البؤادر بنحو ٢٠ يوماً ينزع من التفرعة كل ما هو ضعيف ويزيد من التلابة . وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنزع النباتات الضعيفة ولا يترك في التفرعة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الحف عن الزمن المعلن خوفاً من الزراعة الناشئة من الضعف والسقم || وإذا كانت التفرعة تليقاً فلا موجب لحفها على مرتين بل يباشر تقريدها عندما يرايح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم .

ريه - ليس للري مواعيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يهين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وجفاف ويتخير ورطوبة جوية نسبية وضوح وضوء... ومن المستحسن ري القطن بعدد يدره بنحو ٢٠ يوماً إلا في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات . الري الأول بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب توقيت الري خوفاً من تجريد النمو الخضري الذي يؤثر الإدرار ويمرض النواحي الخفيفة إلى فتك الدودة القرنفلية التي تكثر في هذه الأونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجة ماسة إلى الماء ولا خوف عليها من الدودة القرنفلية فلا مانع من ردها عن جديد .

حفظه - ان كانت رطوبة التربة تحجب النباتات فمزق التربة الذي ينظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها على واجب جليل النفع || يمزق القطن عادة على ثلاث مرات . المرة الأولى بعد الحف وقبل الري الثانية . من الضروري ان تكون سطحية ، طائفة ما يمكن ، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية أو قطع شرونها الدقيقة || والمرة الثانية تم عادة بعد الري الرابعة . الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهويتها وتصلح الخلوط ويجاري الماء وتخزين النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما المرة الثالثة المروقة بالسك فبورها يأتي بعد الري السادسة . قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجرائم النافعة ثم كمن التبات وحسنه بالتراب ليقوى على احتال صصف الرياح || وإذا كانت الزراعة حذية فن الواجب ايضاً عرفها وكهسا في الاوقات التالية : يباشر بالمركة الأولى بعد الحف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من ان تفقد التربة الكثير من رطوبتها . ومن الافضل ان تكون هذه المرة خفيفة سطحية || اما المرة الثانية والتسعين فيباشران بعد المرة الأولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون المرق عميقاً لتخريب كل ما يمكن من انابيب استقلاب الرطوبة

جنيه - ١ - معلومات عامة : القطن كا ذكرنا جنية فناء يستمر ازهارها نحو ثلاثة اشهر . وهي تبشر عند استعمالها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر . ومن التمييز إلى اكتمال البرعمة الزهرية وانتاجها عن زهرة كاملة يلزم نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً . وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة إلى ان يتم تأيرها فيحمر لونها وتذبل ببضع ساعات

## ٢٢٣٣٨ - فُطْن مُشَجَّر

*Gossypium arboreum* (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollenbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من الفُطْن المعمّرة الهندي. شجرته تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خماسية التفتيس. صلالها قلبية القاعدة، خالية الصلحة السفلى. كنانجه كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناصعة البياض، محدودة الاستمال الصناعي.

## ٢٢٣٣٩ - فُطْنَجِيَّة ٥

*Ampelis* (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة القطنيات ورتبة الجوارم سنيات الناقير. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومنتاق أمريكا الوسطى والجنوبية || أجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٨ سم. ألوانها صالطة الألوان الجميلة. مناقبها صغيرة مستعرضة القواعد || قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل || أشهر أنواعها القطنية الزرقاء القلادة.

## ٢٢٣٤٠ - فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء القلادة ٥

*Ampelis cincta* (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من القطنية. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الآهلة || جسمها صغير، معتدل الرشاة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي الى الزرقاء البحرية السفلى السفعاء المراج. ثوبها السفلي الى الخضار البنفسجي المراج تملو في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الاجر. علاهاها مشيرة بالاجر. قة رأسها وأطراف جناحها وذنبها موشة بالاسود الاسف || طيراتها غريفة الحركة طويل الشوط. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل || تدثن عنها في كل مجرة فناء قليلة الارتفاع. الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الاثني بتناوبة الذكر.

## ٢٢٣٤١ - فُطْنَجِيَّات ٥

*Cotingidae* (S). *Cotingidae, Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم سنيات الناقير. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة. موطنها القارة الامريكية اخصها أمريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة. ملجتها الحياتي زوجي باستثناء بعض الانواع الجماعية || اجسامها متوسطة القد أو كبيرة. تميز برساجها اشداهق وبألوانها الجميلة الألوان السفعاء الجماعية || أعرف اجناسها وأشهرها القطنية والطرغيب.

## ٢٢٣٤٢ - فُطْنِيّ، حَقْوَرِيّ

*Lombar* (F). *Lombar* (E).

## ٢٢٣٤٣ - فُطُون ٥

*Catops* (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة القوطيات ورتبة غديات الاجنحة. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة والحارة والمنتشرة نحو الباردة || اجسامها صغيرة القد، اهليجية الشكل، تطول من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، صامخة. تأثيرها وفكوكها نظامية. ملامسها مستطيلة. قوتها الاستعاضة غيطية. كواسلها مستعرضة، محدبة. اغمارها مخددة، لاحقة. قوتها مستطيلة. أثوابها تراوح

الفرارات أو الغرايبيل الفارزة وعلى عمال الفرز ان ينتبهوا جيداً لنظافة الفُطْن وتختلف مراتبه لانها أساس المشرى وعليها التحويل || وبعد فرز الفُطْن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تعبته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى عابر المالح حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكينات الحالجة التي تفصل التيلة عن البذور.

## ٢٢٣٤٢ - فُطْن آزَب، فُطْن امريكي

*Gossypium hirsutum* (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte soie*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من الفُطْن الامريكي المنبت. ساقه وقروبه وأوراقه مزينة. ضروبه وأصرامه وهالجه كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلته متوسطة القد مشكورة الصنف.

## ٢٢٣٤٣ - فُطْن البَرْبَاد، فُطْن مِصْرِي، فُطْن جَزِيرَةِ الْبَحْرِ

*Gossypium barbadense* (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue soie*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Ägyptische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي تيلته في مصر وأصف بمخصائص بيزة منها استقامة التيلة واستقامة الدورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضروبه وأصرامه وهالجه عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

## ٢٢٣٤٤ - فُطْن البُيرو

*Gossypium peruvianum* (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من الفُطْن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهد امريكية الجنوبية. ضروبه وأصرامه عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل الدورة الحياتية.

## ٢٢٣٤٥ - فُطْن الهند

*Gossypium indicum* (S). *Cotonnier indien* (F). *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من الفُطْن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط الدورة الحياتية. اصرامه عديدة منها الهند والهند الصينية.

## ٢٢٣٤٦ - فُطْن حَشِيشِيّ، فُطْن الشَّرْق، فُطْن مَلْتَبِيّ

*Gossypium herbaceum* (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbacea*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من الفُطْن الشرقي الفاخر الصنف القليل الانتاج. كنانجه كبيرة القد قليلة العدد. تيلته مستطيلة ناعمة ومتينة. ضروبه وأصرامه لا تحصى لانه دخل في تهجين معظم اقطان العالم اخصها الاقطان المصرية والامريكية.

## ٢٢٣٤٧ - فُطْن شَرَقِيّ

*Gossypium obtusifolium* (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من الفُطْن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة. مهد البلاد الاسيوية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلته متوسطة القد يفضاه اللون.



فُطْنَجِيَّة زُرْقَاء القلادة



فُطُون



٨٠ الى ١٠٠ سم. هيتبها هريمية الشكل. اوراقها ثلاثية الالوان للتباينة. ازهارها سنبلية التجميع منثلي الاطراف.



فطيفة جميلة

### ٢٢٣٥٣ - فُطِيْمَة جَمِيْلَة \* ، دَلَق ، رُعَاف

Amarantus retroflexus (S). Amarante réfléchie (F). Wild beet (E). Gemeisamarant (D). Fior bellosa (I). نوع من الفطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيتبها هريمية الشكل. اوراقها ملونة. ازهارها عقنودي التجميع منثلف الطرف. ازهارها الى الى الحمره المختلطة الموانج.

### ٢٢٣٥٤ - فُطِيْمَة حَسِيْبَة \* ، فُطِيْمَة ذَيْل التَعَلْب ، فُطُور الجِنْدِي

Amarantus caudatus (S). Amarante d'Abyssinie, A. queue de renard, Discipline de religieuse (F). Love-les-bleeding, Prince's feather (E). Fuchschwauz, Flormour (D). Amaranto codato, Bito maggiore, Staffile (I).

نوع من الفطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متبارجة الالوان العالقة. ازهارها متشكليه التجميع، مستطيل القد، شديد التحسين والالتواء.

### ٢٢٣٥٥ - فُطِيْمَة خُضْرَاء ، شَدَح هِنْدِي

Amarantus oleraceus (S). Amarante oléracée, Brède de l'Inde (F). Edible amaranth, Pot amaranth (E). Kohlamaranth (D). Amaranto oleraceo, Spinacio marrone (I).

نوع من الفطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. ازهارها زاهية اخضر الجليل. ازهارها عقنودي التجميع، مردي الشكل، محسن الطرف، ازهارها فستقية اللون، ارجوانية الموانج.



فطيفة خشبية

### ٢٢٣٥٦ - فُطِيْمَة بَانَعَة ، شَدَح ، بَقْلَة عَرَبِيَّة

Amarantus blitum (S). Amarante blette, A. sauvage (F). Blite, Wild amaranth (E). Gemeiner Erdmarant (D). Amaranto salvatico, Bledire, Blito (I). نوع من الفطيفة الزراعية البقلة. ساقها منتصبه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد مأكولة. ازهارها عقنودي التجميع، هريمي الشكل.

### ٢٢٣٥٧ - فُطِيْمَات

Amarantaceae (S). Amarantacées (F). Amarantaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها عشبي وبضها جنبي. سوقها ليفية. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها لا تقاسي التجميع والارتكاز. ازهارها خنثوية او وسيده او ثنائية المسكن. اكثر نباتاتها برية صالحة ناعمة تغذية المعدة والامعاء.

### ٢٢٣٥٨ - فُطِم \* Polyandre (F). Polyandrous (E).

الفطيم من الاناث من تزواج اكثر من ذكر. والتقليم من النبات من كانت ازهاره كثيرة الاسدية.



فطيمة

### ٢٢٣٥٩ - فُطِيْمَة \*

Eriocrania (S). Eriocranie (F). Eriocrania (E).

حشرة من فصيلة القظليات ورتبة حرشفيات الاجنحة. اعطائها فصحة الارزاء تشمل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها صغير، نحيل، مردي الشكل. بسطها نحو ١٤ سم. رأسها معتدل الجرم. عينها صغيرتان، بارزتان. خطها وملسامها شديدة القصر. زباناها

من المختطي الاسمر الموانج الى الاسود || تعيش في المزاب والدردري التبايني.

### ٢٢٣٥٤ - فُطُورِيَّات ° Catopidae (S).

Catopidés (F). Catopidae (E). فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم واخصها المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، اهليلجية، تطلو من ٣ الى ٨ سم. رؤوسها شبه مكورة. عينها صغيرة، بارزة. تكاثرها وفكوكها نظامية. قرونها الاستشعارية خيطية، مستطرفة الاطراف، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة. اعماها لاحقة. قوائمها نشطة || تعيش في المزاب والدردري ويجاحر الثدييات الصغيرة واكثر الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القُطُوب.

### ٢٢٣٥٥ - فُطُورَاء Cotula (S). Cotule (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات انواعها عديدة اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة. سوقها منتصبه او مسطحة، اوراقها مفصصة او مفرصة. نصالها خلية البشرة بمعدنة العدد. ازهارها رؤسية فردية صغيرة القد صفراء اللون. بزورها تحيلة مستطيلة عادمة الجناح والافرة.

### ٢٢٣٥٦ - فُطُوش Nonette de Calcutta (F).

طائر من المصافير الصغيرة يدعى دحسوم مكيم، اعطيه.

### ٢٢٣٥٧ - فُطِيْب Astragalus drusus (S).

هو الاسطرغالوس الدرزي، اعطيه.

### ٢٢٣٥٨ - فُطِيْع Troupeau (F).

Flock, Herd, Drove (E). الطائفة من النعم كالابل والبقر والنعم. ج قطاع وقطان.

### ٢٢٣٥٩ - فُطِيْمَة ، اُمْلَاك Domaine (F).

Domain, Property (E). اراض زراعية واسعة يملكها شخص واحد.

### ٢٢٣٥٠ - فُطِيْمَة ، سَالَف العُرُوس Amarantus (S). Amarante (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتريينية من فصيلة الفطليات. انواعها عديدة، سوقها منتصبه. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها صغيرة القد، لا قياسية التجميع. احرف وانواعها واشهرها ما يتبع.

### ٢٢٣٥١ - فُطِيْمَة بَضَاء Amarantus albus (S).

Amarante blanche, Fleur de jalousie (F). White coxcomb, Tumbleweed (E). Weisse Amarant (D). Amaranto alba, Erba di gelosia (I).

نوع من الفطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار اللانم. ازهارها عشكولي التجميع. ازهارها بيض. عشكولا مستطيل الشكل محسن.

### ٢٢٣٥٢ - فُطِيْمَة لُثْلَايَة الَانُورَان ، دِجَة الِامِير

مَنْدُ فُور Amarantus tricolor (S).

Amarant tricolore (F). Amarant, Joseph's coat (E). Fuchsschwanz Tricolor (D). Amaranto a tre colori, Pappagallo (I).

نوع من الفطيفة التريينية. ساقها منتصبه تملو من

منها البرية التي تنابت الكمأة في الربيع نجى بيوضها قشوى وتطبخ فتكزل . ومنها الزبينية الشائعة الاستعمال || سرقها فراءه ، أوراقتها متعاقبة ، رؤوساتها الزهرية كبيرة القند مستعرضة . بزورها غريزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة الاغرة || أشهر أنواعه الزبينية ما يلي .

### ٢٢٣٧١ - قُطَبُولُ المَطَرِ

*Dimorphotheca pluvialis* (S). *Dimorphothèque pluviale*, *Souci pluvial*, *Souci hygrométrique* (F). نوع من القبول الزبيني الحولي . ساقه منتصبه كثيرة الفروع تملو نحو ٤٠ سم. أوراقه سنائية الشكل ، مسنة الحافة ؛ فصلها خلي البشرة دبق الملمس . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٦ سم . طبياها اصفر اللون ، لسنتها بيض الصفحة العليا حر السفل . تتلجج وزعو في النهار من الساعة السابعة صباحا الى الخامسة بعد الظهر وتنكش في الليل وفي الايام الماطرة || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

### ٢٢٣٧٢ - قُطَبُولُ بَرْقَعَالِي

*Dimorphotheca aurantiaca* (S). *Dimorphothèque orangée* (F). نوع من القبول الزبيني . ساقه منتصبه فراءه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. أوراقه السفلى كبيرة القند مقطوعة الاطراف قليلة الزغب . أوراقه العليا سنائية صغيرة . رؤوساتها الزهرية كبيرة القند قطرها نحو ٥ سم . طبياها اسمر اللون ، لسنتها برقالية || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع .

### ٢٢٣٧٣ - قُطَبْتَانُ اَزْرَقُ\* ، قُطَبْتَانُ بَنَفْسَاجِي\*

*Xylocopa violacea* (S). *Xylocope violet*, *Abeille charpentière* (F). حشرة خاشية من فصيلة القطبانيات قريبة الشبه من النحل طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . لونها الى الزرقه يطلوعها موج اسود || تشيد خلياتها في الاخشاب التي تحفرها وقد شاعدها مراراً في خشب الليمون المصنوع والاذرعت والازان .

### ٢٢٣٧٤ - قُطَبْتَانُ مُسَجَّسُ\* ، قُطَبْتَانُ مَعَجُوقُ\*

*Xylocopa aestuans* (S). *Xylocope agité* (F). حشرة خاشية من القطبانيات طولها نحو ٢٢ سم . تركيب الاخشاب المصنوعة والاعمدة تحفرها وتشيد فيها خلياتها . الاثنى اكبر قدماً من الذكر ، ثوبها الى السمرة السوداء يطلوعها موج ازرق . جوشها كثيف الحلب اصفر اللون . الذكر صغير القند اصفر اللون اخضر الموج . اجنحته ممتدة الطول عابقة الزرقه السراء .

### ٢٢٣٧٥ - قُطَبْتَانِيَّاتُ\*

*Xylocopidae* (S). *Xylocopidés* (F). فصيلة حشرات خاشية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها متوسط القند قريب الشبه من النحل . اجسامها كثيفة الحلب . بطونها غليظة . تأثيرها قوية مدبها تحكها من ثقب وغفر الاخشاب اليابسة اعصها المصنوعة والاعمدة تحفر فيها الانفاق المستطيلة والسراديب المنرجعة .

### ٢٢٣٧٦ - قَمَدٌ

القند : النخل الصنار . وقعدت الفسيلة وهي قاعد :

عيطيان . اجنحتها خفيفة . مستعرضة التهديد الختاري . كوسلها ويطبخها كثيرا الخمل الدقيق الناعم . ثوبها الى السمرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه || السرة لانه تمشي على وثن النصال . تركيب الكثير من الثبات اعصها البندق والسنديان .

### ٢٢٣٦٠ - قُطَبِيَّاتُ\*

*Eriocranidae* (S). *Eriocranidés* (F). فصيلة حشرات من رتبة حشرغيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم الاجسام المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية وامريكا || اجسامها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة ، عيوبها بارزة . اعطامها وملابسها شديدة القصر . قرونها الاستشارية عجيبة . اجنحتها خفيفة ، شبه سنائية الشكل مهدبة الخار . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل . اثوابها ملونة || اساربعها دقيقة ، عادمة الراجب ، تلف الاوراق وتمشي في وثن النصال || أشهر اجناسها القطعية .

### ٢٢٣٦١ - قَعَا

*Couvrir* (F). *To couple with, To serve* (E). قما الفعل الاثنى وقما عليها : ارسل نفسه عليها .

### ٢٢٣٦٢ - قُعَادُ

*Immobilité* (F). *Immobility* (E). داء يصيب الخمل فيشدها عن العمل اذ يجمد بعض حركاتها متعذراً احياناً . وقد يعتبر من العيوب المبطلة للبيح .

### ٢٢٣٦٣ - قُعَاصُ ، قُعَاثُ

*Clavelée* (F). هو جندي الفنان ، اطليه .

### ٢٢٣٦٤ - قُعَاعَةٌ\*

*Saunage* (F). *Salt-making* (E). التماعه استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح والمعالجة به .

### ٢٢٣٦٥ - قُعَاعِي\*

*Halophyte* هو النبات الذي ينمو في الارربة الملحية او التي تخضع لتأثير المياه الملحية .

### ٢٢٣٦٦ - قُعَالَةٌ

*Pétale* (F). هي البتلة ، اطليه .

### ٢٢٣٦٧ - قُعَايِبُ ، قُعْتَبُ

*Renard mâle* (F). *He fox* (E). هو الثعلب الذكر

### ٢٢٣٦٨ - قُعَبَارُونُ

هو السلي السواد ، اطليه .

### ٢٢٣٦٩ - قُعَيْلُ\*

*Actinomma* (F). *Actinomma* (E).

جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكها الصواني التركيب المولف من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة تتركز على مناسخ شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعها عديدة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط .

### ٢٢٣٧٠ - قُعَيْلُ\* (زهرة اللؤلؤ الافريقية)

*Dimorphotheca* (S). *Dimorphothèque* (F). *African orange daisy* (E). *Regenblume*, *Kapkörbchen* (D). *Dimorfotea* (I).

جنس نباتات حولية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة



قبول



قبول



قشبان ازرق



قشبان مسجس

## ٢٢٣٨٧ - قُفَّاعُ الْآجَامِ \* ، زَمَّارُ الرَّمْلِ

Actitis hypoleucos (S). Guignette vulgaire (F).  
طائر من القفَّاع طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه إلى السمرة الزرنيقية يعلوه موج جزوي ورقشة سوداء. بطنه أبيض. صدره موشع بالأسود. منقاره رادي. سيقانه إلى الخفصار الزيتوني || أقليمه فسح الأرياح يحوم البلاد الاسيوية والاروبية والافريقية. يرتاد المناطق وصفات المياه العذبة ورمال اخوار الأهر.



نقبق

## ٢٢٣٨٨ - قُفَّاعُ مُلَطَّخٍ

Actitis macularia (S).  
Guignette grivelée (F).  
طائر من القفَّاع طوله نحو ١٨ سم. أقليمه البلاد الامريكية. يتصف بميزات وإخلاق وصفات قفَّاع الآجام. ثوبه أقل سمرة ورقشة. منقاره اطمل القوي. سيقانه رادية.

## ٢٢٣٨٩ - قُفَّاعَةُ

Cri du facon (F).  
Cry of the falcon (E).  
صوت الصقر.

## ٢٢٣٩٠ - قُفَّاعُ ضَرْبِ مِنَ الْكَبَاةِ .

## ٢٢٣٩١ - قُفَّاعَةُ

٢٢٣٩٢ - قُفَّاعُ الشَّاةِ الَّتِي تَمْنَعُ الدَّرَّةَ .

## ٢٢٣٩٣ - قُفَّاعِيْدُ

القعيد : الجراد اذا لم يستو جناحاه بعد .

## ٢٢٣٩٤ - قُفَّاعِيَّةُ

Perdrix chukar (F).  
هي الحجل الشقر ، اطلبه .

## ٢٢٣٩٥ - قُفَّاعِيْلُ

Bouquin (F). Buck-rabbit (E).  
هو الخنزير اي الارنب الذكر .

## ٢٢٣٩٦ - قُفَّاعُ

Monticule (F). Hillock, Knoll (E).  
القف ج . قفأ وأقاف : ما ارتفع من الارض دون الهضبة .

## ٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ

Nuque (F). Nape (E).  
هو القذال الجزء الخلفي من العنق مركزه تحت القف .

## ٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ الْجَلْتَوَزِ \*

Apoderus corylli (S).  
Apodère du coudrier (F).  
حشرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٧ م. رأسها اسود ، ثوبها وسائر جسمها إلى الحمرة || تركب أوراق الجلتوز ففتلتها وتعيش عليها فتصلها .

## ٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ مَرْمَرَةٍ

Campanule gantée (F).  
هو جريس البست ، اطلبه .

## ٢٢٤٠٠ - قُفَّاعُ

Bouquetin d'Abyssinie (F).  
هو الوعل الحبشي ، اطلبه .

## ٢٢٤٠١ - قُفَّاعُ

٢٢٤٠٢ - قُفَّاعُ

## ٢٢٤٠٣ - قُفَّاعُ

Diotis (S). Diotide (F).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة . منها خلية زياء تطلو من ١٠ إلى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، حاضنة ، اهليلجية ، صغيرة .

صار لها جذع تقعد عليه . وفي ارض فلان من القاعد كلها وكلها ...

## ٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ

كل اسيل مالك للقرابة إلى البية .

## ٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ

هو الانجاء . يقال قمر الشجرة : اقتلعها مع جذورها .

## ٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ الْقَمَسِ : الرَّابِ الْمُنَى .

## ٢٢٣٨٠ - قُفَّاعُ ، قُفَّاعُ

Formica animosa (S).  
Fourmi féroce (F).  
نوع من النمل الحرجي كبير القدر أحر اللون اسمر الموالج يكثر وجوده في غابات وأسراج البلاد الاستوائية والحارة .

## ٢٢٣٨١ - قُفَّاعِيَّاتُ

Saprolégniaceae (S).  
Saprolégniacées (F). Saprolégniaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التنسيات ورتبة البيضييات .

## ٢٢٣٨٢ - قُفَّاعُ

Arce (F). Arching (E).  
قفص العود : عطفه كما تعطف عروش الكرم .

## ٢٢٣٨٣ - قُفَّاعُ

Extirpation  
القفص هو تلغ البنية ان جنبه او نجرة من اصولها .

## ٢٢٣٨٤ - قُفَّاعُ \* ، طَيْرُ الصَّيْبِ

Serpentarius secretarius (S). Serpenteaire, Secrétaire (F). Secretary bird (E).  
طائر من فصيلة القمقييات وسيد الجنس والنوع ، كبير الجثة ، رشيقي القوام ، أخيف اللد ، طوله نحو ١٢٠ سم. رأسه قصير وعريض. قفنه متوج بكشك من الريش الضيق المستطيل . وهو أشبه العين الكبيرة . أحر الجفن. غليظ المنسر الاوقف الحاد . طويل العنق والذنب والساق . كبير السقط . كثيف الريش . ظهره أريد اللون يعلوه موج أزرق . عنقه ويطقه ويتكابه إلى الطحلة الزاهية . قوادسه إلى السمرة الداكنة . ذنبه مجذع الطرف || الاثنى أكبر حجماً من الذكر لكنها صغيرة الكشة . تنبش من ٣ إلى ٤ رفئات تحضنها نحو ٦ أسابيع في انصوص تشيده بالطين وتبشقه بالفض والريش التام || اسطانه البلاد الحارة . يألف الاماكن الآهلة ويدجن بسهولة . قوته الافاعي حل اختلاف اجناسها وانواعها يقتنها ايئاً شاهدها ولا يفت عن سائر الزحافات والقواغم اغصها الجرادان والفئران والبراغيث وتؤايمها .

## ٢٢٣٨٥ - قُفَّاعِيَّاتُ

Gypogéraniidae (S).  
Gypogéraniidés (F). Gypogéraniidae (F).  
فصيلة طير من كواسر النهار ورتبة الجوارح ، وحيدة الجنس والنوع يمثلها القفَّاع .

## ٢٢٣٨٦ - قُفَّاعُ ، قُفَّاعُ ، رَيْبَةُ

Actitis (S).  
Guignette (F). Small hoe (E).  
جنس طير من عمارة الطوطانيات وفصيلة دجائيات الارض . صغير اللد منسجم الشكل . ثوبه مرقط الرأس والظهر . أبيض البطن . منقاره معتدل الطول . رشفه دقيق وقصير . ذنبه كثيف الانيك مستديره || يرتاد المناطق وصفات المياه العذبة . قوته الحشرات والديدان والناكبات والذباب . يدن عنه في الانجار القريبة من الماء اغصها الحلاف والعصفصاف واللائل || الاثنى قبيض . يعضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو الاسيوسين || له نوعان فقط .



قُفَّاعُ الْجَلْتَوَزِ

٢٢٤١٦ - قَفَص CAGE (F). Bird-cage (E).  
محبس الطير وقد شاع استعماله للصائير البيئية .

٢٢٤١٧ - قَفْط، قَمَط COUVRIR (F). To cover (E).  
قطف وقط الطائر أثناء : قفدها . وقطف الماطر : رُزا .

٢٢٤١٨ - قَفَّعَاء  
عشبة عوارة ثمارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون ان  
تلتقي أطرافها . وهي من اسرار البقول (السان) .

٢٢٤١٩ - قَفْل Claveau (F). Arch-stone (E).  
كل من الحجارة الواقعة بين الثلق والحجرين الاسفلين في  
العقد .

٢٢٤٢٠ - قَفْل Balsamodendron kafal (S).  
Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer  
Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من البلسان، شجرته صغيرة القند فروعها فارشة . اوراقه  
مركبة . ازهاره غليظ التجميع . ازهاره صغيرة القند بيضاء  
اللون فواحة العرف المطري . اخشاها بخورية الرائحة .  
يستخرج من سوقها بالحز عصاره راتنجية بخورية طيبة  
الاستعمال .

٢٢٤٢١ - قَفْلَة ، قَفْلَة Arbre desséché (F).  
Dried tree (E).

هي الشجرة اليابسة وقد كثر اسنادها الى الشجرة الحرجية  
اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قَفْلُوط هو الكراث الاندلسي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - قَفْن Occiput  
الجزء الخلفي الاسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالقحف  
في الحشرات .

٢٢٤٢٤ - قَفْصِي Occipital  
كل ما له صلة بالقحف .

٢٢٤٢٥ - قَفُور ، قَفُورِيَّة Fontanesia (S).  
Fontansée (F).

قَفُور هو الاسم العربي ، اما العلمي فقعود التحريف على  
اسم العلامة « Desfontaines » . جنس جنبايات وشجيرات  
برية وزراعية صياغية وتزيينية من فصيلة القفورييات ||  
انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهددا بموت من الشرق الاقصى  
الى الصين || سوقها فروعها تلون من مَرَّين الى اربعة امتار .  
شكلها قريب الشبه بالياسم . افنانها نخلة متدلية . اوراقها  
متعاقبة ، سنانية النصال اللرية . ازهارها صغيرة ، رباعية  
البتلات الصبيكة ، عاجية اللون . لحاء سوقها ووروعها  
صياغية ، صياغها الى الصغار الكبوريي الجميل || تنويرها  
يستم من حزيان الى آب .

٢٢٤٢٦ - قَفُورِيَّات Desfontainacées (F).  
Desfontaineaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العنانيات مرتفعة  
المبيض . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من  
الشرق الاقصى الى الاقصى || جميع نباتاتها شجيرات ونباتات  
برية . سوقها فروع . اغصانها متباعدة او متدلية . اوراقها  
متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، سنانية النصال . ازهارها  
رباعية البتلات ، صغيرة القند ، عاجية اللون او تبنية ||  
اشهر اجناسها القفوز .

القند . رؤسائها الزهرية صفراء اللون ، عادمة اللسنيات .  
توحيها فارشة استفجية التسج . بزورها مضلعة عادمة  
الجناح والاغرة .

٢٢٤٢٨ - قَفَّالَة \* Mya (S). Mye (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة القفاليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
جميعها من عظم بحار المناطق الشمالية || اصداؤها بيضاء  
اللون ، شبه بيضوية الشكل تملوها تنوات صغيرة ||  
اجسامها مستطيلة المثاب المزودجة التجميع . مصاريها  
لامتناهية القند ، منفصلة الاطراف || تعيش في الرمال  
والاسمال المغورة . لحومها مأكولة .

٢٢٤٢٥ - قَفَّالِيَّات Myidae (S).  
Myidae (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم .  
اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم  
بحار العالم || اصداؤها لاقشائية الشكل والقند ، قليلة  
الاحديداب ، مائلة السطوح . تتميز بمصاريها  
اللامتناهية المنفصلة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها  
القفالة والققيب والكربولة .

٢٢٤٢٦ - قَفَّة Couffe, Couffin, Cabas (F).  
Hamperfrall, Basket (E).

وعاء ثنائي القطة من الاسل او القنب او الليف او  
الكروشك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٢٧ - قَفَر راسع بادية .

٢٢٤٢٨ - قَفَر البود ، قَفَر البود قَفَر البود  
Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).  
نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

٢٢٤٢٩ - قَفَرِي \* Xérophyte (F). Xerophyte (E).  
نعت ترميني يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤٣٠ - قَفَرَات الطيَاء قفزات الطياء كوكبة من ستة انجم وتسمى قفزات النزالان  
ايضا .

٢٢٤٣١ - قَفَرَة أول القفزة الاول نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٢ - قَفَرَة ثالثة القفزة الثالثة نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٣ - قَفَرَة ثانية القفزة الثانية نجم ثَير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤٣٤ - قَفَرِي \* Saltatoire (F). Saltatory (E).  
نعت ترميني يطلق على كل عضو من اعضاء القفز او  
صالح للقفز عند الحشرات .

٢٢٤٣٥ - قَفَسَاء Estomac des ruminants (F).  
Stomach of the ruminants (E).  
معدة الحيوانات الهجرة تشتمل الكرش والقلنسوة وام التلافيف  
والجوث .



قفالة

٢٢٤٣٥ - قُفُول هو التَّمْ، اطلبه .

Cakile (F).

٢٢٤٣٦ - قُفُول

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . أعطائها الشطوط الرملية .

Murette (F). Small wall (E).

٢٢٤٣٧ - قُلْ

هو الحائط القليل الارتفاع .

Zygophyllum (S). Zygophylle (F). ٢٢٤٣٨ - قَلَاب

جنس نباتات جنينية من فصيلة الفرقديات . انواعه نحو ٦٠ معظله بري وبمضها تربيته . سقها فراء جالسة . اوراقها متقابلة مركبة ريشية . ازهارها لفظانية خماسية التركيب . ثمارها عتية || اشهر انواعه التريينية قَلَاب القرم .

Zygophyllum fabago (S). ٢٢٤٣٩ - قَلَاب القرم

Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F). Syrian bean caper (E). Bohnenkapern (D). Fabaria, Favaggine (I).

نوع من القلاب وهو جنبة تربيته شائعة الاستعمال . موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها التريينية جمع البلاد المحلطة الحرارة . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل أرجوانية اللون .

٢٢٤٤٠ - قَلَادَة

القلادة سنة كواكب يعرفن بالقوس .

Moniliforme (F). ٢٢٤٤١ - قِلَادِيّ، سُبْحِيّ

Moniliform (E). شكل من الزباني فواصله كعنب القلادة أو السحبة .

Figue (F). Fig (E).

٢٢٤٤٢ - قَلَار

ضرب من التين ابيض اذا جف اصفر لونه وهو اجود من الطيار .

Merycote (F).

٢٢٤٤٣ - قَلَّاس

القلّاس من استعمال القلّس للتنذية .

Muguet, Stomatite (F).

٢٢٤٤٤ - قَلَاع

Stomatitis (E).

القلّاع مرض معد يعرف بالتهاب غشاء اللّحم . يصيب البقر والغنم . سببه فطر مجهرى شديد الالتهاب . مظهره الخارجى يقع بيض تركب اللسان ودخل الخد .

Brunella (S). Brunelle (F).

٢٢٤٤٥ - قَلَاع

Self-heal, Sikle-wort (E). Brunelle (D). Brunella (I). جنس نباتات عشبية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . سقها فراء . اوراقها متقابلة منقطة كاملة . ازهارها سنبل التجميع طرفي الاركاناز . ازهارها عطرية متوسطة الحجم مختلفة الالوان منها الاحمر والازرق والبنفسجي والابيض || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

Brunella hyssopifolia (S). Brunelle à feuilles d'hy-

sopie (F).

نوع من القلاع البري الترييني ساقه فراء تملو نحو ٤ سم . اوراقه غشيقة كاملة تشبه اوراق الزوفا . سبلته

Blettissement, Blettissure (F). ٢٢٤٢٧ - قُفُول  
Becoming over-ripe or sleepy (E).

القفول كالنقوب والمزارة أو تمام نضج الشر .

٢٢٤٢٨ - قُفِير \* ، عُلْيِيَّة ، مَبَاة

Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

هو مأوى النحل صنع من الخشب ووجهز بالنحائث والاقراص الشمعية .

Haplophyllum (S). ٢٢٤٢٩ - قُفِيل

Haplophyllle (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السليبيات . انواعه المعروفة عديدة سنبها خضاب ونجاد الشرق الاوسط وبعض الاصقاع الاروبية || سقها متصلة فراءا متصلة . اوراقها بسيطة او ثلاثية التخريم . ازهارها عتي التجميع ، طرفي الاركاناز . ازهارها متباينة الاحجام والالوان || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٢٢٤٣٠ - قُفِيل حَرَجِيّ

Haplophyllum sylvaticum (S).

Haplophyllle de Syrie (F).

نوع من القفيل . منته اجراج المناطق الجردية . ساقه فراء مالة . اوراقه ريمية النصال الحادة الاطراف . ازهاره صغيرة القد ، يفضاء اللون . تنويره صيفي .

٢٢٤٣١ - قُفِيل سُورِيّ

Haplophyllum syriacum (S).

Haplophyllle de Syrie (F).

نوع من القفيل . منته معظم الاصقاع السورية باستثناء القلّاب البحري . ساقه متصلة فراءا تملو نحو ٦٠ سم . اوراقه شبه بيضيه الشكل ، ملوئية . اما العليا فثلاثية التخريم . ازهاره صفراء اللون . تنويره يمتد من الربيع الى اوائل الصيف .

٢٢٤٣٢ - قُفِيل مُسْتَطِيل الْوَرْق

Haplophyllum longifolium (S).

Haplophyllle à feuilles longues (F).

نوع من القفيل . منتهه جلاد الودية . ساقه فراء متباينة اللند الخضراء الزجة . اوراقه سنانية النصال الضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم . ازهاره صغيرة متكاكفة ، لونها الى الحمرة المرجانية . تنويره ربيعي .

٢٢٤٣٣ - قُفِيل مُهْدَب

Haplophyllum villosus (S) Haplophyllle velu (F).

نوع من القفيل . ساقه مزينة البهاء فراء . اوراقه السفلى اهليجية النصال اما الوسطى والعليا فثلاثية التخريم . ازهاره مهدبة الكزوس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم . تنويره في اوائل الصيف .

٢٢٤٣٤ - قُفِيل تَجْمِيّ

Haplophyllum fruticosum (S).

Haplophyllle branchu (F).

نوع من القفيل . منتهه الخضاب والنجاد . ساقه كثيرة الفروع المراكبة . اوراقه السفلى بيضيه الشكل اما العليا فرمجة . ازهاره صغيرة القد لونها الى البياض الاصفر المواجه . تنويره صيفي .



قُفِير

Cambium

٢٢٤٥٥ - قَلْب، كَسْبِيوم

الطبقة المولدة في النبات. ج قلوب .

٢٢٤٥٦ - قَلْب، جُمَارَة، شَحْمَة

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).

البرعمة الحامية الطرفية في النخلة وهي شطية يبيض رخصة طيبة الطعم تكون في اعل جذع النخلة. وقد سمي قلباً لياضه. ج قلبية .

٢٢٤٥٧ - قَلْبُ الْأَسَدِ

قلب الاسد نجم نير من كوكبة الاسد الاصفر .

٢٢٤٥٨ - قَلْبُ الْأَسَدِ الْمَلِكِيِّ

قلب الاسد الملكي نجم نير من برج الاسد وهو انور النجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - قَلْبُ الشُّجَاع

قلب الشجاع نجم نير من المرتبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الانثى .

٢٢٤٦٠ - قَلْبُ الْعَقْرَبِ

Antares, Cœur du Scorpion (F). Antares (E).

قلب العقرب او القلب منزل من منازل القمر البانية . وهو نجم نير احر الصود من كوكبة برج العقرب . مركزه في اواسط البدن وراء الاكليل بين كوكبين يقال لهما النياط . وقبب القلب يدعى الدبران || وقلب العقرب يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من نجوم المجرة التي يزيده حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

٢٢٤٦١ - قَلْبِيُوس \*٥

Plebeius (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة القنليات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ٢٥ الى ٢٨ سم . اجسامها سمره اللون رواشها مختلفة الالوان المتداخلة يكثر فيها الازرق والبنفسجي والامطلح الموشم والمنقط بالاسود والاحمر || اناثها اكبر قدماً من ذكورها واقم لوناً واقف وقشة وتوشيحاً || رقاتها تركب اوراق نباتات الفصيلة القرعية .

٢٢٤٦٢ - قَلْبِيُوس القَطَائِيَّات \*٥

Plebeius idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeius Idas (E).

حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية فراشها زاهية قوتها مفتر الا زهار . سرقتها خاضعة قوتها اوراق القنليات قوتها مفتر الا زهار . سرقتها خاضعة قوتها بسطها نحو ٢٧ سم . رأسها صغير الحجم . عينها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صوطانيان . جوشها ازرق اللون اطحلح المواج عند الذكر ، كسني اللون عند الانثى . يطها اربطه اللون عند الذكر ، كسني اللون الداكن القاتم عند الانثى || رواشها عند الذكر || الى الزرقه البنفسجية وطرفها اطار اسود ينتهي بهامش ضيق ابيض . وهي عند الانثى الى الكسني الاصفر اوسع اطار تحيل ابيض تنقده نقط حر وسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بدء ظهورها بحمسة اسابيع وتحت

الزهرية متوسطة القند تحمل ست زهرات || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٦٧ - قَلْع شَائِع \*

Brunella vulgaris (S).

Brunella commune (F).

نوع من القلاع السبروتي الميزول . ساقه متصبية فروع تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه اهلالية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهاره صغيرة بنفسجية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٨ - قَلْع كَثِير الزَهْر

Brunella grandiflora (S). Brunella à grandes fleurs (F).

نوع من القلاع البري الزينبي يرغب في الارربة الكلسية ساقه فروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه ييشية الشكل مسننة الحافة . سبلته الزهرية مستطيلة . ازهارها كبيرة القند ، متباعدة ، اردوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٩ - قَلَاعَة

Aphite (F). Aphtha (E).

بثرة صغيرة يبيضه اللون تظهر في فم الحيوان المريض .

٢٢٤٧٠ - قَلَاعَة

هي الحفافة . اطلبها .

٢٢٤٧١ - قَلَاعَة

Involucre

مجموع القنليات حول قاعدة الخيمة الزهرية او الرئيس الزهري .

٢٢٤٧٢ - قَلَال

Palissade (F). Palisade (E).

اعمدة من البألون او الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعريض الزكية ورمها عن الارض .

٢٢٤٧٣ - قَلَام

Conandron (S). Conandre (F).

جنس نباتات جنمورية عشية معمرة من فصيلة الجنسريات .

أنواعه قليلة . اوراقها قرصية التجميع ، ضمية . نصالها سنانية شديدة وسننة الحار . ازهارها نورية التجميع

ليلكية اللون ، خاسية التقيق الوردي || ازهاره يستمر طول فصل الصيف .

٢٢٤٧٤ - قَلْب

Cœur (F). Heart (E).

عضو عضلي اجوف . وهو العضو الرئوي في الجهاز التنفسي لان عمل عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزه عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار .

والقلب مركب من جزئين : ايمن ، يحوي الدم القاسد وايسر ، يحوي الدم النقي ويتكون كل جزء من تجويفين يعرفان بالاذن والبطين . ويتصل الاذن بالبطين الذي يقابله

بفتحة صمامية . ويتصل الاذن الايمن بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرئوي الذي يتفرع الى فروع اصفر فاصفر تعرف بالشعيرات

الدوية . ويتصل الاذن الايسر بالوردين الايمنين السفلي والعلوي . ويتصل البطين الايسر بالشريان الاهر .

اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اشرار الثانية فتجري حل الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة

الوردين الايمنين الى الاذن الايمن ثم يتدفق الى البطين الايمن ومنه يخرج عن طريق الشريان الرئوي الى الشعيرات

الرئوية التي تتجمع في فروع اوسع فتكون الاوردة الرئوية التي تحمل الدم المتأكسد وتصبه في الاذن الايسر

ومنه يتدفق الى البطين الايسر ثم يتدفق الى الاهر الذي

يؤين وصوله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .



قلاع شائع



قلوبس



قلوبس القَطَائِيَّات



قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

## Mallophages

## ٢٢٤٧٢ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

رَبْتِي حشرات قارضة من طبقة القمليات. فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح. اجسامها صغيرة مفلطحة. رؤوسها كبيرة وعريضة. تأثيرها قوية، قربها الاستثنائية قصيرة || تميش طفيلية على الليرير وبعض الحيوانات البورنة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدم الجاف. صنها وبشي الشكل اغبر اللون تصلصه حيث تتحتم ان بالريش او بالصوف او بالشرم فينفذ عن حوريات تنسلخ عدة مرات قبل اكتمال طورها || اشهر فصائلها القرمشيات والمفرنيات والتمناتيات.

## Alrain (F). Brass (E).

## ٢٢٤٧٣ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

سبيكة من معادن مختلفة اغصها النحاس والقصدير.

## Régurgitation (F).

## ٢٢٤٧٤ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات اغصها النمل. راجع للتقام.

## Drainage (F).

## ٢٢٤٧٥ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

هي عملية تصريف المياه من الآلية الربطة.

## Calotte (F).

## ٢٢٤٧٦ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

هي الآرسوة، اطلها.

## ٢٢٤٧٧ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

جاء في اللسان : نبات يكون منه اللاذن.

## ٢٢٤٧٨ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Cyon dukhunensis (S).

Colsun (F).

نوع من الكلاب المتوحشة المغترسة. ونهم من جملة نوعاً من الضفيل. موطنه غابات غشوات الهندوس وادي حلايا وكشير وأصام. جاعاته تمد من ٧ الى ١٢ زوجاً يرأسها ذكر سن. يقتصر الايل الاقرط وايل المسك واورية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منقسم التقاطع، ابيض القد، يطول نحو ١٠٥ سم. ذنبه نحو ٥٠ سم. وارتفاعه ٥٠ سم. اذنه ٨ سم. لويه الى الشقعة الصنابية تسمر بعض التي، في الصيف. بطة تبي اللون. سباله اسود الحلب. ذنبه جزيل الوبر الكثيف، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل.

## ٢٢٤٧٩ - قُلُوبُسُ أَسَدُ الرِّاسِ

Malathia melanocephalus (S). Malathe mélanocéphale (F). Malathia melanocephalus (E).

حشرة دامتة من فصيلة المبقوسيات ورية غديات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المتدلة الحرارة من الشرق الاذني واورية. تألف الاراضي المنقطة بالبراري الكثيرة الصخور حيث تراكم المواد النباتية من اوراق وعيل ورقش ونظام ... || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ سم. رأسها اسود اللون، قصير الخط. زباناها عيطيان مستطيلان. عينها كيرتان جاسفتان. كيرتها محذوب السطح، احمر اللون. ظهراتها جزوي اللون، معتدل الاحدياد، مستدير الطرف الاصح، ثنائي التميز التمذي القاطب. ارساغها خالية من القمل || الاثنى اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه وقدر زبانا || لها جيل



قُلُوبُسُ أَسَدُ الرِّاسِ

الممكن مبيادياً على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٢٢ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خفي القشار. ثوبها اخضر يملو تجنيم منترس اصفر. رأسها كستني اللون. مدبها ورواجبها الى الطلعة الخضراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحببها السرة على النبات المائل حيث تتدل.

## ٢٢٤٨٠ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Plebeius argus (S). Plebeius argus (E).

حشرة من القمليات ورية حرشيات الاجنحة. موطنها بعض المناطق المتدلة الحرارة من الشرق الاذني واورية. فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار. سرتها تميش على اوراق الرزائل والقصور والشيع والتندول || جسمها صغير القد يطول نحو ٩ سم. يسطها نحو ٢٥ سم. رأسها صغير الحجم. عينها كيرتان. زباناها مستطيلان، شبه صولجانيان. حوشها ويطنها الى الزرقه يطولها موج اغبر عند الذكر والى السرة الكستنية عند الاثنى || رواشن الذكر الى الزرقه البنفسجية يطولها حشار اسود وتهديب ابيض. رواشن الاثنى الى السرة الكستنية يطولها تهديب حنطلي ويطولها في الزوج الاثاني ثلاث نقط صناعية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في النهار. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن مبيادياً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٢٢ سم. جسمها بيضي الشكل، كثيف الحمل القصير، اخضر اللون اصفر المالح تملو خمسة خطوط سود. رأسها اسود. مدبها ورواجبها الى السرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقاً في النبات حيث تتدل السرة.

## ٢٢٤٨١ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Cordiforme (F).

Cordiform, Heart-shaped (E).

نعت تعربني يوصف به الشكل الذي يشبه القلب.

## ٢٢٤٨٢ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

في فصيلة السفريسيات، اطلها.

## ٢٢٤٨٣ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

القلت النقرة في الجبل يستنقظ ثوبا الماء. ج. قلات.

## ٢٢٤٨٤ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Salière (F). Eye-pit (E).

القرة فوق عين القوس.

## ٢٢٤٨٥ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

هو الدجر، اطلها.

## ٢٢٤٨٦ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Ano âgé (F). Aged ass (E).

القلع : الحمار المسن.

## ٢٢٤٨٧ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Irriguer (F). To irrigate (E).

قلع الزرع : سقا.

## ٢٢٤٨٨ - قُلُوبُسُ الرِّزَالِ

Arrosage, Part d'eau (F).

Watering, Share of water (E).

القلع هو السقي ويوم السقي ويقال : ما بين القلدين ظرم. وهو النصيب من الماء. يقال اخذ قلده ابي نصيبه من الماء. ج. قلدي واقلاد.

٢٢٤٨٨ - قَلْقُوسَةُ هَلَالِيَّةٌ \*

Calophasia lunula (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunula (E).

حشرة من فصيلة النسيقيات ورَبَّة حورثيات الاجنحة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها واشعة قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ سم. بسطها نحو ٣١ سم. رأسها حنطي اللون. عينها كبرتان. زباناها خيطيان. جوشها وبطنها الى الحنطي الاسمر المواج || درشانا الاسمايين، عند الشقين، الى الحنطي يعلو هلال ابيض ويتبعج اسمر وتجذع بني. درشانا الخلفيان الى الحنطي يعلو مواج اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تعاثل بعد ظهورها باسبوعين وتمتص المكن طلعاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، مائل القشار. ثوبها الى الزبداء السوداء تعلو خمسة خطوط مزدوجة قاطبة جزوية. رأسها الى الحمرة المرجانية. مدنها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من الطين.

٢٢٤٨٩ - قَلْقُوسُ

وما تقرر عن اسفل مياه السيول متشققة بعد نفوسها. والقلقة: قشرة الارض التي ترتفع عن الكماء قتل عليها (السان).

Colophane (F). Colophaque (F). Colophaque (E). Colophane (E).

٢٢٤٩١ - قَلْقَاسُ \*

Colocasía antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocasia, C. eatable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocasie (D). Colocasía, Aro egiziano, Gichero (I).

نبات عشقولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات. اصطناعه البلاد الحارة. ساقه ارضية عشقولية غليظة. اوراقه قرصية التجميع تقوم على مالميل مستطيلة منتصبه تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وهي كبيرة القد، قلبية الشكل، نصلها جامد الصفحة المتأرجحة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم. ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ سم. ضروبه الزراعية عديدة جميعها ترغب في الارربة الدبالية الرطبة. زراعتها تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهراً. محصوله وافر الانتاج. لباب عساقه بؤكزل بعد طبخه او نغمة بالماء لزوال ما فيه من مواد قارصة كاوية. ولبابه هذا يحوي نحو:

- ٢,٦٥ ٪ من المواد الازوتية.
- ٥,٥٦ ٪ من المواد الدهنية.
- ١٦,٨٢ ٪ من المواد الهيدروكربونية.

٢٢٤٩٢ - قَلْقَاسُ رُوسِي

هو عباد الشمس العشقولي، اطلبه.

واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد النباتية المنحلة والصائرة نحو الانحلال || البرقة عند بلوغها الادراك الجسودي تطول من ١٢ الى ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل. رأسها وصدرها وتظهر سكهما وترجها الى السمرة الكستنية القائمة. بقعها الظورية تنضيق وتضمر تدريجياً من سمكة الى سمكة مع ابتعادها عن الرأس. مدنها ورواجها اقل سمرة من رأسها. درقتها مجعرة باسنان حادة. فكها خيليان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في مجهر البرقة طليقاً من كل غلاف.

٢٢٤٩٠ - قَلْع - Arracher (F). To pull (E). قلع النبات: استخرجه من التربة.

٢٢٤٩١ - قَلْعٌ، حَكِي، احْتِفَاق - Arrachage (F). Pulling up (E). استخراج النبات من التراب.

٢٢٤٩٢ - قَلْف - Phloem القلف هو الجزء الداخلي من لحاء الشجر يتميز بيوبيد الاوعية الغربالية المقطع التي تنقل النسج الغذائي الكامل.

٢٢٤٩٣ - قَلْفٌ - Ecorer (F). To bark, To strip (E). قلف الشجرة: نزع منها لحاءها.

٢٢٤٩٤ - قَلْقَاقُ - Calophaca (S). Calophaque (F). Calophaque (E).

جنس نباتات مجلية معمرة من فصيلة النسيقيات. موطنها يمتد من الشرق الاذن الى اواسط القياي الروسية. سوقها قرعاء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مركبة وثرية العدد اذهارها صفراء اللون، عشقودية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

٢٢٤٩٥ - قَلْقَاقُ الصُّلْبُوكَا - Calophaca Wolgarica (S). Calophaque de la Volga (F).

نوع من القلقاق. موطنه القياي الروسية. ساقه تملو نحو ١٠٠ سم. افئاده منتبضة الاعتداد، الحولية منها خلية اللحاء، مبشرة اللغد الدهنية. اوراقه مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ١١ الى ١٩. وديقاتها صغيرة، خلية النصال. اذهارها صفراء اللون، تطول نحو ٢ سم. || تنويره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٢٤٩٦ - قَلْقَاقُ كَبِيرُ الزُّهْرِ - Calophaca grandiflora (S). Calophaque à grandes fleurs (F).

نوع من القلقاق. موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان. ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افئاده جرداء اللحاء، عادمة اللغد الدهنية. اوراقه مركبة وثرية العدد الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧. اذهارها صفراء اللون، تطول نحو ٣ سم. || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٤٩٧ - قَلْفَةٌ - نبات اخضر له ثمرة صفيرة والمال عليها حريص (السان).



قَلْقُوسَةُ هَلَالِيَّةٌ



قَلْقَاسُ



٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها تشبه ورق الزراب. أزهارها صغيرة القد صيوانية التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

### ٢٢٥٠٢ - فُلُقْلُقَة مَلَسِيَّة

*Minuartia laricifolia* (S). *Alsine à feuilles de mélèze* (F).

نوع من الفقلقة منبها الأثرية الرملية. ساقها تملو من ١٢ إلى ٢٠ سم. أوراقها مليسية الشكل مجنبة النصل الدقيق. أزهارها متعاقبة الإزكاكاز على الساق، كبيرة القد مستطيلة البتلات || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.



فلقة

*Alsines* (F).

### ٢٢٥٠٣ - فُلُقْلُقِيَّاتٌ

سبط من فصيلة الفلوقليات.

*Geotrupes* (S). *Géotrupe* (F). **فُلُقْلُقِيَّة**

جنس حشرات من الجعلليات. أنواعه عديدة جميعها راسمة نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتختطف المواد العضوية المنحللة || أشهر أنواعه فقلوقة البراز.

### ٢٢٥٠٥ - فُلُقْلُقِيَّة الْبِرَازِ \*

*Geotrupes stercorarius* (S). *Géotrupe stercorale* (F). نوع من الفقلوقة طويلا يراوح من ١٨ إلى ٢٥ م. جسمها بيضي الشكل مفلطح الجرم صفحته العليا إلى السواد الأخضر المواجه صفحته السفلى إلى الزرقاء الخضراء المواجه تسرح من غروب الشمس إلى أواسط أو أواخر المخرج الثاني من الليل. قوتها البراز أحمر دوث اللواب. عجزها سرداب ينور من التربة ترسف فيه كامل مكها بعد أن تلتفه بلحاف تحين من الروث بهذه الحرارة اللازمة حتى تنفث ثم التوت الفروري حتى الانسلاخ.

### ٢٢٥٠٦ - قَلَمٌ، قَلَمٌ، قَلَمٌ السِمْعَةِ، حَامِلُ السِمْعَةِ

*Style*

أحد أجزاء مدقة الزهرة وهو غيط أجوف يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

*Greffon* (F). *Graft* (E). **قَلَمٌ**

هو العلم.

*Bouture* (F). *Slip* (E). **قَلَمٌ**

القلم والمعلقة والفلة قفص أو جزء من قفص يفصل عن النبات ويغرس. راجع عقلة.

*٢٢٥٠٩ - قَلَمَتَتٌ* هو نمع البر، اعطيه.

*٢٢٥١٠ - قُلُقْبَاقٌ، رُشْدِيَّة*

جنس انجار مشرة من فصيلة الحماضيات. أنواعه المعروفة اثنان. منبها البلاد الحارة اعصها المهند. سورها منتصب. افضالها دائمة منفرجة. أوراقها متعاقبة مركبة ريشية. وريقاتها اعليجية شغيفة. أزهارها عقدوية التجميع، محورية الإزكاكاز، طرفية. ثمارها يفسية مستطيلة، لهايا حامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطباً ومرباً. وهو من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الأثرية القليلة والمتوسطة الاندماج || يتكاثر بالبرزر. انجاره زهر وتثمر طوال السنة.



فلوقة البراز

*٢٢٤٩٣ - فُلُقْلُقِيَّاتٌ* *Araceae, Aroidaceae* (S).

*Aracées, Aroïdées, Aroidacées* (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجتمع إلى ثلاثة اسباط: الرسيات والرنسيات والوحيات. نباتاتها جذمورية أو صفولية معمرة. معظمها بري وبعضها زراعي وتربتي || عساقلها لتخلو من المواد الكاوية السامة التي يفصل مفعولاً بعد الدلي أو التثع بالماء أو التخميص على النار.

### ٢٢٤٩٤ - فُلُقْلُقِيَّاتِي كُوبَة

*Starnæna cyanocephala* (S). *Colombi-perdrix cyanocephale* (F).

طائر من الفلقانيات وفصيلة الحمايات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة رأسه رصاصية اللون زرقاء المواجه، محاسره وقفته وزوره سود. ثوبه منطلي اللون المايق يعلمو موج جوي. صدره إلى الجذوة الخمرية. منقاره احمر الانتشاب ازرق اللواقط. ارجله حر || يألف الاسراج والمناطق الصخرية. اسرابه صغيرة يراوح عدد افرادها من ١٢ إلى ٤٠. قوته الثار والحبيب والبلور. ينش في الجينات والاشجار القليلة الارتفاع. اناته تبيض بيضتين.

*٢٢٤٩٥ - فُلُقْلُقِيَّاتِي* *Colombi-perdrix* (F).

جنس طير من فصيلة الحمايات. أنواعه قليلة تتميز بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. مناقرها قوية مخدبة. اجنتها قصيرة شبه مستديرة، اذناها عريضة مستديرة. ارسافها طويلة، اصابعها قصيرة. غالبها قوية || أشهر أنواعه فلقاني كوبيه.

*٢٢٤٩٦ - قَلَقْدِس* *Vitriol vert* (F).

هو الزراج الاخضر، اعطيه.

*٢٢٤٩٧ - قَلَقْدِسٌ* *Vitriol vert calciné, Calcitis* (F).

هو الزراج الاخضر المكلس.

*٢٢٤٩٨ - قَلَقْلٌ، قَلَقْلٌ*

هو السنا البري. ثمرة تقارب الرمان تحمل حباً اسود مستديراً في حميم القلقل أو اكبر يبرأ املس فيه لزوجة وحلاوة حسن الثم وبق هذا الشجر اللغات.

*٢٢٤٩٩ - قَلَقْلَة \** *Minuartia, Alsines* (S).

*Alsine* (F). *Alsine* (E). *Scieinleré* (D). *Alsina, Centocchio* (I).

جنس نباتات شبيهة برية معمرة من فصيلة الفلوقليات. أنواعه المعروفة نحو ١٢ منبها الشرق الأدنى وأروبية الجنوبية. جميعها صغيرة القد قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة نصالها مخزنية أو هدية الشكل. أزهارها صغيرة الحجم يبيض اللون || اعرفها ما يتبع:

*٢٢٥٠٠ - قَلَقْلَة كَانِيَّة* *Minuartia liniflora* (S).

*Alsine à fleurs de lin* (F).

نوع من الفقلقة، منبها الأثرية الكلسية. ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها منتصبه جامدة مهدبة. أزهارها صغيرة القد متعاقبة تشبه زهر الكتان. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

*٢٢٥٠١ - قَلَقْلَة لَزَاجِيَّة*

*Minuartia juniperina* (S). *Alsine à feuilles de genévrier* (F).

نوع من الفقلقة، منبها الحماض والجبال. ساقها تملو من

## ٢٢٥١١ - قَلْبَاقٌ لَدِيدٌ \*

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambole, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambole (D). Averroa carambola, A. acellare (I).

نوع من القلباقي. شجرته صغيرة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها عابلة. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأزواج. تصلها مالمس البشرة، قائم الخضار. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها اهليلجية الشكل، خماسية التخديد، صفراء اللون، غصراء المواج. لبها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قَلْبَاقٌ نَسْوَةٌ. Plexus (E). Bonnet, Réseau (F). قسم من أقسام عدة المجترات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبألم التلافيف من الجهة الثانية. راجع عمدة.

٢٢٥١٣ - قَلْبَاقٌ نَسْوَةٌ هي الارسوة، اطلبها.

٢٢٥١٤ - قَلْبَاقٌ نَسْوَةٌ. Collinsia (F). Collinsia (S). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها عديدة منها البرية والزراعية الصياغية والتزيينية. مهدها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متعابلة. أزهارها زاهية اللون فضية التجميع متتالية || تتكاثر بالبر. ترطب في التربة الحارة الجافة المواد الغذائية. أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي :

٢٢٥١٥ - قَلْبَاقٌ ثَنَائِيَّةُ اللّون. Collinsia bicolor (F). Collinsia bicolor (S). عشبة تزيينية زياء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معتقة تصلها ساني الصفحة، سنن الحافة، قلبي القاعدة. أزهارها ثنائية اللون فيها البنفسجي والايض. أزهارها يستمر من أيار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قَلْبَاقٌ رِبَسِيَّةٌ. Collinsia verna (S). Collinsia printanière (F). عشبة تزيينية مزهجرة. ساقها منتصبه فراء تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة تصلها خللي البشرة سنن الحافة. أزهارها الى الزرق. اطراف بتلاتها يبيض وهي متوسطة القد مستطيلة الاذن || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قَلْبَاقٌ صَيَاغِيَّةٌ. Collinsia tinctoria (F). Collinsia tinctoria (S). عشبة صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لاطئة، اهليلجية، تصلها غدي الصفحة المثلثة. أزهارها الى البياض الاصفر المواج يملو توشيح ارجواني. أزهارها سني.

٢٢٥١٨ - قَلْبَاقٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَر. Collinsia grandiflora (S). Collinsia à grandes fleurs (F). عشبة تزيينية سرحة. ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها اهليلجية سميكة النصل المادم التسنين. أزهارها الى الزرق الموشحة بالوردي. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجتمعة. أزهارها يستمر من أيار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْبَاقٌ نَسْوَةٌ. Stylidium (S). Stylide, Stylidier (F). جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة القلبيات. أنواعها المعروفة ثلاثة جميعها تزيينية تزور



قلباق لديد

في المراكب وفي المواقع الرطبة شرط ألا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها متباينة الاشكال وبها المصفية. أزهارها حيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْبَاقِيَّاتٌ. Stylidiaceae (S). Stylidiacées (F). Stylidiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات منخفضة المبيض. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها نباتات عشبية وغشوية ترطب في المواقع الرطبة والمناطق اشهر اجناسها القلطفة.

٢٢٥٢١ - قَلْبَاقٌ نَسْوَةٌ هي القصور، نبات بري طبي معمر.

٢٢٥٢٢ - قَلْبَاقٌ. Outardeau (F). Young bustard (E). فرخ الجباري (اللسان).

٢٢٥٢٣ - قَلْبَاقٌ. Chamelle jeune (F). Young she-camel (E).

قال الجاحظ : « الشاة من النوق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تنثي فاذا انثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٤ - قَلْبَاقٌ، قَلْبَاقٌ. Alcalin (F). Alkaline (E). قال الجاحظ : « الشاة من النوق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تنثي فاذا انثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٥ - قَلْبَاقٌ، قَلْبَاقٌ. Alcalinité (F). Alkalinity (E). خاصية المواد القلوية. وهي اعتماد مقدار الدائف، في محلول ما او محيط ما، من رقم الاعتدال المعين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دائف.

٢٢٥٢٦ - قَلْبَاقٌ، شَيْبَةُ قَلْبَاقٍ. Alcaloide (F). Alkaloid (E). مادة عضوية تتميز بغوامها المشابهة لغوامس القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْبَاقٌ هو اثنان القلي او الحرض، اطلبها.

٢٢٥٢٨ - قَلْبَاقٌ، قَلْبَاقٌ. Alkali (F). Alkali (E). مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبوتاس والصودا والمغنيزيا.

٢٢٥٢٩ - قَلْبَاقٌ. Pâurin commun (F). هو تف البر، اطلبه.

٢٢٥٣٠ - قَلْبَاقٌ خَطْمَاءٌ، قَلْبَاقٌ الزَّرْع. Aelia rostrata (S). Aelle rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة القاسيات. جسمها مفلطح، اهليلجي الشوزن، يطول نحو ١٢ مم. ثوبها الى الخفسار الاصفر المواج يملو تبشير اسمر يمتد من الرأس الى الكوسل فالجلفة فالحنجين. رأسها مخروطي. غصنها مستطيل. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كوسلها قلمي الشوزن. حجبها وحجبها سنانة الاطراف، متقاربة الطول. قشراتها شفاف. يعلها وقوامها الى الخفسار الاصفر الاسمر المواج || مرتها النباتات التجيلية وبها الزروع || راحتها كرمية.

واجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها عشوية . التعامل يتم البطن على البطن واست الواحد في قم الآخر || أشهر فصائلها الخرطونيات .

Callianthemum (S).

٢٢٥٣٩ - قَلْبَت

Callianthème (F).

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الشقيقيات . أنواعه المعروفة قليلة جميعها اشباح جبلية برية تعيش في المناطق التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جذورها جنيشة يتوسطها شراخ يعمل حسب الانواع من ١٠ الى ٣٠ سم . وينتهي زهرة متوسطة القذ يفضاء اللون او وردية براوح عدد بتلاتها من ٦ الى ١٦ . اوراقها جلدية الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة ومفرصة . اعرف انواعه قلبت سدائي الورق C. rutaefolium (S). قلبت كزبري الورق C. corlandrifolium (S).

Saillir (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قَم

قم واقم الفحل الاابل : اشتتل عليها وضربها كلها .

٢٢٥٤١ - قِمَاء

القِماء : الاماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قَاء .

Ectopistes

٢٢٥٤٢ - قِمَارَى

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحانيات . يتميز باستطالة جناحيه واظفكيه . منقاره دقيق البنية . رصنه قصير وسرول . حبله الاوسط بين الانعفاف . واحد قري اطله .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِمَاط

Reproduction of the birds (E).

القِطاط : سفاد الطير . وقيل زين ترصع الطير .

Acidie (F). Ascidium (E).

٢٢٥٤٤ - قِمَاعَة

عارض جسموري يكثر في المالح ، يشو اوراق النبات بتريداته النصيلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قِمَاعَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة النونيات . انواعها المعروفة ستة منها بعض اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || سوفها فراء ، معظمها منتصب وبضها مستلق . اوراقها متعاقبة ، فصالحا لحسية ، سنانية الشكل ، مخنجة ، خلية البثرة . ازهارها لاقياسية التجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية . اوراقها تراوح بين الودي والودي الاخضر او الازرقواني الموالج .

٢٢٥٤٦ - قِمَام

ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قبل عن حالة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِمَام هو الاس المذهب الورق ، اطله .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِمَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنجنيات انواعه نحو ٤٠ فيها الشجيرات والجنات والجنات ، سوفها فراء . اوراقها متعاقبة متبادلة . ازهارها وريّة التجميع ،

Kellya (S).

٢٢٥٣١ - قَلْبَة

Kellya (F). Kellya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم وفصيلة البرسنيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها صغيرة . اصداها قبابية شبه صويانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المائدة .

٢٢٥٣٢ - قَلْبِس

ما يترك من السل منه اشتباهه او ما تمجه النحل من السل في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - قَلْبَسَة مُسَجَّجَة

Callistus lunatus (S). Calliste orné (F).

Callistus lunatus (E).

حشرة واجمة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والمغصاب البحرية الممرض || جسمها صغير القذ يطول من ٦ الى ٧ م . رأسها قصير الخطم ازرق اللون فكها ضليمان . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عينها صغيرتان . كرسها احمر اللون . ظهورها الى الخمرة الزاغية تملو اربع بقع كبيرة ويقبجان صغيرتان لونها الى السواد الازرق الموالج || لها جيل واحد في الحول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقها تطول من ١٠ الى ١١ م . جسمها مربع السكر ، اضحل اللون اسمر اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضليح التأثير الحادة . قوتها المواد العضوية تسمى اليها بدون انقطاع لانها شديدة النهم || طور الاكمال يستمر نحو خمسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْبِسِيَّات

Callistides (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة قانصة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم واخصها البلاد الحارة || جميعها صغيرة القذ او متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجسامها خلية القشار ، جميلة الالوان الزاغية اللامعة . رؤوسها شبه اسطوانية الجرم ، ناشزة العيون ، مستطيلة الزباني ، معتدلة الكوالم اللاقياسية الشكل ، لاحقة الاغداد التساعية الاغاديد المتزاوية || تسرح في النهار وتبيت في الليل . تسمى بسرعة ورشاقة وتعتبر بصفة || قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تمت من فريسة تستطيع اليها سيلا || أشهر اجناسها القليلة والشائنة .

٢٢٥٣٥ - قَلْبِسِي

هو ابلق القلع ، صفصور من الجواثم صغير القذ ابلق التوب يكثر من الوقوف على الصخور ولذا سمي قَلْبِسِي .

Fruits desséchés (F).

٢٢٥٣٦ - قَلْبِف ، قَلْف

Dried fruits (E).

هي الثمار المجففة الموضبة .

٢٢٥٣٧ - قَلْبَقَلَّة هي السبرغولة ، اطلها .

Oligochaetes (F).

٢٢٥٣٨ - قَلِيلَات الْهَلَب

Oligochaeta (E).

رتبة من الحلقيات المفرديات تتميز بخلوها من الولاس والايل والنايم . اما هلبا فشد القصر ، قليل العدد اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها



قَلْبَة



قَلْبَة مَبْجَة

اوراقه ابيدة نخيلة ملتفة الاطراف تطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستقطر منها مشروب كحولى لذيد الطعم. اوراقه وافنائه وجذوره عاصفة تستعمل في الدبابة.

### ٢٢٥٥٥ - قِيَام كَبِير الثَمَر

*Vaccinium macrocarpum, Oxycoccus macrocarpa* (S). *Airelle à gros fruits, Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القِيَام، جنينه مثدودة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سنانية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفعة ملئت الحنار. ازهاره لاقواسية التجميع فيها الاحادية والثلاثية والخناسية والسبابية والتناسية. ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

*Vaccinium arboreum* (S). *قِيَام مُشَجَّر*. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القِيَام، شجرته تملو من ٤ الى ٨ امتار. فروعها وافنائه خالية اللحاء. اوراقها عابطة سنانية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد التسنج، مالمس الصفعة العليا اللامعة الخضار، خلى السفلى البحرية اللون. ازهاره الى البياض الوردى. ثماره سود حامزة عاصفة لا تؤكل.

*Ordures des villes* (F). *Ordures de city* (E).

بقايا الماطبخ وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

*Vacciniées* (F).

سبط من فصيلة الخنجات يشمل بعض الاجناس والانواع. معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة. اشهر اجناسه القِيَام.

*Nanisme* (F). *Nanism* (E). *قُمَاة*.

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تمتنع عن اتخاذ حجمها المألوف فتلبث صغيرة. من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

*Vertex*

*قمة الرأس* هي النافوخ، اطلبه.

*Triticum* (S). *قَمَح \* حِنْفَة*. *Blé, Froment* (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات جلورها جرة دقيقة. سوقها شطاء، قصية، اسطوانية، مستقيمة، فارقة، سلاية التركيب، مصمتة العقد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها محورية مركبة من عدة سفيللات متتالية. اما الاشطاء فانها ترسة الانتشاب وهي حل فنتين امهات ونباتات فالامهات تلك التي سوقها وسنايلها تطول قدر السيلة الرئيسية اما البليات فتلك التي تتأخر عن الامهات وقد تكون سنايلها عادمة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين: غمد طويل ملتف يرتكز على العقدة ويحفن السلاى ونصل ضيق مستطيل يدعى المصقلة يرتكز عند قاعدة انفصاله عن الغمد على لسين مسن الحنار وعلى اذنين تكثفان الساق || اما ثمارها فيايسة لانفجرة تدعى البر. الواحدة برّة. تلوّثه - راجعه في كلمة حنفة.

محورية الازتكاز. ثمارها عنبة الشكل، حامزة الطعم. مأكولة || احرف انواعه واشهرها ما يلي.

### ٢٢٥٤٩ - قِيَام أَحْمَر \*

*Vaccinium vitis-idaea* (S). *Airelle rouge, Myrtille ponctuée, Vigne de l'Ida* (F). *Cow-berry, Whim-berry* (E). *Preisselheidelbeere* (D). *Bacéri vite Ida, Mortella punteggiata, Vigna d'orso* (I).

نوع من القِيَام جنينه جبال البلاد المعتدلة الحرارة. جنينه تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سنانية صغيرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القرمزية يستخرج منها بعد تخميرها وتقطيرها مشروب كحولى لذيد الطعم.

### ٢٢٥٥٠ - قِيَام آسِي \*

*Vaccinium myrtillus* (S). *Airelle myrtille, Abretier, Myrtille* (F). *Bilberry, Blackberry, Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Bacéri mirtillo, Mirtillo, Uva ursina* (I).

نوع من القِيَام. جنينه فناء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد التسنج اخضر الصفعة. ازهارها وردية، خناسية الفصوص، عشارية الاسدية. ثمارها خرية اللون مأكولة ويستقطر منها كحول لذيد الطعم || جذوره وافنائه واوراقه تستعمل في الدبابة.

### ٢٢٥٥١ - قِيَام المَنَاقِع \*

*Vaccinium uliginosum* (S). *Airelle des marais, Canneberge* (F). *Crauberry, Moss-berry* (E). *Mosshelbeere* (D). *Mortella di palude, Mortellina di lago, Scopa fruttifera* (I).

نوع من القِيَام المبدول يكثُر في المناطق الرطبة، ساقه فراءه تملو نحو ٨٠ سم. اوراقه عابطة صغيرة، القد، نصلها سناني الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحته بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطعم مأكولة وصالحة للتقطير.

### ٢٢٥٥٢ - قِيَام جَبَلِي \*

*Vaccinium arctostaphylos* (S). *Airelle de Cappadoce, Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry, Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tè di Brousse, Vaccinio di Cappadocia* (I).

نوع من القِيَام يكثُر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفعة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قديمة الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عصفا حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

### ٢٢٥٥٣ - قِيَام عُنْكَرَلِي \*

*Vaccinium corymbosum* (S). *Airelle à corymbes* (F). نوع من القِيَام جنينه تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها وافنائه سرحة. اوراقها عابطة تطول نحو ٧ سم. نصلها مدند الصفعة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خناسية او سبابية التجميع، عشكولية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة ومناعية كحولية.

### ٢٢٥٥٤ - قِيَام صَغِير \*

*Vaccinium oxycoccus, Oxycoccus palustris* (S). *Airelle commune, A. à maurets, Canneberge commune, Brimbelles* (F). *Small cranberry, Bog-berry, Feu-berry* (E). *Moosbeere* (D). *Bacéri canneberg, Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القِيَام، ساقه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المنايع



قام جبلي



قام صغير

**٢٢٥٧٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَاس**

Triticum durum (S), Blé dur (F).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. ضروبه واصرامه كثيرة العدد. سوقه مسننة او جوفاء. سنابله مقوية. بره مستطيل الشكل صلب المكسر.

**٢٢٥٧٨ - قَمْحُ لَبْن**

Triticum sativum (S).

Blé tendre (F), Common wheat (E), Saatweizen (D), Fromento comune, Frumento, Biada, Grano (I). من الانواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الأوروبية والأمريكية ضروبه كثيرة العدد واصرامه ايضاً. سوقه جوفاء سنابله كبيرة القد منها السفوية واللاسفوية. بره لاقشاسي الشكل والدون. لين المكسر اللينقي.

**٢٢٥٧٩ - قَمْحُ تَشْرِي**

Triticum dicoccum, T. amyleum (S), Blé de Jérusalem, Amidonnier (F), Two grained wheat, Emmer wheat (E), Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn (D), Fromento di Gerusalemme (I).

من الانواع المكشبة. زراعته محصورة ببعض جبال اربوة الوسطى والشرق الاذن. ضروبه واصرامه قليلة. سوقه فارغة. سنابله كثيفة مقوية. بره حنطي اللون، ابيض المكسر، غزير المادة التشوية.

**٢٢٥٨٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الْحَبَّةِ**

Triticum monococcum (S), Blé locular, Engrain, Petit épeautre (F), One grained wheat, Small spelt (E), Einkorn, Einkornweizen (D), Fromento loculare, Piccola spelta (I).

من الانواع المكشبة. زراعته معروفة في ألمانيا وهنغاريا وروسيا. ساقه فارغة. سبلك مستطيلة مقوية. سليلاته وحيدة الحبة. بره حنطي اللون اصفر المواج.

**٢٢٥٨١ - قَمْحَر**

Lune (F), Moon (E).

جرم سماوي كروي الشكل يشهد ضوؤه من الشمس ويمكس على الارض. وهو اقرب الاجرام اليها فقلره يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلثي من حجم الارض وهو يدور حولها في فلك اهليلجي بعد اوجيه منها، وهو المسافة القريبة، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. ويمسد قسيميته، وهو المسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || ولقمر ثلاث حركات، البيوتية واليالية والصمودية وهو يتنجز دورته حول الشمس في اربعة اسابيع. والحركة الصمودية هي التي يشهد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد ايامها ٣٥٤ يوم اي انها تنقص ٥٨ دقيقة عن السنة الشمسية || اما الشهر القمري فلدته ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

**٢٢٥٨٢ - قَمْحَر**

Caranx luna (S).

نوع من السم. وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة القد تظول نحو ٦٥ سم. اطائها مياه مجار البلاد المعتدلة توجد في المتوسط. تكثر في مناطقه النيلية.

**٢٢٥٨٣ - قَمْحَر التُّفَّاح (F).**

Echadure lenticulaire (F), Lenticel spotting, Apple scald (E).

عارض يصيب ثمار التفاح والاباحس اخفونة في البراد سببه تجمع بعض الغازات الناتجة عن تنفس الثمار في اثناء تخزينها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضاء اللون تملو سطح البشرة ثم تنتشر رويداً رويداً الى ان تغطيها بكاملها فتسبب عندئذ عطب الالباب على عرق يراوح من ٢ الى

القيمه - يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين اناته واستحصاده الى كمية من السرعات الحرارية يراوح قدرها بالنسبة الى مختلف ضروبه واصرامه من ١٧٠٠ الى ٢٣٠٠ سعرة. ولا يحصل انتاش اذا كانت الحرارة دون الست درجات سنغ. او فوق ٤٥ درجة سنغ. اما اصحح حرارة لانباته فهي التي يراوح مدها من ٢٢ الى ٢٨ درجة سنغ. لذلك يمكن القول ان اقلهم الخطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبلية العالية ومناطق غط الاستواء التي يراوح ارتفاعها من سطح البحر من صفر الى ٢٠٠٠ م. ترتبه - يثبت القمح في مختلف الارربة التي ألفها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الارربة العميقة الغور المنسوبة التركيب الحكمي المتوسطة الانتماع التي تستوعب الامطار وتحافظ على الرطوبة ولا ينجو في الارربة الكلسية والويلية لانها تجف سريعاً وهو يخشى الارربة الطينية المندجة لانه يتضرر من تماسكها ومن مغاييل نقيضها الرطوبة المفرطة والجفاف الزائد.

انواعه - انواعه الزراعية سبعة اما ضروبه واصرامه فثلاثة العدد. وانواعه الرئيسية هذه تقسم الى قسمن : الانواع الجرد وعددها اربعة والانواع المكشبة وعددها ثلاثة. فالانواع الجرد التي يفصل فيها البر عن عصيفاته والتي تتميز بلين قمار سنابله ولدانها وعدم انفصالها، اربعة : القمح الصلب والقمح اللين والقمح البولوني والقمح الششين. والى الانواع المكشبة التي لا يتفصل برها عن عصيفاته والتي يسهل انقسام سنابله وقصصها فهي : القمح الربوي والقمح التشري والقمح الوحيد الحبة.

**٢٢٥٨٤ - قَمْحُ الْبَرْ**

Sarrasin ménager, Bucall (F).

هو السرازان المعروف، اطلبه.

**٢٢٥٨٥ - قَمْحُ الْبَرْ الهندي**

Blé de Tartarie (F).

هو السرازان التشري، اطلبه.

**٢٢٥٨٦ - قَمْحُ بُولُونِي**

Triticum polonicum (S), Blé de Pologne, Froment de Pologne (F), Polish wheat (E), Polnischer Weizen (D), Fromento di Polonia (I).

من الانواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق اربوة وافريقية الشمالية. ضروبه واصرامه عديدة. بره شديد الاستطالة، جامد المكسر الصلب.

**٢٢٥٨٧ - قَمْحُ ثَخِين، قَمْحُ عَرَبِي**

Triticum turgidum, T. vulgare (S), Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F), Humpy grained wheat, Turgid wheat, Rivet wheat (E), Englischer Weizen (D), Fromento turgido, Grani grossi (I).

من الانواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الارربة الحوارة الوافرة المواد الغذائية. ساقه مسننة في اعلاها. سبلكه مربعة الاصلع، كثيرة البر. برته غليظة عديدة، صلبة المكسر.

**٢٢٥٨٨ - قَمْحُ رُؤُوسِي، قَمْحُ مَكْتَسَر، عَتَس، عَتَد رُؤُوس**

Triticum spelta (S), Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre (F), Spelt wheat, Dinkel wheat (E), Spelz-Weizen (D), Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I).

من الانواع المكشبة. زراعته محصورة بالاقليم الباردة والجبلية. ضروبه واصرامه معدودة. سوقه عالية فارغة. سنابله فرقة، مستطيلة، سفوية، لونها يختلف باختلاف الضروب منها الابيض والاحمر والاسمر.



نح

٢٢٥٨٠ - قَمَرُون \* هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قَمَرُون رَشِيق (F). *Gnatophyllé élégante*

دويبة من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم غير . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قَمَرِي Lunaire (F). Lunar (E).

٢٢٥٨٣ - قَمَرِي Luniforme, Lunulaire (F). Luniform (E).

نمت تمريني يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قَمَرِي \* *Ectopistes migratoris* (S). *Ectopiste migrateur* (F).

طائر من القاربي وفصيلة الحماميات كنيته ابو ذكري وابو طلحة . الانثى قرية والجمع قاري وقر  $\parallel$  يروى ان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لما نقل زوجته عاتكة ، نزولاً عند رغبة ابيه ، كان ينشد :

اعاتك لا انسانك ما ذر شارق

وسا ناع خير الحمام الملوّق

ولم ار مثلي طلق اليوم مثلي

ولا مثله من غير جرم يطلق

اعاتك قلبي كل يوم ويلي

الك بما تحني النفوس معلق

ها خلق جزل ورأي وينصب

وخلق سوي في الحياة ومنطق

فرق له ابو وامره ان يرجعها  $\parallel$  والقري طائر طوله نحو ٤٠ سم . ظهره الى الزرقه الرصاصية عنقه بنفسجي المواج . صدره وبطنه الى الصبغة الصنافية . زمامها ابيض الريش . افيئكه رصاصي الانتشاب اريد الطرف متمزقه بقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطوار والحافة . منقاره اسود . عيناه برتقاليّتان ، جفونها حر . الانثى اصغر قدماً من الذكر وادكن ثوباً واقل مابة  $\parallel$  موطنه فسح الارباء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سميّاً وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشي . اسرابه كثيفة يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ . قوته الحبيب والبذور . يدن عشه في الاشجار . اناته تبيض من المراتين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قَمَرِيَّات Menispermaceae (S).

٢٢٥٨٥ - قَمَرِيَّات Menispermaceae (F). *Ménispermées* (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين ، اسباطها ٤ اجناسها ٣٠ وانواعها ١٠٠ . اعطائها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهار . معظمها من اجنبات العارضة . اوراقها متعاقبة منعقة . ازهارها صغيرة القذ ، عذوقية التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نووية صغيرة الحجم .

٢٢٥٨٦ - قَمَرِيَّة هي حشيشة القمر ، اطلبه .

٢٢٥٨٧ - قَمَرِيَّة \* ، حَبّ الهلال ، سَمّ الحَوْت

*Ménispermum* (S). *Ménisperme* (F). *Moonseed* (E). *Mondsamer* (D). *Ménisperme* (I).

جنس نباتات عارضة من فصيلة القمريات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها متعاقبة منعقة كاملة او مفصصة . ازهارها صغيرة القذ ، ثنائية المسكن ، عذوقية التجميع ، ثمارها نووية لا تخلو من المواد الحذرة تستعمل في صيد السمك  $\parallel$  اشهر انواعها ما يا ، :

٥ م .  $\parallel$  يمكن اجتنابه ١ بالتبريد المنتظم والتهوية الطبيعية . ٢ بعدم الافراط في ري الاشجار قبل نزن الحني . ٣ بجني الثار عند بدء ادراكها حيث تكون نسبة المواد الاثيرة المختلطة على احسن حال .

٢٢٥٧٤ - قَمَرُ اللَّيْلِ \* *Citharinus Geoffroyi* (S). *Citharine du Nil* (F). *Citharinus* (E).

قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه يبيض من مفتوحات المائات وفصيلة السلمونيات . موطنها النيل من منبعه الى مصبه . تعيش في الاسماك والاورحال  $\parallel$  جسمها كبير القد ، مبط الجرم ، بطول نحو ٥٠ سم . عرضها من حافة بطنها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الاولى ، نحو ٢٥ سم . رأسها صغير الحجم ، شبه اسنفي الشكل . شدتها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الاولى كبيرة القذ شبه هريبة الشكل ، اما الثانية فصغيرة . زعانفها الصدرية والخصوية صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مستطيلة ناعثة المقدم . زعنفتها الذيلية فارقة ، رحية الانفراج  $\parallel$  لوها الى الشبهة الغفيرة مما دعى الى تسميتها بقمر الليل  $\parallel$  لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٢٥٧٥ - قَمَرَاءَ *Fauvette des Jardins* (F).

القمراء طائر من الدعاخيل يدعى دخلة اليساين ، اطلبه .

٢٢٥٧٦ - قَمَرُوش \* *Glomeris* (F).

*Glomeris* (E). جنس دويبات من فصيلة القمروشيات . انواعه عديدة جميعها شبه اسطوانية الشكل طولها يراوح من ١٢ الى ٢٠ م . اجسامها مركبة من ١٢ حلقة . جرامرها ٣٤ . ثوبها الى السرة . تعيش تحت الحجارة . قوتها المواد النباتية المنحلّة تسرح في الليل وتتكور في النهار .

٢٢٥٧٧ - قَمَرُوش مُهَدَّب \* *Glomeris marginata* (S). *Glomeris marginé*.

*Glomeris bordé* (F). *Margined glomeris* (E). دويبة دامت من فصيلة القمروشيات ورتبة الدغداخيات شفويات الاحتاك  $\parallel$  جسمها صغير القد ، محبب السطح الملوي ، منبسط الملب . الذكر اصغر قدماً من الانثى يطول نحو ١٢ م . والانثى تطول نحو ٢٠ م .  $\parallel$  رأسها مستعرج الشكل ، قليل التنوء . عيناه زنجيتان . منكما قارض قاضم . زباناها صغيران مخيلان . جرامرها قصيرة تعد ١٧ زوجاً عند الذكر و١٩ زوجاً عند الانثى . ثوبها اسود اللون ، احبل الحمل الكثيف . مدبها الى الطلعة التبرار  $\parallel$  تعيش تحت الحجارة وفي المواقع المعتدلة الرطوبة وفي الاقايء والسكن الارضية . تسرح في الليل وتتكور في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلّة  $\parallel$  تعتبر من الدويبات اللاذقية .

٢٢٥٧٨ - قَمَرُوشِيَّات \* *Glomeridae* (S).

*Glomeridés* (F). *Glomeridae* (E). فصيلة دويبات من الدغداخيات الشفويات الاحتاك . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعها القمروش .

٢٢٥٧٩ - قَمَرُوش *Amande dure* (F).

*Hard almond* (E). هو اللوز الصلب الذي يوجب الكسر .



قر الليل



قروش



قروش مهذب



قري



قرية

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ من الحشرات النافعة أو القليلة الضرر . تعيش على رسيق الأزهار وأوراق الأوراق .  
تكثر في الأماكن الرطبة الظليلة وعلى ضفاف الأنهار .  
يرقاتها تعيش في الماء أو قرب الماء وفي التربة والريال على مختلف المواد العضوية والنباتية المتحللة .

Antedon (S).

٢٢٥٩٥ - قَمْطُول

Antédon, Comatulé (F), Comatulé (E).

جنس حيوانات بحرية من زباني البحر وفصيلة القَمْطُولِيَّات .  
انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم ||  
جميعها عشارية الأصابع القابلة للانعطاف والتحمج .  
أحادية الساق التحيلة المنفصصة عند الإدراك || تسبح بواسطة أصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر الخث والطوح ||  
اعرف أنواعه القَمْطُولُ الأحمر والقَمْطُولُ الوردي .

Comatulidae (S).

٢٢٥٩٦ - قَمْطُولِيَّات

Comatulidés (F), Comatulidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زباني البحر . أجناسها وأنواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع أنواعها ثابثة مستقرة حتى نهاية زين قوتها ثم تتحول إلى متحركة ||  
بجولة تقوم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد هدية ||  
اشهر أجناسها القَمْطُول .

Entonnoir (F), Funnel (E).

٢٢٥٩٧ - قَنْع

جهاز يوضع على فم الآنات فيسب فيه الماء ويغيره . ج . قنّاع .

Cupule

٢٢٥٩٨ - قَنْع ، قَنْع

كأس صغيرة قلبية غشبية التركيب تحيط بثمار بعض الأشجار كالبلوط والبنّوق .

٢٢٥٩٩ - قَمْزَة

ذباب ركب الأيل والظباء إذا اشتد الحر . ج . مقامع وق (السان) .

Bourgeonner (F), To bud (E).

٢٢٦٠٠ - قَمْزَل

قمل النبات : خرجت قاعيله أي براعمه .

Bourgeonnement (F).

٢٢٦٠١ - قَمْزَلَة

Budding, Sprouting (E).

هي نمو قاعيل النبات وزمعا . وهي مجموعة المناشع التي تنشعب لتكوين البراعم ونشؤها .

Catocala nupta (S). \* ٢٢٦٠٢ - قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ

Lichénée rouge, Mariée (F), Catocala nupta (E).  
حشرة من النسيقات حرشقات الإجنسة . موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا . فراشها واثمة قوتها رسيق الأزهار . سرقتها تعيش على أوراق الحور والصفصيات ||  
جسمها كبير القد يطول نحو ٣.١ سم . بسطها تراوح من ٧.٤ إلى ٧.٨ سم . رأسها كسني اللون . عيناها كبيرتان .  
زبانها غشبية عيطيان . جوشها ويطنها إلى الكسني الأكثر كثرة  
روشناها الإماميان إلى الريدة السراء يطولها زراكتش وتزويق غلظلة الألوان نيا البني والكسني والأزرق والأحمر .  
حناها الخارجي يتتابع الأقواس الملالية السراء . روشناها الحلفيان إلى الحفرة القرمزية يطولها طرق جؤري جيدة وسطى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أيلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو سبعة أصابع وتمتد المكن مبادياً



قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ

٢٢٥٨٨ - قَمْزِيَّةُ الصَّيْنِ

Menispermum dauricum (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جينة تزيينية عارشة تملو نحو ٤ أمتار . أوراقها مستطيلة العنق ، أهليلجية الشكل ، خضاسة التفصيص ، نصلها مائل الشرة اللامعة على صفحتيه . ثمارها إلى الجؤوة القاتمة || أنزاعها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمْزِيَّةُ كَنْدَا

Menispermum canadense (S). Ménisperme du Canada (F).

جينة تزيينية عارشة تملو نحو ٤ أمتار . أوراقها قلبية الشكل خضاسة أو سباعية التفصيص ، نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي العروق على السفلى . ثمارها إلى السواد اللامع || أنزاعها يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمْصُ اسْوَد

Tipula nigra (S).

Tipule noire (F), Black tipule (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها أسطواني الشكل ، معتدل القد ، يطول من ١١ إلى ١٥ سم . || ثوبها إلى السواد الاسفع . روشناها إلى البصرة العابقة . زباناها عيطيان || مهدبان || الأثنى أكبر قدماً من الذكر وأصغر روشناً منه ||  
تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى أيلول . تألف المئات والغابات الظليلة || تمتع الأثنى مكها في التربة فينتفخ من يرقاات تعيش على المواد النباتية والعضوية المتحللة .

٢٢٥٩١ - قَمْصُ البَقُولِ \*

Tipula oleracea (S). Tipule potagère (F), Leatherjacket (E), Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٣ سم . جسمها وأجنحتها وأرجلها مستطيلة . لونها إلى الخطي تشوبه صفرة زيتية . ذكرها أصفر جسيماً من أنثاء . والأثنى تمتع مكها في أيار الربيع على سوق الزروع وغتخت نباتات المراعي والمروج فينتفخ عن يرقاات صغيرة همة تلهم الجذور وقد تركب الأوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في البهار . لها جيلان في الحول ، الأول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمْصُ كَبِير

Tipula maxima (S).

Tipule maximale (F), Major tipule (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستطيل كبير ، يطول من ٢٧ إلى ٤٠ سم . || ثوبها إلى الخطي الاسمر . روشناها مهدبان بالابيض والوردي الباهت || زباناها مرفقيان ، مهدبان . تتميز بكثر الدقة وباستطالة القوائم || الذكر أصغر قدماً من الأثنى . تظهر الحشرة الجملانة من أيار إلى تشرين الثاني . تألف الإماكن الرطبة وضفاف مجاري الماء . تمتع الأثنى مكها في التربة . يرقااتها تعيش على المواد العضوية والنباتية المتحللة .

٢٢٥٩٣ - قَمْصَة

Sauterelle à l'éclosion (F).

الجرادة عند نلقها . ج . قص .

٢٢٥٩٤ - قَمْصِيَّات

Tipulidae (S), Tipulidés (F). Schnaken, Riesenschnaken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأنواعها



قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ



قَمِيَةُ التَّيْنِ



قُمُوتَةُ

في شقوق لحاء السوق والانفصال || السرفة تعلو نحو ٧٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة الخضراء يملؤها تمييز دقيق اسود ونقط جانبية فردية حراء اللون. رأسها الى الجؤرة. مدها ورواجها الى الطحلة السمره || طور الاكسلة يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن صلبة تحببها السرفة بين الاوراق التي تجسمها الى بعضها بعض.

### ٢٢٦٠٣ - قُمُوتَةُ زَرْقَاءَ \*

Catocala fraxini (S). Lichénée bleue, Likhénée bleue (F). Catocala fraxini (E).

حشرة من السمقيات حرقشيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاتص الى ادوية وافريقية الشالية. فراشها واسعة قوتها مغر الاثمار. سرفها تعيش على نصال الاوراق || جسمها كبير القند بطول نحو ٣٥ م. يسطها تراوح من ٩٢ الى ٩٦ م. رأسها كسني اللون اسمر الموج. عينها كيرتان. وذاناها عظيماني. جوشها وبطنها الى الكسني الاسمر تعلو ماجة غيرة || روشاها الاماميان الى الطحلة السمره يملوها ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون. روشاها الخلفيان الى الكسني الكلف تعلو جده مقوسة قاطبة زرقاء اللون || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تماثل بظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتد الممكن ميحاديا في شقوق لحاء السوق والانفصال || السرفة تعلو نحو ٨٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحلة تعلو مدها ثمة زرقاء ونقط سود جانبية. رأسها الى الطحلة الذي الى السمره. عليها دقيق اشقر || طور الاكسلة الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلبة تحببها السرفة بين طيات القشور او تحت اللحاء.

### ٢٢٦٠٤ - قُمُورُوطَ، قُمُورُوطَ، قُمُورُوطَ (دوبية (اللسان).

Bourgeon à feuille (F). قُمُورُوطَ  
في البرعة الورقية. ج. قاقيل. Leafy bud (E).

Infundibuliforme (F). قُمُيجِي  
Infundibular, Infundibuliform (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقبع. ويطلق في علم النبات على التوججات، متحدة القعالات، القمية الشكل.

### ٢٢٦٠٧ - قُمُيجِيَّةُ التَّيْنِ \*، حَشْرَةُ التَّيْنِ

Asterolecanium كوشليل التين  
sambuci (S). Cochenille du figuier (F). حشرة صغيرة من القرميزات. جسمها مستدير الشكل قطره نحو ٢ م. لونها الى الصفرة الخضراء الموج. تركب في التين الاسنجة اللبغية فتسبب حيث تحل تجاويف صغيرة يزداد ارتفاع حافها مع طول اقامة الحشرة.

### ٢٢٦٠٨ - قُمُيجِيَّاتُ

Anaploures رتبة حشرات من طبقة القمليات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعا يركب الانسان والحيوانات البقية الداجنة. اما الانواع الباقية فتمترى الحيوانات البرية من القردة الى الفئران || والقمليات حشرات مادمة التطور والاجنحة، جسمها صغير القند غلطط الشكل. رأسها وتدي. متكها ثابت ماص. قرنها

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة. رسنها وحيد العقلة ينتهي بمقطر حاد قوي || تمييز طفيلية حسل الانسان والحيوان البيون. تخلص الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها القرميزات والقرميزات.

٢٢٦٠٩ - قُمُيجِي  
Flacon (F). Case-bottle (E).  
اذا من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

### ٢٢٦١٠ - قُمُيلُ الجُبْنِ راجع سكية الجبن.

٢٢٦١١ - قُمُيلُ الحَيْثَانِ  
Cyame (F). هو القنثر، دوبية بحرية من القشريات، اطلبه.

٢٢٦١٢ - قُمُيلُ الرَّأْسِ هو القرعة، اطلبه.

٢٢٦١٣ - قُمُيلُ الْعَاقَةِ هو الطبوع، اطلبه.

٢٢٦١٤ - قُمُيلُ الْكُتُبِ هو نامس الكتب، اطلبه.

٢٢٦١٥ - قُمُيلَةُ هي اللمة، اطلبه.

٢٢٦١٦ - قُمُيلَةُ الْبُرْقُقَالِ السُّودَاءِ  
هي قمرزية البرققال السوداء، اطلبه.

٢٢٦١٧ - قُمُيلَةُ التُّفَاحِ هي وزنة التفاح، اطلبه.

٢٢٦١٨ - قُمُيلَةُ التُّوتِ هي قمرزية التوت، اطلبه.

٢٢٦١٩ - قُمُيلَةُ التَّبَاتِ هي القمرزية، اطلبه.

٢٢٦٢٠ - قُمُيلَةُ الزُّودِ هي قمرزية الزود، اطلبه.

٢٢٦٢١ - قُمُيلَةُ سَانْجُورِ

هي القمرزية الفتاكة، اطلبه.

٢٢٦٢٢ - قُمُيلَاتُ  
Psocoptéroïdes (F).

Psocoptéroïdes (E). طبقة حشرات صغيرة القند ثائية ماصة وقارضة من شعبة المليات. تطورها تدريجي. لا ملامس شرجية لها. قوتها المواد العضوية والنباتات القطرية || رتبها ثلاث القمليات والقمليات والقمليات.

٢٢٦٢٣ - قُمُيلَاتُ الْمَاءِ  
Hydrachnidae (S).

Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E). فصيلة حشرات صغيرة القند من رتبة القمليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي.

٢٢٦٢٤ - قُمُتَاكَةُ  
Tique (petite) (F).

Tick (small) (E). القردة اول ما تكون صغيرة ثم تصير خنثاة ثم قردة.

### ٢٢٦٢٥ - قُمُوتَةُ \*

Calceola (S).

Calcéole (F). Calceola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التحقيقات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاولى والطبقة الطباشيرية، وبعضها يعيش على الصخور المغسورة البعيدة الغور في بحار البلاد المتندلة الحارة || اصداها قمية، شبه غروطية الشوزن، للؤلؤة النشاء الداخلي.

٢٢٦٢٦ - قُمُيجِي  
Bruant proyer (F).

عصفور من الدرس يدعى الاكمل اطلبه.



٢٢٦٣٧ - قُمَيْس Kousim, Koumys (F).  
قُمَيْس Kousim, Koumiss (E).  
مشروب يستخرج من لبن الخيل المحلى وهو شائع الاستعمال في بعض الاقطار الآسيوية.

٢٢٦٣٨ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٣٩ - قَنَا Canna (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.



قَنَا

٢٢٦٤٠ - قَنَا الهِنْدُ، مَارْزُون Canna indica (S).  
Canna d'Inde, Balistr d'Inde (F).  
نوع من القنا ضروب واصراره وبعته عديدة جميعها زُرِينِيَّة. سوقها خضراء تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. أوراقها تطول نحو ٥٠ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٣٠ سم. أزهارها حراء اللون او وردية يملوها شبح اصفر متفاوت الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٢٦٤١ - قَنَا رَهْل، قَنَا سَحْلِي Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balistr flasque (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. ضروب واصراره وبعته عديدة. ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ الى ١٦٠ سم. أوراقه بيضيه الزام اللون ثم سناية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. أزهاره تشبه أزهار السحاب، لونها الى الصفار الكبري وهي كبيرة الشريقات المستديرة المنتصبه المتصبغة الوسلة. أزهارها يستمر طوال السنة.

٢٢٦٤٢ - قَنَا زُرِينِي Canna illiflora (S).  
Canna à fleurs de lys, Balistr à fleurs de lis (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي الرف الترف. ضروب واصراره قليلة العدد. ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد تطول من ٩٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ٤٠ الى ٥٠ سم. أزهاره زرقية الشكل، عاجية اللون، فواحة العرف الطري، كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.



قَلْبَةُ النَّم

٢٢٦٤٣ - قَنَا سَوَسِي Canna lridiflora (S).  
Canna à fleurs d'iris, Balistr à fleurs d'iris (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. ضروب واصراره وبعته عديدة. ساقه حراء اللون عتية تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد، سناية الشكل، نصلها خلي الصفحة السفلى. أزهاره قرمزية تطول نحو ١٦ سم. شرباتها ثنائية التفصيص. أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٢٦٤٤ - قَنَا مَأْكُول Canna edulis (S).  
Canna comestible, Balistr comestible (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. عائلته كبيرة القد، لونها اشوي المادة شائع الاستعمال النذالي. ساقه حراء اللون مستطيلة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقه جر الاغداد، سناية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ١٨. أزهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الحمرة المابقة، باطنها يرتقالي || أزهاره يستمر من حزيران الى تشرين الاول.



قَنَا

٢٢٦٣٧ - قُمَيْس، قُمَيْز Kousim, Koumys (F).  
قُمَيْس Kousim, Koumiss (E).  
مشروب يستخرج من لبن الخيل المحلى وهو شائع الاستعمال في بعض الاقطار الآسيوية.

٢٢٦٣٨ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٣٩ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٤٠ - قَنَا الهِنْدُ، مَارْزُون Canna indica (S).  
Canna d'Inde, Balistr d'Inde (F).  
نوع من القنا ضروب واصراره وبعته عديدة جميعها زُرِينِيَّة. سوقها خضراء تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. أوراقها تطول نحو ٥٠ سم. وتعرض من ٢٥ الى ٣٠ سم. أزهارها حراء اللون او وردية يملوها شبح اصفر متفاوت الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٢٦٤١ - قَنَا رَهْل، قَنَا سَحْلِي Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balistr flasque (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. ضروب واصراره وبعته عديدة. ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ الى ١٦٠ سم. أوراقه بيضيه الزام اللون ثم سناية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. أزهاره تشبه أزهار السحاب، لونها الى الصفار الكبري وهي كبيرة الشريقات المستديرة المنتصبه المتصبغة الوسلة. أزهارها يستمر طوال السنة.

٢٢٦٤٢ - قَنَا زُرِينِي Canna illiflora (S).  
Canna à fleurs de lys, Balistr à fleurs de lis (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي الرف الترف. ضروب واصراره قليلة العدد. ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد تطول من ٩٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ٤٠ الى ٥٠ سم. أزهاره زرقية الشكل، عاجية اللون، فواحة العرف الطري، كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٦٤٣ - قَنَا سَوَسِي Canna lridiflora (S).  
Canna à fleurs d'iris, Balistr à fleurs d'iris (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. ضروب واصراره وبعته عديدة. ساقه حراء اللون عتية تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد، سناية الشكل، نصلها خلي الصفحة السفلى. أزهاره قرمزية تطول نحو ١٦ سم. شرباتها ثنائية التفصيص. أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٢٦٤٤ - قَنَا مَأْكُول Canna edulis (S).  
Canna comestible, Balistr comestible (F).  
نوع من القنا الزُرِينِي. عائلته كبيرة القد، لونها اشوي المادة شائع الاستعمال النذالي. ساقه حراء اللون مستطيلة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقه جر الاغداد، سناية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ١٨. أزهاره متوسطة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الحمرة المابقة، باطنها يرتقالي || أزهاره يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٢٦٤٥ - قُمَيْس، قُمَيْز Kousim, Koumys (F).  
قُمَيْس Kousim, Koumiss (E).  
مشروب يستخرج من لبن الخيل المحلى وهو شائع الاستعمال في بعض الاقطار الآسيوية.

٢٢٦٤٦ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٤٧ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٤٨ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٤٩ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

٢٢٦٥٠ - قُمَيْس، جَلْبَاب Cane (S).  
Canna, Balistr (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).  
جنس نباتات عشبية جذمية معمرة من فصيلة القنويات. أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والعدائية. سوقها منتصب. أوراقها متعاقبة كثيرة. نصلها جامدة. أزهارها سنبلية التجميع هامة الارتكاز || امرف أنواعها واشهرها ما يلي.

Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات ٥

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . مركزها التصنيفي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، اطرافها معظم المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جنباث شائكة . اوراقها صغيرة ، متقابلة نصالها سنانية الشكل ، بحرية الخصار . ازهارها محورية ، صغيرة ، معنفة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنّاز ٥\*

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنّازة . جنس حشرات من غديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة الغشيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليلجي رؤوسها صغيرة . قرونها الاستعمارية معتدلة الطول . كواهلها خروطية . انحرافها لاحقة ، منها المخذدة ومنها المخرّزة . جرابها بين المتدلة والمستطيلة . اوتابها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الامفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنّازة جبارة

هي الدحلل حشرة من غديات الاجنحة ، اطرافها .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قنّاصة \*

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السفنقيات وفصيلة الشفنيثيات البحرية . انواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورمية . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساويين . اذناها مستطيلة كالسياط تحميها عند قواعدها مناشرة التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المهاجم الصغرى حيث تكمن للانقضاض على فرائسها || لحومها كاعة الصنف ، قل من يرغب في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قنّاق

جهاز يوضع على الرأس لوقاية حواسه او بعضها .

Radiesthésiste (F).

٢٢٦٦١ - قنّاقين

Dowser (E).

من عالج اشعاع التفتنط الكهربى وعرف بوجود الماء والمعادن في جوف الارض .

٢٢٦٦٢ - قنّب ، قنّب (F). To ease (E). Alléger (F). قنّب الكبرية : قلمها وقطع عنها ما يؤدي حملها .

Fourreau (F). Sheath, Cover (E). ٢٢٦٦٣ - قنّب

جراب قفص الدابة ، وقيل وعاء قفص كل ذي حافر . كقنق قنّب الحمار : وعاء جردانه . وقنّب الجمل : وعاء ثيله .

Epanouir (s') (F).

٢٢٦٦٤ - قنّب

To blow, To expand, To open (E).

قنّب الزهر : خرج عن اكامه .

Cannabis sativa (S).

٢٢٦٦٥ - قنّب \*

Chanvre commun, Chanvrier, Pantagruélion (F).

Bractée (F). Bract (E). ٢٢٦٦٥ - قنّابة ، قنّابة

كل ورقة شدّت في شكلها او تركيبها لوجودها قرب الزهرة كالكنافور في النخل والمصفي في النعش . الخ .

Bractéaire, Bractéal (F).

٢٢٦٦٦ - قنّاني

Bractéal (E).

نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنّاسية ، يستوربة

Ostryer, Iron-dur (F). Lever-wood, Bois dur (E). Hopfenbaum (D). Ostrya, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وريزينة من فصيلة السومليات . انواعها قليلة العدد هيكلها واوراقها وازهارها تشبه الشرم (الحريبيوس) . سوقها تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن اللسي . اوراقها عابلة متناوبة تطول من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ م . نصالها مزغب الصفحة ، متقارب المروق المتقابلة التي يراوح عددها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثار الجنبيل . بزورها خلية الطرف الدقيق || اعرف انواعها واشهرها :

Ostrya japonica (S).

قنّابة اليابان

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

قنّابة شمية الورق

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

قنّابة فيرجينية

Ostryer de Virginie (F).

Dalot (F). Scupper (E).

٢٢٦٦٨ - قنّاة

بحرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

Canal azygos (F).

٢٢٦٦٩ - قنّاة الزكّبة ٥

Azygous canal (E).

بحرى انبوبى شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلاليسها الى قنّابها .

Oviducte (F). Oviduct (E). ٢٢٦٧٠ - قنّاة المبيض

بحرى انبوبى ينقل البيوض من المبيض الى خارج الجسم الحيوانى .

Canal cystique (F).

٢٢٦٧١ - قنّاة المرارة

Cystic canal, Cystic duct (E).

هي قناة الحوصلة الصفراوية .

Canal marginal (F).

٢٢٦٧٢ - قنّاة حافية

Marginal canal (E).

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٣ - قنّاة فقرية

Rhachidian canal (E).

هي القناة التي يمر بها الفقار الرشيدي .

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٤ - قنّادية

القنّادية او القنّدية هي زهرة المرجان ، اطرافها .

Connarus (S).

٢٢٦٧٥ - قنّارة ٥

Connaret (F). Connarus (E).

جنس نباتات جنبية ، بريسة ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوقها وفروعها شائكة . واوراقها متقابلة . ازهارها معنفة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الازهار او ليلكية .



قنّاز



قنّاسة

٢٢٦٧٧ - قَنِيطُ  
Chênevis (F). Hemp-seed (E).  
هو بذر القنب ويصنع شحذات يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بنسبة تراوح من ٢٠ إلى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تدبيل التربة .

٢٢٦٧٨ - قَنِيطَةُ  
Glumelle (F). Glumella (E).  
القنبية نباتية ثنائية بزرهة الزيجات وطليها يشفا لها زهرات لكل زهرة من زهرات السلييلة .

٢٢٦٧٩ - قَنِيطُ \*  
Pavonia (S).  
Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D). Pavonia (I).  
جنس اشجار وجنبات برية وتربيتين من فصيلة الحبابيات. انواعه قليلة العدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها معمرة فراء فنواء. اوراقها ايلدة منتقة ، يفضية او رحيمة النصل، عطرية العرف عند السس . ازهارها لا قابسة التجميع والاركاناز، طويلة الزناد مخلفة الاالوان . ثمارها رباعية الفلق . بزورها مزغبة القشور || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢٦٨٠ - قَنِيطُ دَائِمُ الزَّهَرُ  
Pavonia semperflores (S). Pavonie toujours fleurie (F).  
شجرة تربيتية فراء فنواء تملو نحو عشرة اثمار . اوراقها سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القد ، عادمة الكيم ، ناشرة الاسدية ، لونها الى الحمرة الفاتحة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢٦٨١ - قَنِيطُ كَبِيرُ الزَّهَرُ  
Pavonia multiflora (S). Pavonie multiflore (F).  
جنية تربيتية سروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها فراء فناء . اوراقها سنانية النصل ، مششابة الحافة، تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ٦ سم. ازهارها عثوكلية التجميع ، تاجية الاركاناز، ارجوانية اللون ، كيم ازهارها كثيف الوريقات الصيقة الخلية || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢٦٨٢ - قَنِيطُ مَكْرَانَا  
Pavonia mackoyana (S). Pavonie de Mackoy (F).  
جنية تربيتية سروتية تملو من ٦٠ الى ١٧٥ سم. ساقها غليظة فنواء . اوراقها كاملة ماسلة سنانية النصل خلية العنق . ازهارها ضمية التجميع ، تاجية الاركاناز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خاسي الوريقات القلبية الشكل. ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٦٨٣ - قَنِيطُ مُمَيِّزُ  
Pavonia speciosa (S). Pavonie spécieuse (F).  
جنية تربيتية زهية تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها فراء فناء . اوراقها يفضية الشكل ، قلبية القاعدة؛ نصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى الفراء اللون . ازهارها يتفجسها الظاهر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم. فصلها تعد من ٧ الى ٩ يكفنها كيم يعمل ذات العدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢٦٨٤ - قَنِيطِيَّاتُ  
Cannabaceae (S).  
Cannabaceae (E).  
منهم من جعلها فصيلة ثنائية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القرصيات || اشهر اجناسها القنب والجنجل .

٢٢٦٨٥ - قَنِيطُ  
هو القرنييط ، اعطيه .

Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D). Canapa, Canape (I).

نبات عشبي حولي زراعي لبني صناعي من فصيلة القنييات. وهو نبات وحيد الجنس والنوع عديد الفروب اشهرها الهندي والجبالي . ساقه منتصبه تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقه كثيفة مركبة ومنعقة، السفل منها متقابلية والعليا متتالية . جميعها خاسية او سباعية الوريقات الصيقة اللدية . نصلها خشن الملمس، ازغب الصفحة للمشارية الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، الذكرية منها عقودية التجميع اما الانثوية فضمية || ثماره فقيرة منتفخة تملو القنبر والشهدانج وهي مأكول بعض العصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا بأس به تبلغ نسبته نحو ٢٢ ٪ || يزرع القنب لاستخراج الياث سوه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال .

٢٢٦٦٦ - قَنِيطُ النَّافِعِ  
هو البتولا المنعقة، اعطيه .

٢٢٦٦٧ - قَنِيطُ جَبَّارُ  
Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).  
ضرب من القنب منبته الهند . ساقه فراء تملو من ٣ الى ٥ اثمار . فروعه افقية فارشة مستطيلة تجعل قطر دودة النبات اطول من ارتفاعه || الياث ساقه وفروعه صناعية تستعمل في جدل حبال القنب .

٢٢٦٦٨ - قَنِيطُ سِيَّامُ  
هو الرامي ، اعطيه .

٢٢٦٦٩ - قَنِيطُ كَلْكُوتُ  
هو الجوت ، اعطيه .

٢٢٦٧٠ - قَنِيطُ مَسِيلَا  
هو الابن ، اعطيه .

٢٢٦٧١ - قَنِيطُ هِنْدِي \* ، حَشِيشَةُ الْكَيْفِ  
Cannabis sativa indica (S). Chanvre indien, Bang, Hachisch (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).  
ضرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. يزرع لاستخراج ما تفرزه النباتات الاثنى من مادة وراثنية تكثر في عناقيد الزهرية واوراقها العليا يصنع منها «الحشيش» او «الحشيشة» او «الكيف» الذي يستعمل تدخيناً فيخدع اعصاب مدمنيه ويبدل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢٦٧٢ - قَنِيطُ  
هو القبرية ، اعطيه .

٢٢٦٧٣ - قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ  
Huppe (F). Crest (E).

هي فصل ريش قائم . اعطه قنطرة .

٢٢٦٧٤ - قَنِيطُ ، قَنِيطُ ، قَنِيطُ  
هي القبرة ، راجعها .

٢٢٦٧٥ - قَنِيطَةُ الْمَاءِ \*

Arenaria interpres, Strepisalis interpres (S). Tourne- pierre interprète, T. vulgaire (F).  
عائ من طوال الساق القزاع . صغبر القد طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابيض اللون كثير البياض والازخافز للتداخلة المركبة من الاسود والاحمر || يائث الشطوط البحرية ، قوته القشريات والديدان يلتقطها بين الحصى . يثن افوصه في الكشبان . حصصه تراوح من ٣ الى ٤ يفضات .

٢٢٦٧٦ - قَنِيطُ  
هو ابو منقار ، اعطيه .



قنب



قنب هندي



قنطرة الماء



قنبيل

٢٢٦٨٦ - **قَنْبِيل \* ، وَرَس مَلَوْتَا**  
Mallotus (S). Rottlère, Rottlérie (F). Kamala tree (E). Kamalaubum (D). Kamala (I).  
جنس شجيرات برية من فصيلة البتويات . منبتها المناطق الاستوائية الآسيوية . انواعه قليلة جميعها منسوجة القد . يستخرج من ثمارها صباغ احمر قرميدي مرغوب فيه .



قنبيل

٢٢٦٩٣ - **قَنْج**  
Arquer (F). To bend, To arch (E).  
قنج العود : عطفه حتى يصير كالحنج .

٢٢٦٩٤ - **قَنْدَاش \***  
Candacus (S).  
Candace (F). Candacus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات مجذافيات الاجرل وفصيلة الكلنوسيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة .

٢٢٦٩٥ - **قَنْدَقَة**  
Sucre candie (F).  
هي الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - **قَنْدَقَة \***  
Potologie (F). Potology (E).  
القندقة علم يبحث في المشروبات الروحية وفي تراكيبها .

٢٢٦٩٧ - **قَنْدُر**  
Castor (F).  
هو الحارود ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - **قَنْدُرُوس \***  
Chondrus (S).  
Chondre (F). Chondrus (E).

جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف Chondrus crispus (S). واشهرها القندروس المنقبض Chondrus crispé الذي يستعمل طبيا في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - **قَنْدُس**  
Loutre commune (F).  
هو القنصاعة ، حيوان من السرعويات .

٢٢٧٠٠ - **قَنْدُلِي**  
Aesculus (S).  
Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات . انواعه نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات وجنيات فاشرة ، غضة ، حيلة الشكل . اوراقها عايلة ، متقابلة ، منقطة ، مريكة ، كفية خماسية او سباعية او تساعية اللويقات . ازهارها عنقودية التجميع او علقية ، عديدة الالوان منها الاصفر والعنبري والوردي والاحمر || اشهر انواعه ما يلي :

٢٢٧٠١ - **قَنْدُلِي حَلَزُونِي**  
Aesculus turbinata (S).  
Marronnier à fruit turbiné (F).

شجرة داحجة فاشرة مهددة اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها خماسية او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، سنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاخضر تملو رقشة حراء . ثمارها اجاسية الشكل حلزونية ، قشورها مثاقلة شائكة ، لبها حنطي اللون .

٢٢٧٠٢ - **قَنْدُلِي مَبْدُول \* ، قَسْطَل هندي**  
Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).

شجرة مبدولة داحجة فاشرة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراقها خماسية او سباعية التركيب . وريقاتها لا تتساوية الطول والعرض ، نصلها عايق الخضار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تملو رقشة حراء او صفراء . ثمارها كستنية الشكل والقد قشورها شائكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٨٧ - **قَنْة**  
Cime (F). Cyme, Summit (E).  
القنة : اشخ موقع من رأس الجبل واعلى ما يكون في الشجرة . ج قن وقنان وقنون وقنات .

٢٢٦٨٨ - **قَنْة مَبْدُولَة \* ، كَنْخ**  
Ferula communis (S). Férule commun, Pamelier, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemeines Steckkraut (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).  
نوع من الاعدنان وهو نبات عشبي بري معمر مبدول . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه كثيرة التشرج والتفريش نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . جذوره غليظة يستخرج منها بعض العناصر الطبية الصحية النافعة . ويستخرج من سوقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي عواما ونفعا .

٢٢٦٨٩ - **قَنْة مَهْجُونَة \* ، بَارْدَد ، قَنْسا وَشَق**  
Ferula ferulago, F. galbanifera (S).  
Férule bâtarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).

نوع من الاعدنان وهو نبات عشبي طيب بري معمر . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تستخرج من ساقه عصارة صمغية لزجة تدعى الباردد وتناوش وتعرف عند الطائفة بالوشق تستعمل في الامراض الصدرية وغلخانا وفي مضادة للنتنج .

٢٢٦٩٠ - **قَنْثَر \* ، قَمْل الحَيْثَان \***  
Cyam (S). Cyame, Cyamide (F). Cyam (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القنثريات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها طفيلية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصفر ، جميعها مبطلة . قوائمها الصدرية خماسية الازواج ، نشيطة ، تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل . لولاسها رباعية الازواج متفاوتة الطول ، شبه انبوية الشكل . اثارها الى الشبهة او الشقعة .

٢٢٦٩١ - **قَنْثَرِيَّات \***  
Cyamidae (S).  
Cyamidés (F). Cyamidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات العليا مزدوجات الاجرل . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها طفيلية تتركب الحيتان || تتميز باجسامها المبطلة ولولاسها او لمسباتها المتفاوتة الطول والحجم . قوائمها الصدرية مجهزة بمخاط مجنحة ذرية || اشهر اجناسها القنثر .

٢٢٦٩٢ - **قَنْجُول \***  
Abacetus (S).

Abacète, Astigis (F). Abacetus (E).  
جنس حشرات من فصيلة السلكوكيات ورتبة ممدات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة من العالم القديم اعضها افريقية الشالية وبعض الانواع يعيش في الشرق الادنى وفي اودية الجنوبية ||



قنة مبدولة



قنة مهجونة



قنر



قنجل



قندروس



قندلي ميلدر

٢٢٧١٠ - قَنْزَعُ \* ، مَقْتَال Machetes (S).  
Combattant (F). Ruff (E).  
مائل وحيد الجنس والنوع من عمارة الطولانيات. وفضيلة  
دجاجيات الارض. طولها نحو ٢٠ سم. بسطه من ٦٠  
الى ٧٠ سم. ثوبه الى الصبهة الورداء تملؤها رقعة حطية  
يعوقها اطراف ابيض. الذكر قشري الرأس مطوق المنق،  
طوقه مستطيل الريش يتصب عند القتال والبارزة.  
مبارزة الذكور تدوم نحو ثمانية اسابيع تبتدى مع زين  
السفاد وتستمر حتى نهاية الحضانة || الانثى تبيض نحو ٢٥  
بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما. تدش عشا في  
المنافق بين الاشجار || قوته الحشرات والديدان والرخويات.



قنلوس

٢٢٧١١ - قَنْزَعَة Astragale (F). Astragalus (E).  
هي رسة القدم وعظم الكعب .

٢٢٧١٢ - قَنْزَعَة ، قَنْزَعَة ، قَنْزَعَة Algrete (F).  
ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور .

٢٢٧١٣ - قَنْس Norme (F). Norm (E).  
القنس ج قنوس . مبدأ يتخذ كقاعدة . او عخطط قياسي  
يتخذ كقاعدة .

٢٢٧١٤ - قَنْس Aunée (F).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة مشهورة باسم راسن ،  
اطلبها .



قندول

٢٢٧١٥ - قَنْسَطِيطْ اَبْيَض Aesculus parviflora (S). Pavier blanc (F).  
جنية زينة غضة من فصيلة القندليات تملو من متر  
الى خمسة امتار . اوراقها خاسية التركيب ، وريقاتها  
تطول نحو ١٩ سم . وتعرض ٧ سم . لتصلها بحري اللون ، على  
الصفحة السفلى . ازهارها سنبلية التجميع لونها الى البياض  
الاخضر . ثمارها كستنية الشكل واللقد مالة القشور .



قزاع

٢٢٧١٦ - قَنْسَطِيطْ احْمَر Aesculus pavia (S). Pavier rouge (F).  
شجرة زينة سبروتية من فصيلة القندليات تملو من مترين  
الى ستة امتار . اوراقها خاسية التركيب . وريقاتها  
سنانية ، مسنة الحافة . لتصلها جاد الصفحة يطول نحو  
١٥ سم . ويمرض ٦ سم . ازهارها عقودية التجميع ، بتلاتها  
حراء اللون ، مهدبة الاطراف . ثمارها كستنية صغيرة  
مالة القشور .

٢٢٧١٧ - قَنْسَطِيطْ اصْفَر Aesculus octrandra (S). Pavier jaune (F).  
شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القندليات تملو من ٢٠ الى ٢٥  
م . اوراقها خاسية التركيب . وريقاتها سنانية دافئة ،  
تصلها ازغب الصفحة السفلى ، مسن الحافة . ازهارها  
عقودية التجميع ، بتلاتها مهدبة ، صفراء اللون . ثمارها  
كستنية الشكل كبيرة اللد مالة القشور .

٢٢٧١٨ - قَنْس Ciste ladanifère (F).  
هو اللاذن الاسباني ، اطلبه .

٢٢٧١٩ - قَنْشِيل \* ، تَرْغُل Tragus (S).  
Tragle (F). Tragus (E).  
جنس حيوانات لبونة بجرة . الواسها حنة جميعها صغيرة  
القد ، رشيقة القوام ، فيها من الايل والماعز والارانب .  
طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . علوها من ٢٥ الى ٣٢ سم .



قنشل

٢٢٧١٣ - قَنْدَلْكي هِنْدِي Aesculus indica (S).  
Marronnier de l'Indus (F). Indian horse-chestnut-  
tree (E).

شجرة هرمية الشكل مهدبا المهندوس تملو من ٢٠ الى ٢٥  
م . اوراقها لانياسية التركيب منها الحاسية والسباعية  
والسباعية . وريقاتها مستطيلة ، لتصلها جاد الصفحة ،  
مسن الحافة . ازهارها كبيرة القد . عناتيدها هرمية الشكل ،  
تطول نحو ٥ سم . بتلاتها لا متساوية اللد لونها الى الازرق  
المروشن بالاصفر او الوردى . ثمارها رنية ، قشورها  
ثولولية عادمة الشوك .

٢٢٧١٤ - قَنْدَلْكي

Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculacées,  
Hippocastanacées (F). Aesculaceae, Hippocasta-  
naceae (E).

فصيلة نباتية وسيدة الجنس ، عديدة الانواع . نباتاتها  
اجار وشجيرات وجنيات برية وزينة . اوراقها مركبة  
متقابلة . ازهارها عشوية خاسية التركيب والاتسام ، سباعية  
الاسدية ، عقودية التجميع او عذقية او سنبلية .

٢٢٧١٥ - قَنْدُوس \* Coendus (S).  
Coendous, Synèthere, Orleo, Couly (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشيميات . انواعه  
١٣ موطنها امريكة الجنوبية || اجسامها ضخمة مستطيلة  
براح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم . واذنانها من ٢٥ الى  
٥٠ سم . رؤوسها غليظة . مقاضها قصيرة مقطوعة .  
خناياها عريضة . عيونها واذانها صغيرة . جرامزها متدلة  
القد . اطرافها قوية حادة . اذنانها طويلة اعادة . شعرها  
هليبي هدي نغاز يتخلله شوك قصير كسائل تنفضه للدفاع  
عن النفس فينفذ ويصطب حيث يفرز || تألف الثابتات  
والاحراج . تسرح في الليل . تتسلق الاجار وتستن  
باذنانها للانتقال من غصن الى غصن || قوتها الثأر  
والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولحاء الاجار .

٢٢٧١٦ - قَنْدُول \* ، دَار شَيْشَعَان ، عَوْذ البَرْق Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome

spinosa (S). Cytise épineux, Genêt épineux, Caly-  
cotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny  
cytisus (E). Stacheliger Ginster (D). Citiso spinoso (I).  
جنية برية معمرة شالكة من فصيلة القرنيات . اوراقها  
صفرة مركبة . ازهارها صفراء اللون عطرة . يكثر وجودها  
في وعر الجبال اللبنانية السورية .

٢٢٧١٧ - قَنْدِيد \* ، بَذَاق Eau-de-vie (F).  
Brandy (E).

سائل كحولى يحصل من تقطير الثأر بعد تخميرها وهو  
يحوي من الكحول ما يراوح عياده من ٤٥ الى ٨٥ درجة  
متوية وهذا الفارق التاسع بالنسبة يعود الى نوع المشروب  
وما يقتضيه من عيار خفيف او متوسط او قليل .

٢٢٧١٨ - قَنْدِيدِي \* Potologique (F).  
Potological (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقدندة .

٢٢٧١٩ - قَنْدِيلُ الْبَحْرِ Cryssore (F).  
Sea nettle (E).

نوع من المدوس ، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ  
المتوسط . راجع مدوس .

## ٢٢٧٢٥ - قَنْصُور صَغِير الْوَرَق

*Colutea halepica*, C. Istria (S). *Bagueaudier microphylla* (F).

جنية برية سربوتية مهددة الشرق الاوسط ويكثر وجودها من حلب الى سيناء. تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تمد من ٩ الى ١٣ نصفها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون ازرق الصفحة السفلى. ازهارها برتقالية كبيرة القد. سفاتها صغيرة جرابية مبطنة. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قَنْطَار *Quintal* (F).

القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل اي الف وثنى اوقية او ما يماثلها من الوزن المتري وقدره ٢٥٦ كيلو. اما القنطار المتري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قَنْطَر *Goura couronné* (F).

هو الدبسي المتفرج، اطليه.

## ٢٢٧٢٨ - قَنْطَرِيُون، قَنْطَارِيُون

*Centaurea* (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جنس نباتات عشبية مخشوشية من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والحولة والمعمرة ومعتبرا بري وبعضها ترابي. اوراقها متعاقبة لا نظامية. قناياتها لا قياسية. ازهارها رؤسية. بزورها عادمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

## ٢٢٧٢٩ - قَنْطَرِيُون اَسْمَر \* ، رَأْس الدَّوْرِي

*Centaurea jacea* (S). *Centauree jaccée*, *Jacée des prés*, *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black centaury*, *Brown rayed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Giacea*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري المعمر. ساقه زهاب فراء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون، قناياتها الى السرة || يكثر في المراعي والزرور فيصبح من النباتات الضارة || جلوده غليظة غزيرة المادة الطبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم.

## ٢٢٧٣٠ - قَنْطَرِيُون اَلْقَفَّاس

*Centaurea depressa* (S). *Bleuet du Caucase* (F).

عشبة سربوتية حولية ترابينية ساقها فراء منذ السنج تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل خلية البشرة. رؤسياتها الزهرية عادمة العرف لوها الى الزرقة الزاوية تنصسطها الحمرة؛ قناياتها مالة الصفحة، مهدبة الحثار. اهدابها فضية || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ٢٢٧٣١ - قَنْطَرِيُون اَمْرِيكي

*Centaurea americana* (S). *Centauree américaine* (F).

عشبة ترابينية سربوتية حولية. ساقها مزينة منتصبة قليلة الفروع تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها سنانية النصل مسننة تملو من ٥ الى ١٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية التجميع عادمة العرف قطرها براوح من ٥ الى ١٠ سم. لوها الى الزرقة او الحمرة. قناياتها مهدبة الحثار || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

## ٢٢٧٣٢ - قَنْطَرِيُون بَابِل

*Centaurea babylonica* (S). *Centauree de Babylon* (F).

عشبة ترابينية سربوتية حولية. ساقها مجتمعة تملو من ٢٠٠

وروسها مستطيلة جهاء. اذانها قصيرة عريضة منتصبة. قواها دقيقة. اخلاها اربعة. اذانها مرتفعة كاذناب اللماز. سورها خل نام اللمس. اثوابا الى الصلبة المخملية المشعة والمواج || مهددا فصح الاجراء يمتد من سربدب والهند الى الصين. تألف الغابات الجبلية الرطبة. قوتها الاشباب. تمش جاعات قليلة العدد. اجلها يتألف من ٤ او ٥ اناث فيقودها ذكر واحد.

## ٢٢٧٢٠ - قَنْصُور \* ، قَلْوَتَه

*Colutea* (S). *Bagueaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrauch*, *Gewöhnlicher blasenstrauch* (D). *Colutea*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).

جنس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراضية. انواعه عديدة، جميعها جنبات صغيرة او متوسطة القد. اوراقها متعاقبة مركبة تشبه اوراق السناء. ازهارها عقودية التجميع، محورية الارتكاز، صفراء اللون. ثمارها سفات منتفخة مثانة الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

## ٢٢٧٢١ - قَنْصُور اَسْوَد الْكَم

*Colutea melanocalyx* (S). *Bagueaudier à calice noir* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها مركبة كبيرة وثرية العدد مؤلفة من ٩ او ١١ وريقة فضية الشكل، نصفها خل الصفحة السفلى. ازهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكائها زهاب البشرة زهابا اسود اللون. سفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

## ٢٢٧٢٢ - قَنْصُور الشَّرْقِي

*Colutea orientalis* (S). *Bagueaudier d'Orient* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سباعية او تساعية الوريقات. نصفها يضي الشكل، يجري اللون يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٧ الى ١١. ازهارها الى الجؤوة يطولها تيمحج اصفر. سفاتها تطول نحو ٤ سم. لوها الى الخضار المشوح بالبنيجي. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

## ٢٢٧٢٣ - قَنْصُور الْحَمَّ

*Colutea persica* (S). *Bagueaudier de Perse* (F).

جنية سربوتية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد، عادمة العروق، خلية الصفحة السفلى. ازهارها الى الصفرة الزاوية يطولها تيقج اسمر. سفاتها متوسطة القد شدوقة الطرف || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

## ٢٢٧٢٤ - قَنْصُور شَالَع

*Colutea arborescens* (S). *Bagueaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balandier* (F).

جنية سربوتية مبدولة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥. نصفها يجري الصفحة السفلى متلاحق العروق. ازهارها الى الصفرة البرتقالية. سفاتها متدلية مبطنة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



قَنْصُور



قَنْطَرِيُون اَسْمَر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

عشبة سر بوتية حولية برية طيبة وتزيينية. ساقها منتصبة فراء زيا تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها الجذعية عذلية. رؤيساتها الزهرية زرقاء اللون عادمة العرف. قناباتها عناكية النصل سمر الخنار || كانوا يمترونه فيا مضى من اتفع عولجات العين والبصر. ازهراره يستمر من ايار الى ايلول.



قَطْرُونٌ صِفِر

22٧٣٩ - قَطْرُونٌ قَنْزَل (S). Centaurea fenzi (S). Centauree de Fenzl (F). عشبة تزيينية سر بوتية عمو. ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل، قليلة القاعدة، مجنحة المت، رؤيساتها الزهرية فردية التجميع، كبيرة القد، صفراء اللون، عادمة العرف. قناباتها الى البياض التاسع || ازهراره يستمر طوال الصيف.

#### 22٧٤٠ - قَطْرُونٌ قَيْجَنِي الْوَرَق

Centaurea rutaeifolia (S). Centaurée à feuilles de rue (F). بجلة برية وتزيينية معمرة. ساقها فراء منتصبة تملو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة القد فيجينة الشكل بالة التفريغ. رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد صغيرة القد وردية اللون. قناباتها مهدبة الخنار. اهدابا سود قاسية || ازهراره يستمر طوال فصل الصيف.

#### 22٧٤١ - قَطْرُونٌ قَمِيرَةِ السَّاق

Centaurea acaulis (S). Centaurée acaule (F). Centaury (E). Flockenblume (D). Centaurea (I). نوع من القطريون البري وهو نجمة جعدة الساق الفراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراقها قرصية وقوية الارتكاز، صغيرة القد، سنائية النصل الحمل البشرة. رؤيساتها الزهرية فردية، زرقاء اللون، قناباتها حنطية || يكثر في المراعي والبور ويقال ان عصارة جلوده نافعة تفيد الحمة وتنشط الدم.



قَطْرُونٌ عَنَبَرِي

#### 22٧٤٢ - قَطْرُونٌ كَبِير \* عَرَطَب

Centaurea centaurium (S). Centaurée officinale, C. commune, Grande centaurée (F). Great centaury (E). Grosse Flockenblume, Tausendgüldenkraut (D). Centaurea maggiore, C. commune, Fiele di terra (I). نوع من القطريون الطبي البري المعمر. ساقه فراء تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقه كبيرة سنائية سفة. رؤيساته الزهرية عديدة متوسطة القد زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية الملحاة. جلوده عطرية، حارة الطعم، مرة اللذاق، عديدة الفوائك الصحية المعوية النبهة العادمة الاثر الرجمي.



قَطْرُونٌ كَبِير

#### 22٧٤٣ - قَطْرُونٌ مَسْكِي

Centaurea moschata (S). Centaurée ambrette, Ambrette, Barbeau musqué (F). نبات تزييني سر بوتى حولي. ضروبه واصرامه عديدة. ساقه فراء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنائية الشكل صغيرة القد. رؤيساته الزهرية ذكية العرف الطعري، كبيرة القد، عديدة اللوان التي تختلط مع الغروب والاصرام || ازهراره يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

الى ٣٠٠ سم. اوراقها الجذعية معنفة رجمية. نصلها جامد الصفحة. اوراقها العليا رباعية صغيرة القد عناكية الصفحة السفلى، رؤيساتها الزهرية كثيرة العدد، كبريتية اللون، عادمة العرف. قناباتها نحيلة مهدبة بالاسمر || ازهراره يستمر من تموز الى ايلول.

#### 22٧٣٣ - قَطْرُونٌ بَهْمَن \* بَهْمَنُ اَيْض

Centaurea behen (S). Centaurée blanche, Béhen blanc, Rhapsotic blanc (F) White behen, White rhapsotic (E). Weisses Behen (D). Behen bianco (I). عشبة حولية برية طيبة تكثر في الحقول وفي الاراضي الملحاة. ساقها زياء منتصبة فراء تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها مزغرة البثرة على صفحتها، زغبها لبد التجميع ابيض اللون. رؤيساتها الزهرية قرصية اللون صفر الملاج. قناباتها ضيقة مستطيلة، عديدة الملاح || يقال ان قوائده الصحية جلية اخصها التنشيط لانه مقر ناض وقد يستعمل في التوابل.

#### 22٧٣٤ - قَطْرُونٌ دَلْمَاسِي

Centaurea ragusina (S). Centaurée de Dalmatie (F). بجلة تزيينية معمرة. ساقها منتصبة سرعة عادمة الفروع تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. اوراقها ريشية فضية اللون. رؤيساتها الزهرية قليلة العدد مذهبة اللون سمر الملاج. قناباتها بيضيه الشكل ماله الصفحة مهدبة الاطراف. ازهراره يستمر من حزيران الى تموز.

#### 22٧٣٥ - قَطْرُونٌ رَيْشِي

Centaurea phrygia (S). Centaurée plumeuse (F). بجلة تزيينية معمرة ساقها تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها اهليلجية النصل، حناره منشاري التسنين. رؤيساتها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية الملاج، قناباتها ريشية التفريغ، حنطية اللون، سود الملاح || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

#### 22٧٣٦ - قَطْرُونٌ شَرْوَنِي

Centaurea cineraria (S). Centaurée cinénaire (F). جنبة سر بوتية تزيينية معمرة ضروبها واصرامها عديدة. ساقها فراء تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كثيرة التفصيص والتفريغ، حلقة البثرة، فضية اللون. رؤيساتها الزهرية متوسطة العدد والحجم لونها الى الصفار المذهب. قناباتها حنطية اللون واخنار المذهب || ازهراره يستمر من تموز الى آب.

#### 22٧٣٧ - قَطْرُونٌ صَكِير \* مَرَاةُ الْخَشَش

Erythraea centaurium, Chironia centaurium, Gentiana centaurium (S). Erythrée centaurée, Petite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earth-gall, Feverwort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Biondella, Caecia-febbre (I).

نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الجنطيانيات. يكثر في البور. ساقه قصيرة فراء تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة متعاقبة رجمية النصل. ازهاره عذكية التجميع هامة الارتكاز وردية اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحميات ولطرد الديدان المعوية.

#### 22٧٣٨ - قَطْرُونٌ عَنَبَرِي \* ثَرْنُشَاه

Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Aubifoin, Barbeau bleu, Casse-lunettes (F). Bachelor button,

## ٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ \*

Pytho (S).

Pytho (F). Pytho (E).

جنس حشرات من فصيلة القنطريئات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل، مبططة، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة. كواسلها محصورة. اطرافها لاحفة. قوائمها نشيطة. الاطراف ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المولاج || يكثر وجودها تحت لحاء السرو والشرين حيث تحمي فصل الشتاء.

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

نبات لبني ترابي معمر شكسلي. ضروبوه واسرماه عديدة ساقه فضاء زياه تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرج الصلصة العليا عناكيه السفسل. رؤوساته الزهرية كبيرة القد، حافية الزرق. قناباتها سود الهذاب || انزهاره يستمر من ايار الى آب.

## ٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ نَجْمِيٌّ \*

Centaurea calceatrapa, C. stellata (S). Centaurée étoilée, Chausse-trape, Chardon étoilé (F). Caltrop, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calcatrapa, Sternflockenblume (D). Calcatripa, Calcatripola, Cardo stellato (I).

حشبة برية محولة تكثر في البور والمراعي وعلى حافة الطرقات، جذبوها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي.

## ٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflora (F). برية وزبينية معمرة. ساقها فردية زياه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة، سنانية الشكل، مستديرة القاعدة، ثنائية الاذنيان. رؤوسها الزهرية وحيدة، قطرها ٣ سم. لونها الى الحمرة القرمزية. قناباتها مفردة حنطية اللون || انزهاره يستمر من تموز الى آب.

## ٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّةٌ

Centaureid (F). جنس نباتات برية وتزبينية من المركبات تدعى قنطورة، اطليا.

## ٢٢٧٤٨ - قَنْطَرُوةٌ \*

Cantua (S). Cantua, Bronnie (F). الاسم العلمي والعربي من البيروني. جنس شجيرات دغلة جبلية من فصيلة القنسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد مهددا بلاد البيرو من امريكا الجنوبية || سوقها منتصبه فضاء. اوراقها متباينة الاشكال، منها الكاملة ومنها المسنن والمقرضة. انزهارها عتقي التجميع. ازهارها انبوية التوزيع تطول من ٢ الى ٦ سم. لوانها تختلف مع الانواع اعرف انواعها واشهرها النواعان التاليان.

## ٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُوةٌ اِجاصِيَّةُ الورَقِ \*

Cantua pyrifolia (S). Cantua à feuilles de poirier (F).

نوع من القنطورة تزود للزئين. ساقها كثيرة الفروع المنتصبه، تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص. نصلها جبلة الخضار الاصفر المولاج. انزهارها عتقي التجميع اليب. ازهارها معتقة، بيضاء اللون، صفراء المولاج، محبنة التوزيعات مستطيلة الاسدية البالغة النشور || تنويرها يستمر من آذار الى حزيران.

## ٢٢٧٥٠ - قَنْطَرُوةٌ بَقْسِيَّةُ الورَقِ \*

Cantua buxifolia (S). Cantua à feuilles de buis (F).

نوع من القنطورة، تزود للزئين. ساقها فضاء تملو من متر الى مترين. اوراقها كاوراق البقس. نصلها جبلة والخضار الامسا. انزهارها عتقي التجميع. ازهارها معتقة متبدلة حراء اللون، صفراء التوزيع تطول نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان.



قنطرون معمر



قنطرون نجمي



قنطرون

## ٢٢٧٥٢ - قَنْطَرُونِيَّات \*

Pythidae (S).

Pythidés (F). Pythidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل، مبططة، تطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضليمة. قرونها الاستشعارية غليظة مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محصورة. اطرافها لاحفة. قوائمها نشيطة. ارساغها خماسية المقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي المقل. الاطراف ملونة || تعيش تحت لحاء الصنوبريات اخصا السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطرون.

## ٢٢٧٥٣ - قَنْطَرُوةٌ، قَنْطَرُونِيَّةٌ

Centaureidum (S). Centauride, Xanthisme (F). Centauridum (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيه بالقنطرون. جنس نباتات حولية ومحولة. برية وزراعية تزبينية من فصيلة المركبات الشعاعية. منبتها بعض اصقاع امريكا الشمالية. ضروبها الزبينية شائعة الاستعمال الحدائق || سوقها غلافية، فضاء. اوراقها متعاقبة، ضيقة النصال. انزهارها طرفي الارتكاز. ازهارها شعاعية، فردية، كبيرة القد، بنفسجية اللون او صمنجنونية. عطرية العرف المحمود.

## ٢٢٧٥٤ - قَنْطَرُوسٌ

le Centaure (F).

the Centaur (E).

كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها مدم برج المذراع. وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدمه مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره. اما مؤخره، من منشأ الظهر الى الذنب، فؤنصر فرس. وجهه الى المشرق وذنبه الى المغرب. ويده شراخان وقد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة. والعرب تسمي النبر الذي على بطن قنطروس « بطن ». والنبر الذي على حافر يده اليمنى « حصار ». والنبر الذي على يده الاخرى « الوزن ». والحصار والوزن هما اللذان يسميان « الخلفين ».

## ٢٢٧٥٥ - قَنْطَرُوسِيَّات \*

Xanthusidae (S).

Xanthusidés (F). Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العظائيات قابعات الانسان. اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها خمسة. موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى وكليفورنيا || اجسامها تطول من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه عرصة الشكل. اسنانها صغيرة كثيرة



العدد. ألسنتها قصيرة منها المألوسة ومنها المشطلة. عيونها صغيرة، حواجبها لامتحركة. قوائمها متدلة الطول. رؤوسها وعلوياتها حرشية القشار. ظهورها مشطلة. أنثاها إلى الرميكة السوداء.

٢٢٧٥٦ - قُتَاب العظم من الوعل.

#### ٢٢٧٥٧ - قُتَاعَة شَقْرَاء

(F). *Physcephala rufipes* (S).  
حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطول من ٨ إلى ١٢ سم. رأسها مستطيف، أصفر اللون. جبهتها وعصرها مجمعة بالأسود. عظمها معتدل القد. عيناها كبيرتان. مرجانيتان. زباناها مستطيلتان، أصمرتان. رؤسها مستطيلتان، ضيقان، تعلوها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، أصفر اللون، حنطي المواج. بطها قعسي الشكل، أشجع اللون، مجذع بالأسود. قوائمها الخ الشقفة السوداء. قوتها المشر ترشقه من أزهار فصيلة المركبات. تمتع الأنثى مكها على بطون اللتان والقنشيات فينتفح عن يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

#### ٢٢٧٥٨ - قُتَاعَر \*

(F). *Tragelaphus gratus* (S).  
نوع من الجبل كبير الوجة قدرة قدر الغنيس لكنه أصغر قرناً وأصغر ثوباً وأصغر أخلاقاً. يتميز باستطالة واتساع اظلافه التي حول دون فوصه في اسمال ورمال المناسع. موطنه فسح الارباء يمتد من الكامرون إلى النابون. يعيش قرب الماء يرتاد المناسع في الليل والناهار.

#### ٢٢٧٥٩ - قُتَاعَة

الكوة في الحائط.

#### ٢٢٧٦٠ - قُتَاعَة مُذْهَبَة

(F). *Conops flavipes* (S). *Conops doré* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها متوسط القد، يطول نحو ١٠ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، مذنب اللون، يطو في النافوخ والجهة زركشة سوداء. عظمها معتدل الحجم، مرتقي الشكل. عيناها كبيرتان، كستينيتان. زباناها مستطيلتان، أشعثان. رؤسها مستطيلتان، ضيقان، تعلوها مشعة صناعية في الشطر الأمامي. صدرها قدسي الشكل، تملو نقطتان حشاريتا الارتكاز، ذيعيتا اللون وطوق ضيق مذنب. بطها إلى الجؤوة الرصاصية المواج تملو ثلاثة أطواق ذيعية الخضاب. قوائمها إلى الشقفة. افتخاذها مطوقة الأطراف بالأسود. تمتع الأنثى مكها على بطون اللتان والدعاس والزبور فينتفح المكان عن يرقات تنقب بطون الموائ وتدخلها وتعيش فيها حتى الأكامل.

#### ٢٢٧٦١ - قُتَاعَة مُزْرَرَة

(F). *Conops quadrifasciatus* (S). *Conops bandé* (F).

حشرة من فصيلة القنشيات. جسمها يطول نحو ١٢ سم. رأسها كبير، شبه هرمي الشوزن، اسمر اللون اسود الوجة، أصفر النواخ. عظمها مرتقي مستطيل. عيناها كبيرتان كستينيتان. زباناها مستطيلتان أصمرتان. رؤسها ضيقان. صدرها قدسي الشكل، حديدي اللون، يملو زوجان من النقط الصفراء والبني. بطها إلى الصفرة الصنابية المواج تعلوها أربعة أطواق سود. قوائمها إلى

السرة العاقبة. قوتها رقيق الانعار. الانثى اكبر قدأ من الذكر. تمتع الممكن على بطون الزناير والجنادب.

#### ٢٢٧٦٢ - قُتَاعِيَّات \*

(S). *Conopidae* (F). *Conopidae* (E).

فصيلة حشرات من ذرات الجناحين. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها مغترية. قوتها رقيق الانعار. اجسامها ضيائية الحجم، تطول من ٥ إلى ٣٠ سم. رؤوسها فسخة، ناشرة الياويغ. اعطالها مرتقية. عيونها كبيرة. قوتها الاستشعارية لاقياسية الطول وعدد الفصل. رؤسها مستطيلة، ضيقة. صدرها معتدلة. يطولها مستطيلة. اجسامها عرياطة أو حلجية القشار، خلها شديد الدقة والقصر. أنثاها اكبر قدأ من ذكورها. مكها شديد الصغر مستطيل الشكل. يمتد الاناث على بطون الزناير والنسوح والجراد والجنادب فينتفح عن يرقات دقيقة تنقب قشار بطن المائل فتدخله وتعيش كامل حياتها البرقية التي تنتهي مع حياة المائل. اشهر انواعها القنشة المذعبة والمزرة والشقراء.

#### ٢٢٧٦٣ - قُتَقَر

القنفر: شجر مثل الكبر الا ان الاغظ شوكة وصوداً وثمرتها ككثرتها ولا ينبت في الصخر. حكاها ابو حنيفة.

#### ٢٢٧٦٤ - قُتَشَاشَة \*

(S). *Cryptos*  
جنس دويبات من فصيلة القنشيات. انواعها المرفقة ٦ اجسامها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجاً من الجرامز. ج قنشق.

#### ٢٢٧٦٥ - قُتَشَاشِيَّات \*

(F). *Scolopendridae* (S). *Scolopendridae* (E).  
فصيلة دويبات من السدخايات الشقويات الاربل. اجناسها وانواعها العدد اشهرها القنشة وام اربع واربعين (الجريش).

#### ٢٢٧٦٦ - قُتَشَج

(S). *Diots maritima*, *D. candidissima* (S). *Diotide argentea*, *Herbe blanche* (F). *Cotton weed*, *Sea cud-weed* (E). *Silberzweihohr* (D). *Santolina maritima* (I).

نبات عشبي بري معمر وسيد الجش والنوع من فصيلة المركبات. منبته السواحل البحرية. ساقه فروع زياء تملو من ١٠ إلى ٥٠ سم. رؤسها مستطيل القد قطبي الشكل. اوراقه شاذية لاطمة، نعلها اعليجي الصفحة، مقطوم القاعدة، خلل البشرة. رؤسها الزهرية عديدة صفراء اللون، قنابا جريسي الشكل، تويجها اسفنجي النسيج. بزورها مضطمة عادمة الجناح والاعرة. ازهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

#### ٢٢٧٦٧ - قُفْدُ \*، كُتَابَة الشوك، أنشد

حسيكة، دالج، دزام، كيكاب،

كيكاب الشوك، لثشة، منديلج.

(S). *Erinaceus* (S). *Hérissou* (F). *Hedge hog*, *Urchin* (E). *Igel* (D).

كينة ابو سفيان وابو الشوك والانثى ام دلال. قنافة ويقال لها الصاعس. جنس حيوانات لبونة ناعمة من آكلات الحشرات صغيرة القد طولها يراوح من ١٦ إلى ٣٠ سم. وطولها من ٧ إلى ١٢ سم. اجسامها ملحوة بغطاء من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والبطن والجرامز. قوتها الحشرات والقنرات والجرذ والعظاء والحيات



قُتَاب



قُتَشَاشَة



قُفْدُ

٢٢٧٧٨ - **فَقْدَةُ الْبَحْرِ \*** ، شَيْهَمَ بَحْرِي  
Diodon (S). Hérissin de mer (F). Sea-urchin (E).  
جنس اسماك بحرية شائكة من فصيلة الفهقيات ورتبة  
ملحومات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماك بحار  
البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم القنفذ || قوتها  
الحشريات والمرجان . لحومها مؤذية وقد تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - **فَقْدَةُ بَات**  
Erinaceidae (S).  
Erinacédés (F). Erinacidae (E).  
فصيلة الناقض من الحيوانات البنية ورتبة الحشريات اي  
آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - **فَقْدَةُ** هي الآبرة ، اطلمها . ج قناش .

٢٢٧٨١ - **فَقْدَةُ \***  
Acomys  
جنس دوبيات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه  
١٦ موطنها افريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين .  
اجسامها صغيرة القد مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها  
خطوطاً من الحلب اللبيل الشاك . تألف القفر قوتها  
الحشرات والوزغ والحلزون والجذور || اعرف أنواعه  
واشهرها قنفعة القاهرة والقنفعة المصرية .

٢٢٧٨٢ - **فَقْدَةُ الْقَاهِرَةِ**  
Acomys cahirinus (S).  
Acomys du Caire (F).  
موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون  
الرميل . بطنها ابيض . ذنبها قصير . اذناها كيرتان .

٢٢٧٨٣ - **فَقْدَةُ مِصْرِيَّة**  
Acomys dimidiatus (S).  
Acomys de l'Egypte (F). Spiny mouse (E).  
موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية . ثوبها بلون الرملي  
يسبق عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن . طوله نحو ١٢  
سم . وذنبها ٨ سم . اذناها كيرتان || تألف القفار  
والقباني .

٢٢٧٨٤ - **فَقْدُفُل**  
Chèvre (F). Goat (E).  
الغز السمين الفخمة .

٢٢٧٨٥ - **فَقْدُفُس \***  
Gomphosus (S).  
Gomphose (F).  
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديمات.  
انواعه المعروفة اربعة اعطائها المحيط الهندي || اجسامها  
الحليمية الشكل . متنتلة للبطيخ ، تطول من ١٧ الى  
٢٣ سم . اثنائها تراوح بين السمرة والجودة الزيتية الموج .  
بطونها ابيض كثير من ظهورها . زعانفها مبلقة بالاصفر  
والاسود . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل ، مستطيلة  
الخطم . عيونها مامحة . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها  
الذيلية مستعرضة ، محدودة الاطراف العليا والسفلى بتماخض  
غضروفية لينة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - **فَقْدُفُول**  
Canavalia (S). Canavale (F).  
جنس نباتات برية وزراعية ، عارشة اومدادة ، من فصيلة  
الفرقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات  
المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها  
مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا . ازهارها عقدوية  
التجميع ، محورية الانتكاز . ثمارها قرون كبيرة القد ،  
عديدة الحب ، ثنائية الجناح الدرزي || اشهر انواعه  
الزراعية ما يلي .

وفي مولة بالهام الاناعي لا تأثر بسها . تسرح في  
الليل وترقد في النهار وفي رقاعها تنقبض وتتكور فتبدو  
ككرة من الشوك . الاثنى اكبر حجماً من الذكر تصغ  
من ٣ الى ٨ جراه تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع .

٢٢٧٨٨ - **فَقْدَةُ آذِن**  
Erinaceus auritus (S).  
Hérissin oreillard (F).  
موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان ، جسمه يطول  
نحو ٢٦ سم . ويعلو نحو ١٢ سم . اذناه كيرتان .  
خطمه وجرازه مستطيلة . شوكه ابيض القاعدة اسمر الجرم  
اصفر الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٦٩ - **فَقْدَةُ أُرُوبِي**  
Erinaceus europaeus (S).  
Hérissin d'Europe, Echinos (F).  
موطنه اوروبا ، جسمه يطول نحو ٣٠ سم . ويعلو ١٠ سم .  
خطمه يشبه قنفصة الخنزير . عنقه قصير . اذناه صغيرتان .  
شوكه اسمر الجرم ابيض الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٧٠ - **فَقْدَةُ الْمَغْرِب**  
Erinaceus algirus (S).  
Hérissin algérien (F).  
موطنه افريقية الشمالية من مراکش الى طرابلس الغرب .  
جسمه يطول نحو ٢٢ سم . بطنه حنطلي اللون . شوكه فضي  
القاعدة ، اسفل الجرم ، اسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ مم .

٢٢٧٧١ - **فَقْدَةُ التَّمَل**  
Echidné (F).  
هو النضاض ، اطلمه .

٢٢٧٧٢ - **فَقْدَةُ حَبَشِي**  
Erinaceus aethiopicus (S). Hérissin abyssin (F).  
موطنه الحبشة وجوارها . جسمه يطول نحو ١٨ سم .  
بطنه اسمر اللون . شوكه ابيض القاعدة مضلع الجرم  
الاسمر ، اسير الطرف ، يطول نحو ٢٥ مم .

٢٢٧٧٣ - **فَقْدَةُ سُفَارِي**  
Erinaceus megalotis (S).  
Hérissin à longues oreilles (F).  
موطنه الافغان ، جسمه كبير القد يطول نحو ٣٠ سم .  
اذناه كيرتان وذنبه كذلك . شوكه اسمر اللون يطول نحو  
٣ سم .

٢٢٧٧٤ - **فَقْدَةُ طَوِيل الشَّوْكَ**  
Erinaceus macrocanthus (S). Hérissin à longs pi-  
quants (F).  
موطنه العم والافغان والكردستان . جسمه متوسط القد يطول  
نحو ٢٤ سم . اذناه كيرتان ذنقتان . شوكه ابيض الجرم ،  
اصهب الطرف ، يطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٧٥ - **فَقْدَةُ مِطْبَن**  
Erinaceus albiventris (S).  
Hérissin à ventre blanc (F).  
موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر  
ال موريتانيك . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بطنه ابيض  
اللون . شوكه الى الصهبة يطول نحو ٢٧ مم .

٢٢٧٧٦ - **فَقْدَةُ مَطْوِق**  
Erinaceus collaris (S).  
Hérissin à collier (F).  
موطنه الهند والسند والبنجاب . يرغب في القيان والصحابي  
الربلية . جسمه اسمر اللون يطول نحو ١٨ سم . عنقه مطوق  
بالابيض . شوكه اسمر الجرم ، اغبر الطرف ، يطول نحو  
٢٨ مم .

٢٢٧٧٧ - **فَقْدَةُ**  
Hérissin (F).  
She-hedgehog (E).  
اثنى القنفذ .



فَقْدَةُ الْبَحْرِ



فَقْدَةُ



فَقْدُفُس

## ٢٢٧٨٧ - قُنُول بَايز ، قُنُول هِنْدِي

Trigonia (S). \* قُنُقِيْبَة ٢٢٧٩٢

Trigone (F), Trigonia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم  
وفصيلة القنقنيات. أنواعها المعاصرة المعروفة خمسة أعطائها  
تمتد من البحر الأحمر الى الهند وأستراليا || أصدانها  
ثنائية المصارعين المتساوية الأضلاع ، مخددة السطوح  
الخارجية ، مائلة الداخلية للؤلؤة التركيب الجميلة الألوان  
القنطانية .



قنر

## ٢٢٧٨٨ - قُنُول سِيْفِي ، قُنُول سِيْفِي

Trigonidae (S). قُنُقِيْبَات ٢٢٧٩٤

Trigonidae (F), Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم.  
اجتناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار  
العالم || أصدانها ثنائية المصارع ، متباينة الاحجام ،  
شبه مخروطية الشوئن ، مخددة الصفحات المحزنة || أشهر  
اجتناسها القنقنة والجمعة .

Canavalia ensiformis (S). Canavale ensiforme, Haricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean (E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).

نوع من القنقنول وهو نبات زراعي مأكول البُار كاللوبيا  
والقول. منته البلاء الحارة . يعيش من ٣ الى ٥ سنوات .  
ساقه عارضة ملتفة . اوراقها كبيرة . وريقاتها بيضيه ذلقة ،  
تصلها جلدي الصفحة . ازهاره جزؤية اللون . عتقودية  
التجميع . مستطيلة المالمق . ثمارها قرون متدلية ، مقوسة  
كالبسيف طول نحو ٣٠ سم . وقمرض ٣ سم . تكثف من ٨  
الى ١٢ حبة كبيرة القند مفلطحة الشكل يضاء اللون او  
وردية || قرونه الخضر تستعمل استهلاك اللوبيا وهي  
للذبة الطعم جيدة الصنف . حبوبه مأكولة ، غزيرة المواد  
الغذائية ، تحوي ما تعرفه وقدره :

مواد آزوتية	٢٥,٦٢ ٪
مواد دهنية	٢,٣٢ ٪
مواد هيدروكربونية	٤٧,٩٤ ٪

Rancissement (F). Rancidity (E).

فساد الدهن او الزيت رغبث رجمها .

Thyrse قُنُو ٢٢٧٩٦

شكل من اشكال الانزهار العنقودي تكون فيه الاجزاء  
الوسطى اطول من السفلى والعليا .



قنر مشقن

## ٢٢٧٩٧ - قُنُو ، قُنُو ، قُنُو ، قُنُو ، قُنُو ، قُنُو

Régime de dattes (F). Cluster (E).

هو العلق الذي يحمل ثمار النخل وهو كالمعتود من العنب  
ج آقاء وقنيان وقنوان .

## ٢٢٧٩٨ - قُنُقَر \* Macropus (S).

Kangourou, Kangaroo (F). Kangaroo (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة القنقريات ونبية الجرابيات ،  
انواعه ستة ، موطنها أستراليا ، قوتها الاضباب . تتميز  
بقصر اليدين واستاطلة الرجلين والذنب . تألف الغابات  
والروج تمشيش بجاعات صغيرة يقودها فحل مسن .

Bourgeons à fleurs (F).

Blossoms buds (E).

هي أين النبات او اكنة زهرة فاذا بدت قيل قد آتت .

## ٢٢٧٩٩ - قُنُوس التَغْدِيَة

Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).

ما يجب اعطائه في تيمين مقادير العناصر الغذائية اللازمة  
لكل حيوان او فئة من الحيوان بالنسبة الى سنه ووزنه  
وجرمه وعمله .

Chanos salmoné (F).

قُنُوس ٢٢٨٠٠

سمكة بحرية من الصابوغيات تدعى شنوص ، اطلها .



قنفة

Mormyrus (S). Mormyre (F).

٢٢٨٠١ - قُنُوم \* جنس اسماك نهريه من فصيلة القنقويات . انواعه نحو ١٨  
معتلها من اسماك المياه الافريقية اخضها النيل والنيجر .  
اشهر انواعه القنومة الخطاء وقنوية النيل والقتشة .

Mormyrus caschive (S).

Mormyre rume (F).

٢٢٨٠٢ - قُنُومَة النِيل سمكة مستطيلة الجسم ، لينة الزعانف ، صغيرة الفم ، مستدقة  
الخطم الطويل . يتكرر وجودها في النيل . كانت من الاسماك  
المكرمة عند قدماء المصريين .



قنوم

## ٢٢٨٠٣ - قُنُومَة خَطْمَاء ، أُبُو يُوُز

Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).

نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف ، موزنية الخطم ،  
تكثر في النيل والنيجر .

## ٢٢٧٩٩ - قُنُقَرِيَّات \* Kangourous (F).

Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة عاشبة من الجرابيات طويلات  
الارجل . انواعها المعروفة نحو ٢٥ تنضم الى ثلاثة اجناس  
القنقنول والولاب والثلغاب || اجسامها متباينة الاحجام  
التي تتراوح من قد الارنب الى قد الصلادة . رؤوسها شبه  
مخروطية الشكل . اذنانها كبيرة منتصبة . اعناقها واذنانها  
مستطيلة . قوائمها الخلفية بالغة الطول . اناثها رباعية  
الاخلاف || موطنها أستراليا وتسمانية ونيغيا الجديدة والجزر  
المجاورة .

## ٢٢٧٩٢ - قُنُقِين صند بَحْرِي

- Ductule ٢٢٨٢٠ - قَنِبَرَةٌ  
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحيوانات الدنيا .
- ٢٢٨٢١ - قَنِبَلَةٌ  
كل حشرة تنتمي الى القهلبات .
- ٢٢٨٢٢ - قَنِبَسْ  
كل حشرة تنتمي الى فصيلة القهلبات .
- Psocidae (S). ٢٢٨٢٣ - قَنِبَسِيَّاتٌ  
Psocidés (F). Psocidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة القهلبات اجناسها وأنواعها عديدة  
جميعها صغيرة القد طويلاً يراوح من ١ الى ٣ م . قوتها اثنائها  
الى الرعدة السريعة يعلوها موج اسفع || قوتها ما ينمو  
على النبات من الفطور .
- Corrodentia, ٢٢٨٢٤ - قَنِبَلِيَّاتٌ  
Psocoptera (S). Psocoptères (F). Psocoptera (E).  
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهلبات  
والنامسيات .
- Perdrix robuste (F). ٢٢٨٢٥ - قَنِبِيَّ  
هو الحجل النباهي ، اطلبه .
- Narcisse (F). ٢٢٨٢٦ - قَنِدٌ  
هو النرجس ، اطلبه .
- Aubergine blanche (F). ٢٢٨٢٧ - قَنِبَبٌ  
ضرب من الباذنجان ابيض الجار يستعمل كنبات تزيين .
- Fibres du dattier (F). ٢٢٨٢٨ - قَنِهْرٌ ، قَنِهْرُ  
قشرة حمراء مسعرمة الالياف الهيكلة تكون على لب النخلة .
- ٢٢٨٢٩ - قَنِهْقَةٌ  
صوت اللب .
- Anorexie (F). Loss of appetite (E). ٢٢٨٣٠ - قَنِمْ  
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .
- Perdrix robuste (F). ٢٢٨٣١ - قَنِبَبَةٌ  
هو الحجل النباهي ، اطلبه .
- Amphisbenus (S). ٢٢٨٣٢ - قَنِبَرَانٌ \*  
Amphisbène (F).  
جنس عظام من فصيلة القهقرانيات انواعه ثلاثة طويلاً  
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها  
الى السمره السوداء يعلوها تجذيع اغبر . قوتها الحشرات .  
تعيش في التربة وتكثر قرب التمثال حيث تؤين الغذاء .
- Amphisbenidae (S). ٢٢٨٣٣ - قَنِبَرَانِيَّاتٌ  
Amphisbénidés (F). Amphisbenidae (E).  
فصيلة من العظائيات الديمات الارجل والروح الجوزي .  
اجناسها قليلة العدد . تعيش تحت الارض . جميعها من  
الزحافات الناعمة .
- Rémiges primaires, Flèches (F). ٢٢٨٣٤ - قَوَادِمُ  
Wing primaries (E).  
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاعشار والعواشر .
- Rongeurs (F). Rodentia (E). ٢٢٨٣٥ - قَوَاضِمُ  
رتبة حيوانات من البهونات تتميز باجسامها الصغيرة القد  
وبشائنها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكها من القضم .
- Mormyridae (S). ٢٢٨٣٦ - قَوَائِمَاتُ  
Mormyridés (F). Mormyridae (E).  
فصيلة اسماك نهريه من مفتوحات المائدة اشهر اجناسها  
القوم .
- Vasculaire (F). ٢٢٨٣٥ - قَوَتَوِيٌّ ، وَعَالِيٌّ  
Vascular (E).  
نمت تعريفي يطلق على النباتات القوية اي الوائية النسيج .
- Botryoïde (F). Botryoid (E). ٢٢٨٣٦ - قَوَتَرِيٌّ  
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالقنور .
- ٢٢٨٣٧ - قَوَتَوِيَّاتُ  
هي المارزوانيات ، اطلبها .
- Vascularisation (F). ٢٢٨٣٨ - قَوَتَوِيَّةٌ ، وَعَالِيَّةٌ  
Vascularization (E).  
القوية ، جسمورياً ، تكوين اوعية جديدة في النسيج  
المضوية . وهي ايضاً النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة  
عضوية معينة .
- Nuque de l'éléphant (F). ٢٢٨٣٩ - قَنِثَلُ  
Nape of the elephant (E).  
رقبة الفيل حيث يجلس الفيل .
- Nuage épais (F). Thick cloud (E). ٢٢٨٤٠ - قَنِثَبٌ  
سحاب متكاثف التجميع عابق اللون .
- Involucelle (F). ٢٢٨٤١ - قَنِثَبٌ  
قناة صغيرة القد تملو قاعدة الرؤسة الزهرية .
- Bractéole (F). Bracteole (E). ٢٢٨٤٢ - قَنِثَبَةٌ  
قناة صغيرة الحجم تملو قاعدة القنثب .
- Feuilles mortes de pins (F). ٢٢٨٤٣ - قَنِثَبَرَةٌ  
اوراق الصنوبر اليابسة تلحف الارض .
- Glumellule (F). ٢٢٨٤٤ - قَنِثَبَةٌ  
حبة شفاقة صغيرة القد تحت العنيفة ملاصقة للزهرة . وما  
قنينتان لكل زهرة من زهرات السنبله .
- Phénotype (F). Phenotype (E). ٢٢٨٤٥ - قَنِثَسٌ  
هو من النبات الذي يتحل بالصفات الشوزية المنسوبة  
الى عكسه .
- ٢٢٨٤٦ - قَنِثَسَةٌ  
راجع صيد .
- ٢٢٨٤٧ - قَنِثَسَةٌ  
راجع أناسيكولوس .
- Verticilliolepis (S). ٢٢٨٤٨ - قَنِثَسَةٌ  
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات .  
جره الكنديه منتصبة ، فروسه ريشة الشكل ، قاعدية  
الارتكاز . كنانته شغمية التجميع ، يفضيه الشكل شفاقة .  
انواعه قليلة العدد والاذا تلبو في تكاثرها ككتل من الففن  
الابيض تركيب المواد النباتية والمضوية المنحلة .
- ٢٢٨٤٩ - قَنِثَسَةٌ  
قزم زجاجي ألمادة صغير القد محكم السد .



قَنِثَسٌ

Malandre (F).

Malandre, Rotten Knot (E).

مرض جلدي يمتري ركة الفرس .

Dartrose de la vigne (F). **قُوَيْعَة الكَرَم**

Dartros of the vine (E).

وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وفلوج في اصول وسروع الكرمة . سببه علل مختلفة احصاها الفحوص .

٢٢٨٤٥ - **قُوَيْعَة وَطِيَّة** ، اكزيميا وطية

Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).

مرض جلدي يركب الحيوان .

Alouette cochevis (F).

**قُوَيْعَة**

في القبرة المنحوسة ، اطلها .

Sternite (F).

**قُوَيْعَة**

في الاسرة مفصل من مفاسل بطن الحشرة . ج قوب .

Coque d'œuf (F). Shell (E).

**قُوَيْعَة**

قشرة البيض بعد انفلاتها عن الفرج . ج قوب وقواب .

Bergeronnette printanière (F).

**قُوَيْعَة**

راجع ذمرة الربيع .

**قُوَيْعَة الارضي شوكي**

Depressaria subpropinqua (S). Teigne de l'artichaut (F).

حشرة من القربيات فراشها صغيرة القد ، حنطية اللون ، يسطها نحو ١٠ م . يرتقها غبار اللون ثلاثية الخطوط القاطبة . تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - **قُوَيْعَة الازالية** \* ، **قُوَيْعَة الجُلَسَان**

Gracilaria azalae, G. azaleella (S). Teigne de l'azalée (F). Azalea leaf miner (E). Azaleenmotte (D).

حشرة من القربيات يسطها نحو ١٠ م . رواشها خبيقة حنطية اللون فضية اللون . يرتقها دقيقة الجسم غبار الثوب تلغم الادراق وتؤذيها .

٢٢٨٥٢ - **قُوَيْعَة الأشجار المثمرة**

Teigne des arbres fruitiers (F).

في الشبكية الصغيرة ، اطلها .

٢٢٨٥٣ - **قُوَيْعَة البراعم**

Teigne des bourgeons (F).

في الشبكية الصغيرة ، اطلها .

٢٢٨٥٤ - **قُوَيْعَة التفاح**

Teigne des pommiers (F).

في خرطيط التفاح ، اطلها .

٢٢٨٥٥ - **قُوَيْعَة التين** \* ، **لاغمَة التين**

Simaeis nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Feigenblattmotte (D).

حشرة من القربيات فراشها سمراء اللون تظلو نحو ١٠ م . رواشها مستعرضة حنطية يعلمها تبيج اسفح اللواج || لها جيلان في السنة . يرتقها صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والثمرة معاً .

فصائلها ١٤ تنتمي الى ٤ مراتب : السجائيات الشوزب ، والقرقديئات الشوزب ، والشجيمات الشوزب ، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها ونوعها فكبيرة العدد .

٢٢٨٣٦ - **قَوَاع** (F). Migratory (E).

الطيور التي تنهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الازايد .

٢٢٨٣٧ - **قَوَاع** \* ، **أَرْقَب بَرِّي** ، **أَرْقَب وَحْشِي**

Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).

جنس حيوانات لبونة تنافس من فصيلة الارنيئات . انواعه ٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها الكامل ، من برطمانها الى طرف ذنبها ، لا يقل عن ٦٠ سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة ضيقة متصبة . عينيها كبيرة . براطمها مقلوبة . جرابها الازالية قصيرة القد .

خاوية الاصابع ، اما الخلفية فستطيلة ورباعية الاصابع . اظافرها قوية حادة . اقلها سوية اللون منها الاكهب .

والاسمر والاصهب والابيض الغ ... || تألف البهر والجبال والنباتات والاحراج والحضاب والسهول . ترحب في الليل . اجترتها رداء مستطيلة الشكل تخلدها عن احماق

مختلفة تراوح من ٤٠ الى ٧٠ م . مدخلها مغر على نفق واحد مستقيم || قوتها النبات والحيوب . اناها ثنوية

تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الدرصين الى الخمسة تخلف باصرة كاسية ترحب برفقة امهاتها بعد وضعها ياسبور . واثي القواع تدعى درامة . وقواع || اعرف انواعها واسمها :

٢٢٨٣٨ - **قَوَاع ابيض** ، **قَوَاع جعول**

Lepus timidus (S).

Lièvre timide, L. blanc (F).

**قَوَاع اروبي**

Lepus europæus (S).

Lièvre européen, L. commun (F).

**قَوَاع التبت**

Lepus tolai (S). Lièvre du Thibet (F).

**قَوَاع الشمال**

Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

**قَوَاع القطب**

Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

**قَوَاع المتوسط**

Lepus mediterraneus (S).

Lièvre méditerranéen (F).

**قَوَاع المراعي**

Lepus campestris (S).

Lièvre des prairies (F).

**قَوَاع امريكي**

Lepus americanus (S).

Lièvre américain (F).

**قَوَاع مصري**

Lepus aegyptius (S).

Lièvre d'Egypte (F).

**قَوَاع مقلد**

Lepus nigricollis (S).

Lièvre mossel, L. à cou noir (F).

٢٢٨٣٨ - **قَوَال**

القوال طائر معروف باسم عديمس شرقي ، اطلها .

٢٢٨٣٩ - **قَوَاعَة** هي الولاية ، اطلها .٢٢٨٤٠ - **قَوَالِيم**

Membres (F). Limbs (E).

اعضاء الحيوان كاليدين والرجلين التي تؤن انتقال الجسم .

٢٢٨٤١ - **قَوْب**

هو الصوص والكنكوت . ج أقواب .

٢٢٨٤٢ - **قَوَيْعَة**

هي الاكزيميا ، اطلها .



قَوَاع



قُوَيْعَة الارضي شوكي



قُوَيْعَة الازالية



قُوَيْعَة التين

## ٢٢٨٦٥ - قُوَيْعَةُ الشَّحْم

*Aglossa pinguinalis* (S). Teigne de la graisse (F).  
حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة دقيقة وردية اللون تعيش  
على اللحم الجامد.

## ٢٢٨٦٦ - قُوَيْعَةُ الشُّوَدَر ، لَيْتِه

*Lita ocellatella* (S). Teigne de la betterave (F).  
حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ سم.  
نوبها إلى الطحلة العاقبة. رقتها خضراء اللون حمراء الحواف  
تلغم جلود الشندر وتقع بها أشد الأذى.

## ٢٢٨٦٧ - قُوَيْعَةُ الصَّلِيَّات

*Teigne du colza* هي القويعة المائية، اطلبها.

## ٢٢٨٦٨ - قُوَيْعَةُ الصُّوف \* ، سَعْفَةُ الصُّوف

*Tineola bisellialis* (S). Teigne de la laine. Mite  
des vêtements (F). Webbing cloth moth (E).  
Kleidermote (D).

حشرة من القويبيات رقتها صغيرة دقيقة زهراء اللون تركب  
جميع الانسجة الصوفية بما فيها السجاد.

## ٢٢٨٦٩ - قُوَيْعَةُ الْفِرَاء \* ، سَعْفَةُ الْفِرَاء

*Trichophaga tapetzella*, *Tinea tapetzella* (S). Teigne  
des fourrures, Mite des fourrures, Mite des  
tapis (F). Carpet moth (E). Tapetenmotte (D).

حشرة من القويبيات رقتها صغيرة اللون سمراء اللون تركب  
الفراء وتقرضها.

## ٢٢٨٧٠ - قُوَيْعَةُ الْفَلَيْن ، سَعْفَةُ الْفَلَيْن

*Aenophila flavum* (S). Teigne du liège (F).  
حشرة من القويبيات رقتها صغيرة اللون دقيقة سمراء اللون  
حشيتة المواجه تلغم الفلين المصنوع قطعته.

## ٢٢٨٧١ - قُوَيْعَةُ الْكُرَات

*Acrolepia assectella* (S). Teigne du poireau (F).  
Leek moth (E). Lauchmote (D).

حشرة من القويبيات صغيرة اللون بسطها نحو ١٢ سم.  
نوبها إلى الطحلة السمراء رواشها منشفة بالأسود. رقتها  
دقيقة حشيتة اللون تلغم الكرات بأوراقه وقمرس ساقه.

## ٢٢٨٧٢ - قُوَيْعَةُ الْكَرَز \*

*Argyresthia ephippella* (S). Teigne du cerisier (F).  
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmote (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ سم.  
رواشها الاخلاص إلى الرمادي يعلوها تمريغ أسود.  
رواشها الاخلاص إلى السمرة الحشيتة السوية يحويها اطوار  
من الخمل الاصفر الناعم. رقتها تركب ازهار وثمار  
الاجار المشرقة انحصا الكرز.

## ٢٢٨٧٣ - قُوَيْعَةُ الْكَيْشِيش

*Incurvaria capitella* (S). Teigne du groseillier (F).  
حشرة من القويبيات بسطها نحو ١٥ سم. رواشها جوية  
اللون يعلوها تبيج اصفر مثلث الزوايا. رقتها تهب حراء  
اللون في اول عهدها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض  
براعم وثمار الكشمش.

## ٢٢٨٥٦ - قُوَيْعَةُ النَّبَات \* ، سَعْفَةُ النَّبَات

*Tinea pellionella* (S). Teigne des vêtements (F).  
Pelt moth (E). Pelzmotte (D).

حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة دقيقة تعيش على  
النبات الصوفية. اجيالها الحولية من ٣ إلى ٥. فيالغ  
خادراتها غنية الشكل متينة النواص.

## ٢٢٨٥٧ - قُوَيْعَةُ الْجَزَر

*Depressaria nervosa* (S). Teigne de la carotte (F).  
Carrot moth (E). Kümmelmotte, Möhrenschebe (D).

حشرة من القويبيات. رقتها صغيرة غبراء اللون تعيش على  
ازهار الجزر وغيره من نباتات الفصيلة الخيمية فتفشي  
على الازهار وقد لا تمتد في البزور.

## ٢٢٨٥٨ - قُوَيْعَةُ الْخُبُرَب \* ، حُنْطُ الْخُبُرَب

*Tinea granella* (S). Teigne des grains (F).  
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser  
Kornwurm (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٠ إلى ١٤ سم.  
رواشها إلى البياض الاغبر يعلوها تبيج حشيتي ومجاة فضية.  
رقتها وسيدة الجيل الحولي، صغيرة اللون، تركب جميع انواع  
المواد الغذائية المخزونة ولا تمتد في الحنطة والشعير.

## ٢٢٨٥٩ - قُوَيْعَةُ الْحَمْضِيَّات \*

*Prays citri* (S). Teigne du citronnier (F).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللون بسطها نحو ١٠ سم.  
نوبها إلى الطحلة. رواشها مرقشة. ثلاثية الاجيال الحولية.  
رقتها صغيرة اللون، تركب ازهار وثمار الحمضيات.

## ٢٢٨٦٠ - قُوَيْعَةُ الْخَشَب

*Teigne du bois mort* (F).

هي الهربيلة النبكة، اطلبها.

## ٢٢٨٦١ - قُوَيْعَةُ الدَّرَاقِن ، سَرَسْتُوم

*Cerostoma persicella* (S). Cérostome du pêcher (F).  
حشرة من القويبيات كبيرة اللون بسطها نحو ٢٥ سم.  
رواشها الاماميان إلى الصفار الكبريتي والخلفيان إلى  
الطحلة. رقتها رحيمة الجيل الحولي تركب اوراق الدراق  
والوز.

## ٢٢٨٦٢ - قُوَيْعَةُ الدَّرَاقِن الصَّغِيرَة \* ، أَنْرَسِيَا

*Anarsia lineatella* (S). Petite mineuse du pêcher (F).  
Peach twig borer (E). Pfirsichmote (D).

حشرة من القويبيات. بسطها تراوح من ١٤ إلى ١٦ سم.  
رواشها ضيقة طحلاء اللون. لها جيلان في الحول. تركب  
رقعة الجيل الاول الاثنان الثانية فتلفنها وتحول دون نموها.  
اما رقات الجيل الثاني فتتركب الثمار وتنخرها.

## ٢٢٨٦٣ - قُوَيْعَةُ الزُّعُرُور

*Teigne de l'aubépine* (F).

هي التميكة الصغيرة، اطلبها.

## ٢٢٨٦٤ - قُوَيْعَةُ الزُّيْتُون \*

*Prays oleella* (S). Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-  
mote (D).

حشرة من القويبيات. صغيرة اللون بسطها نحو ١٠ سم.  
نوبها رمادي اللون فضي المواجه. اجيالها الحولية ثلاثة.  
رقتها صغيرة اللون حشيتة اللون ثلاثية الخطوط السمرة القاطية  
تركب الارواق فتلفنها والازهار تقسب املاصها والثمار  
فتنخرها وتعلها.



قويعة النبات



قويعة الحبوب



قويعة الحمضيات



قويعة الدراق الصغيرة



قويعة الزيتون



قويعة الصوف



قويعة الفراء



قويعة الكرز

مكنها ذري القد مستدير الشكل لاقياحي الصمغ . ررقها صغيرة ملونة تلغ الاوراق والاعازر . خادراتها تحلج ضمن فبالج حبكها نواس لبد متين .



قوبعة ماسية

٢٢٨٨١ - قُوْبِيَّاتٌ Cobeeaceae (S).

Cobécées (F). Cobeeaceae (E).


فصيلة نباتية وسيدة الجنس، نباتاتها عارضة مهدها امريكة الاستوائية . ومن النباتين من قال انها عارة من القبيسات ومنهم من اعتبرها عارمة من البغليات .

٢٢٨٨٢ - قُوْبِيَّةٌ Cobaea (S). Cobéa, Cobée (F).

جنس نباتات عارضة معمرة من فصيلة القوبيات، انواعها اربعة اعطائها البلاد الامريكية . جميعها تريبتية . ازهارها جرسية الشكل ملونة . ثمارها حقية مستطيلة . بزورها مبطلعة || اعرف انواعها واشهرها القوية العارضة .

٢٢٨٨٣ - قُوْبِيَّةٌ عَاشِرَةٌ Cobaea scandens (S). Cobée grimpante (F). Cusps and saucers, Cathedral bells (E). Klettertulpen, Glockenrebe (D). Cobea (I).

نوع من القوية ساقها ليفية عارضة تطلو نحو ١٨ م . اوراقها مركبة وريقاتها يضيء النصل تطلو من ١٥ الى ٢٢ سم . ازهارها كبيرة القد تطلو نحو ٨ سم . اكائها بنفسجية مضلمة . نويجها جرسى الشكل ، اخضر اللون ، بنفسجي الموالج || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .



قوبعة ناسجة

٢٢٨٨٤ - قُوْبُونُ، حُوتُ الجِنِّ Gobius (S).

Gobie (F). Goby (E).

جنس اسماك بحرية بؤرية ترشب في المياه الرلكة . اجسامها صغيرة . رؤوسها كبيرة ، اشداها واسعة ، انواعها عديدة جميعها من الاسماك الثابتة التي تنقفز فوق الماء . منسلها في الاسماك السامة وبعضها مأكول . انواعها السامة تكثر في البحر الاحمر والخليج الفارسي وبحر اديب .



قوبية عارضة

٢٢٨٨٥ - قُوْبُونُ اسود \*، كُرُوجُ اسود Gobius niger (S). Gobie noir, Boulérot noir (F). Black goby, Rock-fish (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيويات ورنية شاكاتك اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط .

تعتبر من اسماك الثغاف والمجادح . تعيش بين الصخور وفي الاووالج || جسمها مستطيل الشكل ، مستعدل السطح ، يطول نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الكعبة السراء يطولها شحيح اسود في الظهر وتنقفز اسود في الجانبين تتخلله بعض النقط الصفراء . رأسها كبير الحجم ، يرمي الشكل ، قصير الخيط . شفاها معدل الانفراج ، فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذرية ثنائية الصف . عينها يبيضتان ، رديتا الانزكار . زعانفها متباعدة التركيب والاشكال . زعنفتها الذيلية رديحة الشكل || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .



قوبون اسود

٢٢٨٨٦ - قُوْبُونُ مَدَمَّى \*، كُرُوجُ مَدَمَّى Gobius cruentatus (S). Gobie sanglant (F).

Bloody goby, Sea-gudgeon (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيويات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك الثغاف والمجادح . جسمها معدل القد ، شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى



قوبون مدنى

٢٢٨٨٤ - قُوْبَعَةُ اللَّيْلَك Gracilaria syringella, Xanthosyllapteryx syringella

(S). Teigne du lilas (F). Lilac leaf miner (E). Fle-dermotte (D).

حشرة من القوبيات صغيرة القد بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . ثوبها حنطى اللون . ررقها تلغ اوراق اليك وتقتل اطرافها قطعها .

٢٢٨٨٥ - قُوْبَعَةُ المَضَاصِ Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). Hy-

ponomeute du fusain (F).

حشرة من القوبيات فراشها صغيرة القد ودياء الثوب . ررقها غبراء اللون تلهم ورق المضاص بعد ان تجلبه بشفارة من النراس العنكبوتي تعيش في داخلها حتى اكبال تطورها .

٢٢٨٨٦ - قُوْبَعَةُ التَّجِيلِيَّاتِ ٥ ، اَكَيْسَتِه

Elachiste argentella (S).

فَقِيَّةٌ

Teigne des graminées, Elachiste argentée (F).

حشرة مؤذية من القوبيات . فراشها صغيرة القد ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٥ م . روشنها الاماميان الى الطحلة الفقية . روشنها الخلفيان الى الصبهة يحويها اطار من الحبل المهدب الصنابي اللون || يرقها صغيرة دقيقة خطية اللون تركب عصمت التجليات فتلمج النصل بين بشرته || تظهر القرافة في ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . لما جيل واحد في الحول . تنشط البرقة وتظهر دها ليزعا في النصلان في شهر نيسان .

٢٢٨٨٧ - قُوْبَعَةُ الهَلْبِ ، سَعْفَةُ الهَلْبِ

Tinea crinella (S). Teigne des crins (F).

حشرة من القوبيات ررقها صغيرة القد سمرها اللون تركب الهلب وتقرضه .

٢٢٨٨٨ - قُوْبَعَةُ مَاسِيَّةٌ \*، قُوْبَعَةُ الصَّلْبِيَّاتِ

Plutella maculipennis (S). Teigne du colza, Teigne des crucifères (F). Diamond back moth (E). Kohlschabe, Kohlmoette, Schlieirmotte (D).

حشرة من القوبيات . بسطها تراوح من ١١ الى ١٢ م . رواشها خطية اللون تقرضها صفرة تملو الحبل المستطيل . فتلع كلالس . ررقها زباب، ثوبها الى الخضار الفاتح، تطلو نحو ١٢ م . تركب نباتات الفصيلة الصليبية اصمها السلم فتقرض الازهار والبزور .

٢٢٨٨٩ - قُوْبَعَةُ نَاسِجَةٍ \* Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hypon-

meute, Chenille fileuse (F).

حشرة من القوبيات ، تحيلة الجسم ضيقة الرواشن، بسطها تراوح من ١١ الى ٢٠ م . جيلها الحولي واحد . ررقها تركب التفاح والخوخ والزعرور فتتج على الاوراق جلباباً مزياً من النراس تعيش في داخله .

٢٢٨٩٠ - قُوْبَعِيَّاتٌ ، سَعْفِيَّاتٌ

Tineidae (S). Tinéides (F). Clothes moths (E). Echte motten (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجتة . اجناسها وانواعها زهاء ١٤٠٠٠ معلها من الحشرات الناصة، صغيرة القد ضيقة الرواشن المهدة الاطواف . ملاسها الشفوية صغيرة مدبية . قرضها الاستعمارية خطية حرورية .

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).  
Germinal power (E).  
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصل من الزمن تستغلها البذور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الانتاش قياس نسبي نوعي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانثاء.

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جاذِبَةٍ** (F). Force centripète (F).  
Centripetal force (E).  
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ غَامِرَةٍ ، قُوَّةُ غَمَرِيَّة ٥**  
Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).  
هي القوة التي تكبرها امواج البحر الطاغية الغامرة في مدحا وقد توصلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندفاعية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ نَائِذَةٍ ، قُوَّةُ طَارِدَةٍ ، قُوَّةُ مَبْعِدَةٍ**  
Force centrifuge (F).  
Centrifugal force (E).  
هي القوة التي تدفع الشيء لالبتعاد من المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِ** (F). Yack (F).  
هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوَّتِيَّة ٥**  
Bromatologie (F).  
Bromatologie (E).  
القوتية علم يبحث في الاعتداء مع وصف الاذية وتراكيبها ومعاييرها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قُوْنَع** هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قُوْس** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قُوْس** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).  
٢٢٩٠٠ - **قُوْس**  
القوس مجموعة من ستة كواكب تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قُوْس قُوْنَح** (F). Arc-en-ciel (F).  
هو القسطن ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قُوْسِيَّات** (F). Arctotées, Arctotidées (F).  
سبط من فصيلة المركبات الهيشريات .

٢٢٩٠٣ - **قُوَصَرَة** (F). Pot (F).  
هي المكن تركب فيه الزهور . ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوْطَة**  
كلمة عامية تستعمل للدلالة على الثمر وعلى البندورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوْطِي ٥ ، نَرَوَاة ٥** (F). Nasua (S). Coati (F).  
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الرتوليات . انواعها المعروفة خمسة ومنهم من قال انها نوعان وثلاثة غروب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستندرة الاذن ، كثيفة الصوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجلل .  
انها تضع من ٣ الى ٥ جراء . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الثمار والدويبات والحشرات .

٣٠ سم . حراشفها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الربعة والفترة الحمراء يعلوها في رأسها وظهراها وبطنها يتيج عابن الجمره كالد . زعانفها الظهرية والصدريه والذيلية مرقوبة بالاسمر والاخر || رأسها كبير الجرم مستعرض الخلف والظلم . شدتها واسع الانفراج فكها الاسفل يتقدم الاعلى قليلا . اسنانها صغيرة ذرية ، ثنائية الهنك . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الارتكاز . زعنفتها الظهرية الاولى مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاثني تسرا في فلق من الصدف الكبير بعد تنظيفها من الرمال والاووال وتتناوب مع الذكر على حراسة السرم حتى التقف || لهما جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قُوْبِيُونُ مَصْب ٥ ، كَرُوْجُ أَغْبَر**  
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).  
Gobius nebulosus (E).

سمكة بحرية بيوض من القويون . اعطانها تمتد من الخليج الى البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النقا والمخادج . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، معتدل التليط ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . حراشفها معينية جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعملو من الخط الجانبي الى الظهر تمتدح غير متفاوت الكثافة يبدو كالغيباب . اما القسم السفلي فقضي المراج . زعانفها الظهرية والشرجية شفافة . الصدريه والحوضية الى الخفصار البحري ويعملو الحوضية مواج اسمر . الذيلية شفافة ملوكة بخمار اسود || رأسها كبير الحجم ، غزور في الشكل ، قصير الخلف الذلق . اسنانها صغيرة ، متراسة . عيناها معنصرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيعتا الارتكاز . زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشعاع الثاني من الظهرية الاولى الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان لهما جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٨ - **قُوْبِيُونِيَّات** (S).  
Gobiidae (S).  
Gobiidés (F). Gobiidae (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اعطانها مياه البلاد للمتلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . اشداقها معتدلة الانفراج . عيونها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاولى منخسية الاطراف || اشهر اجناسها القويون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّة** (F). Force (F).  
هي صفة الانزامية المفروضة وهي تستعمل في الصيغ التالية :  
قوة الالابات Force probante (F).  
قوة الالتزام الخاص Force d'obligation privée (F).  
قوة القانون Force de loi (F).  
قوة المحكوم به Force de chose jugée (F).  
قوة تنفيذية Force exécutoire, Exécution parée (F).  
قوة قاهرة Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الامْتِصَاصِ ، قُوَّةُ المَصِّ**  
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).  
خاصة الثراب التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الذائبة القابلة للذوبان .



قويون مصب





قُوطِي مَعْرُوف



قُوتَحَان



قُوتَحَان الحَقْل



قُوتَحَان كَبِير



قُوتَحَان مَنيَات

قُوتَحَان مَنيَات

والبور. ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقه سفيرة  
ضيقة زياة النصل. رؤسياته الزهرية فردية التجميع،  
قلنسوة الشكل، صفراء اللون.

### ٢٢٩١٧ - قُوتَحَان المُرُوج \*، كُرويتَم البَر، مَنيَاتِيه

*Chrysanthemum coronarium* (S). *Chrysanthème à carène*, C. des jardins, Marguerite des champs (F). Crown daisy, C. marigold, Garden chrysanthemum (E). *Kronenwucherblume* (D). *Crisantemo da nazi*, *Bambagelle*, *Margherita gialla* (I).

عشبة حولية برية ورَبِيئِيَّة. ساقها فراء متشعبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريش. رؤسياتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طليها اصفر اللون اخضر الملاج. لسنتها الى الصفار الزاهي || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

### ٢٢٩١٨ - قُوتَحَان ذَهَبِي \*، لُؤبِيَا، كُرويتَم مَحْصَل

*Chrysanthemum segetum* (S). *Chrysanthème des blés*, *Marguerite dorée*, M. jaune (F). *Corn chrysanthemum*, C. marigold, Yellow corn-flower (E). *Echte Wucherblume*, *Kornringelblume* (D). *Margherita dorata*, M. delle messi, *Crisantemo* (I).

عشبة حولية برية ورَبِيئِيَّة ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريش، بحرية اللون، ثخينة النصل، متباعدة السنين. رؤسياتها الزهرية ذهنية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. معاليها متفتحة حقة الشكل || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

### ٢٢٩١٩ - قُوتَحَان كَبِير \*

*Chrysanthemum leucanthemum*, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, *Œil de bœuf* (F). Ox-eye daisy, White-weed, Dog daisy (E). *Gänsewucherblume*, *Riesenmargerite*, *Goldsblume* (D). *Margherita grande*, M. dei prati, *Margaritone* (I).

عشبة برية مبدولة معمرة ساقها فراء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لاقباسة الشكل والقد، رؤسياتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. لسنتها ضيقة مستطيلة. ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الثاني.

### ٢٢٩٢٠ - قُوتَحَان مَحْزَنِي \*، زُبدِيَّة، سُمِي

*Calendula officinalis* (S). Souci officinal, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, Mirliton (F). Hen and chickens, Pot marigold (E). *Ringelblume*, *Garten-ringelblume* (D). *Calendola*, *Calta dei giardini* (I).

نبات عشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. فروعها الزراعية عديدة سوفها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها سنالية متعاقبة. رؤسياتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفرة الذهبية العابقة.

### ٢٢٩٢١ - قُوتَحَان مَنيَات \*، شَجَرَة مَرَم، كَرَمَاش

*Chrysanthemum parthenium* (S). *Chrysanthème-Matricale*, *Grande camomille* (F). *Feverfew chrysanthemum* (E). *Goldfederwucherblume*, *Grosse Kamillen* (D). *Amarella*, *Matricale*, *Morella*, *Partenio* (I).

عشبة برية معمرة فواحة العرف. ساقها حيداء فراء تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقها رطلة لاقباسة التفرع تملو

*Nasua rufa* (S).

*Coati roux* (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ١٩ سم. ثوبه الى الجُرَّة الزاهية يمتد عند الظهر. رأسه ويحصر الى السمرة الرمضاء. ذنبه اسهب اللون ملق بالاسود || اعطانه شاسعة الحدود تم جمع بلاد امريكا الجنوبية.

### ٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف \*، قُوطِي مَسْجَابِي

*Nasua narica* (S). *Coati ordinaire* (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم. ثوبه الى السمرة السوداء المراج. يطنه الى الصفرة. خطمه ابيض الطرف. جمراته قصيرة وقوية، تخالبه حادة خاسية || اعطانه فسيحة الارباح تشمل المكسيك وغواتمالا وهندوراس وكوستاريكا.

### ٢٢٩٠٨ - ثُوف، مَحْكَارَة، صِيَوَان

*Pavillon de l'oreille* (F). *Pavillon*, *Auricle* (E).

قُوف الاذن وبمارة الاذن وصيوان الاذن، ثلاثة اسماء لمسي واحد.

### ٢٢٩٠٩ - قُوتَحَان

*Sillex meulier*, *Pierre meulière* (F). *Millstone grit* (E).

حجر اسود اسفنجي شديد الصلابة تعمل منه الرسى.

### ٢٢٩١٠ - قُوتَحَان

هو البجع، اطليه.

### ٢٢٩١١ - قُوتَحَان

*Caquet* (F). *Cackle* (E).

صوت الدجاجة على البيض وصوت الارواح.

### ٢٢٩١٢ - قُوتَحَان \*

*Pyrola* (S). *Pyrole* (F). *Wintergreen* (E). *Wintergrün* (D). *Pirola* (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القُوتَحَانِيات انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطائها بلاد الاقاليم المعتدلة. جلودها ليفية. سوفها مثبوتة. اوراقها متعاقبة متفتحة بيضيه. شماريحها الزهرية متبسة. ازهارها سلبية التجميع يبيض اللون.

### ٢٢٩١٣ - قُوتَحَانِيَات

*Pyrolaceae* (S).

*Pyrolacées* (F). *Pyrolaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللقطين متحدة القللات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها برية لا نفع لها. اشهرها القُوتَحَان.

### ٢٢٩١٤ - قُوتَحَان

*Pyrolaceae* (S).

*Chrysanthemum* (S).

*Chrysanthème* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ويحول ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة منها البرية والربِيئِيَّة واللبية. سوفها فراء. اوراقها متعاقبة مقوسة. ازهارها رؤسية صفراء اللون او يضاء || اشهر انواعها ما يتبع.

### ٢٢٩١٥ - قُوتَحَان

*Pyrolaceae* (S).

*Chrysanthemum* (S).

*Chrysanthème* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ويحول ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة منها البرية والربِيئِيَّة واللبية. سوفها فراء. اوراقها متعاقبة مقوسة. ازهارها رؤسية صفراء اللون او يضاء || اشهر انواعها ما يتبع.

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول

### ٢٢٩١٦ - قُوتَحَان الحَقْل

*Calendula arvensis* (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). *Feld-ringelblume*, *Wilde Ringelblume* (D). *Calendula*, *Calta dei campi*, *Fiorancio* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات يكثر في الحقول

Delphinapteridae (S). **قَوْسَات ٢٢٩٣٠**

Delphinapteridae (F). Delphinapteridae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة متأكلات الانسان  
ورتبة الحفويات || انواعها المعروفة قليلة تتميز بقصر  
المخاط وباندغام الزعانف الظهرية || أشهر أنواعها  
وأعرجها القوي وباللوعة .

Otocoris (S). **قَوْسِس ٢٢٩٣١**

Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).  
جنس طير من فصيلة القديرات انواعه قليلة جميعها قاطمة  
تجوب جبال البلاد الاسيوية والاروبية . تتميز بقصرها  
الرأسية الفارقة التي تبدو كقرنين صغيرين . انواها متباينة  
الألوان ، ظهورها الى الريدة الحمراء الجوانج يعلوها تجذيع  
اسمر . بطونها الى الكهية البغراء . رؤوسها وانعناقها موشحة  
بالاصفر || قوتها الحشرات والبزور البرية .

Koulam **قَوْلَان ٢٢٩٣٢**  
هو فراء الهند ، نوع من حجر الوش ، احليه .

**قَوْلَد زَعْفَرَانِي \* ٢٢٩٣٣**

Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).  
Colias croceus (E).

حشرة من فصيلة الكرنيبات حرشغيات الاجنحة . موطنها  
المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واسعة  
قوتها مشر الزهار . سربها تعيش على اوراق فصيلة  
القرنيات الفراشية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٩ م .  
يسطحها نحو ٤٨ م . رأسها اسمر اللون . عينها كبيرتان .  
زبانها صولجانيان . جوشها يرتقالي الحلقة الصدرية  
الاولى ، اريد الثانية والثالثة . بطنها احمر اللون ، اسمر  
المواج عند الذكر ، اللمع عند الانثى || ريشها الاماميان  
الى الصفار . الزعفراني تملو نقطة سوداء وجدة كستنية عند  
الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . وريشها الخلفيان الى  
الصفار الزعفراني متوسطه بقية حراء يعلوها اطار اسمر  
عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحول .  
تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل  
الثاني في آب . تسرح في النهار . تتناول بعد ظهورها  
بسة اسابيع وتتمتع المكن مباحداً على نصال الوراق ||  
السرعة تطول نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها  
الى الخضار الاصفر يملو خطان جانبيين اغبران قاطبان  
وعشرة اطواق كستنية وتغطي متباعد اسود واصفر . رأسها  
اسود . مدنها ورواجها الى السمره || طول الاكمال الذي  
يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في  
الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً .

**قَوْسَس ٢٢٩٣٤** العظم الناق\* بين اذني الفرس .

**قَوْسَة ، قَوْسَة ، قَوْسَة ، قَوْسَة ٢٢٩٣٥**

Salvia (S). Saug (F). Sage (E).  
جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات . انواعه  
نحو ٥٠٠ معظمها مجلي وبعضها جنبي . منها الحولي  
والحول والمعمر . سوقها عشوية فراء سريعة الانحصاص  
اوراقها متقاطعة معقنة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام  
والالوان . لاقياسة التجميع والارتكاز || اعرف وأشهر  
انواعها البرية والطبية والزيينية ما يتبع .

نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٥ سم . رؤوسها الزهرية صغيرة  
القد قطرها نحو ٢ سم . لسانها متساوية الطول والمرض .  
ضروبها عديدة منها الاصفر والابيض . والذهبي والبحري .

Milvago (S). **قَوْقَش ٢٢٩٣٢**

جنس طير من فصيلة الاشيوريات ورتبة الجوارح - جسمه  
ربع القد، طوله نحو ٤٠ سم . رأسه مستطيل الشكل .  
سقطه خفيف مستطيل وذنبه كذلك وهو مسرول الرفع ،  
دقيق الخلب || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية .  
اشهر انواعه قوقش شيشيا .

**قَوْقَش شِيْشِيْشِيْ ٢٢٩٣٣**

Milvago chimachima (S). Chimachima (F).  
طائر من القوقش، طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى الصهبة  
الداكنة . قوادم سقطه موشحة بالابيض . منسره ازرق  
اللون . رجاءه الى الخضار البحري . مخالبه دقيقة || موطنه  
امريكا الجنوبية يكثر في البرازيل والشيلي يعيش منفرداً  
الا في زمن الرعم والحضانة || قوته الجيف والزحافات  
والاناعي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تخضن  
من ٥ الى ٦ بيضات .

Helix (S). Escargot (F). **قَوْق ٢٢٩٣٤**

هو الخزون ، احليه .

Cantharellus (S). Chanterelle (F). **قَوْقَع ٢٢٩٣٥**

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه قليلة تتميز  
باطراسها الخارجية الخامة المنتظمة التي تكثف كامل  
الصفان || اعرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي .

**قَوْقَع أَصْفَر \* ٢٢٩٣٦**

Cantharellus cibarius (S). Chanterelle comestible.  
Girolle, G. comestible (F).

فطر مأكول كبير القد ، بوقي الشكل ، غني الصفار ،  
تجن الصفحة . يتباعد الاطراس .

**قَوْقَع بُرْتَقَالِي \* ٢٢٩٣٧**

Cantharellus coronilla (S). Chanterelle orangée.  
Girolle orangée, Fausse girolle (F).

فطر مژد وقد يكون ساماً في بعض الاحيان . عسقلانه  
اقل تحمواً من عسقلان القوقع الاصفر ، لونه الى البرتقالي .  
اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراف .

Tetraoallus (S). **قَوْقَل ٢٢٩٣٨**

Tétragalle, T. du Caucase, T. Caspien (F).

Tetraoallus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحجلليات وفصيلة  
الطيوريات . كبير الجفة طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى  
الطلحة الريداء الموشة بالاسود والاصهب . منقاره احذب  
اجن . عنقه مطوق الزور ، قوادمه يبيض القواعد سود  
الاطراف ، افضيكة كثيف الريش المستطيل المبيض بالصهبة  
والسود . رصنه ومخالبه الى الريدة || موطنه الجبال الريفية  
القليلة الاشجار . قوته الاشباب والحبوب والعسقلان والجفود .  
اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

Narval (F). **قَوْقِي ٢٢٩٣٩**

هو حريش البحر ، احليه .



قَوْقَع اصفر



قَوْقَع برتقالي



قَوْسِس



قَوْلَد زعفراني

وفرورها خلية زياء. اوراقها بيضية الشكل، نصلها مدبب الطرف سنن الحافة. ازهارها كبيرة القند مستطيلة لونها الى الحمرة العافية، توجيهاً تربو على اكمامها نحو ست مرات ٥٥ ازهارها يستمر طوال الصيف .

**٢٢٩٤٣ - فُوَسَّةُ سَمَاجُوتِيَّة** (S). *Salvia azurea*  
(F). *Sauge azurée*  
جنية تريينية سروتيعة معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فروع خلية اللحاء. اوراقها سائبة مقطوعة، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. ازهارها سبيلية التجميع، كبيرة، القند سمنجوني اللون. اكمامها لا قياسية الشكل والقند لونها الى الخضار المشرب الزرقاء ٥٥ ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

**٢٢٩٤٤ - فُوَسَّةُ صِيْنِيَّة** (S). *Salvia flava*  
(F). *Sauge chinoise*  
جنية سروتيعة معمرة فروعها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اعطائها الصين. ازهارها عنقودية التجميع، منشبة، كبيرة القند، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكمامها الى الصفار الكبريتي يملو توضيح ارجواني ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

**٢٢٩٤٥ - فُوَسَّةُ هُمِيَّة** (S). *Salvia verticillata*  
(F). *Sauge verticillée* (F). Whorled blue flowered sage (E). *Quirlsalvei* (D). *Salvia verticillata* (I).  
جنية تريينية معمرة. ساقها فروع تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اوراقها قليلة الشكل نصلها جامد الصفحة الخشنة الزياء. ازهارها سبيل التجميع. ازهارها نسيبة متعاقبة مستطيلة القند زرقاء اللون ٥٥ ازهارها يستمر طوال الصيف .

**٢٢٩٤٦ - فُوَسَّةُ هَيْفَةِ الْوَرَق** (S). *Salvia angustifolia*  
(F). *Sauge à feuilles étroites* (F).  
جنية تريينية سروتيعة معمرة. ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها غسيفة النصل مدبية الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ ازهارها سبيلية التجميع، زرقاء اللون، صغيرة القند ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

**٢٢٩٤٧ - فُوَسَّةُ فِصِيَّة** (S). *Salvia argentea*  
(F). *Sauge argentée*  
جنية تريينية محولة. ساقها فروع مزقية اللحاء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها كبيرة القند نصلها خلي البشرة على صفحتي يملو كأنه مطلي باللون الفضي. ازهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لونها الى البياض العاجي يملو مزاج رودي. اكمامها غدية دقة ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

**٢٢٩٤٨ - فُوَسَّةُ قَاسِيَّة \* ، كَتَفُ الدَّب** (S). *Salvia sclarea* (S). *Sauge sclarée*, *Sclarée*, *Toutte-bonne*, *Orvale* (F). *Clary* (E). *Muskatsalvei* (D). *Salvia sclarea*, *Matrisalvia*, *Tuttasana* (I).  
جنية برية مبذولة معمرة مسكية العرف الفواح. ساقها فروع تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها بسيطة بيضية الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. وموخل البشرة على صفحتي. ازهارها وردية اللون، للكية المزاج. اكمامها مسننة شاذكة قليلة الخمل ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

**٢٢٩٤٩ - فُوَسَّةُ كَبِيرَةِ الزَّهَر** (S). *Salvia patens* (S). *Sauge à grandes fleurs* (F).  
جنية تريينية معمرة. تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها

**٢٢٩٣٦ - فُوَسَّةُ الْجَبَل \*** (S). *Salvia sylvestris*  
(F). *Sauge de montagne* (F). *Wild sage*, *Wood sage* (E). *Waldsalvei*, *Wilde Salvei* (D). *Salvia montana*, *S. salvatica* (I).  
جنية برية طيبة مبذولة معمرة. ساقها زياء فروع تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها اعليلجية ضيقة، نصلها جامد الصفحة المسنة الخلية البشرة. ازهارها عنقودية التجميع زرقاء اللون بتفسيح المزاج ٥٥ تكثر في الاراضي الجبلية المخداحة مناهلها الصحية المعوية عديدة ويقال انها تستعمل في علاجات الفالج.

**٢٢٩٣٧ - فُوَسَّةُ الْمُرُوج \*** (S). *Salvia pratensis*  
(F). *Sauge des prés*  
جنية برية مبذولة معمرة. ساقها فروع زياء دقة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها بيضية الشكل، قليلة القاعدة. نصلها متعرج الصفحة، سنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. ازهارها عنقودية التجميع، زرقاء اللون، بتفسيح المزاج، متوسطة القند ٥٥ ازهارها يحصل على دفتين الاول من ايار الى حزيران والثانية طوال الحريف.

**٢٢٩٣٨ - فُوَسَّةُ بَهِيَّة** (S). *Salvia splendens*  
(F). *Sauge éclatante*  
جنية تريينية معمرة ترطب في المواقع الظليلة الرطبة. ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. اوراقها بيضية مدبية نصلها رمل التسج الناعم، سنن الحافة، مائل البشرة على صفحتي. ازهارها سبيلية التجميع، ياقوتية اللون تطول من ٥ الى ٧ سم. ٥٥ ازهارها يحصل على دفتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء.

**٢٢٩٣٩ - فُوَسَّةُ ثُنَائِيَّة الْوَلَن** (S). *Salvia bicolor*  
(F). *Sauge bicolor*  
جنية تريينية معمرة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مفرفة، مزقية، دقة. ازهارها ثنائية اللون. اقسامها العليا الى الزرقا البنفسجية المنشبة بالاصفر الذهبي، اقسامها السفلى الى البياض السوي. اكمامها متوسطة القند، غدية النصل. عنقودها الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ٥٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

**٢٢٩٤٠ - فُوَسَّةُ حَبَشِيَّة ، اَلْيُفُوس** (S). *Salvia aethiopica* (S). *Sauge d'Ethiopie*, *Ethiopienne*. (F). *Ethiopian sage* (E). *Unigarische Salvei* (D). *Salvia di Candia*, *S. lanata* (I).  
جنية برية طيبة معمرة. ساقها فروع زياء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كتيبة الخمل والذب السوي الشكل. اوراقها متوسطة الطول. نصلها خلي الصفحة. ازهارها صغيرة القند يضاء اللون. اكمامها مزقية عادمة التثنيق. توجيهاً يطول نحو ٢ سم. ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

**٢٢٩٤١ - فُوَسَّةُ دَقِيْقَة** (S). *Salvia glutinosa*  
(F). *Sauge glutineuse*  
جنية مبذولة معمرة تكثر في الجبال. ساقها فروع تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها السفلى كبيرة القند تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفحة. ازهارها تطول نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الجميلة. اكمامها انبوبية الشكل غدية البشرة ٥٥ ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

**٢٢٩٤٢ - فُوَسَّةُ رَشِيْقَة** (S). *Salvia elegans*  
(F). *Sauge élégante*  
جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها



فُوَسَّةُ الْجَبَل



فُوَسَّةُ الْمُرُوج



فُوَسَّةُ صَمِيَّة



فُوَسَّةُ قَاسِيَّة

٢٢٩٥٧ - قِيَاس ، تَقْيِيْع ، اِنْفِصَاح Grasserie  
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود  
على الشجر فينتفخ جسمها ويصفر لونها ويصبح جلدها  
شفافاً فيفرز مائناً غروباً يلوث الورق فتضخم اجزائها  
الدخالية وتموت . ويمكن للديد المصاب بهذا المرض أن  
ينسج سلجته ويتحول فيها الى خادرة ولكنه لا يلبث أن  
يموت فيصبح مادة فاسدة مائعة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - قِيَاس Jockey  
هو الجوكي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - قِيَاس Mesure

٢٢٩٦٠ - قِيَاس الارتفاع ، تَقْدِين  
Nivellement (F). Levelling (E).  
تعيين الارتفاع النسبي لمختلف اجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - قِيَاس الأشعة Actinométrie (F).  
Actinometry (E).  
هو قياس قوة الاشعة .

٢٢٩٦٢ - قِيَاس التحليل Acétimétrie (F).  
Acetimetry (E).  
قياس درجة تحليل الخلل أي حوضته .

٢٢٩٦٣ - قِيَاس الحموضة Acidimétrie (F).  
Acidimetry (E).  
قياس الحامض بجمدة من مائها .

٢٢٩٦٤ - قِيَاس الرطوبة ، رَزَاغَة  
Hygrométrie (F). Hygrometry (E).  
قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - قِيَاس السكر Saccharimétrie (F).  
Saccharimetry (E).  
طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والعصارات السكرية

٢٢٩٦٦ - قِيَاس القلبي Alcalimétrie (F).  
Alkalimetry (E).  
معرفة مقدار القلبي الحقيقي في البوتاس وغيره .

٢٢٩٦٧ - قِيَاس الكحول Alcoolométrie (F).  
Alcoholometry (E).  
مجموعة الاساليب او الطرائق المستعملة لتحديد مقادير  
الكحول الموجودة في السوائل او المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - قِيَاس املاح الماء Hydrotimétrie (F).  
Hydrotimetry (E).  
قياس مقدار املاح الجصية الموجودة في الماء .

٢٢٩٦٩ - قِيَاس Mensuration (F).  
Measurement (E).  
وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطبايع والحيوان  
لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض  
الاعضاء .

٢٢٩٧٠ - قِيَاسِي ، تَنَاسُفِي Symétrique (F).  
Symmetrical (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما كان منسجم التركيب منسويه .

٢٢٩٧١ - قِيَاسِيَّة الشكل Actinomorphe (F).

فراء زباء . اوراقها رحيمة الشكل ، نصلها خشن اللمس  
متجمع الختان . ازهارها كبيرة القند زرقاء اللون . اكلها  
تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || ازهارها يستمر  
من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - قُوْسَة كَرْدِيْنَالِيَّة  
Salvia cardinalis, S. fulgens (S). Sauge cardinale (F).  
جنية ترابينية معمرة . ساقها منتصبة فراء تملو من ١٠٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقها بيضية الشكل قليلة القاعدة تطول  
نحو ١٢ سم . نصلها جاهد الصفحة خلي البشرة الخسل  
مدب الطرف . ازهارها كبيرة القند ارجوانية اللون سنبلية  
التجميع تتعاقب على ابعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم .  
ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

٢٢٩٥١ - قُوْسَة مُتَقَابِلَة الْأَزْهَار  
Salvia oppositiflora (S). Sauge à fleurs opposées (F).  
جنية برية وترابينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم .  
اوراقها بيضيه مظلوية تطول من ٢ الى ٥ سم . وتعرض  
من ١٥ الى ٤٠ سم . نصلها تحدد الصفحة ، يارز المروق .  
ازهارها سنبلية التجميع ، متعاقبة ، برتقالية اللون .  
ازهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - قُوْسَة مَخْزِنِيَّة \* ، مَرِيْمِيَّة ،  
أَسْفَلَس

Salvia officinalis (S).  
Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé  
de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E).  
Echte Salbei, Garten Salbei, Salbey (D). Salvia offi-  
cinalis, S. grande, S. cultivata (I).  
جنية برية طيبة بمبولة معمرة . ساقها فراء زباء تملو من  
٢٠ الى ٧٠ سم . اوراقها كاملة ، اهليلجية ، اذينية القاعدة .  
نصلها خلي البشرة على صفحتي . ازهارها بتفصية اللون  
تطول نحو ٣ سم . اكلها ملونة خلية || ازهارها يستمر  
من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استعمال الشاي . منافها  
الصحية عديدة .

٢٢٩٥٣ - قُوْسَة مُشْدَوْدَة  
Salvia hians (S).  
Sauge béante (F).

جنية برية جبلية معمرة . ساقها فراء غدية لزجة تملو  
من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لا قياسية الشكل منها البيضية  
والقلبية والرحمية ، جميعها مستطيلة الاضلاع المملاتية التي يبلغ  
طولها نحو ٢٥ سم . نصلها تطول من ١٣ الى ١٥ سم .  
وهي سنبنة المائلة خلية البشرة . ازهارها الى الزرق الزاهية ،  
توجهها يطول نحو ٤ سم . قسها العلوي منمق الى الخارج  
يبدو كأنه مشدوق الشفة || ازهارها يستمر من تموز  
الى آب .

٢٢٩٥٤ - قُوْسَة مُهَيَّجَة  
في المردكوش الآخر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - قُوْسَة يَابَانِيَّة  
Slavia nipponica (S).  
Sauge japonaise (F).  
بجلة سبروتية فراء تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اسطها  
اليابان . ساقها وفروها زباء القاء . اوراقها صغيرة القند  
خلية النصل . ازهارها تسمية الانتكاز ، عقودية التجميع ،  
مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . اكلها رطلة فضفاضة  
خلية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - قُوْسِيَّة ، قُوْسَة Sauge (F).  
هي القويسة . راجعها .



قُوْسَة مَخْزِنِيَّة

وترفع قدر الذراع ونورها كنورة البفسج يستوقد بسوقها  
وطية . الواحدة قنبية (السان).

٢٢٩٨٤ - قَبْصُومٌ أَنْثَى ، عَشْبَةٌ  
مُقَدَّسَةٌ

Santolina Chamaecyparissus (S). Santoline, Petit  
cypresse, Aurone femelle, Garde-robe (F). Lavender  
cotton, Ground cypress (E). Zypressenhellgen-  
pflanze, Zypressenkraut (D). Santolina, Abrotano  
femina, Crespolina (I).

نبات جنيني عطري بري معمر من فصيلة المركبات .  
ساقه فرعاء تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . أوراق صغيرة  
القد ، ضيقة النصل المسن المزب البشرة . رؤسائه  
الزهري فردية التجميع صغيرة القند صفراء اللون || ازهاره  
يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٩٨٥ - قَبْصَانَةٌ  
Lampris  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات . انواعها عديدة  
جميعها كبيرة القد ، بيضية الشكل ، صغيرة القم والخطم ،  
عذبة الاسنان ، زرقاء اللون ، وردية المواج ، قصبية التبيج .  
زئافنها الى الحمرة الفاتحة || اسطفاها بحار البلاد المحتلة  
الحرارة . اشهرها قبصانة البدر .

٢٢٩٨٦ - قَبْصَانَةُ الْبَدْرِ \*  
Lampris luna (S).  
Lampris lune, Poisson lune, Chrysotosse (F). Moon-  
fish, Opah (E).

نوع من القبصانة وهي سمكة بحرية غريبة الشكل  
المتوسط طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الزرقاء الوردية  
المواج . جانبها مضيء بالفضة .

٢٢٩٨٧ - قَبْصَلٌ \*  
Pinna (S).

Pinne (F). Pinna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة متوسطة العدد ، بعضها  
من سمجرات الاراضي الجورية والباشيرية والبفسج الآخر  
منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة  
اصداؤها كبيرة تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . وهي غروبية  
الشكل متساوية المصاريح البالغة التخديط العلوي تملوها  
زركشة وزخارف وخطوط متفرقة متباينة الالوان . داخلها  
لؤلؤي والمادة وكثيرا ما يوجد في تجويفها لؤلؤ . وردية  
اللون فاقرة الصف متينة . لبها غزير المادة يستعمل  
في صناعة القفازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الغبار  
المذهب ، تسجيح نام الخط متينه || تعيش لاسقة  
بالصخور على اعماق تراوح من ٤ الى ١٢ م . ملجئها  
الحياتي جماعي . مجموعاتها تعد من ٥٠ زوجا الى اكثر  
من مئتين .

Verge du taureau (F).

Penis of a bull (E).

٢٢٩٨٨ - قَبْصُومٌ

قصب الثور .

٢٢٩٨٩ - قَبْصُومٌ \* ، أَبْرُوطُونٌ ، رَيْحَانُ  
الْأَرْضِ ، مَسْكُ الْخَيْلِ

Artemisia abrotanum, Abrotanum (S). Aurone,  
Citronelle (F). Abrotanum, Southern wood, Old  
man (E). Eberaute, Citronkraut (D). Abrotano,  
Citronella (I).

جنيبة عطرية طيبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبورية  
الزهر . عرفها فواح مستحب . ازهارها ابيض الازرناك  
عذوقية التجميع ذهبية اللون عطرية العرف . ازهارها

٢٢٩٧٢ - قِيَاسَةٌ ، قَبْصٌ ، مَقْبَاضَةٌ

Troc (F). Truck (E).

هي الاستعاضة ، من الاعمال الاقتصادية التجارية . ترتكز  
على مبادلة شيء بشيء .

٢٢٩٧٣ - قِيَاسٌ

القياض من الزرع ما زرع في الخريف قبل المطر .

Bathymétrie (F).

Bathymetry (E).

٢٢٩٧٤ - قِيَاسَةٌ

سير عمق البحر .

Morphologie (F).

Morphology (E).

٢٢٩٧٥ - قِيَاسَةٌ

القياض علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجموا  
بكلمة مورفولوجية .

Despotisme (F).

Despotism (E).

٢٢٩٧٦ - قِيَالَةٌ

القِيَالَةُ الحكم المطلق المستبد النافذ الارادة .

٢٢٩٧٧ - قَيْشَارَةٌ ، سَلْيَاكٌ ، سَلْحَفَاةٌ

Lyre, Tortue, Testudo (F). Lyra, Testudo (E).

القيشارة والسلياق والسلفاعة ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم  
شامية الموضع . مركزها بين الدجاجة والجاثي . وقد تسموها  
بالسلفاعة نظرا لشدة ببط حركتها || عدد نجومها ٢١  
منها « النسر الواقع » الذي يعتبر من المرتبة الاولى وقد  
شبهته العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كأنه واقع على  
شيء . وقدام النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب « الاقطار »  
علم الفلك يقولون ان النظام الشمسي يجذب ببطله نحو  
النسر الواقع .

Inscription (F).

Inscription, Registry (E).

٢٢٩٧٨ - قَيْدٌ ، تَقْدِيدٌ

Polx (F).

٢٢٩٧٩ - قَيْرٌ

هو القطار ، اطله .

Carat

٢٢٩٨٠ - قَيْرَاطٌ

حصة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض  
المدائن الكينية اخمصها الذهب يبر من مقدار الذهب  
الصرف . فالذهب حيار ٢٤ هو الذهب الخالص من كل  
جرم غريب والذهب حيار ١٨ مثلاً هو ما شل ١٨ جزءاً  
من الذهب الخالص وبقية اجزاء من غير الذهب || والقيراط  
يساوي في وزن الحجاراة الكريمة كاللؤلؤ ما قدره :

في فرنسا ٠,٢٠٥٩ غرام

في انكلترا والمانيا ٠,٢٠٥٥ غرام

في البرازيل ٠,١٩٢٢ غرام

Quirat

٢٢٩٨١ - قَيْرَاطٌ

هو نصف دانق . كان وزن حبة غروب . والذهب  
اثنتا عشرة حبة . وهو في الحجاز ربع سند دينار وفي  
الوراق نصف عشرة || وعند استعماله في المساحة يعني عرض  
الاصبع || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسوا التيجرات  
الى اربعة وعشرين قيراطاً .

Musculi botryoides (F).

٢٢٩٨٢ - قَيْسَمَةٌ

هي الخمل الجليل ، اطله .

٢٢٩٨٣ - قَيْسَبٌ

نجر من الحمض . وهو شجرة تثبت عيوطاً من اصل واحد



قبسوم



قبصانة البدر



قبصل



قبصوم

المائية . بلايعيها عادة الحاطل القرنية والاسنان الشفوية .  
لكنها مزودة بلواس مستطيلة تملو زوايا الاشداق ||  
منها انواع تعيش وتتكاثر في الاكواريوم ، اخصها قيلم  
لفيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْم هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْعُن Cheilanthus (S). Chélanthe (F).  
جنس سراسخ من البسباجيات . انواعه نحو ٣٠ اعطائها  
مختلف مناطق العالم اخصها الاستوائية والحارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْفَاكَنْتُس Céphalanthé (F).  
هو الرأسية ، اطليه .

٢٣٠٠١ - قَيْفَاوُس Cephé (F). Cephus (E).

كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين  
وذات الكربي . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم  
الذي على الصدر « النثرة » والذي على الكتف الايمن  
« الفرقة » . والذاتة التي تحصل من نجوم ذراعها وما هو  
خارج ضبا « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى  
« الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى  
« الاغنام » .

٢٣٠٠٢ - قَيْشَة Physionomie (F).  
Physiognomy (E).

هي مجموعة التقاطيع والملامح والقبسات الفارقة التي تميز بين  
شيء وبشيء .

٢٣٠٠٣ - قَيْشُوع  
بنت ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تثبت بكل  
مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْقُ \* ، زَرْيَاب Garrulus lanceolatus (S). Geai lanceolé (F). Jay (E).  
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يألف القفص  
فيقتبس الاصوات ويردها || وهو طائر مؤذ ضار .  
شكله كالبومة ، جسمه يطول نحو ٣٥ سم . اصدا الثوب .  
اسود الرأس . ازرق الزمكي . يجزع الجناحين والذنب  
بخطوط متراكبة السواد والزرقة والبياض || قوته الحبوب  
والثآليل البانعة ويختلف انواع الصائير الصغيرة ويضعها  
وفرأخها والمظا والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في  
الاشجار الحرجية الظليلة ، اثناء تضع من ٤ الى ٦ بيضات  
تحضنها ١٦ يوما .

٢٣٠٠٥ - قَيْب هو البوق ، اطليه .

٢٣٠٠٦ - قَيْب ، أَسْتَدَاك Acer (S).  
Erable (F). Maple-tree (E).

جنس اشجار حرجية ويزينة من فصيلة القيقبيات . انواعه  
نحو ١٨٠ منها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة  
الهيكال والقالب . سكرية العصارة . اوراقها متعاقبة ،  
لا قياسية الشكل ، معظمها عايل وبعضها ابيد . ازهارها  
مختلفة التجميع والالوان ، غزيرة الرحيق ، يجربها النحل .  
ثمراها جناحية مركبة من جناتيتين ملتصقتين || اعرف  
انواعه اشددا ما يتد .

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب  
الآس ، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مضادة  
للحيات وناغمة تخفف اوجاع الصدر وضيق النفس  
والمفاصل . بينهم من قال انها من المقويات وقد تستعمل  
ايضا كطاردة للديدان || اما اسم مسك الجن فيطلق  
على عدة نباتات اخصها القيصوم والشفرور والزريرج والورام  
وحشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُوم أنثى Santoline (F).  
هو القنيسون ، اطليه .

٢٢٩٩١ - قَيْصُوم جبكي Achillée suave (F).  
هو الاخيلا المنشدة ، اطليه .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُوم طَبِي Armoise santonique (F).  
هو الشيج الحراساني ، اطليه .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُوم كافوري \* ، مُسِيكَة Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E).  
Wermut (D). Assenzio salvatico (I).

نبات عشبي طيب ري من المركبات الانبوية الزهر .  
سناه فرعاه تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه منعقة صغيرة  
القد ، غدية النصل . رؤسياته الزهرية خلية القناب ،  
ذعية اللون ، عنقودية التجميع ، كافورية العرف المستحب .  
ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْصُ Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E).  
القشرة العليا اي الخارجية البايسة على البيفة اما القشرة  
الداخلية فتدعى القرق .

٢٢٩٩٥ - قَيْطَايَا Noisetier de Turquie (F).  
هي البندق التركي ، اطليه .

٢٢٩٩٦ - قَيْطَس ، قَيْطُوس Baleine (F).  
Cetus (E).

كوكبة نجوم جنوبية تشرق على خط الاستواء وتمتد  
جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان  
يجري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب ||  
عدد نجومها ١٠٢ . والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس  
« الكفت الجذماء » ونها تير يدعى « المنقب » . وتسمى  
الحسة التي في اواسط البدن « اللعنامات » . والتي على اصل  
الذنب « النظام » . والتي على الشعبة الجنوبية من الذنب  
« الصفدع الثاني » . والتي على الشعبة الشمالية « ذنب قيطس  
الثاني » . وفي عنق قيطس نجم يدعى « الاعصوبة » او  
« اعصوبة قيطس » لان حجمه يتحول في اثناء مداره من  
المرئية الثانية الى الثامنة ولان لونه يتحول ايضا من الاحمر  
الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَم \* Xenopus (S).  
Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس ضفادع من فصيلة البباليات عاداته السان .  
انواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض المياه الافريقية  
اخصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول  
١٠ الى ١٥ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية  
الاجفان . ذكرها العليا عادية الانسان . اصابع قوائمها  
الامامية عادية الحظاب اما الخلفية تكاملة الحظاب والثلاث  
الداخلية منها منفلوطة الاطراف باغناد قرنية المادة تيدو  
كالحبال || انشأ تدأ نحو ٢٠٠ دصلة تلصقا بالثانات



قيصوم كافوري



قيلم



قين

صفحة ثلاثية العروق ، بحرية اللون ، زيتية المواج .  
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

### ٢٣٠١٣ - قَيْبٌ تَتَرِي Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سر بوتية تملو نحو ٨ أمتار . مهدا آسية الصغرى ، أوراقها عابلة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبى القاعدة ، مدب الطرف ، سن الحافة ، أغرب الصفحة السفلى ، باغت الخضار . أزهارها عذقية التجميع ، خاسية البتلات البيض جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

### ٢٣٠١٤ - قَيْبٌ ثَلَاثِي الْأَجْزَاء Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وُزَيْيئة جادة تملو نحو ٨ أمتار . مهدا اليابان . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفصيص . نصلها أسفني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها عذقية التجميع ، فسقية اللون ، جناحياتها متصالبة المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠١٥ - قَيْبٌ جَيْمَزِي \* جَرْمَشَق Acer pseudoplatanus (S). Erable sycomore, Faux platane, Grand érable (F). Great maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platanus (D). Acero liso, A. sicomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبلية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أوراقها عابلة منقطة ، ثلاثية أو خماسية التفصيص ، تقوّل وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها مائل البشرة على صفحته وهو أخضر العليا بحري السفلى يتشعب ثم يحمر في الخريف . أزهارها عقودية التجميع متدلية . جناحياتها متبادعة المشافر ، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ حَقْلِي

### ٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَقْلِي \* شَجَرَةُ الرَّبِّ Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzevole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbaum, Feldahorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averliello, Ceppolo (I).

شجرة سر بوتية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها مغلقة اللحم . أوراقها عابلة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خماسية التفصيص . نصلها جابد الصفحة ، مبهر الحامل ، أخضر اللون . أزهارها عذقية التجميع خضراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

### ٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دَلْسِي \* Acer platanoides (S). Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E). Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amilacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م . أعطاها البلاد الباردة . ساقها ملساء ، عصارتها لبية . أوراقها ثلاثية التفصيص تقوّل من ٨ إلى ١٨ سم . وتعرض من ٩ إلى ٢٥ م . نصلها مائل البشرة مدب الطرف . أزهارها عذقية التجميع صفراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلْسِي

### ٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي Acer palmatum, A. polymorphum (S). Erable palmé (F).

شجرة حرجية وُزَيْيئة تنفر من الآرية الكلسية . مهدا الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها عابلة ،

### ٢٣٠١٧ - قَيْبٌ أَيْضٌ Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc, E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weissler Ahorn (D). Acero bianco (I).

شجرة سر بوتية حرجية وُزَيْيئة تملو من ١٠ إلى ٣٠ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خماسية التفصيص . نصلها يعقوّل من ٦ إلى ١٥ سم . ويعرض من ٥ إلى ١٣ صفته العليا باغت الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، غبراء اللون ، بيضاء المواج . أزهارها عذقية التجميع ، صفراء اللون ، عادمة البتلات . جناحياتها كبيرة اللد متقاربة المشافر طولها براوح من ٥ إلى ٧ سم . تنور من شباط إلى نيسان .

### ٢٣٠١٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ Acer rubrum (S). Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Roter ahorn, Virginischer ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سر بوتية حرجية وُزَيْيئة ، مهدا امريكة الشمالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خماسية التفصيص . نصلها يعقوّل ويعرض من ٥ إلى ١٥ سم . صفته العليا مائلة البشرة ، زاهية الخضار ، صفته السفلى خلية البشرة ، أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها حر الاهن ، متبادعة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

### ٢٣٠١٩ - قَيْبٌ أُرْبَدُ Acer griseum (S). Erable gris (F).

شجرة حرجية وُزَيْيئة مهدا الصين . تملو من ١٠ إلى ١٢ م . أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يعقوّل من ٥ إلى ٦ سم . وهو مسن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خماسية التجميع ، مهدية التويجات والبتلات . جناحياتها خلية البشرة متبادعة المشافر ، تنور في أيار .

### ٢٣٠٢٠ - قَيْبٌ الْيَابَانُ Acer japonicum (S). Erable du Japon (F).

شجرة وُزَيْيئة سر بوتية مهدا اليابان . تملو نحو ٨ أمتار . ساقها ملساء اللحم ، فروعها مستطيلة ، مستدقة ، جزوية اللون . أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، مائل البشرة ، أخضر اللون ، مذهب المواج ، يحمر في الخريف . أزهارها عذقية التجميع حراء اللون . جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠٢١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ Acer glabrum (S). Erable glabre (F).

شجرة حرجية جادة تملو من ٧ إلى ١٣ م . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفصيص ، عنها جزوي اللون ، نصلها يعقوّل والتفصيص من ٧ سم . صفته العليا لامة البشرة شديدة الخضار ، صفته السفلى خلية غبراء . أزهارها عذقية التجميع . جناحياتها متبادعة المشافر . تنور في أيار .

### ٢٣٠٢٢ - قَيْبٌ إَهْلِيَجِي الْوَرَقُ Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سر بوتية تملو نحو ١٨ م . مهدا الصين . أوراقها عابلة منقطة . نصلها عادم التفصيص ، أهليجي الشكل يعقوّل من ١٥ إلى ٢٠ سم . ويعرض من ٥ إلى ٦ سم .

ويرى من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحيها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

### ٢٣٠٢٥ - قَيْبُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

*Acer macrophyllum* (S). Erable à grandes feuilles (F).  
شجرة حرجية جاذبة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية التفصيص طول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٠ نصلها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عتقودية التجميع، متدلية، فصلها وامديتها خلية البشرة. جناحيها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

### ٢٣٠٢٦ - قَيْبُ مَرْنَانِي الْوَرَقِ

*Acer negundo*, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).  
شجرة حرجية وريينية مهدا امريكة الثالية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها مركبة وريية التجميع. وريقاتها خس اوسع، نصلها لا قياسية الشكل طول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها إلى الخضار الجميل اللامع يملوه توشيح اصفر وايض. أزهارها عنائيد مستطيلة متدلية. جناحيها متساوية المشافر الدقيقة المستعرضة. تنور في نيسان.

### ٢٣٠٢٧ - قَيْبُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَقِ

*Acer circinnatum* (S). Erable à feuilles rondes (F).  
شجرة حرجية وريينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فرصها وافنانها إلى الجؤوة. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفته خضراء اللون، خلية العروق، مسنة الحافة، نصلها في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع، متدلية. تحمل في الحمرة. بتلاتها إلى البياض. جناحيها صغيرة القد شبه مستديرة. تنور في أيار.

### ٢٣٠٢٨ - قَيْبُ مِلْوان

*Acer opalus* (S). Erable opale, Duret, Ayale (F).  
شجرة سرروتية مبذولة تملو من ٨ إلى ٢٠ م. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلها يضيي الشكل، مستديرة الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتاعبة. أزهارها عتقودية التجميع. جناحيها متباعدة المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

### ٢٣٠٢٩ - قَيْبُ مِيَابِي

*Acer miyabei* (S). Erable de Miyabe (F).  
شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها مغلقة اللحاء. أوراقها عابلة ثلاثية التفصيص. نصلها اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى، باهت العروق. أزهارها عتقودية التجميع. جناحيها خلية البشرة. تنور من أيار إلى حزيران.

### ٢٣٠٣٠ - قَبَائِيَت، أَسْتَدَائِيَت

*Aceraceae* (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F).  
*Aceraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة القعالات. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها القيقب || جميع نباتاتها شجرية. اغشائها صناعية مرموقة يكثر فيها اللون الاحمر.

منقطة، خاسية أو سباعية التفصيص. نصلها جامد الصفحة، راسي الشكل، اخضر اللون، مذهب الملاج. أزهارها عتقودية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

### ٢٣٠١٩ - قَيْبُ رُبَاعِي الْأَجْزَاءِ

*Acer tetramerum* (S). Erable tétramère (F).  
شجرة حرجية سرروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا الصين. أوراقها عابلة منقطة بيضية الشكل. نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ صفته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حثاره مزدوج التسنين. أزهارها عتقودية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات اخضر. تنور في أيار.

### ٢٣٠٢٠ - قَيْبُ زُغُرُوِي الْوَرَقِ

*Acer crataegifolium* (S). Erable à feuilles d'aulépine (F).  
شجرة حرجية تملو نحو ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة منقطة. نصلها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو اخضر الصفحة العليا، يحمر السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع لونها إلى الخضار الفتتي. جناحيها مستقيمة الزوايا. تنور في أيار.

### ٢٣٠٢١ - قَيْبُ سَكْرِي

*Acer saccharum*, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckerahorn, Zucker massholder (D). *Acero zuchcherino*, *A. del Canadie* (I).  
شجرة سرروتية داتحة تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. ساقها ملساء، عصارتها غزيرة المادة السكرية. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص، تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١١ إلى ١٦. نصلها مائل البشرة، مدبب الطرف، اخضر الصفحة العليا، يحمر السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها عتقودية التجميع، غبراء اللون. جناحيها انقية المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

### ٢٣٠٢٢ - قَيْبُ سَلَمِي الْوَرَقِ

*Acer clusifolium* (S). Erable à feuilles de cissus (F).  
شجرة سرروتية وريينية مهدا اليابان تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ م. أوراقها مركبة، وريية التجميع، لاقياسية الحد. وريقاتها غرطية الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية، رباعية الفصل والبتلات. جناحيها صغيرة القد، متباعدة المشافر. تنور في أيار.

### ٢٣٠٢٣ - قَيْبُ شَرْمِي الْوَرَقِ

*Acer caprinifolium* (S). Erable à feuilles de charme (F).  
شجرة حرجية سرروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار. مهدا اليابان. أوراقها عابلة منقطة. نصلها لامع الصفحة المحبونة المسنة الحافة، بارز العروق التي يراوح عددها من ١٦ إلى ٢٠ زوجاً. أزهارها عتقودية التجميع متدلية، رباعية البتلات المخضر. جناحيها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

### ٢٣٠٢٤ - قَيْبُ شَيْطَانِي

*Acer diabolicum* (S). Erable diabolique (F).  
شجرة جاذبة مهدا اليابان تملو من ٦ إلى ١٠ امتار. أوراقها عابلة، منقطة، ثلاثية التفصيص. نصلها يطول



Hématocèle (F).

Haematocèle (E).

ورم يسببه ارتشاح الدم في بنس أجزاء الجسم .

Despotique (F). Despotie (E).

ثمت تعريفي يطلق على كل ما هو استبدادي أو تعسفي .  
كثوك سلطة قبلية أو حاكم قبلي .

Curateur (F).

Guardian, Trustee (E).

هو الذي يمين لإدارة مال المحجور عليه أو لإدارة شؤون القاصر .

Valeur (F). Value (E).

قيمة  
هي من الشيء أو قدره أي ما يقوم مقامه . ج قيم . والقيمة تستعمل في تمايز عديدة . أشهر صيغها ما يلي :

Valeur locative (F).

Valeur déclarée (F).

Valeur vénale (F).

Valeur agréée (F).

Valeur fournie (F).

Valeur mobilière (F).

٢٣٠٣٦ - قَبْلَةُ دَمَوِيَّة

٢٣٠٣٧ - قَبْلِيَّة

٢٣٠٣٨ - قِيم

٢٣٠٣٩ - قِيَمَة

قيمة إيجارية

قيمة مصرحة ، قيمة مبنية

قيمة متعامل بها

قيمة معتمدة

قيمة مقدمة

قيمة منقولة

Coquillière (F). Conchiferous (E). قَبْلَقَة

قشرة البيفة الرقيقة الداخلية تغلف البياض تحت القيش ج قيق .

٢٣٠٣٢ - قَبْلَقُوْبَة Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).

ذبابة مؤذية من الثعرايت . أناها تلسع البقر ولا تعف عن الخليل والحصير ، راجع نكرة البقر .

٢٣٠٣٣ - قَبْلَقُوْبِيَّات Cuculidae (S).

Cuculidés, Cuculés (F). Cuculidae (E).

فصيلة طير من رتبة المنسلقات . اجناسها وأنواعها عديدة تجتمع إلى ثمان عائل ، أشهرها البوقايات . أصلها العالم . تألفت الإحراج الكثيفة . معظمها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والمشي . قوتها الحشرات والدويبات وهي لا تحسن بيضها ولا ترق فراخها .

٢٣٠٣٤ - قَبْل Despote (F). Despot (E).

القيل الحاكم المطلق التصرف المستبد .

٢٣٠٣٥ - قَبْلَة Hydrocèle (F).

هي الأذرة ، أظها .

## جدول ١

## القيمة الغذائية في لتر واحد من التمار المدرجة ادناه

## قيمة غذائية

النوع	خلاصة جافة غ	حوامض <sup>(١)</sup> غ	سكر منحل غ	سكرز غ	رمان غ	بروتين ٦,٢٥ × ن غ	سعة (وحدة حرارية)
اجاص	١٧٢	٢,٧	٩٠	١٣	٣,٥	٣,٥	٥٦٧
اناس	١٦٠	٦,٧	٣٥	٧٥	٥,٢	٤,٣	٥٩٥
برتقال	١٥٧	١٣,٥	٦٠	٢٥	٤,٨	٧,٠	٥٨٠
نفاخ	١٦١	٦,٥	٨٣	١٦	٤,١	٣,٧	٥٧٠
تين	٢١٥	٠	١٥٨	٠	٧,١	١١,٥	٧٤٥
خوخ	١٩٦	٩,٥	٧٥	١٨	٥,١	٦,٩	٧١٨
خوخ زركلود	١٨١	١٢,٥	٦٥	٣٦	٦,٠	٦,٥	٧٠٤
دراق	١٧٣	٨,١	٣٥	٤٢	٥,٨	٦,٦	٦٠٨
سفرجل	١٨١	٩,٣	٦٧	٦	٥,٨	٤,٨	٥٨٥
شمول توت	١٥٠	٨,٦	٥٥	٤,٧	٥,٠	٩,٦	٤١١
شليك (فراولة)	١٤٦	١٨,٤	٥١	٧	٧,٤	١٠,٦	٤٣٣
عنب	٢٠٩	٧,٧	١٥٠	٠	٤,٨	٥,٩	٧٥٧
قام احمر	١٦٣	١٩,٨	٨٢	٥,٣	٢,٦	٥,٩	٥٦٠
قام آسي	١٦٤	٨,٥	٥٤	٢,٢	٣,٧	٦,٨	٥٢٧
كرز	١٨٣	٦,٨	١٠١	٥,٧	٤,٩	٧,١	٦٨١
كشمش شائك	١٤٥	١٩,٠	٥٥	٤,٨	٤,٩	٧,٧	٤٤٥
كشمش عقودي	١٦٢	٢٣,٠	٥٠	٢,٤	٦,٦	١١,٢	٤٤٠
ليون حامض	١٧٤	٥٤,٠	٣٠	٣٠,٠	٥,٦	٦,٣	٥٧٥
مشمش	١٤٨	١٢,٧	٣١	٣٦,٠	٦,٧	٨,٠	٥١٦
موز	٢٦٢	٣,٨	١٠٨	٨٩,٠	٨,٩	١١,٣	٩٧٠

(١) الحوامض التي تدل في تركيب التمار عديدة . لا مجال للدكرها الزائدة . اشبعها التفاحي ثم اللبوني ثم الطرطي الموجود في العنب .

جدول ٢  
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الثمار الجافة<sup>(١)</sup>

النوع	ماء %	مواد معدنية %	بروتين %	مواد دسمة %	غلويسيد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
بازيلاً خضراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بنلوره	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,٠٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمص (جاف)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
خرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
خس	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٣,٠٠	١٨٩
خيار	٩٥	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دبق زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سبانخ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لقي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شمام	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شمندر سكري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
سوجا (جافة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عدس (جاف)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٠,٦٠	٤٤,٦٠	٢١٣٠
فاصوليا (جافة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
فست عبيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كرات أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كرات معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرنس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كرنب	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبيا خضراء	٨٩	١,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هندب (طرخشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٤٠	٦,٣٠	٢٥٠
يندق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٢٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥٠,٢٠	١٠,٥٠	٥٧٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائية المدونة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مريئة لا تدخل فيها القشور والبذور.

مستطيلة ذرية . اثوابها متراكبة الالوان || تألف الغابات ويجاري الماء . قوتها العطاء والحشرات اخصها الجراد . تنش في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمناداة الذكور .

٢٣٠٤٦ - قِيُون الجَبَل (F). Cuon de montagne  
حيوان مفترس يدعى شهل الشال ، اطلقه .

٢٣٠٤٧ - قِيُون الغَاب \* ، قِيُون اِزْمِرْتِي

Halcyon smyrnensis (S). Halcyon de Smyrne (F).  
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابج . اعطاه الالبانية تشمل بعض الرياض وصفات الانهر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وصفته وخوشاء وبطنه الى الكستاني الداكن . زوره واعل صدره الى البياض . رداؤه وظهره وصبره الى الزرقه الخضر . جناحه متراكب الازرق والاخضر والاورد والكستاني والابيض . قوادمه الى الزرقه الخضر . كلاء الى السمرة القامحة . اياهره الى السمرة الخنطية . مناكبه مجذعة بالابيض عيشه كبيرتان . حذقة عينه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل ، محدوب الافك الاسفل ، احمر اللون . ساقاه الى الجؤرة وصفه قصيرة سَرْدِيَّة القشار || تألف الغابات والرياض ويجاري الماء . قوته العطاء والحشرات اخصها السحالي والجنادب والجراد || يدشن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمناداة الذكر نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



قِيُون الغَاب

٢٣٠٤٠ - قِيَمَة غِذَائِيَّة (F). Valeur alimentaire  
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الامتصاص والتشيل الى طاقة ومواد استهلاكية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما تيسر لنا من القيم الغذائية المعادة لبيض الطائر المشهورة . اما الجدول الثاني فللقبول ولبعض الطائر الجافة .

٢٣٠٤١ - قِيَمَة مَرِيئِيَّة (F). Valeur alibile  
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشيل والامتصاص .

٢٣٠٤٢ - قِيَتَس (S). Tragelaphus angasi  
Tragelaphe d'Angas (F).

نوع من الجهيل وهو اكبر جفء من البرع واصغر من الغلب . ثوبه احمر اللون يعلو موج اصفر ويتجديع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افريقية .

٢٣٠٤٣ - قِيَهَل ، قِيَهَلَة (F). Face  
وجه الشيء كقولك قبل البناء ...

٢٣٠٤٤ - قِيَهَلِي (F). Facial  
نعت تعريضي يطلق عل ما له صلة بالتهيل .

٢٣٠٤٥ - قِيُون ، دِيَك البَحْر (F). Halcyon (F). Halcyon, Kingfisher (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطاهها البلاد الافريقية واسترالية . اجسامها متوسطة القد . منافعها



ك

نحو ١٥ يومًا يتقضي ضمن سلجة تحبكهما السرفة بين شقوق البحاء .

٢٣٠٥١ - كَابُوكْ \* ، قَابُوكْ ، دَعَسْ

Eriodendron (S). Capouquier, Kapouquier, Ouatier, Cottonnier soyeux (F). Cotton grass, C. sedge, Silk cotton tree (E). Kapokbaum, Silk Windeuderwollbaum (D). Capoc (I).

جنس اشجار كبيرة القد ضخمة الساق داخنة من فصيلة الخيازيات . انواعه المعروفة ثمانية اصنافها البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية . ثمارها برتقالية الحجم ، بيضية او كروية الشكل ، محشوة بالزغب الدقيق ، الناعم ، اللامع ، القصير التيلة الذي يحق البذور من كل صوب . استعماله ينحصر بالصناعة الرائدة لانه لا يصلح للغزل .

٢٣٠٥٢ - كَابُوكْ

زغب ثمار الكابوك

٢٣٠٥٣ - كَابِيَاكْ \* ، خَنْزِيرِ الماء

Hydrochaeris capybara (S). Cabiais, Carpincho, Capybara, Cochon d'eau (F). Capybara, Cavy, Guinea-pig (E).

حيوان ليون قاضم وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكا الجنوبية من الغويان الى البرازيل وبوليفيا . يعيش جماعات كثيرة العدد ولكل ذكر ثلاث اناث || وهو اكبر القواضم جنة ، طوله ١١٥ سم . وارتفاعه ٥٠ اما وزنه فلا يقل عن ٥٠ كيلو . جسمه خفيف ثقيل . رأسه غليظ الشكل ، كبير القد ، اقلص المقص . اذناه صغيرتان . ذنبه جذعة .

قوامه قوية صغيرة . ثوبه خشن الغليظ الهليبي لونه الى البصرة والصفه والصفرة || يأكل ضفاد الأبر والمناقع والبيجرات . يسرح في النهار . سيره بطيء للغاية . قوة جمع النباتات المائية والارز والذرة وتختلف التفرجات . الانثى تضع من ٣ الى ٨ ادراس تحرس بعد وضعها ببضع ساعات .

٢٣٠٤٨ - كَابْ ، قَسِيصْ ، جِلْبَابْ Cape (F). Wraper, Outer-leaf (E).

قلمة من نصل التبع الجاف تصلح لتغليف السيكار . لذلك يجب ان تكون جيدة الرقمة ، ناعمة الملمس ، مصقولة النسيج اللدن ، سوية اللون البني المايق او الجوزي الفاتح .

٢٣٠٤٩ - كَابِيَحْ ٥

Inhibant (F). Inhibant (E). نعت تعريفي يطلق على كل مادة من شأنها ايقاف الحركة الطبيعية في اي عضو كان اما كلياً او بعض الوقت .

٢٣٠٥٠ - كَابِيَرَةُ الحَوَرِ \* Cabera trilineata (S). Cabère du peuplier (F). Cabera trilineata (E).

حشرة من الارقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارزة . فراشها جارسه قوتها رقيق الازهار . سرقتها تمشي على اوراق الحور والصفصاف || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٣٩ م . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان .

زبانها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . مرشفها معتدل الجرم . جوشها ويطنها الى البياض الاخير المواجه || رواشها عند الشقين الى البياض الاخير تعلو في الزوج الامامي ثلاثة خطوط معتززة رادية . ويمدو في الزوج الخلفي خيطان معتزضان ، مفاصن ، اشهبان . اهدابها الى القبرة القصية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح من الغروب الى فحة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان ميحادياً في شقوق البحاء || السرفة تغزل من ٢٤ الى ٢٨ م . جسمها استوائي الشكل ، مالمس القشار . ثوبها الى الطمعة الكدرار يملعوا ترقيط حنطي رقشة سمرار تمانت الحيط . رأسها الى السمرة السوداء .

مدنها الى الشبهة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر



كابرة الحور



كابوك



كابايا

٢٣٠٥٤ - **كاتب عدل** (F). Notary (E).  
مأمور قضائي منوط به ان يحضر في دائرة اختصاصه جميع  
المعقد التي يرغب اصحابها اثبات صحتها الرسمية .

٢٣٠٥٥ - **كاتب** (F). Garrot du cheval (F).  
(E). Withers of a horse (E).

الكاتب والكتابة هو مجتمع كني الفرس المعروف بالجاروك.  
ج كواب .

٢٣٠٥٦ - **كاجو ، حبّ البلاذر** (F). Noix d'acajou (F).  
Cashew-nut (E).

هي ثمار البلاذر الشرقي والغربي . وهي مأكلة ويستخلص  
من عصارته بعد تخميرها وتقطيعها مشروب كحول  
مستحب العلم .

٢٣٠٥٧ - **كاجيبوت** (F). Caleputier (F).  
هي بلفاء كاجيبوت ، اطلبها .

٢٣٠٥٨ - **كاج ، كيج** (F). Versant de montagne (F).  
(E). Side of a mountain (E).  
الكاج والكيج : سفح الجبل . ج اكياج وكيج .

٢٣٠٥٩ - **كاد** (F). Cadie (F).

الاسم الفرنسي من العري . جنبة برية وزراعية تزيينية  
من فصيلة القرنيات ويسيطر الهندسات . مهدها بعض مناطق  
افريقية الشمالية || سالتها صلبة كثيرة الفروع الدقيقة .  
اوراقها متعاقبة مركبة وقرية التجميع . وريقاتها صغيرة  
متقابلة . ازهارها فردية ، ابطية الازتكاز ، شبه جرسية  
الشكل ، وريدة اللون ، خافتة العرف المستحب .

٢٣٠٦٠ - **كاد هندي** (F). Cachoutier (F).  
هو سبط كاشو ، اطلبه .

٢٣٠٦١ - **كادل** (F). Cadelle (F).  
هي رقة اسطوخودوس ، تعيش على الجيوب المكسورة او  
المكسوة من الحشرات فزيد في عطها واذاها .

٢٣٠٦٢ - **كاديه** (F). Tondeuse de gazon (F).  
Lawn-mower (E).  
الكاديه والمكسمة : مجز آلي يستعمل لقطع الاعشاب  
اخصها الخضير .

٢٣٠٦٣ - **كادينين** (F). Cadinène (F).  
هيدروكربور راتنجي سائل يستخلص من زيت الكاد  
ورائج الالبسة والصنوبر والابست والكافور والحلثيت  
والثشولي . ثقله النسبي عند ٢٠ °س = ٠.٩١٨ ، يغلي  
عند ٢٧٤ / ٢٧٥ °س .

٢٣٠٦٤ - **كاذة** (F).  
الكاذة هي ما حول الحياء من ظاهر الفخذين .

٢٣٠٦٥ - **كاذي** (S). Pandanus (S).  
Pandanus, Baquois, Vaquois (F). Pandang oil plant,  
Screw pine (E). Pandanuspalme (D). Pandano (I).  
جلس نباتات ليغية معمرة من فصيلة الكاذيات، انواعه  
عديدة منتبها البلاد الحارة . سورها جلدية منتصبه او متسلقة  
عامة الاغصان ، تملون من متر واحد الى ٢٠ م . جلورها  
تريه وحواليه متدلية لافعة . اوراقها عصفية الشكل قرصية

التجميع هامة الازتكاز . ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة  
الفية والزائد . ثمارها اكواز اسطوانية نووية التركيب .  
زورها نشوية المادة || اكثر انواعه برية وتزيينية وسها  
الزراعية الصناعية والمأكولة البار . اشهرها ما يتبع .

٢٣٠٦٦ - **كاذي العرف** (F). Pandanus odoratissimus (S). Pandanus parfumé (F).  
نوع من الكاذي الزراعي ساقه منتصبه تملون من ٢٠٠ الى  
٤٠٠ سم . اوراقها عصفية ، ذرية ، مذبذبة الزايم الاخير ،  
تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . نصلها سرج البشرة ،  
مهذب الصلع والخافتة ، بحري الخضار . ثماره مأكلة ،  
سكرية الطعم ، عطرية العرف ، جواء اللون ، تطول من  
١٠ الى ١٥ سم .

٢٣٠٦٧ - **كاذي مدعسكر** (F). Pandanus utilis (S). Pandanus utile (F).  
نوع من الكاذي الزراعي الصناعي . منتبه جزيرة مدغشقر .  
ساقه منتصبه متسلقة ثنائية او ثلاثية الجروع ، تملون  
من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها عصفية مستطيلة ؛ نصلها جامد  
الصفحة ، شائك الحافة ، عايق الخضار البحري . ثماره  
لا توكل ، زورها نشوية المادة || يزرع لاوراقه  
الصناعية ، الياها نسيجية تستعمل في حياكة الاكياس  
والبسوط والاطناب .

٢٣٠٦٨ - **كاذيات** (S). Pandaceae (S).  
Pandacées, Pandanées (F). Pandaceae (E).  
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قليلة الاجناس الانواع .  
نباتاتها معمرة ليغية السوق منها المنتصبه مستطيلة ؛ نصلها جامد  
للمتسلقة . ثمارها عنبية كوزية التجميع . زورها نشوية  
المادة . اشهر اجناسها الكاذي .

٢٣٠٦٩ - **كاريبة** (F). Herse à disques, Pulvérisateur (F).  
هي المشط الصخري او مشط ذو صنوج يستعمل لتفتيت  
مدر التربة ولتنعيم سطحها .

٢٣٠٧٠ - **كاريوكيس ، دودة الثمار** (F). Carpocapsa, Laspeyresia, Cydia (S). Crapocapse,  
Ver des fruits (F).

جنس حشرات من فصيلة الفاتلات ورتبة حشرنيات  
الاجنحة . انواعه عديدة طولها يراوح من ٥ الى ٨ م .  
وبسطها من ١٠ الى ٢٠ م . رواشتها حنطية يعلوها تحطيط  
وتقيح وزراكن مختلفة الالوان || يرقاتها صغيرة القد  
دقيقة الجسم تطلون من ١٢ الى ١٧ م . تنفق بيضاه  
اللون ثم تغير وتسر وتستر على الجزوة او الحفرة .  
رووسها بيقة او سود . مدياتها الى السمرة . مكها ذري  
القد ، عدي الشكل ، اسمر اللون ينطق بعد متعه بنحو  
٢٠٠ ساعة || ايجالها الحولية تراوح من اثنين الى ثلاثة .  
اناثها تنجح المكن في كزوس الازهار ينطق عن زوات  
تحيلة تنقب الثمار في طلب الغذاء فتدخلها بسرديب تخفروها  
بانجاح البزور ثم تخرج منها بعد انسلخها الايجال فتزول  
صلجاتها حيث تتحول الى خادرات بين شقوق اللحاء او  
تحتها . وبعد انقضاء نحو ٥٠٠ ساعة تنشر الصلجات  
عن فراشات تطير فتكوم ثم تسرد على الثمار فتشئ ايجالها  
الثانية وتعيد سيرتها الاولى . اما اضرار رقات الايجال  
الثانية فلا تقل عن اضرار جنيناتها من الايجال السابقة  
لانها تتركب الثمار فتتخروها وتعيش في داخلها وقد تقضي  
عليها وتنبس موطونها || اغصن مواتلها الفتاح والاصاص  
والسفرجل والدارقن والمشمش والخوخ والجوز والكسكتا ...



كاد



كاذي

Infusible

٢٣٠٧٦ - كَارُوج °

غير قابل الانصهار .

٢٣٠٧٧ - كَارِغَة النخلة التي على المادج كارات.

٢٣٠٧٨ - كَارِغَة ° حَصِيْشَة الْجَمِيل

Calochortus (S). Calochorte, Tulipe des Mormons (F). Globe tulip, Hair-bell (E). Grasschöne, Mormontulpe (D). Calocorto (I).

جنس نباتات بصلية تربيتين من فصيلة الزنبقيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. سوقها شراعية تنتهي بالازهار. اوراقها قرصية الانتشاب، تصلها جامد الصفحة الصيقة المستطيلة، ازهارها عنقودية او مظلية التجميع، جملة الشكل. كؤوس اكمامها ثلاثية الفصل السنانية الذرية الخضراء اللون. توجعها ثلاثية البلات المستعرة الزاهية الالوان || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٠٧٩ - كَارِغَة بَهِيْة

Calochortus venustus (S). Calochorte superbe (F). نوع من الكارفة. شراخها الزهري يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها عنقودية التجميع متدلية كبيرة الحجم، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيض الصفحة الداخلية حر الخارجية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٠ - كَارِغَة بَيْضَاء Calochortus albus (S). Calochorte blanc (F).

نوع من الكارفة. شراخها يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ازهارها مظلية التجميع، متدلية، كبيرة القد، تطول وتعرض نحو ٤ سم. بتلاتها حر القويود والقواعد، بيض النصال الخلعية الهذبة الاطراف || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٠٨١ - كَارِغَة ظَرْبِيْة

Calochortus pulchellus (S). Calochorte gracieux (F). نوع من الكارفة. شراخها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٩٠ سم. ازهارها مظلية التجميع متدلية متوسطة الحجم، تطول وتعرض نحو ٣ سم. بتلاتها الى الصفار الكبيرى الزاهي. اطرافها مهدبة، قيودها وقواعدا وكامل زاهها الاول الى الحمرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٢ - كَارِغَة لَيْلَكِيْة

Calochortus lilacius (S). Calochorte lilas (F). نوع من الكارفة. شراخها الزهري يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهارها عنقودية التجميع، منتصبه، كبيرة الحجم، قطرها نحو ٤ سم. وطولها نحو ٢ سم. بتلاتها ليلكية اللون، خلية البشرة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٣٠٨٣ - كَارُوتِين Carotène (F). Carotin (E).

هو الخضاب الاحمر في اوراق النبات وهو ما يعجبه الخضيب . والكاروتين يتحول الى فيتامين «ا» وهو كثير في الجزر والبيتدورة .

٢٣٠٨٤ - كَارُوج °

Icterus (S).

Carouge (F). Icterus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة خمسة اعطاهنا مجتد من البرازيل الى كوبا وتحكيما . تألف الغايات والحراج الكثيفة . نغمارها الحليى جامي . اسرارها متوسطة العدد || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٤ الى

تكاثر باستعمال زرنيدات الرصاص او غيرها من الحواشير الفعالة الجهرية الكثيرة العدد .

٢٣٠٧١ - كَارْبُوكِيْسُ التَّفَاح ° ، دُوْدَة التَّفَاح

Carpocapsa pomonella, Laspeyresia pomonella, Cydia pomonella (S). Carposcapse des pommes, Ver des pommes (F). Codling moth (E). Apfelwickler, Obstmad (D).

فراشة من الكاربوكيس بسطها تراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. رواشها الى السمرة الخطية، الاساميان عديدان تضرها خطوط رسية وتعلوها بقع ملعبة عند طرف كل ريش . الخلفيان موحان بالنسجاني || البرقة تنقف ببيضه اللون ثم تنصرف الى الذرية وتستقر على الوردي . اجيالها الحولية اثنان، جيلها الاول يبتنى في الربيع حيث تمتع مكها افراديا على الثمار بعد انعقادها .

٢٣٠٧٢ - كَارْبُوكِيْسُ الخَوْخ °

Laspeyresia funebrena, Opadia funebrena (S). Carposcapse des prunes (F). Red plum maggot (E). Pflaumenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. رواشها الى السمرة العاقبة يملوها قتيقج اغبر || جيلها الحولي واحد . ريقها تعيش حتى انسلاخها الاخير داخل الثمرة فتعطى || تكاثر بعد الانزهار على اثر سقوط التوجيات الزهرية . وينصح بعدم استعمال الزرنيدات .

٢٣٠٧٣ - كَارْبُوكِيْسُ الدَّرَاقِيْن ° ، قَابِلَة شَرْقِيْة

Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pêcher (F). Oriental peach moth (E). Pfirsichtriebbohrer (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٢ الى ١٤ سم. رواشها الى الاساميان الى الكهية العاقبة يملوها توشم ابيض . رواشها الخلفيان الى الكهية الخنطية الموالج || اجيالها الحولية اثنان . ريقات الجيل الاول تلغم النواهي الناشئة فتسهم وتميتها . اما ريقات الجيل الثاني فتعيش داخل الثمار التي تعطيها وتنسب تلفها || تكاثر باستعمال بعض الحواشير الفعالة الجهرية وذلك بعد التزاع وحرق جمع النواهي اليابسة .

٢٣٠٧٤ - كَارْبُوكِيْسُ الشَّكْبَرِ ، دُوْدَة الشَّكْبَرِ

Laspeyresia woebleriana, Semasia woebleriana, Grapholitha woebleriana, Tortrix woebleriana (S). Carposcapse de l'aulubier (F). Rindenwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٤ الى ١٦ سم. ثوبها سطلي اللون، ورواشها الى الزردة السراء يملوها تنسج اغبر واسود . ريقاتها تركب لحاء الاشجار المثمرة وغير المثمرة وتفسدها حتى الشكبر حيث تستقر الى ان يتم انسلاخها وتطورها البرقي فتخرج ثم تنسج صلبتها وتخلد فيها حتى الربيع .

٢٣٠٧٥ - كَارْبُوكِيْسُ الكَسْتَنَات °

Laspeyresia splendana (S). Carposcapse des châtaignes, Ver des châtaignes (F). European codling moth (E). Kastanienwickler, Eichelwickler (D).

فراشة صغيرة القد بسطها تراوح من ١٠ الى ١٣ سم. رواشها الاساميان الى الكهية الخنطية بخطوط سود، رواشها الخلفيان الى السمرة الخنطية السوية || جيلها الحولي واحد . ريقها تنخر ثمرة الكستناء وتعيش في داخلها وقد تسبب املاحصا او سقوطها قبل الادراك وعنده .



كاربوكيس التفاح



كاربوكيس الخوخ



كاربوكيس الدراقين



كاربوكيس الكستناء



كارفة

- كأس لياسية Calice régulier (F). Regular calyx (E).  
 كأس لالياسية Calice irrégulier (F).  
 Irregular calyx (E).  
 كأس متحدة الفصائل Calice gamosépale (F).  
 Gamosepal calyx (E).  
 كأس منفصلة الفصائل Calice dialysépale (F).  
 Dialysepal calyx (E).



كاروج جَمِيكَا

## ٢٣٠٩٠ - كَاسِرِ ٢٣٠٩٠

كل ما يلحف الجلد عند الطير كالريش ، وما يلحف بشرة الارواق واللحاء عند النبات .

٢٣٠٩١ - كَاسِحِ Envahissant (F). Invading (E).  
 نمت تمريني يطلق على كل نبات بري يتسلط على النبات المزروع ويبيد نموه .

## ٢٣٠٩٢ - كَاسِرِ Réfringent (F). Refracting (E).

٢٣٠٩٣ - كَاسِرِ الْجَوَزِ ، كَاسِرِ الْقَوَزِ ، خَزَانِ الْجَوَزِ ، خَزَانِ الْبُنْدُقِ ، تَبَسِ Sitte (S). Sittelle (F). Nuthatch (E).

جنس طير من الجوارثم شبات الرقبات المناقير . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولهراوح من ١٢ الى ١٦ سم . اناؤها ملونة . اجنتها معتدلة القد . اذناها قصيرة ومربعة . مناقيرها مخروطية قوية . السنبا قصيرة مزدوجة قابضة . ارساغها حبيبية . مخالبها دقيقة . تألف الغابات والاحجام والجلال والقرع . قوتها الحشرات ويزور النباتات البرية والزراعية || تدفن في تجاويف الاشجار وفي اوقاف الصخور واعشاش النغار والحطاف . اناها تقصع من ٦ الى ٩ يبيضات تحضنها وسدها من ١٣ الى ١٤ يوما .

## ٢٣٠٩٤ - كَاسِرِ الْجَوَزِ الْاُورُوبِي ، تَبَسِ الْاُورُوبِي Sitte europaea (S). Sittelle d'Europe (F).

طائر من كواسر الجوز طوله نحو ١٤ سم . ثوبه ثوب كاسر الجوز الازرق الا انه اعم بياضا واقل حمرة في بطنه وظاهر جناحه || موطنه اوروبا الشرقية والثالية . يألف الغابات والاحراج .

## ٢٣٠٩٥ - كَاسِرِ الْجَوَزِ الْاَزْرَقِ \* ، تَبَسِ اَزْرَقِ Sitte coesia (S). Sittelle torche-pot, S. bleue, Torche-pot, Pic bleu, Pic maçon (F).

طائر من كواسر الجوز طوله نحو ١٦ سم . رأسه وظهوره وانفيكه الى الرادي الازرق المواع . جناحاه الى السرة يعلو حنجرها تجذيع ابيض . محمره وزوره وصدره الى البياض الناصع ، بطنه الى الصبغة السفراء . منقاره وصمعي اللون || موطنه الشرق الاذن واوروبا الجنوبية والغربية .

## ٢٣٠٩٦ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي ، تَبَسِ سِرْيَانِي Sitte syriaca (S). Sittelle syriacque (F).

نوع من كواسر الجوز طوله نحو ١٦ سم . رأسه وظهوره وانفيكه الى الوردية الزرقاء المواع . جناحاه الى السرة الخطيئة ، اباهره يبيض الاطراف . محمره وزوره وصدره والنقص الاكبر من بطنه الى البياض الناصع . منقاره حنطي اللون || موطنه الشرق الاذن ، يألف المناطق الجبلية الصخرية .

٢٣٠٩٧ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي ، تَبَسِ السِّرْيَانِي Icterus jamacali (S). Carouge jamacali (F).  
 طائر من الكاروج . يكثر وجوده في البرازيل والفيونان . يألف الغابات والاحراج الكثيفة . سره يراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ زوج || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٧ سم . رأسه وقنزته وعنقه وظهوره وذنبه الى السواد الاسفح المواع . صدره وبطنه وزمكاه الى الصفراء البرتقالي . جناحاه الى السواد الاسفح المواع . يمتزجها حزامان اصفران . الزام الاخير من ذنبه الى الصفرة البرتقائية . عيناه كبيرتان مكشلتان بالاسود ويطلقها حنجر اصفر . حدة عينه صفراء اللون . منقاره اسود ، فكه اخضر . رساه الى السرة الخطيئة || من ميزاته انه يحسن التفريد ويقتبس الحان غيره من الطير . قوته الحشرات والحبوب والثمار المختلفة . يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص شرط ان يكون هيبجا || يدفن عشه في الاشجار المعتدلة الارتفاع من سطح التربة . عشه شبه كروي الشكل ، كبير الحجم ، جانبيه المنخل ، يحكيه بالحشيش والالاف والقص الناعم . الاثنى تقصع من ٤ الى ٦ يبيضات تحضنها وسدها نحو ١٧ يوما بينما الذكر يئفن لها الغذاء .

## ٢٣٠٩٨ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي ٢٣٠٩٨

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Icteridae (S). Icteridae (E).  
 فصيلة طير من الجوارثم شبات المناقير تشمل فصيلة الزرورديات في القارة الامريكية . اجناسها واناؤها كثيرة العدد . تألف الغابات والاحراج والحقول . نظامها الحياتي جماعي . اسرارها وافرة العدد || اجسامها تراوح بين الوسطى والصغيرة . مناقيرها متفرعة الاحجام . اناؤها تختلف مع الانواع ، منها الساطع الاسفح المواع ومنها الباهت . بعضها يقتل الحان والاصوات التي يسميها فيردها . منظر اناؤها يعيش اكثر من نصف حياته على الارض || اعرف اجناسها واشهرها الكاروج والباليمور والفاطان والكسيك والكسيكال والمطرس .

## ٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي ٢٣٠٩٩

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Caséase (F).  
 هو الجبناز . اطلبه .  
 ٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Caséine (F).  
 هي الجبنين . اطلبها .  
 ٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice (F). Calyx (E).  
 جراج الفصل او الفصائل التي تولف بوق الزهرة او لفاقها الخارجية . وكرويز النبات مختلفة الاشكال والتركيب لذلك فهي قد تكون :

## ٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي ٢٣٠٩٩

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice persistant (F).  
 Persistant calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice caduc (F).  
 Deciduous calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

٢٣٠٩٩ - كَاسِرِ الْجَوَزِ السِّرْيَانِي Calice asépale (F).  
 Asepal calyx (E).

## \* ٢٣١١٠ - كافور

Cinnamomum camphora, Laurus camphora, Camphora officinarum (S). Camphrier, C. de Chine, Laurier du Japon (F). Camphor tree, Common camphor of China (E). Japanischer Kamferbaum (D). Lauro canfora (I).

شجرة عطرية كبيرة القدة دائمة من القرفيات وفصيلة الغاربات. مهدها الأصلي، حيث تثبت طويلاً، يمتد من جزيرة فرموزا وتبلغ طونكان إلى جزر الزابج. ساقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ م. قطر جذعها براوح من متر إلى مترين. اغصانها كبيرة فارشة. أوراقها أبيض، معتقة، اهليلجية، مستطيلة؛ نصلها جابد الصفحة، اللامعة رباعي العروق القاعدية الانتشاب. ثمارها زيتونية نوية بيضية الشكل سواء اللون بنفسجية المواج || زراعتها الصناعية تكثر في اليابان والصين وألمنة. يستخرج من اخشابها بعد قطعها وتقصيلها وتقطيرها بالماء نحو ٣ ٪ من الكافور الحر. وقد يستخرج من أوراقها وبالتقطير أيضاً، اذا قُطعت عند ازديادها، ما قدره ١,٢ ٪ || استأثر الأوراق يتنبئ بعد الفرس بنحس سنوات اما الخشب فلا يستأثر إلا بعد الفرس بغيرين سنة وبهم من جعل المدة ٣٠ سنة كما هي الحال في فرموزا اما اخشاب فرموزا تقطر نحو ٥ ٪

٢٣١١١ - كافورات  
Camphorate  
ملح الحامض الكافوري.

٢٣١١٢ - كافوري  
Camphorique (F).  
Camphoric (E).  
نعت ترميني يطلق على كل حاض مصدره الكافور.

٢٣١١٣ - كافورية  
Pyrèthre (F).  
هي القريدب، اطلبه.

٢٣١١٤ - كاكاو، \* تَبْرُومَةُ الكاكاو، لُوزُ  
الآلهة  
Theobroma cacao (S).  
Cacaotier, Cacaoyer, Théobrome cacao (F). Cacao tree (E). Cacaobaum, Kakaobaum (D). Cacao, Theobroma (I).

نوع من التبرومه، ضروبه وأصرامه الزراعية عديدة، جميعها شجيرات وأشجار فراء تملو من ٤ إلى ١٠ أمتار. أوراقها معتقة متعاقبة بيضية الشكل، نصلها كفة الصفصفة المتدلية، بارز العروق، بدب المقصعة. ازهارها خثوية نظامية خاسية التركيب. ثمارها مخروطية، مضلعة، خاسية الفلق وكل فلفة تحوي من ٥ إلى ١٢ لوزة أو حبة || يتكاثر بالبذر. شمرته تثمر بعمر أربع سنوات ويحبي على مرتين في العام وقد يكون حملها جيداً بعمر ٧ سنوات وتبلغ الأوج بعمر ١٢ سنة ويستمر غصنها وأغصانها من ٢٥ إلى ٣٠ سنة || يرغب في الأترية العميقة الغور، المتوسطة الانحماج، المرتكزة على عصري العلن والربل || وجبة الكاكاو عند ادراكها وفصلها من الثمرة تكون علقمية المذاق تنضج بطريقة خاصة، تراوح مدتها من ١٠ إلى ١٢ يوماً، تقضي على القسم الاكبر من المرارة ثم تنسل ويخفف وتعمق || وجبة الكاكاو هذه تحوي ما قدره :

- ٥٠ ٪ من المواد الدهنية
- ٢٠ ٪ من المواد الزلالية
- ١٠ ٪ من المواد الشوية

## ٢٣٠٩٧ - كاسير الحَجَر

هو الشجار الخرفي، اطلبه.

٢٣٠٩٨ - كاسير العظم  
Gypaète (F).  
هو البلع، اطلبه.

٢٣٠٩٩ - كاسية  
Tectrice  
كاسية. ج. كواس. الريش الصغير الذي يلحف قاعدة جناح وذنب الطائر.

٢٣١٠٠ - كاسية\*، خشب مر  
Quassia amara (S). Quassia, Quassier (F). Quassia, Bitter ash (E). Bitterholz, Echter Quassiabaum (D). Quassia, Legno amaro (I).

شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة السذابيات السمرويات موطنها الغويان. ساقها معتقة فراء تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية أو خاسية الوريقات الاهليلجية الشكل. ازهارها خثوية، حراء، عقدوية التجميع، تاجية الارتكاز. اخشابها طيبة تدعى خشب سورينام (bois de surinam) يستخرج منها مادة مرة تدعى كاسين شائعة الاستعمال الطبي.

٢٣١٠١ - كاسيتريت  
Cassitérite (F).  
Cassiterite (E).

اسم يطلق على اكسيد القصدير اللطيف الذي يستخرج منه القصدير الصناعي المعروف || ثقله النوعي ٦,٩٦ وصلابته تراوح من ٦ إلى ٧ || لونه الى السمرة تملو ما جات مخلفة أكثرها الاسود.

٢٣١٠٢ - كاشيف  
Réactif (F).  
Reactive, Reagent (E).

٢٣١٠٣ - كاشم، كاشم رؤمي  
Livèche (F).  
هو الانجذان الربوي، اطلبه.

٢٣١٠٤ - كاشن  
Livèche (F).  
هو الانجذان الربوي، اطلبه.

٢٣١٠٥ - كاشو  
Cachou (F).  
Cachou, Catechu (E).  
مادة حفصة منشطة تفيد المدة تستخرج من كوتل الكاشو وبعض أنواع السط.

٢٣١٠٦ - كاع، كُوع  
Radius  
هو الزند الاعل.

٢٣١٠٧ - كاعن  
Médiocre (F). Mediocre (E).  
الكاعن من التي ما كان دين المستوى الاوسط.

٢٣١٠٨ - كافور  
Spathe  
الكافور والكفري ثنابة عظيمة تحيط ببعض اشكال الانزهار كالطلعة مثلاً.

٢٣١٠٩ - كافور  
Camphre (F). Camphor (E).  
مادة عطرية بيضاء اللون متبلورة تستخرج من اوراق واخشاب شجر الكافور وتستخدم ضد التشنج والباله والألام الموضعية.



كاسية



كانور



كاكاو



٤ ٪ من المواد المعدنية

٢ ٪ من مادة التيوبرومين (جوز الكاكو)

٢ ٪ من السيلولوز

٢٣١٢٤ - كالفيلوم (S).

Calophyllum bF. Calophyllum (E).

جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات .  
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية  
من الفارتين القديمة والجديدة || اشجارها باسقة . اوراقها  
متعاقبة ، اهلجيتها النصال الجميلة الخضر || اشهر  
انواعها الثلاثة التالية .



كاي

٢٣١٢٥ - كالفيلوم اينفيلوم

Calophyllum inophyllum (S).

نوع من الكالفيلوم . شجرة كبيرة دائمة . منبتها يمتد من  
الهند الى ماليزيا . يستخرج من ثمارها مادة دهنية شائعة  
الاستعمال الصناعي . عصارها مطهرة وقد تقضي على  
الامراض الجلدية .

٢٣١٢٦ - كالفيلوم كالابا

Calophyllum calaba (S).

نوع من الكالفيلوم . شجرة باسقة منبتها بعض مناطق  
امريكة الاستوائية || يستخرج من ساقها بالخز عصاره  
راتنجية لزجة شائعة الاستعمال الطبي وتقتل الجروح .  
تقع لحاء الساق والاغصان يدر البول .

٢٣١٢٧ - كالفيلوم ماريانا

Calophyllum Mariae (S).

نوع من الكالفيلوم . شجرة باسقة منبتها جزر الانتيل .  
يستخرج من ساقها بالخز عصاره راتنجية تدعى « دهن  
ماري » تنفع الجروح وتدملها .

٢٣١٢٨ - كاماكة

Chama (S).

Came, Chame (F). Chama (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم  
وفصيلة الكاينات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة  
في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها متباينة الاشكال  
والحجوم والرخايف . مجهزة بفضلات نشطة . مصاربعها  
للمساوية وقد تكون لا متساوية ومنها المدرجة والحفرة  
والشائكة || بعضها يعيش لاصفاً يصغور المحساف  
والبعض الآخر يعيش في الرمال والاسمال المتوسطة الغور .

٢٣١٢٩ - كاماكة

Bois de cam (F).

هي البانيه ، اطلها .

٢٣١٣٠ - كاميلات الرووس

Holocephales (F).

Holocephales (E).

رتبة اسماك من غضروفيات الزعانف تشمل بعض الفصائل  
والاجناس والانواع . اشهر فصائلها الحرفانيات .

٢٣١٣١ - كاميلات الهذب

Holotrishes

رتبة حيوانات دثيا من الثدييات الحديثة .

٢٣١٣٢ - كامليات

Camelliaceae, Theaceae, Ternstroemiaceae (S).

Camelliaceae, Ternstroeniaceae, Ternstroeniaceae,

Théacées (F). Camelliaceae, Ternstroeniaceae,

Theaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين انواعها زهاء ٢٥٠ تنجم  
الى بضعة اجناس فيها الاشجار والشجيرات والنباتات .  
اوراقها متعاقبة ، نصالها اهلجية الشكل ، بسيطة



كاما

اما مسحوق الكاكو التجاري المشهور الذي يستعمل  
لحمه او في صناعة الشوكولاته وغيرها . فهو دقيق تلك  
الجوز التي صار تحميرها وغسلها وتحميضها وتحميضها ثم  
تحميمها وطحنها || وقد يستخرج من حبه ايضا زيت  
طبي جزيل النفع يستعمل في الصيلة .

٢٣١١٥ - كائنوس

Cactus (F).

هو الصبرة ، اطلها .

٢٣١١٦ - كائنوس شوكي

هو الصبار القنفذي ، اطلها .

٢٣١١٧ - كائننج

Alkéenge (F).

نبات عشبي معمر يعرف بالحلوة الكاكنية .

٢٣١١٨ - كائننج أفسر

Alkéenge jaune (F).

هو الحلوة الزباء ، اطلها .

٢٣١١٩ - كاكو

Kakau (F).

هو التزيك ، قرد من الماريات ، اطلها .

٢٣١٢٠ - كايكي \* ، دسيپيروس كايكي ،

مشمش اليابان ، يلك طرايزون

Diospyros kaki (S). Diospyre kaki, Kaki, Plaque-  
minier kaki, P. du Japon, Persimmon kaki (F). Kaki,  
Persimmon tree, Japanese persimmon (E). Kaki-  
baum, Dattelpflaume (D). Diospiro, Kaki, Fico de  
Giappone (I).

نوع من الدسيپيروس مهدد الصين واليابان . ضروبه واصرامه  
الزراعية زهاء ٨٠٠ وقد عمت زراعته معظم البلاد الحارة .  
اشجاره متوسطة القد تعلو من ٤ الى ٨ أمتار . جنورها  
وتدبة . سوقها متصصة قراء . اوراقها يفضية مدبة الزام  
الاخير . نصلها جامد الصفحة ، شديد الخضار .  
ازهارها يضاء اللون رباعية التركيب . ثمارها لا قياسية  
الشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة وهي رباعية الفلق .  
تقشرها غشائية ، ناعمة ، عديدة الالوان التي تراوح من  
الاصفر الى الاحمر المجوي . لبها يرتقلى اللون ، لذيذ  
الطعم ، سكري اللماق، مستحب العرف يحوي ما قدره  
نحو ٢٤ ٪ من الفلوكوز و ٢ ٪ من البروتينات وما  
لا يستهان به من املاح الحديد والفلتاتين « ث » || يتكاثر  
بالذر ويجود في جميع الاثرية المنسوبة التركيب الحكمي ،  
المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور .

٢٣١٢١ - كالك

الكال والكالة والكلولة ان شترتي او تباع دثيا لك على  
رجل بدلين له على آخر .

٢٣١٢٢ - كالامين

Calamine (F).

هو حجر التوتيا ، اطلها .

٢٣١٢٣ - كالدندرون ، شجرة البهاء

Calodendron (F).

شجرة متوسطة القد قراء من فصيلة السلايات . منبتها  
بلاد رأس الرجاء الصالح . تستعمل للزينة لانها جميلة  
الشكل والخضار والازهار .

Conidiophore

٢٣١٤١ - كامب ٥

جهاز تكاثر ي تتميز به بعض الفطور الفيزية . قوامه سوط نواصي التركيب ، قاعدة ارتكازها المشيج ، طرفه صفي الشكل ، ينتهي بشفرة أو بشماغ من الشفاير يحمل الكائنات المرصوفة المتتابعة كحبوب السحبة .

Décembre (F).

٢٣١٤٢ - كانون الأول

December (E).

يعرف أيضاً بديسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه تبدلئ الاربعينيات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يمتد به مخرج النور من حد نقصان الى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين يتبدلئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الدلو لتدخل في برج الجوز . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . متابعة واهام بدر القول والعنسد والباقية وسائر النباتات العطفية . متابعة توصيب وزرم اوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية على الاكباد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتهاء الى وجوب جمع كل ما قطع من الاشجار وحرقه بويماً . المباشرة بفرس النصبوب في المناطق التي لا تحض اللجج والاعتناء بالنقاية بعد الفرس لتأمين البيئة الفضل الضرورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتسميد وحرق الكرمه والزيتون . وتوزيع الاسمدة العضوية على الموز . تغليف كياشه اي طروحه لوقايتها من البرد والتصقيع . انجاز تفضيد البزور ثم تليلها في المشاتل الخاصة بها او في مستورها . اقتلاع النصبوب للمدة للفرس قبل طفر البرام .

٣ - في الحمضيات : متابعة قطاف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والخاصة وفرس نصبوب التاننج (ابو صفيح) في البساتين المستحدثة وتقليم نصبوب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصبوب الاشجار الحرجية والتريينية وتفرع وتشذيب وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول والزهور . متابعة العناية بالتربة والنبات و مشاتل البنورة والنس والباذنجان وباكباد الزبيب والتربس والسوسن .

Janvier (F). January (E).

٢٣١٤٣ - كانون الثاني

يعرف أيضاً بيناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء الغزيرة الامطار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الاربعينيات . تقويمه الزراعي - احص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية . تفقد زروع الحنطة واستلحاقها بالاسمدة الازوتية التجارية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرق التربة المدة لزراعة التبغ اذا كان حرمها لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكباد والمباشرة بنف البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بعنطة فسائل السفرجل والربان والتفاح ايسد مولين والكرمه والزيتون . متابعة تغليف كبالش الموز .

التركيب ، مسنة الاطراف . ازهارها فردية او عقدودية التجميع كبيرة القذ يضاء اللون او حمره || اشهر اجناسها الشاي والكاميليا .

Caméline (F).

٢٣١٣٣ - كاميلية

هي النصار ، اطلبه .

Camélinées (F).

٢٣١٣٤ - كاميلينيات

هي النصاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

Latent (F). Latent, Hidden (E).

٢٣١٣٥ - كامين

ما هو مقدور الوجود الخفي .

Chamidae (S).

٢٣١٣٦ - كاميات ٥

Chamides, Camacés, Chamacés (F). Chamidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشم . اجناسها وزايعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاراضي الجورية والعلياشورية . انواعها المعاصرة منتشرة في سبط بحار البلاد الاستوائية والحرارة || اصداقها متفارقة الاشكال والحجوم . ثنائية المضاربع الانظامية اللامتساوية جميعها عادمة المناسب . مستغلطة الاربل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

Camellia (S).

٢٣١٣٧ - كاميليا \*

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات وسجات برية وتريينية من فصيلة الكاسليات . انواعها نحو ١٤ سوفها منتصبة فراءه . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، كاملة . نصالها جامدة الصفحة حيلة الخضار الزاهي . ازهارها ابيطة او تاجية الارتكاز ، كبيرة القذ ، خاسية او سباعية الفصل وخاسية او سباعية او تساعية البتلات المندمجة القواعد || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - كاميليا سردية

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاميليا الفاخر الصف . جنسه جاذحة متوسطة القذ فراءه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها سردية عابقة الخضار . ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القذ ، قلعها براوح من ١٣ الى ١٥ سم . لوها الى الحمة الكرزية ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - كاميليا سسكا

Camellia sasanqua (S). Camellia sasanqua (F).

نوع من الكاميليا وهي جنبة سردية فراءه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها مقطوعة القاعدة مسنة الحافسة . ازهارها مكسبة قلعها براوح من ٦ الى ٨ سم . لوها الى البياض المعالي || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - كاميليا يابانية

Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japanische Kamellie, Japanische Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاميليا الشائع الزراعة . ضروبها واصنافها نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقها ماسلة ، لامعة ، حيلة الخضار . ازهارها عادية او مكسبة ، كبيرة القذ ، عادمة العرف ، يضاء اللون او حمره .



كاميليا

٣ - في الحمضيات : متابعة اعمال كانون الاول الخاصة بالقطف وتوزيع الاسمدة وغرس النصب وتقليم المرائي...

٤ - في الاشجار المختلفة ، غرس نصوب الاشجار الايذة  
الاوراق من حرجية وزينية يضاف اليها الاوكاليتوس  
والصفصاف والميموزا والكزورينا والشكينس ...

٥ - في البقول والزهور : متابعة اعمال الشهر المنصرم والعناية بالملفوف والقنبيط والخس والاسبانخ والثوم والفجل

والجزر والكرفس واللفت والبقدونس والسوندر والهلين  
والارضي شوكي واللوبياء والبازيلا والشيلك ... || تعهد  
زراعات ومشائل الزهور على اختلاف انواعها والعناية بمختلف  
اوضاعها الخاصة واستمرار مكافحة اوصامها وحشراتهما .

Caniche (F). Poodle (E). **٢٣١٤٤ - كانيش**  
سلالة من الكلاب الصغيرة القد تتميز بصوفها الجعدي  
ويفرط حرصها على اصحابها.

Caustique (F). Caustic (E). کٹاؤ - ۲۳۱۴۵

Bourrache officinale (F).      كَاوْزُوَان - ٢٣١٤٦  
هو الحمص المخزني ، اطلبه .

٢٣١٤٧ - کَاوَشِيرْ\*، جَاوَشِيرْ، سِيَسَارُنْ بَرِّي

Opopanax (S). Opopanax, Panais sauvage (F). Opopanax, All heal (E). Gummipastinak, Pastinake (D). Opopanaco, Panacea (I).

جنس نباتات برية طبية معمرة من فصيلة الخيميات .  
أنواع ثلاثة جذورها حشيشة غليظة . سوقها منتصبة دقيقة

صلبة . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها خيمية التجميع ، صفراء اللون ، صغيرة القد . يستخرج منها صمغ رائنجي يستعمل في المطارة والطب .

Caiman (F).      ۲۳۱۴۸ - کایمان ، کیمان  
هو. تمساح کبان ، اطله .

Fosse à fumier (F).  
Dunhill (E).

٢٣١٥٠ - كِبَابِيَّةٌ هم فلفل كبابية ، اطلبه .

Hérissou (F). ٢٣١٥١ - كِبَابَةُ الشُّوكِ  
هي القنفذ ، اطلبه .

Salvadore (fruit) (F). كَبَاث - ٢٣١٥٢  
نفیج ثمر الاراك واحده كباثة . البریر ما لم ینفج  
من الکباث .

inhibition ۲۳۱۵۳ - کَبَاح ، نَهِي ، مَنَع

٢٣١٥٤ - كَبَّاحَة ، كَمَّاحَة ، فَرَمَل  
Frein (F). Brake (E).

Inhibiteur, Inhibitif (F).  
Inhibitory (E).

نعت تعریفی یوصف به کل عامل بحول دون سیر الحركة الطبيعية فيرقلها او يوقفها كلياً.

Hépatite (F). Hepatitis (E). كَبَد - ٢٣١٥٦  
التهاب الكبد، ويكون حاداً أو مزمناً.

Cédratier (F).                      كَبَّاد - ٢٣١٥٧  
هو الاترج ، اطلبه .



Câpre (F), Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبْرَة

ثمرة الكبر. ج. اكبار وكبار :

Coproah (F), Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كُبْرَة

هي لب الناربيل ، اطليه .

Soufrage (F), Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرَتَة

هو التغير بالكبريت اي ذر مسحوق الكبريت على النباتات لوقايتها من بعض الاوصام الفطرية أو لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

٢٣١٨٠ - كَبْرَتَل

He-coleoptere (E).

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جحر الجبل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُوسِيَّس \*

Capromys, Houtia, Chemi (F), Capromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الدايات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجراد . اجسامها ريمية ضخمة تطول من ٤ الى ٥٥ سم. واذناها من ١٥ الى ٢٧ سم. رؤوسها مستطيلة . مقاضسها مقطوعة . اذناها مستعرضة معتدلة الحجم . عيونها كبيرة . براطها العليا مغلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جرائرها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فخراسية . اطرافها طويلة مقوسة حادة . اذناها حشرافية الجلد يكسوها حلب مستطيل دقيق . مؤلفاتها فزولا وهنتوراس وكوبا والجاييك ... تألف الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بحفة وتسير على الارض ببطي || قوتها الاوراق والثمار والحاء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس \*

Capros (F), Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبرسيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارحها حشاش المجاهد في الاعماق التي يراوح غورها من ١٠ الى ٣٠ م. || اجسامها صغيرة القد ، مستعرضة الجرم ، مستطيلة الرأس والحلم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الأطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

Capros aper (S).

٢٣١٨٣ - كَبْرُوس خنزيري \*

Capros sanglier, Sanglier (F), Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطائها البحر الابيض المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي اللون ، مبط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها منخفض الارتكاز ، مخروطي الحظم المستدق الطرف كفتيشية الخنزيري . عيناها كبريتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهذب الصفعة الخشنة . ثوبا الى المؤخرة الفضية المواج || لحمها كاعن الصنف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَّات \*

Caproides (F), Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرضة . اعطائها ذلقة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حراشفها خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

Hépatiques (F), Liverwort (E).

٢٣١٧٠ - كَبْدِيَّة

صنف من قسم الطحلبات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبْر ، كَبَار

Câprier (F), Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ منظرها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنبات ومنها الشائكة والرسعة . اوراقها منقطة متناقبة بيضيه النسل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، طويلة الزناد ، جميلة الشكل ، كبيرة القد ، مستطيلة الاسدية المدينة الملونة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبْر شَالِك \* ، كَبَار شَالِك ، أَصَف ،

لَصَف ، قَبَار

Capparis spinosa (S).

Câprier commun, C. épineux (F), Caper tree, Common caper-bush (E), Kappenstrauch, Echter Kappenstrauch, Kapper (D), Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة فراءه فناء شائكة تطول ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. منبتها اقليم البحر المتوسط . فروعه دقيقة منبسطة ، الشواكها معجنة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثمارها كالتينار شكلاً وقالباً لكنها لا تطول اكثر من ٥ سم. || ازهارها وثمارها تستعمل في الخللات . جذورها طيبة يقال انها نافعة ومطلعة ومدرية للبول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبْر هِنْدِي

Coccinie, Céphalandre (F), Scarlet fruited gourd (E), Scharlachranke (D), Cefalandro (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها البلاد الحارة . جذورها صقولية . سوقها مدادة او عارشة . اوراقها مقصصة او مثلثة الزوايا . ازهارها كبيرة القد ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها ريفية الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الباب . يزورها الى السواد المرقط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبْر هِنْدِي قَلْبِي الْوَرَق

Coccinia cordifolia (S), Coccinie à feuilles en coeur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زراعي مداد يطول نحو ٢٠٠ سم. اوراقه صغيرة القد ، خماسية التفصيص ، قلبية الشكل ، تطول نحو ١٠ سم. فصلها لامع البشرة على صفحتي . حوالقه بسيطة . ازهاره الى البياض العاجي ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم. ثماره ريفية تطول نحو ٥ سم. لونها الى الحمرة ، لهاها جامد المادة ارجواني الخضاب . ثماره وصافله مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبْر هِنْدِي كَفِّي الْوَرَق

Coccinia palmata (S), Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كثيفة الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. حوالقه فارقة . ازهاره الذكرية عشقودية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، عتيقة اللون ، لهاها جامد المادة الصفراء || ثماره وصافله مأكولة .

٢٣١٧٦ - كَبْرَت

Sulfurer (F), To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شائك



كبريس



كبروس خنزيري

٢٣١٩٢ - كَبْرِينَات البُوتَاسِيُوم  
Sulfate de potasse (F). راجع سلفات البوتاس .

٢٣١٩٣ - كَبْرِينَات الحَدِيد  
Couperose verte, Mélanterie (F). Green vitriol (F).  
مركب معدني طبيعي اخضر اللون يوجد في بعض الكدان.

٢٣١٩٤ - كَبْرِينَات الزِنك  
Couperose blanche, Goslarite (F). White vitriol (E).  
مركب معدني طبيعي ابيض اللون، سهل الكسر واللويان،  
عفص العلم، قليل الوجود .

٢٣١٩٥ - كَبْرِينَات الصُودِيُوم  
Sulfate de soude راجع سلفات الصوديوم يوم .

٢٣١٩٦ - كَبْرِينَات الكِلْس  
Sulfate de calcium راجع سلفات الكلسيوم .

٢٣١٩٧ - كَبْرِينَات النُحَاس  
Couperose bleue, Cyanose, Chalcantite (F). Blue vitriol (E).  
مركب معدني ازرق اللون، زجاجي المكسر، عفص العلم، يذوب في الماء . يوجد في مناجم النحاس .

٢٣١٩٨ - كَبْرِينَات الأَمُونِيَاك  
Sulfate d'ammoniaque (F). راجع سلفات الأمونيكا .

٢٣١٩٩ - كَبْرِينُور الحَدِيد  
Pyrite (F). هو البيريت، مركب من كبريت وحديد .  
Pyrites (E).

٢٣٢٠٠ - كَبْرِينُور الكَرْبُون، سُلْفُور الكَرْبُون  
Sulfure de carbone (F). Sulphide of carbon (E).  
مائع نَن الراتجة شديدة الفاعلية لا لون له يشتمل في الزراعة  
لقضاء على الحشرات ولتطهير التربة من بعض الاوصام  
الفطرية المستعصية .

٢٣٢٠١ - كَبْرِينُوجِي  
Sulfureux (F). Sulphurous (E).

٢٣٢٠٢ - كَبْسَة ، لَوْرَة الآلِيَه  
Cabosse (F). ثمرة الكاكاو ، راجع كاكاو .  
Bump (E).

٢٣٢٠٣ - كَبْسُود الزَعْرُور  
Capsodes flavomarginatus (S).  
Capsode de l'aubépine (F).

حشرة غاصلة من فصيلة الفميجيات . جسمها صغير يطول نحو ٨ م . رأسها مجرسم ، أصهب اللون . خطمها شديد السمرة . عيناهما بارزتان . زباناها مستطيلان ، اسمران . كوسلها أصهب يملو موج اسمر . حجبتهما صغيرة ، صناعية . ظهرها لاصف ، حجبتهما الى الشبهة البيضاء المواج ، يطوقها حمار ضيق اصفر ذهبي يتحول في الزام الاخير الى صناعي . بطنها شديد السمرة ، اسمر الخمار . قوائمها مبلقة بالاسمر والاصفر || تألف الحراج والمواقع التي يكثر فيها الزعرور .

٢٣٢٠٤ - كَبَش  
Bélier (F). Ram (E). ذكر الضأن يستطيع السداد . ج اكيش واكباش وكباش .

٢٣٢٠٥ - كَبَش  
Fascine (F). اعشاب واغصان واعشاب توضع في سبيل الماء لتحويل  
قوس منه الى مجرى آخر .

٢٣١٨٥ - كَبْرِوفِيلْس مُحَرَّز  
Coprofile strié (F). هو الطروب الحز، اطلبه .

٢٣١٨٦ - كَبْرِولِيَت  
Coprolithe (F). Coprolithe (E). سداد الغائط المتحجر . وقد ينتبر من التفسافات الطبيعية .

٢٣١٨٧ - كَبْرُوسَمَة  
Coproisma (S). Coprosme (F). نباتات معمرة بخر من فصيلة الفويات . انواعها  
جس نياتا معمرة بخر من فصيلة الفويات . انواعها  
المعروفة قليلة . مهدها بلاد زيلندا الجديدة . سوقها تلو  
من ٣٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها مستديرة الشكل ، مقنطرة  
القاعدة ، فصلها يطول ويعرض من ٢ الى ٨ سم . صفحته  
جميلة المخضار الزاهي تملو حنارها رقشة صفراء .  
والكبروسمة تستعمل في الحدائق استعمل المضاض الياباني .

٢٣١٨٨ - كَبْرِينَات  
Capparidaceae (S). Capparidacées (F). Capparidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها كثيرة  
المدد جميعها اربعة اسباط : البانيات والزفريات والكلياريات  
واليرويات . نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها  
الاشجار والشجيرات والجنباث ومنها الاعشاب الحولية  
والمعمرة . أوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية . ازهارها  
جميلة القالب فردية او عنقودية التجميع . ثمارها حقية  
ثنائية الفلق || معظمها من نباتات المناطق الحارة وهي  
تحتوي بعض الزيوت الطيارة الطيبة وبعض العناصر المختلفة  
اخصها الصحية والشاقبة والسامة .

٢٣١٨٩ - كَبْرِيت  
Soufre (F). Sulphur, Brimstone (E).

جسم صلب اصفر اللون قابل للكسر رمزه (ك - S) .  
وزنه الاناثي ٣٢٠٠٦٦ يتصهر في ١١٣ م .  
ويقتد في ٢٥٠ م . لهية احتراقه زرقاء اللون ساطعة  
خائفة . وهو رديء الاصل الحرارة والكهرباء يذوب في  
الاثير والبنزين والزيوت ولا يذوب في الماء || عرفه الانسان  
واستعمله منذ قديم الزمان وهو يوجد في الطبيعة اما نقياً  
واما مزوجاً ينفرد من العناصر كالحديد والنحاس والرصاص .  
يستعمل منه العالم سنوياً ملايين الاطنان في صناعة الاسمدة  
والاصباغ واللقاب والبارود والادوية الطيبة الجلدية  
والادوية الزراعية ... من انواعه النقية التي تستعمل في  
الزراعة ضد الاوصام الفطرية :

الكبريت الميكروني  
Soufre micronisé (F).  
الكبريت الزهرة  
Soufre sublimé, Fleur de soufre (F).  
الكبريت المسحوق  
Soufre trituré (F).  
الكبريت المتبلور ، الكبريت العمود  
Soufre cristallisé

٢٣١٩٠ - كَبْرِيت الرِّصَاص  
Galène (F). Galena (E). مركب معدني يحوي نحو ٨٦,٥٠ ٪ من الرصاص  
و ١٣,٥ ٪ من الكبريت وبعض الشوائب من الزر من  
الفضة او الحديد او الزنك او الالمنيوم . وهو رصاصي اللون،  
ازرق المواجه ، اسفغ البريق ، سريع الكسر . ثقله  
النوبي يراوح من ٧,٤ الى ٧,٦ وهو شائع الاستعمال  
الصناعي يستخدم خاصة في طلي الآلية الخزفية منسما  
لائصاها الماء .

٢٣١٩١ - كَبْرِينَات  
Sulfate (F). راجع سلفات .

البياض الفضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

### ٢٣٢١٤ - كَبُوعَةُ مَلَوَانَة

*Megaptera versabilis* (S). *Mégaptère changeante* (F). موطنها شمالي المحيط الهادي طويلا يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الزبداء السمراء الزرقاء المزاج . بطنها الى البياض الماسي تغلوه ماجة وردية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٣٢١٥ - كَبُوكَابُ الشُّوَلَة  
*Hérissor* (F). هو القنفذ ، اطلبه .

٢٣٢١٦ - كَبُول  
*Fourrure garnie* (F). الكبيل : الكثير الصوف من الفراء .

٢٣٢١٧ - كَبُوعَةُ ٥  
*Cabomba* (S). جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة . سوتها شجيلة . جلورها كالشمر تنشاهها مادة لزجة . اوراقها متناقصة صاجية النصل ترتكز على معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابيلية الارتكاز سداسية البتلات . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تنطقو على سطح الماء . وهي تعيش في الاكوابيوم وتستهلك كبرى لاسماك المياه العذبة ٥ اعرف انواعها ما يلي .

### ٢٣٢١٨ - كَبُوعَةُ كَرُولِيَّة ٥

*Cabomba caroliniana* (S). *Cabomba de la Caroline* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كبرى للاسماك . اوراقها صاجية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراص ٥ تنورها يستمر من ايار الى آب .

### ٢٣٢١٩ - كَبُوعَةُ مَالِيَّة ٥

*Cabomba aquatica* (S). *Cabomba aquatique* (F). نوع من الكبيمة المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كبرى للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الحوذان المائي ٥ تنورها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٢٢٠ - كَبُونْد ٥  
*Capnodium* (S). هو التيج ، قطر مجهرى ، اطلبه .

٢٣٢٢١ - كَبُون  
*Chabot, Chabotage* (F). مرض جرثومي يصيب الكرمة فينشطها على افراخ الجذور المحالطة الشبكية .

٢٣٢٢٢ - كَبُونْل ٥  
*Copris lunaris* (S).  
*Copris* (F). حشرة من الجملليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طويلا يراوح من ١٥ الى ٢٢ سم . ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرن مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمومية الارتكاز . وهي من الحشرات الصرصرية الثائلة التي تعيش على مختلف انواع البراز . مجبرها سرداب فردية نميصة تنبع فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتع في كل اكرة مكثه وتقوم على حراستها حتى اكتمال التفك الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٣٢٢٠ - كَبَشُ الْجَبَل  
*Mouflon* (F).  
*Mountain Sheep* (E). حيوان لبون يجتر يعرف بالاروية ، اطلبها .

٢٣٢٢٧ - كَبَشُ الْقَرْنَفُول  
*Girofle, Clou de girofler* (F). *Clove* (E). هو زهرة القرنفل المجافة . طعمها حريف ، رائحتها ذكية المرف فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي وهو مضاد لله و التشنج يجدر الاعصاب ويسكن ألم الانسان .

٢٣٢٢٨ - كَبَشِي الرَأْس  
*Criocéphale* (F).  
*Criocephalous* (E). نعت ترميضي يطلق على كل من كان رأسه كراس الكيش .

٢٣٢٢٩ - كَبُوع ٥  
*Megaptera* (S).  
*Mégaptère* (F). *Humpback whale* (E). الواحدة كبة . جنس حيتان عظيمة القد مدنية الشكل . انواعها المعروفة حدة تألف المحيطات . طويلا يراوح من ١٢ الى ٣٥ م . تتميز زعانفها الصدرية المستطيلة الضيقة الرباعية الاصابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احناكها قصيرة مستعرضة مطاطة . صدرها عديدة متوالية التخديد الطويل ٥ قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناتها تقصع من جرو الى جرون ترصعها بقعة شهود ٥ صرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها خطر وشاق دهنها مرغوب فيه وقد يراوح انتاج الكبة الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعها الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢٢٠ - كَبُوعَةُ الْجَنْتُوب ، كَبُوعَةُ لَانْتَد  
*Megaptera lalandi* (S). *Mégaptère de lalande* (F). موطنها جنوب المحيط الاطلسي . طويلا يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . رأسها وظهورها الى السمره الزرقاء . بطنها الى البياض الاخضر . صفائح حنكها الى السمره العاقبة .

٢٣٢٢١ - كَبُوعَةُ الْخَلِيج  
*Megaptera indica* (S). *Mégaptère indienne* (F). موطنها الاقائس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طويلا يراوح من ١٢ الى ١٥ م . رأسها وظهورها الى الكبة السمراء الصفراء المزاج . بطنها الى البياض الاخضر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢٢٢ - كَبُوعَةُ الْقُطْب ، جَمَلُ الْبَحْرِ  
*Megaptera Boops* (S). *Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak* (F). اكبر انواع الكبع واضنها جثة وطولها هيكل واغرها شكا . طويلا يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م . تتميز بسلام كسان الجبل بطول تيج الظهر ورزعة ظهريه منجلية الشكل صغيرة القد . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . بطنها الى البياض . اخاديد صدرها الى السمره القاتمة . صفائح حنكها سود ٥ موطنها فسح الاربعاء يشمل بحار القطب الشمالي والقسم الاعلى من المحيط الاطلسي .

٢٣٢٢٣ - كَبُوعَةُ كُوزِيْرَا  
*Megaptera Kuzira* (S).  
*Mégaptère Kuzira* (F). تكثر في مضيق بارين والبحار المحاذية . طويلا نحو ٢٠ م . رأسها وظهورها الى السواد الازرق المزاج . بطنها الى



كبع



كبيمة كروليه



كبول (١)



كبول (٢) منظر جانبي

Swine-book ٢٣٢٢٧ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَنَازِيرِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book ٢٣٢٢٨ - كِتَاب أَنَسَابِ الْخَيْلِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book ٢٣٢٢٩ - كِتَاب أَنَسَابِ الضَّأْنِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الضأن .

Canis-book ٢٣٢٣٠ - كِتَاب أَنَسَابِ الْكَلَابِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٢٣١ - كِتَابُ نَبَاتِ الْكَارْمِيرِ . (اللسان) .

Agglomérat, Conglomérat (F). ٢٣٢٣٢ - كِتَابَةُ ٥

Agglomerate, Conglomerate (E).

حالة تدمج طبيعية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أشبهها طبقات الحصى والريال المتناسكة .

Imperméabilité (F). ٢٣٢٣٣ - كِتَابُ ٥

Impermeability (E).

خاصة مسك الماء في بعض أنواع التربة . وفي من عيوب التربة الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). ٢٣٢٣٤ - كِتَابُ ٥

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعه المعروفة زهاء ١٠٠ مغلفها حولي وبهضها معمر . سوقها خشبية أو ليفية منتصبة غليظة . أوراقها لاطئة متعاقبة سنائية النصل أو غطية . أزهارها خالصة التركيب عقدوية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي والأزرق والأحمر . ثمارها حقية ، بزورها بضيقة صغيرة

ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيوت حارة تستعمل في الدعان والطلاء . كما وأنه يستخرج من خاء سوقها الليفية الياف صناعية نسيجية لتحل المركز الثاني بعد القطن || أشهر أنواعه البرية والزراعية الصناعية والزراعية ما يتبع .

٢٣٢٣٥ - كِتَابُ أَبْيَضِ ٥

Linum suffruticosum (S). Lin blanc (F). White flax (E).

نوع من الكتان البروتي الزرني . وهو عشبة حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتظمة ، معمرة ، فراء ، خلية اللحاء . أوراقها غززية الشكل ، جامدة النصل . أزهارها إلى البيضاء الناصع . حنار تبتلها إلى الحمرة البنفسجية المولج || أزهاره يستمر من أيار إلى آب .

٢٣٢٣٦ - كِتَابُ الزَّرْنِ \* ، كِتَابُ زَهْرِي ، كِتَابُ ٥

Linum grandiflorum (S). كبير الزهر

Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E). Leinblume (D). Lino d'Africa (I).

نوع من الكتان وهو عشبة حولية زرقية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراء ، فروهها منتصبة منتصبة . أوراقها سنائية ، نصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة القد حيلة

الحمرة مهدبة النصل || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران

٢٣٢٣٧ - كِتَابُ الشَّرْقِ ٥

Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).

نوع من الكتان الطبي البري المبدول ، منته الشرق الأوسط . عشته معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراء . أوراقها صغيرة القد ، نصلها وحيد العرق

Productif (F). Productive (E). ٢٣٢٢٣ - كَبُوس

كثير الحمل . يقال نقاحة كبوس ونقطة كبوس .

Capucine (F). ٢٣٢٢٤ - كَبُوسِيْن

هي السلية ، نبات عشبي زرعيني مأكول الأوراق والأزهار ، اطلبها .

Loche (F). ٢٣٢٢٥ - كَبِيْت

هو اللغ من الإسمك الأثرية ، اطلبها .

Copalifera (S). ٢٣٢٢٦ - كَبِيْت \* ، كَبِيْتَة

Copaier, Copahier, Copayer (F). Copaliba-tree (E).

جنس أشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ . أصلها البلاد الحارة الأفريقية والأمريكية . جميعها أشجار كبيرة القد يراوح ارتفاعها من ١٥ إلى ٢٥ م . أغصانها منسطة . أوراقها مركبة متعاقبة . أزهارها سنبلية التجميع . ثمارها قرون صغيرة رقيقة وحيدة البزرة المستطيلة البطة || أعشابها جووية اللون صلبة تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها حليب راتنجي المادة ، يسمي العرق يستعمل ، في الصيدلة .

Macrocarpe (F). ٢٣٢٢٧ - كَبِيرُ الشَّعَرِ

Macrocarpus (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). ٢٣٢٢٨ - كَبِيرُ الرَّأْسِ

Megalocephalous (E).

نعت تعريفي ووصفي يطلق على الحيوانات الشاذة بفضامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes ٢٣٢٢٩ - كَبِيْتَج

هو المحوذن الآسيوي ، نبات قصير الساق ، كزبه الرائحة ، اطلبها .

Blométrie (F). ٢٣٢٣٠ - كَت ، بِيَوْمَتِيَا

Biometry (E).

بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وحساب الاحتمالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٣١ - كَتَا

الواحدة كتاة . نبات كالجرجير يطبخ فيوكل (اللسان) .

Book ٢٣٢٣٢ - كِتَاب

يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). ٢٣٢٣٣ - كِتَابُ الإِعْتِمَادِ

Letter of credit (E).

رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يحتفظوا مبلغاً من المال رهن تصرف شخص مسمى .

Pedigree (F). ٢٣٢٣٤ - كِتَابُ الْأَنْسَابِ

Pedigree (E).

يحمل تدون فيه انساب سلالات الخيول العرب وحياد الرهان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). ٢٣٢٣٥ - كِتَابُ الضَّمَانِ

Letter of guaranty (E).

كتاب يتعهد به شاحن البضائع ونقلها بأصلها على الحالة البينة في تذكارة الشحن .

Herd-book ٢٣٢٣٦ - كِتَابُ أَنَسَابِ الْبَقَرِ

يحمل تدون فيه أنساب سلالات البقر .



كَبِيْت



كتان الزهر

Linum viscosum (S).  
Lin visqueux (F).

نوع من الكنان الزبِّيُّ وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مزرية . أوراقها سنانية ثلاثية او خاسية المروق . نصلها مبهر الفدد، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها وردية اللون مشوطة بالبنفسجي . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٣٢٥٣ - كَنَان مَسْهَل \* ، قَرَقُ  
Linum catharticum (S). Lin purgatif (F). Purgif. flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).

نوع من الكنان البري الطبي المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقها مخشوشة فراء . أوراقها طيبة مسهلة ، السفلى منها ضمية التجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متعاقبة غطيلة . ازهارها كبيرة القد لونها الى الصفار النبي || ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٢٥٤ - كَنَانِيَّات  
Linaceae (S).  
Linacées (F). Linaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التعلات. اجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً منها جميع الاصناف المعتدلة . معظمها عشبي حولي او معمّر وبعضها شجري او جنبي . أوراقها متعاقبة او متقابلة . ازهارها تاجية الارزكاز ، لاقياسية التجميع منها الفردية والمتقودة والمشكولية . اشهر اجناسها الكنان والكوكا والردبولا .

٢٣٢٥٥ - كَنَانِيَّة  
Démographie (F).  
Demography (E).

الكناية علم احصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْاَنْسَاب  
Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).  
سجلات تدون فيها الحيوانات باسمائها واشكالها مع اسماء واشكال الآباء والامهات وصفاتها المميزة وما اشهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كَعْد ، كَعْد  
الكند والكند هو اعل الكنف وقيل هو الكاهل وقيل هو ما بين الكاهل الى الظهر . ج . اكند وكند .

٢٣٢٥٨ - كَثَر ، كَثَر ، كَثَر  
Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).  
هو جواز كل شي اي اوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَثْرِيَش \* ، جَمِيْلُ الشَّعْرِ  
Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكثرشيئات . انواعه قليلة العدد ، اعطانها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتمهد لملده وحسته .

٢٣٢٦٠ - كَثْرِيَشَات  
Callitrichaceae (S).  
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها مائية . اشهرها الكثرش .

يطول نحو ٦ م . ويمرض نحو ٢ م . عقصته تنتهي هلبة دقيقة ذرية . ازهارها برتقالية اللون ، غدية الفصل الشفافة . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٨ - كَنَان بَرِّي \* ، كَنَان هَبِيْق الْوَرَقِ ،  
فِيَنَاس  
Linum angustifolium (S).

Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).  
نوع من الكنان البري المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. ساقها مخشوشة قليلة الفروع المتصبة . أوراقها خفيفة ، نصلها غطلي الصفحة ، وسيد المروق . ازهارها قليلة العدد لونها الى الزرقة اليلكية المسواج . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كَنَان ذَهَبِي  
Linum flavum (S).  
Lin jaune d'or (F).

نوع من الكنان السبروتي الزبِّيُّ وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها غلظة فراء . أوراقها ملوئية الشكل ، نصلها يطول من ٢ الى ٣ سم . ويمرض من ١٥ الى ١٠ سم . وهو ثلاثي المروق ، بحري اللون . ازهارها فرقة ، كثيرة العدد ، ذهبية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٥٠ - كَنَان زَيْلَنْدَة  
Lin de la Nouvelle Zélande (F).

هو القربوم المتصلب ، الحلبه .

٢٣٢٥١ - كَنَان شَالِع \* ، مَلَسَج  
Linum usitatissimum (S). Lin cultivé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).

هو الكنان الزراعي الصناعي المشهور - شروبه عديدة . جلوده وثنية متوسطة الانشعاب . ساقه منتصبه فراء تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . أوراقه سنانية النصل ، مخضراء اللون . ازهاره الى البياض او الزرقة الباهتوية . تمام جبراه كروية مقطوعة الرأس والعقب ، عشارية المصاريح وفي كل مصراع بزره . والبزره ماسلة ، لامعة ، سمراء اللون ، مغلطة . تطول من ٤ الى ٦ م . وتعرض من ٢ الى ٣ م .

لباها زيتي الماذة ينتج من ٢٣ الى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعتها وصناعة اليافه في بلاد ما بين النهرين في مصر تعود الى ابد من اربعة الاف سنة || زراعتها الحالية فيسحة الارباح تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسيا وبولونية ولتوانية والمانيه وفرنسه وهولنده وبلجيكا وتركيا || وهو موجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة على الجافة والاجواء العكرة المبهمة النجوم على الصافية الادم || وهو يرغب في الاربة الخصبه الغنية المنسوبة التركيب الحكمي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات الشجرة التي تستنزف كل ما وصل اليها من العناصر العضوية والمعدنية || يكثر عادة في اوائل الربيع ويقطع عندما تصفر ساقه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بضعة ايام الى ان تجف ساقه ثم ينقل الى المضارب حيث تفصل البزور عن السوق . اما الالياف الصناعية النسيجية فتفصل عن السوق اما بواسطة الحرارة في معامل خاصة مجهزة لهذه الغاية واما بواسطة الماء وهو ما يسدونه التعلين وقد يتم بنقع حزم سوق الكنان بالماء الراكد مدة من الزمن تقربها حرارة الموق لكنها مبدئياً تراوح من اسبوع الى اسبوعين .



كَنَان بَرِّي



كَنَان شَانِع



كَنَان سَهْل



كَثْرِيَش



## Catalpa bungei (S). - كَتَلْبَة صِينِيَّة

Catalpa de Bunge, Arbre puant (F).

نوع من الكتلة مهدها الصين. تجربها صغيرة اللقد تملو من ٧ الى ١٢ م. اوراقها رعية الشكل مقنطرة القاعدة. نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٤ وهو مائل البشره على المروق على الصفحة السفلى. ازهارها تطلو نحو ٤ سم. وتعرض ٥ سم. لونها الى البياض المشج بالاصفر والجلوي. ثمارها مخروطية تطلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

## Catalpa speciosa (S). - كَتَلْبَة ظَرْفِيَّة

Catalpa elegant (F).

نوع من الكتلة وهو شجرة سرية النمو تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. مهدها امريكية الشالية. ساقها منتصبه فرعاء. اوراقها تطلو نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٨ سم. نصلها ذرب المعصه المستطيلة. ازهارها عنقودية التجميع، كثيرة اللقد تطلو نحو ٧ سم. وتعرض ٨ سم. لونها الى البياض المرقط بالاصفر. ثمارها تطلو نحو ٥٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

## Catalpa ovata (S). - كَتَلْبَة يَابَانِيَّة

Catalpa du Japon (F).

نوع من الكتلة السبروتية مهدها اليابان. تجربها صغيرة اللقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار. اوراقها ثلاثية اوخاسية التفصيص البيضي الشكل. نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٥ سم. ازهارها صغيرة اللقد، صفراء اللون، ملطخة بالبنفسجي. ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

## Catalpa (S). - كَتَلْبَة صَفْرَاء

Immortelle des sables (F).

هي الخالية الطاقية، اطلها.

## Masse d'air (F). - كَتَلْبَة هَوَاء

Mass of wind (E).

تعريف جولاي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه معين.

## Catalpa (S). - كَتَم

« نبات جبلي ورقة كورق الاس يغضب به مدفوق وله ثمرة كثر اللقلل ويسود اذا انفج وقد يمتصر منه دهن » (١، م).

## Tubercularia (S). - كَتَن

جنس فلور مجهرية من عماره الوطنيات، وفصيلة الككتيات. جرابه الكندي كثير الفروع العادمة الترتيب. كنهاده وسيدة الخلية، كروية او اسطوانية الشكل. وسادته مجنية تيمو عند انفلاتها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه قليلة. اعرفها الثلاثة التالية.

## Tubercularia piricola (S). - كَتَن الإِجَاص

نظر مجهرى يركب البار المخدوشه. الخزونة اخصها الاجاص والتفتاح || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة حرارتها تفوق الاربع درجات ستيفارد ووطنها من ٨٠٪ وصاعداً || مظهره الخارجى ندف خلى. آخر اللون، ابيض المروج، يركب البشره فيملطها ثم ينور في اللب فيعنفه ويهره.

## Chatoussus (S). - كُنُسُوس

Chatoussus (F). Chatoussus (E).

جنس اسماك بحرية زهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوشيات. انواعه المعروفة عديدة معظمها نهري وبعضها بحري. والبحري منها يؤم النهر في زمن الاسراء || اجسامها اهليجية التوزن، تطلو من ٢٠ الى ٢٦ سم. رؤوسها صغيرة، مثقلة الاشداق. عيونها ماصحة. زعانفها الظهرية صغيرة، شبه مزوانية. الصدرية والخوضية صغيرة. الترجية مستطيلة. الذيلية فارقة. اوراقها متقاربة تسمر في القسم الاعلى وتغير في الاسفل || يكثر وجودها في الهند والصين واليابان || لحومها مأكولة وبعضها جيد الصنف.

## Catéchol (F). - كَتَشُول

بلورات ابرية عادمة اللون براقه تستخلص من الكاشو والتعبير والطعان الخ... تغلي عند ١٧٧/١٧٥ °م.

## Cernier (F). - كَتِيد

سمكة بحرية تدعى قباب، اطلها.

## Epaule (F). Shoulder (E). - كَتِف، عَاتِق، مَتَكِب

الجزء العلوي من الصدر.

## Cattana (F). - كَتَشَان

الكفتان الجراد اول ما يطير. ويقال هو الجراد بعد التوفاء اوله السرم ثم اللبي ثم الغفاه ثم الكفتان. الواحدة كفتانة.

## Poussin (F). - كَتَكُون

هو القروب والصوص.

## Catalase (F). - كَتَلَاز

خيرة نباتية تهيم على انتاج واتزان هيدرات الاوكسجين في النبات.

## Catalpa (S). - كَتَلْبَة

Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trompetenstrauch (D). Catalpa (I).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة البفونييات. انواعه المعروفة ٩ جميعها اشجار صغيرة او متوسطة اللقد. سقوها منتصبه. اغصانها فارشة. اوراقها بسيطة، عابله، متقابلة. زفضافه النصل. ازهارها جريبية الشكل. ثمارها جرد مستطيلة كالحيار || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

## Catalpa bignonioides (S). Catalpa commun, C. de la Caroline (F). - كَتَلْبَة شَاعِلَة

نوع من الكتلة الحرجية السبروتية المبدولة مهدها امريكية الشالية. ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة اللقد، بيته الفصوص؛ نصلها بطول نحو ٢٥ سم. ويعرض ٢٠ وهو ازغب المروق كربه الزائحه عند اللس. ازهارها عنقودية التجميع تطلو نحو ٥ سم. وتعرض ٦. لونها الى البياض المرقط بالاصفر والاحمر. ثمارها تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.



كتله شائنة

تعيش على الصخور المغمورة قرب الشواطئ || اصداؤها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او امليلية تغلفها الادرية الغفصاغضة . غياشيمها عيمنية الارتكاز نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواها غطبية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٣٢٨٧ - كَتِيَّعِيَّات (S). Pleurobranchidae (E).  
Pleurobranchidés (F). Pleurobranchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دوبياتها تتميز باصداؤها الرقيقة الصغيرة التي تلتحف الظهر . غياشيمها هدية عيمنية الارتكاز . افواها غطبية الشكل ؛ ثنائية اللوامس الانبوية المفلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيعة والفسوجة والتيدة .

٢٣٢٨٨ - كَتِيَّعِيَّة  
الكتيعة هي النحلة فاتت اليد . ج كئائل .

٢٣٢٨٩ - كَتِين ، كَتِيَّعِيَّة (F). Catène (F).  
Catena (E).  
جموعة ترابية لاقامية التركيب الحكمي جمعها العوائل الطبيعية تميزت بوحدها الشكلية .

٢٣٢٩٠ - كَتِيَّهَة  
Lotier corniculé (F).  
هي القوس القرني ، اطليه .

٢٣٢٩١ - كَتَّاه  
Brachycome (F).  
هي البراكيم ، اطليه .

٢٣٢٩٢ - كَتَّاب \* ، زَقَرَّاقِ الْخَصْص \*  
Sarciphorus (S). Sarciphore, Vanneau à caroncule (F).  
جنس طير من طوائف الساق وفصيلة الزقراقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجنها الحيائي جماعي . قوتها الحشرات والدواب الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الرمال || اجسامها صغيرة الدهن ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاصفر والاسود والجوهر والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها مبطلة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها العليا لخص صغيرة لحمية المادة . اجتنبها لاحقة . اذنانها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء اللون كالنكتيد .

نوعها المعروفان :  
٢٣٢٩٣ - كَتَّابِ السَنغال \*  
Sarciphorus tectus (S).  
Sarciphore du Sénégal (F).  
٢٣٢٩٤ - كَتَّابِ الصَوَال \*  
Sarciphorus latifrons (S).  
Sarciphore des Somalis (F).  
٢٣٢٩٥ - كَتَّاه  
Crème (F).  
هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .  
٢٣٢٩٦ - كَتَّاه  
Roquette (F).  
هي الجرجير من احرار البقول ، اطليه .  
٢٣٢٩٥ - كَتَّافَة  
Densité (F). Density (E).  
هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كترك ١٠ شتول في المتر المربع .

٢٣٢٧٨ - كَتَّنَ البُقْس \*  
Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهري يعيش على اغصان البقس اليابسة وقد شوهد على لحاء المطاط في الاوغندا .

٢٣٢٧٩ - كَتَّنَ شَالَع \*  
Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهري رمي يكثر في الحريف والشتاء . يركب لحاء الاغصان اليابسة في مختلف الانجار الحرجية والمثمرة .

٢٣٢٨٠ - كَتْنَة ، كُوبَالِيَّة  
Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-

ruqueuse (F). Gum copal tree (E). Henschreckenbaum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية وبنفسكر . ساقها كثيرة الثعوب متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ اثمار . غشها صلب المكسر احمر اللون مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالثقب عصارة صفية رائتجية صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كوبال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٣٢٨١ - كَتَّنِيَّات \*  
Tuberculariaceae (F). Tuberculariaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الهيفانيات ورتبة الزريعات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها عمارتان : اللطانيات والوطانيات .

٢٣٢٨٢ - كَتْنِيَّة \*  
Tuberculina (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الوطانيات وفصيلة الكتيانيات . جرابه الكتيدي بسيط التركيب قليل الفروع . كئانه وسيدة الخلد كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها ببثور صغيرة القد لوها الى الحمرة البنفسجية .

٢٣٢٨٣ - كَتُّوم  
Imperméabilité (F). Impermeability (E).

الكثوم والكثام هي خاصة مسك الماء في بعض انواع التربة . وهي من عيوب التربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٣٢٨٤ - كَتُّوم ، كَتِيم ، مَكْتَام  
Imperméable (F). Impermeable (E).

نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٣٢٨٥ - كُتْبِيَّة \*  
Kitalbéla (S). Kitalbéle (F).

جنية معمرة برية وتزبينية من فصيلة الحجازيات معقودة التعريف على اسم البوتاني المغناري بولس كيبيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها فرعاء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متعاقبة خاسية التفصيص . نصلها جبل الخضار . مسن الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، كبيرة القد ، خاسية البتلات ، يفضاء اللون .

٢٣٢٨٦ - كَتْبِيَّة \*  
Pleurobranchus (S). Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيانيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة .



كتيعة



كتاب

Amphicomma (S).

٢٣٣١١ - كَحْص

Pomme (F). Apple (E).

٢٣٢٩٦ - كَلَّة

الكَلَّة : ثمرة التفاح . ج كَلَل .

Amphicome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة البذنيئات .  
أنواعها المروفة قليلة . بعضها تملو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم .  
أوراقها متناقية . ريشية روية . أزهارها عنقودي التجميع ،  
طرفي الإزتيكار . أزهارها جرسية الشكل متدلية ، مستطيلة  
الأنابيب ، خلية البثرة ، ودية أو برتقالية اللون . حب  
ثمّارها يشبه بعين الجراد . جذورها لحية غليظة مستطيلة  
يقال أنها نافعة .

Pommé (F).

٢٣٢٩٧ - كَفَلِي ، كَفَاحِي

Grown to a round head (E).

ما كان شكله شكل التفاح .

Corbeille de fleurs (F).

٢٣٢٩٨ - كُفَنَة

Dune (F). Dune, Sand-hill (E).

٢٣٢٩٩ - كُفَيْب

رمال تسفوها الريح لا تستقر على حالة . ج أكْبَة  
وكَيْبان .

Orcanette tinctoriale (F).

٢٣٣١٢ - كَحْلَاء

هي الشجيرة الصباني ، اطلبه .

Polyvalent (F).

٢٣٣٠٠ - كَثِير التَعَادُل

Spare marron, Rousseau (F).

٢٣٣١٣ - كَحْلَاء

هي الجربيدية ، سمكة مشهورة ، اطلبه .

Adragant (F).

٢٣٣٠١ - كُفَيْزَاه

راجع اسطرغالوس كثيره .

Alcool (F).

٢٣٣١٤ - كُحُول ، سَبِيرُونُو

Alcohol (E).

كلمة عربية الأصل تطلق على طائفة من المركبات العضوية  
السايلة المتطايرة المتشابهة الخواص || عرف الإنسان  
الكحول منذ زمن بعيد . وهي على أنواع عديدة أشهرها  
الكحول الايثيلية أي كحول النّب والثّار والمواد السكرية  
والنشوية والكحول المشيلة أي كحول الخشب || فالكحول  
الايثيلية النقية سوائل عديمة اللون ، قليلة الرائحة التريجية  
لاذعة الطعم ، تحوي ٩٥ ٪ من الكحول و ٥ ٪ من الماء .  
وهي تغل في ٧٨ ٪ سبغ . وتختلط بالماء بأية نسبة كانت  
ومن خواصها أنها تذيب أكثر المركبات العضوية  
وبعض الاملاح المعدنية وهي تستعمل في المواء . تستعمل  
كشروبات روية وفي المركبات الطبية وفي صناعات  
كثى || أما الكحول المشيلة فهي تستعمل من نشارة الخشب  
بعد معالجتها بمخاض الكبريتيك المركز . وهي تستعمل  
كوقود وفي مختلف الصناعات والطلاء والتطهير .

Astragale gommifère (F).

٢٣٣٠٢ - كُفَيْزَاه بَشِيَاء

راجع اسطرغالوس ديق .

Polychètes (F).

٢٣٣٠٣ - كَثِيرَات الهَلَب

Polychaeta (E).

رتبة من الحلقيات المفرديات . فصائلها وأجناسها وأنواعها  
عديدة . جميعها بحرية . تتميز بفتوحها الكثيرة الهلب  
وبرؤوسها الزائفة العالمة ويوجد الخياشيم والأرجل  
والأولاس . بعض أنواعها يفرز مواد قسغورية تقيها في  
الظلام . معظم أنواعها منفصل الشق وبعضها خثوي ||  
وهي تقسم إلى قسمين : كثيرات الهلب الجواله وكثيرات  
الهلب الركينة . فالجواله تنجذب للشواطئ وتعيش على  
الزبل وبين الحصى والصخور والفوس والضرع ... أما  
الركينة فتعيش ضمن أنابيب كلسية المادة أو في انفاق  
تخفرها في رمال القاع وتبطنها بمادة كلسية أيضاً .

Alcool éthylique (F).

٢٣٣١٥ - كُحُول إِيْلِي

Ethylic alcohol, Ethyl alcohol (E).

يوجد بكميات قليلة في بعض ثمار نباتات الفصيلة  
الصويانية وهو يتكون خاصة في أثناء التخفير الكحولي  
الذي يبين على المواد السكرية المختلفة .

Mille-pattes (F).

٢٣٣٠٤ - كَثِيرَة الأَرْجُل

صف من الحيوانات المفصلي يعرف بالسدخايعات . راجعها

Dense

٢٣٣٠٥ - كَثِيف

صفة ما كان له الشيء .

Alcool amylique (F).

٢٣٣١٦ - كُحُول أَمِيلِي

Amyl alcohol (E).

كحول يستخرج من البطاطا والشوندر والثّار والحبيب بعد  
تخميرها .

Endophyte (F). Endophyte (E).

٢٣٣٠٦ - كَثِيم ٥

نعت تعريفي يطلق على كل حي يعيش داخل حي آخر  
أن من الحيوان أو النبات أو من الاثنين معاً كالحشرة  
التي تعيش داخل الزهرة أو الثمرة .

Alcool méthylique (F).

٢٣٣١٧ - كُحُول مَشِيلِي

Methyl alcohol (E).

ويسمى روح الخشب كحول يستخرج من الأخامات الخشبية  
واللغية المختلفة .

Cajan (F).

٢٣٣٠٧ - كُجْنُونُ

هو الكنيس ، اطلبه .

Alcool absolu (F).

٢٣٣١٨ - كُحُول مُطْلَق

Absolute alcohol (E).

هو الكحول الصرف عيار ٩٧ ٪ سبغ .

Alcométrie (F).

٢٣٣٠٨ - كَحْلَاء ٥

هي قياس الكحول .

Alcool dénaturé (F).

٢٣٣١٩ - كُحُول مُعَيَّب

Denatured alcohol (E).

أنواع من الكحول يجب القاتون تميها بالتلون منأ  
لاستعمالها في المشروبات الروحية .

Vipérine rouge (F).

٢٣٣٠٩ - كَحْلَانِي

هي الاخوين الخمرى ، اطلبه .

Raisin vert (F).

٢٣٣١٠ - كَحْب

هو البروق أي الخمر من نهاية طور الحوضه . يقال  
كحب الكرم وأكحب اذا لوح عنه . واحدته كحبة .

٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامستها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كوالسها نصف دائرية الشكل . اغادها لاحقة . قوائمها نشيطة . ارساها خاسية العقل . اثارها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار وتمضي بيئاتها الشوي تحت اللحاء . يرقاتها مؤذية تقضم تحوت الازهار والمبيض والجراهم تنفضي عليها || اشهر اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). **كُدَّاس** - ٢٣٣٢٩  
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). **كُدَّاسَة** - ٢٣٣٣٠  
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة عامات من الحصيد تهرم وتكدس وتحفظ رطبا تُدرَس .

**كُدَّال مُتَوَجَّه** - ٢٣٣٣١  
Gubernatrix cristatella (S).  
Commandeur huppé, Cardinal vert (F).

مائل من فصيلة التشرشوريات ورتبة الجواثم غروريات الناقير . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي جماعي الا في زمن الترخيم || جسمه صغير القد ، بطول من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوب الذكر متراكب الالوان الجميلة . ظهره الى الشبهة انضغاص المالح . صدره وظهره ولولحت جناحيه وافتيكه الى الصفار الزاهي . قبتيره ورأسه وعنقه الى السواد الاسفع . منقاده حشطي اللون . رسنه الى السرة السوداء . اما الانثى فصدرها الى الشبهة وظهرها الى الخضار الباهت . صدغها ومصرمها الى البياض العاجي || قوته الحشرات والبدور . يألف حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يذئن عشه بين اثناد الانحار القريبة من سطح الارض . الانثى تحضن على مرتين في الحول . حشنتها من بيضتين الى ثلاث بيضات تقوم برعيهما دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Mouvement (F). **كُدَّاهَة** - ٢٣٣٣٢  
Movement (E). الكدامة هي الحركة ، اطلها .

**كُدَّاهَة** - ٢٣٣٣٣  
Leptodactylus (S).  
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس ضفادع قازية من فصيلة الكدمايات . انواعه المعروفة ستة مهدا المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٦ الى ٨ سم . عنده الذكور ومن ٧ الى ١٠ سم . عنده الاناث . رؤوسها معتدلة والبصر . عيونها مستديرة جاحضة . فكوكها السفلى عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب . جلودها مثالة دقيقة الصول || اثارها الى السرة الخضراء الباقية الالزمة لتعلوها رقتة جزئية على الظهر ، صفراء على البطن || تعيش قرب المنابع ويجاري الماء اكثر من عشرة اعوام . تسرح في الليل وتبيت في النهار بين اوراق النبات او في المنابع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تسرا نحو ٥٠٠ دعبلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسهال والخز والنباتات المائية المختلفة .

٢٣٣٣٠ - **كُحُولاز ، زِيمَاز**

Alcoholase, Zymase (F). Alcohohase, Zymase (E).  
خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول وفاز كربوني .

Spiritueux (F). **كُحُولِي** - ٢٣٣٣١  
Spirit, Spirituous (E).

نعت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول .

**كُحَيْبَة** - ٢٣٣٣٢  
Stilbella (S).  
جنس فطور مجهرية من عمارة الخثيات وفصيلة الكحيبيات . يتميز بكرميته المستطيلة القضيبان الدبوسية الرأس . بويغاته كروية الشكل ، صغيرة القد || انواعه المؤذية قليلة امهرها كحيبة الشاي .

**كُحَيْبَة الشاي \*** - ٢٣٣٣٣  
Stilbella theae (S).  
فطر مجري يتطفل على افاد الشاي . مظهره الخارجي يقع خلية زياء تشبه القنابر تركب لحاء الافناد . تلبو وردية اللون ثم يبيض . مشججه يسير في الارعية وقد يستقر في قم الافناد فيوقت نموها ويسبب ياسها || يكالنج (١) باقتطاع الاغصان الموصية وحرقها . (٢) يتطهر الجروح . (٣) بتفضيض التربة لصفوف المياه الزائدة التي تسبب هذا التوم .

**كُحَيْبَة** - ٢٣٣٣٤  
Stilbaceae (S).  
Stilbacées (F). Stilbaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الميفانبات ورتبة الزويات تتميز بكتاندعا المجموعة الى كرميات . هيئها لا نظامي الاثكاز منه المنتصب الخوازي ومنه المتشابك اللانقياسي الترتيب . مشججها فربي الثول . بويغاتها قلادية التنجيج . اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الخثيات والمودانيات .

**كُحَيْبَة** - ٢٣٣٣٥  
Crypte (F). Crypte (E).  
كحيبة ج كحيثات . الكحيثات ، جسوريا ، اسم يطلق على غدييات صغيرة او انايبس نحيلة ، غير نافذة ، تشب في القننة الخضمية عند بعض الحشرات .

**كُحَيْبِيلَة** - ٢٣٣٣٦  
Fauvette orphée (F).  
طائر من الدنل ، اطلب دخلة غريبة .

**كُحَيْبِيَة \*** - ٢٣٣٣٧  
Phalacrus (S).  
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واشمة من فصيلة الكحيبيات ورتبة غدييات الاجنحة . اثارها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . رؤوسها غروريط ، قرونها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامستها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية الاطراف . كوالسها محدودة نصف دائرية الشكل . اغادها لاحقة يملوها تحديد نحيل ، قاطب . قوائمها نشيطة . اثارها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تحوت الازهار ويبيضاتها .

**كُحَيْبِيَات** - ٢٣٣٣٨  
Phalacridae (S).  
Phalacridés (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واشمة من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية اللون . تطول من



كحيبة الشاي



كحيبة

## ٢٣٣٤٧ - كَدَو

Lenteur (F).

Slowness, Tardiness (E).

يقال كدت الارض اذا بطل نباتها . وربة كاداة اي بطيئة الانبات .

## ٢٣٣٤٨ - كَدَوَة

Leptosphaeria (S).

جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة العشويات . تتميز بأصنافها الغائرة في نسج النبات النضار وبيوضها الوشي الشكل الملون والمديد اللزج المتعرضة || أنواعه عديدة أشهرها ما يتبع .

## ٢٣٣٤٩ - كَدَوَة الأرز

Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmoideum, Sclerotium oryzae (S).

فطر مجهرى يركب الارز في جميع اعضاء الحوالة فيؤذيها ويعطيها || مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة مهيبة ، لون عورها الى الجوزي ثم يزداد اسمرارا مع اقترابه من الاطوار المتأخرة || تركب المصغ والسوق والسبيل || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يكافح بتطهير الشلب المعد الى البذار .

## ٢٣٣٥٠ - كَدَوَة الحنطة

Leptosphaeria tritici (S).

فطر مجهرى يركب عصف الزروع وانحصا الحنطة ثم الشعير والشونان والشيلم || مظهره الخارجي بقع صفراء تتشعب على المصغ والاعواد تقسب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يعيق نمو النبات ويحد من نشاطه .

## ٢٣٣٥١ - كَدَوَة السُّنْدَرَة

Leptosphaeria rusci (S).

فطر مجهرى يصيب بعض انواع السُّنْدَرَة وانحصا السُّنْدَرَة الاربع || مظهره الخارجي نكت كثيفة لثولوية الشكل تكثف الانفاد تقسب ذبوا وبجافها || يكافح باستعمال سائل بورديو وغيره من السوائل السلفوكسيلية .

## ٢٣٣٥٢ - كَدَوَة السِّلْم

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria exitiosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodermium exitiosum, S. brassicae (S).

فطر مجهرى يصيب بعض النباتات السليبية وانحصا السِّلْم واللفت والملفوف والفجل ... || مظهره الخارجي بقع شقر تملأ سطح المادة الخضراء في السوق والاوراق والخريبات تقسب يباس النسج ويجفاف الخريبات ويجفها وانفلاتها || ومنهم من قال ان عفن جلور اللفت يعود الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة مذهلة اذا لامته العوامل الجوية وانحصا الرطوبة || يكافح بتطهير البذار .

## ٢٣٣٥٣ - كَدَوَة الشَّوْفَان

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S). Maladie des taches sombres (F). Oat leaf spot (E).

فطر مجهرى يركب عصف الشَّوْفَان فيؤذي ويبيد الى نحو . مظهره الخارجي بقع صغيرة مبيضة الى اتصال المصغ ، تبدو اقل اخضراراً من النصل ثم تسمر بعد ان يملوها في وسطها نكتات خلية بيضاء || اغراضه زعيدة لانه قليل الاذى والاساءة .

## ٢٣٣٥٤ - كَدَوَة الصَّجَمَان

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S). Piétin-verse des céréales (F).

فطر مجهرى يركب سوق الزروع انحصا الشيلم والحنطة

## ٢٣٣٤٥ - كَدَامِيَّات

Leptodactylidae (S). Leptodactylidés (F). Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات ديداء قازية من الرقيات السويات ورتبة البتروات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها عديدة . مهدا امرىكة البصل واسترالية . منظر انواعها قازب ومها البري والمائي والشاير والباس . جميعها مسنة الفكوك العليا ، عادمة الانسان في السفلى . وفرة عجزها شبه غالية من التنوعات العظيمة الجانية || أشهر اجناسها واعرفها الكدامة والالوزيا والحيلود والسيراتوفريس .

## ٢٣٣٥٥ - كَدَان

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).

اربة صفيحية التركيب مرصاة متوالية صلبة المكسر . كل مادة ترسب في قعر الاعية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويبرها كأكبر والزيوت .

## ٢٣٣٥٦ - كَدَوِيَّة

Ganga cata

طائر من القطا يعرف بقطاة كدوية ومنهم من قل كدارية . الجلع كدوي وكداري وكدر .

## ٢٣٣٥٨ - كَدَس ، كَدَسِيَّس

Bottelage (F). Tying up in bundless (E).

جع الحشيش وامثاله الى اكادس .

## ٢٣٣٥٩ - كَدَس ، كَدَسِيَّس

Entasser (F). To hoard up (E).

جعل الشيء كدسا بمعنى على بعض .

## ٢٣٣٦٠ - كَدَم

Tondre le gazon (F). To mow a grass (E).

كدم الحضر جزء بالكدامة او المكدمة .

## ٢٣٣٦١ - كَدَم

نوع من الجراد سود الاجسام خضر الرؤوس الواحدة كدمة .

## ٢٣٣٦٢ - كَدَمَة

Brebis grasse (F). Fatted ewe (E).

نجة سمين غليظة .

## ٢٣٣٦٣ - كَدَمَة

Ecchymose (F). Ecchymosis (E).

أثر نفسيجي او احمر اللون يظهر في الجلع عقب جرح او رضه سببه انكساب الدم تحت الجلد .

## ٢٣٣٦٤ - كَدَمِيَّوْم

Cadmium

معادن ثنائي الذرة ، ابيض اللون ، ازرق الموانج ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المظولية ، اصلب من القصدير . قلته النوبي يراوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩ رمزه (كـ - Cd) وزنه الانوبي ١١٢,٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ مئ . ويبل في ٨٦٠ مئ . بخاره ذائقي ، شديد الاذى ، يرتاقب اللون ، يتكثف بلورات ثمانية الارجح من المدد التي الحمر . وهو يذوب في بعض المحامض منها الكبريتي والازوتي والكلوريدينيكي .

## ٢٣٣٦٥ - كَدَن

Frutescent (F). Graze (E).

نمت تمريني يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنية .

## ٢٣٣٦٦ - كَدَه

Talure (F).

عارض فيزولوجي يعترض لاه الانجار .



كدوة الارز



كدوة الحنطة



كدوة السِّلْم



كدوة الشَّوْفَان

٢٣٣٦٣ - **كُرَاتٍ ، كُرْبَ** Scariflage (F). هو السلف أي الحُرث السطحي بالمسلفة يبعثر ذرات التراب ويفتت المدر ولا يقلب التربة .

٢٣٣٦٤ - **كُرَاتٍ** شجر كبير بجبال الطائف . الواحدة كُرَاتَة (أ. م.) .

٢٣٣٦٥ - **كُرَاتٍ الْبَرِّ ، طَيْطَان**

Allium vineale (S). Ail des vignes, Porreau sauvage, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكُرَات البري يكثر في الكروم . دوفسته مستديرة مبطلة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الخضار البحري العابق . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . نوره صيوانية كروية الشكل ، أزهارها إلى البياض الوردى المواج .

٢٣٣٦٦ - **كُرَاتٍ الدُّبِّ** Allium ursinum (S).

Ail des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio pedunculata (I).

نوع من الكُرَات البري الميزلول . أوراقه مستطيلة مستعرضة . شراخه يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . نوره صيوانية كروية ، أزهارها غبراء اللون وريدة المواج .

٢٣٣٦٧ - **كُرَاتٍ الصُّخُورِ ، كُرَاتٍ إسبَانِيَا**

Allium scorodoprasmum (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Grasilauch, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكُرَات المعمر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهاره إلى البياض الأخضر يعلو مواج أحر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة وفعالة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها اصداق وأسرع من البزور . يوجد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - **كُرَاتٍ عَسْفَلُونِ ، كُرَاتٍ أُنْدَلُسِي**  
**كُرَاتٍ أَبُو شَوْشَة ، قَفْلُوط**

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكُرَات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى البووضة تستلزم ثلاث سنوات . يوجد أيتها زرع ولا يخفى سوى الأتربة الكلسية . يقال أنه طيب ويستعمل كطارد للديدان الموية .

٢٣٣٦٩ - **كُرَاتٍ مَعْرُوفٍ ، كُرَاتٍ رُومِيٍّ**

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية معلقة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها أهليلجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، نصلها مستطيل الصنفعة عابق الخضار . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل أزهارها إلى الحمرة . يرغب في الأتربة الدبالية التوسطة الانحداج . يبلو في أكواد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطف أوراقه وتكدم جذوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والثوفان فيسب قصفها في إبان تحبيب السنايل أو قبل تمام الإدراك . مظهره الخارجي بقعة سمراء مستطيلة تكتنف غدة الشرافت بالسلاية الأولى حيث تعلب جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غدة إلى غدة بعد أن يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الأولى فيمتطها بنشأة فعمية لبدة تمرقل التبادل الشفني إن لم تقض عليه .

٢٣٣٥٥ - **كُدْوَةُ الْفِصَّة**

Leptosphaeria circinans (S).

فطر مجهرى يصيب الفصّة فيؤذيها ويشلل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجنت والجذور فتعطيا وتشل نشاطها وقد تسبب ذبول النبات وموته . لم تنجح فيه مكافحة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - **كُدْوَةُ الْمُرْزِ**

Leptosphaeria musarum (S).

فطر مجهرى يركب أوراق المرز فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لطح حنطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الأوراق وتسبب جفاف النسيج المتحار . أضراره زيدة لانه قلما يعزل ويؤخر تبادل النسج . يكافح باستعمال الفطاري غير المركزة على النحاس .

٢٣٣٥٧ - **كُدْوَةُ الْوَرْدِ**

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmenti (S).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب الورد والمعلق والموجع والكشمش والخمضيات . مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يعلو النواحي فيسبب ذوبها كما في الورد والموجع ، ويملو نصل الأوراق كما في الخمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها . ومن العلماء من قال أنه يصيب النبات الضعيف دون غيره . يكافح بتسميد النباتات الضعيفة وباستعمال أحد الادوية الفطورية اعخصها سائل بورديو وسائل سلفوكسليك .

Cystocarp (F).

Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ أو أكياس البوغ عند الخياش الحمر .

٢٣٣٥٩ - **كُدَيْس الْوَرْدَا** هو رباح دنفله ، اطلبه .

٢٣٣٦٠ - **كُدَان ، نِسْفَة ، خَفَان** Ponce (F).

Pumice (E).

حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرعى الموج .

٢٣٣٦١ - **كُدُو ، كُورْبَرِيل**

Hymenaea courbaril (S). Hyménée courbaril, Courbaril (F). Courbaril tree (E). Kourbaril (D). Courbaril (I).

شجرة حرجية كبيرة القد حيلة الشكل من فصيلة القُرْبَات . مهددا البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبه فراء تعلو من ١٥ إلى ٢٥ م . خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقة ، جزوي اللون ، صناعي الاستعمال ، مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالخز حليب غزير المادة الراتنجية ، اصفر اللون ، منتحب العرف يدعى « كُورْبَرِيل » يستعمل كطلاء فاخر الصنف .

٢٣٣٦٢ - **كِرَاء** Louage (F).

رابع اجارة .



كُدْوَةُ الْمُرْزِ



كُدْوَةُ الْوَرْدِ



كُدُو



كُرَاتٍ الْبَرِّ



كُرَاتٍ الصُّخُورِ



كُرَاتٍ مَعْرُوفٍ

كُرَاتٍ صَفْلُونِ



كُرَاتٌ نَبَيطِيَّةٌ



كُرَاتٌ وَرْدِيَّةٌ



كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ



كُرَاتُةُ الْخَوْرُجِ



كُرَاتُةُ الْكَلْوَرِ



كُرَاتُةُ الشَّمْشِ



كُرَاتُةُ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ



كُرَاتُةُ عَشْنَةِ

٢٣٣٧٨ - كُرَاتُةُ الْمَيْسِ \*، سَكُولِيَتِ الْمَيْسِ  
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'Orme (F).  
Larger European elm bark beetle (E). Großer  
Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل مقنوم  
الطرف. طولها نحو ٦ م. رأسها وصدرها وكولها الى  
السواد الازرق المواج. غداها الى الجوزة العنابية. تركيب  
الميس وبض الاجزاء التزيينية فتخلج الشكير وتوقع به  
اشد الاذى.

٢٣٣٧٩ - كُرَاتُةُ الْمَيْسِ الصَّغِيرَةِ \*

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme  
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner  
Ulmensplintkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل اسطواني  
الحية يطول نحو ٤ م. رأسها اسود اللون. جسمها كستني  
اللون. غداها سطحية التخذيد. تركيب الميس ولا تغت  
من الاجزاء المثمرة فتخلج شكير الاغصان والافئاد وتوقع  
به اشد الاذى.

٢٣٣٨٠ - كُرَاتُةُ خَشِيبَةِ \*، سَكُولِيَتِ خَشِيبِ

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte  
des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole  
borer (E). Ruzzeliger Obstbaumpinnkäfer (D).

حشرة من الكرشيات، طولها نحو ٣ م. كولها اسود اللون،  
غداها الى الجوزة البنية. تركيب جميع الاجزاء المثمرة  
اغصانها الفتاح والكرز والخوخ فتخلج شكير الاغصان  
وتوقع به اشد الاذى. لها جيلان في الحول. بيائها الشتوي  
يحصل في الطور البرقي.

٢٣٣٨١ - كُرَاتُةُ لَامْتَجَانِسِلَةِ

Xylebore disparate (F).

خنفساء مؤذية تدعى كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ، اعطاه.

٢٣٣٨٢ - كُرَاتُشِيَّاتٌ \*، سَكُولِيَتِيَّاتٌ \*

Scolitidae (S). Scolytidae (F). Scolityidae, Bark  
beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها  
عديدة جميعها صغيرة القد. اجناسها اسطوانية. اقربها  
الى السواد ومشتقاته والجوزي واللبي والحظلي. قربها  
الاستعمارية قصيرة، رفيقة او صرمانية. اقربها رابية.  
تعيش باكثرها تحت لحاء الاجزاء وفي الشكير فتخلجه  
وتعطيه ثم تمتع مكها الذي ينقث من رقات دقيقة تعيش  
على المواد النشوية والسكرية التي يفرزها النبات.

٢٣٣٨٣ - كِرَاضِ \*، Sperme des oiseaux (F).

Sperm of the birds (E).

هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند الطير.

٢٣٣٨٤ - كُرَاعُ Tibia

الكراع من القدم والبقير بمنزلة الوطيف من الغرب وهو  
مستند الساق. وقيل هو ما دون الكعب من البهائم. ج  
أكرع وأكارع وكرامان.

٢٣٣٨٥ - كُرَامٌ Vigneron, Viticulteur (F).

Vine-dresser, Viticulturist (E).

من تعاطى زراعة الكرمة لاستثمار العنب.

٢٣٣٧٠ - كُرَاتٌ نَبَيطِيَّةٌ \*، بَصَلُ الْعِفْرِيتِ، ثوم الثرق

Allium ampeloprasum (S). All d'Orient, A. à cheval,  
Poireau sauvage, Pourrai, Pourrie (F). Blue-leek,  
Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch  
(D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكراث البري المبذول. اوراقه مسطعية،  
مستترضة، شديدة الخضار. شمره يملو من ٣٠ الى  
٦٠ سم. ينتهي بنورة صيوانية قلنسوية الشكل،  
ازهارها الى البياض الاغر.

٢٣٣٧١ - كُرَاتٌ وَرْدِيَّةٌ \*، قُرْطُ

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic  
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكراث البري والزرع المأكول. دوفسته يفضية  
الشكل سمره اللون تحويها فصوص خلبية صغيرة القد.  
اوراقه مسطعية محددة تعرض من ٥ الى ١٢ م. شمره  
الزهرى يملو نحو ٧ سم. ينتهي بنورة صيوانية كروية،  
ازهارها وردية اللون.

٢٣٣٧٢ - كُرَاتِز Menon (F).

تيس أو كيش يقود القطيع.

٢٣٣٧٣ - كُرَاسُولَا Crassula (F).

هي الكركب، اعطيه.

٢٣٣٧٤ - كُرَاتُةُ الْحَرَاةِ \*

Xyleborus dispar, Anisandrus dispar (S). Xylé-  
bore disparate (F). Shot hole borer (E). Ungleichler,  
Holzböhrer (D).

حشرة من الكرشيات. ثوبها الى السمرة السوية. الذكر  
اصغر قدماً من الانثى التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ م.  
تركب الاجزاء الخرجية على اختلاف فصائلها واجناسها  
ولا تغت عن الدراق والمشمش والجوز. تخلج الشكير  
وتسرده على حدود الخشب حيث تمتع المكان.

٢٣٣٧٥ - كُرَاتُةُ الْخَوْرُجِ \*، سَكُولِيَتِ الْخَوْرُجِ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte  
des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكرشيات طولها نحو ٥ م. رأسها وكولها  
وصدرها الى السواد اللامع، غداها وبطنها الى العنابي  
الزاهي. تركيب الخوخ وسائر الاجزاء المثمرة فتخلج  
الشكير في السوق والاغصان. لها جيلان في الحول.  
بيائها يتم في الطور البرقي.

٢٣٣٧٦ - كُرَاتُةُ الْكَلْوَرِ \*، سَكُولِيَتِ الْكَلْوَرِ

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).

حشرة من الكرشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها  
كستاني اللون حطلي المواج. تركيب معظم الاجزاء  
الورزية اغصانها الورز فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٧٧ - كُرَاتُةُ الْمَشْمِشِ \*

Xyleborus saxesen, X. xylographus (S). Xylé-  
bore de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot  
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzböhrer (D).

حشرة من الكرشيات جسمها اسطواني الشكل، قصير القد،  
يطول نحو ٢ م. ثوبها الى الحظلي العابق || تركيب  
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه.

Porcellio scaber (S).

\* كَرْبَس ٢٣٣٩١

Porcellion (F). Porcellio (E).

دودية من القشريات مساويات الارجل من فصيلة الطرميطيات مبلولة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || جسمها قليل الصلابة، صغير القد، سميكة، الكركيب، يطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم. عند الانثى. رأسها صغير الحجم. متنها قاصم قارض. قربنها الاستشعارية اربعة. جرابها صغيرة. تشرجها ينتهي بأربع زوائد لامتناهية القد. ثوبها الى الطحلة الرصاصية الملوحة. مدها اغبر || تألف المواعظ الرطبة والواقية والسكان الارضية حيث تعيش بمعية حمار قبان، وفي مثلها بطيئة الحركة تسمى يهدو وتتكور عند الشعور بالخطر || كرشح في الليل وتبيت في النهار. قوتها المواد العضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وعساقها وجذورها.

Grape-fruit

٢٣٣٩٥ - كَرْبُورُوت

هو ليمون الجنة، اطليه.

٢٣٣٩٦ - كَرْبَل

هو الشفش، نوع من الاسماك، اطليه.

Kalmia (S).

\* كَرْبَل ٢٣٣٩٧

(Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I)). جنس نباتات معمرة من فصيلة الخنجنيات. انواعه عديدة جميعها سامة الاوراق والازهار. منها الارضية الرطبة. منها الانجبار والشجيرات والجنبات والاعشاب. معظمها بري وبعضها زرع. اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام الدوري. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز، خاصة البيلات الثنائية الغضن، عشارية الاسدية، بحيلة الشكل، مختلفة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.

٢٣٣٩٨ - كَرْبَلٌ بَحْرِيٌّ الْوَرْقِ

Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F). نوع من الكربل وهو بحلة سبروتية معمرة تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء فروعه مفضلة. اوراقها متعاقبة سنائية الشكل، نصلها يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. صفحته السفلى خلية البشرة بيضاء اللون، صفحته العليا الى الخضار البحري. ازهاره علقية التجميع، هامة الارتكاز، وردية اللون، ليلكية الملوحة || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٣٣٩٩ - كَرْبَلٌ زَهْبِيٌّ الْوَرْقِ

Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F). نوع من الكربل وهو عشيبة سبروتية معمرة. شكلها شكل الصنوبر. ساقها ليفية فروعها تملو نحو ٥ سم. اوراقها متعاقبة لاطئة صغيرة القد. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ سم. وهو خلي البشرة على صفحته. ازهارها ابطية، فردية، حراء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٣٤٠٠ - كَرْبَلٌ صَيْقُ الْوَرْقِ

Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F). نوع من الكربل وهو بحلة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقها خشوية فروعها. اوراقها متعاقبة منقطة تملو نحو ٧ سم. ويعرض نحو ٢ سم. ازهارها علقية التجميع، تاجية الارتكاز، وردية اللون || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٣٣٩٦ - كَرْوَايَا \*، كَرْوَايَا، كَمْوَنُ اُرْمِي

Carum carvi (S). Carvi, Cumini des prés, Kummel (F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel (D). Carvi, Comino tedesco, Kummel (I).

نبات من الاناويه وهي عشيبة حولية من فصيلة الخيميات. منها المروج والمراعي الجبلية وزرع بكثرة. جميع اجزاء النبات عطرية من الجذور الى الازهار والبرور وفي تستعمل استعمال الانيسون وتدخل في تمليز الاطباء وسائر المأكلا || بزورها حاضنة تفتح الشبهة وتدر العلاب وتنشط المعاصر المدية وتمنع التخخ وحض الطعام وتعمل التفتح وتطرد الرياح وتدر البول. غير ان الاكثار من استعمالها، يضر بالكلى || ويستخرج من بزورها زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف.

٢٣٣٩٧ - كَرْوَب

اصول السنف الغلاظ العراض التي تقطع معها. الواحدة كربة.

Emblaver (F).

٢٣٣٩٨ - كَرْوَب، رَهَم

حرت الارض وسمها وبذرها. (E). To sow with wheat.

Entelurus (S).

٢٣٣٩٩ - كَرْبَانَج

Entelure (F). Entelurus (E).

جنس إملاك بحرية من عصيليات الخياشم وفصيلة زمارات البحر. انواعه المعروفة قليلة العدد، اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط. جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة. اطولها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها غنية الاعظام الحافرة الاطراف.

٢٣٣٩٠ - كَرْبَانَجِيَّات

Flagellariaceae (F). Flagellariaceae (E).

فصيلة نباتية من سحيدات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات. اشهر نباتاتها الكربانية.

Flagellaria (S).

٢٣٣٩١ - كَرْبَانَجِيَّة \*

Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratang (D). Flagellaria (I).

جنس نباتات جذموية معمرة متسلقة من فصيلة الكربانيات. انواعها عديدة مهدها البلاد الحارة. تألف النماق وضفاف الأنهار. اوراقها حاضنة، عصيفية الشكل، مستطيلة. نصلها سميك الصفعة، بحري اللون، ينتهي بجوالم حلزونية مزدوجة.

٢٣٣٩٢ - كَرْبَة \*

Carapa (S). Carapa, Carape, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).

جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدشتيات. مهدها البلاد الاستوائية. تثبت قرب الشواطئ. وعل صفات الانهار. اشجارها كبيرة القد دالحة براوح ارتفاعها من ٢٠ الى ٣٠ م. ثمارها جراء ليفية التركيب تحضن بعض البذور المختلفة الاشكال والاحجام، يستخرج من لبها مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية للوقاية من الاجرشات فيهدون بها اجسادهم واخشاب منازلهم. وقد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون. اما لحاء الاشجار فليفية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال الكينا في مكافحة الحميات.

٢٣٣٩٣ - كَرْبُز

الكربز: القثاء الكبار الطول.



كاروايا



كربانية



كربة




كربس




كربل






الكرة الأرضية قبل تجزئتها وانفصالها

رقم ١




الكرة الأرضية كما كانت في الإبداع الثاني

رقم ٢




الكرة الأرضية بعد انقسامها وتجزئتها وتشكيل صفائح غلافها أي منذ ٦٠ أو ٧٠ مليون سنة

رقم ٣




الكرة الأرضية في حالتها الحاضرة

رقم ٤



الكرة الأرضية كما ستكون بعد مرور ٤٠ أو ٥٠ مليون سنة بعد الميلاد

رقم ٥



رقم ٦

### شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار دفينة

الشبكة المثقبة بتخوم الصفائح الكوردية. أما مناجم النفط فعدت التقاطع. والدليل على ذلك منجم «تيومن» الذي يفوق كل حدّ.

تركيب التربة - النقص العنصري في تركيب التربة يسبّب بعض الشذوذ والغرائب في تطور النباتات كما هي الحال في الرقبتين ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع الحيوانية والنباتية لا توجد إلا في هاتين المنطقتين. احتضنها منطقة بحيرة بيكالك.

توزيع الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد عديدة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معينة لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.

الساحل الجوفية والبحرية.

عوارض بطائية - اعرفها حتى الآن الصدع الوسط - اطلسي الذي يمتد من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الأشعاع الشمسي - المواقع المعرضة للضخ الأقصى تقع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانفجار الانبومي - يقولون، بعد الأبحاث العلمي، أن انفجاراً نووياً وقع تلقائياً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في حدود الرقم ٤٠. أما سببه فيعود إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تختشد طوال الخطوط

النواحي الزهية - عشر مناطق، توزيعها حول الكرة الأرضية متناسق الخطوط، تميّز بنواحيها المدهشة. يدخل في إطارها مثقت البرمود. المناطق العشر تحمل الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٤٧، ٤٩، ٤٣، ٤١ و ٤٥.

البراكين - معظمها واشدّها نشاطاً يقع على خطوط التصادم صفائح الغلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت الغلاف الجوي.

جويئات - مراكز العصف محصورة في بعض عقد الشبكة وقد ينجم عنها زوايا وأعاصير لا قياسية الضغط والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

٢٣٤٠٨ - كَرْبُوكْسِيلَاز Carboxylase  
نوع من الأزيم الكبير المسئول في منظم أعضاء النبات .  
نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوامض .

٢٣٤٠٩ - كَرْبُونْلَه \* Corbula (S).  
Corbule (F). Corbula (E).



كربوس منقط

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة القفاليات . أنواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ،  
قسم منها أي نحو ٢٥ من متحجرات الاراضي الثانوية  
والثالثية ، اما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || احدائها  
سميكة الصفحة ، بيضيه اللون ، لامتناهية المصاريع  
المفصلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كَرْبُولِيغَاز Carbolligase  
أزيم شاذلة توجد في الخبز وفي التفاح وفي بعض اوراق  
النبات . جهدها يماكس حميد الزيملز .

٢٣٤١١ - كَرْبُون Carbon (F). Carbone (E).  
جسم بسيط رمزه (C) وزنه الاتومي ١٢.٠١ وهو  
من عناصر المركبات العضوية الاساسية ان نباتية او  
حيوانية . ونظراً لكثرة اهمية هذه المركبات الكربونية  
فقد جعلوا الكيمياء العضوية لدراستها || والكربون لا  
ينصهر وهو قابل للانقاد ويحل ويبدد الاصلية الحرارية  
والكهربية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة احصاها  
المبلورة كالاس والاسرب وغير المبلورة كالصمغ والساج .



كربوله

٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات Carbonate  
ملح الحامض الكربوني .

٢٣٤١٣ - كَرْبُونَات الْبُوتَاسِيُوم Carbonate de potassium (F). Potassium carbonate (E).  
ملح ابيض سريع الذوبان في الماء يحوي من ٥٢ الى  
٦٢ ٪ من البوتاس || يستعمل كصاب يوتاسي .

٢٣٤١٤ - كَرْبُونَات الْكَلْسِيُوم ، كَرْبُونَات الْكِلْس Calcium carbonate (E).  
ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية  
من الكرة الارضية .

٢٣٤١٥ - كَرْبُونِي Carbonifère (F).  
Carboniferous, Coal-bearing (E).  
نمت تعريفى يطلق على الصخور التي تحوي  
بعض الكربون او الفحم الحجري || ويطلق خاصة على  
الحقبة الرابعة من الاباج القدم وفي الطبقة الارضية التي  
تركز على الديفونية . راجع مادة حياة .



كريته

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيل Carbonyl (F). Carbonyls (E).  
مركب مضاد للتلف يستعمل في صيانة الاشعاب .

٢٣٤١٧ - كَرْبُونِيْدَاز Carbohydase  
هو العمل الذي تقوم به الازيمات في مضافة الجلوسيد  
والهتر وسيد .

٢٣٤١٨ - كَرْبِيْتَه \* Couroupita (S).  
Couroupite (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . انواعها  
المعروفة خمسة منها بعض اصناف امريكة الجنوبية احصاها

٢٣٤٠١ - كَرْبَلْ عَرِيضُ الْوَرَقِ ، غَارَ سَامَ ،  
لُورَه Kalmia latifolia (S).

Kalmie à feuilles larges, Laurier de montagne (F).  
Mountain laurel (E). Breitblättrige Kalmie (D).  
Calmia a foglie larghe, Lauro di montagna (I).  
نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تملو من ٧  
الى ١٢ م . اوراقها متعاقبة او ضمية ثلاثية . نصلها يطول  
نحو ١٣ سم . ويعرض ٤ سم . ازهارها عشكولية التجميع ثنائية  
الارتكاز عديدة الالوان التي تختلف مع الضروب || ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٤٠٢ - كَرْبَلَه Carpel (F).  
هي الحياء ، اطلبه .

٢٣٤٠٣ - كَرْبَلَه Carbonylase (F).  
المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الاشياء  
الخشبية او تقمها بالكربونيل لحفظها من التلف .

٢٣٤٠٤ - كَرْبُر Carbu (F). Carbide (E).  
قسم ثنائي او هيدروجيني .

٢٣٤٠٥ - كَرْبُوس Pelodytes (S).  
Pelodyte (F). Parsley-frog (E).

جنس ضفادع من فصيلة الهكسريات . انواعها المعروفة  
قليلة العدد مهدا بعض اصناف العالم القديم || اجسامها  
صغيرة القدر تطلو من ٤ الى ٦ سم . عيونها كبيرة ناشزة .  
حداقات عيونها عمودية الارتكاز . جلودها مبيضة التلون  
والقصد || اقلها في الطحلة الخضراء تملوها زراكن  
متباينة الاشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات  
هذا الجنس رائحة الدوم الخامة التي تفوح منه واستمراره  
على التفرقة نحو تسعة اشهر من كل عام || اشهر انواعه  
الكربوس المنقط .

٢٣٤٠٦ - كَرْبُوس مُنْقَط \* Pelodytes punctatus (S). Pelodyte ponctué (F).  
Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربوس وفصيلة الهكسريات . اصطناعه  
تحدد من الشرق الاوسط الى اطراف البلاد الاسبانية دون  
ان تتجاوز الاقاليم المتدلة || جسمه صغير القدر . الذكر  
يطول من ٤ الى ٥ سم . والاثنى تطلو من ٦ الى ٧ سم .  
رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . عيناه كبيرتان  
ناشرتان . حدقة عينه عمودية الارتكاز . اصابع قوائم  
الخلفية قليلة الخطاط الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده  
مائل البشرة . ظهوره مجهز ببض التلون والقصد المتدلة  
الشوز تنفس المادة الحيوية الرائحة التي يتميز بها || ثوبه  
الى الطحلة الخضراء تملوها زراكن غضة عابقة ||  
يعيش في المناطق وجاري الماء . يعمر نحو عشر سنوات .  
مسرحه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوته  
الحشرات والديدان || الاثنى تسراً خلال موسمها السنوي  
الذي يستمر نحو تسعة اشهر من ١٢٠٠ الى ١٦٠٠  
دعبله ضمن حبال مستطيلة تلفها على بعض النباتات  
المائية . القف يَم بعد التفرقة بنحو ثلاثة اسابيع والبالغ  
عند اكتمال طورها البلوغوي تطلو نحو ٦ م .

٢٣٤٠٧ - كَرْبُوبِيل حَنْطِي Carpopile brune (F).  
هو الزوحة الخنقية ، اطلبه .



كربيس

### ٢٢٤١٩ - كُرْبِيس \*

Corbis (S).

Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللويثيات. انواعه المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها الغابرة المتحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصداؤها شبه بيضية الشكل متساكنة ، مخددة ، عابكة الالوان ، يكثر فيها الجؤري القاتم || اجسامها متوسطة الحجم او صغيرة و ثنائية المشاعب المستطيلة الطويلة || اعطائها معظم بحار العالم . تعيش منفردة في الرمال المغورة بالماء المعتدل القور .

### ٢٢٤٢٠ - كُرَّة

Sphère, Globe (F).

Sphere, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بتساوي جميع خطوطه المستقيمة الممتدة من المركز الى السطح . تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قايها بعدد ٣.١٤١٥٩٢٦٤ ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قايها بعدد ٤.١٨٨٨٨ .

### ٢٢٤٢١ - كُرَّة اُرْضِيَّة \*

Globe terrestre (F).

Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي . (راجع ارض) || كيف تكونت ومتى ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لسردها جميعها ، انما نذكر اشيعها واقربها للعقل || عند حصول الانفجار السديمي ، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة ، تكون الشرح الرقيق المعروف بالنظام الشمسي ، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين اصبحت ما نعرف عنها الآن : ارض متيانية التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر ، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقوفها يعني الزوال . وحياة تنبت من كنه الخالق فتتجدد وتنو ثم تلوي وتندثر . (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الحرايط الاربع المدرجة تباعاً فانها تبين مدى التطورات العظيمة المفعلة التي حصلت عبر الازمنة السميقة الغابرة ، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤٠ او ٥٠ مليون سنة .

### ٢٢٤٢٢ - كُرَّة الثلج

Boule de neige (F).

هي الافلاس الثلجي ، اطلبه .

### ٢٢٤٢٣ - كُرَّة هَرْمِيَّة

Photosphère (F).

Photosphère (E).

سطح الشمس المضيء .

### ٢٢٤٢٤ - كُرْتَلُوم اُسُود الرَأْس \*

Cartallum ebulinum (S). Cartallum à tête noire (F).

Cartallum ebulinum (E).

حشرة واسمة غاشلة من فصيلة القرنيثيات ورثة مخمدات الاجنحة . تألف البراري والجزواتين . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واغصانها ازارار الصبوانيات . يرقاها هُمة



كرد

تسردب لحاء وشكير جلوع النباتات البرية || جسمها صغير القد يعلو من ٨ الى ١٢ م . رأسها وكسلها وبطنها وجرانها الى السواد الاسفع . ظهرها الى اخضر الازرق الموج . عيناها كبيرتان جاحظتان . زباناها دقيقان مستطيلان || ظهرها مقطوم الطرف الاصح . غذاها متباعدة التخذيد . ارسافها رباعية العقل الظاهرة || الاثنى امين قدماً من الذكر واضخم بطناً منه واخصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانية في نيسان وتميش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار || البرقة عند ادراكها الكالك الجسموري تطلو نحو ١٨ م . جسمها مستغلط المقدم والرأس ، مستقد المؤخر ، قليل الملب المبعثر . ثوبها الى الخنطي الاسمر . رأسها وشرجها الى الصرة السوداء .

### ٢٢٤٢٥ - كُرْت \*

Karst

هي الطبقة الطباشيرية السطحية كُثرت فيها الإمات والكتل اللاقياسية الارتكاز والاجرام .

### ٢٢٤٢٦ - كُرْجُولَة \*

Corrigiola (S).

Corrigiote (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النومانيات . انواعها المعروفة ستة منها الشرق الاذق واروية وبعض مناطق افريقية وامريكة الجنوبية || سوقها نجيلة . اوراقها لجية مستطيلة . اثمارها هامي ضمي التجميع . اثمارها صغيرة خاسية البتلات والاسدية ، تبينة اللون . تنويرها ربيعي . اعرف انواعها واشهرها كرجولة السواحل .

### ٢٢٤٢٧ - كُرْجُولَة السَّوَّاحِل \*

Corrigiola littoralis (S). Corrigiote du littoral (F).

نوع من الكرجولة . طوعية في بعض مناطق الساحل الليتاني ونها ضواحي بيروت || ساقها نجيلة مستطيلة . اوراقها رحيمة الشكل ، مستطيلة التصال . اثمارها هامي . اثمارها الى الصفار الباهت . تنويرها ربيعي .

### ٢٢٤٢٨ - كُرْد

Base du cou (F).

Basis of the neck (E).

هو اصل العنق او قاعدة ارتكازها .

### ٢٢٤٢٩ - كُرْد

Ferme, Métairie (F).

Farm, Lease, Land (E).

المشارنة من المزارع . ج . كرد .

### ٢٢٤٣٠ - كُرْد \* ، عَشْبَة السَّيِّح ، دَقْنَة قَاتِلَة

Daphne tatonraira, Thymelaea tatonraira (S). Daphné tatonraire, Tartonraire, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartonraire (D). Laureola bilkeia, Salamandra (I).

نوع من الدفنة البرية السامة منهاها الكليسة الرطبة . شكلها يشبه الخلنج . ساقها فراء تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة ضيقة ، نصلها جامد الصفحة ، باهت اخضر . اثمارها سنبلية التجميع ، هامة الارتكاز ، صغيرة القد ، يفضاء اللون .

### ٢٢٤٣١ - كُرْدَانَة \*

Cordana (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة الطحجيات . جريه الكينيدي اسطوانية قصيرة تملوها كتاك سولجانية غنية التجميع ثنائية الخلية || انواعه قليلة العدد والاذى ، اعرفها كردانة الموز .

## ٢٣٤١٠ - كُرْدَهَان الْعَاب



كردانه الموز

*Codonopsis silvestris* (S). *Codonopsis* des bois (F).  
نوع من الكردهان. ساقه فراء متسلقة ملتفة تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه معتقة قليلة الشكل، نصلها بمجر الزغب الجامد. ازهاره لا يقاسية الارتكاز، كثيرة العدد، صغيرة القد، فستقية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

## ٢٣٤١١ - كُرْدَهَان بَيْضِي الْوَرَق

*Codonopsis ovata* (S). *Codonopsis* à feuilles ovales (F).  
نوع من الكردهان. ساقه متسلقة متلو نحو ٨٠ سم. فروصها متقابلة قليلة الاستطالة. أوراقه بيضيه الشكل، خلية البشرة، تطلو من ٢ الى ٣ سم. ازهاره تطلو نحو ٣ سم. لونها الى الزرق الباهتة يعلوها توشيم عابق || ازهاره يستمر طوال الصيف.



كردون

## ٢٣٤٤٢ - كُرْدَهَان مَرَعَانِي

*Codonopsis clematidea* (S). *Codonopsis*-clématite (F).  
نوع من الكردهان. ساقه متسلقة متلو نحو ١٢٠ سم. فروصها لا يقاسية الارتكاز. أوراقه معتقة كاملة، السطح منها متقابلة والعليا متضاربة، نصلها خلية البشرة، بيضيه الصفحة المدببة عند زامها الاخير. ازهاره طرفية الارتكاز، بيضاء اللون، مفصلة بالازرق || ازهاره يستمر من تموز الى آب.



كرديس

## ٢٣٤٤٣ - كُرْدُوس

*Epiphyse* (F). *Epiphys* (E).  
٢٣٤٤٤ - كُرْدُولَه \*  
*Cordylura* (S). *Cordylure* (F). *Cordylura* (E).  
جنس حشرات قانصة من فصيلة الطلواحيات رتبة ذوات الجناحين. أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء، تطلو من ٨ الى ١٢ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة. عيونها ناشزة، متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية شديدة القصر، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها ضليعة. ملاسها صغيرة. بطونها صقاية الشكل. كواسلها ويطونها ورؤوسها وقوائمها متكاثفة الملب. رواسها ضيقة، ملونة. قوائمها نشيطة || الحشرة الجمالانة قانصة. البرقة قازية والجمه.



كردوله

## ٢٣٤٤٥ - كُرْدُوم

*Cardium* (S). *Cardium*, *Bucarde* (F). *Cardium* (E).  
جنس حيوانات نهريه وقعاعية من الرخويات صفيحات الحياشيم وفصيلة الكردوبيات. أنواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبعضها قعاعي يعيش في مياه الاخوار || اصداؤها شبه قليلة الشكل، متساوية المصارع. اصداؤها ماسية او غمدية او مفصلة. جميعها محززة ملونة عادمة الاغشية. مفصلاتها رباعية الاسنان. مشاعها ثنائية طليقة || تعيش متغمة في الاسمال والزرايل.



كردوم

## ٢٣٤٤٦ - كُرْدُونِيَّات

*Cardilidae* (S). *Cardilidae* (F). *Cardilids* (E).  
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحات الحياشيم. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منها النهريه التي تعيش في المياه المذبة ومنها البحرية ومنها القعاعية التي تعيش عند مصبات الانهر || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي. مداريعها متساوية القلق

*Cordana musae* (S). \*  
فطر مجهري يركب اوراق الموز فيؤذيها بعض الشيء. مظهره الخارجي رشفة عسدية الشكل تركب النصل على صفحته العليا. تبدو سمرة اللون ثم تنصرف الى الخلفي يحيطها حار اشهب قائم || اضراسه زهيدة لا تتدعي العناية.

## ٢٣٤٣٣ - كُرْدَرَة

*Kruberia* (S). *Krübère* (F).  
جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الخبيات. انواعها المعروفة عديدة منهاها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة، غمدية، لمساء اللحاء، فراء. اوراقها غمرية، متباينة التفصيل الريشي. ازهارها صيراني التجميع، طرفي الارتكاز، لامتساوي الاشعة عددا وطولاً. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون او صفراء او ارجوانية || تنويرها ربيعي.

## ٢٣٤٣٤ - كُرْدُوتُون \*

*Cordulia*  
جنس حشرات من فصيلة اليعسوبيات، انواعها المعروفة قليلة جميعها مفترسة تقضي على الحوام. طول اجسامها راوح من ٤٨ الى ٥٠ سم. بسطة اجنتها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ مم. ألوانها الى الخضار الزرقي. اناثا اعقب ثوبا من ذكورها.

## ٢٣٤٣٥ - كُرْدُكَيْس \*

*Corydalis* (S). *Corydalis* (F). *Corydalis* (E).  
جنس حشرات من فصيلة الكردوليسيات رتبة سادات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها غليظة، متسلسلة التبطيط. عيونها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. تتميز بتأثيرها المستطيلة خاصة عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألوانها تراوح من السمرة الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تعيش كائيل طولها اليومي في الماء.

## ٢٣٤٣٦ - كُرْدُكَيْسِيَّات \*

*Corydalidae* (S). *Corydalids* (F). *Corydalidae* (E).  
فصيلة حشرات من رتبة سادات الاجنحة. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار البلاد الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها مستطيلة يكثر فيها التبطيط. قرونها الاستشعارية خيطية. عيونها صغيرة جانبية. اجنتها غشائية || مسرهما دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

## ٢٣٤٣٧ - كُرْدُوتُون

*Cordylone* (F).  
هو القلب، جنس نباتات زينة، اطليه.

## ٢٣٤٣٨ - كُرْدَمَانَة

*Garou* (F).  
نوع من الدقة، اطلب مثان.

## ٢٣٤٣٩ - كُرْدَهَان

*Codonopsis* (S). *Codonopsis* (F).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس. جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها ترابي. اعطائها بلاد الشرق. جذورها لحية. سوقها متسلقة متسلقة او ملتفة. اوراقها لا يقاسية الشكل والارتكاز يطلب فيها التقابل. نصلها بحرية اللون. ازهارها جريسية متدللة || اشهر انواعها ما يتبع.



كرديت



كردينال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز عادي



كرز عقنودي

المضلة والمنسنة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المشاب  
الطليقة || اعرف اجناسها واشهرها الكردوم .

#### ٢٢٤٤٧ - كَرْدِيْت \* Cardita (S).

Cardite (F.)- Cardita (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة الكرديتيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة  
في جميع بحار البلاد الحارة والمنتلة الحارة || اصداؤها  
شبه قلبية الشكل ، مسننة التخديد . مشابها ثنائية ،  
طليقة || تعيش لاصقة بالصخور المعنورة القليلة الغور.  
ليفنها غزير المادة النشيطه .

#### ٢٢٤٤٨ - كَرْدِيْتِيَّات \* Carditidae (S).

Carditides (F.) Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم .  
اجناسها وانواعها عديدة . الماصرة منها منتشرة في جميع  
بحار البلاد الحارة والمنتلة الحارة . اما البائرة فن  
متحجرات الاثرية الدفوية || اصداؤها شبه قلبية الشكل ،  
مدببة الفن . خياشيمها لاشاوية القد ، خلفية الرباط .  
مصاريها متساوية ، منفرجة الاطراف || اعرف اجناسها  
واشهرها الكرديت .

#### ٢٢٤٤٩ - كَرْدِيْنَال \* Cardinalis (S).

Cardinal (F.) Cardinal (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعها المعروفة اربعة  
موطنها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يأنف  
الغابات . فوجها يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا || اجسامها  
صغيرة القد . رؤوسها متوسعة بفتانع شباينة الاحجام .  
اثوابها ملونة يكثر فيها الاحمر والجؤوي . تتميز بمناقيدها  
الشبه مخروطية الشكل القصيرة والفصلية . اذنانها مستطيلة ،  
مقعرة الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،  
معتدل الشوط ، كثير التصعيد والتبهييط . تتنقل على الارض  
بحفة وعلى الاغصان برشاقة || قوتها الثار العنيفة واليلبور  
والخيرات ولا تنف عن ثمار الفاكهة والحبوب والذرة ||  
اشهر انواعها كرينال فيرجينية .

#### ٢٢٤٥٠ - كَرْدِيْنَال فيرجينية \* Cardinalis virginianus (S).

Cardinal de virginie (F.)-  
Cardinal tanager (E).

طائر من الكردينال . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية  
اغصانها فيرجينية . يأنف الغابات ويحبو البلاد باستمرار  
الا في زمن الترحيم . فوجها يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا ||  
جسمه صغير القد . ريع القامة ، يطول نحو ٢٣ سم . بما  
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى الحمرة  
الفرتمزية تبهت في الظهر وتيق في الجناحين والذنب .  
جنبته الى الجؤوي وكشته كذلك . زوره اسود . صدقه عينه  
ياقوتية اللون يطوقها حطار جؤوي || طيرانه خفيف  
الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يدن عشه في  
الادغال وبني الاشجار القليلة الارتفاع الملتفة الانداد  
والاننان . الاثنى قنع من ٤ الى ٦ فضات تحضنها وسدعا  
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

#### ٢٢٤٥١ - كَرْز \* Cône, Strobile (F).

Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة السنورية وغيرها من الثار الخروطية  
او الخروطية الشكل .

#### ٢٢٤٥٢ - كَرْز \* Cerasus (S).

Cerisier (F.) Cherry tree (E).

جنس اشجار برية وزراعية مشرنة من الفصيلة الوردية .  
انواعه وفروبه كثيرة العدد تختلط باحجامها وبياكلها  
وارتكانز اغصانها وقد ثمارها واشكالها . ويرف هذا التباين  
في الاعصام الجسورية فالصفات الشوزية الجفنية  
الرئيسية واحدة : جذور عمودية ثم حزبية ، سوق منتصبة .  
لحاء ملس . غشب جؤوي اللون . اوراق معتقة ، مسنة  
الحافة ، ناعشا بيضية الشكل او رمية . ازهار نوري  
التجميع يشمل من ٣ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خامسة  
البتلات ، عديدة الاسدية . ثمار لحمية ، مستطيلة الاذن ،  
كروية الشكل ، ملسة الشور اللامعة ، لذيلة اللباب  
الدم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار  
التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه يخشى  
المواقع الممرضة لرياح الموسما لانها تسبب اغلاص الازهار .  
يجمد في جميع الاثرية من الفقيرة بالماء الغذائية الى الغنية  
ومن الرميعة الى الطينية غير انه لا يتحمل الاثرية الشديدة  
الاندماج ، المستحكة الرطوبه . وهو يتكاثر بالبزور  
والغسائل وبالتقيد والتعلم . امنع واجود مظهراته المقلب  
والبري والشرية وسنالشويه .

#### ٢٢٤٥٣ - كَرْز الطير \* Cerasus avium (S).

Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mèrisier (F.) Gean  
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süßkirsche  
(D). Ciliegio visciolo, Ciregiolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر . اليه تنسب أكثر واشهر  
الضروب الموصوفة المعروفة . اجمارها كبيرة القد تملو من  
١٠ الى ٢٠ سم . سوقها واغصانها منتصبة . ثمارها مستديرة ،  
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،  
لذيلة النكهة .

#### ٢٢٤٥٤ - كَرْز القُدس \* Cerise des Juifs (F).

هو الحبة الكاكجية ، اطلبها .

#### ٢٢٤٥٥ - كَرْز عَادِي \* Cerasus vulgaris (S).

Cerisier acide, Griottier, Bir-  
garreaulier (F.) Cherry tree (E). Sauerkirsche, Sauer-  
kirsch (D). Ciliegio agerotto, Cirlegio (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر العديد الضروب . ساقه  
منتصبة تملو من ٦ الى ١٢ م . اغصانها منفرجة مسترسلة .  
ثمار كروية ، قليلة الحمرة ، غزيرة المادة ، لذيلة الطعم ،  
بينه الحفوة التي تتفاوت نسبها مع الضروب وقد تكون  
حامزة في الضروب المعروفة بالوشنة .

#### ٢٢٤٥٦ - كَرْز عُنُقُودِي \* Cerasus padus (S).

Cerisier à grappes, Putier, Putlet (F.) Bird-cherry,  
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-  
kirsch (D). Pado, Ciliegio a grappoli (I).

نوع من الكرز البري المشر . ثماره صغيرة القد عقنودية  
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منيته اغصانها والجبال  
الصخرية . شجيرته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اغصانها  
مسترسلة متدلية . اوراقها اهليجية ذرية مسنة الحافة .

#### ٢٢٤٥٧ - كَرْز غَارِي \* Prunus lauro-cerasus (S).

Laurier-cerise (F.) Cherry  
laural (E). Larbeer-kirsche (D). Lauro ceraso, L.  
mandorlo (I).

جنس نباتات برية وترية من فصيلة الورديات . انواعه  
قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنيات . سوقها



## ٢٣٤٦٣ - كَرْسُوفَة دَرْبِيَّة

*Botryodiplodia tubercicola* (S). Java black-rot (E).  
فطر مجهري يتطفل على درنات البطاطا الحلوة فيغنيها.  
مظهره الخارجي احتلال بصبيب اللباب والقشور تتسمر  
وتسود وتسلب ثم تتفتن ويعلو العفن || علاجه الوحيد  
يقوم باجتناث الزرعة في المواقف الرطبة وفي الآربة  
المويومة مع التأكد بضرورة تطهير البذار قبل الزرع.

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف، كَرْسُوف  
Coton (F).  
هو القطن، اطلبه.



كرز غازي

٢٣٤٦٥ - كَرْسُوفِيَّة، عَنَقَلَال  
Gnaphale (F).  
جنس نباتات برية طليحة من فصيلة المركبات. أنواعها  
عديدة منها العشبية الحولية والخشبية المعمرة. سوقها وأوراقها  
زباه، زغبها أبيض اللون. أوراقها متعاقبة لاطئة كاملة  
صغيرة اللد سنانية النصل. أزهارها روئيات طرفية.  
معظم أنواعها طبي يستعمل ضد السعال وينفع الصدر.  
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.



كرسفية جبيلة

٢٣٤٦٦ - كَرْسُوفِيَّة جَبَلِيَّة \*، عَنَقَلَال جَبَلِي  
Gnaphalium leontopodium (S). Gnaphale pied-de-  
Lion (F). Lion's paw cudweed, Everlasting (E). Ruhr-  
kraut, Ruhrpflanze (D). Canapicchia, Immortali (I).  
نوع من الكرسفية البرية الطليحة منها الجبال العالية،  
زغبها لبد أغبر اللون. أزهارها ليلكية. تنبت السعال.

٢٣٤٦٧ - كَرْسُوفِيَّة حَمْرَاء \*، عَنَقَلَال أَحْمَر،

ذَم الْفَرَّال  
Gnaphalium sanguineum (S). Roter  
Gnaphale rouge (F). Red cudweed (E). Roter  
Ruhrkraut (D). Canapicchia rossa (I).

نوع من الكرسفية البرية الطليحة المبلولة. تنبت في الأراضي  
للحساء من ارتفاع ٤٠٠ م إلى ١٢٠٠ م. عن سطح البحر.  
زغبها أبيض اللون برّاق. أزهارها إلى الحمرة الجميلة. تفيد  
السعال والصدر.



كرسفية حراء

٢٣٤٦٨ - كَرْسُوفِيَّة \*

*Ervum ervilia*, *Vicia ervilia* (S). Ers, Ervillier, Lentille  
ervillière, Vesce noire, Faux orobe (F). Ers, Ervil,  
Bitter vetch (E). Stachelwicke (D). Ervo, Fragellini,  
Girlo, Lero, Moco, Veggolo (I).

نبات عشبي حولي علني من فصيلة البقوليات، يزرع لمحبه  
رشته. وهو يعطى علقاً للبهائم اخصها البقر والغنم إلا أن  
كثرت مستشيطه لذلك يحسن الثروي في استعماله || جذوره  
سطحية متوسطة الانشعاب. ساقه عذرة قليلة الفروع  
تتلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها متعاقبة، مركبة، شضية،  
مؤلفة من ١٠ أو ١٢ أو ١٤ زوجاً من الورديات  
الامتقابلة، نصلها يفيش الشكل، أشل الصمعة.  
أزهاره صغيرة القد، بنفسجية اللون مسطيلة الزناد. ثماره  
سنت صفار وكل سنف تحسن من حيتين إلى ثلاث حبات  
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها إلى السرة البنية.  
زراعتها بعلية وهو يحد بعد الحطة أو الشعير وفي جميع  
الآربة الخفيفة والمتوسطة الانتاج ولا يخشى سوى المواقف  
الرطبة || يذرع عادة في الكواكن ولزوم الدم يراوح  
من ١٠ إلى ١٢ كيلو.

٢٣٤٦٩ - كَرْسُوفِيَّات هي البقيعات، اطلبها.

٢٣٤٧٠ - كَرْسُوعِي \*  
Grégaire (F).

Gregarious (E).  
صفة النبات الذي يعيش ويتكاثر جاعياً متجانساً.



كرسنة

مستقيمة، أوراقها أبيدة، اهليجية، سنانية و نصلها  
جامد الصفحة، مشاري الحافة. أزهارها عتقودية التجميع  
ثمارها صغيرة القد زيتونية الشكل ذبة العقب، لونها إلى  
الحمرة أو السود.

٢٣٤٥٨ - كَرْزَة  
Cerise, Guigne (F).  
Cherry, Sweet cherry, Heart cherry (E).

هي ثمرة الكرز، اشكالها وألوانها عديدة جميعها مستحبة  
الطعم المركب. لباب سوتها يحوي نحو:

من الماء	٨٠,٠٠٪
من المواد السكرية	١١,٦٠٪
من المواد الاستخلاصية	٣,٨٥٪
من المواد الازوتية	١,٣٥٪
من المواد الدهنية	٠,٣٥٪
من السليولر	٢,٥٢٪
من الرماد	٠,٤٣٪

وهو يحوي أيضاً بعض المواد المض الضوية اخصها الحامض  
التفاسي وما لا يستهان به من العناصر المعدنية كالبرناس  
والفسفور والمغنيزيوم والكبريت والكلسيوم والصوديوم  
والحديد والنحاس واليود... اخض إلى ذلك نحو ١٥٪  
من الفيتامين «ث» وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين  
«آ».

٢٣٤٥٩ - كَرْزِيَّ

Bacciforme (F).  
Bacciform, Berry-shaped (E).

ما كان شكله شكل حبة العنب أو الكرز.

٢٣٤٦٠ - كَرْس، صَاعُورَة، مِرَاع

*Chèvreria* (F). Goat-pen (E).  
مأوى الماعز المبني المسقوف. والكرس هو ما تلبه من  
البر والبول. ج. اكراس ومرح وبوايع.

٢٣٤٦١ - كَرْسُوفَة \*

*Botryodiplodia* (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات. يكتبداته  
غنية كثيفة تجمعها ونيسة غليظة شارة. بويضاته حطية  
اللون ثنائية الخلية || أنواعه المؤذية قليلة، يكثر وجودها  
في البلاد الحارة، اعرفها ما يتبع.

٢٣٤٦٢ - كَرْسُوفَة الكَاكَاو \*

*Botryodiplodia theobromae*, *Lasiodiplodia theobromae* (S).

فطر مجهري يصيب عدة نباتات تخلفة الفصائل اخصها  
الككاو والكاكاو واللباط والقطن والموز || فهو على  
الككاو آكلة تنخر الجذور فتذبل الأوراق بعد أن تحنق  
السنع بمسحة من العفن الاسود وبعد أن توشع لحاء الساق  
يبض البقع المنخفضة السمراء اللون || وهو على الموز  
عفن يركب قلب الآرومة فينويها أو يصيب الطرح فيوش  
الثار يبقع قطرها وعقمها نحو ٨ م. لونها إلى الخضار  
الزيتوني || وهو على البطاطا ذبول على بقعة الشجرة يبقه  
امرار واسوداد في لحاء الساق || ويصيب الشاي والبن  
فيابل اللتان والاناد وبؤدو || وهو في القطن وسم  
يركب العفازة فيمنعها من النمو بعد أن يركم ثيلها ويتغيب  
مشبهه الاسود || يكافح بالقنطاق وشرق الأعضاء المويومة،  
بتطهير الجروح، وباستعمال أحد الفواطر الفعالة أما  
نفساً على النبات أو تدفيراً على الآربة والنبات.

قصيرة وغليظة ، جذورها عمودية . أوراقها لاطئة متناوبة مركبة . السفلى منها قرصية الانقباض مستطيلة الاعناق الضلعية ، اما العليا فتباعدة وكثيرة التفريش . أزهارها صولانية التجميع ، لونها الالباض الاخضر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفتت الصدر وتحلل الورم وتنفذ الحصى || تنكأثر بالبزور وترغب في الازرية البدالية الحصى .

### \* كُرْقَس الجَبَل \* ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الريفية . ساقه مخشوشة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها مستطيلة الاعناق كثيرة التفريش والتشريح . أزهاره صولانية التجميع صغيرة القذ وريدة اللون .

### \* كُرْقَس الماء \* ٢٣٤٨٣

Sium latifolium (S). Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociana, Sedano d'acqua (I).

ومن اسمائه أنس النفس وجرجير الماء وهو نبات عشبي طبي معمر ، من فصيلة الخيميات ، يكثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقه جذوره مضادة للحفر ومدرة البول . بزوره منفطه كالخردل وهي مهيجة لقروة الجنسية وقد تكون شاذية نظراً لما تحواه من الفسفور والكلسيوم . وإذا رعته الماشية من غم وماعز وبقر كثر درها وباد صنفه .

### \* كُرْقَس بَرِّي \* ، سَمِيرْنُوم ٢٣٤٨٤

Smyrniolum olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbdohle, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olosatro, Smirno (I).

نبات عشبي بري يغلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاسواق المتدلة الحارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس . أوراقه مأكولة مستحبة العرف والطعم .

### \* كُرْقَس رُومِي \* ٢٣٤٨٥

Persil (F). هو البقدونس ، اطليه .

### \* كُرْقَس لَفِي \* ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Celériac (E). Kohlrabellerie, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I).

ضرب من الكرفس يزرع لجذوره وأوراقه المأكولة . وهو نبات محلي يندر في الاكواد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الازرية الخوارة الحصى .

### \* كُرْقَس ٢٣٤٨٧

Auchenoglanis (S). قال الفريق امين المملوف : « الكرفس او شال كرفس ، سلك سلوري ذكر منه بولنجه نوعين في النيل » .

### \* كُرْفُكُول ٢٣٤٨٨

سائل زيتي حادم اللون يتخلص من سطور الشفويات والسيولانيات ، اخصها سطور الصمتر والقودنج والندج . ثقله النسبي عند ١٥° مغ = ٠.٩٨٥٦ . وهو يغلي عند ٣٢٦° مغ .

### ٢٣٤٧١ - كُرْسِي الْجَوَّاء

كربي الجوزاء مجموعة كوكاب بالقرب من الجوزاء .

### ٢٣٤٧٢ - كِرْش

Souchet à nattes (F). هو سم الحصر ، اطليه .

### ٢٣٤٧٣ - كِرْش

Panse, Rumen (F). Belly, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة المجترات تتصل بالمريء وتشغل ثلاثة ارباع الجوف .

### ٢٣٤٧٤ - كُرْقَسَاب ٥

Calyptre (F). Calyptre (E). سقوف الجرائم الفطرية واشباهها .

### ٢٣٤٧٥ - كُرْقَسَب ٥

Calypter محمد غشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهور الحشرة .

### ٢٣٤٧٦ - كُرْشُون \* ، رأس الحنّش

Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertie, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I).

نبات عشبي سروي معمر وحيد الجلس والنوع من فصيلة المركبات الحشريات . ضروبه التزيينية عديدة . سوقها مخشوشة مسطحة ، فروعه منتصبة . أوراقها عروية وهي متناوبة مشورة الشكل واللون نصلها شريك النسيج الشبه للحصى . أزهارها وريسية كبيرة القذ صفراء اللون . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

### ٢٣٤٧٧ - كُرْعَان

Oursin melon هو للتوتياء ويحصى السفور نوع من الاغنيوس المأكول يكثر على الشواطئ الصخرية اللبنانية .

### ٢٣٤٧٨ - كُرْعَانِيَّات ٥

Echinides, Oursins (F). Echinidea, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شاذة الاعداد . فصائلها واجناسها وانواعها الحالية والمنذرة عديدة ، معظمها شائع على الشواطئ البحرية في جميع اسواق العالم .

### ٢٣٤٧٩ - كُرْعَانِيَّة ٥

Echinocystis (S). Echinocyste (F). Echinocystis (E).

بجلة معمرة عارشة من فصيلة القرعيات . مهدا بعض مناطق امريكية الشالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . سواقلها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خاسية القصوص . أزهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكية منها عنقودية التجميع ، الملقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الخضار الاصفر ، تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٤ سم . طليها تافه المذاق تؤكل مطبوخة .

### ٢٣٤٨٠ - كُرْف

كرف وكرف : تشم . يقال كرف الفحل او الحار عندما يشم طروقه ثم يرغ رأسه ويقلب جفلفه .

### ٢٣٤٨١ - كُرْقَس \* ، كُرْقَس تَبْطِي

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smallage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I).

نبذة بقلية محولة من فصيلة الخيميات ، ساقها عشية



كِرْشُون



كِرْسَب



كُرْسِي الجبل



كُرْسِي الماء



كِرْسِي بري



كُرْسِي لَفِي



كرفة جيتا



كرفة ذوية



كرك



كركب



كركدن افريقي

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عيونها ماسحة ، محاسرها متراكبة السيف . زعانفها الظهرية ضيقة مستطيلة . الذيلية فارقة || الثوباء ضيقة يملؤها تجذيع متعرض اسمر ورقة سمراء تجدد من الرأس الى ثنيج الظهر والذنب || لحومها جيدة الصفت مرغوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كَرْكَاش (F). Chrysanthème matricaire  
هو قوقان منيات ، اطليه .

٢٣٤٩٨ - كَرْكَب \* ، كَرْسَلَا

Crassula (S). Crassule (F). Crassula, Thick-leaf (E). Dickblatt (D). Crassula (I).

جنس نباتات لحية معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه زهاء ١٠٠ ، منها افريقية الجنوبية . معظمها بري وبعضها زيبعي . اشهر انواعه الكركب القرنزي . اعزاهو قرنزية اللون ، نورية التججيع ، جميلة الشكل ، فواحة الورد الياسميني .

٢٣٤٩٩ - كَرْكَة  
هي الالبيق ، اطليه .

٢٣٥٠٠ - كَرْكَج  
هو الحذف الصيني ، اطليه .

٢٣٥٠١ - كَرْكَدَن \* ، كَرْكُند ، مَرْميس

Rhinoceros (S). Rhinocéros (F).  
جنس حيوانات ليونة من الحافريات وفصيلة الكركدنات . انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسبوعية واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصابع . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذنانها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . سفنها اخشن بالغ السك . تحمل قرناً او قرنان فوق انفها || وهي هنية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت . تقم قرب الماء . قوتها الجلود والافصان والراسخ والاشعاب الغليظة . تعيش ازواجاً ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كَرْكَدَن اَبْيَض ، هَرْميس

Rhinoceros simus (S). Rhinocéros camus (F).  
اكبر واضخم انواع الكركدن وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاغبر . جثته تطول نحو ٣٧٠ سم . وتعلو ١٩٠ سم . ذنبه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وصفات بر الأورنج .

٢٣٥٠٣ - كَرْكَدَن اَفْرِيقِي \* ، عَرْثِيَت

Rhinoceros bicornis (S). Rhinocéros bicorné (F).  
كبير الجثة الغليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوه ١٧٠ سم . ذنبه ٧٠ سم . سفنه الى السرة الخطية الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير مستعرض القاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في المنافع وضغاف البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كَرْكَدَن اَلْبَحَر ، لِحْرَح  
هو حريش البحر ، اطليه .

٢٣٥٠٥ - كَرْكَدَن السِّنْد ، كُنْدَة

Rhinoceros sondaicus (S). Rhinocéros de la Sonde, R. de Java (F).  
كركدن وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يصفر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كَرْفُول ، كَرْفُون Carvol, Carvone  
سائل زيتي عادم اللون يستخلص من عطر الثيار والكرويا والكمون والنعنع الجدي والصعترى . ثقله النسبي عند ١٧ سم<sup>3</sup> = ٠,٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ °م .

٢٣٤٩٠ - كَرْفِئَة  
Coque d'œuf (F).  
Chell, Empty egg (E).  
قشرة البيضة العليا اليابسة وتدعى القوية .

٢٣٤٩١ - كَرْفِئَة  
Corypha (S). Coryphe (F).  
ج . كرفي . جنس اشجار ريفية الجماع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منهاها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها هامة الارتكاز ليفية التركيب ، يستخرج منها نسج الكرفي الذي يستعمل في صناعة القبعات وبعض اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزرقية التي تعيش في بعض المراتع الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزرقية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كَرْفِئَة جَبَنْجَا \* ، كَرْفِئَة مستديرة  
الورق

Corypha gebanga, Gebanga rotundifolia, Taliera gebanga (S). Coryphe à feuilles rondes, Tallère (F).  
نوع من الكرفي الزرقية الشائع الاستعمال ، يوجد في جميع الاربة واقلاها خصيصاً اما لا يتحمل العطش الشديد والمعارض الباردة التي يخفص فيها القر الى خمس درجات م . فوق الصفر || ثمرته تملو من ٤ الى ٦ اطار بمدة ٢٠ سنة . جذعها منتصب القوام ، مالمس السواء ، ينهي بقسمه من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريدة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كَرْفِئَة ذُؤَبِيَّة \* ، شَلَحْج

Corypha umbraculifera (S). Coryphe parasol, Talipot de Ceylan (F). Great fan-palm, Talipot palm (E). Talipotbaum, Gross Schirmpalme (D). Palma corifa, Corifa del Malabar (I).

نوع من الكرفي . جلدها اسطواني الشكل منتصب كالشعمة يملو نحو ١٠ اطار . قشرته ماسلة . اليافه الخشبية شديدة الصلابة . اوراقها هامة مروحية كبيرة القذ مستطيلة السعف جميلة الخضار الالامس .

٢٣٤٩٤ - كَرْفِئَات \*  
Coryphinées (F).

سبط اشجار برية وزرقية من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . منهاها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزايب وسيلان || سفنها منتصب ريفية . اخشابها صلبة تستعمل في البناء . اوراقها هامة الارتكاز صناعية الانتماء || اشهر اجناسها الكرفنة .

٢٣٤٩٥ - كَرْكَة  
وقف عن البني . يقال كركت الدجاجة وهي كركة اذا وقفت عن البيض .

٢٣٤٩٦ - كَرْكَة \*  
Charax (S).  
Charax (F). Charax (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجناسها بسيطة ، هي معظم بيضيه اللون ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها



كركدن الهند

طوله نحو ٢٨٠ سم. وارتفاعه ١٧٠ سم. اثناء جلاء لا قرن لها. يفيم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠٠ م. عن سطح البحر. موطنه الهند وبرمانيا وجاوا.

٢٣٥٠٦ - كَرْكَدَنْ سُوْمَتْرَا، نَشَان، نُوْشَان  
Rhinoceros sumatrensis (S). Rhinoceros of Sumatra (F).

اصغر انواع الكركدن جرماً واقلها غلاظة. جسسته تطول نحو ٢٤٠ سم. وتبلغ ١٣٠ سم. ذنبه ٦٠ سم. اما وزنه فلا يقل عن ١٠٠٠ كيلو. قرنه غليظ القاعدة البمطلة. ذرب الطرف يطول نحو ٧٠ سم. موطنه سومترا وسيام وملقة ...

٢٣٥٠٧ - كَرْكَدَنْ هِنْدِي \*، وَحِيد الْقَرْن، زَيْعَرِي

Rhinoceros unicornis, R. Indicus (S). Rhinoceros unicornis, R. de l'Inde (F).

اعظم انواع الكركدن الاسيوية وسيدة القرن. وهو كبير الجثة الغليظة طوله نحو ٣٠٠ سم. وعطوه ١٧٥ سم. اما ذنبه فنحو ٦٥ سم. وقرنه ٣٥ سم. وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو موطنه مستنقعات الهند وضاف نهر الكنج.



كركر

٢٣٥٠٨ - كَرْكَدَنْيَات  
Rhinocoridae (S). Rhinocoridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات. اشهر اجناسها الكركدن.



كركرود

٢٣٥٠٩ - كَرْكَدَنْيَات \*  
Palinuridae (S). Palinuridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل، طولها الذيل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. اعرف اجناسها واشهرها العنقوس والجراد البحري المعروف أيضاً بالكركند او الكركند.

٢٣٥١٠ - كَرْكَرْ  
Fourreau (F). Sheath (E).

الكركر وعاء قصب الثور والتيس.



كركة مدنية

٢٣٥١١ - كَرْكَرْ \*  
Stercorarius (S). Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E).

جنس طير بحرية من كفيات الدب. انواعه ثلاثة تجوب البحار من النرويج الى الجنوب. اجسامها هيفاء، القد، حيلة الشكل، بقاء الثوب، مستطيلة الاذنان. بسطة جوارحها تراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. مناقيرها طويلة منقطة المنادق. تطارد زيج الماء والحريشة فتنازلهما ما يصيدان من سمك وقد ترهبها على لفظه تلتفتهم.

٢٣٥١٢ - كَرْكَرْ غَاصِب \*  
Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisneur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skus (E).

نوع من الكركر. طائر بحري من كفيات القدم وفصيلة النورسيات. اعطاه البحار القطبية. ملبته الحيات فردى. لا تقترب الذكور من الاناث الا في زين الكوم والحضن. جسمه هيف الشكل، مستطيل الذنب والجناح. طوله نحو ٥٧ سم. وبسطه نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى السمرة العابقة المضلعة بالشقعة السعفاء. بطنه الى السمرة الرمادية.



كركم

عيناه جؤونيا اللون. منقاد اسم القاعدة والجسم، اسود البهرة. ساقاه الى السمرة السوداء. قوته كل ما استطاع اقتراضه من اسماك. وحيوانات وطيور وحشرات. يطارد الزيج ويغريها من طير الماء فينازلهما ما تصطاد من سمك. يدشن عشه في الفحوس يطنه بالحشيش والطحلب. الاثني تقع يبيضان في اوائل شهر محرم. الحفن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني بمثابة الذكر. الفرخ يستقل بطيرانه ابتداء من اوائل ايلول.

٢٣٥١٣ - كَرْكَرْو \*  
Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الحسيرييات. انواعه الفسارة قليلة تركب الخيازيات. فراشاته صغيرة القد طولها يراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم. اجسامها مخروطية الشكل، كستنية اللون. وراشها بيضاء يعطوها تجذيع وتبييض وزرا كش مختلفة الالوان. تظهر من حزيران الى ايلول. تمتج مكها على الاوراق ينقث عن رقات صغيرة القد مستطقة الجسم. رؤوسها سود، اثنائها الى الزرقا يعطوها تحطيط وتجذيع اسمر.

٢٣٥١٤ - كَرْكَسَة مُدْبِيَّة \*  
Charaxes jasius (S). Charaxe jasini, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E).

حشرة من فصيلة البشوريات حشرقيات الاجنحة. موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها واسعة قوتها مفر الاظهار. سرقتها تعيش على اوراق الخنجيليات. جسمها كبير القدر يطول نحو ٢٢ مم. بسطها نحو ٧٥ مم. رأسها جؤوي اللون، عيناه كبيرتان. زبابان صولجانيان. مرشها دقيق الجسم. جوشها وبطنها الى المرة البراء المالح. وراشها الاماميان الى الصمرة الخنطية تملوها بيج وتزويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر العسائي والاحلح. وراشها الخلفيان الى السواد الازرق المالح تملوها بيج وتزويق كا في الزوج الامامي وثلاث جدات الالوي بيضاء. الثانية متراكبة الالوان، الثالثة صفراء. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في النهار. تعاطل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتج الحول طلعاً على نصال اوراق النبات المائل. السرة تطول نحو ٦٥ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار. ثوبها الى الخضار الاحلح يعطوه الى السمكتين الخاصة والسامة بقتان مستديرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر ويطوقه اطار اسفر. رأسها سداسي الزوائد القرنية الجلوية اللون. سمكتها الشرجية مقلوبة الطرف الاخاذ. طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً.

٢٣٥١٥ - كَرْسُم \*  
Curcuma

جنس نباتات جذمورية عشوية معمرة من فصيلة الزنجبيليات. مهدها المناطق الاسيوية الحارة. انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزهراور والكركم الصياغي. اوراقها منتصبه مستطيلة الزناد سنانة النصل الشاروف. ازهارها صفراء اللون مثلية التجميع تتفتح على شراخ قصير. يستخرج من صاقلهما مادة تشوية ما كولة تدعى ارزوت الهند ويستخرج من ازهارها وبتدبيرها مادة صبغية صفراء اللون ومادة طيبة تدعى كركين (Curcumine).



كركي



كركتد الزيتون



كركي رمادي



كركي منشورية

Grus (S).

Grue (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركيات ورثة طول الساق. كنيته أبو حريان وأبو حن وأبو العيزار وأبو نعيم وأبو المصم. ج. كراكي. ١٢. أنواعه ١٢. جميعها من القواطع. طويلة العنق والساق. قوية المنقار الخروطي المستطيل. أوتابها تختلف باختلاف أنواعها يكثر فيها الأبيض والرمادي. رؤوسها ملس أو ثنائية القزعة || تألف المناطق وشطوط الأنهار. قوتها الأعشاب والحبوب والذرة والديدان والخشرات والصفاد والرحاحات من عظام وأفاعي || تنفث في أفرس رتبته في الإدخال السرحة أو بين الأعشاب الرقيقة. الانثى تضع من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

Grus cinerea (S).

Grue cendrée, G. commune (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طوله يراوح من ١٣٠ إلى ١٤٠ سم. ثوبه أبيض اللون. رأسه ومقدم عنقه إلى السواد الأزرق للمواج. محسرة وجانبه عنقه إلى الأبيض التاسع. أباهره وأنيكه وساقه إلى السمره النحسية اللامعة. منقاره أسود اللون أخضر المواج. عيناها جزويتان مستديرتان. يألف المناطق وأخوار الأهر وجزرها. يحبب العالم في طلب الرزق ويعود مع البرد إلى مشاته الذي يمتد من السودان إلى الهند.

### ٢٣٥٢٧ - كُرْكُمِي منشورية \*

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي أكبرها جثة وإجلها ثوباً. طوله يراوح من ١٤٠ إلى ١٥٠ سم. ثوبه إلى الأبيض العاصي جبهته إلى الحسرة. عيناها كالياقوت. قاعدة منقاره ومقدم عنقه إلى السواد الأزرق للمواج. منقاره إلى الخضرة الزرقية. أباهره وأنيكه إلى السواد العاصي يطوق مواج أخضر. ساقه إلى الأخضر الاسمر || مشاته بعض الأقاليم الصينية. يكثر في منشورية. يألف الشطوط النهرية والبحرية.

Gruidae (S).

Gruidae (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طول الساق. أجناسها وأنواعها قليلة العدد أشهرها الكركي والفرقوق.

Camomille odorante (F).

هو البابونج العطري، أطله.

Crocus (F).

هو الزعفران، أطله.

Stapélia (F).

هي التفل، نبات من الصفليات، أطله.

Carlina (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من الحشريات وفصيلة المركبات. أنواعه عديدة تكثر في الأرتبة القاحلة وفي الأراضي المنحاة وبين الصخور. سوقها قصيرة جدفة، أوراتها كبيرة، مستطيلة، مفروسة، شائكة. أزهارها روكسية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٤ سم. أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

### ٢٣٥١٦ - كُرْكُم أسود، جدوار أسود

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zédoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عشقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الأقصى. عساقله نشوية غذائية مأكولة ويستخرج منها ومن الأزهار بعض المواد الطبية والعصائية.

### ٢٣٥١٧ - كُرْكُم زَدَوَار، زَدَوَار، جدوار عقيده، سَطَوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zédoaire, Zédoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurzel, Zittwerkurm (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الأقصى ويستخرج من عساقله مادة نشوية غذائية تدعى أريون الهند. أزهاره صباغية نقيها منه وسق.

### ٢٣٥١٨ - كُرْكُم صِبَاغِي، هُرْد، عقيده هندي، ماميران، أصابع صفر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي عشقولي معمر. ينبت الحقم ويذر البول ويكثر إفراز القلب ويفتح الشبه. يزرع ويحضر في الهند وبياع تحت اسم «كاربي».

Mélilot-bleu (F).

هو الخندقوق الأزرق، أطله.

Crocotemhis \*

جنس حشرات من فصيلة اليسويبات أنواعه قليلة العدد جميعها مفترسة تقضي على الحوام. ذكورها حر، أنثاها إلى الصغار الخنطي. أجسامها طولها من ٣٥ إلى ٤٠ سم. وبسطة اجتناباً تراوح من ٥٢ إلى ٦٠ م.

Crocotemhis \*

هو الكركند وهو أيضاً الجراد البحري، أطله.

### ٢٣٥٢٢ - كُرْكُنْد الزَيْتُون \*

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنفساء كبيرة القدر من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها إلى الكستنائي يعلو مواج اسمر لاعم. رأس الذكر مسلح بقرن منعك إلى الوراء. الانثى جاء لا قرن لها || يألف الزيتون. يسرح من الغروب إلى الشروق ويبعث في النهار. يعيش على الأشجار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرقه كبيرة القدر، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقبوة، غبراء اللون، سمراء الرأس، تركيب جلود الزيتون فتقظها.

Amethystea (S).

Améthyste (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D).

نبات عشبي حولي زراعي تربيتي من فصيلة الشفويات. يزرع لزهرة الأزرق الجليل المستحب العرف. نبتة صفراء اللون، نخيلة الساق، قصيرة الفروع المستنقة || يتكاثر بالبذر. أزهاره صيني.

Meinate (F).

طائر من الزرايزر يدعى مينات، أطله.

## ٢٣٥٣٣ - كَرَلِين أَفْتَشِي الْوَرَقِ °

Carlina acanthifolia (S). Carline à feuilles d'acanthé, Chardoussé (F).  
نوع من الكرلين المبدول في الجبال. ساقه جذعة تملو من هـ إلى ١٠ سم. أوراقه كبيرة القند أفتشي الشكل. نصلها خلى البشرة على صفحته السفلى. رؤوساتها قصيرة الزناد. قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. قناباتها صفراء اللون. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.



كرلين شائع

## ٢٣٥٣٤ - كَرَلِين شَالِع °، زَيْد الْعَبْد

Carlina vulgaris (S). Carline vulgaire (F). Carline thistle (E). Kleine Eberwurz (D). Carline vulgare (I).  
نوع من الكرلين المبدول يكثر في المراعي الجبلية وفي الاراضي المذلاة. ساقه تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه كبيرة القند، شديدة التفريش، خلية الصفحة السفلى رتعاها الماشية قبل الادراك والهج. رؤوساته الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. قناباتها حنطية اللون || يقال أنه من النباتات الطبية التي تفيد افادة الحرفش والاراضي شوكي.



كرميوس المراعي

## ٢٣٥٣٥ - كَرَلِين عَدِيم السَّاقِ °، كَرَلِين تَجَسِي °

Carlina acaulis (S).  
Carline acule, Baromètre, Loque (F). Carline (E). Eberwurz (D). Carline, Carlo pinto (I).  
نوع من الكرلين المبدول. ساقه جذعة تملو من هـ إلى ١٢ سم. أوراقه كبيرة مستطيلة مقوسة، نصلها اخضر اللون، مائل البشرة على صفحته. رؤوساتها كبيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٣ سم. قناباتها قفصية. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين وهو ينكش عند وجود النعم وينبلج مع اشعة الشمس.

## ٢٣٥٣٦ - كَرَم ° Vignoble (F). Vineyard (E).

ومن اسمائه القردوس. كل ارض مفروسة كرمه.

## ٢٣٥٣٧ - كَرَم ° Cépage (F). Vine-plant (E).

الضرب المعروف الموصوف من الكرمة.

## ٢٣٥٣٨ - كَرَم زَيْتُون، بَسْتَان زَيْتُون، زَوَائِن Olive, Olivaraie, Olivieraie (F). Olive-plantation (E).

كل ارض غرس فيها الزيتون.



كرميوس النجيليات

## ٢٣٥٣٩ - كَرَمِيُوسُ الْمَرَاعِي °

Crambus pratensis (S). Crambe des prairies, Teigne des prairies (F). Crambus pratensis (E).  
حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رقيق الانهار وظلمها. سرقتها غاصلة تميش على اوراق النباتات المرصدة || جسمها صغير قمصيت يطول نحو ٨ سم. بسطها نحو ٢٤ سم. رأسها صغير الجرم. عينها زويتان ممتلئتان. زباناها خيطيان. ملاحسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الرمدة || روشنها الاماميان الى السمرة الكستنية يطلوها دركة ممتزعة صفراء وجدة مستطيلة بضاء. روشنها الخلفيان الى السمرة الكستنية السوية. اهدابها الى التني || الاثني اميز قدأ من الذكر واغلظ بطنأ منه وأطول مرشأ || لها جيل واحد في الحول. تظهر القراشة في ايار. تسرح في النهار ويبيت في الليل || الاثني تلقى المكن ميحادي على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || الطور



كرمة العنب

الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١١ م. جسمها اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اريد اللون يطلو تنقيط اخضر الس يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود. مذهبها ورواجبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في المجالاة او تحت قشور الاشجار الحربية القريبة من المراعي.

## ٢٣٥٤٠ - كَرَمِيُوسُ التَّجَلِيَّاتِ °

Crambus perillus (S). Crambe perle, Teigne des graminées (F). Crambus perillus (E).  
حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واسعة قوتها رقيق الانهار وظلمها. سرقتها غاصلة تميش على النجيليات البرية والزراعية || جسمها صغير يطول نحو ٩ سم. بسطها تراوح من ٢٨ إلى ٣٠ سم. رأسها معتدل الجرم. عينها زويتان، بارزتان. زباناها خيطيان. ملاحسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشنها وبطنها الى الرمدة القفصية المواج || روشنها الاماميان الى الرمدة القفصية يطلوها خفيف متداخل الاخضر والازرق. روشنها الخلفيان الى الرمدة السمراء المواج. اهدابها عاجية || الاثني اميز قدأ من الذكر واغلظ بطنأ منه وأطول مرشأ || لها جيل واحد في الحول. تظهر القراشة في مطلع حزيران ويبيت حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الاثني تلقى المكن ميحادي تغلفه مادة غروية تثبته على عصف النجيليات || الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرقة عند بلوغها الكال الجسوري تطول نحو ١٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، واضح التقسيم السكي، اغبر اللون يطلو تنقيط جزوي يمتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مذهبها ورواجبها الى الحطلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اروماتها.

## ٢٣٥٤١ - كَرْمَة Vitis (S). Vigne (F). Vine (E).

جنس نباتات معمرة عارشة من فصيلة الكرديات. انواعها عديدة، معظمها بري ويزيني وبعضها زراعي || اشهر انواعها واعها زراعة واكثرها غروبأ واجزلا نغماً الكرمة العنابية.

## ٢٣٥٤٢ - كَرْمَة الْعَبَب °، كَرْمَة عَنِيَّة

Vitis vinifera (S). Vigne commune, Vigne noble (F). Cultivated vine, Grape vine (E). Weinrebe (D). Vite (I).  
نوع من الكرمة ضرورها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ مجها زراعية مشرة. سوقها عارشة ليفية مخشوشة. جنورها حزنينة منسطة لا تضرب القور العميق. مرقعها سروح غيلة اسطوانية مستطيلة السلايات. اوراقها مقفزة متعاقبة عابلة تنمو على العقد. نصلها كني الشكل يكثر فيه التفصيص الخامسي وهو سنن الحافة، ازغب البشرة على صفحته او على الصفحة السفلى. حولها فارة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها عنقودي. عناقيدها تكون على عقد سلايات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صفيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كأس خامسي الفصل وتوتج خامسي البتلات المندمجة التي تبدو كالقلمعة فوق الاسدية والمدة. والاسدية خمس والمدة ذات مغلفين فروع يحضن كل منها بويضتان تصبحان بعد التاير والاصحاب

٢٣٥٤٨ - كُرْمِيس الزَيْتُون (F). Kermès de l'olivier  
هي قزمية الزيتون المخططة ، أطلبا .

٢٣٥٤٩ - كُرْمِيس السَّنْدِيَّان Kermès du chêne  
هي قزمية السنديان ، أطلبا .

٢٣٥٥٠ - كُرْمِيس الْوَرْد Kermès du rosier (F).  
هي قزمية الورد ، أطلبا .

٢٣٥٥١ - كُرْمِيسِيَّات Coccidés (F).  
فصيلة حشرات مشهورة باسم مغفريات ، أطلبا .

٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّ Vinicole, Viticole (F).  
Wine-growing (E).  
كل ما هو مختص بالكرومة من زراعة وصناعة .

٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات Ampelidaceae (S).  
Ampélidacées (F). Ampelidaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات سفلية  
الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الكرومة .

٢٣٥٥٤ - كُرْتَاب اصول الكرتب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف .  
الواحدة كرتافة . ج كرايف .

٢٣٥٥٥ - كُرْتَاب \* Brassica caulorapa (S).  
Chou-rave, Colrave (F). Hungarian turnip, Kohl-rabi (E). Knollenkohl, Knollkohl (D). Cavolo rapa (I).  
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه غليظة مستنيرة  
تنمو على سطح التربة || يجود في جميع الارربة الزراعية .  
يؤخذ في الاكودام وينقل الى مستقره حيث يغرس على  
ابعاد تراوح من ٤٠ الى ٥ سم . بين السطر والسطر . وهو ينزق ويك .  
قوته الغذائية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كمكلف  
البهايم اخصها البقر .

٢٣٥٥٦ - كُرْتَاب الْجَمَل Moricandie (F).  
هو الحلم ، اطلبا .

٢٣٥٥٧ - كُرْتَاب الْمَاء Nénuphar bleu (F).  
هو التيلوفر الازرق ، اطلبا .

٢٣٥٥٨ - كُرْتَاب بَحْرِي \* Crambe maritima (S). Crambe maritime, Crambé,  
Chou marin (F). Sea cabbage, Sea kale (E). Echter  
Meerkoohl, Seekohl (D). Crambe maritima, Cavolo  
marino (I).  
بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تثبت برية على الشواطئ  
البحرية وتزرع في بعض البلاد اخصها اكثرها حيث  
ياكلونها بكثرة . طعمها كالقنبيط .

٢٣٥٥٩ - كُرْتَاب عُلْبِي Rutabaga (F).  
Swedish turnip, Swede (E).  
نبات علقي يدعى رباغة ، اطلبا .

٢٣٥٦٠ - كُرْمِيَّات Pieridae (S). Piéridés (F).  
Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies (E).  
Weisslinge (D).  
فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
عديدة معظمها متوسط الحجم وبعضها كبير وصغير . انواها

زبور الثمرة . والثمرة عننية مختلفة الاشكال والاحجام  
والالوان مركبة من قشرة خارجية ولباب وزور . لبابها  
يؤلف من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيعود الى  
القشرة والزور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة .  
كثير المادة السكرية ، لذلك الطعم ، مستحب النكهة  
والعرف ، متوسط تركيبة .

ماء من ٧٥٠٠ الى ٨٠٠٠ ٪  
سكر قابل الاختار من ١٨٥٠٠ الى ٢٥٥٠٠ ٪  
حيوامض طليقة ترزيريه وتفاحية من ٠٢٣ الى ٠٤٥ ٪  
يترترات البوتاس من ٠٠٥ الى ٠٠٧ ٪  
مواد ازوتية وبمعدنية عطرية من ٠٠٢ الى ٠٠٣ ٪  
والكرومة ترطب في الاقاليم المعتدلة التي تؤمن لها الحرارة  
الكافية لادراك الثمار . هذا لا يعني انها لا تعيش في الاقاليم  
الباردة فهي تعيش وتتمثل الفر الشديد شرط ان تؤمن لها  
حرارة الصيف ما هي بحاجة اليه من السرعات اللازمة لادراك  
الثمار . وهي تفضل السفوح والمضارب والمواقع المنحدرة  
على البقاع المنبسطة او المنحدرة || وهي تجود في جميع الارربة  
يستثنى منها الربلية الصروف والكلسية البحت والطليعية  
المنحدرة || اما تكاثرها فقد يتم على اربعة اشكال : بالزور  
والتفصيل والتبريد والتطعيم || فالزور يستعمل عادة  
الحصول على اسرام ارقاء جديدة . اما التفصيل فهو الاشبع  
الطرق واسهلها واصلمها ، قوامه اصطفاء المغلة من زرعين  
بلغ الحول شرط ان لا تقل عقدا عن الاثنتين . اما التبريد  
فيتركز على لي وطر بعض سرور الجفنة الى ان تشرش  
تفصيل . يبقى التطعيم وهو اشر من ان يعرف وقد كثر  
استعماله في الاجنحان الأمريكيتين لا تحشى الفيلوكسره .

٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء Bryone blanche (F).  
هي الفانشار البيضاء ، اطلبا .

٢٣٥٤٤ - كُرْمَدَان ، مَشَّان Narthecium, Abama (S).  
نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه  
المعروفة اربعة . جذاميرها مدادة . اوراقها صفية الشكل  
مستعرضة النصل الجامد المخدج . شماريحها الزهرية متنبسة  
مستطيلة تعلوها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة .  
ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد سداسية  
البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جحالية فعالة  
شديدة التشط .

٢٣٥٤٥ - كُرْمَدَان مَتَقَبِيَّ ، حُثْنِي كَدَّاب Narthecium ossifragum (S). Nartécie des marais,  
Anthrécis des marais (F). Bastard asphodel, Bog  
asphodel (E). Echter Beinbrech, Beinbrechgras (D).  
Asphodillo bastardo (I).  
نوع من الكردان وهو نبات عشبي طبي معمر زرع  
الترين . يتكاثر بالقلع واليزور . اوراقه صفية متوسطة  
الاستطالة . نصلها جامد الصفحة غائر التخذيد . ازهاره  
صغيرة القد لونها الى الصفرة يدلوها موج اخضر . يستخرج  
من جميع اعضائه مادة جحالية فعالة يقال انها منشطة  
ومفيدة .

٢٣٥٤٦ - كُرْمِيس Kermès (F).  
هي القزمية ، اطلبا .

٢٣٥٤٧ - كُرْمِيس الثَفَاح Kermès virgule (F).  
هي قزمية التفاح ، اطلبا .



كرنب



كرنب بحري

## Cranchiidae (S). ٢٣٥٦٦ - كَرْتَشِيَّات \*

Cranchiidae (F). Cranchiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل مزدوجات الخيشوم. اجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد أعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برباطها العضلي الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الارتكاز، خاصة الأضلع. عيونها كبيرة جاحظة || أشهر اجناسها الكرنشة.

## Carnallite (F). ٢٣٥٦٧ - كَرْتَلِيَّت \*

Carnallite (E).

ملح معدني يستخرج من الأرض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم.

## Carnauba (F). ٢٣٥٦٨ - كَرْنُوبِيَّة \*

Carnauba palm (E).

كرنوبية هو الاسم البرازيلي. شجرة من التعليلات تدعى البتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل. راجع بتقوس.

## Calebasse (F). ٢٣٥٦٩ - كَرْتِيب \*

هو القرع الطويل، اطلبه.

## Chernetidae (S). ٢٣٥٧٠ - كَرْنِيسِيَّات \*

Chernetidae (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من العقربيات الكاذبة. اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد، معظمها من دويبات المناطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى بالمطوق الناطق ويشابها المستطيلة المسلسلة بملاطط طرفية قريبة الشبه بملاطط العقارب || تعيش في المواقع المظلمة وتحت قشور الأشجار وفي البيوت الخشبية اعشاشها الخشبية السفوف || جميعها من الدويبات النافعة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية.

## Numenius (S). ٢٣٥٧١ - كَرَوَان \*

Curlis (F). Curlis (E).

جنس طير من الكروانيات القرواط. الاثنى كروانة والجمع كراوين وكروان. انواعه ١٠ تتميز باستطالة ودفق منقارها وسيقانها. اجنحتها ذلقة. اذنانها مستديرة. ارساها جحيفية الجهة الامامية، سرديلة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ. والحيوانات والاشجار. قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة لتلتقطها عند جزر البحر || انماها تدن في افاحيص تنفذ قوتورها بالخشيش وهي تقم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها ٣ اسابيع. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

## ٢٣٥٧٢ - كَرَوَانُ أُرْمَد \*، كَرَوَانُ الْغَيْط \*

Numenius arquata (S). Courlis cendré, Grand courlis (F). Common curlew (E).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. ثوبه الى الريدة الزمادية المرقطة. يطنه الى البيضاء. عيانه، عسلتيان، منقاره اسمر. ساقاه الى الرصاصي. يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يحومها مرتان في السنة.

## ٢٣٥٧٣ - كَرَوَانُ إفْرِيقِي \*

Numenius tenuirostris (S). Courlis à bec grêle (F).

نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية اللونان يملعوا تجذيع وبقيق || يرقاتها شبه ملساء. رباط خادرتها يحزم اوساطها ويمنعها من التذلي.

## ٢٣٥٦١ - كَرْتَشِيَّةُ الزُّعُرُور \*، قَرَاشَةُ الزُّعُرُور

Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gazé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D). حشرة من الكرتشيئات وسيدة الجبل الحولي. بسطها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البيضاء العاجي، عرقها سود. رقبها سمراء اللون، غيراه المدب، تعيش على اوراق الزعرور وسائر الاشجار المشرية. بيئاتها الشتوي تقفصيه داخل الاوراق التي تفتلها وتجمعها الى بعضها بجيوب من الحرير حطلي اللون.

## ٢٣٥٦٢ - كَرْتَشِيَّةُ الْكُرْتَب \*

Pteris rapae (S). Piéride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرتشيئات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م. ذكورها يفس الراش، سمر الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. انماها عادمة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. لها في الحول من جيلين الى ثلاثة. رقبها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اعشاشها الكرتب.

## ٢٣٥٦٣ - كَرْتَشِيَّةُ الْفَلْت \*، قَرَاشَةُ الْفَلْت

Pteris napi (S). Piéride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرتشيئات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ م. رواشها الى البيضاء الاغبر يملعوا موج اغبر. ذكورها سمر الزوايا الامامية. انماها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || رقبها خضراء اللون تركب الفلت وسائر الصليبيات. اذاها يستمر من حزيران الى ايلول.

## ٢٣٥٦٤ - كَرْتَشِيَّةُ الْمَلْفُوف \*، دُوْدَةُ الْكُرْتَب، قَرَاشَةُ الْمَلْفُوف

Pteris brassicae (S). Piéride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرتشيئات بسطها، تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. رواشها الى البيضاء الاغبر، زواياها الامامية سودالاطراف. انماها ثلاثية البقع السود || من جيلان في الحول تمتع مكها على الصفعة السفلى من التصل. مكها غمروبي الشكل، اصفر اللون، رزني التجميع، رزته تد من ٣٠ الى ٥٠ مكته || رقبها نهمه مؤذية تلهم اوراق الملفوف وسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا ترك منها سوى الضلوع والمروق. ثوبها الى الخضار الاكعب يملعوا تنميش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيراه اللون.

## ٢٣٥٦٥ - كَرْتَشِيَّة \*

Cranchia (S). Cranchie (F). Cranchia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الكرتشيئات. انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة. اعطائها بحار البلاد الحارة. ملجنها الحياتي جماعي. اسراها وافرة العدد. جميعها يمية لا تقرب الشطوط. مسرحها جدوي || اجسامها اسطوانية الشكل، صغيرة القد. زعانفها صغيرة، خاصة الاضلع، شرجية الارتكاز. ملاسها مندفعة بحجة الاطراف.



كرنيزية الزعرور



كرنيزية الكرتب



كرنيزية الفلت



كرنيزية الملفوف



كروان ارمد



كروان افريقي



٢٣٥٨٢ - كروان مدسي Gobie sanglant (F). هو القويون المدسي، سمكة بحرية، اطلبه.



كروان الهليون

٢٣٥٨٤ - كروان أمونياك، كروان الأمونياك، حريف الشكادر

Crud ammoniac, Crude ammoniac (F). سماد كبري آزوتي يستعمل كحاشور وعشاب. وهو من عوائل صناعة غاز الانارة يحوي من ٢ الى ١٠ ٪. الازوت البطيء الانفعال والنترجة الذي يستعمل لتحويله في التربة من ٤ الى ٥ شهور || اما خواصه الدوائية ان على الحشرات والديدان او على الاعشاب فسرعة المفعول الجيد النتاج. وهو يستعمل في هذا السيليل بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو للدم الواحد.

٢٣٥٨٥ - كروان البصل \*

Lilloceris meridgera, Lilloceris brunnea (S). Cricocère de l'oignon (F). Onion-beetle (E). حشرة خاضعة مؤذية من النضاريات ورتبة مفسدان الانجحة. تألف البراري والمزارع وحقول البصل. غنائها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكراث والروم البري وزيتق الوادي || جسمها صغير القديط من ٦ الى ٧ م. ثوبها العلوي الى الحمرة القرمزية الصائبة الملاج. ثوبها السفلي الى السرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عينها صغيرتان. زباناها غطيان. ظهورها مستدير الطرف الاصح. غداها متشابها التحيز القاطب || لها جيلان في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اوائل نيسان. تسرح في النهار. تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتد الممكن على نصال الارراق || البرقة عند ادراكها الكال المجسوري تطلون نحو ٨ م. ثوبها الى الخنطي الاصفر الملاج. رأسها ورواجها سود.



كروان البصل



كروان الزورع

٢٣٥٨٦ - كروان الزورع \*، أوليسا الزورع \* Ulema melanopus (S). Cricocère des céréales (F). Cereal leaf beetle (E). Rothsaliges Getreidehähnchen (D).

خنافس من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغداها الى الزرقه اللاصقة. كوسلها الى الحمرة. تركب مع برقاتها عصف التجليات فتؤذي وتسي. الى النباتات.

٢٣٥٨٧ - كروان الزنابق \*

Crioceris lili, Lilloceris lili (S). Cricocère du lis (F). Lily beetle (E). Lilienhähnchen (D). خنافس من النضاريات طويلا يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقولانها سود. كوسلها وشارها حر. مكبا ناري اللون وشعي الشكل تمتد الاثني على اوراق الزنابق فيفتق عن برقات تقطع الارواق وتقرضها.



كروان الزنابق

٢٣٥٨٨ - كروان الهليون \*

Crioceris asparagi (S). Cricocère de l'asperge (F). Asparagus beetle (E). Spargelhähnchen (D). خنافس من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها اسود اللون، ازرق الملاج. كوسلها الى الحمرة يعلو توشيع اسفع. غداها الى الزرقه المابقة عبقها اطار اصهب ويتخللها تبيج نصفي متقابل لونه الى الصغار الاغبر الخنطي || يركب المليون ويؤذي.



كروان الهليون

١٠٠ م. متقار دقيق نحيل. ثوبه الى الوردية الغبراء المرقطة. بطنه واثنيكه وشتر جناحه الداخلي الى البياض. مشتاه الرقيقة الاستوائية. مصيفه يمتد من مراکش الى الصعيد وقد شوهد مراراً في صقلية.

٢٣٥٧٤ - كروان الجبل Edicnème (F). Stone curlew (E).

هو البرهني، طائر من دجاجيات الارض، اطلبه.

٢٣٥٧٥ - كروان الهندنسن

Numenius hudsonicus (S). Courlis du Hudson (F). نوع من الكروان متوسط الجثة. طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١١٠ م. ثوبه الى الوردية المرقطة بالابيض والاسود. بطنه تبي اللون وصدره واثنيكه كذلك || يحبب امريكية الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق الهندنسن اخصها الخليج.

٢٣٥٧٦ - كروانيات Numenius (F).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرقيق الاهيف. مناقيرها مستطيلة، حلالية التفويص، مخدة الجرم. سيقانها دقيقة. اراسها سرديّة، اصابعها رباعية || أشهر اجناسها الكروان.

٢٣٥٧٧ - كروان جنس نباتات حرجية ودية من فصيلة البتويجات. انواعه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنابات والاعشاب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية || اوراقها كاملة متعاقبة، معققة، رمحية. ازهارها حنقودي تاجي. ازهارها وحيدة المسكن. ثمارها جراه كروية او بيضية الشكل، يزورها نفعية منها هدنية طيبة ومنها صناعية. قشور بعض انواعها طيبة || اشهرها ما يتبع.

٢٣٥٧٨ - كروان الزيت \*، حب السلاطين، خروان صيني

Croton tiglium (S). Croton cathartique (F). Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium (E). Purgierkroton, Tiglibaum (D). Croton, Tiglio drastico (I). نوع من الكروان، منته المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. يستخرج من بزوره مادة زيتية خواصها خواص زيت الخروع وتستعمل استعماله.

٢٣٥٧٩ - كروان عنبيري، قشر عنبيري

Croton eluteria, Cascarilla elutia (S). Cascarille, Croton eleuthérie (F). Cascarilla-bark tree, Seaside balsam (E). Kaskarillenstrauch (D). Cascariglia, China aromatica (I). نوع من الكروان، منته البلاد الامريكية، يستخرج من طائحه مادة عنصرية مرة زكية العرف العنبري المستحب، تستعمل ضد الحيات.

٢٣٥٨٠ - كروان

Gobie (F). جنس اسماك بحرية مشهورة باسم قوبيون، اطلبه.

٢٣٥٨١ - كروان اسود

Gobie noir (F). هو القويون الاسود، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٢ - كروان اغبر

Gobie nébuleux (F). هو القويون المشب، سمكة بحرية، اطلبه.

Sphérique (F).

Spherical (E).

ما كان شكله كالكرة او ما كان له صلة بالكرة .

Carvli

٢٣٦٠٢ - كُروِيّاء

هي الكراويا ، اطلبها .

Micrococceae (S).

٢٣٦٠٣ - كُروِيّات

Micrococccées (F). Micrococceae (E).

فصلة من البكتيريا . اجناسها وانواعها التي هم الزراعة قليلة العدد تتميز باحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || اعرف انواعها المضرة ما يتبع .

٢٣٦٠٤ - كُروِيّة البُرّ \*

Micrococcus tritici (S). Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).

مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوباء والاضرار على برّ الحنطة فيقبحه ويغندده ويمطيه ويشبهه بالخضاب الوردي اللون .

٢٣٦٠٥ - كُروِيّة إمبراطوريّة

Micrococcus imperatoris (S). Microcoque impérial (F).

مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوباء على درنات البطاطا المخروسة والمحفوفة في اماكن رطبة عادمة البهوية لانه يهرسها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٦ - كُروِيّة بيضاء

Micrococcus albidus (S). Microcoque blanc (F).

مرض بكتيري من الكرويات يعمرى البطاطا والفلقاس والبصل فيعفنهما ويهرسها .

٢٣٦٠٧ - كُروِيّة ذهبيّة

Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).

مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمرض على عدة المحدثات المحفوفة فيفسدها ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٨ - كُروِيّة قِصْرِيّة

Micrococcus pellucidus (S). Microcoque pellucide (F).

مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه يمرض على عدة نباتات بصلية وبوصية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدرري .

٢٣٦٠٩ - كُروِيّة بَنَكُورِيّة \*

Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).

مرض بكتيري من الكرويات ، نحازه شديد الوباء على سوق البطاطا حيث يعمم بعض اقسامها فيسبب اسودادها وتلفها . وقد يصيب الدرر فيبدو كبقع سود تحورها حالات سمر تجفف القشرة وتصلبها وتشفقها ثم تهري القلب .

٢٣٦١٠ - كُريّ

Curage (F). Cleansing (E).

اخراج الرجل والحماً والاعشاب من القنوات والمخساري المائية

٢٣٦١١ - كُريّات

Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).

الوحدة كُريّة . والكريات مجموعة من الاجسام السائجة في الدم منها الحمر والبيض ثم الصفوية والمخاطية او الحيودة .

Crossing-over

٢٣٥٨٩ - كُروسيّن أوفر

هو الحاصل الناتج عن تشابك والتفاف النشب .

٢٣٥٩٠ - كُروْلَا اُرْجُونِيّ الصدر \*

Querula rubricollis (S). Plauhau de Cayenne (F).

طائر من الجوارثم سنيات المنقير وفصيلة القطنجيات . اعطاه بعض مناطق امريكا الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد الاسفع . زوره وصدره ارجونيا اللون عند الذكر || ملجته الحياتي جماعي الا في زمن التساقط والحضانه . يالف الغابات والحراج . قوة البذور والثار البائنة وبعض الحشرات اخصها النمل .

٢٣٥٩١ - كروم

معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النزي يراوح من ٦ الى ٨,٦ انصهر في ١٥٢٠ سغ || رمزه (كـ - Cr) ونقته الاتوبي ٥٢٠,١ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد الا في درجات الحرارة العالية . يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بسبب تخلفه . تحريره واستخلاصه من غلفه يستوجب صهره في افران خاصة تتحمل الحرارة العالية || اشهر مركباته الطبيعية كرومات الرصاص . اما اشهر مركباته الصناعية فهي كرومات البوتاسيوم وكرومات الصوديوم التي تستعمل في ديع الجلود وصباغها .

٢٣٥٩٢ - كروماتيد

هو من النشبة نصف شطرها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوّنة .

٢٣٥٩٣ - كُروماتيكِي، صِبغِي

Chromatique (F). Chromatic (E). نمت تعريفي توصف به الاعضاء الصبغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ - كُروماتِين، كرومِتين

Chromatine (F). Chromatin (E). مركب آسي - حامضي - فسفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجبهة الخليوية .

٢٣٥٩٥ - كُرومُوبلاست

Chromoplaste (F). Chromoplastid (E). مادة الأثلة الملونة .

٢٣٥٩٦ - كُروموزوم

Chromosome هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ - كُرومُولُوسِيت

Chromoleucite حبيبة الخشب في وُدّة الخلايا النباتية .

٢٣٥٩٨ - كُرومُومِير

Chromomère (F). اصفر جزئيات تشغل بالشكل والمركز في شعاع الببتون الكروماتيكِي .

٢٣٥٩٩ - كُروْنِيْلَة

Coronille (F). هو الامروس نبات من الفريتيان ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ - كُروِنُومِتر

Chronomètre (F). Chronometer (E). آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والضبط الفائق والتوقيف الحيازي .



كرولا ارجوني الصدر



كروية البر



كروية بَنَكُورِيّة

## ٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِيْ

Globules blancs, Leucocytes (F). Leucocytes (E).  
حجيرات حيوانية متحركة وظفيتها الرئيسية القضاء على  
الجُكروبيات السابحة في الدم || المليمتر المكعب من الدم  
يحتوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

## ٢٣٦١٣ - كُرْبَات حُمْر

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).  
حجيرات حيوانية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حمل  
الاكسيجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم وهي تعيش  
بضعة اسابيع ثم تنقسم وتفتت . نسبتها الى الكريات  
البيضاء نسبة ٥٠٠ الى ١ || المليمتر المكعب من الدم  
يحتوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات  
الحمر . اما لونها الاخر فيزوي الى المادة الملونة الحمراء  
المعروفة بالهيموغلوبين (Hémoglobine) .

## ٢٣٦١٤ - كُرْب

Rhizome de roseau (F).  
Rhizome of reed (E).  
الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي «صلطون» .

## ٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْسِيْسِيْس

Cryptosporium (S).  
جنس فطور مجهرية رمية من فصيلة الزيفيات . انواعه  
قليلة قليلة ولاضرار . تركيب لحم الاغصان والافئاد اليابسة .  
ونيمته مجنية او عسبة الشكل ، تنشا محضنة ثم ترقى .  
بويضاته شفاقة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

## ٢٣٦١٦ - كُرْبِيْتِرْك \*

Cryptorrhynchus (S).  
جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة السويات . انواعه  
المعروفة سبعة . اولها تراوح من ٦ الى ١٠ سم . اولها  
حنطية او سمره اللون تعلوها تراويق وزرا كاش سود . تعيش  
على الحوز والصفصاف والبيتولا . يرقاتها تسرب  
الاجنار الفتية والجنود المنطوقة اليابسة وقد تنخرها حتى  
اقتلاها .

## ٢٣٦١٧ - كُرْبِيْتِرْك الصَفْصَاف \*

Cryptorrhynchus lapathi (S). Cryptorrhynque  
des saules (F). Cryptorrhynchus lapathi (E).  
حشرة خاضعة غاشبة مؤذية من فصيلة السويات ورتبة  
ممنذات الاجنحة . تألف المواقف الرطبة والمنائع . خنافسها  
تعيش على اوراق البث والحميض . يرقاتها غاشبة تركيب  
الحوز والصفصاف والحوز تسرب الاجنار الفتية والجنود  
المنطوقة وقد تتخلجها حتى اقتلاها || جسمها صغير القد ،  
يطول نحو ٨ سم . ثوبها اسمر اللون تعلوه فصوص متراكبة  
وتتراويق وزرا كاش فيها الاسود والخطي والكشني والاصهب  
والاشقق الصنابي . رأسها صغير الحجم . عينها صغيرتان  
زباباها صوغانيان ، مرقطتان . ظهرها مذهب المخضر  
اللاصق . غمداه متشابته التحزيز الخفيف القاطب ||  
لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها  
الشتوي في اوائل نيسان ويبقى حتى اوائل الحول . تسرح  
في النهار تزد المكان ميحاديا في ثوب تتخلجه يمتكها في  
لحم الجلود || البرقة عند بلوغها الادراك التام تظل نحو  
١٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب ،  
الطرف ، حنطي اللون اسود الرأس والشرج .

## ٢٣٦١٨ - كُرْبِيْتِلِت

Cryptolite  
هو فسفات السيريوم الطبيعي ، يكثر وجوده في الايبيت  
الاخضر .

## ٢٣٦١٩ - كُرْبِيْتِرِيَا

Cryptomérite (F).  
شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي ، اطباها .

## ٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S).  
Coréopsis (F). Callopsis, Tickseed (E). Schöngesicht, Wauzenblume (D). Coreopsiside, Callopsis (I).  
جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ،  
منها البرية والزرينية . اوراقها لاقياضية الشكل والاركانز .  
ازهارها زردية ، ثمانية السينات الملمة . بزورها  
مستطيلة مبطلة متوجة بسنين او حسكتين او حرفشتين .  
اشهر انواعه الزرينية ما يليح .

## ٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس اَيْنِي \*

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coréopsis élégant (F).  
نوع من الكريبيس ضرورية عديدة ، اولهاها ، جميعها  
اشباب زرينية حولية تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها  
متقابلة مفرشة . فروصها قدية الشكل ، ثلاثية او خماسية او  
سباعية العدد . فصلها مائل البشره حايق الخضر .  
رويساتها الزهرية ملونة اللبالب والسينات ، قطرها نحو ٤ سم .  
ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

## ٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِي

Coreopsis maritima (S). Coréopsis côtière, C. maritime (F).  
نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية معمرة تملو نحو  
٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة  
قصيرة متشعبة . اوراقها متقابلة قدية التفريش الضيق .  
رويساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد صاحبة الشكل ،  
قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طول  
فصل الخريف .

## ٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهْر \*

Coreopsis grandiflora (S). Coréopsis à grandes fleurs (F).  
نوع من الكريبيس وهو عشبة زرينية معمرة تملو من ٣٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة مفرشة . فروصها قدية  
الشكل ثلاثية او خماسية العدد . فصلها مائل الصفحة العليا  
خلى السفلى . رويساتها الزهرية مكسبة قطرها نحو ٥ سم .  
طباها الى الصفرة ، لسيناتها رباعية التفصيص ذهبية اللون .  
ازهارها يستمر من ايار الى آب .

## ٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مَوْج \*

Coreopsis coronata (S). Coréopsis couronné (F).  
نوع من الكريبيس وهو عشبة زرينية حولية تملو من ٣٠  
الى ٥٠ سم . ساقها نخيلة مستقيمة . اوراقها متعاقبة كاملة ||  
فروصها القاعدة ، مقطوع القاعدة ، وحل الصفحة  
المائلة . رويساتها الزهرية صفر الغلاب . لسيناتها  
برتقالية اللون حنطية الخضر . قناباتها سنائية مهدبة .  
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

## ٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِي

Coreopsis stellata, C. major (S). Coréopsis étoilée (F).  
نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية معمرة تملو من ٦٠  
الى ٩٠ سم . ساقها وفروصها مزيفة اللحم . اوراقها ضمية  
الاركانز ، ثلاثية التفريش الضفي . فصلها خلى البشره .  
رويساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمة الشكل  
مستطيلة السينات الناشرة || ازهارها يستمر من تموز  
الى آب .



كُرْبِيْتِرْك



كُرْبِيْتِرْك الصَفْصَاف



كُرْبِيْسِيْس اَيْنِي



كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزَهْر

المتوازية. ازهارها خاسية او مداسية التركيب. ثمارها مختلفة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباني المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

### ٢٣٦٣٥ - كرزوفيلم إفريقي \*

*Chrysophyllum africanum* (S). *Chrysophylle africain* (F).

نوع من الكرزوفيلم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة بيضيه الشكل مقبوة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ عجات .

### ٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم كيميتو \*، كيميت \*

*Chrysophyllum caimito* (S). *Chrysophylle caïmite*, *Caimitier* (F). *Common star apple* (E). *Echter Sumpfelbaum* (D). *Crisifollo caimito* (I).

اشهر انواع الكرزوفيلم واعما زراعة. ضرهه الثلاثة حسة. اشجارها تملو من ١٥ الى ١٠ م. سوقها منتصبة، مثققة السماء. اغصانها فارشة. قشها فروع قلنسوية الشكل. اوراقها متناوبة اهليلجية. فصلها جامد السنج، اخضر الصفحة العليا، خلى السفل، مذهب الخمل، ازهارها صغيرة، اللد، بيضاء اللون، خماسية التركيب، مستطيلة الاذن. ثمارها كروية الشكل حجمها حجم التفاح. قشورها مألثة ملونة، لبانها جامد المادة متوسط العصارة السكرية اللزجة .

### ٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم مكوكو \*

*Chrysophyllum macoucou*, *Aubletia macoucou* (S). *Chrysophylle de Macoucou* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ١٠ اطار. ثماره مأكولة اجاسية الشكل واللذ، برتقالية اللون مداسية المعجات .

### ٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم وحيد العجمة \*

*Chrysophyllum monophyrenum*, *C. oliviforme* (S). *Chrysophylle monosperme* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي. ثمرته تملو نحو ٨ اطار. ثماره وحيدة العجمة بيضيه الشكل والحجم. لوها الى البفسجي المايق. لبانها لذيق الطعم عند الادراك التام .

### ٢٣٦٤٠ - كرزوكوم \*

*Chrysocome* (F).

هو ذنب القط، اطلبه .

### ٢٣٦٤١ - كرزوييكسه \*

*Chrysomyxa* (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرجايات يشتر بذانجه الوادية وبمسائله الشفافة الرقيقة. طوره الاديدي يتكون وينقيض على اهداب الصنوبريات حيث يلو كالحوصلات المرصوة بموازة الصلغ على جانبها || انواعه الاقتصادية المعروفة قليلة منها كرزوييكسه الاييسه وكرزوييكسه المعصل .

### ٢٣٦٦٦ - كرزوبسيس وزدي \*

*Coreopsis rosea* (S). *Coréopsis rose* (F).

نوع من الكريسيس وهو عشبة زينة معمرة تملو ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متناوبة لاطنة. فصلها مائل البشرة وحيد العرق يطلو من ٣ الى ٧ سم. ويعرض من ١ الى ٣ م. رؤوسها الزهرية صفر الطياب، بيض السنينات قتلها نحو ٢ م. ازهارها يستمر من تموز الى آب .

### ٢٣٦٦٧ - كريتة \*

*Butyrospermum parkii* (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشرة من فصيلة الطليحات . منتهيا البلاد الافريقية الاستوائية. تكثر في ساسب السودان وغينيا والشاطئ العاجي والدهوبي والفرنزا والكيمون وتشاد والابوني || ساقها غليظة منتصبة نخنة السماء الرطبة . اوراقها ضمية طرفية. فصلها سناني الشكل، مستطيل المنق، بارز العروق العديدة. ازهارها ضمية التجميع، طرفية الارتكاز، خنثوية. ثمارها برتقالية اللذ مأكولة الاباب تخض عجينتين لوزيتين لبها يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد الدهنية الجامدة المعروفة باسم الكريتة وهي تستخرج من اللوز بعد تحميمه ونفشه .

### ٢٣٦٦٨ - كيريرة \*

*Carriérée* (F).

هي النوار الصبي، شجرة زينة، اطلبه .

### ٢٣٦٦٩ - كيرير \*

*Conus* (S).

*Cône* (F). *Conus* (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاجل وفصيلة الكيريزيات، انواعه المعروفة نحو ٥٠٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداها غروية حلزونة قريبة الشبه باكرار الصنوبر. مرادها سننة. اسنانها نبال صغيرة ذرية لسها ذرابي مؤذ .

### ٢٣٦٣٠ - كيرنثم \*

*Chrysanthème* (F).

هو القوتحان، اطلبه .

### ٢٣٦٣١ - كيرنثم البر \*

*Chrysanthème à carène* (F).

هو قوتحان المروج، اطلبه .

### ٢٣٦٣٢ - كيرنثم مخصّل \*

*Chrysanthème des blés* (F).

هو القوتحان الذهبي، اطلبه .

### ٢٣٦٣٣ - كيرزوييكس \*، سيميريس \*

*Chrysorthrix* (S). *Saimiris* (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السوسيات. انواعه ٣ موطنها امريكة الوسطى اخصها البرازيل والنيوان وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صغيرة القد. رشيقة القوام. قوامها دقيقة متوسطة الطول. اذنانها مستطيلة نخلة. انواها متباينة الالوان الزاهية. شعورها ناعمة، لبدة وثيرة. تألف الاجراع والغابات. مرمها الاشجار دون الخفيض. قوتها البرام والادراق والحشرات والمصافير .

### ٢٣٦٣٤ - كيرزوفيلم \*

*Chrysophyllum* (S). *Chrysophylle* (F). *Star apple* (E). *Sernsappelbaum* (D). *Crisifollo* (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية مشرة من فصيلة الطليحات. انواعه عديدة. اصطانها البلاد الاستوائية. سوقها منتصبة. مصانها حلابية المادة. اوراقها اهليلجية مستطيلة. فصلها جامد الصفحة، كثير العروق النخيلة



كريتة (١)



كيريه (٢)  
(الثمرة والبذرة والزهر)



كيرز



كيرزوييكس



كيرزوفيلم كيتينو

## ٢٣٦٤٢ - كريزوميكس الأيسنة

*Chrysomya abietis* (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtennadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اهداب الايسنة فيذبلها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجى يقع منخفضة متناوبة متجانسة صفراء اللون تظهر في اواخر حزيران على ظهور ميازيب الاهداب ثم تتطور وترتفع وتصيب كل بقعة من البقع قاعدة لحوصليتين مستطيلتين لونها الى الصفرة الزاهية تقومان على جانبي نسيج الهدب || وهو يركب الايسنة في جميع المراتع اما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة.

## ٢٣٦٤٣ - كريزوميكس العفصل

*Chrysomyxa rhododendri*, *Uredo rhododendri*, *Acidium abietinum* (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على العفصل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجى يشور مستندرة او بيضيه الشكل تركب النصل على صفته السفلى يقابلها على البهفصة العليا يقع بنفس الحجم النسيج الى الجقوة ثم تنحرف الى الخنفي وترتفع بشرة النسيج وتغيرها وتسبب جفاف النصل وسقوط الورقة.

## ٢٣٦٤٤ - كزيميات

Conidæ (S). Conidés (F). Conidæ (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والبعض الآخر معاصر || اصداقها محلزنة اسطوانية الشكل او مخروطية. فروبها مستطيلة مفرسة الحمار. اسفلها قرنية المادة || اعرف اجناسها واشهرها الكزيم والزراعة.

## ٢٣٦٤٥ - كريزيل

Crésyl (F). Cresyl (E). سائل مظهر خزوني اللون يستخرج من قطران الفحم الحجري.

## ٢٣٦٤٦ - كزيمية الحما

*Astragalus peregrinus* (S).

نبات يدعى اسطرافالوس رحال، اطلبه.

## ٢٣٦٤٧ - كريفلون

Pomelo, Grape-fruit هو ليمون الجنة، اطلبه.

## ٢٣٦٤٨ - كريكة

*Carychium* (S). *Carychie* (F). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرغويات مميزات الارجل وفضيلة الحفصيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي الجوردية والطباشيرية. انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم. تعيش في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداقها شبه مردنية الشكل، محلزنة الصف الخلفي، مستدقة الاقصاب.

## ٢٣٦٤٩ - كريكة

جنس نباتات شجرية معمرة من فصيلة البياضيات. مهدا البلاد الحارة الاستوائية. سوقها اسطوانية منتصبة عريضة تحمل في زاهها الاخير ومنه قتا بعض الاوراق المزندة الكبيرة النصل وبعض الثمار الكبيرة اللد || ثمارها

ماكولة البلب نافمة تقيد المعدة وتتشط الحقم. اشهر انواعها ما يتبع.

## ٢٣٦٥٠ - كريكة الالند

*Carica candamarcensis* (S). نوع من الكريكة، مهدا جبال الالند الامريكية اخصها الوالمة قرب خط الاستواء. ثمرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها غليظة. اوراقها مستطيلة الزناد. نصلها سباعي التفصيص، متباعد التفريض، بحري اللون، ازرق المواج، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اهليلجية الشكل، خاسية الفلوع، ناعمة الصرة اللدية. قشورها عند نفضها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم. لبها رخو، المادة، عادم اللون. بولورها بيضيه الشكل، سمراء اللون، حريفية الطعم، لاذعة. قشورها ولها توكل طازجة ومطبوخة. تتكاثر بالبذر، ترب في الارربة الخفيفة المتوسطة الاندماج. تعيش على الساحل اللباني.

## ٢٣٦٥١ - كريكة بيبايا

هي البياض الزراعي، اطلبه.

## ٢٣٦٥٢ - كريكة بنتاغون، كريكة خماسية

التضلع *Carica pentagona* (S).

نوع من الكريكة البربرية الشائعة الزراعة. تجود وتثمر في معظم البلاد الحارة، لكنها تنحى الصقيع ولا تنحلل درجة الصفر اكثر من بضعة ايام. ساقها منتصبة نحلة عريضة تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها خماسية التفصيص، نصلها مالمس البشرة على صفحتي، زائداها ثلاثي التضلع. ثمارها مقطوعة القاعدة، مدببة الطرف، قطرها نحو ١٢ سم. وطولها يراوح الى ٢٥ من ٣٠ سم. لبها حامض المذاق، ابيض اللون، مستحب العرف. ترب وتؤكل مطبوخة ومصورة.

## ٢٣٦٥٣ - كريكة صفراء البتلات

*Carica chrysopetala* (S).

نوع من الكريكة، مهدا البلاد الامريكية الحارة. ساقها اسطوانية منتصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاصلع. نصلها خاسي التفصيص، متقارب التفريض، بحري اللون، مالمس البشرة. ثمارها اهليلجية الشكل، مقطوعة القاعدة، ناعمة الثقل، سباعية الفلوع تطول نحو ١٥ سم. لونها عند نفضها يراوح من الفسقي الى الاسفر المايق. لبها تافه الطعم مستحب العرف يؤكل مطبوخا.

## ٢٣٦٥٤ - كريكة متخاضية الزهرة،

## كريكة كزولوبا

*Carica cestriflora*, *Vasconcella cestriflora* (S).

نوع من الكريكة، مهدا كولومبيا وفرنطة الجديدة. ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار: اوراقها سباعية التفصيص خلية الصفحة السفلى، غليظة الزناد. ثمارها عطرة العرف، مستحبة المذاق، تؤكل مع السكر. لبها اصفر اللون، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبذر. ترب في الارربة الخفيفة العميقة الغور. تعيش وتثمر على الساحل اللباني.

## ٢٣٦٥٥ - كزيم

*Dicholopus* (S). *Cariama* (F). جنس طير من طرال الساق، اقوا المعروفة قليلة العدد تجمع بين التفلق والروو. اخلاقها اخلاق التعقب وهي قريبة الشبه منه. موطنها امريكا الجنوبية. اجسامها



كريكة

كريكة (١)  
(الورقة والزهرة)

كريكة (٢) (الشرة)

سفعه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ابطي الاينكاز ، صغير القد ، ينشق من طلمة متدلية . ثماره جوزية الشكل والقد . يستخرج من جاراته لباب كالسغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - **كُريوسوت**  
Créosote (F).  
Creasote, Creasotum, Creosote (E).

سائل مطهر كاو عديم اللون فواح الرائحة يستخرج من قطران خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الإنسان .

٢٣٦٦٤ - **كُريوفيلين**  
Caryophyllène (F).  
Caryophyllin (E).  
هيدركربور سائل يستخلص من عطر القرنفل والدارسيني والكليية . ثقله النسبي عند ١٥ °س = ٠,٩٠٨٥ ، ويغل عند ٢٦٠/٢٥٨ °س .

٢٣٦٦٥ - **كُريوكار**  
Caryocar  
جنس الشجر برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتربينية . سوقها منتصب ، رفيعة ، فروعها . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهنى الايوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استعمال السمن او الزبدة || اشهر انواعه الكريوكار السمني والحسني .

٢٣٦٦٦ - **كُريوكار حسني**  
Caryocar nucifère (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وتربينية منها امريكية الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقها فروعها . اوراقها متقابلة . اثمارها ارجوانية سوداء المواج يطرقها حمار احمر زاهي . اسيدها عديدة مستطيلة ذهبية اللون . ثمارها حسني اي جوزية مأكولة الصلآم .

٢٣٦٦٧ - **كُريوكار سمني**  
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شائعة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - **كُريوكاريات**  
Caryocaraceae (S).  
Caryocaracées (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منها مطع اصفاع امريكية الحارة والاستوائية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستنصبة القالب . اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الايوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار .

٢٣٦٦٩ - **كُريوليز**  
Caryolyse (F). Karyolysis (E).  
الكريوليز انحلال نواة الحجرية او الخلية .

٢٣٦٧٠ - **كُزَّاز ، كُزَّاز ، تَتَانُوس ، تَيْتَانُوس شوهار ، قَسَل**  
Tétanos (F). Tetanus (E).  
مرض خبيث خطر تقتضي منه العضلات وتشنج . سببه تسم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يدهي قصية تيكلولايت تدخل الجسم عن طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - **كُزْب**  
Nothoscordeon (S).  
Nothoscorde (F).  
جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

واعناقها مستطيلة ، رؤوسها كبيرة متوجة الجباه بكثرة من الزئبق المنتصب الدقيق . منايدها قوية مدببة الملاحظ المحدة الحادة . اجنسها مزيلة . سيقانها واراسها رفيعة . غالبها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٧٦ - **كُزْب مُتَوَجَّح \* ، لَقْلَقُ الاقاصي**  
Dicholopus cristatus (S). Carliama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه تملوها خطوط دقيقة متعرجة شبيهة اللون زاحية . ريش رأسه وصقعه الى الربعة السمر المراج . افيكه ابيض الاطراف . حذقة عينه كيرينية الصفار . زقده ازرق . منقاده ورسفاه حر || موطنه امريكية الجنوبية . يألف الحضاب الدفلة والمواقع الكثرة الحشب الرفيع . قوته الخمرات والنظار والافاعي وتختلف انواع القار والجرذان || يدين في الاشجار القليلة الارتفاع . عشه مزيج من القصبان والحشائش المنموه بالطين . اثناء تضع بيضتان تحضنها نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويعيش بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٧٧ - **كُزْمَة**  
Corémie (F).

٢٣٦٧٨ - **كُزْمَت ، كُزْمَتَس**  
Coryanthes (S).  
Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Helmbloome (D). Coriantio (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السحليات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتربينية . اصطلها المناطق الاستوائية اعضها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كرجة الرائحة .

٢٣٦٧٩ - **كُزْمَة**  
Oosphère (F). Oosphere (E).  
البويضة النباتية الانثوية الى ان تتحد بالذكورة فتصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٨٠ - **كُزْمَت \* ، نخلة الجوز**  
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منته يمتد من الهند الى الكونغو وجزر الزايج . انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوت المتقوية وكريوت مسقطر والشمشاع . جذوعها منتصب السوق المستعمرة الحيد . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سفعها ثنائي التركيب متقابل الخوص الاقاصي الشكل . كافورها مستطيل العنق صغير القد . ازهارها وحيدة المسكن في طلمة واحدة .

٢٣٦٨١ - **كُزْمَت سَقَطَر**  
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوت مهدد جزر الزايج . جذعه منتصب الساق يعلو من ١٢ الى ١٥ م . سفعه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، حاملة العلم ، حريفة . يزرع لاستخراج جواه ولاستعمال جذعه الصلب .

٢٣٦٨٢ - **كُزْمَت عَشْقُودِيَّة**  
Caryota sobollifera (S). Caryote sobollifère (F). Fish-tail palm, Sago palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma carlota (I).

نوع من نخل الكريوت . مهدد حضاب ويرتفعات ملقة ولبليزيه . جذعه منتصب الساق يعلو من ٨ الى ١٢ م .



كرم متوج



كريوت

## ٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة \* ، تكدة

*Coriandrum maculatum* (S). *Coriandre cultivée* (F). *Coriander* (E). *Echter Korlander* (D). *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).



كزبرة البير

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي حولي يزرع لأثمار الطبية والمستعملة كأفوايه . ساقه دقيقة فراء . أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفرصة ، خيطية للتفرع . أزهاره خفية التجميع ، صغيرة القد ، وردية اللون ، عاجية الملاج . ثماره من كرتبة الرائحة المسببة لثقل جفافها تصبغ بعد الجفاف ذكية الرائحة المسببة العرف .

## ٢٣٦٧٩ - كزمارك

Fruits du tamaris (F).

Fruits of the tamarisk (E).

هو شجر الطراف . يقال انه طيب نعيمه يقيد الصدر والامعاء .

## ٢٣٦٨٠ - كزوان ، فضبة

*Cisticola* (S).

*Cisticole* (F). *Fan-tailed-warbler* (E).

فصية هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الدخليات انواعه المعروفة ٢٠ اعطائها العالم القديم . جميعها صغيرة القد ، انثواها الى الطحلة السرماء . ظهورها واجنحتها مجمعة بالاسود . قوائمها بيض الاطراف او ربادية . نحوها يبيض . جواشها ونحوها الى الشفرة . مناقيرها وسيقاتها الى السرة || تألف المنافع والمراعي والحقول المزروعة . قوتها الحوام والذباب والاساربع الصغيرة . تدن في الادغال وفي الاعشاب التي تملو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم . عشها جراب يرمي الشكل . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها بأرواح من ٤ الى ٦ بيضات لها الى الياض الاخير تملو ماجة وردية او زرقاء اللون .



كزبرة البير الجبلية

## ٢٣٦٨١ - كزوان مبدول \* ، فسكة

*Cisticola schenckii* (S). *Cisticole ordinaire* (F).

فسكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزوان ، صغير القد ، طوله يراوح من ١٠ الى ١١ سم . ثوبه يختلف عن ثوب جلته بالتوشيم الاسود الذي يملو اواسط ريش الظهر فقط . اعطاه حوض البحر المتوسط . يألف المنافع وفضاف الاثمار والمراعي والحقول المزروعة اخضاها حقول القمح والذرة الصفراء || الانثى تحضن ثلاث مرات في العام الواحد . حضنتها اربع بيضات .



كزبرة مزروعة

## ٢٣٦٨٢ - كزود

Pupe (F). Pupa (E).

عدواه الحشرات من ذوات الجناحين وهي كالفسادة للحشريات والحورية للعدويات .

## ٢٣٦٨٣ - كزور

Casuar. (F).

هو الشيم ، من الرواكس ، اطلبه .

## ٢٣٦٨٤ - كزورينة بهشية

*Casuarina torulosa* (S). *Casuarine toruleuse*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . قشورها فليظة سلفة كقشور البش . غراسيها دقيقة . فسستها تجمع من ٣ الى ٥ بانثاق اسطوانية الهرم ، خلية البشرة . اكرازاها خلية الجراحت الناشئة || ترب ، كرفاقها ، في الاثربة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تنأدى من القر العابر .



كزوان مبدول

قليلة منبتها شطوط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صغير القد مستطيل . اوراقها قرصية الانتساب ؛ نصلها مستطيل الصفحة الغضبية المستوية . شراخها الزبري يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . يلتقي بصيوان من الزهر الابيض الموشح بالوردي || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

## ٢٣٦٧٢ - كزبرة ، كزبرة ، كسيرة

*Coriandrum* (S). *Coriandre* (F). *Coriander* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . انواعها ١٠ منبتها حوض البحر المتوسط . جميعها طيبة تستعمل في عدة تركيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع العطش والخفقان وتحبس البخار عن الرأس . ويقال ان قلبها مع الساق يفيد الزطاري . سورها دقيقة فراء . اوراقها مركبة متعاقبة ، ازهارها صغيرة القد ، خفية التجميع || اشهر انواعها الكزبرة المعروفة المزروعة .

## ٢٣٦٧٣ - كزبرة البير \* ، شعر الجن ، شعر

الفل ، شعر الأرض ، وصيف ، برشاوشان

*Adiantum capillus veneris* (S). *Adiante capillaire*, *Cheveux de Vénus*, *Capillaire* (F). *Maidenhair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E). *Capillärkraut*, *Frauenhaar*, *Yenushaar* (D). *Adianto*, *Capel-veneris*, *Capoveneris* (I).

نبات عشبي بري جذموري معمر من السراخس البسيجايات . يكثر في المواقع الرطبة الظليلة . يقال ان منافعها الطبيعية عديدة انما احقق منها هو انه مرقق وقايش . يباهد يقوي الشعر ويعطو || اوراقه تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . نازها اسود اللون ثنائي الانتساب وكل شعبة منه تحمل اربعة فروع لاجسية الطول ، مروحية الترتيب ، كلوبة الورقيات المتجمعة الاطراف .

## ٢٣٦٧٤ - كزبرة البير الجبلية \*

*Polytrichum commune* (S). *Polytrich commun*, *Capillaire doré* (F). *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E). *Echter Widerton* (D). *Politric* (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . ساقه اسطوانية دقيقة متعصبة . اوراقه هدية متراكبة جذعية الارتكاز . ثمرته جراب يبغي هالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصحية يستعمل استعمال الشاي لكنه بحث حل النوم .

## ٢٣٦٧٥ - كزبرة البير المكسيكية

*Adiantum tenerum* (S). *Capillaire du Mexique* (F). *Brittle maiden hair* (E). *Capillär Kraut* (D). *Capel-veneris de Mexico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طلي بري معمر ينبت في المواقع الرطبة في ظل الصخور والاشجار . يقال انه ينفع الاراض الصدريه وضيق النفس . يستعصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

## ٢٣٦٧٦ - كزبرة العطب

*Pimprenelle sanguisorbe* (F).

هي البلاون المحجام ، اطلبه .

## ٢٣٦٧٧ - كزبرة الحيشة

*Pigamon jaune* (F).

هي الطليب الاصفر ، اطلبه .

### ٢٣٦٨٥ - كُزُورِيَّةٌ كُنْبَايِيَّةٌ \*

Casuarina equisetifolia (S). Casuarine à feuilles de préle, Filao à feuilles de préle (F). Beef-wood tree, She-oak, Swamp-oak (E). Kasuarbaum (D). Casuarina (I).

نوع من الكزورينة ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ،  
بناتها دقيقة متدلية وباعية التضلع . غلف عقدها مألوه  
البشرة وباعية التسنين . منبها البلاد الحارة . تزرع لصد  
الرياح والسياح . ترغب في الأثرية الساحلية الرملية ويجود  
قرب الشواطئ البحرية .



كزورينة كنبائية

### ٢٣٦٨٦ - كُزُورِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ

Casuarina stricta (S). Casuarine dressée, Filao dressé (F).

نوع من الكزورينة . ساقها وأغصانها منتصبه تملو من  
٦ إلى ٩ أمتار . غراسيها غليظة ، ضمتها تجمع من ١٠  
إلى ١٢ بليقة . بناتها منتصبه متدلة . غلف عقدها  
معدية التسنين والتخديد || تألف المناطق الساحلية الرملية  
الدافئة .

### ٢٣٦٨٧ - كُزُورِيَّاتٌ

Casuarinaceae (S). Casuarinacées (F).

فصيلة نباتية وحيدة الجنس من ذوات الغلقتين . أنواعها  
نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الأوراق .  
ترغب في المواتع الرملية أخصها الشواطئ البحرية . غراسيها  
وبناتها أسطوانية الشكل والترتيب والانظام . أزهارها  
الذكورية قدي التجميع ، مستطيل الحجم ، أسطواني  
الشكل ، زهرته وحيدة السداة . أزهارها الانثوية قدي  
التجميع ، قصير الحجم ، كثيف الأزهار ، زهرته وحيدة  
المبيض والقلم القصير . ثنائية السمة الخيطية المستطيلة .  
ثمارها أكواز صغيرة ريفية الشكل .

### ٢٣٦٨٨ - كُزُورِيَّاتٌ

Xeromys (S). Xéromys (F).  
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعها  
قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي . أجسامها مستطيلة .  
طولها الكامل يراوح من ٤٠ إلى ٤٥ سم . رؤوسها ذلقة .  
أذنانها كبيرة . جرائرها قصيرة . أصابعها خاسية . أطرافها  
حادة || تألف الادغال والحقول . قوتها المواد النباتية  
على اختلاف مصادرها والحشرات والديدان .

### ٢٣٦٨٩ - كُسْتَالِيٌّ

Paraseux (F).

في الداليات ، أطليها .  
٢٣٦٩٠ - كُسْبٌ  
Tourteau (F). Cake, Oilcake (E).  
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور الدهنية كالقطن  
والسمسم واللفت السوداني والكتان الخ .. منظم يستعمل  
كغلف للبها . راجع جدول العلف .



كستنة مبدولة

### ٢٣٦٩١ - كُسْبَرَةٌ

في الكزبرة ، أطليها .

### ٢٣٦٩٢ - كُسْتَنَةٌ، كُسْتَنَةٌ، أَبُوقُرَّةٌ، قُسْطَلَةٌ

Châtaigne (F). Chestnut (E).

ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاهيلوط وهي مأكولة مغذية ،  
لبها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين « ث » ونحو ٩٠  
وحدة من الفيتامين « ب » ولعرقه عناصرها الغذائية راجع  
كستنة مبدولة .

### ٢٣٦٩٣ - كُسْتَنَةٌ

Castanea (S). Châtaigner (F).  
Chestnut-tree (E). Kastanie (D). Castagno (I).  
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السميليات .

أنواعها المعروفة ١٥ أقليمها البلاد المعتدلة الحارة . تنمیز  
بضخامتها سوقها واستطالة أعمارها التي تبلغ بصفة قرون .  
أغصانها داحجة . أوراقها عابلة ، متعاقبة ، معنقة ،  
بسيطة . نصلها نافرة العروق المتوازية ، منشارية الحافة .  
أزهارها وحيدة المسكن . أزهارها قدي التجميع ، شبارق  
مستطيلة منتصبه . كثيرة الأزهار الذكورية المتناهية ، قليلة  
الانثوية السفلية الارتكاز ، الفردية أو الثنائية أو الثلاثية  
التجميع التي تكثفها بعد التضلع والأصابع ولقطة كثيفة  
الشوك الدقيق تحضن الثمرة أو الجار || ثمارها مأكولة الباب  
التشوي المادة .

### ٢٣٦٩٤ - كُسْتَنَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ

Castanea dentata (S). Châtaigner d'Amérique (F).  
نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية البريوتية . مهدها  
أمريكة الشمالية . تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها غليظة .  
أوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٤ إلى ٦  
سم . نصلها منشاري الحافة ، الملمط الصفحة العليا ، الزغب  
الشغل على غصنها وعروقها || ثمارها صغيرة اللد مأكولة .

### ٢٣٦٩٥ - كُسْتَنَةٌ حُمْرَاءُ

Pavie (F).

هي القسطل الهندي ، أطليها .

### ٢٣٦٩٦ - كُسْتَنَةٌ صِيْنِيَّةٌ

Castanea duclouxii (S). Châtaigner de Ducloux, C. de Chine (F).  
نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية مهدها الصين . تملو  
من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها غليظة متوسطة الضخامة .  
أغصانها فاشرة ، أوراقها متباعدة التسنين المنشاري  
المهدب ؛ نصلها شمع الصفحة السفلى ، قليل العروق الغائرة ،  
الملمط البشرة على صفحتها || ثمارها صغيرة مبطة  
مأكولة .

### ٢٣٦٩٧ - كُسْتَنَةٌ مَبْدُولَةٌ \* ، قُسْطَلٌ ،

### قُسْطَلٌ ، شَاهِيلُوطٌ ، أَبُوقُرَّةٌ

Castanea vulgaris, C. sativa (S). Châtaigner commun, Marronnier (F). Sweet chestnut (E). Echte Kastanie, Kastanienbaum (D). Castagno domestico (I).

نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية المبدولة . ضرورها  
كثيرة المدد ، منبها الشرق الأوسط وأروبة الجنوبية والغربية .  
شجرتها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها ضخمة عظيمة .  
أغصانها غليظة قائمة . فروعها جاسلة ، قنتها فاشرة .  
أوراقها أليلحية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم .  
وتعرض من ٧ إلى ٩ سم . نصلها قلب القاعدة . ذرب الطرف .  
بارز العروق المتساوية الإبعاد ، لونه ال الخضر الاصفر .  
أغصانها صناعية تفوق السنديان صفاء وصلابة وطولاً .  
ثمارها مأكولة غذائية . قشورها كستنية اللون لامة الصفحة  
الخارجية خلية الداخلية لبها إلى البياض التني . تحليلها  
الكيميائي يفيد أن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المسلوقة  
بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المنهضة ،  
تتميز فيها :

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية

١,٧٢ ٪ مواد دهنية

٢٤,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٠ ٪

من الوحدات الغذائية ، تتميزها :

٣,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤٩,٦٦ ٪ مواد هيدروكربونية



وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩٪ من الوحدات الغذائية، تعريفها :  
٧,٥١٪ مواد زوتية  
٥,٦١٪ مواد دهنية  
٧,٥٨٧٪ مواد هيدروكربونية

Fraction كَسْر ٢٣٧٠٦  
كسر العدد . ج. كسور وكسورات .

Pampille كَسْمَة ٢٣٧٠٧  
الريش الابيض المجتمع تحت ذنب الطائر .

٢٣٧٠٨ - كَسْمَرَة الحِمَار هي الشامتج ، اطليه .

٢٣٧٠٩ - كَسْكَاك \*  
Quisqualis (S).  
Quisqualis (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisqualis (I).  
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الالهليجات .

انواعه اربعة اعطائها بعض المناطق الحارة الاسيوية والافريقية . جميعها شجيرات عارضة تطول من مترين الى عشرة امتار . اوراقها معتقة متقابلة اهليجية . ازهارها عنقودية التجميع طرقي الارتيكار . ازهارها جميلة الشكل مستطيلة الانابيب يكثر فيها الابيض والاحمر والوردي . يزورها طليعة طاردة للود .

Couscous (F). كَسْكُوس ٢٣٧١٠  
الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى كَسْتَشَجَر ، اطليه .

٢٣٧١١ - كَسْكُول \* ، كَسْكُول \*  
Cassculus (S), Cassicle (F). Cassculus (E).  
جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة عشرة

جميعها من طيور امريكا الوسطى والجنوبية . تألف الغابات ولا تقترب من الاماكن الاطلة . نظامها الحياتي جامعي . فوجها يعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً || اجسامها محشوة تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . مناقدها مخروطية ذرية . رؤوسها متوجة يقتنازع قنصل في الجاه وليس في قم الرؤوس . اجنحتها معتدل الطول . اذناها مستطيلة ، مستنيرة الاطراف . انواها تختلف مع الانواع إنما يكثر فيها الاسود الخلف الاماجات || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها والثار والحبوب || اعرف انواعه واشهرها كسكول المكسيك .

٢٣٧١٢ - كَسْكُول المكسيك \*  
Cassculus melanicterus (S).  
Cassicule du Mexique (F).

نوع من الكسكول . يكثر بجموده في المكسيك . يألف الغابات . ملجئه الحياتي جامعي . فوجه يعد من ٢٠ الى ٣٠ زوجاً || جسمه ابيض الشكل يطول نحو ٤٥ سم . ثوبه الى السواد اللامع يعلوه موج اخضر . تنزعتة جوية اللون . هامش جناحه الى الغيرة . متفاده الى السمرة الزيتية . قائمته ونحاله الى السمرة القائمة || قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثار والحبوب والبقور || يدفن عشه في الاشجار الكبيرة الدائمة لان الفوج يكامله يدفن في ذات الشجرة . الاثنى تحضن وسعدا من يبيضتن الى ثلاث بيضات بيضا الذكري يؤثن الى الفداء .

٢٣٧١٣ - كَسْكِر \*  
Excaecaria (S).  
Excécaire, Excécaille (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة

اقليلها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة . وهي ترقب في الارربة الخفيفة العميقة الغور المشبعة بالعصر الربلي . وقد تنمو وتضرب في الارربة الطينية المتوسطة الاندماج لكنها لا تنمر كثيراً فيها . وهي تخشى الارربة الكلسية لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تنكأثر باليد وقد تزور البذور اما في مستقروا مباشرة او في الشتل ان ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم . وقد يكون ذلك بعد البذر بستين فتفتل اذ ذلك الى مستقروا .

٢٣٦٩٨ - كَسْتَنَّة هِنْدِيَّة  
الكستنة الهندية وابو قرقه الحصان وتسلل القرس ، ثلاثة اسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، اطليه .

٢٣٦٩٩ - كَسْتَنَّة يَابَانِيَّة  
Castanea crenata (S).  
Châtaignier du Japon (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية . مهدا اليابان . تملو من ١٠ الى ١٥ م . ساقها غليظة متوسطة الفصاحة . اضعائها قائمة . اوراقها صغيرة القد ؛ نصلها مرتفع الجانب كثير العروق الناشئة الاطراف ، لونه الى الخضرة الصفراء تلوها لمة صفراء || ثمارها متوسطة القد مأكولة .

٢٣٧٠٠ - كَسْتُونَة \*  
Xestobium (S).  
Xestobie, Vrillette (F).  
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . انواعه قليلة العدد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلبه . اعرفها واعماها كستونة الخشب .

٢٣٧٠١ - كَسْتُونَة الخَشَب \* ، غِفْرِيَّة الخَشَب

Xestobium rufovillosum, X. tessellatum (S).  
Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E).  
Buntwürfeller Nagekäfer (D).

نوع من الكستونه طولا براوح من ٦ الى ٩ م . ثوبها حنطلي . نمشة كوسلها وتظهرها صهبا اللون || رقاتها مؤذية تنخر منظر انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في الطبيعة او ضمن المنازل والحانجر .

٢٣٧٠٢ - كَسْتُور  
Castor (F).  
هو الحارود ، اطليه .

٢٣٧٠٣ - كَسْتُورَة  
Porte-musc (F).  
هي أيل المسك ، اطليه .

٢٣٧٠٤ - كَسْج \*  
Ravalement (F). Trimming (E).  
قيل فروع الشجرة بقية تجديده شياها .

٢٣٧٠٥ - كَسْدُولَة \*  
Cassidula (S).  
Cassidule (F). Cassidula (E).

جنس حيوانات من الرخويات معديات الاجرل وفصيلة الحفصيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد اعطائها الهند وبعضها فارتب يعيش في المناطق التي تنكأثر فيها احراج الشورى ، وبعضها بحري يعيش في رمال



كستونة الخشب



كسكول



كسكول



كسكول المكسيك

الزيتية الطبية النافعة. وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متتابعة الارتكاز، تبينة اللون. ازهارها هامة، سفلية التجميع، قصيرة السبلية، يبيضه اللون او وردية || جميع انواعها طفيلية، وعوائلها جذور الصنوبر والسرو والمولق والسنديان.

**٢٣٧٢٢ - كسيدييات**  
**Monotropaceae (S).**  
**Monotropacées (F).** **Monotropaceae (E).**  
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القلمات. اجناسها ٤ وانواعها ٢٠ منها البلاد المتعددة المنشرة نحو الحارة. معظمها طفيلي يعيش على جذور الصنوبريات والسوليات. جميعها عشية. سوقها فردية الالتساب عادية الفروع. وريقاتها حشوية النصل. ازهارها سفلية هامة.

**٢٣٧٢٣ - كسوف**  
**Eclipse**  
 ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الارض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الارض وقوس الشمس. ولا يحدث الكسوف الا اذا كان القمر في المحاق وقد يكون كلياً او جزئياً. فالكل يكون عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس.

**٢٣٧٢٤ - كسيية ٥ ، بُلْدُر ٥**  
**Polder (F)**  
**Polder (E).**  
 اسم يطلق على الاراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية الى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها للجواجز وعزلها عن مساوي مياه البحر.

**٢٣٧٢٥ - كسيدي اخضر ٥ ، كسيدي الحُرْشُف ٥**  
**Cassida deflorata, C. viridis (S).** **Casside de l'artichaut, C. verte (F).** **Tortoise beetle (E).** **Artischokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**  
 حشرة صغيرة القد من فصيلة النشاريات. جسمها يضيء الشكل مقلط. طولها يراوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها اخضر اللون اسفح المزاج. مدنها اسود. لها جيلان في الحول. ريقاتها مستطيلة القرون الشرجية المنمكة على الظهر. تركيب هي وريقاتها اوراق الارضي شوكي وجميع انواع الحُرشف تنقعط البشرة وتميش على خلايا النسيج.

**٢٣٧٢٦ - كسيدي الشوْندَر ٥**  
**Cassida nebulosa (S).** **Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).** **Clouded tortoise beetle (E).** **Nebliger schildkäfer (D).**  
 حشرة صغيرة مبظطة من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٥ الى ٧ سم. ثوبها الى الصفرة الخطية الباهتة. غمداتها متقاطن بالاسمر والاسود. لها جيلان في الحول وهي تركيب مع ريقاتها اوراق الشوْندر فتتخرها وتميش عليها.

**٢٣٧٢٧ - كسيدي نيل ٥ ، كسيدي السروقييات**  
**Cassida nobilis (S).** **Casside noble, C. des salsolacées (F).** **Cassida nobilis (E).**

نوع من الكسيد، حشرة خاضلة مؤذية. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروية وافريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السروقيات. خنافسها وريقاتها تميش على نصال الاوراق || جسمها صغير القد، يضيء الشوزن، عموذوب الصفحة العليا، يطول من ٦ الى ٨ سم. ثوبها العلوي الى الخضار الاصفر يملوه في منطقة درز الظهران

الفربيويات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سوقها ماسة بحرية اللون. اوراقها متعاقبة معنقة. نصالها يرمية الشوزن. ازهارها سنبلية التجميع || يستخرج من لحائها بالخر عصاره لبنية تختلف تركيبها ومفعولها مع اختلاف الانواع. منها تهيج البشرة وتؤذي العين ان اسبابها ومنها طيبة تنقي الدم والاعلاط ومنها المفادة لداء السلسل ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة دعنية يبيضه اللون شائعة الاستعمال المنزلي || اشهر انواعها الخمسة التالية :

**\*Ex. sebifera (S).** **كسيدي الدهن**  
**Ex. sylvatica (S).** **كسيدي حرجي**  
**Ex. spinosa (S).** **كسيدي شالك**  
**Ex. hibernica (S).** **كسيدي فتوي**  
**Ex. agallocha (S).** **كسيدي يغشي البصر**

**٢٣٧٢٤ - كستلن**  
**Bradype, Ai, Paresseux (F).**  
 هو الداب، اطلبه.

**٢٣٧٢٥ - كسم**  
**Habitus (F).**  
 هو الامدود والطلالة، اطلبه.

**٢٣٧٢٦ - كُسمُولُوجِيَّة ٥**  
**Cosmologie (F).**  
**Cosmology (E).**  
 الكسولوجية علم فوايس العالم عامة اي فلسفة معقولات العالم المجردة.

**٢٣٧٢٧ - كستثويزا \* ، صفراء العروق**  
**Xanthorrhiza (F).**  
 جنس جنبات برية ويزينية من فصيلة الشقيقيات. انواعها قليلة. سوقها فراء تملو من ٧٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها زنادية، متعاقبة، مركبة، ثلاثية او خاسية الورقيات المفردة الصفراء العروق. ازهارها عقدوية التجميع، ابطية الارتكاز، صغيرة القد، تبينة اللون، خاسية البتلات الصغيرة السنائية الشكل || ازهارها يستمر طول فصل الصيف.

**٢٣٧٢٨ - كستثوسيرا \* ، صفراء القرون**  
**Xanthoceras (S).** **Xanthocère (F).**  
 جنس اشجار وشجيرات برية ويزينية من فصيلة السبنديات. مهدها الصين، تتميز بازدهة قرنية الشكل مغنرية الرحيق تتوسط بتلات الزهر. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها تملو من ٢ الى ٨ امتار. اوراقها عابلة متعاقبة وزية التركيب. ازهارها عقدوية التجميع. ازهارها متراكبة الاالوان، كبيرة القد، نظامية، خاسية الفصل والبتلات، ثمانية الاليدية. ثمارها تفاحية الشكل والقدر غير مأكولة.

**٢٣٧٢٩ - كستنج**  
 جنس من الكماء ينبت في الرمال لذية جداً (السان).

**٢٣٧٣٠ - كُسو هو الشارا، اطلبه.**  
**Cousso**

**٢٣٧٣١ - كُسوب \***  
**Monotropia (S).** **Monotrope (F).** **\*Ice plant, Indian pipe (E).** **Fichtenspargel, Monotrope (D).** **Monotropia, Erba da cera (I).**  
 جنس نباتات عشية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات. منها بلاد المندلة الحارة. انواعها نحو ٨ سوقها فردية ليفية. لها دماغ، عصارته عادية اللون تجفح بعض المواد



أنواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الحراج والبراري. ملجئها الحياتي جماعي. فوجها يد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها متوسطة الحجم، قريبة الشبه بالصدر وبالزناج. مناقبها كبيرة ضلعية. اثنائها الى السمرة القاتمة يتخللها بقع ابيض || قنبا الحشرات والزروع والمطاه والفئران والمصاير الصغيرة. طباعها شرسة كالصرد. تتميز بالجسارة والشراسة ومن عادتها انها تسفد قنصها في اثنائها لاجبار تصد اليها حيناً يطلب لها اعرف انواعه واشهرها الكسيكان الغرب.



كُشِك قنبراني

### ٢٣٧٢٢ - كُسيكان مُعَرَّب \* Cracticus torquatus (S), Cassican destructeur (F).

نوع من الكسيكان. موطنه شمالي استرالية. فوجها يد نحو عشرة ازواج. يألف الادغال والحراج المبعثرة الاشجار. يعتبر اشرس انواع الكسيكان وانهماء || جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم. رأسه مستقيم الشكل. منقاده كبير وضلع. ذنبه متوسط الطول، مقطوم الطرف، مستدير الزوايا. فوقه ابيض اللون، رأسه وظهوره وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي. عنقه وصدره واثنيكه الى البياض الاخير. قوائمه الى السمرة القاتمة || يدفن عنه في الاجبار الرقيقة. الاثنى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بينا الذكر يئن لها الغذاء.

٢٣٧٢٣ - كسيلوز  
Xyloste (F). هو الخشبوز، اعطيه.

### ٢٣٧٢٤ - كُسيوية \* Cassiope (S), Cassiopelia (E).

نبات معقود التعريف على اسم الملكة لغرافية كسيوية. جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة النخلتجيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت البلاد الحارة || سوقها قصيرة فراء تملو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقها ابيدة، صغيرة، سنانية التصال الجامدة الخلفية البشرة. ازهارها فردية، متدلية، جلبةية الشكل، بياض اللون او وردية || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز.

### ٢٣٧٢٥ - كُسيوة \* Vestiture (F).

الكسيوة مجموعة الاعضاء الثانوية كالزغب والشوك والمناسخ التي تلحف قشور النبات او جلود الحيوانات وذيلها.

### ٢٣٧٢٦ - كُش \* Androcée (F).

هو جهاز التذكير في النبات، راجع جش.

### ٢٣٧٢٧ - كُشاة \* Défaut apparent (F). Visible défaut (E).

هو العيب الظاهر.

### ٢٣٧٢٨ - كُشاح \* Empreinte du fer rouge (F).

سمة بالنار في موضع الكشع وقد تطلق على كل سمة بالنار في اي موضع كان من الجسم.

### ٢٣٧٢٩ - كُشت \* Pueraria (S), Puérarie (F), Pueraria (E), Knollengrische (D), Pueraria (I).

جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعها ١٠ مهدها الشرق الأقصى من الهند الى اليابان. جذورها غليظة درنية. سوقها تملو من متر الى ١٠ امتار. اوراقها عابلة، مركبة، ثلاثية الوريقات الكبيرة.

جدة قاطبة لؤلؤة اللون تنشأها ماجة ذبية. ثوبها السفلي ومدها الى السمرة || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تباشر الاثنى مع الملكن بعد ظهورها باسبوع. وينتفج الملكن بعد متحه بنحو عشرة ايام || البرقة عند بلوغها التكامل الجسوري تطلق نحو ١٠ م. ثوبها الى الخضار الاصفر تملو بقجة بياض في مقدم الصدر. رأسها مكور الشكل. اسود. سكتها الشرجية تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان علويتان متمكنتان على الظهر واحدة سفلية جاسمة. سرهما علوي الفتحة يلتقي البراز على الزوائد || طور الاكثار يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً وينتفضي لاصفاً ينصل النبات العائل بعد ان تملق فيه البرقة بزائدتها السفلية.

### ٢٣٧٢٨ - كُسيعة \* Pelote (F), Pad (E).

تضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات. وتضخم في الزوائد الخلفية عنه بعض الحشرات.

### ٢٣٧٢٩ - كُسيك \* Cassicus (S), Cassique (F), Cassicus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبيجات. انواعه المعروفة ٢٣ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى. تألف الغابات وبعضها يقترب من الحدائق. نظامها الحياتي جماعي. اسراجها متفاوتة العدد منها الانواع التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج وبها الارباب الوفرة العدد || اجسامها بين المتوسطة والكبيرة. اطالها قراوح من ٢٦ الى ٤٠ سم. مناقبها مخروطية الشكل، مستعرجة القواعد، حادة الاطراف. رؤوسها متوجة بقنازع مختلفة الاحجام. اجنتها معتدلة الطول. اذنانها مستطيلة، مستديرة الاطراف. اثوابها مختلفة الالوان، يكثر فيها الاسود. اثنائها اصفر قدماً من ذكورها || قنبا الثار والحبوب والذبور والحشرات المختلفة الانواع والجناس || اعرف انواعه واشهرها الكسيك القنبراني.

### ٢٣٧٣٠ - كُسيك قُنبراني \* Cassicus cristatus (S), Cassique huppé (F).

نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والفويان حيث يدعى «هايو». يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجائان والحقول. سره يراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ زوج || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. قنزته كبيرة تمتد الى منتصف الالفن. ثوبه الى السواد الاسم الاسفع. اثنيكه وذنبه الى الجوزة. رفال ذنبه الجانبية صفراء اللون اما الفزائل فالى السواد الاسم الاسفع. منقاده اصفر اللون. صدقة عينه زرقاء. ساقه الى السواد الاسمر المواج || من ميزات انه يتقلد ويردد الاصوات التي يسمها فريد صياح الديك وثغاء الغم وصهيل الخيل زهيق الحمير وصييح البقر ... || قوته الثار والحبوب والذبور والحشرات || يدفن منه في الاشجار الرقيقة الكبيرة الغصان القارشة الالنفية الانتادة. عنه جراب مستطيل يملق في النعند ويحك بالالايات والفس اخصها اليات الباهرة واليوكا. وقد يوجد على الشجرة الواحدة من ٢٠ الى ١٠٠ عش. مداخلها جانبية عليا. الاثنى تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بينا الذكر يئن لها الغذاء.

### ٢٣٧٣١ - كُسيكان \* Cracticus (S), Cassican (F).

جنس طير. من الجوامئ منيات المناقير وفصيلة الغرابيات.



كُسيكان عرب

Reaumuria (S). Réaumurie (F). كَيْشْتِي ٢٣٧٥٢  
جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الالديات .  
أنواعه المعروفة خمسة ، منهاها البلاد الحارة اخصها  
الصحراوية || سوفها شديدة القصر ، كثيرة الفروع الجانسة  
والمفرجة . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، سختيانية النصال  
او لحميتها ازهارها لاقسيانية الانتظام والازدكار ، منها  
العنقودي والمعدني والباطني والظري والمستطيل الزناد القصيرة .  
اشهر انواعه الثلاثة التالية :

- R. mucronata (S). كَيْشْتِي حوية  
R. palestina (S). كَيْشْتِي فلسطينية  
R. hirtella (S). كَيْشْتِي مهدية

Ribes (S). كَيْشْتِي ٢٣٧٥٣  
Grosellier (F). Currant-bush (E).  
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة القليقيات . انواعه  
نحو ٦٠ مظهرها بري وبعضها زراعي يزرع لثماره  
المأكولة . اوراقه متعاقبة ، معنقة ، كفية ، فلقية ،  
مسنة . ازهاره عنقودية او فردية التجميع . ثماره عنينية  
سكرية وحامزة او مرة . اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٥٤ - كَيْشْتِي أحمر\* ، كَيْشْتِي عنقودي  
Ribes rubrum (S). Grosellier rouge, G. à grappes,  
Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E).  
Johannisbeere, Rote Johannisbeere (D). Ribes, R.  
vulgare, R. a grappoli (I).  
نوع من الكشش، ضرابه الزراعية كثيرة العدد جميعها  
جنبات فرعاء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية  
والخامسة الفلق المسنة . نتائجها الزهرية تجمع نحو ٢٠  
زهره لونها الى الخضار الموشع بالاحمر . ثماره متصلة القدة ،  
كروية الشكل ، حراء اللون ، لذينة الطعم ، مستحبة  
العرف || يعود في جميع الارضية لا يغني سوى المنتجات  
الموطاب . يتكاثر بالتمليقة ويشر على الافئدة المحولة .

٢٣٧٥٥ - كَيْشْتِي أسود\* ، هلمش  
Ribes nigrum (S). Grosellier noir, Cassissier (F).  
Black currant bush, Quinsy-berry (E). Schwarze  
Ribisel (D). Grossularia nera (I).  
نوع من الكشش البري والزراعي . ضرابه قليلة العدد  
تتميز ببندها البنية الطرية الصفراء اللون المبشرة على  
الاوراق والافئان والثار . سقه تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم .  
اوراقه خامسة الفلق النقصيص لاقسيانية التنتين المنشاري .  
ازهاره عنقودي . ازهاره حراء اللون خلية القنابات .  
ثماره كروية عطرية سوداء اللون .

٢٣٧٥٦ - كَيْشْتِي شائك\*  
Ribes grossularia (S). Grosellier à maquereau, G.  
épineux (F). Gooseberry bush, Cat berries (E). Stachelbeere,  
Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D). Grossularia rossa,  
G. dei giardini (I).  
نوع من الكشش البري والزراعي الشائك الميزول . تكثر  
زراعتي في انكلترا . ازهاره فردي الانتساب فسي التجميع ،  
ضمت تجمع من زهرتين الى خمسة ازهار . ثماره ريفية الشكل  
جقوية اللون مجرمة بالأخضر . وهي تتميز من المرطبات  
الصعية الشائعة في المانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

٢٣٧٥٧ - كَيْشْتِي  
Grosellie (F). Currant (E). ثمرة الكشش .

ازهارها عنقودية التجميع ، حراء اللون او زرقاء . ثمارها  
سختيلة . يزورها كالحوياء || اشهر انواعه ما يلي .

٢٣٧٥٨ - كَيْشْتِي دَرْبِي  
Pueraria tuberosa (S).  
Puerarie tubéreuse (F).

نوع من الكشش الزراعي ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠  
سم . اوراقه مفصصة . ازهاره زرقاء اللون ، حنابله مستطيلة  
عنقوية الفواصل تخشن بغض البذور . جلوره درنية  
لايها نشوي المادة . بلوره وجلوره مأكولة تطبخ  
كالفاصوليا والبطاطا .

٢٣٧٥٩ - كَيْشْتِي ياباني  
Pueraria hirsuta (S).  
Puerarie hirsute, Koudzou (F).

نوع من الكشش الزراعي السبروتي . ساقه تطول نحو عشرة  
امتار . فروعها خلية النحاء ، وريقاتها معنيفة الشكل  
تطول وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . ازهاره الى الزرقسة  
البفسجية الموشعة بالابيض . عنقوده الزهري يطول نحو ٢٥  
سم . حنابله مستطيلة ، زياه الغلاف || جلوره درنية  
مأكولة . سقه صناعية نسجية . يزوره واوراقه علفية .  
يعود من النباتات التي تزرع في المواقع المعرضة لاحت  
لأنها تتشبت بالترية وتسبح انجرافها .

٢٣٧٦٠ - كَيْشْتِي  
Huppe (F). Crest (E).  
شكل من اشكال القزعة .

٢٣٧٦١ - كَيْشْتِي العجوز  
Lichen (F).  
هي الخزاز ، اطليه .

٢٣٧٦٢ - كَيْشْتِي  
Marquage au fer rouge (F).  
الكشش : الكي بالثار .

٢٣٧٦٣ - كَيْشْتِي  
Geitonogamie (F).  
Geitonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصلاب بين اقارب  
من اصل واحد .

٢٣٧٦٤ - كَيْشْتِي  
Haricot mungo (F).  
هو الماش ، اطليه .

٢٣٧٦٥ - كَيْشْتِي ، تقشير  
Décortage, Décortication (F). Décortication,  
Stripping off bark (E).  
ازالة لحاء الاجمار او سقوطها طبيعيا وانتزاع تشور بعض  
الثار والبزور كالجلوز والوز والارز .

٢٣٧٦٦ - كَيْشْتِي الطحلب  
Emoussage (F).  
Removal of moss from trees (E).  
زوع الطحلب من لحاء الاجمار .

٢٣٧٦٧ - كَيْشْتِي  
Niquetage (F). Nicking (E).  
الكشش في الخيل : التواء في عيب الذنب .

٢٣٧٦٨ - كَيْشْتِي ، معاينة  
Constat (F).

٢٣٧٦٩ - كَيْشْتِي التخاروب  
Désoperculation (F). Uncapping (E).  
هو رفع الغطاء الشعي من عين الشهاد عند جني العسل .



كشش احمر



كشش اسود



كشش شائك



كشنة اللون



كشني



كشوت زكي الرائحة



كشوت فلسطيني

- Or. luteus (S). Orobe jaune (F). **كشني صفراء**  
Or. aureus (S). Orobe dorée (F). **كشني مذهبة**  
Or. roseus (S). **كشني وردية** ، بخرام  
Orobe rose (F).

٢٣٧٦٧ - **كُشَيْنِين**  
Vicia fulgens (S).  
Vesce brillante (F).  
نوع من الباقية وهو نبات عشبي حولي بري ويزرع. ساقه  
فراء عارضة تملو من ٦٠ سم. ٢٠٠ سم. حوافه مستقيمة  
منشعبة. أوراقه مركبة، وريقاتها شغوية تعد من ١٦  
الى ٢٤. ازهاره عقدية التجميع. سداسية التصنيف،  
حمراء اللون، فضية الموالج اللامع || ازهاره يستمر من  
ايار الى تموز.

- ٢٣٧٦٨ - **كُشُوت، كُشُوت، كُشُوت، كُشُوت، كُشُوت**  
Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Seide (D).  
Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء عن الكشوت في لسان العرب :  
« هو الكشوت فلا اصل ولا ورق  
ولا نسج ولا ظل ولا ثمر »  
جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. انواعه المعروفة  
نحو ٨٠ مظهرها امريكي النبات. جميعها من النباتات  
المؤذية العادة للورق. سوقها مستقيمة، فراء، كثيفة  
التجميع، غطية الشكل، صفراء اللون او صفراء، تلتف  
على حاضنتها وتلتصق فيها مرافقها المماسية فتستريح نسجها  
وتتجيب. ازهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون او وردية.  
اعرف انواعه الشرقية والاروية ما يتبع.

- كشوت السعتر، انمين**  
C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym,  
Petite cuscuta, Epithym (F).  
**كشوت الكتان**  
C. epilinum (S). Cuscuta du lin (F).  
**كشوت الثفل**  
C. trifolii (S). Cuscuta du trèfle (F).  
**كشوت زكي الرائحة**  
C. suaveolens (S).  
Cuscuta à odeur suave (F).  
**كشوت عربي، شرين**  
C. arabica (S).  
Cuscuta d'Arabie (F).  
**كشوت غليظ**  
C. racemosa (S). Cuscuta grosse (F).  
**كشوت فلسطيني**  
C. palaestina (S).  
Cuscuta de Palestine (F).  
**كشوت كبير**  
C. major (S). Cuscuta grande (F).

- ٢٣٧٦٩ - **كُشَيْفَة** شجرة كلية القصب.  
٢٣٧٧٠ - **كُشَيْش** صوت الحية مجلجلا.

٢٣٧٧١ - **كُطْرِي** ، **كُتْدَشْ جَوَال**  
Dendrocticta (S). Dendrocticta, Pie vagabonde (F).  
Dendrocticta (E).  
كطري هو الاسم الهندي. جنس طيز من الجوامم وفصيلة  
الغرابيات. انواعه المعروفة عشرة موطنها الهند. تألف  
الحراج البميثة الانجار. ملجها الحيائي جماعي. جماعاتها  
قليلة العدد. قوتها البنور والحبوب والتأثر والغشتر ||  
اجسامها متوسطة القدر تطول من ٢٨ الى ٤٦ سم. بما فيه  
الذنب الذي يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. تتميز باذانها  
المستطيلة الشبه سمية الشكل وبالثوباء الحنطية القائمة  
المبلطة بالاسود والاحمر والاشهب.

- ٢٣٧٥٨ - **كُشَيْفَة سَوْدَاء** Cassis (F).  
٢٣٧٥٩ - **كُشَيْفَات** Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Gros-  
sulacées (E).  
نمرة الكشش الآسود.  
Black-currant (E).

سبط من فصيلة القليات يشمل الكشش والربياس  
وبغيرها. اجناسه وانواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع  
الاصقاع المعتدلة المنحرفة نحو الباردة من العالم القديم  
والجديد.

- ٢٣٧٦٠ - **كُشَمَلَع** Androsace (F).  
هو الاندروزاس، اطلبه.

- ٢٣٧٦١ - **كُشَن** Guérîte (F). Shelter (E).

- ٢٣٧٦٢ - **كُشُنْج** Truffe noire (F).  
هو الكشم الاسود، اطلبه.

٢٣٧٦٣ - **كُشْنُولَة**  
Kuehneola (S).  
جنس فلور مجهرية من فصيلة السحمايات، يتميز بمشالعه  
الرئيسية التجميع التي تركب فصل الاوراق على صفحاتها  
المليا. نامتجه صفراء اللون قلادية التجميع والشكل. نكاته  
عديدة مترافعة. سامه الساسية شغوية التركيب، رباعية  
الريجات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة، منها كشنولة  
التي وكشنولة القطن.

- ٢٣٧٦٤ - **كُشْنُولَة التين**  
Kuehneola fici, Physopella fici, Uredo fici (S). Rouille  
du figulier (F).

نظر مجهري يتطفل على اوراق التين فيؤذيها ويهيء الى  
نمو الانجار ونفج النار || مظهره الخارجي بقع مبيضة  
صفراء اللون تركب فصل الاوراق على صفحاتها السفلى  
تتسبب جفاف التجميع وذبول ثم الايصال الباكر الذي  
يؤذي نمو الشجرة ويؤخر نضج النار || يكافح باستعمال  
سائل بوردو المخلول ١٪ عند ظهور عوارض الوبس وبعد  
ذلك بأسبوعين.

- ٢٣٧٦٥ - **كُشْنُولَة القطن**  
Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille  
du cotonnier (F).

نظر مجهري يتطفل على اوراق القطن فيؤذيها ويسبب  
سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبيضة  
او متلامسة تركب فصل الاوراق على صفحاتها العليا  
تقابلها على الصفحات السفلى حالات بنية تمرقل سير النسخ  
تذبل الاوراق بعد ان تقضي على نسجها التي تلوي وتموت.  
يكافح باستعمال احد الفواطير النحاسية الارتكاز الضعيفة  
التركيز.

- ٢٣٧٦٦ - **كُشْنِي**  
Orobus (S).  
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbse (D).  
Orobo (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القطنيات  
الغرابية. انواعها نحو ٤٠ سوقها فراء مستطيلة. ازهارها  
مغترية يجمرها النحل. ثمارها سنية. بزورها مستديرة.  
اشهر انواعها :

- كشني ربيعية Or. vernus (S). Orobe printanière (F).  
كشني لطفاء Or. variegatus (S). Orobe panachée (F).  
كشني سوداء Or. niger (S). Orobe noire (F).

وصفه وأعل صدره وذنبه إلى السواد اللامع . قفنه قبري الريش الأسود الأزرق المالح . ظهره ومثابه إلى الجؤوة . قوامه وأباهره إلى السواد المطروق بالأحر . سائر ريش جسمه إلى الحمرة النارية . أثناء أقل تلويناً ولعبة || يألف القفص ويضاهي الحسون في التفرية .

### ٢٣٧٨٥ - كُفْرٌ مَبْدُول \*

Chrysomitris spinus (S). Tarin commun (F). Common siskin (E).

نوع من الكُفْر ، موطنه يشمل الشرق وأروبة وبعض مناطق أفريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو صغير القد ، جيل الثوب يطول من ١١ إلى ١٢ سم . الذكر منه متوج الرأس بالسواد . ظهره إلى الخضار الأصفر . يطول تجنيد أسمر . جناحه إلى السواد يعترضها خطان أصفران . محسره وزوره وصدره إلى الصفار الأخضر . عقه أسود . منقاره حنطلي الجسم أسود الملقط . حدة عينه كستنية اللون ، ساقه إلى الوردية . الأني أكثر بيضاء وأقل حمرة واسوداداً . أما رأسها فإلى الخضار إلاكهف بدلاً من الأسود . أثناء تبنيص وتحقق مرة واحدة في العام وقد يكون ذلك في الويزة الأولى من حزيران || وهو يألف القفص بسرعة ويدجن بسهولة .

### ٢٣٧٨٦ - كُفْرِيَّيْ ٥

Botrytide (F). نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كزهره القزديط أو كالمعتقد القصير المستدير .

### ٢٣٧٨٧ - كُفْرْدِيَّة ٥

Toile d'araignée (F). هي الشح ، راجحه .

### ٢٣٧٨٨ - كُفْرْدَة ٥

Pézize (F). Peziza (E). جنس فطور مقعرة من الكدمات . أنواعه عديدة منها واحد مهم الاقتصاد الزراعي يدهى الكدمة الجراحية .

### ٢٣٧٨٩ - كُفْرْدَة جَرَابِيَّة ٥ ، أَلْوَرِيَّة ٥

Peziza vesiculosa, Aleuria vesiculosa, Edocephalum fimetarium (S). Pézize vésiculeuse (F). عسقلانه

كبير القد مركب من سداً غليظة قدسية الشكل ملفوفة الحافة . قطره براوح من ٣ إلى ٩ سم . مواجه الخارجى غير خلى . سطحه التكمي امس البشرة داكن اللون الحنطلي أضراره قائمة على ما يتلف من شتول يتغلغلها من التربة عند شق طريقه نحو النور .

### ٢٣٧٩٠ - كُفْرْدِيَّات ٥

Pezizaceae (S). Pézizacées (F). Pezizaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الزقيات . أجناسها وأنواعها عديدة جميعها مقعرة ، بعضها عادم العنق . معظم أجناسها يعيش على المواد النباتية والنباتية المتحللة . منها أنواع كبيرة القد ، لحية المسقلان ، ما كولة || أشهر أجناسها الكدمة والاستبولة والسركوسينا والأوتيدا ، الخ .

### ٢٣٧٩١ - كُفْر ٥

الكمر : « شك يسبب له ورق كبار امثال الذراع كثيرة الشكل ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبة هنات امثال الزجاج يطيف بها شك كثير طوال ، وفيها وردة حراء مشرقه تجمرها النحل وفيها حب امثال العصفور إلا انه شديد السواد » (اللسان) .

### ٢٣٧٩٢ - كَيْطَامَة

Canal souterrain (F). Underground duct (E).

القناة جـر الماء مدودة ومقيبة تحت الأرض .

### ٢٣٧٩٣ - كُفْر ٥

Carène (F). Keel (E). كل اخدود بارز يملو احد اضواء الحشرة أو الزهرة . ومنهم من دهاه قارب وزورق .

### ٢٣٧٩٤ - كُطْرَان ٥

Capsules surrénales (F). Suprarenal capsules, S. bodles (E). غدد فوق الكلا .

### ٢٣٧٩٥ - كُغَب ٥

Nœud (F). Knot (E). العقدة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . وقيل الكعب هو طرف الأنبوب الناشئ . ج كعوب وكعاب .

### ٢٣٧٩٦ - كُغَب ٥

Malléole, Talon (F). Malleolus, Heel (E). هو عقب الرجل .

### ٢٣٧٩٧ - كُغَب الفَرَكَال ٥

راجع سكايبوزا حقلية .

### ٢٣٧٩٨ - كُغْبَرَة ٥

Nœud (F). Knot (E). الكمبرة : عقدة انبوب الزرع ونحوه . ج كمار .

### ٢٣٧٩٩ - كُغْبَرِي ، كُغْبِي ٥

Radial

### ٢٣٨٠٠ - كُغْبُور ٥

Capsule هو الجرو ، اطلبه .

### ٢٣٨٠١ - كُغْبُورِي ٥

Capsulaire (F). Capsular (E). نعت تعريفي يوصف به ما كان شكله كالكمبور .

### ٢٣٨٠٢ - كُغْبَة ٥

Pirula (S). Pirule (F). Pirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مذنبات الارجل وفصيلة الخنثنيات . أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداؤها شبه اجامية الشكل ، رقيقة ، سريعة العطب ، كبيرة الفوهات المستطيلة القاطبة ، صغيرة الاعقاب الملهونة المدببة ، حجلة الألوان المتناسقة || أشهر أنواعها الكمنة التينية (Pirula ficus) التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

### ٢٣٨٠٣ - كُغْر ٥

Chrysomitris (S). Tarin (F). Siskin (E).

جنس عصافير صغيرة القد تالعة من فصيلة الشرشوريات . انولاه المعروفة ٨ أنولاه متداخلة الألوان المركبة المتباينة اذنانها مستعرضة فارقة . مناليعها مخروطية قصيرة . تألف الغابات ومجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي ، قوتها زور النباتات البرية ونولي الاوراق والخضراوات الصغيرة على اختلاف فصائلها وأنواعها . تنش في الاشجار الكثيفة اخصها السرو والصنوبر . انائها تقسم من ٣ إلى ٥ ه بيضاء تحضنها وحدها ١٢ يوماً . أشهر أنواعها المبدول والقنبري .

### ٢٣٨٠٤ - كُغْرٌ قُفْرِيَّيْ ٥

Chrysomitris cucullata (S). Tarin rouge à tête noire (F).

نوع من الكُفْر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل وفنزويلا . طوله براوح من ١٣ إلى ١٤ سم . رأسه وزوره



كعنة



كُفْر مَبْدُول



كدمة جرابية

٢٣٧٩٢ - كَفَرَة هي المقعدة الغدية الشكل .

٢٣٧٩٣ - كَفَس Os des phalanges (F).

الكف عظام السلاحي في الاصابع . ج كفس .

٢٣٧٩٤ - كَفَسَم Ane sauvage (F).

هو الحمار الوحشي .

٢٣٧٩٥ - كَفَسُوم Ane domestique (F).

هو الحمار الاحملي .

٢٣٧٩٦ - كَفَل ٥ Métamorphose (F).

الكفل هو الاكمال ، اطلبه .

٢٣٧٩٧ - كَفَنَد Germon (F).

هو الكند ، اطلبه .

٢٣٧٩٨ - كَفْب \* شَوْك الدِّمَن ، حَرَشَف بَرِي Carduus Marianus, Silybum Marianum (S).

Chardon-Marie, C. argenté, Lait de N.D., Artichaut sauvage (F). Milk thistle, St. Mary's thistle (E). Echte Mariendistel (D). Cardio di Maria (I).

نبات عشبي بري يحول من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفرصة حاشية . نصلها لامع الصفحة المستجبة بالابيض . حثاره شائك الاحداث . رؤوساته الزهرية تكبر من ٤ الى ٨ سم . ازهارها ارجوانية ، قناباتها ماسية سنانية تنتهي بشوكة مبطلعة الجرم مستطيلة الحمة .

٢٣٧٩٩ - كَفَبَت Pycnonote (F).

هو البلب ، اطلبه ، ج ، كفتان .

٢٣٨٠٠ - كَفَبَتَات ، بَلْبَتَات Pycnonotidae (S).

Pycnonotidae (F).

فصيلة طير من الجوائم مشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها معظم اقاليم البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صفرة . مناقيرها مخززية الشكل ، مستعرضة القاعدة ، منفضلة الجوانب ، مدببة الاطراف . اجنتها مستعرضة ، معتدلة الطول . اذانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . ارياشها ناعمة وفزيرة . ارسافها قصيرة ، سرديّة الفصالح الامامية . اصابعها قصيرة وقوية . قوتها الحشرات والثمار العنينة واليدور البرية وبعض نواصي النبات || اشهر اجناسها الكميث اي البلب .

٢٣٨٠١ - كَفِيس Cri de la souris (F).

صوت القارة او صراخها .

٢٣٨٠٢ - كَفِيط ٥ Brachyslen" (F).

نمت وصفي يطلق على ما كان ظله شديد القصر . ويطلق جغرافياً على الشعوب التي تسكن المناطق الاستوائية لان ظل افرادها عند الظهيرة يكون شديد القصر .

٢٣٨٠٣ - كَف آدم

« ثبت نحو ذراع مستدير الورق خشن بين سواد وصفرة داخله احمر لونه زهر كالقرطم لكنه اذق وفيه مرارة . ييرة

منع الحفان شرباً بالين ويجمل الرياح ويقوي الكبد » (التذكرة) .

٢٣٨٠٤ - كَف الدُّب Saugé sclérée (F).

راجع قوية قاسية .

٢٣٨٠٥ - كَف السَّع Renoncule asiatique (F).

راجع حوذان اسوي .

٢٣٨٠٦ - كَف الصَّبَاغ Iris d'Allemagne (F).

راجع سوسن جرمانى .

٢٣٨٠٧ - كَف العَدْرَاء \* ، وَرْدَة أُرْبَا Anastatica hierochuntica (S).

Rose de Jéricho, St. Mary's flower (E). Jerichorose, Marienrose (D). Anastatica, Rosa di Gerico (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الصليبيات . منبته الاصقاع القاحلة اخضها البراري الفلسطينية . ساقه قراء تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل ، غليظة التسنين ، نصلها ازغب الصفحة زفيه نجمي التركيب . ازهاره اهبطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطنة الانتشاب ، يقياس اللون || وهو من النباتات التي تعيش من جديد ، بعد يباسها ، فيما لو وضعت في الماء .

٢٣٨٠٨ - كَف النَّسْر ، عَفْرَبَان ، حَشِيشَة دُورِيَّة ، فَايس Scolopendre officinale, Herbe à la rate (F).

Official hart's tongue (E). هو السرخس الخزفي من النباتات الطبية المشكورة ، يستعمل في علاجات الطحال ويطرد الحمى ويدبر البول ويزيل البرقان .

٢٣٨٠٩ - كَف المَهْر Renoncule des champs (F).

هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

٢٣٨١٠ - كَف اليَد Dessaisissement (F).

Parting with, Abandonment (E). هو منع الشخص عن ادارة ماله . وقد يكون الانتناع طوعاً واختياراً .

٢٣٨١١ - كَف جَدْمَاء

الكف الجذماء بضعة نجوم من كوكبة قيطس مركزها في الرأس .

٢٣٨١٢ - كَف مُخَضَّب

الكف المخضب نجم نير من كوكبة ذات الكرسي . ويدعى ايضاً الكف الخفيف .

٢٣٨١٣ - كَف مَرْتِم

هو الارادة ، جنية طيبة معمرة . وهو كوكب البحر ، اطلبه .

٢٣٨١٤ - كَفَّاسَة \*

Sparassus (S).

Sparasse (F). Sparassus (E).

دوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايات سداسية المشانق تنتمي الى فصيلة الهاجيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . عند الذكر ونحو ١٢ م . عند الانثى . صداسها ناعق \* المقدم ، حنطي اللون ، مكيف الحمل .



كعب



كف العذراء



كفَّاسَة

الى الكسني الاحمر المواج . ملذها ورواجها الى السرة الحالكة || طور الاكمال يستمر نحو ١٦ يوماً وينقضي في الجفلة او في التربة حيث تنغم السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

Cautionnement (F).  
Security (E).

### ٢٣٨١٧ - كَفَّالَة

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو أيضاً الذميمة المرتهنة سواء كانت أوراقاً مالية أم تقوياً تستوعد تأميناً لدين احتماله .

Garantie (F).  
Guaranty, Warranty (E).

### ٢٣٨١٨ - كَفَّالَة ، ضَمَان

شهادة خطية من البائع بان ما يبيعه من بذار واسمدة واودية ودوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

Ducroire

### ٢٣٨١٩ - كَفَّالَة الشَّارِي

هو ان يلتزم الوسيط دفع ثمن المشتري الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

Caution juratoire (F).  
Juratory security (E).

### ٢٣٨٢٠ - كَفَّالَة الْقَسَم

قسم تعتبره المحكمة بمثابة كَفَّالَة .

Caution légale (F).  
Common bail (E).

### ٢٣٨٢١ - كَفَّالَة قَانُونِيَة

هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

Caution judiciaire (F).  
Judicial security (E).

### ٢٣٨٢٢ - كَفَّالَة قَضَائِيَة

هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

Limite du feuillage (F).  
Limit of the foliage (E).

### ٢٣٨٢٣ - كَفَّة

كفة الشجرة : منتهى حدود دوحها حيث تنقطع أوراقها .

### ٢٣٨٢٤ - كَفَّة جَنُوبِيَة

الكفة الجنوبية كوكب .

### ٢٣٨٢٥ - كَفَّة شَالِيَة

الكفة الشالية كوكب .

Bitume

### ٢٣٨٢٦ - كُفَّر

هو الحمر الغروي ، راجع حر .

Kaempferia (S).  
Kaempféria (F).

### ٢٣٨٢٧ - كُفَّرِيَة

جنس نباتات جذمورية دوفسية معمرة من فصيلة الزنجبيليات . انواعه نحو ٢٠ منبهاً المناطق الحارة . اوراقها كبيرة اللد ، قرصية الانتشاب يتوسطها شراخ تملوه زهرة كبيرة ، جملة الشكل ، ثنائية الالوان || جذاميرها طيبة يستخرج منها مواد ناعوظية شديدة الفاعلية .

Selaginella (S).  
Sélaginelle (F). Resurrection plant (E). Auferstehungsflanze (D). Selaginella (I).

### ٢٣٨٢٨ - كُفَّان

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخدرديات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة . سوقها نخيلة مدادة فراء . فروصها منتسبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المتركة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شيسفاها صغيران ذريان . فكاهها كبيران مجهزان بغلاف حادة . جزامرها كبيرة مستطيلة . بطنها بيضي الشكل ، حطلي اللون تملوه شمة سمراء واربع نقط سود || تألف البراري والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات والذباب : تسرح في الليل . ماراها سنة قصيرة قلنسوية الشكل تنسجها عند سوق النبات . بيئاتها الشتوي يستمر نحو خمسة أشهر تقضيها في مكانية صلجية تنسجها بين الحجارة وتحتها || تعتبر من الدويبات النافعة .

### ٢٣٨١٥ - كَفَّاشَة تَرَاوِيَة \*

Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).  
Calymnie trapézoidale, Cosmie trapézoidale (F).  
Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة العثقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جولة قوتها رحيق الازهار . سرفتها غاضلة تركيب اوراق الاشجار الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . رأسها معتدل الجرم ، ناقى الجبهة . عينها كبيرتان ناشزتان . زباناها غيطيان . ملاسها نخيلة . مرشفاها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الحطلي الاسمر المواج || روشناها الامامية الى الحطلي الاكلفت تملوه شمة غنائية وضطان ممرضان اسمران . روشناها الخلفية الى الحطلي الاسمر المواج يطوقه حطار تني ينتهي بالاسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وبقية حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الاثني تلقى المكان لطعاً لامساوية الشكل تغلفها مادة غريبة تقيها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ سم . جسمها ماس التشار ، مستدق المقدم ، مستنطق المؤخر الذي يبدو كعقرب المدقة . ثوبها الى البني الاسمر تملوه خطوط صفير ممرضة . رأسها كسني اللون . ملذها ورواجها الى السرة القاذرة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغم السرة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتصقة بجلباب خفيف من الطين ينفلق عند انطلاق الفراشة في ايار .

### ٢٣٨١٦ - كَفَّاشَة مُوَاطِئَة \*

Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).  
Calymnie complice, Cosmie complice (F).  
Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من العثقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفتها غاضلة تميش على اوراق السديان || جسمها صغير اللد يطول نحو ١١ سم . بسطها نحو ٢٩ سم . رأسها الى الحطلي . عينها كبيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها دقيقة . مرشفاها معتدل الجرم . جوشنها وبطنها الى الحطلي الاسمر المواج || روشنها ، عند الشقين ، الى الحطلي الاكلفت تملوه في الزوج الامامي ماجة صائبة وضطاط سمير ممرضة ويقبضان الى الطلعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وبقية حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ٤٠ يوماً وتمتد المكان لطعاً مستطيلة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول نحو ٢٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ماس التشار . ثوبها الى الطلعة يملوها مواج اخضر وخطوط سود ممرضة يتخللها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كَفَّاشَة تَرَاوِيَة



كُفَّرِيَة



كُفَّان





كففة مدادة



ككوة



ككبة الطيآن



ككبة الحازن



ككبة مفلطحة

٢٣٨٢٨ - كُكُوتُوه \* Cactus, Plectolophus (S).  
Cacatoès, Cacatois (F). Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء. أنواعه قليلة العدد جميعها متسلقة أصلاً فسيحة الأرجاء تمتد من الهند إلى جزر الزابنج وأستراليا. أجسامها كبيرة القد. أوتارها إلى الأبيض الناصع. طارها كثيرة فارشة لونها يختلف باختلاف النوع، يراوح من الأبيض إلى الوردي والأصفر. وفي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.

٢٣٨٢٩ - كُكُوتُبة الطيآن \* Laemophloeus clematidis (S).

حشرة من الككجيات طويلة يراوح من ٢ إلى ٣ م. ثوبها إلى الخشنى تملؤ ماجة جزئية. كوسلها عادم التسنين. زيانها صولجانية مهدبة || تعيش على سوق الطيآن بعد يساها.

٢٣٨٤٠ - كُكُوتُبة المتحازن \*، كُكُوتُبة سورينام \* Oryzaephilus surinamensis (S). Silvain (F). Saw-toothed grain beetle (E). Getreideschmalkäfer (D).

حشرة من الككجيات ثوبها إلى الخشنى القائم. جسمها مستطيل الشكل يطول نحو ٣ م. كوسلها مرن الحنط. زيانها صولجانية مهدبة || تركب مع رقاتها جميع الحبوب المغزونة والآبار المخففة والساكر والبنج. وقد تفرس وينيد رقات الكلدرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - كُكُوتُبة مفلطحة \* Uleiota planata (S).

حشرة من الككجيات جسمها مستطيل مفلطح. طولها يراوح من ٤ إلى ٥ م. ثوبها إلى الصبيبة يملؤها مواج قائم. كوسلها إلى السرة ثنائي التسنين الطرفي الامامي. زيانها خيطة، مستطيلة مهدبة. || تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية اعصها السنديان.

٢٣٨٤٢ - كُكُوتُبات \* Cucujidae (S). Cucujids (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وأنواعها عديدة اصطلحها العالم. جميعها من الخنافس الصغيرة المستطيلة الشكل. قرونها الاستعمارية خيطة او صرطانية مركبة من ١١ فاصلة. ارساغها خالية العقل || تعيش بين الاخشاب وتحت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تفرس ما تقوى عليه من المرام والغشرات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - كُكُوتُبة \* Cucujidae (S).

٢٣٨٤٤ - كُكُوتُبة \* Cucujidae (S).

٢٣٨٤٥ - كُكُوتُبة \* Cucujidae (S).

جنس اثمار وخجيرات برية من فصيلة الببلياتيات. انواعه المعروفة نحو ١٦ منبتها المناطق الاستوائية الامريكية. تتميز بصلابة ومناعة اخشابها الصاعدة || اشهر انواعه ما يتبع.

٢٣٨٤٦ - كُكُوتُبة أزغَب \* Coccobola pubescens (S). Coccobole pubescent, Bois de fer (F).

شجرة عظيمة دائمة تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. خشبها احمر

الزيتونية اللون || تزرع للزيتين يستعملها الزمارون في صناعة ابراش وبقاات الزهر.

٢٣٨٢٩ - كُكُوتُبة Croupe (F).  
هو الرود، اطله.

٢٣٨٣٠ - كُكُوتُبة Glechoma (S).  
Gléchome, Glécime (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقسية الشكل منها المادة والمتنصبة. اوراقها متقابلة معقفة، نصلها مستدير الصفحة المشارية الحافة. ازهارها ابوية الاركانز مختلفة الالوان منها الابيض والازرق والارجواني والبفسجي. تعيش في المواقع الرطبة وفي الاقنية والسياجات.

٢٣٨٣١ - كُكُوتُبة مدادة \*، تلباب أرضي \* Gléchome hederacea (S). Gléchome hédéracé, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Terrette, Lierre terrestre (F). Ground ivy, Hedge malds (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edera terrestre (I).

نوع من الكففة المبدولة وهو نبات عشبي طبي ربي معمر. ساقه تقطو نحو ٣٠ سم. اوراقه جميلة الخضار الموضح ازهاره غصية التجميع، نحاسية، زرقاء اللون.

٢٣٨٣٢ - كُكُوتُبات القدم \* Palmipèdes (F).  
Palmipeds (E).

رتبة من الطير تنتمي الى قسم الجوزيات، فضائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تتجمع الى اربع رتبيات :  
شابلات الكفوف منها الجمع  
صفحيات المناقير منها الوز والبط  
طويلات الريش منها القفوس  
مدجات الريش منها البطريق.

٢٣٨٣٣ - كُكُوتُبة Kéfir, Képhir (F).  
Kefir, Kefyr (E).

مشروب كحولي حازن العلم يستحضر من مضارة اللبن بعد تخثيرها بخماز فطرية خاصة تمتد من نشاط الحامض اللبي.

٢٣٨٣٤ - كُكُوتُبة Caution, Fidjousseur (F).  
Caution, Surety (E).

هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الاصلي بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين.

٢٣٨٣٥ - كُكُوتُبة، ضامن Garant (F).  
Guarantor, Warrant (E).

هو الملتزم بالكفالة او الضامن.

٢٣٨٣٦ - كُكُوتُبات التفقات القضائية Kéfir, Képhir (F).  
Kefir, Kefyr (E).

هو الكفيل الذي يضمن دفع التفقات القضائية.

٢٣٨٣٧ - كُكُوتُبات متضامن Caution solidaire (F).  
Binding on several caution (E).

هو الكفيل الذي تتنازل للدائن عن حق المطالبة بتجريد المكفول فاصبح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

طوله نحو ١٠ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي؛ عيناه صغيرتان، ماسحتان. خنثاه، مقطوعتان، مقنوتتان. سباله متكاثف مستطيل. أذناه مستطيلتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذنبه مدرج في الغشاء الجلدي || يألف البيوت والكهوف والمغاور القريبة من الجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يغتر بالإنثى إلا في زمن الكرم. من في الحول || يصرحه يستمر من الفسق إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها.

٢٣٨٥٥ - **كلادة\***  
Chelodina (S).  
Chelodine (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القاذبة المفترسة تنتمي إلى فصيلة الحسبيات. تعيش في المياه العذبة وعلى ضفاف الأنهر. قوتها الاسماك والرخويات والصفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها بطول نحو ١٠٠ سم. منها ٢٢ سم. عتقا للراس والعتق رأسها مبسط الشكل، ذلق الخلع. عتقا أسطواني مستطيل. ذنبها جذعة. ذيلها شبه يضيي الشكل، متدل الإحديدياب، ويتربك من ٢٥ فترة لامتسارية الحجر، لونه إلى السمرة الصفراء الكدرية || موطنها بعض مناطق امريكة الجنوبية || لحمها كاعن الصنف، مأكول من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - **كلاديون\***  
Cladium (S).  
Cladion (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicastrella di padule, Serrazo (I).  
جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السعديات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها العالم. تألف المنافع والمواقع الرطبة. سوقها دقيقة قرصية التفريع، مستطيلة السليميات، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - **كلاركيا، إكلركية**  
Clarkia (S).  
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الإخندريات مهدها البلاد الامريكية. أنواعها قليلة جميعها صغيرة القدر زرع للترئين. أوراقها متعاقية. أزهارها فردية التنسج، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسمات ثمانية الاسدية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - **كلاركيا رشيقة\***  
Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).  
عشبة ثريبتية سرولية حولية تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. أوراقها اعطليجة ذلقة، نصلها مسن الحافة، بحري اللون. أزهارها كبيرة القدر عادية أو مكسية، بتلاتها مستديرة أو كلوية الشكل، مسنة الخبار المتجمع. ألوانها تختلف مع الفسروب منها الوردي والبنفسجي والأبيض. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - **كلاركيا تحيفية**  
Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).  
عشبة ثريبتية سرولية حولية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ضروبها عديدة. أوراقها سنائية ذرية، نصلها خلي البشرة. أزهارها كبيرة القدر، منها البادية والمكسية؛ بتلاتها لانياسية التفصيص، ألوانها تختلف باختلاف الفسروب منها الاحمر والابيض والبنفسجي والأبيض. أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

اللون شديد الصلابة ناعم الرقة يقاوم التبخ يعرف بنخب الحديدي.

٢٣٨٤٧ - **ككلوب كينو\*، وذن الفيل، عتب الشقة**

Coccoloba uvifera (S). Cocolobe à baguette, Bois baguette, Raisinier des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gemeine Seet-raube (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).  
نوع من الككلوب وهو شجيرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقية، معتقة، كبيرة. نصلها مستدير الصفحة الجامدة اللاصقة. أزهارها سنبلية التجميع، تناسج الارتكاز. أزهارها جليجية الشكل، صفرة القدر، وردية اللون || يستخرج من ساقها بالحز عصاره لزجة، قابضة، مفراة اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - **ككم\***  
Ierax (S).  
Hlerax, Faucon nain (F). Ierax (E).  
جنس طير من عرأة الصقور وفصيلة الصقريات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القدر، ربة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. أنفها إلى الكلفة المرقطة يكثر فيها الاطمل والاسمر والأزرق العابق، ريش صدورها أحر. رؤوسها مستديرة. عينها جليية وكبيرة. مناسرها مسنة ومنعقة. غالبها حادة || موطنها البلاد الاسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الاجام ويحاري الماء. قوتها اللوديات والخشرات اعصها الجنادب والسرابعب والفرشاش الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - **ككلا**  
Fourrage (F).  
Fodder, Provender (E).  
كل ما ترعا الماشية من اعشاب خضر او تخلفه من نخيش وصقال مخزونة كالبطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - **ككلا يابس**  
Foin (F). Hay (E).  
الككلا اليابس والنن والصالرة والقيبي هو العشب المخشوش المجهف المحفوظ ككلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - **ككلاية**  
Pâturin des prés (F).  
هي ثف المروج، اطليه.

٢٣٨٥٢ - **ككلاب**  
Canidae  
فصيلة حيوانية من اللواحم تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - **ككلاية\***  
Quillaja, Quillaya  
جنس اشجار برية من فصيلة اللوديات. أنواعها قليلة اعطانها البلاد الامريكية. سوقها وفروعها منصبة، أوراقها متعاقية معتقة بيضبة النصل. أزهارها نوري. أزهارها ثنائية المسكن، ابطية وتاجية الارتكاز || أشهر أنواعها الككلاية الصابونية التي تتميز بسكاكة قشور سوقها وانغصانها الفنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - **ككلاج، عخفاش أسبل**

Vespertilio mystacinus (S).  
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).  
الككلاج والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. مولته نسج الاجراء يمتد من الصين إلى اربوة مروراً بالشرق الاوسط والاندل || ثوبه إلى الطحلة السمراء تعبق في الرأس والظهر، وتغير في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلادة



كلادة



كلاديون



كلاركيا رشيقة

## ٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الْجَبَّارِ

كلب الجبار كوكب .

## ٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نير من كوكبة الجاني ، يسمى أيضاً رأس الجاني ، اطلبه .

## ٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْدِ

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E). صرم من الكلاب النشطة الحاذقة الثم تستعمل في الصيد . عروقها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثرها .



(١) كلب

Ligne du dos (F). ٢٣٨٧١ - كَلْبُ الْفَرَسِ  
Line of a back (E). هو الخط الذي يوسط ظهر الفرس .

## ٢٣٨٧٢ - كَلْبُ الْمَاءِ

Lutra (S). ٢٣٨٧٢ - كَلْبُ الْمَاءِ  
Loutre (F). Otter (E). هو القضاة والفتندس وتلعب الماء . جنس حيوانات لبونة قازية من فصيلة السعوييات . انواعها ثمانية اصطلحها العالم . تألف البحيرات والانهر والاخوار . قوتها الاسماك والقشريات . والصفادع وبعض الثآليل والاعشاب || اجسامها مستطيلة . رؤوسها مستعرجة مفلطحة . اعطالها مقبولة . اعتاقها غليظة . قوائمها قصيرة ، اصابعها خاسية ملتصحة . اذنانها مستطيلة . جلدها غروية فاخرة الصنت || اجارها داليز منحدرة الانفاق تبتني تحت سطح الماء تخسبن او ستين سم . وتنتهي على بعد ٢٠٠ سم . ردهات مستمرة تملو مستوى الماء بنحو ١٠ سم . وتتصل مع الخارج براديب تزين الهواء والحرب عند الحاجة || اناها اصفر قدام ذكورها وفي تقص من جروين الى اربعة جراء . رضعها ورضيها نحو ٥ شهور .

(٢) كلب

Courtilière (F). ٢٣٨٧٣ - كَلْبُ الْمِي  
هو الخالوش ، اطلبه .

## ٢٣٨٧٤ - كَلْبُ الْمُتَقَدِّمِ

الكلب المتقدم كوكب .

## ٢٣٨٧٥ - كَلْبَانِ

الكلبان « نجان صفران كاللترقين بين الثريا والدرابن » .

## ٢٣٨٧٦ - كَلْبِيَّةٌ

انثى الكلب .

## ٢٣٨٧٧ - كَلْبِيَّاتٌ

Canidae (S). Canidés (F). ٢٣٨٧٧ - كَلْبِيَّاتٌ  
Canidae, Dogs (E). فصيلة الكلاب من اللواحم تشمل الكلب والذئب والكلب وابن آوى .. قوائمها الاسامية خاسية البرائن اما الخلفية فرباعية وبرائنها لا تنقبض كما في السنابير وفي لا تتسلق الاضراس ولا تنقبض على فريستها ببرائنها بل بانهاها .

## ٢٣٨٧٨ - كَلْبِيَّاتُ الرُّؤُوسِ

Cynocéphales (F). ٢٣٨٧٨ - كَلْبِيَّاتُ الرُّؤُوسِ  
Cynocephalus (E). هي القراذيع جنس قرد من فصيلة الهجرسيات . رابع قردوح .

٢٣٨٧٩ - كَلْتُم هو الفيل والزنديل ، اطلبها .

## ٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّةٌ

جنس نباتات برية معمرة من النقيات تدعى مياكة ، اطلبها .

## ٢٣٨٦١ - كَلْبٌ ، سَعَارٌ ، سَعَرٌ

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). ٢٣٨٦١ - كَلْبٌ ، سَعَارٌ ، سَعَرٌ  
مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسنابير ويسري الى سائر الحيوانات كالليل والبقر والغنم والماضر والارانب . عدواه يابخر من العالب .

## ٢٣٨٦٢ - كَلْبٌ \*

Canis familiaris (S). ٢٣٨٦٢ - كَلْبٌ  
Chien (F). Canis, Dog (E). جنس حيوانات شاردة واعلية من فصيلة الكليليات . سلالات كثيرة العدد تجتمع الى اربع فئات :Lupoïdes فئة الكلاب الصبورية  
Braccoides فئة الكلاب الشمسية او المرجعية  
Molossoïdes فئة الكلاب الدوراسية  
Graloïdes فئة الكلاب السلوقية

أثله حشاية الأطباء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء تبصر النور بعد وضعها بنسبة أيام . وتفقد اسنان الحليب بمر ثلثة اشهر ويكتمل تسنيها النهائي بمر ثمانية اشهر . وللكلب خمسة اصابع في قوائمه الاحامية وأربعة في الخلفية . اصابعه مبطة قوية البرائن || وهو حيوان متأنس آيف وفي يستخذه الانسان في الحراسة والصيد والرعاية والطاردة .

## ٢٣٨٦٣ - كَلْبُ أَصْفَرٍ

le Petit chien (F). ٢٣٨٦٣ - كَلْبُ أَصْفَرٍ  
Canis minor, the Lesser Dog (E). الكلب الاصفر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها بعد الكلب الاكبر الى الشرق || مجموعها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب انور من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يغيب في ثقب الشام . وتسميه ايضاً « الغميضاء » . وتسمى الكوكبين اللذين على الذراع « الذراع المتبوس » او « مرزم الذراع » .

## ٢٣٨٦٤ - كَلْبٌ أَكْبَرُ

le Grand chien (F). ٢٣٨٦٤ - كَلْبٌ أَكْبَرُ  
Canis major, the greater Dog (E). الكلب الاكبر كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها خلف كوكبة الجوزاء ولذلك تدعى كلباً || عدد مجموعها تسعة وعشرون . والعرب تسمى النير الاعظم الذي على موضع الفهر « الشعرى العبر » . وكان قوم في الجاهلية يعمدونه لانه يقطع الباء عرضاً دون غيره من الكوكب . وهي عبوراً الى عبر الهجرة الى سهيل ، ويسمى ايضاً « الشعرى البانية » لان مغيبه في ثقب الين . اما الاربعة التي منها على كتفه وعلى ذنبه وما بينها وعلى فخذها فتدعى « المذارى » والاربعة المصطفة على الاستقامة تدعى « القرد » .

## ٢٣٨٦٥ - كَلْبُ الْأَوْكَارِ

Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E). سلالة من الكلاب النشطة الشقيقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والزابذب وغيرها .

## ٢٣٨٦٦ - كَلْبُ الْبَحْرِ

Requin (F). ٢٣٨٦٦ - كَلْبُ الْبَحْرِ  
هو القرش ، اطلبه .

## ٢٣٨٦٧ - كَلْبُ الْبَحْرِ

Emissole (F). ٢٣٨٦٧ - كَلْبُ الْبَحْرِ  
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيتل ، اطلبها .

٢٣٨٨٧ - كَلْسُومَةُ حَرَشَةِ ٥

*Calosoma rugosum* (S). *Calosome rugueuse* (F).  
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها نحو ٢٥ م.  
ثوبها اسود اللون. غمداءا مخدائد يعلوها مولج أخضر.  
اسفح || تكثر في الصيف على الانجبار الحرجية وفي  
الحادائق والجنان حيث تقترس يرقات غيرها من الحشرات  
أخصها يرقات فصيلة السفيقيات .

٢٣٨٨٨ - كَلْسُومَةُ مَاكِرَةِ ٥

*Calosoma sycophanta* (S). *Calosome sycophante* (F).  
*European Calosoma beetle* (E). *Puppenräuber* (D).  
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها براوح من ٢٥  
الى ٣٥ م. رأسها وكسلها الى الزرقه ، غمداءا مستعرضان  
الشكل ، لونها الى الخضار المنهب الاسفح المواجه .  
تألف الغابات والحادائق حيث تقترس على تيسر لها من  
يرقات الحشرات أخصها اساربع القرزيات .

٢٣٨٨٩ - كَلْس ، جَبْر ٥  
*Chaux* (F).  
هو اكسيد الكلسيوم ، اطبله .

٢٣٨٩٠ - كَلْسُومَةُ ٥  
*Calospora* (S).  
جنس فطور مجهرية من الرفقيات . تتميز ببوغها المستطيل  
القد ، الشفاف الجسم ، الشفعي الانقسام والبوري  
المعترض || له نوع واحد هم الاقتصاد الزراعي يدعى  
كلسيومرة الويلة .

٢٣٨٩١ - كَلْسُومَةُ الْوَيْلَةِ ٥ ، لَصُوفُ الْوَيْلَةِ ٥  
شُحْرَانُ الْوَيْلَةِ ٥

*Calospora vanillae*, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthraco*  
*se de la vanille* (F).  
فطر مجهرى يركب اوراق وممار الويلة فيقطعها ويذوبها .  
مظهره الخارجى على الاوراق فقط سمر توشم صفحة النصل  
البيا فتعطب النسيج وتمرقل فوق الجسموري . وهو على  
المبار قروح صغيرة مستديرة فحمية اللون تصيب القرن  
في احد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح  
فور ظهوره على الادواق لمحلول بورود المركز من ١  
الى ١٥ ٪

٢٣٨٩٢ - كَلْسُومُ ٥  
*Callistemon* (S). *Callistème* (F). *Callistemon* (E).

جنس اشجار وجنبات معمرة من فصيلة الاريات . انواعها  
المعروفة عديدة ، منها فسيح الاجزاء ، يمتد من الشرق  
الاسوط والاقصى الى امريكا واوراقها استرالية || سرفها تملو من  
مترين الى سبعة امتار . اوراقها ايده ، متعاقبة ، متقاربة ،  
منعقة . نصلها ستانية ، جامدة ، ازدهارها سنبل التجميع .  
ازهارها مختلفة الخصب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ،  
التالية :

٢٣٨٩٣ - كَلْسُومُ أَيْنِ ٥

*Callistemon speciosa* (S). *Callistème élégant* (F).  
نوع من الكلسوم . يثيرته تملو نحو سبعة امار .  
أغصانها وأفانها وأفانها حمر اللون . اوراقها تملو نحو  
١٠ سم . نصلها فواحة العرف الطري ، خلية البشرة  
في اول عودها . سنابلها الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره  
الى الصفار المايح الجميل || تنويره يستمر من آذار الى  
حزيران

٢٣٨٩٠ - كَلْبَم ٥  
*Géophyte* (F). *Geophyte* (E).  
كل نبات تكون أعضاء كائنه المائية مدفونة في التراب  
كالباتبات السقولية والدوفصية والبصلية .

٢٣٨٩١ - كَلْبَمُ \* ٥ ، لِسَانُ الْمَزْمَرِ

*Salpiglossis* (S). *Salpiglosse* (F). *Painted tongue*, *Val-*  
*vet flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).  
جنس نباتات عشبية حولية ثرينية من فصيلة الباذنجانيات.  
انواعها المعروفة خمسة اما عروبه فكثيرة العدد جميعها زياه  
الاعضاء لزجة . سرفها فراء منتصبه تملو من ٤٠ الى  
١٢٠ سم . اوراقها منعقة اهلجية ذرية . ازهارها قمية  
الشكل ، كبيرة ، القد تملو من ٤ الى ٦ سم . اقلام مدقاتها  
مبطلة . ألوانها عديدة تختلف مع الصروب منها الاصفر  
والاحمر والازرق والبنفسجي والايض والموشح والمنسج  
والمرقط || ازدهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٨٩٢ - كَلْبَخ ٥  
*Férule commun* (F).  
هي القنة المبذولة ، اطبلها .

٢٣٨٩٣ - كَلْد ٥  
*Cumuler* (F). *To accumulate* (E).  
كالد الشيء : جمعه وجمل بعضه على بعض .

٢٣٨٩٤ - كَلْدَةٌ ٥  
*Terrain dur et compact* (F).  
هي التربة الصلبة المتندجة .

٢٣٨٩٥ - كَلْدُودَةُ مَبْدُودَةٍ ٥

*Eupithecia vulgata* (S). *Eupithécie vulgaire* (F).  
*Eupithecia vulgata* (E).  
حشرة مبدولة من الريفات حرشيات الاجنحة . مطبها  
معظم الاسفح المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى الى  
اروبه . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها  
خاضعة قوتها اوراق الصيرانيات والشفويات والمركبات  
جسمها صغير قضيض يطول نحو ٨ م . بسطها نحو ٢١ م .  
رأسها حنطى اللون . عينها صغيرتان . زبانها مشطيان  
عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى  
الحنطى الاكلف المواجه || رواشها ، عند الشقين ، الى  
الحنطى الاكلف تملو في الزوج الامامي بقجتان ونقطة  
مستطيلة الى البني الاسمر المواجه وسبع نقط بنية في الحثار  
الخارجي . تملو في الزوج الخلفي مشعة بنية وسبع نقط  
صغيرة تتأخم الحثار || لها جبل واحد في الحول . تظهر  
الفراشة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح  
من العصر الى فحة الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة  
اسابيع وتتبع المكان مباحدا على الصفحات السفلى من  
نصل الاوراق || السرعة تملو نحو ١٩ م . جسمها شبه  
وشمي الشكل . ثوبها الى الخضار الزيتي تملو رقشة غبراء  
وسط بجي قالب اسمر وقسمه خطوط جانبية وردية . رأسها  
اسود . رواجها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تنقوس  
عند الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٦٠  
يوما ينتهي في الجلالة او بين فروع النبات التي تالاس  
التربة ضمن جراب مخرومي الشكل يتفلق عند انطلاق  
الفراشة .



كَلْم



كَلْدُودَةُ مَبْدُودَةُ



كَلْسُومَةُ مَاكِرَةِ

٢٣٨٩٦ - كَلْسُومَةُ ٥  
*Calosoma* (S). *Calosome* (F).  
جنس خنافس نافعة من فصيلة السلكوتيات . انواعها  
عديدة تقتلك بيض الحشرات الضارة .

## كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

والاستوائية || معظم انواعها اشباح حولية او معمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زياه السماء خلية الوراق . ازهارها رؤسية ، عديدة الالوان . تنويرها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكلسير والطاعة والقلادة .

## Calcium

## ٢٣٩٠٢ - كَلْسِيُوم

عنصر فلزي غير اللون ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca-ك) وزنه الذري ٤٠.٠٨ ينصهر في ٨١٠°مغ ويغلي في ١٤٨٧°مغ . وهو من الاجسام الشرفة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركباً من بعض العناصر اهمها اكسيد الكلسيوم او الكلس الحلي . ثم كربونات الكلسيوم وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة على هيئة ركام او طباشير او جص . ثم كبريتات الكلسيوم الموجود في الطبيعة على هيئة حصى ومرمر . ثم فسفات الكلسيوم الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الاسجة النباتية .

## ٢٣٩٠٣ - كَلْسِيْسِيْن ، كَلْسِيْسِيْن ، سُوْرْتَجِيْن

Colchicine (F). Colchicin (E). مادة قلوية بلورية متياسرة تستخرج من سورجان الحريف تقل عند ١٤٥°مغ . تلوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

## Crevasses (F). Chaps (E).

## ٢٣٩٠٤ - كَلْع

قش صفى يحصل في جلد اسراع الدواب .

## Macule du soleil (F).

## Sun-spot, Macula (E).

## ٢٣٩٠٥ - كَلْف

## Galvanomètre (F).

## Galvanometer (E).

## ٢٣٩٠٦ - كَلْفَانُومِيْتَر

مقياس القوة الكهربائية اي شدة التيار .

## Phyllosticta (S).

## ٢٣٩٠٧ - كَلْفَةُ

جنس فطور مجهرية من الفصليات . بكتيدات فمية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الوانها عابكة ، مقه واضع الارتكاز ، شفراتها بسيطة ، قصيرة وشغافة || يركب الوراق فيوشم نسيجهما ويؤذيها || انواعه عديدة . اغمرها ما يتبع .

## ٢٣٩٠٨ - كَلْفَةُ الْاِسْبَانِجِ

## Phyllosticta spinaciae (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الاسبانج فيلذوها . مظهره الخارجي يقع كبيرة مستطيلة تملو نصل الوراق . تبدو حنطية اللون ثم غبراء ، تسب ذبول النسيج ويابه . يكلفها باقتطاع الوراق المصابة عند ظهور الومص .

## ٢٣٩٠٩ - كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا \*

## Phyllosticta fusiformis (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الاكيدنيا . مظهره الخارجي بنور مستدير فطرها نحو ٣ م . تركب النصل على صفحته العليا . تبدو حراء اللون ثم سمراء || بكتيدات حكاكية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شفراتها نغفية الجسم . يوفغاته مستطيلة قياسها نحو ٤×٩ ميكرون || يمري الاجشجار الضعيفة دون سواها . لذلك يجدر الاعتناء بالتسميد .

## ٢٣٨٩٤ - كَلْسْتُوم جَامِدِ الْوَرَق \*

## Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).

نوع من الكلسيوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها ضيقة ، جامدة ، ذرية ، تطلو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ م . || سابلها الزهرية حراء اللون ، قريزية الموج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز

## ٢٣٨٩٥ - كَلْسْتُوم سَتَافِي، الْوَرَق \*

## Callistemon lanceolata (S). Callistème à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكلسيوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية ، ضيقة ، تطلو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ م . نصلها جلدية ، حراء اللون في اول عهدها ثم خضراء . سابلها الزهرية الى الحمرة الدودية || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٣٨٩٦ - كَلْسْتُوم فَصْصَانِي الْوَرَق \*

## Callistemon saligna (S). Callistème à feuilles de saule (F).

نوع من الكلسيوم . تجرته تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنانية تطلو نحو ٨ م . وتعرض نحو ٢ م . نصلها جامدة ، مبيضة الغدد الدهنية العطرة . سابلها الزهرية صفراء اللون . ازهارها شديدة الصغر || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٣٨٩٧ - كَلْسْتُوم صَوْبَرِي الْوَرَق \*

## Callistemon pinifolia (S). Callistème à feuilles de pin (F).

نوع من الكلسيوم . جنبته صغيرة القد ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كأوراق الصنوبر . سابلها الزهرية كثيفة التجميع ، لونها الى الخضار الاصفر الموج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٣٨٩٨ - كَلْسِيْ ، جِيْرِي ، جِيْصِيْ

## Calcaire (F). Calcareous (E).

ما كان جصي التركيب او ما كانت تغطي على تركيبه مادة الجص .

## ٢٣٨٩٩ - كَلْسِيْت \*

## Calcite (F).

## Calcite, Calc-spar (E).

كربونات الكلسيوم الطبيعي المتبلور .


## ٢٣٩٠٠ - كَلْسِيْر

Calycera (S). Calycère (F). جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او معمرة من فصيلة الكلسيريات . انواعه المروفة قليلة البد ، منبها الطوي بعض اسحاق البلاد الحارة ، اغصها الشيل والبيرد || سوفها عفاية وبرية متكاثفة الرطب . اوراقها صفيرة ، سنانية النصال الخلفية او المرطاب . ازهارها وويبية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردى فالازرق || تنويرها ربيعي .

## ٢٣٩٠١ - كَلْسِيْرِيَات \*

## Calyceraceae (S). Calycéracées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . تربتها بين المركبات والديسميات . اجناسها وانواعها المروفة متوسطة العدد ، منبها بعض اسحاق البلاد الحارة



كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

عديدة، مبعثرة، قصيرة، سوداء اللون. بويغاته بيضيه شفافة، قياسها ٢×٥ ميكرون .

### ٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَابِقَةٍ \*

*Phyllosticta congesta* (S). Blotch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الأوراق والثمار || مظهره على الأوراق يقع صغيرة تقش النصل، تبدو حطية ثم طحلاء وأخيراً قضيبة اللون || وهو على الثمار يقع قرحية مستديرة لونها الى السمرة يكتنفها اطار مهدب || يكافح مكانة كلفة التفاح. وبهم من فضل الفواطر غير المرتكزة على النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْفَنَ (F). To galvanize (E). Galvaniser (F).

٢٣٩١٨ - كَلْفَنَة ، كَلْفَن (F). Galvanisme (F). Galvanism (E).

٢٣٩١٩ - كَلْفَنِي (F). Galvanic (E). Galvanique (F).

٢٣٩٢٠ - كَلْكَسَة (F). Putois (F). هي ابن عرس ، اطلبه .

٢٣٩٢١ - كَلْمَار (F). Calamar (E). Calmar (F).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الأرجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهندى || اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. ومنها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم. جميعها عشارية الجرامز المستطيلة ، العادمة الفاصل المنبهة بكل من المهاجر تمكثها من القبش على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْمَبُولِيَّات (F). Collemboles (F). هي الكهليليات ، اطلبها .

٢٣٩٢٣ - كَلْمَكْنِيَّات (F). Ubiquité (F). Ubiquity (E).

الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْمِيدَة \* (F). Chlamydospore (F).

اسم يطلق على بوغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطرفي. ولكنكيد يعتبر من البوغ المتخدر الذي لا ينش قبل انقضاء زمن بيانه .

٢٣٩٢٥ - كَلَنْثِيَّاس \* (S). Callanthias (F).

جنس اسماء بحرية من شائكات الزعانف وفضيلة الفريحيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المتدلة الحرارة اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم. زعانفها الظهرية مستطيلة مقطوعة . زعانفها الذيلية فارقة دقيقة الاطراف . اثوابها اقراوش من الشقعة الصنانية الى الوردي . ظهورها اعقب لونا من بطونها || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلَنْدَرِين (F). Calandrinia (F). Calandrine (F).

جنس نباتات عشبية حولية بعمره من فصيلة الرجليات . انواعه قليلة جميعها تزيينية اعطائها البلاد الامريكية الشمالية

٢٣٩١٠ - كَلْفَةُ التَّبَع \* ، فِلُتْسْتِيكَتَا نِيكُولِيَّانَا (S). *Phyllosticta nicotianae* (S).

فطر مجهري من الصننيات، بكتنياته خضية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم ترقى الى السطح . مقه واضح الارتكاز شفراته بضيئة التركيب ، قصيرة القد ، شفافة || يركب اوراق التبغ فيوشم وثن النصل يقع مستديرة لاقياسه براوح قطرها من ١ الى ١٠ م. تبدو صنانية اللون وتستقر على الخشلي الاسمر || اغماره زيدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١١ - كَلْفَةُ التَّفَاح (S). *Phyllosticta solitaria* (S). Blotch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه وافناده وثماره . مظهره الخارجي على الأوراق يقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا، غبراء أو مفراء اللون، تركيب النصل فتقشي على نسجه الادمية || وهو على الافناده قروح مستديرة أو مستطيلة طولا نحو ٣ سم. لونها الى الجؤرة تركيب البعاء كقتيب جفافه وانصداع بشرته || وهو على الثمار يقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمرة يكتنفها اطار اخر ، تتسع مع حجم الثمرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م. || يكافح باستمال سائل يورده المحلول ٠.٦٪ حيث تنضج الاشجار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية ياسويين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || وبهم من استعمل سائل يورده الحادي ٠.٤٪ من سلفات النحاس مع ٠.٨٪ من الكلس .

٢٣٩١٢ - كَلْفَةُ المَخُوح \* (S). *Phyllosticta prunicola* (S).

وصم يصيب المخوخ والاجاص سببه فطر مجهري يركب الارراق فيعطبا ويقودها الى الاعمال الباكرا || مظهره الخارجي بثور مستديرة او بيضية الشكل تملو النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون ، وماء المحور ، بنفسجية الاطار || يظهر في اوائل آب ويعمل الاوراق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الزَيْتُون (S). *Phyllosticta oleae* (S).

فطر مجهري يمتري الزيتون باراقه الفتية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي بثور مستديرة قطرها نحو ١ م. تركيب النصل على صفحته العليا . تبدو حطية اللون ثم غبراء يحيطها اطار اسمر || بكتنياته عكازية الشكل ، شفافة، لقياسه ٣×٣.٥ ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظراً لقلّة اذاه .

٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السِّيَم \* (S). *Phyllosticta antirrhini* (S).

فطر مجهري يصيب السيم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الاوراق ، بثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ م. لونها الى الصهبة يكتنفها اطار اخر || وهو على الفروع يقع قرحية لونها الى الجؤرة السمره || بكتنياته غليظة ، لاقياسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويغاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَلْبِيَّات (S). *Phyllosticta brassicae* (S).

فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٨ م. تركيب النصل الاوراق ، تبدو فاقمة الخضار ثم غبراء اللون || بكتنياته



كلفة التبغ



كلفة الخوخ



كلفة عابقة



كلثياس



كلنكو

والجنينة . اوراقها متعاقبة . ازهارها جملة الشكل ، زاهية الالوان ، لاثامية التجميع والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

### ٢٣٢٢٧ - كلندين خيمية

(F). *Calandrinia umbellata* (S). *Calandrinia en ombelle* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فناء جزئية اللون . فروصها فائشة . اوراقها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتي . ازهارها صغيرة التجميع ، تاحية الارتكاز ، كثيرة العدد ، صفيرة القذ ، حراء اللون ، بنفسجية الموالج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٣٢٢٨ - كلندين زخيفية

*Calandrinia discolor* (S). *Calandrine discolor*, C. *élégante* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ٨٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها ملعقة مقطوعة ، نصلها بحري الصفحة العليا ، احمر السفلى . ازهارها عقنودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٤ الى ٦ سم . لونها الى البنفسجي الازرق الموالج . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ٢٣٢٢٩ - كلندين فاخرة

*Calandrinia spectabilis* (S). *Calandrine remarquable* (F). عشية تزيينية حولية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها معينة الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم . نصلها بحري اللون جامد الصفحة . ازهارها عقنودية التجميع ، كبيرة القذ ، قطرها براوح من ٥ الى ٧ سم . لونها الى الازرق الموش والمضلع بالاسود || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٣٢٣٠ - كلندين كبيرة الزهر

*Calandrinia grandiflora* (S). *Calandrine à grandes fleurs* (F). جملة تزيينية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها منتصبه فراء . اوراقها بيضيه ذرية تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٨ سم . نصلها اخضر اللون ، سميك الصفحة . ازهارها كبيرة القذ نورية التجميع ، محورية الارتكاز ، قطرها براوح من ٤ الى ٦ سم . لونها الى الودي الموش بالاصفر والاسود || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

### ٢٣٢٣١ - كلندين متزي

*Calandrinia menziesii* (S). *Calandrine de Menzies* (F). عشية تزيينية حولية منتبسة . ساقها تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها السفلى ملعقة الشكل تطول نحو ٨ سم . اوراقها العليا سانية ضيقة . جميعها مالة النصل الاخضر . ازهارها عقنودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ، صفيرة القذ ، ارجوانية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ٢٣٢٣٢ - كلندينليات

*Calandrinia* (F). *Calandrinia* (E). بسيط من فصيلة الرجليات يشمل بعض الاجناس والانواع . نباتاته عشية او مجلية وبنجينة . معظمها امريكي المنبت . ازهارها خشوية . ثمارها جراء ثلاثية الفلق .

### ٢٣٢٣٣ - كلنكو

*Kalanchoe* (F). *Kalanchoe* (E). جنس نباتات طيبة معمرة من فصيلة الخلدات . انواعه نحو

### ٢٣٩٣٤ - كلنوس

(S). *Calanus* (F). *Calanus* (E).

دوبية بحرية من القشريات مجذافات الارجل وفصيلة الكلنوسيات || جسمها صغير الجرم ، شبه غروفي الشكل مستعرض الصدر ، وريد العين ، عادم الحاف || تعيش على الطلوح . جماعتها وافر العدد .

### ٢٣٩٣٥ - كلنوسيات

(S). *Calanidae* (F). *Calanidae* (E).

فصيلة دوبيات مائية من القشريات مجذافات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها لكثيرة ، معظمها بحري يعيش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في الانهر والبحيرات والمناطق .

### ٢٣٩٣٦ - كلنكو ، كلنية ، حقو

(E). *Rein* (F). *Kidney* (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . هما كلنات او سقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية .

### ٢٣٩٣٧ - كلنكو الماء ، لاجم الضفدع

(S). *Hydrocharis morsus-ranae* (S). *Hydrocharis*, *Hydrocharide*, *Morrène*, *Mors de grenouille* (F). *Frog-bit*, *Frogs-bit* (E). *Echter Froschbiss* (D). *Favagello di chiana*, *Morso di rana* (I).

نبات عشية بري مائي معمر وصيد الجنس والوتع من فصيلة كلويات الماء . يعيش في المياه الراكنة وتزين به الاحواض . سوقه سلبية متقاربة القذ . جلوهه ضمية التجميع تنشب من القذ . اوراقه مستطيلة الاضلاع كلوية الشكل تطول وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها سميك الصفحة اخضر اللون . ازهاره ثلاثية الفصل والبتلات البيض || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٣٩٣٨ - كلور

(E). *Chlore* (F). *Chlorine* (E).

غاز سام اقل من الهواء لونه الى اخضر الزيتي . رائحته محرقة تثير السعال . وزنه الاتوني ٣٥.٤٦ رمزه (كل Cl) || يوجد في الطبيعة مختلطاً بغيره من العناصر المختلفة اخصها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو يتميز بجملة الشديده الى الاتحاد بالفلزات والالافزات . يتبر من المظهرات المشهورة يستعمل في تطهير مياه الشرب . كما انه يستخدم في اغراض ثي اهمها تبييض للمنسوجات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الغازات السامة .

### ٢٣٩٣٩ - كلوروس

(S). *Chlorops* (S).

ذباب اسفر اللون يعرف بخضراء العين ، راجع خزياء .

### ٢٣٩٤٠ - كلوروبلست

(E). *Chloroplaste* (S).

جسيمات الخلايا النباتية الملونة بالمخضف والتي يتركز عليها التمثيل الخفصبي .

### ٢٣٩٤١ - كلوروفرم

(F). *Chloroforme* (E).

(E). *Chloroform* (E).

سائل عادم اللون اثري الرائحة ينتج عن الكلور مع الكحول يستعمل في الطب كمنج يخذل الاعصاب .



كلو الماء

كيرثان. زباناها صولجانيان. جوشنها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج. بطنها اصغر القوب اسمر المواج || رواشها ، عند الشقين ، الى الخططي الاسمر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفي حثار ضيق اغبر وتنفوذا حنطية تبدو كزوائد نودلية الشكل || لها جويلان في الحول. تظهر فراشة الجليل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجليل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتمتص المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من نصال الماعل || السرعة تطول نحو ١٤ م. جسمها مستطيل الوسط، مستدق المقدم والمؤخر ، كسني اللون يملو غطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية. اما الطوق الصدري الاول فأسود كالرأس. مدنها ورواجها الى السمة || طور الاكمال الذي يستمر في الجليل الاول نحو ١٥ يوما وينتقص معلقا بانفان النبات ، يستمر في الجليل الثاني نحو ٣٠ اسبوعا .

Kaloula (S). **كلولة** ٢٣٩٥٠  
Kaloula (F). Kaloula (E).

جنس ضفادع قازية من فصيلة الرزانيات . انواعها المعروفة خمسة . موطنها الهند والصين وماليزية والفلبين || اجسامها مستدلة القد او صغيرة . تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحاجر طرفية . حطائها قليل الانبساط تمتد حتى اوائل الزمان الثاني من الاصابح . انوثاها السائلة الى السرة الزيتية يملوها تبغيع اشهب اسمر ورقعة حنطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم .

Collomia (S). **كلوميّة** ٢٣٩٥١  
Collomie (F). Collomia, Queen Ann's thimble (E). Blumenschleimame (D). Collomia (I).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبياس . انواعها قليلة ، سوقها واوراقها زياء لينة . ازهارها رويسية كثيفة التجميع . يستخرج من بزورها غراء نباتي يدخل في عدة تركيب || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

Collomia coccinea (S). **كلوميّة أزجوانيّة** ٢٣٩٥٢  
Collomie écarlate (F).  
عشبة زرينية سبروتية تعلو نحو ٥٠ سم . ساقها قليلة الفروع ، زياء اللحاء . اوراقها بيضيه مستطيلة ، نصلها ثلاثي او رباعي التشرع القدي . رويسياتها الزهرية متوسطة القد . ازهارها حر الابواق صفر الاناياب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

Collomia grandiflora (S). **كلوميّة كبيرة الزهر** ٢٣٩٥٣  
Collomie à grandes fleurs (F).  
عشبة زرينية سبروتية تعلو من ٢٠ الى ٧٠ سم . ساقها فراء . اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم . وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها خيل البثرة . رويسياتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها مستطيلة ، كؤوسها سننة الحافة ، توجعها تظهر صفراء اللون ثم تتحرف ، مع الادراك ، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

Hydrocharidae (S). **كلوريات الماء** ٢٣٩٥٤  
Hydrocharidae (F). Hydrocharidae (E).  
فصيلة نباتات مائية من فصيلة الغلقة . اجناسها وانواعها عديدة . اعرف اجناسها الاقطنان والطورق وكلفة الماء ووش الماء .

٢٣٩٤٢ - **كلوريدات ، هيدروكلورات**  
Chlorhydrate (F). Hydrochlorate (E).  
هو ملح الخافض الكلوريديني .

٢٣٩٤٣ - **كلوريد هـ \***  
Chloridea (S). Chloride (F).  
جنس حشرات ضارة من فصيلة الزعقوقيات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة القد خيفاس الجسم . مستطيلة القرون الاستشعارية الشاربية الفواصل . اوثاها زاهية . اتحادها مخددة يعترضها تجلديج وتسنيج . رقبتها خاضلة او ناهمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل .

٢٣٩٤٤ - **كلوريد البوتاسيوم ، كلوريد البوتاس**  
Chlorure de potassium (F). Chloride of potassium (E).  
سماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء ويبيض انفعله وتركيبه في التربة .

٢٣٩٤٥ - **كلوريد الصوديوم ، كلوريد الصوديوم**  
Chlorure de sodium (F). Chloride of sodium (E).  
هو ملح الطعام المعروف .

٢٣٩٤٦ - **كلوريل هـ**  
Chlorelle (F).  
جنس نباتات مائية من الخليات الخضف وحيدات الخلايا المجهريات . هيكلها كروي الشكل ، قطرها نحو ٨ ميكرون . تعيش في المياه العذبة جماعات واقر العدد على المدارات والجذريات وغيرها || وهي وافرة المواد الغذائية اغصها البروتايين والفولوسيد والدم والفيتامينات والكثير من طفيف المتاصر || تكاثرها الصنعي في المحيط الملائم يعطي اجود النتائج . نتاجها الجاف واقر المواد الغذائية القيمة .

٢٣٩٤٧ - **كلوزيات**  
Clusiaceae (S). Clusiaceae, Guttifères (F). Clusiaceae (E).  
فصيلة نباتات من ذوات الفلقين عديدة القعالات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات سوقها منتصبة او عارشة . اوراقها ابيدة جامدة النصل . ازهارها عشقودية التجميع ، محورية الارتكاز او تاجية . ثمارها نورية ، ثمرورها جلدية ، لبها غزير المصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصعب بنية بعد جفافها .

٢٣٩٤٨ - **كلوزيّة**  
Clusia (S). Clusie, Clusier (F).  
جنس نباتات عارشة متسلقة من فصيلة الكلوزيات . انواعها قليلة، سوقها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتقتضي عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون ، دبق المادة الراتنجية ، يستعمل في تلييب جروح الحيوانات اغصها الخليل والبقير .

٢٣٩٤٩ - **كتوفريس العوسج هـ**  
Calliphrys rubi (S). Calliphrys des ronces (F). Calliphrys rubi (E).  
حشرة من فصيلة اللقييات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على العوسج واللوزا والزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. يسقطها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الحجم . عينها



كلوريد هـ



كتوفريس العوسج



التجميع ، محورية الارتكاز أو تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لأنها إلى الحمرة البنفسجية || أشهر أنواعها ما يلي .

#### ٢٣٩٦٥ - كليكرَبه أرجوانية ٥

جنية تزيينية وفرة مهدا اليابان. تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم. نصلها انخسر الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عقابدها الزهرية رطلة ، أزهارها أرجوانية اللون زاجية || أزهارها يستمر طوال شهر تموز .

#### ٢٣٩٦٦ - كليكرَبه أمريكية ٥

جنية تزيينية رفعة مهدا أمريكا الشمالية . تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها فراء . أوراقها مستطيلة الاعتناق ، نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها تاجية . بنفسجية اللون رطلة المتنايد || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

#### ٢٣٩٦٧ - كليكرَبه صينية ٥

جنية تزيينية جادة مهدا الصين. تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها فراء . أوراقها طول من ٥ إلى ١٠ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى وفيه نجسي التركيب. أزهارها تاجية كثيفة التجميع ودية اللون || أزهارها يستمر طوال شهر تموز .

#### ٢٣٩٦٨ - كليكرَبه يابانية ٥

جنية تزيينية سريرية مهدا اليابان. تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها منقطة طول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٦ سم. نصلها لامع الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، متباعد التستين المشاري . عقابدها الزهرية صغيرة القد. أزهارها ودية اللون || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

#### ٢٣٩٦٩ - كليكنثس \*

جنى جنات تزيينية سطرية من فصيلة الكليكنثوسيات. أنواعه ستة . سوقها منتصبه تملو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم. أوراقها كاملة متقابلة . أزهارها فردية ، محورية أو هامة الارتكاز ، جملة الشكل ، جذورية اللون ، فواحة العرف العطري الشبيه بالتفاح والشام .

#### ٢٣٩٧٠ - كليكنثوسيات \*

فصيلة نباتية من فوات الفلقين ، اجناسها وأزهارها عديدة . نباتاتها أشجار وجنات . سوقها وفورها مضطعة . أوراقها متقابلة . أزهارها جملة الشكل ، عطرية العرف .

#### ٢٣٩٧١ - كليمنيه \* ، كليمتيت

جنس حيوانات من الرغويات رأسيات الاجل رباعيات الخياشيم وفصيلة الفليثيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من متحجرات الحقبة الديفينية || اصدها قرصية الشكل ، معتدلة القد . اخدودها القروي يستمر من القرفة إلى العقب .

#### ٢٣٩٥٥ - كلى

من ريش جناح الطائر ما يكو قواعد الابار . والكل قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلحف الكبيرة والكبيرة يكو الابار .

#### ٢٣٩٥٦ - كلىة

هي الكوة ، اطلبه .

#### ٢٣٩٥٧ - كليترش \*

جنس قردو أمريكية من فصيلة السبوسيات . أنواعه ١٠ موطنها حوض الامازون . اجسامها رشيقة . رؤوسها مستندرة . فرائها متوسطة الطول . اذنانها كاسية معلقة لا اخاذة . اثنائها قصيرة الشعر المتجاين الالوان || تألف الاحراج والغابات . رتمها الاشجار تنفتل بينها بخفة الطير . قوتها التار والخشرات والمصابير .

#### ٢٣٩٥٨ - كليش ازغب

هو الصملول الازغب ، اطلبه .

#### ٢٣٩٥٩ - كليش أهيف

هو الصملول الاهيف ، اطلبه .

#### ٢٣٩٦٠ - كليثوسيب ٥

جنس فلور مؤدية من الفارقونيات مركب بمشبه القدي الشكل اريومات واساخ وجذور بعض النباتات الزراعية منها الموز والفواكه والكمية والكنيا والكروريه وقد تألف ايضاً ، في ظروف خاصة ، التفاح والمشش والقسط والجمبوزة والياسمين ٥ مشبه غزر المادة وافر القدد المتشبه . يتركز بين الحاء والشكر او بين الجردة والغلب فيعط الازرية والتنج على اختلافه ثم يقضي على التبادل اللسني || يكالنج بقتلح الاشجار الموسومة وتطهير التربة بالكلس الحراق .

#### ٢٣٩٦١ - كليجة \*

جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة الكليجيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة الحاف . تنطفل على الاسماك .

#### ٢٣٩٦٢ - كليجيات ٥

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات الدنيا مجذافيات الاجل . اجناسها وأزهارها عديدة . جميعها طفيلية تعيش على مختلف انواع الاسماك اغصها الفادسيات .

#### ٢٣٩٦٣ - كليش ٥

هو ملح الشيل كما يستخرج من المناجم وهو يذى بعد استصلاحه ونكره نترات الشيل او نترات الصودا الطبيعي

#### ٢٣٩٦٤ - كليكرَبه \*

جنس نباتات خنثية معمرة من فصيلة الساجيات . أنواعها قليلة معظمها تزييني . أوراقها متقابلة اهليجية ، مستطيلة ، مسنة الحافة ، غدية الصفحة السفلى . أزهارها عنقودية



كليرش



كليجة



كليكرَبه



كليكنثس



كليمنيه

## ٢٣٩٨١ - كَمَّءُ اسْوَد \* كُفْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).  
نوع من الكم المأكول الجيد الصنف. درنته كبيرة القدح حجمها قدر البيضة الصغيرة. ثمومها بارزة لونها الى الصبغة. لبائها اسود اللون اسفح المواج عند الادراك. تدرك في الخريف.

## ٢٣٩٨٢ - كَمَّءُ شَتْوِي \* بَسَات الرَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).  
نوع من الكم المأكول المتوسط الصنف. درنته مستديرة حجمها حجم الجوزة. ثمومها الى السمرة السوداء. لبائها احمر اللون يتحمل بتهكة خاصة. تدرك في الشتاء.

## ٢٣٩٨٣ - كَمَّاء Rabassier (F).

جامع الكرم.

## ٢٣٩٨٤ - كَمَّاء Truffe (F). Truffle (E).

واحدة الكرم.

## ٢٣٩٨٥ - كَمَّاء الماء Macre (F).

هي المكر، نبات من الاعديرات، اطمله.

## ٢٣٩٨٦ - كَمَّاح Préfloraison (F).

نشور اجزاء واعضاء الزهرة داخل الزمرة اي البرعمة الزهرية.

## ٢٣٩٨٧ - كَمَّاحة Frein (F).

هي الكباشة، راجعها.

## ٢٣٩٨٨ - كَمَّاح Pampination (F).

الكبح نومة براعم الكرم وانتشارها.

## ٢٣٩٨٩ - كَمَّاخة Protérante (F).

كلخ م كاخة. نمت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر قبل ان يورق.

## ٢٣٩٩٠ - كَمَّاد رِيُوس Germandrée officinale (F).

هو الطوقيون الحزني ويدهى أيضاً خامادريوس.

## ٢٣٩٩١ - كَمَّاس Kemas (S).

Céma (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبونة عاشبة عجمية من فصيلة الابلات. انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين وبشوروية. تألف الحفاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م. حتى ٢٧٠٠ م. عن سطح البحر. ملجنها احيائي جماعي. ايجالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٩ انفار || اجسامها قريبة الشبه باجسام الظباء كما وانها تشبه الحزى. قرونها صغيرة متتابة الحيد، مستدقة الاطراف المنحرفة الى الوراء. رؤوسها صغيرة ذلقة الاعظام. اعتاقها مستطيلة. قوائمها شديدة النشط. اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها السمرة الثبائية للماجات. فروع اثابها ثنائية الاخلاص. تحبل الاثنى يدوم نحو ستة اشهر تضع في تمامه بغفورا واحدا || اعرف انواعه واشهرها كاس غورال.

## ٢٣٩٩٢ - كَلْبُوب \* Calliopes (S).

Calliope (F). Calliope (E).

طائر من الجالوم وفصيلة الشحوريات. موطنه بعض المناطق الشرقية من القارة الاسيوية. ملجنه احيائي زوجي باستثناء زين القطار حيث يتجمع الى اسراب وافرة العدد. يألف البراري والحراج. قوته الحشرات الصغيرة والبلور البرية || جسمه صغير القدح، قريب الشبه بالبع، طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى السمرة الزينية المتفاوتة الماجات. رأسه وجناحاه اعين من رذاه. زوره احمر. منقاده غروطي الشكل. ذنبه معتدل الجرم، مقطوم الطرف || يذئن عشه على ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم. عن سطح الارض. الاثنى تحضن بمنابرة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات.

## ٢٣٩٩٣ - كَلْبُوبَة Cléome (F).

هي الذفرة، اطلبها.

## ٢٣٩٩٤ - كَلْبُوبِيم Butter (F). Raisin, Mounding (E).

الكم ويدعى التخييق هو جمع التراب عند سوق النبات. الغاية منه دم الساق وسحبها على انشاش الجذبرات وإبعاد الماء عنها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس، الخ.

## ٢٣٩٩٦ - كَمَّء \* كَمَّء Périante (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة اي جماع الكأس والتويج. وقد سمي كما لانه يستر ما ينشق عنه. ج اكمام وكمام واكم.

## ٢٣٩٩٧ - كَمَّء Tuber (S). Truffe (F). Truffle (E).

الواحدة كماء والمثنى كآتان والجمع كرم وأكوه وكآت. جنس فطور درنية من الرقيات وفصيلة الكمثيات. تنبت وتتكاثر تحت الارض فتتفصها. غلالها جلدي التسج || تولوي التركيب يحضن العدة التناسلية البوفية. لبائها سردى التركيب جامد المادة || انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاجام والالوان اشهرها ما يتبع.

## ٢٣٩٩٨ - كَمَّء اَبْيَض Tuber hiemalbum, T. album (S). Truffe blanche (F).

White truffle, False truffle (E). Weiße Trüffel (D). Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).  
نوع من الكم المأكول المادي الصنف. درنته متوسطة القدح منخفضة التحول. لبائها ابيض اللون مسكي العرف. تدرك في الخريف.

## ٢٣٩٩٩ - كَمَّء احمر \* مغرود Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E).

Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).  
نوع من الكم المأكول الفاخر الصنف. درنته مستديرة مقطوبة المقامة. ثمومها ناشرة لونها الى الجؤوي الاسمر. لبائها احمر اللون مستحب الطعم، تدرك في اواخر الخريف.

## ٢٣٩٨٠ - كَمَّء اَرْمَد \* بَسَات اَوْبَر Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F).

Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).  
نوع من الكم المأكول المادي الصنف. درنته بيضوية الشكل مفلطحة، ثمومها مستديرة مبططة رمادية اللون. لبائها اخضر. تدرك في الخريف.



كَلْبُوب



كَمَّء احمر



كَمَّء ابد



كَمَّء اسود



كَمَّء شَتْوِي

## \* ٢٣٩٩٩ - كَمَالِيَّةُ الْبَرِّ \*

*Alchemilla arvensis* (S). *Alchemille des champs*, *Perce-pierre des champs* (F). Break-stone, Colic wort, Persley plert (E). *Feldsinau*, *Steinbrech* (D). *Spacca pidra*, *Petricicolo* (I).  
نوع من الكمالية تكثر في المراعي الجبلية .



كاشير

## \* ٢٤٠٠٠ - كَمَالِيَّةُ الْمُرُوجِ \* كَمَالِيَّةُ مَبْدُولَة،

*Alchemilla vulgaris* (S). *Alchemilla commune*, *Mantelet de dame*, *Pied de lion*, *Porte rosée* (F). *Great sanicle*, *Lady's mantle*, *Lion's foot* (E). *Löwenfuss*, *Mantelsinau*, *Sinau* (D). *Alchemilla comune*, *Ventaglina* (I).  
نوع من الكمالية تكثر في المروج . أوراقها طليبة شاذقة وموارة .



كالة

## \* ٢٤٠٠١ - كَمَالِيَّةُ فِضِيَّة \* \*

*Alchemilla argentea* (S). *Alchemille argentée*, *Satinée* (F). *Alpine lady's mantle* (E). *Alpensinau*, *Alpen-frauenmantel* (D). *Alchemilla alpina* (I).  
نوع من الكمالية الممررة تكثر في أحرار الجبال العالية ، أوراقها خلية البشرة فضية اللون .



كالية البر

## \* ٢٤٠٠٣ - كِمَامَة ، مِفْطَمِيَّة \*

*Muflière*, *Muselière* (F). *Muzzle* (E).  
أداة تلتف في الحيوان تنم عن الرضاة والاكل والعص .



كالية المروج

## \* ٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي \*

*Cambrien* (F). *Cambrian* (E).  
اسم يطلق على الحفنة الأولى من الأياح القديم . ويقال العصر الكمبري والحفنة الكمبرية ، وهي تتميز بأحواشها على أقدم عظم الكرة الأرضية .

## \* ٢٤٠٠٥ - كَمْبُود \* \*

*Campodea* (S). *Campode* (F). *Campodea* (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الكمبوديات ورتبة لاطئات المتك . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || أجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، متعدلة التبطيط ، مبدرة الحلب اللينق الناعم ، تطول من ٤ إلى ٦ م . أطواها ألي البيضاء اللينق ، رؤوسها شبه مكورة . مناكها لاططة . قربونها الاستشارية غيبطة . عيونها شديدة الصغر . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكر ، قصية ، أي سرية السطب . قوائمها نحلة . أرساغها ثنائية العقل . أسراكها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المتحللة .

## \* ٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَات \*

*Campodeidae* (S). *Campodeidés* (F). *Campodeidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة لاطئات المتك . أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة البدن ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، قصية ، بيضاء اللون . عيونها شديدة الصغر . قوائمها عشارية السكر . رؤوسها ثلاثية . بطونها حوصلية تنفسية . سكها قوياتها الأولى مجهزة بزوائف حوصلية تنفسية . سكها الثانية والسابعة مجهزة بمرارد صغيرة . أطرافها الشرجية ثنائية الاسراك || أعرف أجناسها الكمبيو .



كمبود

## \* ٢٣٩٩٢ - كِمَاسُ غُورَال \*

*Kemas goral* (S). *Céma goral* (F).

نوع من الكماس . موطنه يمتد من كمشير الى بربانية وأصام . يألف الوعر والمواقع الكثيرة الصخور . يسرح من الصبح الى نحو الساعة الثامنة ومن العصر الى فحة الليل || جسمه ربعة بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم . عند الانثى . رأسه صغير الجرم ، ذلق الحطم . عيناه كيرتان مكشلتان ومطوختان بخار اصفر . اذناه صغرتان مستطيلتان الشكل . قوائمها شديدة النشط . ثوبه الى السرة الحمراء المواج يبق في الرأس والظهر ويتحول تدريجياً الى الشقعة في الصدر والبطن || اجله يعد ثمة انفار ، ذكر مانع واربع انثا واربعة شواذن .

## \* ٢٣٩٩٣ - كَمَاسِيَا \*

*Camassia* (F).

هي الكش من الزنايق ، اطليه .

## \* ٢٣٩٩٤ - كَمَاش \*

*Polycarpaea* (S). *Polycarpée* (F).

جنس نباتات عشبية حولية وبسرة من فصيلة النبنانيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها معظم الاصقاع الحارة من العالم القديم || سوقها مستقلة متعادية القروع . أوراقها متقابلة رحيمة التصال . ازهارها خاسية البتلات والسبال الفصيلة الحادة الاطراف . لونها الى البياض الاعصر المواج .

## \* ٢٣٩٩٥ - كَمَاشِير \*

*Athamanta macedonica* (S). *Athamante*, *Ache des rochers*, *Persil de Macédoine* (F). *Macedonian parsley* (E). *Macedonische Petersilie* (D). *Prezemolo di Macedonia* (I).  
نبات عشبي بري ممر ميلول من فصيلة الحميات . أوراقه مفروسة ومشرقة نصلها خلى البشرة على صفحتين . ازهاره صيوانية وردية اللون . يقال انه طلي يستعمل في معالجة الموارض المعوية .

## \* ٢٣٩٩٦ - كَمَافِطُوس \*

قال الانطاكي « هو الحامايطس يعني صنوبر الارض ثبت كمي » العالم الصغير في تقتيل أوراقه وامتلائها بالارطوية وراكانها له زهر اصفر يخلف حيا اصفر من زر الكركس ابيض الاصول مر الطلم يفتح السدد ويدر ويؤزل الرياح ويوجاع الطهر والمفاصل » .

## \* ٢٣٩٩٧ - كَمَالَة \*

*Echinus Phyllipensis* (S). *Kamala* (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة الليتوسيات . مهدها الهند . ساقها فراع . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، بيضية التصل المذهب الطرف . ازهارها عقودي التجميع تأتي الازتكاز ثمارها بلوطية الشكل تغلفها ثمل دقيقة تتحول الى غبار يرتقالي اللون حنطي المراج يستعمل في صباغ الالفة الخيرية ويستعمل ايضا لطرد البودرة الوحيدة . النشمة منه تزوح من غرامين الى ١٢ غراما وذلك بالنسبة الى عمر المرو .

## \* ٢٣٩٩٨ - كَمَالِيَّة \*

*Alchemilla* (S). *Alchemilla* (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . انواعه قليلة منها الحولية والممررة تكثر في المراعي والاراح الجبلية . يحزن اليها بعض الحواس الطيبة ويقولون انها شاذقة وتؤثر اغشية البكرة فتفنيه الزوايق ففقد كينهن .

بعض الاصناف الامريكية اخصها كليفورني والمكسيك ||  
جسمه كبير القد . طوله نحو ٧٠ سم . وبسطه نحو  
١٠٠ سم . ثوبه الى السواد اللامع . جناحاه مبلقان  
بالابيض . صدقة عينه الى الصفار الذهبي . منقاده وساقاه  
واصابعه الى الزرقه الطحلاء || اخلاقه رضية لكنه يتجنب  
الانسان ويبتعد عن الممران . يتسلق جنوع الاشجار  
قفراً . طيراته طويل الشوط كثير التجمعات والسيف ||  
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها واجناسها ثم الانحار  
البرية والبلوط || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى الموت .  
يدثن عشه في تجاويف الاشجار الرقيقة . الانثى تبيض  
من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي  
يؤن لها الغذاء .

### ٢٤٠١٩ - كمفيل اميري \*

*Campephilus principalis* (S).  
*Campephilus princier* (F).

نوع من الكمفيل موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية من  
فلوريدا الى كاريولينا والتكساس || جسمه كبير القد  
طوله نحو ٥٨ سم . وبسطه نحو ٨٢ سم . ثوبه الى السواد  
اللامع . جناحاه وعلاطا عنقه مبلقة بالابيض . صدقة  
عينه الى الصفار الذهبي . منقاده عاجي اللون . ساقاه  
واصابعه الى الزرقه || اخلاقه خنية لكنه كثير الرجل .  
قوته الحشرات والاساريج والنمل والثار البرية والبلور  
والبلوط || يتسلق الاشجار قفراً . طيراته معتدل الشوط  
كثير التجمعات || يعيش ذكراً وانثى لا يفرقها سوى  
الموت . يدثن عشه في تجاويف الاشجار على ارتفاع بعض  
الانحار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها  
وحدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

### ٢٤٠٢٠ - كمككات \*

*Kumquat* هي ليمون ككات . شجرة ريفية مشرحة من الحمضيات .  
لها ضربان مشهوران هما :

### ٢٤٠٢١ - كمككات مُستديرة \*

*Citrus japonica madurensis*, *Limonellus madurensis*  
(S). *Kumquat à fruits ronds*, «*Marumi*» (F).  
ضرب من الكمككات . اسمه الياباني «مارومي» || ثمرته  
سرسة متوسطة القد تملو نحو ٤ انحر . اوراقها معتقة  
متعاقبة سنائية . نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة .  
ثمارها كروية صفراء اللون مائلة البشرة . قشرها يراوح  
من ٢٠ الى ٣٠ م .

### ٢٤٠٢٢ - كمككات مُستطيلة \*

*Citrus japonica margarita*, *C. margarita* (S). *Kum-*  
*quat à fruits oblongs*, «*Nagami*» (F).  
ضرب من الكمككات اسمه الياباني «ناغامي» || ثمرته  
متوسطة القد تملو نحو خمسة انحر . اوراقها متعاقبة ،  
معتقة ، سنائية ؛ نصلها جامد الصفحة المائلة ، شديدة  
الخضار اللامع . ثمارها مستطيلة اجاصية الشكل صفراء  
اللون طويلاً نحو ٤٠ م . وعرضها ٢٥ م .

### ٢٤٠٢٣ - كمككام

*Essence de la marjolaine* (F).  
*Oil of the sweet marjoram* (E).  
هو دهن الرو يستعمل في العطارة . يستخرج بتقطير  
الازهار والاوراق بعد نقعها بالماء . وهو اصفر اللون  
يخضر ويبيض مع مرور الزمن . عرفه ذكي الرائحة ، حامز  
الطعم ، يغلي عند ١٦٣ شغ . ويذوب بالكافور في  
الكحول عيار ٨٥ .

### Cambium

### ٢٤٠٠٧ - كمبوم

هو القلب الطليقة المولدة في النبات .

### ٢٤٠٠٨ - كمم

هي الارسوة ، اطلها .

### Poire (F).

### ٢٤٠٠٩ - كمثرأة

هي الاجاصة ، ثمرة الاجاص .

### Poirier (F).

### ٢٤٠١٠ - كمثري

هي ثمرة الاجاص .

### ٢٤٠١١ - كمح

*Bourgeonner* (F). *To bud* (E).  
كبح الكرم اذا تحرك للبراق . واكحت الزمة اذا ما  
ابيضت وظهر عليها خلل كالقطن .

### ٢٤٠١٢ - كمثر

*Solive* (F). *Girder* (E).

### ٢٤٠١٣ - كمثر

الكسر من البسر : ما لم يربط على نخله ولكنه سقط فارطب  
في الارض . اما النخلة فكبار .

### ٢٤٠١٤ - كمثس \*

*Camassia* (S). *Camassie*, *Camash*, *Cyanotride* (F).  
*Camass*, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).  
من الاسم الهندي «كش» . جنس نباتات بصلية من  
فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٨ منها البرية  
والزراعية . اوراقها قرصية الانتشاب شقيقة مستطيلة .  
ضربانها اسطوانية جوفاء . ازهارها عنقودية التجميع  
يكلل الشاربخ . ازهارها نجمة الشكل فارشة || اعرف  
انواعها واشهرها ما يلي .

### ٢٤٠١٥ - كمثس جرتي \*

*Camassia hyacinthina*, *C. fraseri* (S). *Camassie-*  
*jacinthe*, *Camash-jacinthe* (F).

نوع من الكمثس البروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو ٣٠  
سم . بتلات ازهاره لثالية العروق تغلظ من ٦ الى ١٢ م .  
لونها الى الوردي يملو موج ليكي || ازهاره يستمر  
من نيسان الى ايار .

### ٢٤٠١٦ - كمثس ليشتلين \*

*Camassia leichtlini* (S). *Camassie de Leichtlin*,  
*Camash de Leichtlin* (F).

نوع من الكمثس البروتي الزنبقي . شراخه يملو نحو  
٩٠ سم . بتلات ازهاره خاسية او سباعية العروق  
تغلظ من ١٥ الى ٢٥ م . ضروبه المشهورة اربعة تختلف  
بالوانها منها الابيض والاصفر والازرق والبنفسجي .  
ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

### ٢٤٠١٧ - كمثس مأكول \*

*Camassia esculenta* (S). *Camassie comestible*, *Ca-*  
*mash comestible* (F).

نوع من الكمثس البروتي الزراعي المأكول البصل . شراخه  
يملو من ٤٠ الى ٨٠ م . ازهاره الى الزرقه اللبنة المولج ،  
بتلاتها خاسية او سباعية او تساعية العروق تغلظ من ٢٠  
الى ٣٠ م . مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٥ الى ٧ م .  
ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٤٠١٨ - كمفيل امبراطوري \*

*Campephilus imperialis* (S).

*Campephilus imperial* (F).

طائر من فصيلة التفاريات ورتبة المتسلقات . موطنه



كش



كمفيل امبراطوري



كمفيل اميري

مستديرة  
مستطيلة  
ككات



كُول



كهة مبدولة



كوكليت اربواني



كون



كون حيشي



كيشي

## ٢٤٠٣٣ - كَمِين \* ، سَنَوْت ، سَنَوْت

Cuminum cyminum (S). Cumin (F). Cumini (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الحبيبات . يزود من الافاوية وقد تستعمل في تطهير الحيز والجبن . ويستخرج منها مشروبات صحية نافعة || والكومن منه للعدة ، يحل الرياح والالارام ويبلغ سوء الحضم ويصر النفس والمغص . كان يستعمل في الطب القديم موقويا جليسيا بمزجه مع السمل والفلفل .

## ٢٤٠٣٤ - كَمُون اُرَمْسِي Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطلبها .

## ٢٤٠٣٥ - كَمُون حَبَسِي \* ، يَانِسُون بَرِي

Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sison (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة حولية من فصيلة الحبيبات . انواعه المرفوقة حصة اعطائها حوض وجزر البحر المتوسط ونبتا نوع حيشي المنبت . اوراقها تشبه اوراق الجزر . منافعها الطبية كمنافع الكومن .

## ٢٤٠٣٦ - كَمُون حُلُو Anis (F).

هو الانيسون ، اطلبه .

## ٢٤٠٣٧ - كَمِينَات Tuberaceae (S).

Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الذرة من الفطور الزقية اجناسها وانواعها عديدة اكثرها مستحب العلم مأكول . فوارقها الشكل والحجم والون والوئل .

## ٢٤٠٣٨ - كَمِين Baj (F). Bay (E).

من الوان اثواب الخيل للذكر والاُنثى ج ك ت . والفرس الكمينت اشد حرة من الاُنثى ويكون عرفه وذنبه اسودين وقوامه كذلك . والكمينت قد يكون :

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٩ - كَمِينَة Kitchi (F).

هو الذي يملو حوته سواد

## ٢٤٠٣٤ - كَمُون اُرَمْسِي Cyathea (S). Cyathée (F).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الكلوكليات . انواعه عديدة جميعها كبيرة القند تملو نحو ١٠ امتار . جذوبها زياء الحاء . اوراقها منتصبه ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ امتار . فصوصها اهليلجية الشكل ، مفشافية التسنين ؛ نصلها جامد النسيج ، اخضر الصفعة العليا ، قضي السفل || وهو يرغب في الاثره المعية النور المتوسطة الاندماج الكائنة في المارض الجنبوية الدافئة .

## ٢٤٠٣٥ - كَمُونِيَات Cyatheaaceae (S).

Cyathacées (F). Cyatheaceae (E).

فصيلة من البرانخس الوصائية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ نوعا حصة اجناس . اعطائها البلاد الحارة . تصلف للزئين انما يرغب في المواقع الرطبة .

## ٢٤٠٣٦ - كَمِينَة ، كَمِينَة Aveugle de naissance

هو ذو الكمة اي العمى يولد به الانسان او الحيوان .

## ٢٤٠٣٧ - كَمِينَة ، تَنْقُص Tanche (F). Tench (E).

الواحدة كمة . ولكنه جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم . انواعه قليلة تميز باجسامها الاهليلجية الشكل ويعدنبتها الفكيتين البقيتين . اعرف انواعه واشهرها الكمة المبدولة .

## ٢٤٠٣٨ - كَمِينَة مَبْدُولَة Tinca vulgaris (S).

Tanche commune (F). Common tench (E).

نوع من الكمة يعي مكنة نهريه ترغب في المياه الراكنة اغصها مياه الغدران حيث تعيش في اسماها طوطا عند ادراكها التام يراوح من ٢٤ الى ٣٧ سم . وزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوها صغيرة القند لينة . زعانفها الظهرية والصدرية والبطنية والثرجية مستطيلة ومستديرة الاطراف . ذنبها مستعرض مقطوم . ثوبا الى الحصار الاسفح الموج .

## ٢٤٠٣٩ - كَمُونِيَات Quamoclit

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة البليديات . انواعه قليلة جميعها زينة . سوقها عطق . اوراقها متعاقبة . ازهارها لاقياصة التجميع والارتكاز || تتكاثر بالبرز وتجدو في جميع الاثره الزراعية || اشهر انواعه التريينية ما يلي .

## ٢٤٠٣٩ - كَمُونِيَات اُرْجَوَانِي \* ، ياسمين اُحْمَر

Quamoclit coccinea, Ipomaea coccinea (S). Quamoclit écarlate, Jasmin rouge des Indes (F).

نوع من الكمونكليت الترييني السبروتي . ساقه تطول من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه قلبية الشكل جملة الحصار الزاهي . ازهاره عنقودية التجميع كبيرة القند . بتلاتها خمسة الزوايا ، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

## ٢٤٠٣٩ - كَمُونِيَات رِيْشِي \* Quamoclit pinnata, Ipomaea quamoclit (S).

Quamoclit penné, Q. cardinal, Liseron à feuilles laciniées (F). نوع من الكمونكليت الترييني السبروتي . ساقه تطول نحو ٣٥٠ سم . اوراقه كبيرة مفرصة متوازنة التشرم المشطي الذي يبدو كالريش . ازهاره فردية التجميع ، كبيرة القند ، وردية اللون ، ارجوانية الموج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

## ٢٤٠٣٩ - كَمُون Latence (F). Latency (E).

الكَمُون حالة الشيء الكامن .

Canarium (S). \* **كتناريوم**  
Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarlenbaum (D). Canario (I).  
جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطيئات.  
انواعه المعروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية،  
تفرز عصارة راتنجية بيضاء اللون بطيئة الاشتعال قوية  
الهب فواحة العرف المستحب. اغشائها صلبة بيضاء اللون  
لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

Gîte (F). Lair (E). \* **كتناس**  
مأوى الطي في الغاب بين الشجر يستريح فيه. ج كنوس  
واكتناس.

Lignée (F). \* **كتناشة**، \* **كتنح**  
Issue, Progeny (E).  
ج. كنتاجات وكناسح. هي الاصول الموصوفة المنتخبة  
كأمهات لسلالات نباتية معينة.

Tectonique (F). Tectonic (E). \* **كتناهة**  
علم يبحث في تكوين الأرض وتوغلها.

Cal (F). Callus (E). \* **كتنب**  
نسج دامل يغطي الفراغ الذي احدهه الجرح في الشجرة.

Callose, Callous \* **كتنّب**  
اندمال في الجلد مظهره نقط رافعة متصلة او نتوءات  
جامدة.

Equisette (F). \* **كتنّبات الحقل**  
٢٤٠٥٤ - هو الأسوخ، اطبله.

Prêle d'hiver (F). \* **كتنّبات الشتاء**  
٢٤٠٥٥ - هو الأسوخ الشتوي، اطبله.

Equisetaceae (S). \* **كتنّبيات**  
Equisétacées (F). Equisetaceae (E).  
هي الأسوخيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر  
الوعائية.

Chamaedorea (S). \* **كتنبار**  
Chamaedorée (F).  
جنس اشجار ليفية من فصيلة النخلات. انواعه المعروفة  
١٠ اصطلحها الاقاليم الحارة معظمها امريكي المنبت وبعضها  
افريقي. تزرع للزينة، جذوعها تملو من مَر إلى تسعة  
اقدام، سفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها  
عديدة، قنواها لبنة، ثمارها كرزوية الشكل والقذ،  
نافعة المادة للاستعملة || اشهر انواعه التزيينية :  
كتنبار النيق \*

Ch. elegans (S).  
Chamaedorée élégante (F).  
Ch. elatior (S). كتنبار شامخ  
Chamaedorée élevée (F).  
Ch. gracilis (S). كتنبار ظرفي  
Chamaedorée gracileuse (F).

Chenopus (S). \* **كتنبث** \*  
Chénopée (F). Chenopus (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
وفصيلة الكتنبثيات. انواعه المعروفة كثيرة العدد، المعاصر

Caecum (S). \* **كتميئة**  
Caecum (F). Caecum (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
وفصيلة الكتميئات || انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠  
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداها  
صغيرة، انبوبية الشكل، محلزنة القنة المقوسة. افواها  
دائرية. اسفاطها مدملكة، قرنية الغشاء. لولاسها عادمة  
العيون.

Caecidae (S). \* **كتميئات**  
Caecidés (F). Caecidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل  
اماميات الخياشيم وحيادات الاجهزة || اجناسها وانواعها  
المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الياح الثالث  
اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد  
يدعى كميئة.

Lepadogaster gouanii (S). \* **كتميئة**  
Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).  
سمكة من فصيلة الرغشيات يكثر وجودها في المتوسط. تتميز  
بكير رأسها وامتطالة زعانفها الصدرية والظهرية. جسمها  
متوسط القد، ثوبها جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي  
المذهب المواجه. بطنها فضي اللون. محسراها ونيج ظهرها  
معرضة التجليل الاسمر. لحمها متوسط الصنف.

Callosité (F). \* **كتناب**  
٢٤٠٤٥ - هو الجبسة، اطبلها.

٢٤٠٤٦ - **كتنار** \*، **كتناري**، **حزكار**  
Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F).  
Canary (E).  
نوع من النمر وهو صغفور غريد اصفر اللون، اخضر  
المواج يرق في الانقاص. ضروبه وسلالاته الحالية عديدة  
تختلف باختلاف الثوب والحجم || موطنه الاصل جزر  
كناريه وهو يألف الأماكن القريبة من الماء لانه يقتل  
كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ولواي النباتات وبعض  
الانعام السكرية اغصها التين الناضج الساك. وهو في  
القفص يعيش نحو ٢٠ سنة على بزر المكس والبسببية  
والقنيز والشليم المنقوع والخس والثآبر السكرية والخبز  
المنقوع بالحليب المنلي وصغار البيض || الانثى تحضن  
ثلاث مرات في الحول. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥  
بيضات صغيرة الحجم غبراء القشور المرقوشة بالجلوي  
رخيمها يستعمل ١٣ يوماً || وهي تضاف النمر والحسون  
والكمثر والخفيري والتفقيشي والشورور والدوري ...  
تفاجها نعل قوي الشكية متراكب الالوان المتداخلة  
المرتكة على الاصفر.

٢٤٠٤٧ - **كتنارين** \*  
Canarina (S). Canarine (F).  
جنس نباتات جبنية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها  
قليلة اصطلحها جزر كنارية. جذورها غليظة وشية. سوتها  
تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. عصارها حليابية دقة.  
اوراقها متقابلة، معتقة، رعيمة. نصلها مالمس الشبرة،  
مسن الحافة، بحري اللون. ازهارها قمية الشكل، كبيرة  
القد، مستطيلة الماعاليق متدلية. لونها الى الصفرة الذهبية  
عروقها الى الحمرة. ثمارها عنبية مأكولة.



كميئة



كنار



كتناريوم



كتنبار النيق

يشار الى ذلك باضافة « ١ » فيصح التعريف اذ ذلك كلاً او كلاً او كلاً الخ .

٢٤٠٦٦ - كُنْجُوْس ، كُنْجُوْس (S). Cajanus

Cajan (F).

جلس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي . اصلها البلاد الحارة والاسيائية . سوقها منتصبة . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها نورية التجميع . ثمارها قرون مبطلة مخضرة القواصل الحبية || اعرف انواعها واشهرها الكنجوس الهندي .



كنبت

٢٤٠٦٧ - كُنْجُوْس هندي \* ، قُرَيْشَاء ، سِيلَه هِنْدِيَّة ، لُوَيْبَاء سُوْدَانِيَّة

Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angola, Pois d'Angole (F). Doli, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congopea (E). Catjang, Angolische Erbsen (D). Cajano dell'Indie, Citsio dell'Indie, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس الزراعي ، فزروه عديدة شائعة الانتشار . ساقه ليفية ، خشبية ، فراء ، زيا ، تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراق مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهليلجية النصل ، خلية البشرة على سطحها . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، موشمة بالاحمر . ثمار قرون مبطلة تقوّل من ٤ الى ٧ سم . تغلف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة ملفطة قدحها قدر الحزمة ، لونها يختلف مع القرب منها الابيض والحلتي والاحمر والاحمر والمقرّوش || قرونه الخضر تطلّح كاللوبياء . حبه النافس الجاف صلب المادة يستعمل بعد تحمق وهو غزير العناصر الغذائية يحوي ما قدره :

من ١٩ الى ٢٠ ٪ من المواد الازوتية  
من ٦٢ الى ٦٤ ٪ من المواد الهيدروكربونية  
من ١٠ الى ١٠,٢ ٪ من المواد الدهنية



كثور الشوك



كنجوس هندي

٢٤٠٦٨ - كَنْتَب

Anaphalis (S).

Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E). Weisses Perikörbchen (D). Semprevia blanca (I).  
جس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متعاقبة مضفرة قطعية . وريقاتها الزهرية عناقية التجميع . ازهارها عاجية لولبية . ثنائياتها ضيقة . يزورها مستندة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٠٦٩ - كَنْتَب الثِيَّت

Anaphalis nubigena (S). Anaphalide du Tibet (F).

نوع من الكنجب ينمو من ١٠ الى ٢٠ سم . ساقه وارواقه مضفرة قطعية . اوراقه سنائية النصل وحيدة العرق . وريقاتها الزهرية وحيدة ، ازهارها صغيرة مبعثرة عاجية اللون . ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنجب ثعمني

٢٤٠٧٠ - كَنْتَب ثُعْمِيَّ

Anaphalis margaritacea, Antennaria margaritacea (S). Anaphalide nacré, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنجب الزبني ينمو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ضيقة طول من ٥ الى ١٢ سم . تعرض نحو ٥ م . نصلها اغصن الصفحة العليا مزهر البزير البزير البيضاء اللون . وريقاتها الزهرية كبيرة القذبة ثعمني اللون والعملة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يعيش في بحار شمال المحيط الاطلسي || اصداؤها صغيرة القذبة وضعية محاذية مثقلة اللوية . فوهاها معتدلة الانفراج ، رباعية الفلق اللامساوية التي تبدو كأربيل التّم شكلاً وحطاباً .

٢٤٠٥٩ - كُنْبِيَّات ٥

Chenopodiidae (S). Chenopodiidae (F). Chenopodiidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مُعديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاقحاف الجوروية والطباشيرية وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الكنجب والذريضة والمربفود والفصجية .

٢٤٠٦٠ - كُنْه

Auvent (F).

Pent-roof, Porch roof (E).

سقيفة مسطحة لاقياسة الطول والعرض والاعتدال ترتكز على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - كُنْه

Envelope, Revêtement (F). Covering, Facing, Revêtement (E).

كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وسره .

٢٤٠٦٢ - كَنْتَب

Biblot (F). Curio (E).

ج. كتابت . هي الأشياء الصغيرة الفاخرة الصنع من تماثيل وغيرها توضع لزيين .

٢٤٠٦٣ - كَنْتَرِيد

Cantharide (F).

هو الزراع ، اطليه .

٢٤٠٦٤ - كَنْثُور الشوك ٥

Agapanthia cardui (S). Agapanthie des chardons (F).

Agapanthia cardui (E).

حشرة واشمة غاضلة من فصيلة القرنيئات وربة مفدمات الاجنحة . موطنها يشل معظم اقالم حوض البحر الايبي المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والفضياء . غذائها تموش على الازهار . يرقاتها تسردب ارويات النباتات المائلة ولا تمتع من سوقها || جسمها صغير القذ ، ابيض الشكل ، يطول من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزقة العاقبة يعملوها مواج سبورى وثلاثة خطوط عاجية تغلف الكويل ، وشطان اصفران يكتنفان الدرز القندي . رأسها معتدل الحجم ينور بمغظمه تحت الكويل . عينها صغيرتان . زياتها غطيطان ، مهدبان . ازهارها مهدب الحثار . غذاءها معتدلتا الصلابة ، متباغتتا التحزير القاطب . ارسافها خماسية المقل || الانثى امير قدأ من الذكر وابنت ثوبا منه واتصر زياتا || لها جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملدة في اوائل ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها الكال الجسموري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨ اسبوعاً ، تقوّل من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الحجم ، مستطال الصدر ، مستدق السكة الشرجية ، سداسي الراجب . ثوبا الى السمرة الحظيئة البزراء المولاج يكتنفها تنقيط اسود يطوه بعض الهلب .

٢٤٠٦٥ - كَنْج ٥

Exotype

هو حاصل التجميع انيل كان ام الشيب . يعرف عنه عداقة بحرف « ك » الى السلالة الاول فتريفها ك١ || والسلالة الثانية ك٢ || والثالثة ك٣ . واذا حجن الكنج من جديد من احد طرفيه ، وهو ما يدعي التنايل او الدجلة ،

٢٤٠٨٠ - كُنْدُس أُنُق (S). *Gypsophila elegans*  
 Gypsophile élégante (F).  
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جنورها، دقيقة ساقها  
 قوية منتصبة. أوراقها سنائية ذلقة، نصلها وحيد العرق.  
 أزهارها مستطيلة المالمق، بيضاء اللون أو وردية.  
 أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨١ - كُنْدُس دَبْحِي الرَّق (S). *Gypsophila scorzonifolia*  
 Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).  
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها  
 كثيرة الفروع المستنقة. أوراقها سنائية، نصلها قلبي  
 القاعدة خماسي العروق. أزهارها إلى الحمرة الجليمة،  
 كلسها اخضر اللون صغير القلذ يطول نحو ٢ سم. || أزهاره  
 يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٢ - كُنْدُس ذَرَب (S). *Gypsophila acutifolia*  
 Gypsophile à feuilles aiguës (F).  
 عشبة معمرة زباه تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء.  
 أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفحتها. أزهارها  
 وردية، كؤوسها إلى البياض الاخير تملو خمسة خطوط  
 حر || أزهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٣ - كُنْدُس كَثِير الزَّهَر (S). *Gypsophila floribunda*  
 Gypsophile multiflore (F).  
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها  
 دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة  
 العدد، صغيرة القلذ، وردية اللون، كلسها خماسي الفلق  
 المسنة المصنولة بمطيلن ابيضين يتوسطها خط اخضر.  
 أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٠٨٤ - كُنْدُس لَرَج (S). *Gypsophila viscosa*  
 Gypsophile visqueuse (F).  
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فراء.  
 أوراقها سنائية؛ نصلها خلي البشرة المزجة، ثلاثي او خماسي  
 العروق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالمق || أزهاره  
 يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٥ - كُنْدُس مَدَاد \* (S). *Gypsophila repens*  
 Gypsophile rampante (F). Chalk plant, Cloud plant  
 (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).  
 عشبة سبروتية مبذولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٥ سم.  
 ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنائية مستطيلة. نصلها  
 بحري اللون وحيد العرق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة  
 القلذ، وردية اللون او بيضاء || أزهاره يستمر من  
 حزيران إلى ايلول.

٢٤٠٨٦ - كُنْدُس مَصْرِي \* (S). *Gypsophila struthium*  
 Gypsophile frutueuse, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root,  
 Struthium gypsophila (E). Spanisches Gipskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).  
 عشبة برية مبذولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث  
 تستعمل في النسيج. لها ساقها مدادة. جنورها متوسطة  
 الخالصة. أوراقها خفيفة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون.  
 أزهارها صغيرة القلذ وردية اللون او بيضاء.

٢٤٠٨٧ - كُنْدُس (F). *Pie*  
 هو الملقق، اطليه.

٢٤٠٧١ - كُنْدُسَة (F). *Pterygode*  
 الكندسية جناح زائد صغير القلذ، قلبي الشكل، يلحف  
 الرورش عند قاعدته في رتبة حششيات الاجنحة. وهما  
 كندسيان، يعني ويرى، تستعملها الفراشة لكسج  
 ورشيتها الاماميين.

٢٤٠٧٢ - كُنْدُسَة \* (F). *Cantharus*  
 Canthère (F). Bream (E).  
 جنس اسماء بحرية من الاسبوريات الشاكلات الزعانف  
 الكشيات الفلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها يضيبة الشكل،  
 طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زعانفها الظهرية تشبه  
 السنام. تألف الفور البعيد ولا تقرب من الشاطئ الا في  
 بعض الازمنة.

٢٤٠٧٣ - كُنْدُسَة مَبْذُولَة (F). *Cantharus cantharus*  
 Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).

نوع من الكندارة. سمكة بحرية يبيض من فصيلة  
 الاسبوريات ورتبة شاكلات الزعانف. مسرعا المجاهد،  
 تألف الشطوط والاخوار وتدخل المواني. اعطاها البحر  
 الابيض المتوسط || جسمها اهليجلي الشكل، معتدل  
 الطيطط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبها إلى الشهية  
 الفضية المالح تشدد سحرها في الظهر. جانبها مشيزان  
 مغطوط قاطبة صفراء اللون. رأسها كبير الحجم، قصير  
 أنف. فكها متعادلان. شقها متصل الانفراج.  
 اسنابها رباعية الصفوف في الفكين. عيناها صغيرتان،  
 نافذتان. زعنفتها الظهرية واحدة سنائية الشكل. زعنفتها  
 الدالية قارعة || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٠٧٤ - كُنْدُسَة هو كركدن السند، اطليه.  
 ٢٤٠٧٥ - كُنْدُسُ هو البان الذكر، اطليه.

٢٤٠٧٦ - كُنْدُسُورُوم، مِيْتُوكُنْدُرِي (F). *Chondriosomes, Mitochondries*  
 Chondriosomes, Mitochondria (E).  
 هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الحبيرة الحيوانية  
 او الخلية النباتية.

٢٤٠٧٧ - كُنْدُرِيُوم (F). *Chondriome*  
 هي الهية، اطليه.

٢٤٠٧٨ - كُنْدُس (S). *Gypsophila*  
 جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. انواعه زهاء  
 ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزراعية. سوقها فراء.  
 أوراقها صغيرة القلذ متعاقلة. أزهارها خضبة التجميع،  
 تاجية الاوتكاك، صغيرة الحجم. جنور بعضها صناعية  
 يستخرج منها مادة الصابون وتستعمل في غسيل الانسجة  
 الصوفية والكاتانية والظفنية تنظفها من الاقذار وتكسبها  
 بعض الزهراء والورق || أدب انواعه واشهرها ما يلي.

٢٤٠٧٩ - كُنْدُسُ الصُّخُور \* (S). *Gypsophila petraea*  
 Gypsophile des rochers (F).  
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الارتفاع والصخور  
 الكلسية. تملو من ١٠ إلى ١٥ سم. جنورها غليظة.  
 ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القلذ، بحرية اللون،  
 بنفسجية القاعدة والسنت. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض  
 العاجي. قناباتها يضيبة الشكل ثنائية التركيب || أزهاره  
 يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة مبذولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري





كندور



كندية

Astéroïde (F). Asteroid (E). **كُنْدَسْ** ٢٤٠٩٥  
نعت تعريفى يطلق عل جميع السيارات الصغرى الدائرة  
حول الشمس بين المشتري والمريخ. ج كُنْدَسْ وتدعى ايضاً  
الجواري الكنسى.

Organite ٢٤٠٩٦ **كُنْسَجْ**  
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كالجيلة  
والسننوزوم ... ج. كنسج.

Lignée (F). ٢٤٠٩٧ **كُنْسَجْ**  
هو الكنافة، اطباها.

Consoude (F). ٢٤٠٩٨ **كُنْسُوْدَهْ**  
هي السفولن، جنس اشبا برية طيبة.

Tringiens (F). ٢٤٠٩٩ **كَنْسِيَّاتْ**  
عارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها قليلة.  
اعرفها الجهلول. جميعها من القواطع الصغريات اللد.  
مناقيرها دقيقة خالية من التخذيد. ارساغها نحلة. اولها  
مرفقة وهي صيفية وثتوية تختلف عن بعضها برونق  
الالوان واقترب الرقعة او تباعدوا.

Conchite (F). ٢٤١٠٠ **كَنْسِيَّتْ**  
مادة متحجرة في داخل صفة.

Germon (F). ٢٤١٠١ **كَنْعَدْ، كَنْعَتْ**  
هو التون الابيض اي الجربون، سمكة بحرية من فصيلة  
الاسقمريات. قال جرير:

«قوم اذا جفوا في صيرهم بصلا  
ثم اشتوا كنداً من مالح جفوا»

Holacanthus (F). ٢٤١٠٢ **كَنْفْ**  
هو الطبق من الاسماك البحرية، اطليه.

Biotope ٢٤١٠٣ **كَنْفْ ٥، كَنْفَهْ ٥**  
هو المكان الموصوف المحدود ببيئته وبناعه.

٢٤١٠٤ **كَنْكْ** هو البان الذكر، اطليه.

Terricole (F). Terricolous (E). ٢٤١٠٥ **كَنْكَلِيَّة**  
نعت تعريفى يطلق عل الديدان والحيروانات الدنيا التي تعيش  
داخل التربة.

Topinambour (F). ٢٤١٠٦ **كَنْكُرْ**  
هو عباد الشمس السقولي، اطليه.

٢٤١٠٧ **كَنْكَلِيَّة، عَمَرْتَقِيْع**  
Combretum altum, C. micranthum (S).  
Combret. élevé, Kinkeliba, Chigomier altier (F).  
Vegetable-glue plant (E). Langfaden (D).  
نوع من السم وكنكليه هو الاسم الافريقى. نبات  
حرجي طبي معمر من فصيلة الالهليجيات. سنننه يمتد  
من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ الملاج ٥ وهي  
شجرة قراء تعلو نحو اربعة امتار. ساقها شديدة الصلابة.  
قرونها متراكبة، مستطيلة، جؤرية اللون ثم طحلاء.  
اوراقها متعاقبة، منقطة، اهليلجية، تطول من ٥ الى  
٩ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. نعالها ماسة البشرة،  
عاقبة الخضار الجؤري الملاج. ازهارها سنبل التجميع،

Pier vagabonde (F). ٢٤٠٨٨ **كُنْدُش جَوَال**  
طائر من الجوائم يدعى كطري، اطليه.

٢٤٠٨٩ **كَنْدَلَاءْ، كَنْدَلِي**  
نبت ينبت بماء البحر ويدعى بالشورة. قشره يمسى  
الأيلع يدبغ به (اللسان).

٢٤٠٩٠ **كَنْدَمْ، جَوَزْ كَنْدَمْ**  
Mangouste (F). Mangosteen (E).  
ويدعى الجندم، هو ثمرة جندم منفستان.

٢٤٠٩١ **كُنْدُوْجْ**  
Silo  
شبه مخزن يشاد في الارض يغمر التراب تخزن فيه الحبوب.

٢٤٠٩٢ **كَنْدُوْرْ، تَنْرْ اْمُرِيْكِي، تَنْرْ قَحَاح**  
Sarcorampus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).

طائر من النسور ينتمي الى فصيلة الزناحيات. جنته كبيرة  
القد تطول نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سقله فنحو ٣٥٠ سم.  
رأسه مستطيل الشكل يحمل عل جبهته عرف اخر. منسره  
كبير اللد، حريص الانتشاب، احسن الهرة الحادة.  
عنقه اغفر الريش كالرأس، مطوق بالأبيض الاصفر  
الملاج. ريشه الملط، مخاليه كبيرة. ثوبه الى الطلبة  
المرشحة بالاسود. قوادمه يبيض ٥ اطائه جبال الالند  
في امريكا الجنوبية. يألف المناطق العالية من ارتفاع  
٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. عن سطح البحر. نظامه الحياني  
جاسي. سره يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً. يلتصق قوته  
في رامة الثبار، يرغب في الجيف وان تذمر عليه ويجودها  
اصطاد الايائل والماعز وكل ما استطاع اليه سبيلاً.  
يأش وكنه على الحضيض في اواب الصخور المُنَزَّعة او  
في تنوع الجبال الرقعة. اثناء تضع وفتين كبيرتين تحضنها  
يحددها نحو ٤٠ يوماً.

٢٤٠٩٣ **كَنْدِيَّة \*، زَهْرَةُ المَرْجَان**  
Kennedy (S). Kennédie, Kennédye (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).  
جنس نباتات ليفية عارشة برية وتربيتية من فصيلة القرنريات  
القرشاية. انواعها ١٢ معظمها تربيي، سوقها زياء تطول  
من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة منقطة ثلاثية  
القصص. ازهارها كبيرة القد فريدة او عتقودية التجميع،  
محورية الارتكاز او طرفية لونها الى الحمرة ومنها الوردي  
والاريجاني والقرمزي والياقوتي ... ٥ اشهر انواعها  
التربيتية:

كندية هببة  
K. splendens (S).  
Kennédie splendide (F).  
كندية حراء، كندية بالقوية  
K. rubicunda (S).  
Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).  
كندية سوداء  
K. nigricans (S). Kennédie noire (F).  
كندية شقارية  
K. coccinea (S). Kennédie écarlate (F).  
كندية مرداء  
K. glabrata (S). Kennédie glabre (F).  
كندية مستلقية  
K. prostrata (S).  
Kennédie couchée (F).

٢٤٠٩٤ **كَنْسْ** هو الشنقب، اطليه.

٢٤١١٦ - **كُنْيَاك ، كُونَاك**  
Cognac (F).  
Cognac brandy (E).  
مشروب قنديدي شائع الاستعمال يصنع من كمون العنب .  
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونيك في فرنسا .

٢٤١١٧ - **كُنْيَب**  
Arbres desséchés (F).  
Dried trees (E).  
الكُنْب: اليبس من الشجر .

٢٤١١٨ - **كُنْيِدَة ٥ ، كُونِيدِيَا**  
Conidie (F).  
Conidium (E).  
كل بويضة فطرية نشأت على كائنا لا في زق تدعى كُنْيِدَة .

٢٤١١٩ - **كُنْيَنَة ٥**  
Locule (F). Loculus (E).  
الكُنْيَنَة ، في علم التاريخ الطبيعي ، هي الحدر الشديد  
الصغر .

٢٤١٢٠ - **كُنْيُولِسِيُوم ٥**  
Coniothecium (S).  
جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة الطحجيات .  
يتميز بخلو من الجرب الكُنْيِدِيَة . كائنا مركبة مستطيلة .  
بويضاتها كروية جبرية التجميع || انواعه عديدة جميعها  
دمية تركيب لحاء بعض الاجار دون ان تؤذيها ، منها البندق  
والحور والموخ والصفاص .

٢٤١٢١ - **كُنْيُورَاف ، كُونُورَاف**  
Gogniographie (F).  
ويسمى مرممة الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض  
تقسم مستواها على الفور .

٢٤١٢٢ - **كُهَب**  
Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).  
هو الجاموس المسن لا يزال كائر الحِم .

٢٤١٢٣ - **كُهَبَل**  
Detarium (S).  
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tall-tree  
(E). Detaripbaum (D). Detaria, Meli (I).  
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرزيات . له  
نوعان نوع ثماره مرة العلم ، سحالية المادة ، مؤذية .  
ونوع ثماره مأكولة مستحبة العلم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - **كُهَبَلُ السَنَغَال ٥**  
Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).  
Senegal tallow tree (E).  
نوع من الكهبل شجرته تملو نحو ١٢ م . ساقها منتصبه  
اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها شفافة الانتظام .

بوصية  
الشكل ، نصلها جامد الصفحة . عابق الخصار . ازهارها  
عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز ، ثمارها مشفية  
الشكل والقد ، لباب سودقها ناشف المادة ، سكري العلم ،  
اخضر اللون .

٢٤١٢٥ - **كَهْدَبُ الْإِجَاص ٥ ، أَكَارُوس**  
الإِجَاص  
Eriophyes pyri (S).  
Phyopte du poirier, Eriophyes des poiriers (F). Pear  
leaf blister (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركيب برام الاجاص  
تسبب اليراق الباكور ثم تغلي على الوراق فتفهم النصال  
بالبثور السم او الخطية بعد ان تقضي على خلايا النسج  
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .  
يكافح مكافحة العناكب باستعمال الحواشير والمواكين .

محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة ، وردية اللون ،  
تملوا رشفة نحاسية . ثمارها يزور محرمصة بجنحة صغيرة  
تبدو في اول عهدها خضراء اللون ثم يتحرف اللون ، عند  
النضج ، الى الوردية الغفيرة العجاجة .

٢٤١٠٨ - **كُنْيَلِيلُوجِيَة**  
Conchyliologie (F).  
Conchology (E).  
في علم الاصداق .

٢٤١٠٩ - **كُنْيَنِيَا ٥ ، كُنْيَنَا ٥ ، سِينْكُونَا ٥**  
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinquina bark  
(E). Chinabum, Fiebertindenbaum (D). China (I).  
جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة  
الفويات . انواعه المعروفة ٢٠ اعطائها المناطق الحارة  
الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .  
سوقها منتصبه تملو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متقابلة  
معقنة ، نصلها بيضيه او اهلبلجية الشكل . ازهارها  
عنقودي او عشكري التجميع . ازهارها عشوية زباء  
البشرة . ثمارها جراء مخروطية الشكل تحضن العديد من  
البزور الصغيرة الغشائية الجناح || يستخرج من قشورها  
مادة قلوية يفسد اللون شديدة المرارة تعتبر من اهم القلويات  
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - **كُنْيَنِيَا ٥**  
Cinchonées (F).  
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات  
تنتمي الى ١٠٠ جنس اشهرها الكُنْيَنِيَا .

٢٤١١١ - **كُنْيَنَا ٥ ، لُبِيد**  
Alkana orientalis (S). Alkanne, Alcanne, Alcan,  
Grénil à fleurs jaunes (F). Yellow bogloss, Yellow  
gromwell (E). Orientalische Perlhirse (D). Al-  
canna (I).  
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات . اوراقه  
ضيقة مستطيلة ، نصلها خلي البشرة . ازهارها صغيرة القد  
بيضاء اللون . بزوره مستديرة ، حنطية ، قاسية كالحجر  
تدر البول وتفيد الحمض وتنبش الايلع وتذيب البلم .  
انواعه عديدة اعطائها الجردو واليقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - **كُنْيَنَا صِبَاغِي ٥ ، شَنْجَارَ البَر ٥**  
عَسَّ الحَمَام ، رَجُلُ الحَمَام  
Alkana tinctoria (S). Alkanne tinctoriale (F). Al-  
kanet (E). Alkanne (D). Alkanne spuria (I).  
نبات عشبي بري من فصيلة الحمحميات يستخرج منه  
صباغ احمر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - **كُنْيَنَل ٥**  
الكُنْيَنَلُ شجر عظام . قال امرؤ القيس :  
فاضى يسح الماء من كل فيقة  
يكب على الاذقان دوح الكُنْيَنَل .

٢٤١١٤ - **كُنْيَنُور ٥**  
Fractocumulus  
ضرب من الغيوم الغزيرة المطر ويدي الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - **كُنُود**  
Terre improproductive (F).  
Unproductive soil (E).  
ارض لا تنبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .



كُنْيَنَا



كُهَان صِبَاغِي



كهبل السنغال



كهبد الاجاص

## ٢٤١٢٦ - كَهْدَبُ الْبُنْدُقِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْبُنْدُقِ

Eriophyes avellanæ (S).  
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F).  
Hazelnut gall mite (E). Haselnussgallmilbe (D).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب حوافش برام  
البندق تقسب سقوطها وأغلاص الازهار .

## ٢٤١٢٧ - كَهْدَبُ الْبَنْدَوْرَةِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْبَنْدَوْرَةِ

Eriophyes cladophthirus (S).  
Eriophye des tomates (F).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب سوق ولوراق  
البندورة فتعطيها ويجعلها وتعمتها عن الأثمار .

## ٢٤١٢٨ - كَهْدَبُ التَّيْنِ ٥ ، أَكَارُوسُ التَّيْنِ

Eriophyes ficus (S). Eriophye du figulier (F).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق التين الطرية  
النامية فتؤذيها بفص التي .

## ٢٤١٢٩ - كَهْدَبُ الرُّمَّانِ ٥ ، أَكَارُوسُ الرُّمَّانِ

Eriophyes granati (S). Eriophye du grenadier (F).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الرمان  
تقشب اصفرارها ويهلها الباكرك .

## ٢٤١٣٠ - كَهْدَبُ الزَّيْتُونِ ٥ ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ ، فِيلُوكُوبِت ٥

Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). Rust mite (E).  
Kräuselmilbe (D).  
حشرة من الكهديات تركب اوراق الزيتون اغصنها  
وريفات الاناث التابعة فتمتصها من اتحاد حجبها الطبيعي  
وترقصها ببطور صفر تنسج تدريجيا الى ان تم النصل  
تقتضي عليها .

## ٢٤١٣١ - كَهْدَبُ الزَّيْتُونِ ٥ ، أَكَارُوسُ الزَّيْتُونِ

Eriophyes tilliae (S).  
Eriophye du tilleul, Phytopte du tilleul (F).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الزيتون  
فتشوها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات  
النصل العليا .

## ٢٤١٣٢ - كَهْدَبُ الْكَرْمَةِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْكَرْمَةِ

Eriophyes vitis, Phytoptus vitis (S). Eriophye de la  
vigne, Erinoze de la vigne, Phytopte de la vigne (F).  
Grape bud mite, Grape erineum mite (E). Reben-  
blattgallmilbe, Rebenpockenmilbe (D).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الكرمة  
فترقصها بالبرير بمد القضاء على خلايا التسنج فيصيح  
النسج بين البشنتين كانه محروق لا رجاء منه .

## ٢٤١٣٣ - كَهْدَبُ الْكِشْمِشِ ٥ ، أَكَارُوسُ الْكِشْمِشِ

Eriophyes ribis (S).  
Eriophye du groseillier, Phytopte du groseillier (F).  
Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).  
حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام ولوراق  
الكشمش فتؤذيها وقد تسبب اغلاص البرام والازهار .

## ٢٤١٣٤ - كَهْدَبُ الْمُنْعَا ٥ ، أَكَارُوسُ الْمُنْعَا

Eriophyes mangiferae (S). Eriophye du manguier (F).  
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام المنفا فتؤذيها  
وقد تقتضي عليها .

## ٢٤١٣٥ - كَهْدَبِيَّات ٥

Eriophyidae (S).  
Eriophylids (F). Eriophylidae, Blister mites, Gall  
mites (E). Gallmilben, Gallenmilben (D).  
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة القراذيات . اجناسها  
وانواعها عديدة جميعها مجهرية . اجسامها اسطوانية .  
تطول من خيلين الى اربعة خطوط من المليمتر . جرابيها  
رباعية طرفية تحيط باجزاء المنك || جميع حشراتها ضارة  
تركب برام ولوراق النبات فتؤذيها اشد الاذى وقد تسبب  
تلها .

## ٢٤١٣٦ - كَهْدَلُ الْقُطْنِ ٥ ، قَافِرَةُ الْقُطْنِ

Lepidocyrtinus incertus (S).  
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، سمره اللون ،  
مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة  
اغصنها القطن والبرسيم والفسحة .

## ٢٤١٣٧ - كَهْدَلُ الْمَوْزِ ٥ ، قَافِرَةُ الْمَوْزِ

Drepanura muscatis, Entomobrya muscatis (S).  
Drépanure du bananier (F).  
حشرة صغيرة من الكهديات فوها الى الصفرة ، تركب  
الموز وقشب السكر . اضارها زعيدة لا تستوجب  
الكتابة .

## ٢٤١٣٨ - كَهْدَلِيَّات ٥ ، كَلْتَمِبِيَّات ٥

Collemboles (F). Collembola (E).  
ومنهم من دعاهم « قافزات الذنب » . رتبة حشرات عديمة  
الاجنحة ناقصة التطور التي تسكن الاراضي الرطبة . حشراتها  
قارضة قافزة مستطيلة الاذنان تحمل في حلقائها البطنية  
الاولى جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تاصدعها على  
تسلق السطح الناعمة المائلة .

## ٢٤١٣٩ - كَهْرَابِي ٥

Electrogène (F).  
Electrogin (E).  
نمت تعريني يطلق على كل جهاز يولد الكهرباء .

## ٢٤١٤٠ - كَهْرَبَاء ٥

Electricité (F). Electricity (E).  
الكهرباء طاقة مُوَلَّدَة ، دأستها تتبع علم الطبيعيات .  
وهي تقسم الى فرعين الكهرباء الاحثكاكية والكهرباء  
الديناميكية فالاحثكاكية هي التي تستعمل في توليد  
الكهرباء . اما الديناميكية فهي المختصة بالتيار الكهربائي  
والاجهزة التابعة له .

## ٢٤١٤١ - كَهْرَبَة ، تَكَهْرَب ٥

Electrisation (F).  
Electrification (E).  
Electrique (F).  
Electric (E).  
٢٤١٤٢ - كَهْرَبِي ، كَهْرَبَاتِي

٢٤١٤٣ - كَهْرَبِيَّة غَلْشَانِيَّة


Electrogalvanisme (F). Electro-galvanism (E).  
درس القوى الصادرة عن الصفائح المتعددة .

## ٢٤١٤٤ - كَهْرْمَانُ أَصْفَرِ

Succin  
هو المنبر الاصفر مادة راتنجية بحجرة ، صلبة ، شبه  
شفافة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تلويث  
في الماء وتنصهر في ٢٨٧ °س . اشتغالها يولد الحامض  
النبري وزيت طيار مستحب الرائحة العطرية .



كهذب البندوة



كهذب الزيتون



كهذب الكرمة



كهذب القطن



كهذب الموز

الزعانف . انواعه المعروفة اربعة تتميز برؤوسها المستضخمة وباشداقها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنقطة كالثياب الاقاعي || اجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبعثرة المناخس . عيونها علوية الاوتكار تحتل قمة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملاس غضروفية تبدو كخيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكواكح لاجتذاب الاسماك الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم اوقاته سلقياً على بطنه فاتحاً شفته بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كواكح المحيط وكواكح المتوسط .

### ٢٤١٥٤ - كَوَاكِحَة المَحِيطِ الأَطْلَسِيّ °

Lophius budegassa (S).  
Baudroie de l'Atlantique (F).  
سمكة من الكواكح . اعطائها جناح واطوار وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في الجبلان المراكشي والاسبانيه والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه مخروطي الشكل طويل من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبها يماثل الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

### ٢٤١٥٥ - كَوَاكِحَة مَبْدُولَة ° ، كَوَاكِحَة

المَتَوَسِّطَة ° ، لُطُ بَحْرِيّ مَبْدُول °  
Lophius piscatorius (S). Lophie baudroie, Baudroie commune, Diable de mer, Crapaud pêcheur, C. de mer (F). Toad-fish, Sea-devil, Fishing-frog (E).  
نوع من الكواكح . سمكة بحرية ييوس . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض اقالم المحيط الاطلسي . مسرحها اضواء المجاذب والشطوط . تألف المواقع المأدبة التي يراوح عقفا من ١٠ الى ٢٠ متراً || جسمها صفي الشكل ، يطول من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . سمكها عادم السهف . ثوبها الى الخنثي الاسمر يبق في الصفحة العليا ويغير ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شفتها رجب الانفراج . عينها كبيرتان سطحيّتان . ويملؤها في قمة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهرية الامامية مستطيلة المناخس الشائكة || تتميز باستطالة قواعدهم الزعانف الصدرية الزرقية الاوتكار . وتتميز ايضا بالشودة اي انها تمانق البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .

### ٢٤١٥٦ - كَوَاكِحِيَّات °

Lophiids (F).  
Lophiidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف المجاذب والشطوط . مسرحها الاطوار التي يراوح عقفا من ١٠ الى ٢٠ متراً . تتميز بالكسل والشودة اي انها تمانق المواقع التي تعيش فيها || اجسامها صغية الشكل كالشرع ، ضخمة الرؤوس ، مالة القشار الزجاج ، مبعثرة المناخس الحادة . اعطائها فقس . اشداقها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة منقطة || عيونها زرقية الاوتكار تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المنوخة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواكح .

### ٢٤١٥٧ - كَوَاكِرَة °

Bulla (S).  
Bulle (F). Bulla (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الارجل

Hydro-électrique (F).  
٢٤١٥٥ - كَهْرْمَانِي  
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

### ٢٤١٤٦ - كَهْفِيَّان °

Spéléologue, Spéléologiste (F). Speleologist (E).  
من كان اختصاصه الكهفنة .

### ٢٤١٤٧ - كَهْفَنَة °

Spéléologie (F).  
Spelaeology (E).  
علم يبحث في تنقيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

Aubergine (F).  
٢٤١٤٨ - كَهْكَب ، كَهْكَم  
هو الباذنجان ، الطلبه .

### ٢٤١٤٩ - كَهْنَسَة °

Chicocca angulifuga, C. brachiata (S).  
Cahinga, Cainga (F). Chickoo tree (E). Traubenformige, Kainzawurzel (D).  
شجرة حرجية طيبة معمرة من فصيلة الفويات . مهدا بعض مناطق امريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة فراء . اوراقها منعقة ، متقابلة ، اهليجية الشكل . نصلها جامد الصفصه ، جميل الخضار العاكس للامع . ازهارها عتقودي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة الريف . ثمارها لحمية ، مبطة ، عاصفة المذاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق والثمار مقوية وقايزة .

٢٤١٥٠ - كَهْل °  
Liobunum rotundum (S).  
Phalangide, Fauteur (F). Harvester, Harvest-spider (E).  
حشرة قاصصة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة الهرديات . موطنها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبه || جسمه صغير القد ، اهليجي الشكل ، ملحم الصدر والبطن ، عادم المشن ، غيشوي التنفس . ثنائي الجرامز المستطيلة الدقيقة . ثوبه اصهب اللون عند الاثنى وينصرف الى السرة الخنثية يملؤها قتيق اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدماً من الاثنى التي يبلغ طولها نحو ٤ م . || يآلف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يسرح في الليل . قوته الحشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والهاموم || يعتبر من الدويبات النافعة لانه يقضي على الخوذية .

٢٤١٥١ - كَهْلِيَّات °  
Phalangidae (S).  
Phalangidés (F). Phalangidae (E).  
فصيلة حشرات دابة من رتبة الهرديات وصف التناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الكهول .

٢٤١٥٢ - كَهْرِب °  
Electron  
جزئي . عادم الجرم المملوس يشحن الكهرباء السلبية .  
٢٤١٥٣ - كَوَاكِر ° ، عُنْجُوم البَحْرِ ، لُطُ بَحْرِيّ °  
Lophius (S).  
Baudroie, Lotte de mer (F). Angler-fish, Frog-fish (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكواكيات ورتبة شاكات



كهول



كَوَاكِرَة مَبْدُولَة

الجناوية . تسرح في الصباح الباكر وقرب الغروب . قوتها الاخشاب والجذور والحبوب . اجبرتها انفاق مستطيلة عديدة المتاريج والنهايز المتفرعة اشهر انواعه مايلي .



كُوَاة

٢٤١٦٩ - **كُوَيَايَ الْبِرَاكِيل** *Cavia porcellus* (S).  
*Cobaye apérée* (F).  
موطنه البرازيل والغيان وبوليفيه والأوروغواي . طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصنائية . بطنه ابيض اللون . يعيش جماعات عدد أفرادها نحو ١٥ . يألف الاماكن الرطبة ويجاري الماء والطراف الاذغال والغابات || انشاء قنص من الدرصين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - **كُوَيَايَ الْجَنُوب** *Cavia australis* (S).  
*Cobaye austral* (F).  
موطنه امريكة الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه سوي اللون احمل الظهر اغبر البطن . وبره خشن مستطيل || يألف الغضاب والاذغال . انشاء قنص مرتين في العام .



كُوَيَايَة

٢٤١٧١ - **كُوَيَايَ الْهَنْدُ ، حَمِزْبَرِ الْهَنْدُ**  
*Cavia cobaya* (S). *Cobaye*, *Cochon d'Inde*, *Lapin d'Amérique*, *Rat d'Amérique* (F).  
هو الكوباي الداجن . مهده امريكة الوسطى . سلالته الرئيسية خمس تختلف عن بعضها باختلاف وبرها بين الطول والقصر والخشونة والنعومة والقلة والكثالة || طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه عديد الالوان المتراكمة المتباينة || طباعه طبايع الارب وببري مثله . انشاء تلد عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - **كُوَيَا** *Cobra* (F).  
*Cobra*, *Hooded-snake* (E).  
الكوبرا والتيجا والصل اسماء مختلفة لافئ من الحيات الخيشية الامايات الاخايد . اطلب نجا .



كُوَيَاي

٢٤١٧٣ - **كُوَيْبَت** *Cobalt*  
معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي التكافؤ ريزه (كو-Co) وزنه الذرئوي ٥٨,٩٤ . ثقله الذرئوي ٨٩,٦ يذوب في الحمض النيتريك || لا يوجد في الطبيعة حراً بل مركب مع بعض العناصر . اوسه استعماله عديدة اعضها تلون القزاز والحرف .



كُوَيْن

٢٤١٧٤ - **كُوَيْن \*** *Galeopithecus* (S).  
*Galeopithecus* (F). *Galeopithecus* (E).  
كوين هو الاسم الماليزي . اما الاسم العلمي فيني (فر-قرد) . جنس حيوان لبين حاشر رابل متسلق من فصيلة الكوينيات . له نوعان كوين ماليز وكوين الفيلين . الفارق بين الاثنين حجم ذنوب . الماليزي يطول نحو ٦٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم . بسطته نحو ٦٧ سم . ثوبه العلوي الى الطحلة السوداء المشايبة الماجات . ثوبه السفلي الى الصبغة السوداء . اطراف قوائم الى السوداء المنمش بالابيض . الفيليني يطول نحو ٥٥ سم . وبسطته نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السوداء السوداء تملوها بقشة بيضاء لامتناهية التوزيع ثوب السفلي اطراف قوائم الى الطحلة السوداء يملوها موج اسمر || ملجته الحياتي جماعي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متسلقا بقائمتيه الخلفيتين كالوطوط . قوته الحشرات والثار ووراق النبات ||

وفصيلة الطايات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداها اهليلجية الشكل ، رجة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفحة الملونة ، عادمة الحليزة والاريفة . اجسامها اهليلجية مقطعية الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادة اللوامس .

٢٤١٥٨ - **كُوَاة ، كُوَاة ، كُوَاة** *Ruche* (F).  
*Hive* (E).  
هي مأوى النحل اي خليته حيثك شباكها بالقصب او بالقش .

٢٤١٥٩ - **كُوَاَسِيب** *Rapaces* (F). *Rapacious* (E).  
نمت تعريفي توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦٠ - **كُوَاَسِر** *Oiseaux de proie*, *Rapaces* (F).  
*Birds of prey* (E).  
رتبة من الطير تعرف بالجوارح . فصائلها واجنسها عديدة تقسم الى فئتين كواسر النهار وكواسر الليل .

٢٤١٦١ - **كُوَاَسِر اللَّيْلِ** *Rapaces nocturnes* (F).  
*Nocturnal birds of prey* (E).  
هي جوارح الليل تشمل اليوم وسائر اجناس الطير الكواسر التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - **كُوَاَسِر النَّهَار** *Rapaces diurnes* (F).  
*Diurnal birds of prey* (E).  
هي جوارح النهار وتعدى سباع الطير تشمل الغبان والصقور والنسور الخ ...

٢٤١٦٣ - **كُوَاَكِبِ الْبَحْر** *Asteriadae* (S).  
*Asteriadae* (F). *Asteriadae* (E).  
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - **كُوَيْبَال** *Copal* (F). *Copal-resin* (E).  
صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكتنة يستعمل في صناعة الطلاء .

٢٤١٦٥ - **كُوَيْبَالِيَّة** هي الكتنة ، اطلبها .

٢٤١٦٦ - **كُوَيْبَان** *Caparaçon* (F).  
*Caparlson*, *Housings* (E).  
سترة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لوقايتها .

٢٤١٦٧ - **كُوَيْبَانِيَّة \*** *Cupania* (S). *Cupanle* (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابديات انواعها المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات فروع . ازهارها متعاقبة مركبة ، شغوية التجميع ، سنابسة النصال . ازهارها محوري الاثنتكاز ، متقوي التجميع . ازهارها غريبة متباينة الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الودي . بزورها مأكولة طعمها شبيه بطعم الكتنة .

٢٤١٦٨ - **كُوَيْبَاي \*** *Cavia* (S).  
*Cobaye* (F). *Guinea-pig* (E).  
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة الشردفيات . انواعه ثمانية . جميعها ربة ارجة ، صغيرة القد ، متناثلة الشكل ، رؤوسها غليظة . راسها لا مغلوقة . اذنانها قصيرة فارشة . قوائمها متساوية الطول . اذنانها جلداج || موطنها امريكة

٢٤١٨٢ - **كوتنل، أطماط**  
 Areca (S).  
 Arc (F). Areca (E).  
 جنس اشجار مشرة من النخليات. أنواعه عديدة منها البلاد الحارة. جذورها رقيقة مستقيمة. جريدها ريشي الصف. ثمارها بيضيه صناعية، لبها شائع الاستعمال الطبي لا سيما الطب البصري || أشهر أنواعه كوتنل الكاشو.

٢٤١٨٣ - **كوتنل الكاشو \*، أطماط الكاشو**  
 Areca catechu (S). Areca catéchu, Aréquier, Noiset de l'Inde (F). Areca-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalme, Arekapalme (D). Arc, Palma arc (I).  
 نوع من الكوتنل جذبه مستقيم ريع. ثماره بيضيه الشكل والحجم، يستخرج من لبها مادة الكاشو.

٢٤١٨٤ - **كوتن الحبشة، كوتن إفريقي**  
 Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucée d'Ethiopie, Ko-sam d'Afrique (F).  
 نوع من الكوتن. شجرة برية من فصيلة السمرويات. مهدا الحبشة وبعض مناطق افريقية الوسطى والشمالية || ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. أوراقها معتقة متعاقبة، سنانية، أبيضه || تمتد من النباتات الطبية. لحاء ساقها وجذورها تحوي بعض المواد الدوائية والحواض الضوية ومادة الكوتنين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الامعاء.

٢٤١٨٥ - **كوتن نحيل**  
 Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucée grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).  
 نوع من الكوتن. شجرة برية من فصيلة السمرويات. منها الطوي يمتد من جنوب الصين الى ماليزية والفلبين واستراليا || ساقها تحلة فراء تملو من مترين الى ثلاثة أمتار. أوراقها معتقة متعاقبة اهليلجية، أبيضه || تعتبر بعض المواد الدوائية والحواض الضوية ومادة غلوكوزية تدعى كوتنين. ثمارها كوتن سوداء اللون تغلظ عجايب لوزية الشكل دهنية المادة خواصها خواص اللحاء || تستعمل كعصاة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الامعاء.

٢٤١٨٦ - **كوتن**  
 Psathyrella (S).  
 Psathyrelle (F).  
 جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاروقنيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الجبلية الممتدة من الشرق الاقصى الى اوروبا. يعيش على التبال وصل اريبات الاشجار الحرة اغصانها السندبان ومنه اللك والمكوك والمدر والدرايم. يتميز بسوقه التدبقة الجادة ومجمودة لحية الانواع المأكولة || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية.

٢٤١٨٧ - **كوتن أمغر \***  
 Psathyrella spadicea (S). Psathyrelle bai brun (F).  
 نوع من الكوتن. يعيش مجموعات وافرة العدد على اريبات اللك والمكوك. ساقه دقيقة مملوءة اللون. نكهته مظلمة الشكل، قطرها نحو ٧ سم. لوها الى الحفرة القائقة او الكمية الاسمر. اطراسها الى الكسني الاحمر المواج || لحية كائفة الصف، غير مرغوب فيها.

يتسلق الاشجار بخفة وينقل بين اغصانها برشاقة ويقفز من شجرة الى شجرة حلقاً في الفضاء كالظلي، من اعل الى اسفل، مسافة ٦٠ او ٧٠ متراً.

٢٤١٧٥ - **كوتنيات**  
 Galeoepithécidae (S).  
 Galdépothécidés (F). Galeoepithécidae (E).  
 فصيلة حيوانات لبونة، حاشرة، رابطة، متسلقة، مركزها في هرم البوكتا بين اليموريات والبولوطيات || اجسامها مكشوفة بغشاء أشمر، يمتد من قاعدة العنق الى اطراف القوائم والذليل، يقوم مقام المظلة فيمكنها من الانتقال جواً بين الاشجار على مسافات تراوح من ٦٠ الى ٧٠ متراً || اصابع قوائمها مشطية الارتكاز، لا متعاقبة. اظفارها حادة بحجة الاطراف || اناتها ثنائية الاختلاف الصدرية، تضع جرواً واحداً يتعلق بصورها حتى الغمام || لها جنس واحد يدعى كوتن وله نوعان.

٢٤١٧٦ - **كوتنية** هي الابدانجية، راجعها.

٢٤١٧٧ - **كوتية، مظن**  
 Jour (F).  
 نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور. فهو قانوني اذا كان يشرف منه على الطريق العام ما دام مطابقاً للانظمة الادارية ولكنه محظور اذا كان يشرف منه على ملك الغير ولم تراعى المسافة القانونية في بده عنه الا ان يكون مرفقاً او مغطى بماسحاً.

٢٤١٧٨ - **كوتنل منقط البطن، كوتنل**  
 Cleonus  
 punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S).  
 Cléone piqueté (F).

حشرة مؤذية من فصيلة السوسيات. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط ومعظم اقالم حوض البحر الاسود. تألف المواق التي توجد فيها السوسيات. خنافسها تقضم الارواق. يرقاتها تتركب الجذور فتقنها وتضعها || جسمها معتدل الحجم، اهليلجي الشكل، يطول من ١٦ الى ١٨ م. ثوبها العلوي الى الكهية يملؤها مواج اشجع. ثوبها السفلي الى الكهية السمره يملؤها تنقيط اغبر. رأسها يرمي الشكل ينتهي بظن غروري ناشز الكظر. زباناها مرفقان، وشعا الاطراف. الاثنى اميز قدماً من الذكر واطول خطه منه || لها جيل واحد في الحول. تخرج الحشرة الجملة من استكانتها الشتوي في اواخر نيسان تسرح في النهار. تبشر منع المكن بعد ظهورها بنحو عشرة ايام. قترزه في التربة قرب استاخ النباتات المائلة البرقة مرقاة، بطيئة النمو، تبلغ الكال الجسودي بعد الثفت بنحو عشرة اسابيع. جسمها يطول نحو ٢٠ م. وهو اسطواني الجسم، مقوس الشكل، ابيض اللون، تنبي المواج. رأسها مستطيل، مكور، اسمر || طور الاكمال يستمر نحو عشرة ايام وينتهي في التربة.

٢٤١٧٩ - **كوتنلوك**  
 Caoutchouc (F).  
 هو المطاط، اطليه.

٢٤١٨٠ - **كوتنين** هي البشرين، اطلبها.

٢٤١٨١ - **كوتن**  
 كوتن الزرع وكل نبات حولي: فاقد الابداس وصار على اربع ورفات او خساً.



كوتن منقط البطن



كوتنل الكاشو



كوتن أمغر



كُونَن كندول



كُونَن غنبل



كوجر



كودانة جلاو



كودانة رولفي



كودانة سولاني

متشقة تطرح بالحاء ليفتقت ويسقط || وهو على الحفصيات يقع حنطية لاقامية مستطيلة تركب الحاء تقسب جفائها وتصلها والتصاقها بالتشب. وبعد ذلك نجسة او ثمانية اسابيع تنطلق الحاء باستطاعتها وتظهر على الشقوق ثنائيل فطرية رمية قهوها نحو المبرر لنها ابرواح من الابيض الى الوردى || يكالغ بالاستتصال وبظلاء الجروح بعد تطهيرها.

### ٢٤١٩٥ - كُوْدَانَة رولفي \*

*Corticium Rolfsii, Sclerotium Rolfsii* (S).

فطر مجهرى يكثر ويبدو في المناطق الحارة يتطفل على العديد من النبات كالارز والبالذجان والباله والبنفسج والتامول والحنصيات والحطنة والحظفل والحورج والحطبي والنجر والديوسر والذرة والسلق والشيلم والعاتق والفاصوليا والفجل والبقيلة والفول السني والقرع والقطن والفلقاس والمفلوف والتبجيل والطنش والتبيلج والمهرش وبياد الشمس وفستق الميه وقصب السكر || يصيب النبات في عهد غيه ونشوته السريع فيوشم السويق بنقطة حنطية اللون || يبيض اغور || كثيفة التجميع || تبدو كالبقعة الواحدة || تعرقل التبادل السني وتسبب اصفرار الاوراق وذبولها || وقد شوه على التبغ في زراعات الهند التبرلية كما انه يركب اغمار ورق اللوز دون ان يقع بها شديد الاذى || يكالغ باعتباب كثرة الرطوبة وبالاكثر من الاسماء الاثرية اخصها نيزرات الجير وسلفات الامونيوك.

### ٢٤١٩٦ - كُوْدَانَة سُولَانِي \* ، رِيْزُوْكَوْنُونْ اُسُوْدَه

*Corticium solani, C. vagum, Hypochmus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi* (S). *Rhizoctonia noir, Maladie des colerettes, M. des manchettes, Varole des tubercules, Chancere du pied* (F). *Black speck, Collar rot* (E). *Wurzelkötter-Krankheit* (D).

فطر مجهرى يتطفل على البطاطا وعلى أكثر من ٢٠٠ نوع من النباتات تنتمي الى ٦٦ فصيلة. يكثر في المساقط المتدلة الحارة. يصيب الشتول في الاكواد فيلونها ويركها في الحقل فيعطلها اخصها القطن والبنندرة والبالذجان. مظهره على البطاطا المزروعة وشاح عتكيوي اغبر اللون يكتنف اللون والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجتمها ثم يقضي على صلابتها فترقي ونسود وتذبل اوراقها وتيس. وهو على درن البطاطا المقولعة وشاح مشيبي ابيض اللون عتكيوي النواص تنسلط قروح لاقامية الشكل والحلم لنها الى السمرة تعطب التسيج البندري || يكالغ باستعمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق.

### ٢٤١٩٧ - كُوْدَانِيَّات \* Corticiaceae (S). Corticiacées (F). Corticiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة العنيمات تتميز بعتبتها الفارش. نكتتها لمساء السطح او زباد، دقيقة الحلب اغشيتها قوية التركيب او شجعية. بوبغياتها شفافة. اجناسها وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة.

### ٢٤١٩٨ - كُوْدَانِيَّين ، كُوْدِيْن Codéine (F). Codein (E).

مادة قلووية بلورية متباعدة عادمة اللون تستخرج في الانيون. تغلي عند ١٥٥ م.غ. وهي قليلة اللوان في الماء. تلوب في الكحول والكلورفورم والبزيرن وسلفور الكربون.

### ٢٤١٩٨ - كُوْنَن كَنْدُول \* \*

*Psathyrella candolleana* (S).

*Psathyrelle de Candolle* (F).

نوع من الكونن. يكثر وجوده في بعض غابات اوروبية وتركية. يعيش على الدبال في المراعي الجبلية. ساقه دقيقة ، رفيعة ، غيراه اللون. نكتته مظلمة الشكل ، غيراه اللون ويلها مواج اصفر تشته صفوته وتسر عند القرقص ، قطرها نحو ٧ سم. اطراسها وردية اللون || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة.

### ٢٤١٩٩ - كُوْنَن مُحْمَكِي \* \*

*Psathyrella velutina* (S). *Psathyrelle veloutée* (F).

نوع من الكونن. يعيش على الدبال في المراعي الظليلة. ساقه دقيقة ، عرياء ، سمراء اللون ، خلية الزغب حتى اواسط انزام الرابع. نكتته مظلمة اللبوة ، لامتساوية السطح الخليل الزغب ، قطرها نحو ٥ سم. لنها الى الكسني الاصفر المراج || لحيتها جيدة الصنف ، مأكولة.

### ٢٤١٩٠ - كُوْجَر \* ، بُوْمَاء ، اُسْد اْمُرِيْكِي

*Felis concolor* (S). *Puma, Puma concolor, Cougar, concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique* (F). *Puma, Cougar, American lion* (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات. اصطفاه البلاد الامريكية. شكله يشبه البوق. طوله الكامل نحو ٢٠٠ سم. جسمه ١٤٠ ودينه ٦٠ اما ارتفاعه نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الفللة السوية المتأخرة يمتع مع اقترابه من الظهر ويغير عند البطن. زوره ابيض وشفته العليا كذلك || يأنف الاجراح الكثيفة العائنة. يتسلق الاشجار بجمعة وقد يقضي وقت استراسته عليها || قوته ما استطاع اقتراسه من الحيوان والطير. يسرح عند الغروب وفي اوائل الليل ويعد الفجر || انشاء تقعص من جبر واحد الى خفة جراء تبصر النور بعد وضعها بستعة ايام وتراقق ايام بعد ثلاثة اشهر.

### ٢٤١٩١ - كُوْدَ ، كُوْدَة Planche à semis (F).

هي التربة او المسكية سطح ترابها ودفعت حروفها وحضرت لاقبال البزور. ج اكود.

### ٢٤١٩٢ - كُوْدَ Entasser (F). To hoard up (E).

كود القراب. جمعه ويجعله كية مسطحة.

### ٢٤١٩٣ - كُوْدَانَة \* Corticium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الكودانيات. انواعه عديدة تتطفل على مختلف اغشاء النبات وعلى الاشخاب الجافة المصنوعة || مظهره الخارجى اباد مشيبي كثيف التسجيع يلحف الاغضاء الموصومة ثم يوشها بقروصه الحنطية اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعها ما يتبع.

### ٢٤١٩٤ - كُوْدَانَة جَاوَا \* \*

*Corticium salmolicolor, C. javanicum, Necator decretus* (S).

فطر مجهرى يعيش في المناطق الحارة. يتطفل على عدة نباتات اخصها الحيفية والين والككاه والحنصيات والسنت والكتيا والمنشا... || يركب الافاناد عند انتشارها على الاغصان والاغصان عند انتشارها على الجذور من الجهة السفلى المعرصة لاشعة الشمس || مظهره الخارجى يور مستترة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة ملبة



كودر

## ٢٤١٩٠ - كودر \*، كوسان \*

*Pachyrhizus* (S). *Pachyrhize*, *Pachyrhiz* (F).  
كودر هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة .  
جنس نباتات جنية عارضة ومعمرة من فصيلة القرنبيات  
الفراسية . أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الهند الصينية  
وملقة . تزرع كنبات حولي لجناء جلورها || سوقها  
عارضة كالوربياء . أوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات  
قلبية الشكل . أزهارها عنقودية التجميع ، أبطي الارتكاز .  
أزهارها صغيرة بنفسجية اللون ، مستحبة العرف . سنفاتها  
مستطيلة ، معتدلة التبطيط || حبوبها تؤكل خضراء ومطبوخة .  
جلورها شبيهة بالكربن وتؤكل طازجة ومطبوخة .

## ٢٤٢٠٠ - كودس

*Codex*  
مجموعة العقاقير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

## ٢٤٢٠١ - كودن

*Bardot* (F). *Hinny* (E).  
هو البغل المتولد من الحصان والآنثان ومنهم من سماه النخل .

## ٢٤٢٠٢ - كودن \*

*Croiser* (F). *To cross*

## ٢٤٢٠٣ - كودنة \*

*Croisement* (F).  
*Cross-breeding* (E).

## ٢٤٢٠٤ - كودو \*

*Strepsiceros* (S).  
*Strepsicère*, *Coudou* (F). *Kudu* (E).

جنس حيوانات لبونة غابية مجترة من فصيلة الايليات .  
له نوعان موطنها يمتد من الصومال الى الحبشة والزمبيز .  
وبعض اصقاع افريقية الجنوبية || ملجئها الحياتي جماعي .  
اجسامها كبيرة اللد تتميز . بقرونها القلبية المستطيلة .  
اناثها جاء . ضرورها ثنائية الاخلاف . عجلها يستمر  
نحو ستة اشهر تقص في تمامه ينفورا واحدا .

## ٢٤٢٠٥ - كودو الحبشة \*

*Strepsiceros imberbis* (S).  
*Strepsicère imberbe*, *Coudou de l'Abyssinie* (F).  
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الاجام  
والغابات التي تجتازها بجاري الماء . يسرح في النهار ويبعث  
في الليل في مواقع معينة قلا يغيرها || جسمه كبير اللد  
يطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم .  
ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لولبي الشكل يرتفع نحو  
٦٥ سم . ثوبه الى الشقعة السمراء المتفاوتة المواجه بين الرأس  
والظهر والصدر والبطن . وهو عادم المفرة والحلال الابيض  
في الجبهة انما يعلو من الحاروك الى الكفل خطوط معترضة  
بيضاء عددها ١٥ عند الذكر و١١ عند الانثى . قوائمه  
شديدة النشط وسرعة عدوه تفوق سرعة كودو الرأس ||  
اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية  
شودان .

## ٢٤٢٠٦ - كودو الرأس \*

*Strepsiceros capensis* (S).  
*Strepsicère du Cap*, *Coudou du Cap* (F).  
نوع من الكودو . موطنه يمتد من رأس الرجاء الصالح الى  
الحبشة والصومال . يألف الغابات والارحاج . يسرح في  
النهار ويبعث في الليل || جسمه كبير اللد يطول نحو  
٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه  
نحو ١٣٥ سم . قرنه لولبي الشكل ، ارتفاعه العمودي  
نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم .  
ثوبه الى الشقعة السمراء . عفرته شديدة السمره تمتد من قة



كودو الحبشة

الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلمو من الحاروك الى الكفل  
تسمة خطوط معترضة ، بيضاء اللون ، لامتسارية الطول .  
عيناه لوزيتان ، بارزتان . اذناه كبيرتان . ويحمل في  
اعل قصبة الانف هلال ابيض ينتهي عنه المائي . قوائمه  
ضليمة . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكربين مانين  
واربع اناث واربعة شودان .

## ٢٤٢٠٧ - كور العبيد هو الشيط الحيشي ، اطلبه .

*Uranoscopus* (S).  
*Uranoscope* (F). *Uranoscopus* (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الترخونيات ورتبة  
شائكات الزعانف || انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها  
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة اللد  
عاز متوسطة . تتميز برووسها المنتصب الاشدق ، ويعونها  
الحامية الارتكاز الاقني وبزعانفها الشائكة المنانص  
الحادة || تعيش مغفورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها  
سوى طرف الزعنفة الظهرية الاول وهي شائكة المنانص  
المسمة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخشن .

## ٢٤٢٠٩ - كورب اخشن ، اشتررب ابيض ،

*Uranoscopus scaber* (S).  
*Uranoscope raboteux*, *Rascasse blanche*, *Rat* (F).  
*Uranoscopus scaber* (E).

نوع من الكورب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة  
الترخونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها  
اهليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ،  
مصفع ، منتصب الفك ، مستعرض الشق ، متراكب  
الزوايق العظمية . عيناهما اقنيتا الارتكاز تحتلان قنة  
الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاول  
ناشرة المنانص الصلبة اللدرة المسمة . منانص اسفله  
مسمة ايضا || ثوبها اللولبي الى الريدة السمراء تملوها  
رقشة حنطية زاهرة . جانباها الى الريدة الفضية المواجه  
بطنها الى البياض الاغبر || لحمها كائن الصنف ، قل  
من يرغب فيه .

*Courbaril* (F).  
٢٤٢١٠ - كوربريل  
هو الكدو ، اطلبه .

*Crù*, *Cru* (F).  
*Growth*, *Country* (E).

منطقة معينة تتميز بمجموعة بعض صفات محاصيلها الزراعية .  
ج . كور .

## ٢٤٢١٢ - كورتل

*Patrinia* (S). *Patrinie* (F).  
٢٤٢١٣ - كورس زورقي  
جنس نباتات عشبية من فصيلة الناريدييات انواعها المعروفة  
١٢ منها البري والزيتي والحوول والمعر . سوقها فروع  
تعلو من ٣٠ الى ١٨٠ سم . أوراقها مركبة متعاقبة .  
أزهارها نطاطية عشوية عثولية التجميع . ثمارها بيضية  
الشكل ، مستديرة القنابات . اشهر انواعه .

*P. rupestris* (S). *P. des rocaillies* (F).  
*P. siberica* (S). *P. de Sibérie* (F).  
*P. scabiosaeifolia* (S).  
*P. à feuilles de scabieuse* (F).

*Coreus scapha* (S).  
*Coreus esquif* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الكورسيات . جسمها متوسط



Coryza (F).

٢٤٢٢١ - كُورِيَّا

هي الثَّباب غشاء الانثى .

Chorizema (S).

٢٤٢٢٢ - كُورِيْزِمَة \*

Chorizème (F). Tango plant (E). Körismapflanze (D). Corizema (I).

جنس نباتات عشبية وجبئية من البذرانيات وفصيلة القرنيات. أنواحه قليلة منبهاً استرالياً، بعضها زراعي تزييني أشبه :

Ch. dicksonii (S).

كُورِيْزِمَة ديكسونيه

Ch. de Dickson (F).

Ch. cordatum (S).

كُورِيْزِمَة قلبية

Ch. en cœur (F).

Ch. varium (S). Ch. varié (F).

كُورِيْزِمَة موشحة

Chorista (S). Choriste (F). ٢٤٢٢٣ - كُورِيْزِمَة

جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات. أنواحه المهرقة قليلة المدد، منبهاً بعض المناطق الاسترالية اصحابها امريكية الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة، داخجة، تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها نژادية، مركبة، خاسية الورديات البيضية الشكل، الجالدة التصال. ازهارها غشوية، خاسية البتلات، عديدة الاسدية. ثمارها حقية، مستطيلة، تحوى عدة بزور يشها زغب نام، قصير التيلة، قلماً يصلح للزئ. بزورها مأكولة بعد التحميص .

٢٤٢٢٤ - كُورِيْسِيورَة هي الصوب، اطلبه .

Courique (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيْك

جنس طير من الببناوات مشهور باسم امانزوة، اطلبه .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس، جِلُورِيْة

Corylopsis (S). Corylopse (F).

جنس جنبايات معمرة من فصيلة المشتركات. أنواحه عديدة. اصحابها الصين واليابان. دعوها جلوزية لانها قريبة الشبه من الجلوز. سوقها فراء. اوراقها عابلة. ازهارها سنبلية التجميع يستبق الازراق. ازهارها صغيرة ملونة عريفة الرائحة. اشهر أنواحه ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوس سُنْبِلِي \*

Corylopsis spicata (S). Corylopse en épis (F).

جنية سبروتية تزيينية منبهاً اليابان تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها وفروعها زياء اللحاء. اوراقها بيضية التصال، خلية الصفحة السفلى تملو من ٥ الى ٨ سم. سنابلها سباعية أو تساعية الازهار تملو نحو ٥ سم. || ازهارها يستمر طولك شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس صِيْنِي

Corylopsis sinensis (S). Corylopse de Chine (F).

شجيرة سبروتية تزيينية مهدا الصين تملو من ٣ الى ٦ اطار. ساقها فراء فناء. اوراقها اهلبلجية الشكل، نصلها يطول من ٨ الى ١٠ سم. سنابلها سباعية أو تساعية الازهار تملو نحو ٨ سم. || ازهارها يستمر طولك الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوس قَلِيل الزَّهَر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopse pauciflore (F).

جنية سبروتية تزيينية منبهاً اليابان تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء. اوراقها تملو من ٣ الى ٦ سم. وتعرض من

القد والتعطيط، شبه مربع البطن، مزواني الكوسل، يطول نحو ١٣ م. رأسها محرم. عظمها متدل الطول. ازهارها ناثرة. عينها صغيرتان، بارزتان. زيانها مستطيلان. كوسلها مزواني الجانبين || ثوبا الى الخنطى الاسمر الجذوي المواج. بطنها ملجذ بالاصفر. الصفحة السفلى من صدرها وبطنها الى الخنطى التبري المواج || مسرحها البراري حيث تكثر الاعشاب والازهار .

٢٤٢٢٤ - كُورِيْسِيَّات \*

Coreidae (S).

Coreidés (F). Coreidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجسامها منبهاً الحجوم والاشكال. رؤوسها محرمة أو مربعة. قرونها الاستشعارية رباعية الفصل. صفحات صدرها السفلى لاقبسية التعديد المد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاذى .

٢٤٢٢٥ - كُورَل \* Eurypyga (S). Caurale (F).

جنس طير من فصيلة الكورليات. أنواحه المهرقة قليلة المدد. موطنها يشمل كامل امريكة الجنوبية. اجناسها رقيقة. مناقبها جالسة مستدة الاطراف. اجنحتها مستعرضة ذرية، اذناها مستطيلة القد عريضة الرفال. ارساغها رقيقة ودقيقة. ارياشها رملة. اولها متراكبة الالوان الزاجية || اعرف أنواحه واشهرها كورل اللبس .

٢٤٢٢٦ - كُورَل الشَّمْس \*، بَلَشُون الشَّمْس

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F).

طائر من الكورل طوله نحو ٤٤ سم. قويه متركش الالوان يجمع بين الاحمر والاصفر والاخضر والاسود والابيض والاسمر والخنطى. زوره ويحصره مع عظمها الى البياض الماجي. عنقه مؤذر بالاسمر والاسود. ظهره وسفاه مجعدة بالاصهب والاسفع. افيئته وذنبه وقواده واباهره ومناكه مغطلة بالابيض والاسود. صدره وبعته الى البياض الخنطى. حدقة عينه حراء اللون، متقادة وساقه صفر || موطنه امريكة الجنوبية، يأنف الاخوار ويجاري المياه. قوته الحشرات على اختلاف أنواعها || يدفن في الاشجار المتفتدة القناء. يحبك مشه بالحنش ويططنه بالسلس والطين. اثناء تحضن من يبيضتن الى ثلاث بويضات نحو ٣ اسابيع .

٢٤٢٢٧ - كُورَلِيَّات \*

Eurypygidae

فصيلة طير يجمع بين الخنطى وطول الساق. رؤوسها واصنافها واجنحتها بلشونية الشكل، مناقبها وسبقاتها ثققلية. موطنها امريكة الجنوبية. تألف الاخوار ويجاري الماء. قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها .

٢٤٢٢٨ - كُورَم، كُورَمَة

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E).

نعت تعريفي توصف به الساق النوصية الديماسية .

٢٤٢٢٩ - كُورِيْدَال

Corydale (F).

هي التبرية، نبات من الخشخشيات، اطلبه .

٢٤٢٣٠ - كُورِيْدَالِيْن

Corydaline (F).

مادة قلوية عادمة اللون مؤشورية البلورات تستخرج من جذور الكوريدال واثراروند. تغلي عند ١٣٤ مغ. وهي قليلة الذوبان في الماء. تذوب في الكحول الساخنه وفي الكلوروفورم ولايتبر .



كورل اللبس



كوريزم



كوريليس سنبلية

٢٤٢٣٨ - **كُوسَج** هو القرش، اطليه .

Scyllorhinidae (S). **كُوسَجِيَّات** ٢٤٢٣٩

الكوسجيات فصيلة اسماك بحرية تدمي ايضاً غرائيات ، اطليها .

Corselet, Pronotum ٢٤٢٤٠ - **كُوسَل** ٥  
هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجشش .

Cucurbita pepo ovesera (S). **كُوسِي** \* ٢٤٢٤١  
Courgette (F). Vegetable marrow (E). Elerkürbis, Kürbiss (D). Zucca, Z. da mangiare (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات. ضروبه واصرامه عديدة. زراعتها مروية . ثمارها مستطيلة تؤكل مطبوخة . وتُزار الكوسى تحوي نحو :

٩٥,٠٠ ٪ من الماء  
٥,٨٠ ٪ من المواد البروتينية  
٠,٣٠ ٪ من المواد الدهنية  
١,٢٠ ٪ من المواد السكرية  
٢,٢٠ ٪ من المواد النشوية  
٥,٥٠ ٪ من الالياف

وهي تحوي ايضاً بعض الاملاح المعدنية اعصها الكليسيوم والحديد مع القليل من الفيتامين « ١ » والقليل القليل من الفيتامين « ٢ » .

Chayote (F). **كُوسِي اِفَرَنْجِي** ٢٤٢٤٢  
هو السكيوم ، نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

Apparier (F). To couple (E). **كُوش** ٢٤٢٤٣  
كوش الطائر اثناء سفدها والكوش سفاد الطائر .

Conyza dioscoroides (S). **كُوش** \* ٢٤٢٤٤  
Conyze, Conlise, Conlisa (F). Ploughman's spike-nard (E). Dörrkraut (D). Conliza (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . يجله تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها خشبية فراء . اوراقها منعقة اهليلجية ، نصلها ازغب البشرة على صفحته . ازهارها الى البياض الاخير || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجعالية الفعالة التي تفكك بالاحشار اعصها البراثيت .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْشِيَّات ، جَنْطِيَّات**  
Gentiana (S). Gentiane (F). Gentian (E).

جنس نباتات جنينية وعشبية من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ معلها بري وبعضها زراعي وزيتي وبعضها طبي . يستخرج من جذور اكثر الانواع مر الكوشاد ونجافس الكوشاد وسباغ الكوشاد . ويؤثر بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستعمل منه بعد التخمير نوع من التقديد الجيد الصف ٥ اعرف انواعه واشهرها مايتع .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد اُرْجَوَانِي** \*

Gentiana purpurea (S). Gentiane pourpre (F).  
نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مبدولة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لائفة متعاقبة سنائية ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايلق ، ارجوانية اللون ، سفاد الملاج . توجعها جبري الشكل سداسي التفصيص المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ . سنايلها ثنائية او ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٣٠ - **كُورِيلُوسِ مُسْتَعْرِضِ الْبَتَلَات**

Corylopsis platypetala (S). Corylopse à pétales élargis (F).

جنبة ثنائية مهدا الصين تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . سنايلها مبدولة القروع ، خلية اللحاء . اوراقها بيضوية الشكل ، نصلها خلي الصفحة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايلها خاسية او سبانية الازهار بطول من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها فأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طول فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوسِ** (S). Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البقاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها ماليزية وبجزر الزايج . ملجتها الجعياتي جماعي الا في زين التساقد والحضانة . تألف الغابات . قوتها الثار على اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد . اثوابها بجلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذناها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضاً انها تتدلى ككافائيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** ٥

Strobile (F).  
Strobile, Pine-cone (E).  
نمت تعريفي يطلق على الثار الكروزية المخروطية الشكل ، الورقية او اللبغية القشور .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَنْدَم**

Mangoustancier (F).  
هو جوز جنم ، اطليه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن**

Daine (F). Doe (E).  
هي انثى الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُو** ٥

Trichosurus (S).  
Trichosure, Kousou (F). Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة الفلنجريات . موطنه استرالية . تألف الاجراع اعصها اجراع الاكاليبتوس . قوته الاوراق والازهار وبيض العصائير والعصائير والاحشار . يسرح في الليل ويرقد في النهار || جسمه يحيم جسم السور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه ناشزتان . غوامه خاسية الاصابع متعددة الارتفاع || اثناء رباعية الاختلاف . له نوعان الثعلبي والكلبي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُو تَعْلِي** ٥

Trichosurus vulpecula (S).  
Trichosure renard, Kousou renard (F).

نوع من الكوزو شكله شكل الثعلب ، حركاته حركات الثعلب . اذناه كبيرتان قائمتان . ذنبه جمل الصفوف المستطيل . ثوبه الى الصهوة الشهاب يملوها موج صناعي يبق في الظهر ويغير في الاطليل والبلن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُو كَنْي** ٥

Trichosurus caninus (S).  
Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزو لا يختلف عن العلبي الا باذنيه المودتين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه جبري الصفوف . ثوبه خال من الموج الصناعي تملو مشعة سمراء .



كوسى



كوش



كوشاد ارجواني

## ٢٤٢١٧ - كُوشَاد أَصْفَر \* ، جَنْثِيَانِيَاتٌ صَفْرَاءُ ،

## جَنْثِيَانِيَاتٌ صَفْرَاءُ ، دَوَاءُ الْحَمِيَّةِ

*Gentiana lutea* (S). *Gentiane jaune*, *Grande gentiane* (F). *Yellow flowered gentian* (E). *Gelber Enzian* (D). *Gentiana gialla*, *G. maggiore* (I).

نوع من الكوشاد وهو جنبة معمرة جصاصية طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول نحو ٣٠ سم. وتعرض ١٥، فصلها طسي الصفحة جبل الحصار. أزهارها ضخمة التجميع، أبطية وتاجية الارتكاز، مستطيلة الماعلي، خاسية البتلات التجميعية الشكل والانتشابه، لونها إلى الصفرة || جلورها وافرة المواد الطبية والصباغية والسكرية. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٢١٨ - كُوشَاد رَيْبِي \* ، *Gentiana verna* (S). *Gentiane printanière* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية رية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة اللقد تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية سمجونية اللون. تويجها خماسي التفصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

## ٢٤٢١٩ - كُوشَاد صَلِيبِي الْوَرَقِ

*Gentiana cruciata* (S). *Gentiane croisetie* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها خمسية رباعية متقابلة تملو كالصليب. فصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبطية الارتكاز ضخمة التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. تويجها رباعي التفصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

## ٢٤٢٢٠ - كُوشَاد لَبْنِي \* ، جَنْثِيَانِيَاتٌ لَبْنِيَّةٌ ،

## جَنْثِيَانِيَاتٌ لَبْنِيَّةٌ

*Gentiana asclepiadea* (S). *Gentiane-asclepiade* (F). *Milkweed gentian*, *Willow gentian* (E). *Würger-enzian* (D). *Gentiana asclepiade* (I).

نوع من الكوشاد وهو جملة معمرة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة سنانية الشكل؛ فصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٣ إلى ٥ سم. عروقه بارزة ثلاثية أو خماسية المدد. أزهارها سمجونية اللون مرقطة بالبنفسجي. جلورها وسطحها غزيرة العصارة اللبنية المسماة || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

## ٢٤٢٢١ - كُوشَاد مَقِير

*Gentiana acaulis* (S). *Gentiane acaule* (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة ترينينية مقرّة. فروعه تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لاطئة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة اللقد، فردية التجميع، تملو من ٥ إلى ٦ سم. لونها إلى الزرقاء السمجونية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٢٢٢ - كُوشَاد مَهْدَب \* ، *Gentiana ciliata* (S). *Gentiane ciliée* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سبريتية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها فرعاء رباعية التفصيص. أوراقها لاطئة متقابلة، فصلها ضيق الصفحة وحيد العروق. أزهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ إلى ٥ سم. تويجها رباعي التفصيص، مهدب الختار والخالطة. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

## ٢٤٢٢٣ - كُوشَاد بَيَات ، جَنْثِيَانِيَاتٌ ،

## جَنْثِيَانِيَاتٌ

*Gentianaceae* (S). *Gentianacées* (F). *Gentianaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين وحببات الثمالة. أنواعها نحو ٥٠٠ تنتمي إلى ٦٠ جنسًا. جميعها أعشاب وحبشيات صغيرة اللقد. أوراقها لاقبسية الشكل والانتظام. أزهارها غشوية لاقبسية التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والأرجواني.

٢٤٢٢٤ - كُوشَر \* ، *Pluchea* (S). *Pluchée* (F).

*Ovra-bla* (E). *Ovra-blakorn* (D). *Pluchea* (I). جنس نباتات رية معمرة من فصيلة المركبات. أنواعه نحو ٢٠ أصنافها المناطق الحارة في جميع أصقاع العالم. نباتاته غشبية أو جبلية. أوراقها متعاقبة. أزهارها عذقية التجميع.

٢٤٢٢٥ - كُوشَشَة ٥ ، *Dendrométrie* (F).

*Forest mensuration* (E). تقدير أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها ووسائلها الحاضرة والمستقبلية.

٢٤٢٢٦ - كُوشِيلِ ، *Cochenille* (F).

هي القرمزية، أطلها.

## ٢٤٢٢٧ - كُوشِيلِ أَسْتَرَالِيَّةٌ

*Cochenille australienne* (F). هي القرمزية الأسترالية، أطلها.

## ٢٤٢٢٨ - كُوشِيلِ الْبُرْتَقَالِ الْبَيْضَاءُ

*Cochenille blanche des orangers* (F). هي قرمزية البرتقال البيضاء، أطلها.

## ٢٤٢٢٩ - كُوشِيلِ الْبُرْتَقَالِ السَّوَدَاءُ

*Cochenille noire de l'oranger* (F). هي قرمزية البرتقال السوداء، أطلها.

## ٢٤٢٣٠ - كُوشِيلِ الْفُتَّاح

*Cochenille du pommier* (F). هي قرمزية التفاح، أطلها.

## ٢٤٢٣١ - كُوشِيلِ الْتِينِ

*Cochenille du figuier* (F). هي قمية التين، أطلها.

## ٢٤٢٣٢ - كُوشِيلِ الصَّبَارِ

*Cochenille du nopal* (F). هي قرمزية الصبار، أطلها.

## ٢٤٢٣٣ - كُوشِيلِ الْلَكِّ

*Cochenille de la laque* (F). هي قرمزية لك، أطلها.

## ٢٤٢٣٤ - كُوشِيلِ الْوَرْدِ

*Cochenille de l'amandier* (F). هي قرمزية اللوز، أطلها.

## ٢٤٢٣٥ - كُوشِيلِ النَّخِيلِ

*Cochenille du dattier* (F). هي قرمزية النخيل، أطلها.

## ٢٤٢٣٦ - كُوشِيلِ الْوَرْدِ

*Cochenille du rosier* (F). هي قرمزية الورد، أطلها.



كُوشَاد أَصْفَر



كُوشَاد رَيْبِي



كُوشَاد لَبْنِي



كُوشَاد مَهْدَب



كُوشَر

٢٤٢٧٧ - كُوفَانِي ٥ Sabulicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل دويبة أو حشرة أو نبات يعيش في كوفان البرمل وكتبانه .

٢٤٢٧٨ - كُوفَة \* Cuphaea (S).

Cuphée, Cuphée (F). Cigar flower (E). Höckerkelch (D). Cufea (I).

جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الخناثيات . انواعه نحو ٨٠ اصلاتها البلاد الحارة الامريكية . اوراقها صفيرة متقابلة . ازهارها محورية الارتكاز ملونة تتميز باحديداب كؤوسها وبكبر بتلاتها العليا || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كُوفَة بَنَفْسِيَّة Cuphaea cyanea (S). Cuphée violet (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زياء . اوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذات الزام الاخير . كؤوس ازهارها خلية البشرة . ارجوانية الانتساب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة القد بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كُوفَة سَلْفُونِيَّة Cuphaea miniata (S).

Cuphée à pétales vermillon (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . نصلها زياء فراء . اوراقها متقابلة قصيرة الاضلاع . نصلها ضيق الصفحة ، خلي البشرة . كؤوسها الزهرية عشارية التستين تطول نحو ٣ سم . بتلاتها سلفونية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كُوفَة سَنَابِيَّة Cuphaea lanceolata (S).

Cuphée à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكوفة التزيينية المحلية تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصب . اوراقها سنانية ، متقابلة ، تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة ناشز العروق . كؤوسها الزهرية كثيرة الاحديداب ، بتلاتها مستديرة متجمعة وريدية أو ارجوانية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٢ - كُوفَة نَارِيَّة Cuphaea ignea (S).

Cuphée rouge-feu (F).

نوع من الكوفة التزيينية المعمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها وفروعها مغضلة الزوايا . اوراقها متقابلة ، اهليجية ، مدبية . كؤوس ازهارها نارية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة المعاليق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٤٢٨٣ - كُوفَة \* ، كُوفَة Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrach (D). Coca (I).

نبات بري وزراعي من الزكوايات . مهد البلاد الحارة الاسيوية وقد عمت زراعتها بعض اصقاع الحارة الاسيوية اخصها الهند وبرلنديب . غروب عديدة ، جميعها جنبايا معمرة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سوقها يغيض اللحم . اوراقها متقابلة معتقة اهليجية مدبية . نصلها بارز الضلع والسفل والعروق واضح الشرايين ، اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلى . ازهارها محورية الارتكاز ، صفيرة القد صفراء اللون . ثمارها ثورية مستطيلة الشكل عابطة الامرار || يستخرج من اوراقها بعد قفلها ويغليها مادة قلووية غندرة طبية تدعى « كوكاين » .

٢٤٢٧٧ - كُوشَنِيل سَان جُوزِه Cochenille de San José (F).

هي القرمزية الفتاكة ، الملهبا .

٢٤٢٦٨ - كُوشَنِيل طُوطِيَّة Cochenille floconneuse de la vigne (F).

هي قوزمية الكرم الحمراء ، الملهبا .

٢٤٢٦٩ - كُوشَنِيل غَبَرَاه Cochenille farineuse de la vigne (F).

هي القرمزية الفدراء ، الملهبا .

٢٤٢٧٠ - كُوشِيَّة ، هَيْثَم Kochia (S).

Kochia, Belvédère (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . انواعه نحو ٣٠ معظما بري وبعضها تزييني هربي الشكل . سوقها فراء فناء منتصبه تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعاقبة مشتركة غطية يكثر فيها الهديب ، تبو غضراء اللون صفراء الملوام ثم تحمر مع الخريف . ازهارها محورية الارتكاز ، صفيرة القد ، قليلة العدد || وهي تستعمل في صناعة الكانكس ولدود القز كالشبح .

٢٤٢٧١ - كُوشِيَّة هَرْمِيَّة Kochia-cypris (F).

هي الميهم الهربي ، الملهبا .

٢٤٢٧٢ - كُوشِيلِيَس Cochylys (F).

هو المذفوط ، الملهبا .

٢٤٢٧٣ - كُوشِيلِيَس الكُوفَة Cochylys de la vigne (F).

هو فائلة الثب ، الملهبا .

٢٤٢٧٤ - كُوع RADIUS

هو العظم الاصغر من الزند الاصل .

٢٤٢٧٥ - كُوعَر ٥ Colon (S).

Colon (F). Colon (E).

جنس حشرات من فصيلة الكوريات وربة غدييات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة بارزة . تأثيرها وتكوكها وملابسها نظامية . قرونها الاستشمارية قصيرة ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة . امحادها لاحفة . كواسلها وامحادها كثيفة الخمل الناعم . قوائمها صغيرة . اثوابها تراوح من السمرة الى السود القاتم || تألف الحقول والذبايات . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجائلة . بعضها قانص والبعض الاخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كُوعَرِيَّات ٥ Colonidae (S).

Colonidae (F). Colonidae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهليجية الشكل ، تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية . قرونها الاستشمارية قصيرة ، رباعية الفصل ، دبوسية الشكل . كواسلها عريضة . امحادها لاحفة ، خلية القشار || جميعها مفترمة ودائمة . تعيش تحت الحجارة والجائلة . تسرح في الليل . طيراتها خفيف الحركة || اشهر اجناسها الكوير .





كوكال السباح



كوكاليس



كوكال البحر



كوكية كوكية



كوكية



كوكلة الشبحان

صغيرة. سوقها كثيرة الفروع. عراجيدها متشعبة. اوراقها غشائية شبه متصالية يملؤها تحبيب متتابع مستنفل الوسط الاخف، مستنق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكال.

#### ٢٤٢٩٢ - كوكية

*Astrantia (S).*  
*Astrance (F).* *Astrantia (E).*  
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من السنكوليات وفصيلة الخبيثيات. انواعها قليلة جميعها بجيلة وجنبية. اوراقها مقصصة. ازهارها صوانية التجميع، تبدو كالنجوم بيضاء اللون او وردية. جلورها طيبة سهلة. اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

#### ٢٤٢٩٣ - كوكية خورقية الورق

*Astrantia helleborifolia, A. heterophylla, A. pontica, A. trifida (S).* *Astrance à feuilles d'Elébore (F).*  
نوع من الكوكية وهي بجيلة برية وتزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروبها مدادة، ساقها منتصب. اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسنة المهدبة. قلاوة صلبها الزهري مؤلفة من ١٢ الى ١٣ قنابة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ٢٤٢٩٤ - كوكية صغيرة

*Astrantia minor (S).* *Petite astrance (F).*  
نوع من الكوكية البرية المبدولة وهي بجيلة صغيرة القد تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروبها مدادة، ساقها مستنقة. اوراقها خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وتقرض من ٤ الى ٨. اصوبها الزهرية صغيرة القد قطرها نحو ١ سم. ازهارها الى الياض الاخير. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ٢٤٢٩٥ - كوكية كبيرة

*Astrantia major (S).* *Astrance majeure, Grande astrance, Sanicle de montagne, S. femelle (F).* *Larger astrantia, Master wort (E).* *Grosse Sternoldole, Meisterwurz (D).* *Astrantia maggiore, Sanicola femina (I).*  
نوع من الكوكية الطيبة والتزيينية وهي جنبه صغيرة القد تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة سهلة. ساقها قوية منتصب. اوراقها كبيرة مستعرضة خماسية او سباعية او تساعية الفصوص الاهليلجية الشكل المسنة الحار. اصوبها الزهرية كبيرة القد، ازهارها بيضاء اللون، قناباتها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

*Sillquaria (S).*  
*Sillquaire, Ténagode (F).* *Sillquaria (E).*  
جنس حيوانات بحرية من الرعويات مفديات الارجل وفصيلة المحبليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة. اصداؤها انبوبية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره اللولبية واسطاخته تختلف مع الانواع.

#### ٢٤٢٩٦ - كوكية

*Cucullia absinthii (S).*  
*Cucullie des armoises (F).* *Cucullia absinthii (E).*  
حشرة من السفقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. فراغتها جارية قوتها رقيق الازهار. مرثتها خاملة واسطة تعيش على

#### ٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان

*Cucullia absinthii (S).*  
*Cucullie des armoises (F).* *Cucullia absinthii (E).*  
حشرة من السفقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. فراغتها جارية قوتها رقيق الازهار. مرثتها خاملة واسطة تعيش على

#### ٢٤٢٩٨ - كوكال

*Centropus (S).* *Coucal (F).*  
جنس طير من فصيلة البقويات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اصنافها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسرائلية. اجسامها متوسطة القد او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المستقلة القليلة الطيران. تتميز باستنطال اذانها وبالطراها السفهاء المراج. اجنتها قصيرة. منقادها قوية، عنبية الافاك العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من اغث الاغصان الى الغطاء والناكبات والمقارب والديدان. ذكورها واناثها تتناوب على حضان البيض الذي يستمر نحو ١٥ يوما. اشهر انواعه. كوكال السنغال وكوكال السباحات.

#### ٢٤٢٩٥ - كوكال السنغال

*Centropus senegalensis (S).* *Coucal du Sénégal (F).*  
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من السنغال الى السودان. يألت الاذغال والاجام والغياض. ينساب بين الاعشاب ويتسلق الاشجار بشفقة. جسمه يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعقته والقسم الامامي من ظهره الى السواد الدامس يملوه مراح ازرق اسفع. جناحاه والقسم الخلفي من ظهره الى الصخرة الشفراء المراج. افنيكه وذنبه الى السواد المنمش بالاصهب. بطه الى الياض الاخير. قوته الحشرات والجنادب والمقارب والافاعي الصغيرة.

#### ٢٤٢٩٦ - كوكال السباحات

*Centropus rufipennis (S).* *Coucal des haies (F).*  
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يألت المناطق الرطبة والاجام والغابات. يقترب من المزارع ويحتم على السباحات. يملو بسرعة ويتسلق بشفقة ويغير يده. جسمه يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المراج. بطه الى الصخرة الخملية. افنيكه احمر. ذنبه الى الجوزة. قوته الافاعي والغطاء والوزع والمقارب والجراد. يدخن عشه بالحشيش الاخضر في الاشجار القليلة الارتفاع.

#### ٢٤٢٩٧ - كوكاليس

*Caucalis (S).*  
*Caucalide, Caulicler, Caulcaine (F).* *Caucalis, Bear parsley, Hedge parsley (E).* *Hafoldole (D).* *Caucalis, Lappolina, Seccia (I).*  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبيثيات. انواعها المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

#### ٢٤٢٩٨ - كوكالين

*Cocaine (F).* *Cocaine (E).*  
شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكال يستعمل في الطب للتخدير الموضعي.

#### ٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية

*Aster d'Afrique (F).*  
هو الشبيهة، نبات تزييني، اطلبه.

#### ٢٤٢٩٠ - كوكب البحر، صليب البحر، كلف مرزم

*Asterias (S).*  
*Astérie, Etoile de mer (F).* *Asterias, Starfish (E).*  
جنس حيوانات مائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.

#### ٢٤٢٩١ - كوكية، لومتاريا

*Lomentaria (S).* *Lomentaire (F).*  
جنس نباتات بحرية من الخبيثات احمر. انواعها المعروفة ١٢ اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحارة. كلالها

يتميز بقصر منقاره الاعقف الثلاثي التفريش . اجنحته متوسطة القد منفرجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٠ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول قوتها الحبوب والثمار والخضرات || اناته تبيض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في افصوص تدثنه بالخشيش بين الادغال والاشباح || اشهر انواعه ما يلي .

### ٢٤٣٠٤ - كُولَانَة عَمِيرِل

Colin de Gambel, Caille à casque (F).  
طائر من الكولان يتميز ببقعته المولفة من ٦ ارياش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يألف المناطق الوعرة قرب مجاري الماء .

### ٢٤٣٠٥ - كُولَانَة فِيرَجِينِيَّة

Colin de Virginie (F).  
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجوزة المؤذرة بالاسود والاصفر . رأسه عديم القزعة . يألف المراعي والحقول المزروعة وجوانب الرياض .

### ٢٤٣٠٦ - كُولَانَة كَلِيْفُونِيَّة

Colin de Californie (F).  
طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه متوج ببقعة مستطيلة الريش الاحمر القمعة || يألف الحشبات والادغال والحقول المزروعة .

### ٢٤٣٠٧ - كُولَانَة مَسِينَا

Colin Masséna (F).  
طائر من الكولان . ثوبه اسود اللون يعلو توتيم ابيض . يألف الرياض ومجاري الماء .

### ٢٤٣٠٨ - كَوَلَب °

Cholæxus (S).  
Cholæpe (F).  
جنس حيوان من فصيلة الدابات المتسلقة البطيئة الحركة . طوله يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . قوائمه ثنائية الاظافر المتسلطة المنقطة . ثوبه كثيف الورب لونه الى الصبغة العاقبة . يعيش على الاجنار . قوته البرام والتواهي والتجارة اثناء تقصع جرواً واحداً ترشعه وتحمله حتى الطعام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولوبيو .

### ٢٤٣٠٩ - كَوَلَبَة °

Calappa (S).  
Calappe (F), Calappa (E).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الكوليبيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة قلنسوية الشوزن بحبة الدروع حمرسة الالفوا . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متائلة || لحمها كاعنة الصنفت لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبية المبحجة .

### ٢٤٣١٠ - كَوَلَبَة مُحَبَّبَة °

Calappa granulata (S). Calappe granulé (F).  
يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المغمورة بالماء .

### ٢٤٣١١ - كَوَلَبِيَّات °

Calappidae (S).  
Calappidés (F), Calappidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل المخرمات . اجنتها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واخصها الشبان || جسمها متوسط القد يعلو نحو ١٦ م . بسطها نحو ٤٢ م . رأسها حنطلي الثوب . عينها كيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطلي اللون اصفر المخرج . بطنها الى الخنطلي الاشفتح المراج يعلو خط ثجبي اسود يعطى كامل البطن عند الذكر ويضبط نحو ثلثيه عند الانثى || وراثتها عند الشقين الى الخنطلي الاصفر تملوه في الزوج الامامي زركسة وصفقة وتزاويق تراوح من الصافي الى الاسود || لها جبل واحد في الحلق . تظهر القراصة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعامل بل ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المنك لطفاد على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الخضار الباهت يعلو تمشيع اريد ويجتمع معترض اسود يمتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . مدها الى اربعة الخضر . وارجبها الى السمرة || طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغفن السرعة ملتصقة بجلباب من اللبن .

### ٢٤٢٩٨ - كَوَكُو مُدَّهَب (F). Coucou doré

طائر مشهور باسم هوهو ، اطلبه .

### ٢٤٢٩٩ - كَوَكُوْلُس ° (S). Cocculus, Cebatha

Coquecul, Cébathe (F).  
جنس نباتات عارشة برية معمرة من فصيلة القمريات . انواعه نحو ٢٠ . جميعها طيبة مهددا المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقبسية الشكل . ازهارها عتقودية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نوية لا قيسة لها .

### ٢٤٢٠٠ - كَوَكَبِيَّات (S). Erythroxylaceae

Erythroxylacées (F). Erythroxylaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجنتها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

### ٢٤٣٠١ - كُولَا ° ، كُولَة

Seerculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Colanut, Kola-nut tree (E). Kolabum, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعه قليلة اعطانها المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٠ الى ٢٠ م . سوقها غبراء اللون مشققة القشور . اغصانها متبسطة متدلية . اوراقها معتقة متعاقبة اهليلجية ؛ نصلها جامد المسحة ، بارز البروق ، مستطيل المتى ، مدبب الطرف . ازهارها ذكورية او خنثوية ، الخنثوية عتقودية التجميع بحورية الارتكاز ، تتكون على الافئدة التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرون نولية مبطلة تنفذ من لوزتين الى عشر لوزات كلوية الشكل جامدة المادة اللبائية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر ، وهي مأكولة مغذية تنشط القلب وتنبه الاعصاب وتدفق الشعب والهرم .

### ٢٤٣٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).  
Kaolin, Porcelain clay (E).  
هو الاسم الصيني والبلعي للصلصال الحر الاغبر اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وغيرها .

### ٢٤٣٠٣ - كُولَان

Colins (F).  
American partridges (E).  
جنس طير من عمارة الحجلبيات وفصيلة الغليوبيات .



كوكولس



كولا



كولانة كليفونية



كولب



كولبة



كولج أرمك

الطول ، اسمر الخطم الاعل ، اصفر الاسفل . ساقه معتدلة الطول سوداء اللون . حذقة عينه الى الحمرة الياقوتية || يألف الاطعام الكثيفة ويقترب من الاماكن الاملة لكنه كثير الوجل والخلد || قوته الحشرات واسارهم والجراد والبراغ والنمل والثمار البرية والزراعية ومنها الكرز والتين || الاثني ثدثن عشها في الاشجار الرقيقة اللبابة الطل وتبيض من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما .

Salille, Colt, Monte (F).

كَوْمْ

زو ذكر الحيوان عل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والدواب .

٢٤٣١٩ - كَوْمُورُونَكْ \* ، صَرْأَبِيَّة \*

Coumarouna odorata, Dipteryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة القرنيات . مهدا البلاد الامريكية الحارة تكثر في فنزويلا والغويان . يستخلص من بزورها اللبابة ، يمدقها بالروم ، مادة الكوبرين الشائعة الاستعمال العطري والتبني || وهي كبيرة اللقد فارشة الانفسان اوراقها متعاقبة مركبة . ورفقها برية التجميع اذنيها ؛ فصلها جامد الصفحة يضيئ الشكل . ازهارها محورية الانتكاز . ثمارها شامية الشكل لبيفة السودق تحوي عصية مبطلة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم . ثمرتها قليلة الشائعة ، سريعة التجميع ، لونها الى السمرة البنية اللامعة ؛ لبها جامد المكسر ، اصفر اللون .

Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لتكون الحامض الكوبريني ؛ مادة متبلورة يضاء اللون مستحبة العرف العطري تلذب في الماء والكحول . تستخرج من الكوبرينه والهندوق ... وهي شائعة الاستعمال العطري تدخل في صناعة تعطير وتمثيل التبوغ الاسريكية .

٢٤٣٢١ - كَوْمَكْ \* ، كَلْدَمْ Cumul, Pluralism

الكوملة هي الجمع من كومل مع وكلة كذلك .

٢٤٣٢٢ - كَوْمَنْجَة \* Cumingia (S).

Cumingie (F). Cumingia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منقبحات الخياشيم وفصيلة المتحريات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار امريكية الجنوبية اغصها الشيل واليرير || اصداقها شبه يبرمية الشوزن ، متساوية المتوازي لا متساوية الاضلع ، مائلة السطوح البيضاء اللون الموضحة بالجلاوي .

٢٤٣٢٣ - كَوْمَة \* Coumia guianensis (S).

Couma, Coumier (F).

شجرة برية راتنجية دماع من فصيلة الدفليات . منبتها حراج الغويان || ساقها معتدلة الارتفاع فراء . فروعها متصبية محمرة اوراقها متعاقبة ، مثلبة ، جامدة النصال المرطاء . ازهارها محورية الانتكاز طرفية || يستخرج من ساقها بالغز عصارة راتنجية لها استعمالها الصناعي .

٢٤٣٢٤ - كَوْمَيْتْ \* Cometes (S). Comètes (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة النونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نيوت فياني الشرق الاوسط وافريقية الشرقية || ساقها فراء ، شكلها عنقودي

متوسطة العدد . اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة اللند ، لاثياسية الشكل تتميز بافواها المحرمة وبدروعها المهدبة السطوح العلوية ، وبلاقطها الضلعية || اشهر اجناسها الكوملة والذبالة والمتشوة .

٢٤٣١٢ - كَوْلَجْ أَرْمَكْ \*

Phascolarctus cinereus (S). Phascolarctus cendré, Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرابيات الشجارت وفصيلة الفلنججرات . موطنه بعض مناطق استرالية اغصها الشرقية . يألف الغابات . يسرح في الليل ويبست في النهار . قوته اوراق الاشجار وزعماتها وازعارها وممارها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم . ويرتفع نحو ٣٣ سم . رأسه اقلس القدم قريب الشبه من رأس الدب . قوائمه قصيرة ، خاسية الاصابع ، كبيرة الاظفار المهجنة الحادة الاطراف || ثوبه الى الرمكة ، يمتق في الظهر ويتر في البطن . الاثني رباعية الاخلاف || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها .

Coulomb

كَوْلُتْ ، كَوْلُتْ

هو ما يصرفه بالثانية الجبري الكهربي التي تبلغ قدرته ١ أمبير .

٢٤٣١٤ - كَوْلُتِيَّة \* Collybia (S).

جنس فلور من الفاريقنيات . انواعه عديدة تركيب عرضاً جلور بعض النباتات الحرجية دون ان تؤذيها .

٢٤٣١٥ - كَوْلِيَا الدجاج ، كَوْلِيَا الطير ، هَيْصَة الطير

Pasteurellosis avium (S). Choléra des poules (F).

مرض وبائي يصيب الدجاج فيفشي عليه اذا لم يكالنج وقائياً بالتطعيم بل الاصابة .

٢٤٣١٦ - كَوْلِيَّة \* Colisa (S).

Colisa (F). Colisa (E).

كوليز هو الاسم الهندي البنغالي . جنس اسماك نهريّة من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها انهر الهند وجبجرات ومنافقها || اجسامها شبه اهليلجية ، صغيرة ، لا تتجاوز ٢٠ سم . رؤوسها مستدقة الاعظام الصغيرة الاشدق . زعانفها الظهرية والبطنية مستطيلة ، متأثلة . زعانفها الحوضية شبه عجيطة . الذيلية كبيرة مقنونة . اثنائها الى الحصار الباهت يعلو تجذع مغرّض اريد اللون ، نحاسي المواج . بطونها الى البياض الاغر || ذكورها تحضن السري في عشاش شبه جرابية الشكل تحببها بين النباتات المائية || غوبها مأكولة متوسطة الصف .

٢٤٣١٧ - كَوْلِيْكُو امريكي \* Coccyz americanus (S). Coulicou américain,

Coucou à bec jaune (F). Yellow-billed cuckoo (E).

طائر من القواطع من فصيلة القيقوبيات . موطنه امريكية الشمالية وكندا . يرسل في اواسط الخريف الى جزر الانتيل ويعود في اوائل الربيع || جسمه متوسط اللد يطول نحو ٢٠ سم . بطنه نحو ١٤ سم . ثوبه العلوي الى الكهبة الزرداء تملؤها مهابات تراوح من الشبهة الى الخضرة والزرق . صدره وبطنه الى البياض الاغر . لواحف الاجنحة الى الشبهة . زكاه بلون الزرد اما ظاهر افيكه مع الزلاين فال السواد التام باستثناء الاطراف البياض . قدته زناجي المستطيل وعريض . منقاد معتدل



كوليز



كوليكو امريكي



كومورنه (عجبة)



كومتية

الصقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره واهاليه الى الشهية السوداء. بطنه وخوافيه الى البياض الاخير. هيته كالياقوت. منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواضم والحشرات يصيدها عند الشروق وقرب الغروب || يذئ في الاشجار الرقيقة. اثناء تقصع من فئتين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٤ - كَيْتُونِيَّات  
Cautérisation (F).  
Cauterization (E). هو احراق الجلد بمجديدة ونحوها.

٢٤٣٣٥ - كَيْتُونِيَّات  
Pélican (F). هو البجع، اطلبه.

٢٤٣٣٦ - كَيْتُونِيَّات  
Accommodat حالة حيوان أو نبات كَيْتُونِيَّات عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

٢٤٣٣٧ - كَيْتُونِيَّات \* حَارْدُ الْمَتَاعِ  
Myopotamus (S). Myopotame coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).  
حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اغصها الاقاييم المعتدلة الحرارة. يألف المئات وضفاف البحيرات وبحاري الماء. ملجئه الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. بما في الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل، مقطوع الخلف. عيناه واذناه صغيرتان، خاصة الاصابع. ذنبه مردي الشكل غليظ القاعدة، مستدق الطرف، هليبي الوبر في الزمان الاول والثاني، حشفي الحلقات في الزمان الاخيرين. وبره لبد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السمرة الكستنية. وفي البطن الى السمرة الخنثية. خاصرته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حجرة وجار يتحفرة بالتربة. الاثني تقصع من ٨ الى ٩ ادراس كاسية باصرة تسرح وتقوس في الماء بمر اسبوع || فروته جيدة الصفت مرغوب فيها ولحمه كذلك.

٢٤٣٣٨ - كَيْتُونِيَّات \*  
Chitonellus (S).  
Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم مصصحات القشار وفصيلة الكيتونيات. انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاندونيسيا واسرائيل || اصداؤها مستطيلة ممانية الصفحات المتراكبة. اجسامها قريبة الشبه باجسام البزاق. طولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اوبنها قليلة الانفرج. تتكود عند الخوف فتبدو كالأكرة الصغيرة.

٢٤٣٣٩ - كَيْتُونِيَّات \*  
Chitonidae (S).  
Chitonidés (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل، اماميات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها مؤلفة من ثمان صفحات كلسية المادة، متراكبة، مفصلية، تغلف الظهر ويمكن الدوبية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدبة.

الشوزن. اوراقها متعاقبة، وريجة النصال الضيقة المستدقة الاطراف || ازهارها خاسية البتلات والاسدية، وريجة اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها ربيعي.

٢٤٣٣٥ - كُونَج \*  
Hobbeva, Falquet (F).  
Hobby (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات. انواعه اربعة جميعها خفيفة الجناح ربعة الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. اثوابها عمرة ظهورها وسراقلها الى السمرة. بطونها الى البنية || اما انواعه فهي الكونج الديني والكونج الشائع والزمدم واليؤنو.

٢٤٣٣٦ - كُونَج الديني  
Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S).  
Faucon-pigeon (F).

طائر من الكونج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، ثرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد الهام والعصافير والقواضم الصغيرة والحشرات. وهو من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي. سره في رحله يمد بضع مئات. يذئ في الاشجار العالية وفي اوقاب الصخور. اثناء تقصع من ٣ الى ٤ وفئات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٧ - كُونَج شائع  
Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S).  
Hobereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكونج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثني اكبر حجماً من الذكر. وهو من القواطع يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاروبية. يألف الغابات والاحراج اللينة الاشجار. قوته العصافير والحشرات. يذئ في الاشجار الرقيقة اثناء تقصع من ٣ الى ٥ وفئات تحضنها وسدها نحو اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٨ - كُونَجِيَّات  
Cosmique (F). Cosmic (E).  
نعت تعريفي يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكون كالأشعة الكونية.

٢٤٣٣٩ - كُونِيَّات  
Cognac (F).  
هو الكيالك، اطلبه.

٢٤٣٤٠ - كُونِيَّات \*  
Cosmogonie (F).  
Cosmogony (E).  
الكونية نظرية في تكوين العالم، والنظريات في التكوين او التكوين عديدة ومنها المقدورة الهابة واللامقدورة.

٢٤٣٤١ - كُونِيَّات  
Conidie (F).  
هي الكنيد، اطلبها.

٢٤٣٤٢ - كُونِيَّات \*  
Cunila (S). Cunile (F).  
Dittang, Stone-mint (E). Kunel (D). Cunilia (I).

جنس نباتات برية نجيبة معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها نحو ٢٠. اصطناعها البلاد الامريكية. معظملها طهي. اوراقها معققة متعاقبة اهلجيلة الشكل. نصلها صغير القد خلى البرشة عطري العرف يشبه النعنع. ازهارها عطري التجميع طرفي الاركاناز. نقيع اوراقها وازهارها يفيد الالام ويقيء المعدة.

٢٤٣٤٣ - كُونَجِيَّات \*  
Elanus caeruleus (S).  
Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزراريق ينتمي الى عمارة الحناء وفصيلة



كونج



كونيلة



كومي



كيو



كيتون





كَيْبَلِيَّةٌ

بين الصخور. لحمها مستحب الطعم فاخر الصنف.  
أشهر أنواعه الثلاثة التالية :

## ٢٤٣٦ - كَيْبَلِيَّةُ الْأَطْلَسِ

*Labrus bergylta* (S). *Labre neustrien*, Crahotte, Vras (F). *Cockwing wrasse* (E).  
نوع من الكيدم. تكثر في المحيط الأطلسي من شواطئ بلجيكا إلى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مراكب الألوان الزاهية المتباينة.

## ٢٤٣٧ - كَيْبَلِيَّةُ حُمْرَاءَ

*Labrus viridis* (S). *Labre vert* (F). *Cuckoo wrasse* (E).  
نوع من الكيدم. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها إلى الخضار. ظهرها اسفع المواج. بطنها وردي اللون محتلي الماجة. الأثني ثلاثية البقع السود الجانبية وهي الأكبر من جنس من الذكر.

## ٢٤٣٨ - كَيْبَلِيَّةُ زُرْقَاءَ \*

*Labrus merula* (S). *Labre merle*, Merle (F). *Labrus merula* (E).  
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدميات ورنية شائكات الزعانف. أعطانها معطف أقاليم البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من أسماك الهامد والحشاش. ملجئها الحيائي شرطي || جسمها اهليلجي الشكل، معتدل التبييط، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. ثوبها متباين الخصب بين الشقين. اللون السائد هو الأزرق يطولو في القسم الأعلى من الجانبين والظهر مواج جزوي وأسد عند الذكر ومواج وردي عند الأثني. ويطولو في القسم الأسفل من الجانبين وفي البطن مواج بنفسجي عند الذكر ويليكي عند الأثني. رأسها مخروطي الشكل، منتشر الشعاف. فكاهما متعادلان. شفتها متوسط الانفرج. أسنانها كبيرة، منمقة. عيناها مستديرتان، جاحظتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة. زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.



كيدل ثنائي التنقيط



كيدم

## ٢٤٣٩ - كَيْبَلِيَّةُ مُلَوَّنَةٌ

*Labrus mixtus* (S). *Labre varié*, Coquette, Connet, Tenca (F). *Sespartridge* (E).  
نوع من الكيدم. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها متباين الألوان الزاهية فيها الوردي والحنتلي والبي والاحمر والاخضر والاسمر الدايق.

## ٢٤٣٥ - كَيْبَلِيَّاتٌ

*Labridae* (S). *Labridés* (F). *Labridae* (E).  
فصيلة أسماك بحرية من شائكات الزعانف تشمل زهاء ٤٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

## ٢٤٣١ - كَيْبَلَجٌ

*Terre de bruyère* (F). *Heath-soil* (E).  
هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكيي يختلف باختلاف مناصره الأساسية أو ريلية أو طينية أو جصية لكنه يتميز بوفرة المادة الدبالية المنحلة التي تجعله من أجود الأتربة الصالحة للزراعات التريينية والبيئية.

## ٢٤٣٢ - كِيرِش

*Kirsch* (F). *Kirschwasser* (E).  
هو خمر الكرز، شراب مسكر يصنع من قنديل الكرز.

## ٢٤٣٣ - كَيْرُوبٌ \*

*Cheropus* (S). *Chérope* (F). *Cheropus* (E).  
حيوان جاس لاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة

## ٢٤٤٠ - كَيْبَلِيَّةٌ \*، مَشْطَرَّةٌ

*Kigelia* (S). *Kigélie*, Arbre à concombres (F). *Cucumber tree*, Sacred tree of Nubia (E). *Kigeliabaum* (D). *Kigelia*, Albero di cetriolo (I).

جلس اشجار برية وزينية من فصيلة البنونية. مهدا البلاد الحارة. أنواعها أربعة. أوراتها متعاقبة مركبة. ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة القدد جملة الشكل، ملونة. ثمارها تشبه الخيار لكنها حاملة الطعم لا تؤكل.

## ٢٤٤١ - كَيْبَحَاءُ \*

*Rhynchonella* (S). *Rhynchonelle* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الكبحاليات. أنواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المائدة إلى الأياح الأول، أما المعاصرة منها فتنتشر في بحار الشمال والجنوب || اصداؤها مصراعية، متساوية، مروحية الشكل، تحدد الصفحات الخارجية، لؤلؤية الداخلية. تعيش شبه لاسقة بالصخور رابطها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ إلى ٣٥ م.

## ٢٤٤٢ - كَيْبَحَالِيَّاتٌ \*

*Rhynchonellidae* (S). *Rhynchonellides* (F).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الأياح الأول || أشهر اجناسها الكبحاء.

## ٢٤٤٣ - كَيْبَحَنٌ

*Pipit rousseline* (F). *Tawny Pipit* (E).  
طائر من فصيلة الذعيريات يدعى جشنة الحقل وطرسوم، اطلب جشنة الحقل.

## ٢٤٤٤ - كَيْدَلٌ ثَنَائِي التَّنْقِيطِ \*

*Adalia bipunctata* (S). *Adalie à 2 points*, *Coccinelle à 2 points* (F). *Adalia bipunctata* (E).  
حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسوقيات ورنية مفدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية. تألف البراري والحدائق والجنائن والبساتين والزراعات الصيفية. خنافسها ويزقاتها تعيش على الارق والقرنيز والمغفر والوبف ... || جسمها صغير القدد، بيضي الشكل، يطول من ٥ إلى ٦ م. ثوبها الذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً إلى السود تملو في كل غمد من غديه نقطة حمراء. رأسها صغير الحجم، ذلق الحظم، بقور بمعلمه تحت الكوسل. عيناها صغيرتان ماصحتان، زبابانها صقيتان. فكاهما ذريان. تأثيرها وملاصها صغيرة || الأثني اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زباباً || ايجالها الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وتبيت في الليل. يخفصاء الجليل الثالث تخفي فصل الشتاء مخبئة تحت الحجارة إلى ان تدب الحرارة فتخرج من مكبتها في اوائل فصل الربيع.

## ٢٤٤٥ - كَيْبَدَمٌ \*

*Labrus* (S). *Labre* (F). *Wrasse* (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدميات أنواعه المعروفة ١٠ تتميز بألوانها المراكبة الألوان الزاهية وبامتدالة زعانفها الظهرية والشرية. رؤوسها صغيرة. أعطانها مخروطية الشكل مشدقة الفك || مرتها قرب الشواطئ



كَيْرُوبٌ

حل القلب. وظائفة عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

### ٢٤٣٦١ - كَيْش \* ، أُو مَالِك

*Spatula clypeata* (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E). نوع من البط الروشن. طائر من القواطع مشتهر البلاد الأفريقية الحارة وبصيلة البلاد الباردة الأوروبية والاسيوية || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وعتقه الى الخصار الالاسع. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطلاؤه الى الشقطة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تملوه رقشة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاحضر والكسني. عيانه صغرتان عسلتان. منقاده صفيحي الشكل، ملمعي الطرف، اسمر اللون، اخضر المواج. جناحاه مستطيلان، لاحفان. ذنبه مخروطي الشكل، صغير القد، ابيض اللون، يتوسطه الاسود. ساقاه قصيرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اغصها المائية ودعل الصفادوع وبعض النباتات المائية || يدفن اضموصه بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاوعار في المواق الصميمة المنال. الاثنى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثنى دون الذكر الذي يؤمن لها الحاية والغذاء || تعتبر من الطرائد العزيزة. لحماها فاخر الصنف.

الزيبات. موطنه بعض احراج بلاد استرالية. قوته الديدان والحشرات || جسمه صغير القد يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وذنبه من ١٢ الى ١٤ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستند المقطر. قوائمته كقوائم الزيزب. جراب الاثنى ثنائي الالباء. فحنته من الوراء.

Mouche de l'olive (F).

### ٢٤٣٥٤ - كَيْشُون

هو غرشة الزيتون، اطلمها.

*Cairina moschata* (S).

*Cairine*, Canard de Barbarie (F). Barbary duck (E). طائر داجين من كفيات القدم صفيحيات المناقير ينتهي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكة الجنوبية || جسمها كبير القد. عتقها اطول من عتق البط الاهلي جناحها كبير الحجم، ذلق الطرف، يكاد يلحف الذنب. ذنبها صغير الجرم، مقطوع الطرف. ثوبها الى الخصار الالاسع الاصفر يملوه قتيقج ابيض || اخلاقتها شرسة تتمدى على غيرها من الطير الداجنة. لحما متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

### ٢٤٣٥٦ - كَيْش البَوْغ ، كَيْش الغُبَيْرَات

*Sporange* (F). Sporangium (E).

هو الكيس الشجري الذي يحضن بؤغ مستورات الزهر.

### ٢٤٣٥٧ - كَيْش الراعي \* ، قَرْمَلَة

*Capsella Bursa-pastoris* (S). Capselle, Bourse à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Mother's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Bors di pastore (I).

نبات عشبي بري حولي مبدول من فصيلة الصليبيات.

*Embryon d'animal* (F).

### ٢٤٣٦٢ - كَيْشَة

*Embryo of animal* (E).

هي النمرة، ملقحة الحياة التناسلية الكائنة في الحيوان.

*Caïophora* (S).

### ٢٤٣٦٣ - كَيْفُور

*Caïophore* (F). *Caïophora* (E).

جنس نباتات عنبية برية وتزيينية من فصيلة الموزيات. منها بعض مناطق امريكة الجنوبية. هليها حارق كالقراش سوقها مدادة. عارشة. اوراقها لاقباسة الشكل. ازهارها كبيرة القد، حراء اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

### ٢٤٣٦٤ - كَيْفُور أعْوَج الحَقِ

*Caïophora contorta* (S).

*Caïophore à capsule tordue* (F).

نوع من الكيفور. عشبة حولية تزيينية. ساقها عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخير. نصلها منشارية الحتار، باهتة الخصار يملؤها بعض الزغب والمطب. ازهارها حراء اللون يملؤها بعض مواج يرتقالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف.

### ٢٤٣٦٥ - كَيْفُور قُرْمِي

*Caïophora coccinea* (S). *Caïophore écarlate* (F).

نوع من الكيفور. عشبة تزيينية معمرة. ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة، السفلى منها ريشية غمرية اما العليا فاهليجية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها قرمزية اللون. غدة الرحيق فيها مستطيلة الخويط المحببة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

*Kyste* (F). *Cyst* (E).

دملة لاقباسة الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض الننج.

### ٢٤٣٦٩ - كَيْسْكَال \* ٥

*Quiscalus major* (S).

*Quiscale majeur* (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكة الشمالية. يألف المناطق الجبلية وصفاف الابهار. سريره وافر العدد || جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم. منقاده اطول من رأسه وهو محدب الخطم العلوي البين التقوي. جناحه معتدل الطول. ذنبه مستدير الطرف. حدة عينه جزؤية اللون. ثوب الذكر اسود اسم يملوه مواج جزوي في الرأس والذال ومواج اخضر في الذنب. ثوب الاثنى الى الكهبة السمرام المابقة في الرأس والرداء والجناحين والذنب والى الكسلة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اخلاقه رضية آتسة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاساربع والصفادوع والروغيات ولا يعف عن الحبوب والثار العنبية || يدفن عشه في الانجار الراتنجية اغصها الصنوبر. الاثنى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمثابة الذكر نحو ١٥ يوما || عشه جرابي الشكل، بالغ الطول، لبد الحيك يملقه بفند الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وقطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

### ٢٤٣٦٠ - كَيْسَم

*Xylem*

هو في النباتات الخشبية نسيج الساق والجذور الذي يرتكز



كبريتة



كيس الراعي



كيسكال



كيش

صغيرة. اذناها قليلة الانفراج. زعانفها الظهرية مستطيلة، الجزء الأول منها شفاف شائك، الجزء الثاني مغني سرح. الذيلية منفرجة، شبه فارقة. اثنائها الى الرعدة الفضية تعلوها زخارف وتجاويز متباينة الزرابة سمراء اللون خضراء الموالج || طولها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

**٢٤٣٧٣ - كيلوغرام**  
Kilogramme (F).  
هو الف غرام يعرف عنه عادة بكلمة كيلو. وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

**٢٤٣٧٤ - كيلومتر**  
Kilomètre (F). Kilometre (E).  
من المقاييس السطحية قدره الف متر.

**٢٤٣٧٥ - كيلوات**  
Kilowatt  
من المقاييس الكهربائية قدره الف وات. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقاتها الف جول بالثانية.

**٢٤٣٧٦ - كَيْفِيل**  
Chimaphila (S). Chimaphile (F). Chimaphila (E).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «حبيب الشتاء». جنس نبات معمرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منبتها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستقلة مدادة قليلة الفروع. اوراقها متعاقبة، سانية النصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون او وردية || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كيلع ألس

**٢٤٣٧٧ - كَيْفِيل مَيْتَوَانِي**  
Chimaphila umbellata (S). Chimaphile en ombelle (F).  
نوع من الكيفيل. ساقه تطلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. اوراقه جميلة الخضار تطلو نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القند، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

**٢٤٣٧٨ - كَيْفِيل مَلْطَخ**  
Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).  
نوع من الكيفيل. ساقه تطلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. اوراقه تطلو نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القند بيضاء اللون، فواحة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران.



كيلس

**٢٤٣٧٩ - كَيْمَوِي**  
Chimique (F). Chemical (E).

**٢٤٣٨٠ - كَيْمَوِي**  
Chimiste (F). Chemist (E).

**٢٤٣٨١ - كَيْمُوغ**  
Terre arable (F). Arable soil (E).  
هو التراب الزراعي. ويتميز آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتسكن منها المهرات او التي تسبر غورها جذور النباتات الزراعية.



كيلودكيل

**٢٤٣٨٢ - كَيْمُوغ**  
Chyme  
مجموعة المواد الغذائية المائعة في المعدة بعد امتدادها الارلي.

**٢٤٣٨٣ - كَيْمُوغ**  
Géophage (F).  
هو التاراب، اظليه.

**٢٤٣٦٦ - كَيْمِي**  
Empirique (F).

**Empiric, Empirical (E).**  
هو ما ارتكز على المادة او التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية الململة.

**٢٤٣٦٧ - كَيْكَة**  
Calca (S).

**Calca (F). Calca (E).**  
جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعها المعروفة ستة تنتمي الى عمارة الدّر. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملجئها الحيائي جماعي باستثناء زين التسافد والحضن || اجسامها ربعة تطلو من ٣٠ الى ٣٦ سم. اثنائها تختلف مع الانواع. الوانها الملوية الى الخضار المتفاوت الماحات. الوانها السفلية تراوح من الزيتية الى الصفيتية والسمراء، اجنتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب، لا تلحف كامل الذب. اذناها مقطوعة الاطراف. ارسافها قصيرة. اصابعها كبيرة، شديدة السرعة || تألف القبايات القريبة من المعمران. قوتها اثار البرية والزراعية والحجوب.

**٢٤٣٦٨ - كَيْل، مَعَايِرَة**  
Jaugeage (F).

**Gauging (E).**  
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم وما اشبه. كقياس المياه الجارية وحجم الدن وقطر الشجرة الخ.

**٢٤٣٦٩ - كَيْل المِسَاحَة**  
Levé superficiaire (F).

**٢٤٣٧٠ - كَيْلَع أَلْس**  
Obisius lubricum (S). Obisie lisse (F). Obisius lubricum (E).

دويبة ناعمة من فصيلة الكرنيسيات ورتبة العقربيات الكاذبة. جسمها صغير القد يطلو نحو ٣ سم. صدرها مجوذي اللون، مبط الصفحة المائلة. مقنيها كيران يتنيان بمقلطين كلائط المقارب يعلموها هلب دقيق اطحل. بطنها مبط عادم الذب اكهب اللون اسمر الموالج. عينها مركبتان، صغيرتان. جرابها معتدلة الطول، حنطية اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجثالة والحجارة الصغيرة. مسرحها جدوي. قوتها الحشرات الصغيرة وكنها ومازن النمل ودياب والديدان ... || تتمر نحو خمس سنوات يباها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبض الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تطفلها كالثوبة يصلبة حريرية النورس سمراء اللون. يتم التفق وتفتلق الصلبة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلباً للرزق بعد التفق بنحو ٤٨ ساعة.

**٢٤٣٧١ - كَيْلَس**  
Chellinus (S). Chéline (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديات الشائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٢٥ اعطائها المحيط الهندي وجواره. تتميز باستطالة زعانفها الظهرية والشرجية ويتبدس قلوبها المشتابة وبخضر فاحكها البطني || جمع انواعه مأكولة اشهرها كيلس ديشل وهي مككة كبيرة القند تطلو نحو ٦٠ سم. لوها الى السمرة يملوها موج اخضر.

**٢٤٣٧٢ - كَيْلُوْد كَيْتِيل**  
Chellodactylus (S). Chellodactyle (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة. اعطائها بحار الجنوب || اجسامها شبه اعليجية الشوزن تطلو من ٢٥ الى ٣١ سم. رؤوسها

التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعتها رابحة وجوبه شائعة الاستعمال الغذائي .

٢٤٣٩٥ - كَيْنُونَة °  
Phylogénese (F).

تاريخ تكوين ونشوء وتطور الانسال .  
Phylogeny (E).

٢٤٣٩٦ - كَيْنَيْت  
Kaïnite

ملح بوتاسي طبيعي الحفرة تركيبة مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض التي من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية المحمودة الاستعمال بحوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكنه يسمح ذرات التربة السطحية وينشط انكماشها لذلك يحسن استعماله في الأثرية الرليلة الخفيفة دون سواها .

٢٤٣٩٧ - كَيْشِين  
Quinine

الكينين اصل فاك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحيات .

٢٤٣٩٨ - كَيْهَب °  
Prioscélus (S). Prioscèle (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة تختلفت الاجزاء وفضيلة النيشيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاقالم المجاورة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط . رؤوسها معتدلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كوالها مجنية الشكل . اغارها لاحقة محزنة . جرانها قصيرة ، مقوسة ، نشطة . انوابها لماعة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود والبني الاسمر .

٢٤٣٩٩ - كَيْهَنُ الثِين °  
Hypoborus fuscus (S). Hypobore du figuier,

Scolyte du figuier (F). Hypoborus fuscus (E).

Feigenborkenkäfer (D).

حشرة غاضلة خاشية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة منعدات الاجنحة . اعطائها اللبانية تمتد امتداد اقلم الثين ، من السواحل الى ارتفاع الف متر عن سطح البحر . تركب الافاناد المستضفة ولا تقرب من الريانة او اليابسة || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية يملوها في ظهرانها مواج اريد . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها صولجانيان فكاهها شبيخان ذربان . ظهرانها ذلق المؤخر اللاحت . غدها متابعنا التميزر القاطب || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ ، اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجبلان في اعالي الوسط || وجود الحشرة الجملانة والبرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مدار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتأخذ على عاتقها علاج السرداب الرئيسي وسجرة التعاطل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

٢٤٤٠٠ - كَيْوِي °  
Apteryx (S).

Aptéryx, Kiwi (F). Apteryx, Kiwi (E).

طائر راس عداً وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكيويات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القد ، جسمه محجم الدجاجة ، ثوبه الى السمرة السفاه المراج . وهو اجدع الجناح ، عادم الذنب . خيبي الريش اللقيق الناعم الذي يشبه الشعر . مقاره مستطيل مخدب . يسرح في الليل . قوته

٢٤٣٩٤ - كَيْمُونْتَسُ \* ، زَهْرَة الشِيَاء

Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycaut du Japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Kelchblume (D). Chimonanto (I).

جنس شجيرات رية ورتبية من فصيلة الكليكتوسيات . انواعه قليلة العدد . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلها سناني الشكل ، ماس البشرة ، زاهي الخضار || ازهارها متدلية انبوبية جرونية العرف . الوانها تختلف مع انواعها منها الارجواني والاحمر والاصفر والموشع || ازهارها يستمر من كانون الاول الى اذار .

٢٤٣٩٥ - كَيْمِيَاء ، كَيْمَاء

Chimie (F).

Chemistry (E).

علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

٢٤٣٩٦ - كَيْمِيَاء حَيَوَانِيَّة

Zoachimie (F).

Zoochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٩٧ - كَيْمِيَاء كَهْرَبَائِيَّة

Electro-chimie (F). Électro-chemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في المناشع الكيماوية التي تسيرها الكهرباء .

٢٤٣٩٨ - كَيْمِيَاءِيَّة

Biochimie (F).

Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٤٣٩٩ - كَيْمِيَاء تَبَائِيَّة

Phytochimie (F).

Phytochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء خاص بالنبات .

٢٤٣٩٠ - كَيْمِيَت راجع كروز فيلم كينيتو .

٢٤٣٩١ - كَيْنَا هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - كَيْنَة

Clitoris

هي مقر الاحساس المرفع من الفرج وهي جلام مدخل الزردان او حجابها ، مركزها تحت الزردية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - كَيْنَكَاوُ °

Cercoplectes (S).

Kinkajou (F).

حيوان من الرانثيات وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكية الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية . جسسه تطول نحو ٤٠ سم . وذيله ٥٠ سم اما ارتفاعه من ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالفرد للارتفاع من غصن الى غصن ومن شجرة الى اخرى . قوته الثار والدويبات الصغيرة والمصابير والبش و الحشرات والعسل الذي يفتش عنه ويلتهمه بشراهة .

٢٤٣٩٤ - كَيْنَوَا ° ، أَلِيْنَة كَيْنَوَا °

Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F).

نوع من الالينية وهو نبات عشبي يحل حولي زراعي مهدد بلاد الشيلي والبيرو . ساقه منتصبه قليلة الفروع . اوراقه معتقة متعاقبة سنانية النصل المرفرس . ازهارها سنبلية ليد



كيمونتس



كيتاجو



كينوا



كيب



كين الثين



كيوي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كِيِيَكَة

Micro-organisme.

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق على كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد بالعين المجردة بل تحت المجهر كالميكروبات والبكتيريات والخمائر والاعفان والاولالي .

٢٤٤٠٢ - كِيِيِين °



الحشرات والديدان والحيوب . يعيش ذكراً واثى . انثاء تحضن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة واحدة زرعها نحو ٢٤ يوماً .

Apterygidae (S).

Aptérygids (F). Apterygidae (E).

فصيلة طير من العوادي تشمل حالياً بنوع واحد يدعى كيوي موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كِيُونَات °



ل

Electrode

٢٤٤١٢ - **لاحب**

هو القطب الكهربائي أو المنفذ الكهربائي .

Lepismidae

٢٤٤١٣ - **لاحسات**

فصيلة حشرات تعرف بالشحبيات ، اطلها .

Lepisma (S).

٢٤٤١٤ - **لاحسة**

Lépisme (F). Lepisma (E).

جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والنشوية . راجع شحمة .

٢٤٤١٥ - **لاحسة السكر \***

Lepisma saccharina (S). Lépisme du sucre, Petit poisson d'argent (F). Silverfish (E). Silberfischchen (D).

حشرة صغيرة القد اهليجية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبدولة في البيوت تلتص السكر وتقرص القرطاسية والكتب .

Cœlentérés (F).

٢٤٤١٦ - **لاحسويات**

Cœlentèrata (E).

هي الحرفوات ويدعوها في مصر « جوفويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بجلوها من الاحشاء والاستعاضة عنها او الاكتفاء بتجويف وحيد الفتحة ويقوم مقام الفم والامتصاص .

Zoophage (F).

٢٤٤١٧ - **لاحيم ، واليج**

Zoophagous (E).

ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دودية ام حشرة .

Carnassiers

٢٤٤١٨ - **لاحيمات**

هي آكلات اللحوم ، اطلها .

Apétale (F). Apetalous (E).

٢٤٤٠٤ - **لايتلي**

هو النبات الذي لا لقالة في زهرته . وهي الزهرة العادمة البتلات .

Lactifère (F). Lactiferous (E).

٢٤٤٠٥ - **لاين**

نعت تعريفي يطلق على الاوعية العضوية التي تنقل اللبن او العصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

٢٤٤٠٦ - **لاقتاضي بالوكالة**

Nul ne plaide par procureur (F).

مبدأ قانوني فرنسي سري مسرى الامثال فحواله انه اذا وكل عمرو زيدا بمقاضاة بكر وجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصل .

Grémillet (F).

٢٤٤٠٧ - **لاكتسي**

نبات تربيني يدعى آذان الفأر المنقي ، اطلها .

Lathyrine (F).

٢٤٤٠٨ - **لاتيرين**

هي الجلبانين ، راجعها .

Calcifuge (F).

٢٤٤٠٩ - **لاجصي**

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي لا تنمو في الارربة الكلسية او انها تنحشاها .

Frénateur (F). Brakesman (E).

٢٤٤١٠ - **لاجيم**

نعت تعريفي يطلق على الاعصاب والمضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

٢٤٤١١ - **لاجيم الضفدع**

نبات يدعى كلوة الماء ، اطلها .



لاحسة السكر

## ٢٤٤٢٧ - لاذن إكريتني\*، قستوس إكريتني\*

Cistus creticus (S).

Ciste de Crète (F). Cretan rockrose (E). Kretische Cistrose (D). Cisto di Creta (I).

نوع من اللاذن المعمر المبدول. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فروع فناء. أوراقها قصيرة الاعناق، صغيرة القذبة. نصلها يتقاطع المروق والأعصاب، غشن الملمس، أزغب البشرة على صفحتيه. أزهارها قبيضة اللون، كبيرة القذبة، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. || أوراقها وفروعها وساقها لزجة تستلقط منها أجود أصناف اللاذن || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.



لاذن أزغب

## ٢٤٤٢٨ - لاذن طوطي\*، برعون

Cistus villosus (S). Ciste cotonneux (F).

نوع من اللاذن المعمر. جنبته تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها وفروعها مزغبة. أوراقها معتقة بيضية. نصلها أخشن الصفحة المتجمعة الزباء. زغبها لبد ستليل يبدو كثيل القطن. أزهارها فردية حراء اللون، قطرها نحو ٥ سم. || ساقها وفروعها وأوراقها لزجة يستلقط منها اللاذن || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

## ٢٤٤٢٩ - لاذن غاري الورق

Cistus laurifolius (S). Ciste à feuilles de laurier (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه سبروتية تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها فروع. أوراقها معتقة غارية الشكل. نصلها ثلاثي المروق، مالم الصفحة العليا أزغب السفلى. أزهارها بيضاء اللون، كبيرة القذبة، قطرها يراوح من ٥ إلى ١٠ سم. || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران.



لاذن اسباني

## ٢٤٤٣٠ - لاذن قروسي الورق

Cistus salvicifolius (S). Ciste à feuilles de sauge (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه ميلولة ترغب في الأزربة الرملية، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها معتقة قويسية الشكل عادمة المروق. نصلها أزغب البشرة على صفحتيه، أبيض الصفحة السفلى المشبهة الخمل والأزغب. أزهاره إلى البياض الاصفر. قطرها نحو ٥ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

## ٢٤٤٣١ - لاذنات

Cistaceae (S).

Cistacées (F). Cistaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات، أجناسها أربعة، أما أنواعها فكبيرة العدد. أشهر أجناسها اللاذن والمالهين.

Lar

## ٢٤٤٣٢ - لار

هو جبون لار، الطله.

## ٢٤٤٣٣ - لاريس، مَلَزْ

Larix (S).

Larix, Mélèze (F). Common larch (E). Lärche, Lärchenbaum (D). Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار حرجية من التنوبيات وفصيلة الصنوبريات. أنواحه المعروفة نحو ١٢ أجناسها كبيرة الحجم، هرمية الشكل، اقية الاغصان والفروع. غرايبها مبرشرة، بناتقها جانبية الانتشاب، قصيرة القذبة. أوراقها خطية، غمية التجميع، عابلة. أزهارها وحيدة المسكن، الاثنية قذبة الشكل. ثمارها أكواز قصيرة. اغصانها جذوية اللون صلبة، قشورها تستعمل في الدباغة ويستخرج من سوطها بالخر مادة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي || أعرف أنواحه وأشهرها ما يلي.



لاذن إكريتني

## ٢٤٤٣٤ - لاحيوي\* Abiotique (F). Abiotic (E).

نقيض الحيوي.

## ٢٤٤٣٥ - لايح ٥ Intensif (F). Intensive (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر.

## ٢٤٤٣٦ - لاخيشوشي\* Abranche (F).

Abrachiste (E).

نمت تعريفي يطلق على الحلقيات العاديات الغياشيم.

## ٢٤٤٣٧ - لاذن، لاذن Ladanum

مادة صمغية راتنجية طيبة قفرها سوق وأوراق بعض النباتات انحصها نبات اللاذن. لوها يراوح من الاشهب الصنابي إلى الجوزي الاسمر المواج، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان ولا يزال يستعمل في الطب ومنهم من استعمله للفيج وهو شائع الاستعمال العطري.

## ٢٤٤٣٨ - لاذن، قستوس، قستوس، قستوس

Cistus (S). Ciste (F). Cistus (E).

جنس نباتات طيبة بروية وتربوية من فصيلة اللاذنيات. أنواعه المعروفة ٢٠ منها الجنبات والجبيلات والاعشاب. اصلها حوض البحر المتوسط. سوطها قصيرة منتصبة فروعها. أزهارها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة التصل. أزهارها لاقياسية التجميع، جملة الشكل، خاسية البتلات. ثمارها حقية خاسية او عشارية الاخيصة || أشهر أنواعها ما يتبع.

## ٢٤٤٣٩ - لاذن أجعد Cistus crispus (S).

Ciste crépu (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جملة سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها لاطئة سنانية الشكل. نصلها أجعد الصفحة الخشنة الزبام الفواحة العرف الطعري. أزهارها أرجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم. || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

## ٢٤٤٤٠ - لاذن أرغب\* Cistus hirsutus (S).

Ciste hérissé (F).

نوع من اللاذن المعمر وهو جنبه سبروتية تملو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الزغب. أوراقها رهلة. نصلها لبد الخمل على صفحتيه. أزهارها عتوكوية التجميع، متوسطة القذبة، لوها إلى الأبيض المبيج بالأصفر || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

## ٢٤٤٤١ - لاذن إسباني\*، قستوس لاذني، شقراص، قستوس

Cistus ladaniferus (S). Ciste ladanifère, C. lédon,

C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F). Gum-cistus,

Ladanum-resin tree (E). Spanische Cistrose (D).

Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من اللاذن المعمر، يكثر في هضاب إسبانية وحبالها وهو جنبه ميلولة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها فروع. أوراقها لاطئة ثلاثية المروق. نصلها أخضر الصفحة العليا غير السفلى الكثيفة الخمل والأزغب. أزهارها كبيرة القذبة قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٥ سم. لوها إلى الأبيض يملو تنييح وتبيح اجر || أوراقها وفروعها لزجة يستلقط منها اللاذن المشهور. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

صفحته العليا خضراء اللون مخددة، صفحته السفلى خلية البشرية، غبراء اللون. وأوراقها هذه تشفر عند اقترابها من الحريف فتبدو بلون الذهب. اكوازهَا مخروطية الشكل تطول من ٦ الى ٧ م. وتعرض من ٤ الى ٥. جرهاتها جوية اللون، هرية الشكل، ناشرة.

#### ٢٤٤٤٠ - لَارُوْرْد ، لَارُوْرْد

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulite

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الازرق الفساربي الى حرة وخضرة.

#### ٢٤٤٤١ - لَارُوْرْدِيَّة

Cynanthus (S).

Cynanthe (F). Cynanthus (E).

عشبة معمرة، برية وتربينية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحدائقية والمرتكية في أكثر من قطر || ساقها قصيرة تطول نحو ٢٠ سم. جذورها دريما مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضية النصال، صغيرة الحجم. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، لازوردية اللون. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من اواسط آب الى اواسط ايلول.

#### ٢٤٤٤٢ - لَاشِقِي

Agame, Asexuel (F).

Agamous, Asexual (E).

كل ما هو عادم الشق اي عادم الاعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

#### ٢٤٤٤٣ - لَاشِقِيَالِيَّة

Lachenalie (F).

هي زئبق البر، اطلبه.

#### ٢٤٤٤٤ - لَاصِع

Dessev (F).

نمت تمرغني يطلق على التسج النباتية الحالية من المواد الصائنة.

#### ٢٤٤٤٥ - لَاصِف

Plantain (F).

جنس نباتات عشبية كثيرة الانواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطلبه.

#### ٢٤٤٤٦ - لَاطِيس ، قِشَر

Lates (S).

Latés (F). Lates (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعه قليلة العدد اعطاهما نهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والتيجر والكنج والفرات ... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الظهر. اثوابها الى السمرة الفضية يملؤها موج يختلف باختلاف النوع. طولها مأكولة لكها دون الوسط || اشهر انواعه ما يلي.

#### ٢٤٤٤٧ - لَاطِيس النِيل \* ، حِمَار البَحْر ، قِرْخ

Lates nilotica (S).

Latés du Nil (F). Great Nile perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبعه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف. وكان المصريون من عهد الفرعانة الى عهد الرومان يقدسونها وبها سميت مدينة لاطوبولس اي اسنا في الصعيد.

#### ٢٤٤٤٨ - لَاطِيس الهِنْد

Lates maxima (S).

Latés des Indes, L. du Gange (F). Great Ganges perch (E).

نوع من اللاطس وهي سمكة كبيرة القد ضخمة، طولها نحو

#### ٢٤٤٤٩ - لَارِيس أُرُوْبَة \* ، مَلَر أُرُوْبَة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اروب. ثمرته تطول من ٣٠ الى ٣٥ م. خراصها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ الى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رجلة، كثافية الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. ازهارها الانثوية ارجوانية اللون. اكوازهَا تطول من ٣ الى ٤ م. وتعرض نحو ٢. جرهاتها سكية الشكل كثيرة العدد.

#### ٢٤٤٣٥ - لَارِيس الصِين ، مَلَر الصِين

Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).

نوع من اللاريس منبته جبال الصين. ثمرته سبروتية، تطول من ١٥ الى ٢٥ م. خراصها زياه خشبية اللون. بتانقها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ الى ٣ م. لوها الى الخضار الماي يملوه موج ازرق. اكوازهَا مخروطية تطول من ٣ الى ٥ م. جرهاتها بارزة مشنسة الاصغر.

#### ٢٤٤٣٦ - لَارِيس اليَابَان \* ، مَلَر اليَابَان

Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).

نوع من اللاريس منبته جبال اليابان. ثمرته سبروتية سريعة النمو تطول من ٢٥ الى ٣٠ م. خراصها جوية اللون لامة. بتانقها خلية البشرية، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ الى ٣٠ م. لوها الى الخضار الصناني الموج، اكوازهَا مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ م. جرهاتها قطنوية الشكل غائرة الخمار.

#### ٢٤٤٣٧ - لَارِيس أَمْرِيكَة ، مَلَر أَمْرِيكَة

Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).

نوع من اللاريس منبته امريكة الشمالية. ثمرته سبروتية بطيئة النمو تطول من ٢٥ الى ٣٠ م. خراصها الى الحمرة البفسجية. بتانقها بحرية اللون، وردية الطيل. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ الى ٢٠ م. اكوازهَا جوية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

#### ٢٤٤٣٨ - لَارِيس سِيْبَرِيَّة ، مَلَر سِيْبَرِيَّة

Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).

نوع من اللاريس منبته سيري. ثمرته سبروتية تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. خراصها سود الخمار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ الى ٥ م. وتعرض نحو ١ م. ازهارها الانثوية الى الخضار الباهت. اكوازهَا مخروطية تطول من ٤ الى ٥ م. جرهاتها بارزة، سدسة الزوايا، قليلة العدد.

#### ٢٤٤٣٩ - لَارِيس كَاذِب ، مَلَر كَاذِب

Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).

شجرة حرجية سبروتية، سريعة النمو، هرية الشكل، وسيدة الجنس والنوع من التنوبيات. مهدا جبال الصين الشمالية. تطول من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها افقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابلة، ضمية التجميع. نصلها خطي الشكل يطول من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٣ م.



لَارِيس اُرُوْبَة



لَارِيس اليَابَان



لَاطِيس النِيل



تطول من ٨ إلى ١٠ م. تخلد نصل أوراق التبغ الاخضر وتسرده بين بشرتيه فيبدو شغافاً خالياً من المواد النبتية المهيمنة . راجع عنجول البطاطا .



لاغية

24458 - **لاغية التين** (F). Mineuse du figier (F). هي قوبعة التين ، اطليها .

24459 - **لاغية الزرع** \* ، **أغروميذا مبهمة** (F). Agromyza ambigua (S). Mineuse des céréales (F). حشرة صغيرة من اللاغيات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها وبطنها الى الجؤوة البنفسجية . كوسلها الى السواد الازرق الملوغ . تكثر في اراثل نيسان . تمتع مكها على حذف الزرع فينتف عن رقات تلم التسنج وتسبب ذبوله .



لاغية الارضي شوكي

24460 - **لاغية الكرزيتم** \* ، **فيستوميذا قرتاء** (F). Phytomyza atricornis (S). Mouche des chrysanthèmes (F). حشرة صغيرة من اللاغيات ، طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م. لونها الى الريدة السمر، تعلوها بقع صفر . يرقاتها تركب اوراق الكرزيتم فتلتهمها وتؤذيها اشد اذى .



لاغية التبغ

24461 - **لاغية اللوبياء** \* ، **أغروميذا الفاصوليا** (F). Agromyza phaseoli (S). Mouche du haricot (F). حشرة صغيرة من اللاغيات ، طولها نحو ٣ م. ثوبا اسود لامع . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب الفسلج فينتف عن رقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تنجعو نحو الفسلج ومنها الى الملاقق فالساق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم اسلاخها وتتحول الى كزود .



لاغية الزرع

24462 - **لاغية اوراق الأشجار المثمرة** (F). Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F). حشرة مؤذية من حرشقيات الاجتحة تدعى رثاعة ملوثة ، اطليها .

24463 - **لاغية** (F). Euphorbe officinale (F). هي الغريون الخزني ، اطليها .

24464 - **لافتاري** (F). Invertébrés (E).

اللافتاريات قسم من الحيوانات لا فغار لها . فالاولا والاسفنجيات والحويجات والشوكيات والدوديوات والرخويات جميعها من الحيوانات اللافتارية .



لاغية الكرزيتم

24465 - **لافتلي** (F). Acotyélédon (E).

نعت تمريني يطلق على النبات الدميم الثقلة .

24466 - **لاغية بؤغية** (F). Zygospora

24467 - **لافتسيات** (F). Atracheates (F). فئة من الحليميات تشمل الانواع العادمة الرغامى ، الجلدية التنفس . جميعها من الحيوانات الدنيا تنطفل على الحيوان او تعيش على المواد العضوية السائرة نحو الاخلاخل .



لاغية اللوبياء

24468 - **لافتيات النمل** (F). Fourmiliers (F). Ant-thrush, Ant-catcher (E).

مرتبة من الطير تنتمي الى رتبة الجوارم . فصائلها واجناسها

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبته الى مصبه . ثوبا الى السرة الفحمية يعلوها موج جزوي يبعث عنه الظهر ويخف وزمو عنه البطن .

24469 - **لاططات العيون** Edriophthalmes ثعبة من الحيوانات الثريات اللينات الصفد .

24470 - **لاططات المتك** Diploures, Eutotrophes رتبة حشرات مة ذية من هذيات الاذئاب . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اعطائها جميع المناطق الحارة والمعتدة . تتميز بصغر مكها واحتجابها ، باستاطلة قرونها الاستشعارية العديدة الفواصل وبارسائها الوحيدة المغاسل .

24471 - **لاططي** (F). سعت تمريني يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقوم على دعائم بل ترتكز مباشرة على المحور كقوك ورقه لائنة .

24472 - **لاعضوي** (E). Inorganique (F).

24473 - **لاعية** \* Lophospermum (S).

Lophosperme (F). جنس نباتات عارشة خلية لزجة من فصيلة الخنازيريات . انواعها قليلة ، سيقها فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها معتقة قليلة خاسية التغميص . نصلها خلي البثرة مسنن الحافة . اعجازها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، وردية اللون موحجة بالابيض والاصفر وهي مغزرة الرقيق يحرسها النحل .

24474 - **لاغيات** (F). Agromyzidae, Leaf miners (E). Minierfliegen (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ جميعها صغيرة القد ، رمادية اللون او بنية ، ملونة الجناح . تظهر في الربيع . تمتع مكها على اوراق النبات وصاليجه الغضة فينتف عن رقات دقيقة خيطية تدخل النصل فتلتهمه وتقتطع خلاياه ، بين البشريتين ، ثم تتحول بعد اسلاخها الاخير الى كزود تحمك في مكانها او تقيم في التربة كامل فترة بيائها العذري .

24475 - **لاغية الارضي شوكي** \* ، **أغروميذا اندلسية** (F). Agromyza andalusica (S). Mineuse de l'artichaut (F).

حشرة صغيرة من اللاغيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . ثوبا الى السرة العابقة . اجيالها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلغم هروق اوراق الارضي شوكي فتلتهمها .

24476 - **لاغية البهشية** \* ، **فيستوميذا البهش** (F). Phytomyza ilicis (S).

Mouche du houx (F). حشرة صغيرة من اللاغيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبا اسود اللون . رأسها وجرايزها مجعدة بالاصفر . رقاتها تركب اوراق البهشيات فتلتهمها وتؤذيها .

24477 - **لاغية التبغ** \* Phtorimaea operculella (S). Mineuse des feuilles de tabac (F). فراشة من فصيلة العنجلويات تدعى عنجول البطاطا . دويديتها نخيلة فراء اللون حنطية الرأس حلبيبة النقط الترجية الجانية.

٢٤٤٧٨ - لَامَة \* ، جَمَلْ أَمْرِيكَة

Auchenia, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الجمليات . أنواعها أربعة ، موطنها هضاب وجبال أمريكا الجنوبية . أجسامها رشيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم . وأرتفاعها من ٨٠ إلى ١٢٥ سم . أعناقها مسطيلة . أوبارها مصنوعة جيدة الصنف تحمي القدر . قوتها الأعشاب . بعض أنواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الأثقال .

٢٤٤٧٩ - لَامْتَسَاوِي الْأَوْرَاقِ

راجع غير متساوي الأوراق .

٢٤٤٨٠ - لَامْتَسَاوِي الْبِتَلَاتِ

راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - لَامْتَسَاوِيهِ الْأَجْزَاءِ

راجع غير متشابه الأجزاء .

٢٤٤٨٢ - لَامِيَّاتِي

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). لا مَرْكَبِيَّة ، قَدْ يُنَوِّدْ

Lamarkie, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة «لامارك» . وفي بركة ، مرغوة ، حولية أو معمرة من فصيلة النجيليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جوص البحر الأبيض المتوسط || سوقها شطئية فراء تملو ٢٠ إلى ٥٥ سم . صفها مستدل الطول ، قليل الغرض . أزهارها سنبلية التجميع ، شبه غرطوي الشكل ، سنبليلتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - لَامِسَة

Tentacle (F). Tentacle, Feeler (E).

ج. لوامس . زوائد لا مفصلية قابلة الانعطاف والانكماش توجد عند بعض الحيوانات تمكئها من القبض على فريستها أو التماس طريقتها ...

٢٤٤٨٥ - لَامِشِيَّاتِي

Aplacentrales (F). Aplacentalia (E).

شعبة من صف الفرعيات . فصائلها وأجناسها عديدة تجتمع إلى رقتين : الجرابيات ووحيديات المسالك .

٢٤٤٨٦ - لَامِعَاتِ

Ganoïdes (F). Ganoïdes (E).

رتبة أسماك غضروفية تشمل بعض الفصائل أخصها الخفيات .

٢٤٤٨٧ - لَامِعَة

هي الفتوتينية ، نبات من الورديات ، أطبلها .

٢٤٤٨٨ - لَامِصِيَّاتِي

Inarticulé (F). Inarticulate (E).

نمت وصني يطلق على الاعضاء العادة المفاصل .

٢٤٤٨٩ - لَامِي

هو الأمريد ، أطبلها .

٢٤٤٩٠ - لَامِي الْبَلَسَمِ

هو الأمريد البلسمي ، أطبلها .

٢٤٤٩١ - لَامِي الْمَكْسِيكِي

هو أمريد المكسيك ، أطبلها .

وأنواعها كثيرة العدد معظمها من طيور إفريقية وأمريكية . تأثت المناطق الحارة والامتوائية || أما فصائلها فهي الجليثيات والفتناجيات والقرناريات والمأنوريات والهنريات والوصريات .

٢٤٤٩٦ - لَأَثُون مُنْقَط

Lacon punctué (F).

هو السائل المنقط ، أطبلها .

٢٤٤٩٧ - لَأَيَّاسِي ، لَأَنْتَسَاقِي

Asymétrique (F). Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الأشياء الشاذة عن نظم القياسات المألوفة .

٢٤٤٩٨ - لَأَلَا

Renoncule d'Orient (F).

هي الحدوذن الآسيوي ، أطبلها .

٢٤٤٩٩ - لَالَة

Trillium (S). Trillie (F). جنس نباتات عشبية سرطية معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة عديدة . أعطائها العالم ، معظمها أمريكي المهد . ترطب في المراتق الظليلة . أروماها مدادة . سوقها قصيرة تنتهي بفسمة ثلاثية الأوراق تملوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٣ - لَالَة الْبَلِجِ

Trillium nivale (S). Trillie des neiges (F).

نوع من اللالة . ساقها تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها منقطة ، بيضبة ، صغيرة القد . فصلها ثلاثي العروق يطول نحو ٥ سم . أزهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٤٤٩٤ - لَالَة حَافِيَّة

Trillium sessile (S). Trillie sessile (F).

نوع من اللالة . ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها حافضة ، فصلها ثلاثي العروق أهليلجي الشكل مذنب الزام الأخير يطول من ٧ إلى ١٥ سم . أزهارها قوزية اللون ، قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٩٥ - لَالَة كَبِيرَة الزَّهَر \*

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من اللالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها حافضة . فصلها خماسي العروق أهليلجي الشكل ذلق الزام الأخير يطول من ١٠ إلى ١٤ سم . أزهارها عادمة العروق ، كبيرة القد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها إلى الأبيض أو الوردي . أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٤٩٦ - لَالَة مُنْتَصِبَة

Trillium erectum (S). Trillie dressée (F).

نوع من اللالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها حافضة . فصلها خماسي العروق ، سنائي الشكل ، مستنق الزام الأخير يطول نحو ١٢ سم . أزهارها جفر ، كبيرة القد ، منتصبية الارتكاز . يتلاتها إلى الخضار الأصفر يطوقها حنار أحر وتغطيها ثلاثة غطوط جزوية . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٩٧ - لَامِيَّاتِي ، هَيْبِلِر

Anhydre (F). Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الأجسام الخالية من الماء أو العادة الماء .



لالَة كَبِيرَة الزَّهَر



لَامَة

٢٤٥٠٠ - **لاهوَالِيَّة ، أُتِيرَبِيَّة** (F). Anaérobie (F).  
 (E). Anaerobe (E).  
 صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .



لايون ابيض

٢٤٥٠١ - **لاؤتَدَه**  
 هي الخواص ، اطلبها . ومنها الاصلية والذكر والغرسية والحسنه .

٢٤٥٠٢ - **لايَسَحَلْ ، لايدَوْب** (F). Indissoluble (F).  
 (E). Undissolved (E).

٢٤٥٠٣ - **لَبْ**  
 هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

٢٤٥٠٤ - **لَبْ التَمَرَة ، ميزوُكَرَب**  
 (F). Mésocarpe (F). Mesocarp (E).  
 هو البونق ، الجزء المتوسط من الثمرة ؛ وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .



لايون ارجواني

٢٤٥٠٥ - **لَبْ التارجيل ، كُبَرَة**  
 (F). Coprah, Copra (F). Coco-nut (E).  
 لب ثمر التارجيل الذي يستخرج منه بالمصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي » .

٢٤٥٠٦ - **لَبْ يَتِي**  
 (F). Brunissement interne (F).  
 (E). Internal browning (E).  
 عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، قوامة عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة تشعب من وسط الثمرة الى سطحها فتعطب الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرها . يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب وزن ادراك الثمار وإلى هبوطها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .



لايون ارط

٢٤٥٠٧ - **لَبَا**  
 (F). Arroser (F).  
 To water, To sprinkle (E).  
 لبأ الترسه : سقاها عند غرسها ، اذا غرست فيلة يجب ان تلبأها .

٢٤٥٠٨ - **لَبَا**  
 (F). Amouille, Colostrum (F).  
 (E). Bestings, Colostrum (E).  
 اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والشاة والعمرة . وهو غني بالمواد الاحية فقير بالزبد والسكر والماء .

٢٤٥٠٩ - **لَبَاب**  
 (F). Pulpe (F). Pulp (E).  
 هو بوجه عام جاع المادة الدزنية النباتية الطبيعية . وهو بوجه خاص ما يتبقى من الثورندو بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .



لايون اسفر

٢٤٥١٠ - **لَبَابِي ، لَبُوِي ، أَلْبُوِي ، لَحِم**  
 (F). Pulpeux (F). Pulpous, Pulpy (E).

٢٤٥١١ - **لَبَادِي ، لَبَادِي**  
 قال الجاحظ : « طائر على شكل البهائم اذا أسف على الارض ليد فلم يكد يطير حتى يطار » .

٢٤٥١٢ - **لَبَان ، بَسْتَج**  
 (F). Boswellia (S).  
 (F). Boswellie (F).  
 جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطميات انواعه المعروفة قليلة اصطلها جبال المناطق الاستوائية الهندية

٢٤٤٩٢ - **لايَمِيَّة الصَّفَصَات** (F). Lamie des saules (F).  
 هي قزليي الصفصاف ، اطلبها .

٢٤٤٩٣ - **لايَمِيُون**  
 (F). Lamium (S).  
 (E). Lamier (F). Dead-nettle (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ٤٠ جميعها اشباب تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة ، منقطة ، مخززة . ازهارها ضمية الجميع ، ابطية الاوتكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري الماء . وهي من النباتات المرعوية التي تشتهها الماشية . اعراف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٤ - **لايَمِيُون أَيْتِفَس \* ، قُرَاص كَنَازِب**  
 (F). Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E).  
 نوع من اللامييون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه الى الخضار الاصفر المواجه ، يملوها زغب مبعثر نحل . ازهاره كبيرة اللد بيضاء اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٩٥ - **لايَمِيُون أَرْجَوَانِي \* ، قُرَاص أَحْمَر**  
 (F). Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. fétide (F). Red dead-nettle (E). Rote Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fétida (I).  
 نوع من اللامييون الطبي . عشبته كرحبة الرائحة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره ارجوانية اللون ، كبيرة اللد ، تطول نحو ٤ سم . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٦ - **لايَمِيُون أَرْقَط \* ، لُوقَاس ، حَرَف**  
 (F). Lamium maculatum (S).  
 (F). Lamier maculé, L. tacheté (F). Spotted dead-nettle (E). Gefleckte Taubnessel (D). Lamio scitro, Dolcimele, Mizardella (I).  
 نوع من اللامييون الطبي . عشبته تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة اللد تطول نحو ٥ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٧ - **لايَمِيُون أَصْفَر \***  
 (F). Lamium luteum, L. galéobdolon (S). Lamier galéobdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I).

نوع من اللامييون ، عشبته تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مائلة البثرة على صفحاتها ، ازهاره متوسطة اللد تطول نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبيرة . ازهاره ربيعي .

٢٤٤٩٨ - **لاهيَة ، مِلْهَاب**  
 (F). Lance-flammes (F). Flame thrower (E).

جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوصام والجراثيم

٢٤٤٩٩ - **لاهوَالِي ، أُتِيرَبِي**  
 (F). Anaérobique (F). Anaerobic (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيداً عن الهواء .

سوقها عصارة صمغية رائحة شفاقة تستعمل استعمال البخور ، عرفها ليموني الرائحة مستحب .

٢٤٥٢٢ - لَبَبْ

لب الحب : جرى فيه اللدقيق وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لَبْتْ ٥\*

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة التعليط ، وذية القدم ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها معتدلة الجرم ، قصيرة الاخطام ، صغيرة الاشداني كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض . الصدرية والخصوية والشرجية معتدلة الجرم . الذيلية كبيرة ، مقطوعة الطرف . اوتابها تراوح من الزبدية السمر الى الزبدية الفضية يملوها ستة او ثمانية او عشرة اطواق معرضة شديدة السمره || من ميزات هذا الجنس ان الذكور تحضن سره الاناث في تجاويف اعطامها حتى التفك اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

Tilapia orontea (S).

٢٤٥٢٤ - لَبْتْ العاصي

Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري العاصي والاردن .

Tilapia nilotica (S).

٢٤٥٢٥ - لَبْتْ النيل

Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمونه غرشقي وبشط في حين ان المشط اي الغرشقي ينتمي الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لَبْتْ ٥\*

Trombidium holosericeum (S). Leptae automnal, Aouat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من الغاشيات ، طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى الحمرية تكثر في المراعي والحقول المزروعة وعلى اللوبيا . رقبها نحيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ مم . تركيب الانساج اذا جلس فوق الشب وتدخل تحت بشرة الجلد تحدث حكاكا مؤلما . يجيبها البزير .

Leptothyrium

٢٤٥٢٧ - لَبْتُونِيُوم ٥

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهديكات . انواعه قليلة ، تتميز ببيكانتها المحجنية الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بوفاته اهليلجية او وشعية || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - لَبْتُونِيُوم التفاح ٥\*

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرية يعترى ثمار عدة نباتات برية وزراعية انحصا التفاح في بعض انواعه المتشابة || مظهره الخارجي وقش ورشية تشبه ونم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ ونمة . تركب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبو حنطية اللون ثم تنحرف الى السمره الفحمية || يشب الثمار فينبس قيمتها التجارية دون ان يعطها || يكافح باستعمال سائل يورود المخفف قبل ادراك الثمار باسبوعين .

٢٤٥٢٩ - لَبْتُونِيُوم كاروفيلوم ٥

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E).

فطر مجهرية يعترى بعض انواع الاجناس المتشابة . مظهره

والايريقية . يستخرج من سوقها بالخز عصارة رائحة سريمة الجفاف فاحرة الصنف تدعى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لَبَن حَبْثِي \* ، بَسْتَج حَبْثِي ، طُونَس

Boswellia papyrifera (S).

Boswellie d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero Incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة . يستخرج منها بالخز اخضر بخور واجمته .

٢٤٥١٤ - لَبَن شامي ، صَمْع البَطْم

Poix-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لَبَن هندي ، لَبَن ذَكَر ، بَسْتَج هندي ، كَنْدَر

Boswellia serrata (S). Boswellie des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد ، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالخز بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لَبَن

Laitier (F). Milkwoman (E).

من تعاطى بيع الحليب واللبن .

٢٤٥١٧ - لَبَانَة

Andrachnes (S). Andrachné (F).

False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I). جنس نباتات برية من فصيلة اليتونيات ، انواعه عديدة منها الاشباب والجنبات والشجيرات . جميعها معمرة ، اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها منتصبة او معرجة ، فروصها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة القد معتقة متناقبة متقاربة . ازهارها ابطية فورية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آحية المادة || اشهر انواعها الطيبة ما يلي .

٢٤٥١٨ - لَبَانَة المَوسَط \*

Andrachnes telephiolides (S). Andrachné téléphiole (F).

نوع من اللبانية الطيبة ، مهددا تمام شرقي المتوسط من فلسطين الى انزير . ساقها نحيلة ، فروصها دقيقة وملتوية . اوراقها صغيرة ، بيضية النصل ، نعيمها ينقي الدم ويدبر البول .

٢٤٥١٩ - لَبَانَة الهند

Andrachnes cadishawii (S).

Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانية الطيبة ، مهددا الهند . اوراقها مطورة ناجمة

تدمل الجروح وتشي القروح الحبيطة .

٢٤٥٢٠ - لَبَانَة مغربية

Euphorbe résinifère

هي العنجد ، اطلبه .

٢٤٥٢١ - لَبَانَة \* ، اَمْطِي

Icica icariba, Protium icariba (S). Icaquier (F).

Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يعيش في رمال الشواطئ البحرية والصحريه . اوراقها مركبة متناقبة . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون . ازهارها عذكوكي او عقودي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من



لبان حبشي



لبانة المتوسطة



لبانة



كُت



لَبْتْ



لَبْتُونِيُوم التفاح

النبات || البرقة عند الادوك الثام تطول نحو ١٦ م .  
جسمها شبه اسطواني الشكل اسمر اللون اطحل المراجع ،  
اسود الرأس ، مبعثر الهلب الثام الاجبر اللون .

#### \* ٢٤٥٣٦ - ليثورة ملطحة \* (S).

*Leptura maculata* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٧ م .  
جسمها ضيق مستطيل ، رأسها وكوسلها الى السواد الفضي .  
عندما الى الصغار اللبني يملوها بخطوط وتبيج وتنش  
اسود . تعيش على مختلف ازهار الورديات والحيميات .  
يكثرو وجودها من ايار الى ايلول . رقاتها همة مؤذية .

#### \* ٢٤٥٣٧ - ليثورة منقطعة \* (S).

*Leptura cerambyciformis* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ م .  
رأسها وكوسلها الى السواد اللامع . عندما الى الصفرة  
المعرة تملوها نقط سود طرية || تعيش في الاغلاوالخادائق  
الجبلية ، يكثرو وجودها من حزيران الى آب .

#### \* ٢٤٥٣٨ - ليثورة مؤذرة \* (S).

*Leptura aurulenta* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٨ م .  
رأسها وكوسلها الى السواد الباق . عندما الى الصغرة  
الغنية تملوها ثلاثة خطوط سمر يملوها حل مذهب اللون .  
تعيش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنديان ،  
يكثرو وجودها من حزيران الى آب . رقاتها مؤذية تسردب  
الشكير .

#### \* ٢٤٥٣٩ - ليثوسيريات \* (S).

*Leptoceridae* (S). *Leptoceridae* (F).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة منتشرة المدن منتشرة في بعض اصقاع  
البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها  
متوسطة القد ، غبراء . اجنحتها غبراء اللون مهدبة الاطراف  
الخلفية ، تملوها بمس الزخارف . تزنيها واضح التزيين ،  
قابيل الاعصاب المترقة || ملجها الحياني جامي . افواجاها  
كثيرة العدد . تحلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهور ||  
اساريها تعيش في المياه الجارية ملموعة بجلابيب مخروطية  
منعقة كمد الحسام || اشهر اجناسها :

*Leptocerus* (S).

الليوسيريس

*Trianaodes* (S).

الترينود

*Mystacides* (S).

المستسيد

*Leptotène* (F).

\* ٢٤٥٤٠ - ليثون \*

الباف نشطة تحية تظهر في الجبلية عندما تكون في اول  
طور الحبوقة .

*Lepton* (S).

\* ٢٤٥٤١ - ليثونة \*

*Lepton* (F). *Lepton* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات سفنجيات الحاشيم  
وفصيلة اليرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة  
معظم بحار العالم || جميعها صغير القد طول من ١ الى  
٢ م . اصداها شبه بيضيه الشون ، رقيقة الصفا ،  
قليلة الاحدياب . يملوها ريس قمي الشكل || تعيش  
لاسقة بالصخور . ليثها غزير المادة .

الخارجي رقة حنطية تركب التار فتصلب البشرة المنحارة  
وتشبه التار دون ان تملها || يكالغ باستمال سائل  
يوردو الخفف او السائل السفلوكليسي .

#### \* ٢٤٥٣٠ - ليثورة \* (F).

*Leptura* (S). *Leptura* (F).

#### \* ٢٤٥٣١ - ليثورة ذهبية \* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٤ م .  
رأسها ويوشها وجسفتها سود . عندما الى الصفرة الذهبية .  
تعيش على ازهار المركبات والحيميات . تكثرو في المروج  
والمراعي من حزيران الى ايلول .

#### \* ٢٤٥٣٢ - ليثورة سداسية التجذيع \* (S).

*Leptura sexguttata* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ م .  
نوبها اسود اللون . عندما سداسية التجذيع الاصفر .  
تعيش على ازهار الحشويات . يكثرو وجودها في حزيران .

#### \* ٢٤٥٣٣ - ليثورة سيدانية \* (S).

*Leptura cordigera* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ الى ١٦ م .  
رأسها ومقدم جوشها وجسفتها سود . عندما الى الحرة  
الكرزية يملوها عند ملتقاهما بمس الزام الالون  
القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدانية الشكل تمتد حتى  
طرف القمدلين || تعيش على ازهار الشوك والاراضي شوكي .  
يكثرو وجودها من حزيران الى ايلول .

#### \* ٢٤٥٣٤ - ليثورة فسنتقية \* (S).

*Leptura virens* (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م .  
نوبها الى السدرة يملوها حل دقيق كثيف اصفر اللون  
اخضر المويج . تكثرو في احراج الصنوبر . رقاتها همة  
تسردب قشور وشكير الاخشاب اليابسة والمقلطومة .

#### \* ٢٤٥٣٥ - ليثورة مضعبة \* (S).

*Leptura bifasciata* (S). *Leptura bifasciata* (F).

*Leptura bifasciata* (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنبيات ورتبة سمعات  
الاجنحة . تألف الهضاب والبراري . غناها تعيش على  
بتلات الازهار . رقاتها خاضعة ناعمة تركب لحاء الاشجار  
الغنية وسوق النباتات الحولية خلفها وتسردبها وتعلها ||  
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١٠ م . نوبها ثنائي  
اللون ، رأسها وكوسلها وزبابانها وبرامزها الى السواد  
الباق اللامع ، بطنها وظهرانها الى البني الاسمر المويج  
يملوها في القمدلين تمصيب اسود . رأسها صغير الجرم .  
عينها كيرتان ناشزتان . زبابانها دقيقان ، مستطيلان .  
ظهرانها فارق المؤشر لا يلحف السكمة الشرجية . عندما  
متناخا التميزير القاطب . اسافها رباعية النقل الظاهرة ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانية في اوائل  
حزيران وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار .  
تسافد عند ظهورها باربة اسابع . تترز المكان في لحاء



ليثورة ذهبية  
التجذيع




ليثورة سدانية  
ليثورة فسنتقية



ليثورة مضعبة



ليثورة ملطحة



ليثورة منقطعة  
ليثورة مؤذرة



ليثونة



ليثين



لبث



لبخ الجبل



لبرة الحمص



لبرة الزيتون



لبرة الكرز

٢٤٥٤٢ - ليثيد *Leptidea brevipennis* (S).

٢٤٥٤٣ - ليثين *Leptine* (F). *Leptinus* (S).

حشرة نصفية الغمد من فصيلة القرنيات. اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السمرة الحطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الاغناد || قوتها جمع المواد الصغوية واخصها الاغشاب اللينة التي تنخرها وتردها وتقضي عليها.

٢٤٥٤٤ - ليثينيات *Leptinidae* (S).

٢٤٥٤٥ - ليثينيدات *Leptinides* (F). *Leptinidae* (E).

فصيلة حشرات جلدية من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، مبطلة، شبه بيضية الشوزن، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة، مستعرضة. عينوها طامسة. تأثيرها وكوكها قياسية. قرنها الاستشعارية صوطانية. كواسلها وانماؤها خلية القشار. اغنادها متباينة الشكل، بعضها يلمع كامل الطعن والبعض الآخر نصفه. اوساغها ربابية العقول. اولها عادمة الشقاق || تعيش على فراء القوامس الحية. قوتها التوسفات التي يفرزها الجلد || اشهر اجناسها الليثين.

٢٤٥٤٦ - لبيخ *Lebbek* (F).

٢٤٥٤٧ - لبيخ الجببل *Cocculus laeaba* (S).

٢٤٥٤٨ - لبيخة، لبخة *Cataplasme, Charge* (F). *Cataplasme, Poultice* (E).

نوع من الكركوس من فصيلة القرنيات. وهو نبات عشبي طيب ري معمر. ساقه فضاء. فروعوه رولة متدلية. اوراقه منعقة متعاقبة بيضية صغرة القد. تصلها ماس البشرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحمايات والبرقان والزرقنة والكدب ... مستحضر قاعل يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٥٤٩ - ليثيد *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

٢٤٥٥٠ - ليثيدان *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

٢٤٥٥١ - ليثيدان *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

٢٤٥٥٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٣ - ليثيدي، وثيري *Tomenteux* (F).

٢٤٥٥٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٥٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٦٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٧٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٨٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٥٩٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٠٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦١٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٢٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣١ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٢ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٣ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٤ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٥ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٦ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٧ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٨ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٣٩ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

٢٤٦٤٠ - ليثيدور *Lepidurus* (S).

ظهورها مستدير المؤخر الفارق اللامع . غمداء متتابعات  
التنقيط الخفيف . أرسافها رباعية المقل الظاهرة || لها  
جبل واحد في الحول . تظهر أخشرة الجملانة في أواخر  
نيسان وتعيش حتى أواخر حزيران . تشرح في الليل وتضاف  
بعد ظهورها بنحو ثلاثة أسابيع . تمتع المكن رؤيا تغلفها  
مادة غروية على اتصال الأوراق ولها السوق والتضيقان ||  
البرقة عند بلوغها الإدراك تطول نحو ٧ م . جسمها شبه  
أسطواني الشكل ، قليل التقويس ، سداسي الرواجب ،  
ستطي اللون ، اسمر الموج ، أسود الرأس . ويعلو الجسم  
ثلاثة خطوط قاطبة عاجية وهلب دقيق اشبه اللون || طور  
الاكمام الذي يستمر نحو أربعة أسابيع يتقضي في التربة  
تحت الجلالة والبلبل .



لبوس الوزال

Labeobarbus (S).

٢٤٥٦٦ - كَبَرُوس

Labeobarbe (F).

جنس اسماك نهري من مفتوحات المائة وفصيلة البوطيات.  
أنواعه المروفة ثلاثة ، اثنان يعيشان في أنهر الهند وأفغان  
وواحد يعيش في النيل || أجسامها شبه اهليلجية ، قليلة  
التخطيط ، تطول من ٦٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها معتدلة  
الجرم . عيونها جاحظة . اشداقها كبيرة ، خاصة اللبتات  
الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شرعية الشكل .  
زعانفها الذيلية فارقة . أوقاها الى الخضار البحري .  
زعانفها الى الخضار الاصفر || لحويها متوسطة الصنف ،  
مأكولة || اما أنواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S).

لبوس النيل \*

Labeobarbus jungha (S).

لبوس أصام

Labeobarbus macrolepis (S).

لبوس كشمير

Labrella (S).

٢٤٥٦٧ - كَبَرِيْلَا

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهذكيات ، أنواعه قليلة  
لا مؤذية . يكتنحاته مستديرة ، سداة اللون ، فرجية  
لا انفلاق . بويغاته مستطيلة او وشعية او كروية الشكل ،  
شفافة .

Sanve (F).

٢٤٥٦٨ - كَبَسَان

هو الخردل البري او خردل الحقل ويدعى الحرشاء . وقد  
يصر من الأعشاب الضارة نيا لو كثر في الزرع . إبادته  
تتم بإستعمال أحد الموشاب الفعالة الكثيرة الوجود في  
هذا العصر .

Lampsane commune (F).

٢٤٥٦٩ - كَبَسَانَة

هي الخفج ، اطليه .

Pralinage (F).

٢٤٥٧٠ - كَبَسَة

علية زراعية تتقدم غرس النصب . قوامها تغليس جنور  
الاغراس بروة مائنة من الماء والطين ويخى القبر وذلك  
لتغطية الجذور وجبرسها بنشاء ناعم واق لا يتخلل من الغذاء  
يساعدا على مقاومة عوامل البيئة الجديدة ويحضرها ويحياها  
على انتاش الجذرات الخيطية وما يتبعها من عدة استصاص  
الغذاء ، اود الحياة والنشوء .

Lobostemon (S).

٢٤٥٧١ - كَبَسَمُون

Lobostémone (F). Lobostemon (E).

جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الحمصيات .  
سوقها منتصبه فراء تعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها

٢٤٥٥٩ - كَبَرَةُ المِيوزُوْتِس

Cylindrosporium myosotidis (S).

فطر مجهرى يركب نصل أوراق الميوزوتيس || مظهره  
الخارجي يقع نسيجة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ م . لوها  
الى السرة ، اطرافها اصفر الخصب ، اشقر الموج . تسبب  
الذبول والالجاب .

Lapeyrousia (S).

٢٤٥٦٠ - كَبَرُوْتِيَة

Lapeyrousie (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات . انواصها  
كثيرة العدد معظمها بري وبعضها تزييني . مهدا البلاد  
الافريقية . جميعها صغيرة القد وحيدة الساق والشرعية .  
أوراقها مردوبة الصنف . أزهارها سنبلية التجميع .  
اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

٢٤٥٦١ - كَبَرُوْتِيَة أُسَلِيَّةُ الْوَرَق

Lapeyrousia juncea (S). Lapeyrousie à feuilles jonci-  
formes (F).

نوع من البروزية . أوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة  
التصل المهدب الختار . شرانخها الزهري يعلو من ٤٠  
الى ٦٠ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها متوسطة  
القد ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر  
طوال شهر أيار .

٢٤٥٦٢ - كَبَرُوْتِيَة عَذِيْقَة

Lapeyrousia corymbosa (S). Lapeyrousie en co-  
rymbe (F).

نوع من البروزية ، شرانخها يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم .  
أزهارها مغلي الشكل وهو بذلك يشذ عن سائر أنواع الجنس .  
أزهارها الى الزرقة الزاهية تنطسها نجمة يفساه اللون  
بنفسجية الختار . تنورها يستمر نحو ٣ أسابيع  
ابتداء من شهر أيار .

٢٤٥٦٣ - كَبَرُوْتِيَة كَبِيْرَة الزَهْر

Lapeyrousia grandiflora (S). Lapeyrousie à grandes  
fleurs (F).

نوع من البروزية ، أوراقها غمية الايتكان . شرانخها  
يعلو نحو ٣٠ سم . أزهارها سنبلية التجميع . أزهارها  
اريجوانية ، زاهية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .  
تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٥٦٤ - كَبَرُوْتِيَة مُبَطَّطَة السَاق

Lapeyrousia anceps (S). Lapeyrousie à tige aplatie (F).

نوع من البروزية ، شرانخها مبسط الجسم ، ثنائي الزوايا ،  
يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها  
بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر أيلول .

٢٤٥٦٥ - كَبَرُوس الْوَزَال \*

Luperus circumfusus (S). Luperus des genêts (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النصاريات ورثة مخدات  
الاجنحة . تألف اليرم والبراري والاحراج . غناصها  
ورقاتها تعيش على نباتات القرنيات الفراضية واخصها  
الوزال || جسمها صغير القد يعلو من ٣ الى ٤ م .  
ثوبها الى الصفرة النشواء الموج يطوقها في الكويل والفدين  
ختار اسود . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان .  
زياتاها غيطيان . عظمها مخروطي . فكاه ذريان .



لبوس النيل

٢٤٥٧٩ - **لُبْسُ حُنْطِي\*** (S). *Elops congicus*  
*Elops brun* (F).  
 نوع من اللبص. اعطائه تمتد من مصب النيل الى الجزائر والمغرب. جسده متوسط القد النسبي، يطول نحو ٧٠ سم. ثوبه الى الريدة الخطيئة المواج يدين في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٨٠ - **لُبْصِيَات**  
 Elopidae (S).  
 Elopidae (F).  
 فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحة المشانث. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمحاجد وبعض انواعها تدخل الاغوار والانهار || اجسامها اهليجية الشكل تطول، بالنسبة الى الانواع من ٣٠ الى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشدق تتميز بوجود نصل عظمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زعانفها الظهرية مقعرة. زعانفها الذيلية فارقة || اشهر اجناسها واعرفها اللبص والمعجاس.

٢٤٥٨١ - **لُبْطُوس\*** (S).  
 Leptosomus (S).  
 Courou, C. bicolore (F).  
 طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القتيويات. اعطائه فسيحة تمتد من تهام البحر الاحمر الى الحبشة ومدغشقر ومعظم مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدماً من الانثى، طوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الالوان. ظهره مع جناحيه وذنبه الى الخفسار النحاسي المواج. يعلو الى الصهبة الغبراء. رأسه الى الصهبة الخطيئة تملوها قلنسوة سمراء. زنده كمرف الديك ثنائي الانتشاب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. ثوبها الى الريدة الخطيئة تملوها نمشة صناعية النتم سمراء الحمار. وثوبها هذا يدين في الرأس والظهر والذنب ويغير في المتق والصدر والبطن والافنك || يألف الغابات والادغال. قوته الثار والحشرات اخصها الجراد والجنادب والزيزان || يدين عشه في الانحجار المتراكبة الاغصان والافنان. الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحفظها بجناوبة الذكر نحو ٢٤ يوماً.

٢٤٥٨٢ - **كَلْبَاب**  
 Convolvulus (S).  
 Liseron (F). Convolvulus (E).  
 جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللبليات. انواعه نحو ١٥٠ اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة معتمها بري وبعضها طبي وزيني || اعرف انواعه واشهرها مايلي.

٢٤٥٨٣ - **كَلْبَابِ اَرُضِي** هو الكفة المدادة، اطلبها.

٢٤٥٨٤ - **كَلْبَابِ اَلْحُقُولِ\*** ، كَلْبَابِ صَغِيرٍ ، طَرَبُوشِ الْغُرَابِ

Convolvulus arvensis (S). Liseron des champs, Petit Liseron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily, Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde (D). Convolvolo arvense, Erba leprina, Vitechio (I).  
 نوع من اللبالب المبدول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الفسارة. ساقه مضلعة مغزيرة تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه رعيحة مجنحة. ازهاره وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

لاطئة، متعاقية، كاملة. ازهارها مختلفة الالوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - **كَلْبَشْتُمُونْ أُنَيْق\***  
 Lobostemon formosus (S).  
 Lobostémone élégant (F).  
 نوع من اللبستمون. ساقها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. افتادها مغزيرة اللباد. اوراقها سنائية الشكل. نصلها خلية الصفحات العليا، سننة الحمار. ازهارها وردية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٥٧٣ - **كَلْبَشْتُمُونْ بِحَرِّيِ الْوَرَقِ\***  
 Lobostemon glaucophyllum (S).  
 Lobostémone à feuilles glauques (F).  
 نوع من اللبستمون. ساقها فروع تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخفسار، خشنة الحمار. ازهارها معتدلة الحجم، بنفسجية اللون، ناشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

٢٤٥٧٤ - **كَلْبَشْتُمُونْ فِيْ\***  
 Lobostemon argenteum (S).  
 Lobostémone argenté (F).  
 نوع من اللبستمون. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زباب اللباد. اوراقها كاملة سنائية الشكل، نصلها مغزيرة على الصفحتين، زغبها فني اللون. ازهارها معتدلة القد، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الزرقعة الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٥٧٥ - **كَلْبَشَة\***  
 Radier en béton (F).  
 Concrete bed (E).  
 تسمي لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

٢٤٥٧٦ - **لُبْسُ\***  
 Elops (S).  
 Elops (F). Elops (E).  
 جنس اسماك بحرية من فصيلة البصيات. انواعها المعروفة خمسة. اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها اهليجية الشكل، شذاه الحظم، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جامدة الحراشف المتباينة الاحجام. اثنائها متراكبة الالوان تكثر فيها الريدة الرصاصية التي تدبق في الظهر وتغير الى بياض في البطن || اعرف انواعه واشهرها، الثلاثة التالية :

٢٤٥٧٧ - **لُبْسُ اصْغَر\***  
 Elops saurus (S).  
 Elops saurien (F).

نوع من اللبص. اعطائه البحر الاحمر والخليج العربي. جسده كبير القد يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبه الى الصهبة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٧٨ - **لُبْسُ حِرْدَوْتِي\***  
 Elops lacerta (S).  
 Elops lézard (F).

نوع من اللبص. اعطائه الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب الى انكولا. جسده كبير القد يطول نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى الريدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



لبص حنطي



لبطوس



لبالب الحقول



رطة خلية البشرة القفصية المواج. أزهاره ثلاثية التجميع، زرق الحنار، حر القاعدة، صفر الإسدية || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين .

### ٢٤٥٩٣ - تِلَاب يَابَانِي ، تِلَاب أُرُغَب

*Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). Liseron pubescent (F).*

نوع من التِلَاب الممر . ساقه : باه عارضة تطول من مترين إلى أربعة أمتار . أوراقه خلية النصل ، صغيرة القد ، قصيرة الاعتناق . أزهاره كبيرة الحجم ، مستطيلة المالحق ، بيضبة الثنايات ، حواء اللون || أزهاره يستمر من أيار إلى أيلول .



تِلَاب السَّيَاحَات

### ٢٤٥٩٤ - تِلَابِي (F). Hédéracé (F). Hederaceae (E).

نمت تمرغبي وصفي يطلق على السوق المنطقة التي تشبه التِلَاب .

### ٢٤٥٩٥ - تِلَابِيَّات ، مَحْمُودِيَّات ، سَقْمُولِيَّات

*Convolvulaceae (S). Convolvulacées (F). Convolvulaceae (E).*

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القفالة . أجناسها وأنواعها عديدة . جميع نباتاتها مذادة أو متسلقة . سوقها غزيرة العصارة اللبنة . أوراقها متناحية مغرسة . أزهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والارتكاز . ثمارها حقية تنفلق من مصراعين أو أربعة مصاريع . مصاريعها لا قياسية الاخضية التي يراوح عددها من ١ إلى ٤ ، وكل غباء يحسن حية أو حبتان قشراهما جامد الماد || أشهر نباتاتها السقمونيا والبطاطا الحلوة والجلباب والرديد .

### ٢٤٥٩٦ - تِلَابِيَّة (F). Clissoïde (F).

اسم يطلق على منحن خاص من المعادلة الثلاثية .

### ٢٤٥٩٧ - لَبِين ، لَبِين ، لَبِين (E). Torchis (F). Cob, Loam (E).

المضروب من اللبن لبناء مربعا كان أو مستطيل . واحدته لبنة أو لبنة .

### ٢٤٥٩٨ - لَبِين (F). Lait (F).

هو الحليب ، اطلب . واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب .

### ٢٤٥٩٩ - لَبِين زَائِب ، لَبِين مُرَوَّب

*Lait caillé, Yoghort, Yahourt (F). Curdled milk, Yaourt (E).*

هو الحليب غثر بالروبة فراب واسبقانة حوامضه .

### ٢٤٦٠٠ - لَبْنَات ، لَكَنَات Lactate

هي ملح الحامض اللبني .

### ٢٤٦٠١ - لَبْنَتَار ، لَكَنَتَار Lactase

خيمرة تحول اللبنيوز إلى غلوكوز وغلكتوز .

### ٢٤٦٠٢ - لَبْنَة

هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضج صله .

### ٢٤٦٠٣ - لَبْنَتُور ، لَكَنَتُور Lactose

هو سكر اللبن . يشبه السكر العادي لكنه أقل حلولة ، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول .

### ٢٤٦٠٤ - لَبْنَسِي (F). Lait (F).

هي الاصطرك ، اطلبه .



تِلَاب نَفْسِي

### ٢٤٥٨٥ - تِلَاب السَّيَاحَات \*

*Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). Liseron des haies, Grand liseron (F). Hooded bindweed (E).*

نوع من التِلَاب الممر المبلول ساقه تطول نحو ٥ أمتار . أوراقه كبيرة القد مثلثة الزوايا مستطيلة الاعتناق . أزهاره كبيرة الحجم ، بيضاء اللون ، وردية المواج || أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين .

### ٢٤٥٨٦ - تِلَاب المَحْمُوس

هو التيرونيكا الخنزيرية ، اطلبها .

### ٢٤٥٨٧ - تِلَاب زَيْتُونِي الْوَرَق

*Convolvulus olecefolius (S). Liseron à feuilles d'olivier (F).*

نوع من التِلَاب الممر . ساقه خشوية منتصبة تعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقه زيتونية الشكل ، أزهاره نورية التجميع ، صغيرة الحجم ، وردية اللون || أزهاره يستمر طوال الصيف .

### ٢٤٥٨٨ - تِلَاب فُضِي \* ، تِلَاب خَبِيزِي الْوَرَق ، حَشِيشَة مَهْبُولَة

*Convolvulus althaeoides (S). Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis (F). Mallow bindweed (E). Kleine Kornwinde (D). Convolvolo argentino (I).*

نوع من التِلَاب البري المبلول . ساقه فرعاء زياء تطول نحو ١٠٠ سم . أوراقه خبزنية الشكل مفصصة ، نصلها خلي البشرة على صفحتي . أزهاره كبيرة القد ، ليلكية اللون ، بيضبة القصل . جنوده درنية طيبة عديدة المنافع || أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

### ٢٤٥٨٩ - تِلَاب مُثَلَّث الْأَنْوَان

هو شب النبار ، اطلبه .

### ٢٤٥٩٠ - تِلَاب مِصْرِي ، لُوبِيَاء تِلَابِيَّة

*Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). Dolique d'Egypte, Dolique lablab (F). Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab (E). Agyptische Fasel, Gemeine Lablab (D). Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto (I).*

نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات . ساقه عطقه عارضة . أوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الذرية . أزهاره عطرية الرائحة ، عنقودية التجميع ، بنفسجية اللون ومنها الأرجوانية والموعدة بالأبيض . ثماره قرن مغلطة سنية ، مقومة . بزورها بيضبة مبطلة بنفسجية اللون أو جزوية || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب .

### ٢٤٥٩١ - تِلَاب مُقَصَّص

*Convolvulus cneorum (S). Liseron-camélée, Liseron argenté (F). Silvered bindweed (E).*

نوع من التِلَاب الممر . ساقه خشوية منتصبة تعلو من ٧٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقه أليفة نصلها سناني الشكل ، ملحمي الطرف ، خلي البشرة على صفحتي ، بحري اللون ، فضي المواج . أزهاره عشكولية التجميع ، صغيرة القد ، بيضاء اللون ، وردية التوشيح || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف .

### ٢٤٥٩٢ - تِلَاب مُورِيَّانِيَّة

*Convolvulus mauritanicus (S). Liseron de Mauritanie (F).*

نوع من التِلَاب الممر وهو جنبة ليفية خشوية . ساقها قصيرة ، فروعها دقيقة مذادة ، تطول من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقها بيضبة الشكل قصيرة الاعتناق . نصلها

بمد متحه ببضعة ايام عن رقات ذرية تنوجه فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اخاديد العروق حيث يتوفر لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبودة تسرح على التماسك والافانصان والسوق .

#### ٢٤٦١٤ - لَبُودَةُ فُلُورِيدَةِ

Ceroplastes floridensis (S). Céropaste de Floride (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصلي فلوريدة وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . عوائلها عديدة اصحابها الغار والكأكي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدوب بالشكل مقعقل التنوء . ثوبها الى البياض الاغبر ، جيلها الحولي واحد . نفق مكها يتم في اواخر حزيران . تركيب الاوراق على صفحتها العليا وقد تركيب الاغصان والسوق . تتكاثر بالزيت الشتوي .

٢٤٦١٥ - لَبُونُ ، لَيْتِيَّةُ Laitière (F). Milch (E). صفة الانثى الحلوب .

#### ٢٤٦١٦ - لَبُونَات

Mammifères (F). Mammiferous, Mammalia (E). هي الحيوانات اللبونة المعروفة بالثدييات . واحدها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبِيَّاز Lapiaz هو السري دبار طبيعي لا يقاسي العمق والاتساع يخدح سطح التلوث الجصي .

#### ٢٤٦١٨ - لَبِيَّةٌ

Lebia (S). Lébie (F). Lebia (E). جنس حشرات قانصة من فصيلة الليبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة كثيرة البعد منتشرة في معظم اقطار واقالم العالم || اجسامها صغيرة ، مبطله ، تعطول من ٥ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تأثيرها وتكورها ولامسها نفاظية . كاسلها صغيرة ، مخصورة . بطونها مقلطه ، مستعرضة . اعماها تساعية الاخاديد النحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . اولها متبانية الالوان الزاهرة ، تكثر . فيها الزفرقة || الحشرة الجلجلة قانصة والبرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لَبِيَّةٌ Lippia (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة رعي الحمام ، اطلها .

#### ٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ الْمَيْسِ

Libythea celtis (S). Libythée du micocoutier (F). Libythea celtis (E). حشرة من فصيلة اللشائيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنحرفة نحو المعتدلة . فراستها جارية قوتها رقيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الانجيريات ومنها الميس || جسمها مردني الشكل يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٤٦ م . رأسها صغير الحجم . جوشها وبطنها الى الجوزي الاشقم الموج || رواشتها عند الشقن الى الجوزي الخفلي الموج يطوى في الزوج الامامي تجذيع الكلف وبقتان عاجيتان وخمس نقط بيض وسط حشاري اغبر . ويعملو في الزوج الخفلي تجدة قاطية عاجية وتطهر حنطلي بين الجدة والطرف || لها جيلان في الحول . تقطر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمنح المكان ميحادياً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لَبِيَّةُ Lactée (F). Lactéous (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

#### ٢٤٦٢١ - لَبِيَّةٌ

٢٤٦٢٢ - لَبُونِ Fécule (F). Faecula (E). هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر المساقل النشوية المادة .

#### ٢٤٦٢٣ - لَبُونُ

Libitina (S). Libitine (F). Libitina (E). جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرخويات صفحيات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي || اسدائها شبه كلبية الشكل ، معتدلة الحجم ، متساوية المصاريع . مناصبا صغيرة ، مطليقة ، ثنائية || تعيش لاصقة بالصخور المغورة القليلة العمق . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٤ - لَبُونَةٌ ، لَبَاةٌ Lionne (F). She lion (E). انثى الاسد ، ويقال لها العرس ايضاً .

#### ٢٤٦٢٥ - لَبُودَةُ التَّيْنِ \* ، شَمْعِيَّةُ التَّيْنِ

Ceroplastes rusci, C. nerii (S). Céropaste du figuier (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب التين والاس . جسمها كروي الشكل ، اسمر اللون ، قطره يراوح من ٣ الى ٤ م . قرونها الشمعي جامد التند المنسجي الشكل ، ثمانية الصحائف الطويلة . شمها اومد اللون بنفسجي المواج . ذكورها بمنحة تطول نحو ٢ م . ثوبها الى الجؤوة . رواشتها عاجية اللون مهدية الخنار .

#### ٢٤٦٢٦ - لَبُودَةُ الْحُمْصِيَّاتِ \*

Coccus hesperidum, Lecanium hesperidum, Lecanium tessellatum (S). Pou des hespérides, Cochenille plate de l'oranger (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي بيضيه الشكل مقلطه . طلبها الخناري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يقلب في البني والاسمر || تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق ومن الاوراق اخاديد العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل || تتكاثر باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

#### ٢٤٦٢٧ - لَبُودَةُ الزَّيْتُونِ

هي قرمزية الزيتون المخططة ، اطلها .

#### ٢٤٦٢٨ - لَبُودَةُ صَيْبِيَّةٌ \* ، شَمْعِيَّةُ الْحُمْصِيَّاتِ

Ceroplastes sinensis (S). Céropaste ciroux (F). حشرة من القرمزيات تركيب الحمصيات على اختلافها . مهدها الصين وقد انتشرت مع اللبون في جميع مناطق زراعتها . وهي صغيرة القد مكورة الجسم طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . وعرضها من ٣ الى ٥ م . لبدتها تكلو نحو ٤ م . وهي مبيجة التاليل الشائكة . قرونها الشمعي جامد التند ، اغبر اللون ، لبيكي المواج || جيلها الحولي واحد . الانثى تضع من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ مكنة اهليلجية الشكل حقيقية اللون وذلك من اوائل تموز الى اواخر آب . ينتفح المكان



لبودة التين



لبودة الحمصيات



لبودة صينية



لية



ليس النيل

البلبل من نصال النبات المائل || السرة طول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خلى القشار، كسني التجميع. نصلها رعي الشكل ثلاثي المروق، ازهاره كبيرة القد، كثيرة العدد، لونها الازرق الزاهية. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِّيْنٌ ظَرِيف** (*Anagallis tenella* (S).

Mouron mignon (F).

نوع من اللين البري المعمر، يكثر في المنافع، ساقه منتسجة طول نحو ١٠ سم. اوراقه متقابلة، نصلها مستدير الشكل صغير القد. ازهاره وردية اللون، مستطيلة المالحق النعيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣٢ - **لَبِّيْنٌ مُسْتَعْرِضُ الْوَرَقْ** \*

*Anagallis latifolia* (S). Mouron à larges feuilles (F).

نوع من اللين المعمر يزرع كحولي. ساقه منتسجة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقه متقابلة معتقة بيضيه. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الزرقه الازوردية || ازهاره يستمر من نحو الى آب.

#### ٢٤٦٣٣ - **لَبِّيْنَةٌ** \* في الفرج، اطليه.

#### ٢٤٦٣٤ - **لَبِّيُوتْ** \*

*Lepiota* (S).

*Lépiote* (F), *Lepiote* (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريفقيات. انواعها المعروفة نحو ١٢. اصطناعها بعض اقالم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش على المواد النباتية المتحللة في الغابات وفي المواقع الرطبة. تتميز بيوها الازبيض اللون وباطراسها الحادة الاطراف الطليقة، وطوق يكتنف اعالي الساق، تحت الاسبوسة. يكثر وجودها في فصل الخريف || بعض انواعها لذيق العلم ماكول والشمع كاعن الصفن غير مريض فيه ومنها نوع جعالي المادة يؤذي وقد يميت.

#### ٢٤٦٣٥ - **لَبِّيُوتْ رَكِيثْ** \*

*Lepiota rhacodes* (S). *Lepiote déguenillée* (F).

نوع من الليوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه معتدلة الارتفاع، مستقلة القاعدة. اروسه مظلية الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاخر يملو مواج اصفر عند التنفج.

#### ٢٤٦٣٦ - **لَبِّيُوتْ رَفِيعْ** \*

*Lepiota procera* (S).

*Lépiote élevée* (F).

نوع من الليوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستفصحة القاعدة، اروسه مظلية الشكل، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت العادم الاحرار.

#### ٢٤٦٣٧ - **لَبِّيُوتْ زَقِي الْبَرَقْ** \*

*Lepiota metulaespora* (S).

*Lépiote à spore en outre* (F).

نوع من الليوت الكاعن الصنف. يوجد في المواقع الرطبة. ساقه رفيعة، معتدلة الشخلة، حنطية اللون. اروسه شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الغرة، وشاعها اصفر السابغ. يوهها زني الشكل.

#### ٢٤٦٣٨ - **لَبِّيُوتْ عَادِمُ النَّعْمْ** \*

*Lepiota naucina* (S). *Lépiote sans valeur* (F).

نوع من الليوت الكاعن الصنف. يكثر وجوده في المراعي.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِّيْنَةٌ** هو الكنهان، اطليه.

#### ٢٤٦٣٢ - **لَبِّيْنَةٌ** (*Cierge de Notre-Dame* (F).

نبات يدهي بوضير لبد، اطليه.

#### ٢٤٦٣٣ - **لَبِّيْنَةٌ سَوْدَاء** (*Molène noire* (F).

هي البوضير الاسود، اطليه.

#### ٢٤٦٣٤ - **لَبِّيْسْ** (*Labeo* (S), *Labéon* (F), *Labeo* (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبليات. انواعه نحو ٢٠ اصطناعها اهر وبجيرات البلاد الحارة من العالم القديم. اجسامها طول نحو ٢٠ الى ٦٠ سم. اثوابها سوية الالوان. يكثر فيها الاسمر والجودي البني. جميعها كبيرة الزعانف. اشهرها ليس النيل.

#### ٢٤٦٣٥ - **لَبِّيْسُ النَّيْلِ** \*

*Labeo niloticus* (S).

*Labéon du Nil* (F).

نوع من اللبيس وهو سمكة نهريه تكثر في النيل. جسمها كبير القد يطول نحو ٦٠ سم. نوحها الى الخضار الاسمر. زعانفها كبيرة حراء اللون. لحمها ماكول متوسط الصنف.

#### ٢٤٦٣٦ - **لَبِّيْنٌ** (*Anagallis* (S), *Mouron* (F).

ويدهي «أناغالس» جنس نباتات برية وثرينية، من فصيلة الربيبات. انواعه اكثر منها العشبية والخشبية والحرولية والمعمرة. اوراقها متقابلة او ضية. ازهارها جرسية الشكل || اعرف انواعه ما يتبع.

#### ٢٤٦٣٧ - **لَبِّيْنُ الْمَاء**

هو السولس، اطليه.

#### ٢٤٦٣٨ - **لَبِّيْنُ الْمُرُوجْ \***، **زَعْلَيْكَةٌ**، **حَشِيْشَةُ**

**الْحَلْمَةِ**، **عُشْبَةُ الْعَلَقِ**

*Anagallis arvensis* (S). *Mouron des champs*, *M. rouge*, *Morgeline* (F). *Red pimpernel*, *Poorman's weather-glass* (E). *Roter Gauchkel*, *Rote Mäuse-darm* (D). *Anagallide*, *Anagall* (I).

نوع من اللين البري المبدول. ساقه جالسة مفصلة تملو نحو ١٥ سم. اوراقه لائنة متقابلة، نصلها بيضي الشكل صغير القد. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يعتبر من الاعشاب الضارة الواجب تلفها ان في الزروع ام في الحدائق والمبايل || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

#### ٢٤٦٣٩ - **لَبَّبْنُ الْهَضَابْ** \*

*Anagallis collina* (S).

*Mouron des collines* (F).

نوع من اللين التريبي المعمر. ساقه خشبية منتسجة طول نحو ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه السفلى متقابلة، اعليجية النصل. اوراقه العليا ضية ثلاثية التجميع، سنانية النصل الضيق. ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

#### ٢٤٦٣١ - **لَبِّيْنُ ضَمِي الْوَرَقْ**

*Anagallis verticillata* (S). *Mouron verticillé* (F).

نوع من اللين التريبي المعمر. ساقه خشبية منتسجة



لين الحضاب



لين المروج



لين مستعرض الورق



ليوت رفيع

ليوت ريث



ليوت زقي البوق

Latania (S). **لَتَانِيَة \* ، لَاتَانِيَا**  
Latanier (F). Fan-palm (E). Latanie, Fächer  
palme (D). Latania (I).

جنس اشجار زراعية من التعلقات التاليات. أنواعه ٦  
منها المأكولة البَار والصناعية والزَّيْتِيَّة. جذوعها منتصبة  
حلقية. أوراقها هامة مروحية. أزهارها ثنائي المسكن.  
طلوها مهبل الشكل. جبابها متبورة. أزهارها الذكورية  
منفردة. كؤوس وتواجيات أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل،  
متناكها سهمية، أسديتها محيطية تمد من ١٥ الى ٣٢.  
جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الأتربة الخفيفة  
العميقة النور التي لا تتنصها الرطوبة || اعرف أنواعها  
ما يلي .

٢٤٦٤٦ - **لَتَانِيَة أَمْرِيكِيَّة**  
Latania americana (S). Latanier d'Amérique (F).  
نوع من اللتانية، منبتها أفريقية الوسطى. تزرع لأتزين  
ويستخرج من أوراقها الياف نسجية صناعية لا بأس بها  
شائعة الاستعمال المحلي .

٢٤٦٤٧ - **لَتَانِيَة بُورْبُونِيَّة**  
Latania borbonica (S). Latanier de Bourbon (F).  
نوع من اللتانية الأتزينية. تزرع في المراكن والحدائق  
التي لا تخشى البرد. أوراقها مروحية جميلة الخضار الزاهي،  
تطويل وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها شبيحة  
الحشف الاخضر اللون || ترطب في الأتربة الدالية  
الحوارة الممكن رجا .

٢٤٦٤٨ - **لَتَانِيَة حَمْرَاء**  
Latania rubra (S). Latanier rouge (F).  
نوع من اللتانية الزراعية الصناعية، منبتها البلاد الاستوائية.  
أوراقها كبيرة اللد تطويل وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها  
حشطي اللون جوي المواج. غوصها أحمر الضلع، أخضر  
الصفحة || يستخرج من أوراقها الياف صناعية شائعة  
الاستعمال .

٢٤٦٤٩ - **لَتَانِيَة صِينِيَّة**  
Latania sinensis (S). Latanier de Chine (F).  
نوع من اللتانية الزراعية، منبتها الصين تتميز بكثر  
كباشها وكثرة عددها الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما  
متوسط وزن الكباشه فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة وهي  
الاصفر أو الجوزة السوداء. رؤوسها كبيرة. ثمارها  
أوراقها متوسطة اللد تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض  
الانسجة الوطنية .

٢٤٦٥٠ - **لِيُثْرُوس \***  
Lethrus (S). Lèthre (F). Lethrus (E).  
جنس حشرات من غديات الاجنحة سفحيات القرون  
وفصيلية الجمليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها تمتد  
من الشرق الاوسط الى اربوة الشرقية والجنوبية. جميعها  
الشوزن، تطويل من ١٨ الى ٢٢ سم. أطواها الى السواد  
الاصفر أو الجوزة السوداء. رؤوسها كبيرة. ثمارها  
ضلعية. عيونها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية  
سفحيات الاطراف. كواشها عريضة مقعرة الماس  
الرامي جالسة الماس الفمدي، اعماها مستديرة الاطراف  
اللاحقة. قوائمها شديدة النشط، متكاثفة الحلب .

ساقه معتدلة الارتفاع لونها الى الطحلة. ارسوت قلنسوة  
الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الطحلة السوداء.

٢٤٦٣٩ - **لِيْبِيُوت مُجَعَّد \***  
Lepiota cristata (S). Lépiote crêpe (F).  
نوع من الليبوت الجحالي المؤذي. يوجد في الغابات كربه  
الرائحة عند البسوس. ساقه معتدلة الارتفاع، سمراء اللون،  
طولها ابيض اللون، اسمر الحافة. ارسوتها بجدة الصفعة،  
مقعرة الوسط، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السمرة يطولها  
تتميز امغر .

٢٤٦٤٠ - **لِيْبِيُوت مُزْبَر \***  
Lepiota hystrix (S). Lépiote hérissée (F).  
نوع من الليبوت المأكول. يكثر في المواقع الظليلة. ساقه  
مستفصمة، قصيرة، عادمة الطول. ارسوتها شبه  
غروبية الشكل، مشثلة الصفعة، صفيرة الجرم،  
قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستانية المواج .

٢٤٦٤١ - **لِيْبِيُوت مُسْتَج \***  
Lepiota excoriata (S). Lépiote excoriée (F).  
نوع من الليبوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة.  
ساقه مستفصمة القاعدة، مستدقة المتق، غبراء اللون.  
ارسوتها شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى  
الغبرة يطولها تسنج اسمر .

٢٤٦٤٢ - **لِيْبِيَّات \***  
Lebilda (S). Lebilda (F).  
فصيله حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها  
وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم  
اجناسها صغيرة، مبطلة تطويل من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها  
صغيرة. عيونها بارزة. قاشيرها وفكوكها قياسية، عادمة  
الحلب. قرونها الاستعمارية خيطية، مركبة من ١١  
فصلة، مهدبة ابتداء من الفصلة الرابعة. كواشها صغيرة،  
مخسورة، يكثر فيها الشكل الخذروتي. اعماها تساعية  
الاعاديد النحيلة، جميلة الالوان الزاهرة، ارساغ القوائم  
الالمانية، عند الذكور، مجهزة بصفين من الاحاجم  
جميعها مقعرة، تطير بخفة وتنتقل على الارض برشاقة.  
تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لانه من فرائسها المفضلة ||  
اشهر اجناسها اللببيَّة والسيسيتيديس .

٢٤٦٤٣ - **لُتَات** ما فتت من قشور الشجر .

٢٤٦٤٤ - **لَتَاسَة \***  
Latastia (S). Latastie (F).  
جنس حيوانات زحافة بيضوية من المظليات وفصيله  
الضبابيات. انواعها المعروفة اربعة موطنها الجزيرة العربية  
وبعض المناطق الافريقية. تألف القيسان والبراري  
والواحات. قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... ||  
اجناسها مستطيلة. اطاولها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم.  
رؤوسها مستطيلة الشكل. قوائمها خاسية الاصابع .  
اذنانها مستطيلة، دقيقة الاطراف. اثوابها الى السمرة  
الخيطية او السهية الصفراء || ذكورها اصغر قدًا من  
اناثها ولم ثوبًا منها. الاناث تقعن شلقها في الرمل على  
عق ٤ او ٥ سم. فينتف بعد خسة اسابيع من دوبيات  
نحيلة دقيقة تسمى الى القوت بعد التف بيوين .



ليبوت عادم الفتح



ليبوت مجعد



ليبوت مزبر



ليبوت مستج



لتاسة



لتانية



لنوس



لنين مداد



لثاء

٢٤٦٦٠ - لثَاء مَعْتَبِيَّةُ الْوَرَقِ (S). *Clethra alnifolia* (S).  
Clêthre à feuilles d'aune (F).

نوع من اللثاء وهي جنبة سربوتية تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منفشة الشكل طولها من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. تصلها بمبهر الزغب كثير العروق المتشابكة المتوازية. ازهارها وريدية اللون عطرية الريح عتقودية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

### ٢٤٦٦١ - لثَاء مُلْتَحَبِيَّة

*Clethra canescens*, *C. barbinervis* (S). Clêthre barbu (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة سربوتية تعلو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه مديبة ملتحة كثيرة العروق المتشابكة الشارة ؛ تصلها خلي الصفحة السفلى ، بحزري اللون . عتاقيد ازهارها منشبة رعدة ، ازهارها كبيرة القذ يقضاه اللون || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

٢٤٦٦٢ - لثَائِيَّات ٥  
*Clethraceae* (S).  
*Clêthraceae* (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين ، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنجيات || انواعها كثيرة العدد ، معظمها بري وبعضها تزييني . جميعها شجيرات ونباتات . اوراقها متعاقبة ، بسيطة ، مسنة الحافة . ازهارها عتقودية التجميع او سنبل ، طرفي الارزكاز . ازهارها خماسية الفصل والبيلات ، عشارية الاسدية ، مقلوقة المآبر ، مثلفة السات || اشهر انواعها اللثاء الزباء والمديبة والشجرة والمغشية واللشحية .

٢٤٦٦٣ - لثَاءَة ٥  
*Macroglossus* (S).  
*Macroglosse*, *Roussette kiodote* (F).

جنس حيوان من فصيلة الطوطيات. انواعه المعروفة خسة جميعها يترآه صغيرة القذ ، طولها من ٦ الى ٧ سم. يسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم. اثارها الى الريد السواء . فراطيسها ضيقة ، ذلقة ، مديبة . اسنثها قابلة الانعطاف خارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش جماعات قليلة العدد . تألف مجاري الماء والادوية والكهوف والبيوت الخربة . قوتها التار على اختلاف انواعها .

٢٤٦٦٤ - ثَلَاثَةُ زَعْبَاء ٥  
*Macroglossus minimus* (S).  
*Macroglosse minime*, *Roussette kiodote minime* (F).  
*Small Reed-bunting* (E).

نوع من اللثاء . حيوان ليون ثامر من فصيلة الطوطيات || جسمها صغير القذ ، عادم الذنب ، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ يسطه نحو ٢٠ سم. ثوبا الى الريد السواء السوداء المواج . رأسها مستعرض الثقف ، غرطوي الشكل . قرطوسها ضيقة ، ذلقة . اذناها صغيرتان ، منتصبتان ، مديبتا الطرف . عينها مستديرتان كيرتان . تقها كبير الشدق يحوي ٣٤ سنًا . لسانها غارق الطول يعمل في طرفه بعض الحامض الماصة || تألف جفوع الاجبار والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة . تعيش جماعات قليلة العدد من الذكور والاناث || مسرهما دجوي يستمر من الدفوش الى الفجر . نباتها الشتوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً . يحبل الاثنى يدوم نحو ٣٨ يوما تقفع في تمامه جرراً واحداً يكثي ويسمع ويصير بعد الوضع باسرع ويتنقل يصدر امح حى النظام ، اي نحو سبعة اسابيع || قوتها التار اليانة واعصها السكرية . تعتبر من الطوايط المؤذية الفاضرة .

٢٤٦٥١ - لَتِيس  
*Drépane* (F).

سكة من السحليات مشهورة باسم ترلاس ، اطلبا .

٢٤٦٥٢ - لَتِيسَن .  
*Ononis* (S). *Ononis*, *Bugrane* (F). *Arête*, *Arête-bœuf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola dei campi*, *Serppeggiante* (I).

٢٤٦٥٣ - لَتِيسَن الْقَدَمَاء  
*Ononide antique* (F).

هو الشبارق ، اطلب .

٢٤٦٥٤ - لَتِيسَن مَدَاد \*  
*Ononis repens* (S).  
*Ononis des champs*, *Bugrane rampante*, *Arête-bœuf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bullmacola dei campi*, *Serppeggiante* (I).

٢٤٦٥٥ - لَثَاء  
*Suc végétal* (F).  
*Vegetable juice* (E).

ما يسيل من الشجر من عصارة مها كان نوعها .

٢٤٦٥٦ - لثَاء \* وَلِثَة  
*Clethra* (S). *Clêthre* (F).

٢٤٦٥٧ - لثَاء زَبَاء  
*Clethra tomentosa* (S).  
*Clêthre tomenteux* (F).

نوع من اللثاء وهي جنبة سربوتية تعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروصها زباء اللحاء . اوراقها اهليلجية ضيقة تطول نحو ١٠ سم. وتعرض ٤ ، تصلها خلي الصفحة السفلى المحلحلا اللون . ازهارها عطرية كبيرة القذ سفلية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٤٦٥٨ - لثَاء مُدَبَّبَة  
*Clethra acuminata* (S).  
*Clêthre acuminé* (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة سربوتية تعلو من مترين الى ٦ امتار. اوراقها اهليلجية مديبة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٩ ، تصلها مسن الحافة ، اخضر الصفحة العليا ، يحزري السفلى الحولية البشرة . ازهارها كبيرة القذ ، سفلية التجميع ، يقضاه اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٦٥٩ - لثَاء مُشَجَّرَة  
*Clethra arborea* (S).  
*Clêthre arborescent* (F).

نوع من اللثاء وهي شجيرة تعلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها ابيدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. تصلها جامد الصفحة ، خلي البشرة السفلى الصفراء اللون . ازهارها عاجية ، متعاقبة صغيرة القذ ليدة . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

## ٢٤٦٧٢ - لَجْدَة - Chelonia (S).

Chélone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).

جنس سلاحف بحرية من فصيلة الجشيات . أنواعها عديدة، جميعها كبيرة القد تقود نحو ٢٠٠ سم . وتزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحديداب . قترها قرني المادة اليابسي الترتيب . قوائمها زعنفية الشكل ثنائية المقاب . قوتها الاغشاب البرية . تبيض على الشواطئ الرملية، لحماها مأكول ويضها أيضاً .

## ٢٤٦٧٣ - لَجْدَة حَضْرَاء \* Chelonia viridis, C. midas (S). Chélone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).

نوع من اللجاء المأكولة اللحم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طولها نحو المترين ، ذيلها الى الخفصاء الزيتوني .

## ٢٤٦٧٤ - لَجْدَة سَهْنِيَّة \* Chelonia imbricata (S). Chélone imbriquée, Caret (F).

نوع من اللجاء المأكولة اللحم المنتشرة في جميع البحار . ذيلها اسمر اللون ، قترها سهي التركيب لؤلؤي الماجة .

## ٢٤٦٧٥ - لَجْبَة

النجمه التي قل لبها وقد يكون ذلك بعد تاجها باربعة اشهر . ج . لجاب .

## ٢٤٦٧٦ - لَجْه - Abyss (F). Abyss (E).

العمق البعيد الغور في البحر ، يبتدئ من حدود المنطقة اللجيه اي على عمق ٥٠٠ م . من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

## ٢٤٦٧٧ - لَجْدَة مُلْفُوحَة \* Ligdia adustata (S). Ligdie aduste (F).

Ligdia adustata (E).

حشرة من الارفيات حشرغيات الاجنحه . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها جارسه قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق المضايف والقات ... جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ م . بسطها نحو ٢٨ م . رأسها الى الكسني . عينها ناشزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشها الى الكسني الاسود المواج . بطنها الى الطلحة السمر المواج || رواشها عند الشقن الى الشهية الوردية المواج تملوها في الزوج الاسامي بقعة قاعدية بلون الجوشن ، وبقعة بيضاء ورقشة الى الطلحة . وتملؤها في الزوج الخلفي رفشة تراوح من الخنطي الى الاسمر . اعداها بتبنيه اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح من الصمر الى قسمة الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتمتد المكان مباحداً على الصفحات السفلى من نصال النبات العائل || السرفه تطول نحو ٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار . ثوبها الى الطلحة الكدراء تملوها رفشة زرقاء قائمة . رأسها الى الزرقه السوداء . مدنها الى الخنطي الاخير . رواجها البطنية الوسطى ماصحة ما يجعلها تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفه في كل مكان .

## ٢٤٦٦٥ - لَنَادَة ° Synanthérie, Syngénésie (F).

Syngenesia, Syngenesia (E).

الثاندة حالة الاسديه الملثوه اي الملثمة المأبر .

## ٢٤٦٦٦ - لَنَادَة الْآفَاقِي ° Astica cracca, Toxocampa cracca (S).

Toxocampe de la vesce craque (F).

Astica cracca (E).

حشرة من النسيقيات حشرغيات الاجنحه . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى واروبه الجنوبية والغربية . فراشها جارسه قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الفريثات الفرائسية واعصها الآفافي والققداد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م . بسطها نحو ٣٨ م . رأسها كسني اللون جزوي المواج . عينها كبرتتان . زباناها غشيطان . جوشها وبطنها الى الخنطي الاكلس المواج || رواشها الاساميان الى الخنطي الاكلس تملو جده كسنيه وبقعة حلالية سوداء ثم جده اخرى غبراء . رواشهاا الخلفيان الى الخنطي الاكلس في الزاينين الاول والثاني والى الكسني الاسمر في الزاينين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان مباحداً على نصال اوراق النبات العائل || السرفه تطول نحو ٢٣ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار ، اخضر اللون ، اطحل المواج تملوه خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط شجي ينتهي عند السكمة التاسعة . رأسها الى الفرة القائمة . مدنها ورواجها الى الصمره || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكهما السرفه على ماعيق الوراق الذاللة القريبة من التربة .



لَنَادَة الْآفَاقِي



لجاء خضراء

## ٢٤٦٦٧ - لَنَقْ Rosée du matin (S).

Morning dew (E).

هو الندى ونهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وأما الذي يسقط اوله فهو السدى . ويقال يوم لثم اذا كان ساكن الريح كثير الندى .



لجاء سهفية

## ٢٤٦٦٨ - لَنَقْ Recueillir un suc (F).

To gather a juice (E).

لثي ولثي ولثي : استقطر عصارة الانجبار من حليب وصنع وما اشبه .

## ٢٤٦٦٩ - لَنَقْ ، صَامِعْ Gommeux (F).

Gummeux (E).

ما كان صمغي المادة او كانت تملوه مادة صمغية .

## ٢٤٦٧٠ - لَنِيد ° Synanthérique (F).

Syngenetic (E).

اللثيد من النبات ما كانت مأبر ازهاره ملتصحة . ومن الازهار ما كانت مأبرها ملتصحة .



لجاء ملثوقة

## ٢٤٦٧١ - لَنِيدِيَّات ° Synanthérées (F). Synanthérées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القاطلة سفلية الاسديه الملثمة المأبر . كانوا ، فيما مضى ، يعتبرونها عمارة من فصيلة المركبات .



لَجَفَةُ الحور



لَجَفَةُ السَّنْدِيَانِ



لَجَفَةُ السَّنْطِ لَجَفَةُ الْمُرْكَشَةِ



لَجَفَةُ الصَّنُورِ



لَجَفَةُ الْعَلِيقِ



لَجَفَةُ الْمُلُولِ



لَجَفَةُ النَّجِيلِ



لَجَفَةُ خُطْلَةٍ

« Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد، ثوبها إلى البني الداكن، وراشها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود. يرقاها تركب الملول والصرور والخورج.

٢٤٦٨٧ - **لَجَفَةُ النَّجِيلِ** \*، و **رَاشِفَةُ النَّدَى** Cosmotriche potatoria (S). Cosmotriche, Buveuse (F).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد صفراء اللون. يرقاها تركب مختلف النباتات النجيلية. هي خصائصها أنها ترشف نقط الندى المتجمعة على زغب الاوراق قبل ان تقرض النصل.

٢٤٦٨٨ - **لَجَفَةُ مُخَطَّطَةٍ** \*

Malacosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrien (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).

حشرة من اللجفيات صغيرة القد حنطية اللون حمراء المواجه تمتع مكها بالتتابع على الاغصان فيسود كالطوق أو كالحاتم. يرقاها تركب اوراق الاشجار المشرقة والحرجية من ايار الى حزيران.

٢٤٦٨٩ - **لَجَفِيَّاتٌ** \* Lasiocampidae (S). Lasiocampidés (F). Lasiocampidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠٠ جميعها متوسطة القد، كثيفة الخرافش، ضعيفة الراش، عادمة الطعم، مشطية الزباب، اناثها اكبر حجماً ورائحة لونا من ذكورها. يرقاها تحمل على جانبها خصل من الهلب اللين. خادراتها لتتحف بشرائق حريرية المحيط مثقوبة النسيج.

٢٤٦٩٠ - **لَجَمٌ** « لَجَمٌ دويبة اصفر من الغلاية. وقيل اكبر من شمة الارض ودون الحرباء ».

٢٤٦٩١ - **لَجِينٌ**، **لَجِينٌ** Mash كل خيليط من دقيق او نخالة او قت او غيرها مع الورق او اللبن مرث بالماء لتتلفه الماشية.

٢٤٦٩٢ - **لَجَنِيَّاتٌ**، **لَجَنِيَّاتٌ** Cheloniidae (S). Chélonidés (F). Cheloniidae (E). فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاف، اجناسها وانواعها عديدة معظمها كبير الجف. ذلها صدى التركيب قليل الاحديداد. زغها يفسد في الماددة، وقوامها مجلطة زغنية الشكل || اشهر اجناسها اللبابة والحفان والقبض.

٢٤٦٩٣ - **لَجِيٌّ** Abyssal, Abyssique (F). Abyssal (E).

نعت تعريفي يطلق على الكائنات البحرية الموجودة في الجة اي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م. تحت سطح الماء حتى القمر.

٢٤٦٩٤ - **لَجِيدُ يَوْمٍ** \* Lagidium, Lagotis (S). Lagidium (F).

جنس حيوانات لونة قاعية من فصيلة الشفليات. موطنها بوليفيا والبرو والتيلي. اجسامها متوسطة القد، قدرها قدر الارنب. سبالها كثيفة الهلب الاسود الطويل. اذانها كبيرة منتصبة. اذانها مستطيلة جثة طولها يعادل طول

٢٤٦٩٥ - **لَجَفَةُ الرَّبْسِمِ** \*

Lasiocampa trifolia (S). Bombyx du trèfle, Lasiocampe du trèfle (F).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد ثوبها إلى الجوزة الوردية المواجه. يرقاها تركب الربسم وجميع انواع النفل وبعض القطنيات.

٢٤٦٩٦ - **لَجَفَةُ الْحَوْرِ** \*

Gastropacha populifolia (S). Gastropache du peuplier (F).

حشرة من اللجفيات، متوسطة القد. بسطها نحو ٦٠ م. ثوبها إلى البني الزاهي. وراشها منشارية الحافة، خاسية الخطوط السود. يرقاها تركب الحور وتعيش على اوراقه.

٢٤٦٩٧ - **لَجَفَةُ السَّنْدِيَانِ** \*

Lasiocampa quercus (S). Bombyx des chênes, Lasiocampe des chênes (F). Oak moth (E). Eichen-spinner (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد كبيرة الراش المتداخلة الالوان. ثوبها إلى البني الاصفر المواجه. يرقاها نمة تركب جمع انواع السنديان.

٢٤٦٩٨ - **لَجَفَةُ السَّنْطِ** \*

Nadisa obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).

حشرة من اللجفيات، متوسطة القد، بسطها نحو ٥٠ م. يرقاها تحمل في بعض طيات حلقها البنية جيوبا مشبهة بالهلب اللينق الناعم اللادب تقلقه عند الحاجة دفاعا عن الحياة. هي تركب السنت فتمريه من الورق.

٢٤٦٩٩ - **لَجَفَةُ السَّنْطِ الْمُرْكَشَةِ** \*، **لَجَفَةُ**

الميسموزا Taragama acaciae (S).

Bombyx du mimosa (F). حشرة من اللجفيات تحمل بذات خصائص ريقها السابقة الا انها اكبر قدًا واغلظ جثة وابق ثوبا. وراشها مزركمة بالاسود والاعطل. يرقها تركب السنت دون سواء.

٢٤٦٩٣ - **لَجَفَةُ الصَّنُورِ** \*

Dendrolimus pini (F). Dendrolime du pin, Bombyx du pin (F). Pine lappet, Pine moth (E). Kiefern-spinner (D).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد بسطها نحو ٥٠ م. ثوبها إلى اللون اغير المواجه. وراشها مزركمة ومخططة. تسرح من تموز إلى آب. تمتع مكها على جنود واغصان واهادب الصنوبر فينتفخ عن رقات دقيقة تباشر بالاهادب الاهادب منه السلاخا الاول. ومن قائل ان البرقة تأكل في اثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدية. وانها تلهم الهدية بظرف خس دقات.

٢٤٦٩٤ - **لَجَفَةُ الْعَرَعَرِ** Pachyose lineaire (F).

فراشة مشهورة باسم بكلمة العرعر، اطلبها.

٢٤٦٩٥ - **لَجَفَةُ الْعَلِيقِ** \*

Macrothylaea rubi (S). Bombyx de la ronce (F).

حشرة من اللجفيات متوسطة القد بنية الثوب بسطها نحو ٥٠ م. تسرح من ايار الى حزيران. يرقاها نمة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية اغصانها الوردية.

٢٤٦٩٦ - **لَجَفَةُ الْقُرْعِ** \*

Gastropacha quercifolia (S). Gastropache du chêne,

## ٢٤٧٠١ - تحلاح \* ، قُصَوَان الجِمَال

Cnicus acarna, Picnomon acarna (S). Chardon acanthin (F). Cnicus, Thistle, Welte thistle (E). Schöne Distel, Sperrdistel, Stacheldistel (D). Cardo acantino, Scardacione (I).

نبات عشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البور وعسل جوانب الطرقات ويصعب من النباتات القسرة اذا كثر في الزروع .

Apogon (S).

## ٢٤٧٠٢ - تحلح

Apogon (F). Apogon (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية الشكل تغلظ من ١٠ الى ٢٠ سم . ألوانها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخلف . اشدافها واسعة منفردة . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماسحة . زعانفها الظهرية اثنتان . زعانفها الذيلية فارقة || اشهر انواعه الحلح الاحمر .

## ٢٤٧٠٣ - تحلح اخضر \* ، تحلح مبدول ، بوزباشي

Apogon ruber, Ap. imberbis (S). Apogon rouge, Ap. commun, Roi des rougets (F). Apogon ruber (E).

نوع من الحلح . سمكة بحرية بزر من فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها الكثاف الصخرية والاشجاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يعلوها تنقيط اسود . زعانفها حمراء اللون . رأسها معتدل الحجم ، رفيع المقدم ، قصير الخلف . شدفها واسع الانفراج اسناتها صغيرة ، متراصة ، ذرية . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية فارقة || لهاها متوسط الصنف ، مأكول .

## ٢٤٧٠٤ - لحم ، لحم - Viande (F). Meat (E).

هو التسجيع المنسل في الحيوان والطير وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستوائه على نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوسلها في الجدول التالي :

نوع اللحم	مساء	مواد	مواد	مواد معدنية
ايقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ايقار مسمة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٩,٢٨	٠,٩٢
صجل عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
صجل مسمة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
غم عادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
غم غسم	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٣
خنازير مسمة	٤٧,٤٤	١٤,٥٤	٣٧,٣٤	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الحانة الاخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

حامض فسفوري	٠,٥٠ %
كلور	٠,١٠ %
بوتاس	٠,٥٠ %
صودا	٠,١٠ %

الجسم . جرانها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جميعها رباعية الاصابع . وبر فرامها كثيف التسجيع نام الممس ابيض القاعده اسهب الجسم صماني الطرف || قوتها اعشاب والجذور والطحالب . اناتها تقص من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة || انواعها اثنتان :

Lagidium pallipes (S).

Lagidium à pieds pâles (F).

Lagidium peruanum (S).

Lagidium du Pérou (F).

لجديدوم البرو

Ecorce (F). Bark, Strip (E).

الحاء بوجه عام هو قشر العود والغصن والساق . والحاء من الوجهة النباتية هو احد النسج الثلاثة التي تتكون منها الخزم الوضائية . وهو يتكون من انسجة غربالية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . والحاء جسموريا يأتي بين القشرة والشكير وهو يغلف النسج القلبية التي تلحف الشكير .

## ٢٤٦٩٦ - لحناء دجوتية \*

Nomophila noctuella (S). Nomophila noctuella, Teigne nocturne (F). Nomophila noctuella (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحرارة في جميع اقطار العالم . فراشتها رحالة قوتها رقيق الارعار . سرقتها خاضلة تعيش ضمن غمد حريري التسجيع على الارواق التي تلامس التربة من التيجليات والمركبات والقرينات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يسطها فراوش من ٣٢ الى ٣٤ سم . رأسها شبه مكور الشكل . عينها صغيرتان ، ناشزتان . زباناها غيطان . ملاسها صغيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني || رواشها الى الصناني تملوها ، في الزوج الامامي ، رشفة وزرا كش كسنية تمتد من القاعدة الى الخنار الحاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر القرفة في نيسان وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح وتجنول في الليل || طولها القراشي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في غلاله نحو ست مرات . والاثنى تلقي المنك بعد كل طرة زوا شعية العدد تغلفها مادة غروية تشبها على الصفحات السفل من تعال الارواق التي تلامس التربة || الطور الاسروي يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبوعا لانه متوسط بموالم البيئة والحرارة والاعتناء . السرة عند الادراك التام تغلظ نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حنطي اللون ، اسمر المواج . رأسها كسني اللون . مدنها ورواجها الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن حلجة تنسجها السرة تحت الجلالة او بين اربوات النباتات .

Pointe (F). Tip (E).

## ٢٤٦٩٧ - لحاظ

لحاف الرشفة : اسفلها الابيض .

Protogénie (F). Protogyny (E). ٥

الحلب هو ادراك اعضاء التناسل الانثوية في الزهرة قبل ادراك الاعضاء الذكورية .

Ecorcer (F).

To strip, To bark (E).

Chalcide (F).

## ٢٤٦٩٩ - لحت ، لقا

لحت القضيص : قشره .

## ٢٤٧٠٠ - لحنكاء ، لحنكاء

هي الحلكة ، دودية تدوس في الرمل ، الحلبا .



لجديدوم



لحناء دجوتية



ملحاء



لحم أحمر



اسمر ، يطفئ الى الصفار الاخير . عذباته صغيرة دقيقة  
اربع منها تحلي الفك الاعلى ولثنتان في الفك الاسفل .  
لحمه لذيق الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠٠٠١ %  
مغنيزيا ٠٠٠٤ %  
اكسيد الحديد ٠٠٠٥ %



لُحْ الغُدْران

٢٤٧١٩ - لُحْ شَائِك Cobitis taenia (S).  
Loche épineuse, L. de rivière (F). Groundling (E).  
نوع من اللُح، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه  
يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبطط الشكل متراكب  
الاروان القائقة والعابقة . عذباته ست تحلي الفك الاعلى  
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧٠٥ - نُحْمُ Omophage (F). Omophagous (E).  
أكل اللحم النيء .

٢٤٧٠٦ - نُحْمِي Ganache (F). Lower jaw (E).  
وهما لحيان اي شبتا فك القفوس والبلبل والحمار...

٢٤٧٠٧ - لُحْبَةُ التَّيْس Salsifs des prés (F).  
هو سلسليل المَرَج ، اطليه . قال الانطاكي : « هو  
الموسطيداس نبت كورق الكركث لكن لا يرتفع حفص  
حاد الرائحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرئة والصدور » .

٢٤٧٠٨ - لُحْبَةُ الحِمَار في كزرة الير ، اطلبها .

٢٤٧٠٩ - لُحْبَةُ الحَيَّة في ذق الحية ، اطلبها .

٢٤٧١٠ - لُحْبَةُ العُتْر في الشناب البحري ، اطلبها .

٢٤٧١١ - لُحْبَةُ الهَبْل في اللوتيا ، اطلبها .

٢٤٧١٢ - لُحْبَةُ Volva, Volve (F). Skin (E).  
في غشاء الفطر ، غشاء شفاف ناعم لا يقياس الوَلُ .

٢٤٧١٣ - لُحْبِيَّاتُ الأَلْسَنَة Crassilingues (F).  
زينة من المغالطات تشمل بعض الفصائل \* . تتميز بالسنتها  
للحمية السمكة القصيرة وغير الاخذة .

٢٤٧١٤ - لُحْبِيَّش قال الانطاكي : « اللحيش نبت بري وجبل يرتفع نحو  
ذراع له حب اسود مر الطعم في حجم العدس ينفع من  
السوم غصصاً بالمغرب ويحلل الرياح الغليظة وينفع  
السدد ويزيد الفواق والبرقان وشربته مثقال » .

٢٤٧١٥ - لُحْ Loch (F). Log (E).  
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧١٦ - لُحْ، كَبِيَّت Cobitis (S).  
Loche (F). Loach (E).

جنس اسماك نهري من الشبوطيات اللينات الزعانف . انواعه  
المعروفة قليلة . اعطاه مياه البلاد المتدلة اجسامها  
ضيقة مستطيلة . تتميز بكثرة عذباتها واسنانها البلعومية ،  
يسفر فلولها وسيق غشايسها مما يجعلها ترادد سطح الماء  
كثيراً || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧١٧ - لُحْ الغُدْران Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis (S). Loche d'é-  
tang, Misgurne (F).

نوع من اللُح، يعيش في سمل البحيرات والغدران . جسمه  
يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة القبراء عمل  
على جانبيه خطان اسودان قاطبان . عذباته ١٠ ، ست  
منها في الفك الاعلى واربع في الفك الاسفل ، لحمه متوسط  
الصنف مأكول .

٢٤٧١٨ - لُحْ حُر Cobitis barbatula (S).  
Loche franche, Dormille, Moutaille, Motelle (F).  
Rock-ling (E).

نوع من اللُح، يعيش في الانهر والبحيرات والغدران . جسمه  
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة يطولها توشيح

٢٤٧٢٠ - لُحْب Livistona (S).

Livistone, Rondier (F). Fan-palm (E). Echte Schirm-  
palm (D). Palma di cappelli (I).

جنس اشجار ليفية صناعية وزيتية من فصيلة النخلات .  
مهددا المناطق الحارة والاستوائية . انواعها عديدة جميعها  
رفيعة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في  
الاقلام المتدلة ، اوراقها تستعمل في عدة صناعات اصغرها  
صناعة القبعات والسائر . الواحدة لحية || اشهر انواعها  
الزيتية ما يلي .

٢٤٧٢١ - لُحْب Intensifier (F).  
To intensify (E).

استعمل اضمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٢٢ - لُحْبَةُ أندُونِيْزِيَّة \* Livistona hoogendorpii (S). Livistone de Hoogen-  
dorp (F).

نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكم والحداثق . اوراقه  
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم .  
غوصها مخروطي الشكل ، خاسي او سبامي الانشباب وهو  
جامد الصفحة اخضر اللون اصفر المارح .

٢٤٧٢٣ - لُحْبَةُ زَيْتُونِيَّة التَمَر \* Livistona olivaeformis (S). Livistone à fruits en  
olive (F).

نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكم والحداثق .  
اوراقه كلولية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها  
شائكة جسمها احمر اللون ، متباد الاوتكار . غوصها عايق  
الاخضرار محبب الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل والقعد .

٢٤٧٢٤ - لُحْبَةُ مُخْتَشِبَة Livistona humilis (S). Livistone bas (F).

نوع من اللُحب الزيتي يزرع في المراكم والحداثق .  
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها سرسة .  
غوصها ضيق الصفحة جبل الحصار الزاهي وهو ذرب الزام  
الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٢٥ - لُحْبَةُ مُسْتَدِيرَة الْوَرَق Livistona rotundifolia (S). Livistone Biroo (F).

نوع من اللُحب الزيتي والصناعي . اوراقه كبيرة القعد  
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .  
جرائدها سرسة تطول نحو ٢٠٠ سم . غوصها شديد الحصار  
المابق يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٢٦ - لُحْم، لُحْم Requin (E). Shark (E).  
هو القرش ، حيوان بحري جسور ، اطليه .



لُحْبة أندُونِيْزِيَّة



لُحْبة زَيْتُونِيَّة التَمَر



لُحْبة مُسْتَدِيرَة الْوَرَق

## ٢٤٧٢٧ - لَحْنٌ أَيْضُ

*Carcharodon carcharias* (S). Requin blanc (F).  
White shark (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللحميات. أعطانها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة أحصاه المحيط الأطلسي. مسرحها العادي يمتد لا يتجاوز الأعواظ ويمتد سطح الماء وتوابع السفن || جسمها كبير القد، وشبي الشكل، يطول نحو ١٢ متراً. ثوبها إلى الزرقاء البحرية البيضاء المواج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها مخروطي الشكل. خطمها شارب. لها لاسط مستعرض الشدق الكبير. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بأنهم وبشدة البطش. قربها كل ما استطاعت إليه من الأسماك والجيف || أناثها معتدلة النثر. تضع في كل مرة، بين أوائل حزيران وأواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.



لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُسَوِّدَةِ

## ٢٤٧٢٨ - لَحْنٌ لَحْمِيٌّ

*Alopias vulpes* (S).  
Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة اللحميات. أعطانها معظم بحار المعالم أحصاه المحيط الأطلسي || مسرحها يمتد ولا تخفى عبور المياه الإقليمية والاقتراب من الجوارح عند مطاردتها أسراب الرنكة والسردين والاسقمري || جسمها وشبي الشكل، كبير القد يطول من ٤ إلى ٦ أمتار. ثوبها إلى المثلثة الزرقاء المواج يمتد في الظهر ويبيض في البطن. رأسها مخروطي. خطمها شارب. لها لاسط مستعرض الشدق. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة الفضفاضة التي يبلغ طولها طول الجسم والرأس معاً || أناثها معتدلة النثر تضع في كل مرة، بين أوائل أيار وأواخر حزيران نحو ٣٥ مجراً.

## ٢٤٧٢٩ - لَحْمِيَّاتٌ

*Lamnidae* (S).  
*Lamnids* (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولودة مفترسة من السنغقيات ورتبة الأشلاق. أجسامها وأنواعها المعروفة نحو عشرة. أعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || مسرحها يمتد، مخروطي وسطحي || جميعها كبيرة الأجسام الوثنية الشكل. تتميز بشدة بطشها ونهمها وبأسنانها المثلثة الرؤوس الحادة وبالفتحات الحسني الكبير بين زعنفتها الظهريتين || أشهر أنواعها اللحم الأبيض واللحم الصلبي والحداد والياح.

## ٢٤٧٣٠ - لَحْنٌ

*Sclerotinia* (S).

جنس فطور مجهرية من الزهفيات وفصيلة الخشريات. يتميز بصدائه اللطيفة الكبيرة التقسية الشكل. تكاته مخروطية متشعبة متشابهة الشدة، بوجه ثنائي أو شمسي التركيب. يركب مختلف الاجناس النباتية || أشهر أنواعها وأضرها البائية مشر التالفة.



لَحْنُ الْأَكِيدِيَا

وذبول التواهي وانتشار لحاء الافئاد والافئان وعفن الثآير وتجنيتها || مظهره الخارجي: يبدو على الفتح والاجاص والسفرجل ذبول طارئ يصيب الثمرة أو بعض ازهارها فيملصها ثم يركب الأوراق القريبة منها وينتقل إلى الفئان والفئان فيلوي الاول بعد ان يوشم الثاني ببقع عفنية تقضي على النسج المصابة وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز والمشمش ذبول فجائي يحل بأوراق التواهي فيذبلها ويصيب أقرب الأوراق من الثآير فيقضي عليها ثم ينتقل إلى الافئاد فيفقرها ويسبب انتشار لحائها. أما الثآير فانه يفتحها على دفعتين الاولى عند الانعقاد، على أثر سقوط البتلات، فيذوبها. والثانية قرب الادراك فيوشها بحرساته الخلية الحطية التي تعطب القشرة وتحميها بعد أن تسبب عفنها وصفن لها || وهو على الكرز ورم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والبيجان والأذن والأوراق والافئاد، والنسج تلو الآخر. كما وانه يصيب الثآير عند ادراكها فيعطلها ويفعل فيها فعله بآثر الفوخ والمشمش والدراق || يكافح أولاً في فصل الشتاء، من كانون إلى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصولة وسرقها وينفخ الاشجار بمذوب ملح الصودا المحلول ١٪ والمضاد إليه ١٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تنضف الاشجار مرة ثانية خلال شهر آذار أي قبل الاكاح بسائل بورديو المحلول من ٠.٨ إلى ٢٪ بالنسبة إلى نوع الاشجار وإلى ظروفها الخاصة، ومن الواجب أيضاً تفحصها مرة ثالثة توتاً بعد العقد.

## ٢٤٧٣٢ - لَحْنُ الْأَكِيدِيَا \*

*Sclerotinia mespili* (S). Maladie du dessèchement des pousses de néflier (F).

فطر مجهري يصيب الأكيدنيا في تواليمها وازهارها وأوراقها وتغاريها الفتية || مظهره الخارجي عفن أصهب اللون كثيف العرصات يركب التواهي فيلويًا وينخر نموها ويركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الأوراق تنخيف وتسرُّ ابتداء من عتقها بعد ان تكتسب رائحة عطرية مستحبة. وإذا سطا على الثآير بقودها إلى اليباس بعد جفاف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورديو المحلول ١٪ بعد قطع الاعضاء الموبوءة وسرقها.

## ٢٤٧٣٣ - لَحْنُ الْبَرْقُوقِ

*Sclerotinia pruni-spinosae* (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهري يصيب الثآير والافئان فيمنطقها بعفنه التيبي اللون الذي يسبب اهترامها بكاملها أو أجزاء منها. وهو على الافئان عفن اغبر ثم اصفر يعطب للحساء ويسبب اليباس || يكافح بكثرة من اللخن.

## ٢٤٧٣٤ - لَحْنُ الْبُقُولِ

*Sclerotinia minor* (S).

فطر مجهري ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ إلى ١٠ درجات. يصيب عدة بقول اغصانها الحليين والجزر والكرنس واللوبيا والخنس والبنوترة والطرطوط ... || مظهره الخارجي بقع عفنية لينة صغيرة مستديرة تركب مختلف اغصان النبات تنضفها بشور سودا بعد ان تثل فيها الحركة اللبغية التي تسبب الذبول الذي يعيقه اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باجتناب زراعة البقول المعرضة لهذا الفطر في المراتق الرطبة الباردة.

## ٢٤٧٣١ - لَحْنُ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ \*، لَحْنُ

## لَحْمًا مُونِيلِيَّوُزُ سَلِيرُونِيَا لَحْمًا

*Sclerotinia laxa*, S. cinerea, S. oregonensis, Monilia Laxa, M. cinerea (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliose (F). Blossom blight (E). Monilia-spitzendürre (D).

فطر مجهري يركب الفتح والاجاص والسفرجل والكرز والفوخ والدراق واللوز والمشمش فيسبب اعلاص الازهار

عفن الطحلح خلي يعلو الثَّار عند ابتداء الارواق فينتقلها بعمرها ثم يركب الثَّواري والارواق الفتية والانفان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكانته لحن الثَّار .

#### ٢٤٧٤٢ - لَحْنُ السُّوسَنِ

*Sclerotinia convulata*, *Botrytis convulata* (S).  
فطر مجهري يفتك بجذامير السوسن . مظهره الخارجي يقع عنية حطية اللون زغبية ، تركب الجذامير المحفوظة وفي الثَّارة تنمطها وتلفها || يكافح بتطهير الجذامير المحفوظة بالفرمول وبالملاح الزئبق .

#### ٢٤٧٤٣ - لَحْنُ الشَّيْتَمِ

*Sclerotinia temulenta*, *S. secalicola*, *Stromatinia temulenta*, *Phalea temulenta*, *Endoconidium temulentum* (S). *Maladie du seigle envlvrant* (F).

فطر مجهري يصيب حب الشيلم وحب بعض النجيليات العلفية والثَّرية || مظهره الخارجي استطالة في الحب وتخديده يعقبها انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب الموبوء وديقه يسبب في الانسان والحيوان مسا يسببه الزوران من عوارض اسرعا وسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغمر الحب مدة ٣٠ دقيقة بالماء الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة ستينغراد .

#### ٢٤٧٤٤ - لَحْنُ الْعَقْرِ\* ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَتِكَبِي\*

*Sclerotinia fuckeliana*, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polycystis cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). *Pourriture grise*, *Pourriture noble*, *Maladie de la talle* (F). *Grey mould* (E). *Botrytis-fäule*, *Graufäule* (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق الى الثَّار كما وانه يركب المواد العضوية في سطح الثَّرة فيفسدها بعمرها واصانها التي تشبه نواس العنكبوت . مظهره الخارجي يختلف مع النبات المنحدر . يبدو غالباً بشكل ونيمة جامدة طحلاء اللون او حطية تكشف النبات . هو في الكربة يقع عنية زغبية طحلاء اللون تركب السروع القريبة من الثَّرة وتركب حب المتأقية فتنطه وتذله وهو في الاجاص يقع عنية متتابعة قدية الشكل تركب الانفان فتؤذيها ونميتها || ويركب الثين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثَّار وجفافها || ويصيب النبات في المساق فيفشي على الشتول الفتية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير الثَّرة وباستعمال احده العلاجات الاقتصادية الزهيدة الثمن .

#### ٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الْقَرْنِيَّاتِ

*Sclerotinia ciborioides*, *S. trifoliorum* (S). *Maladie à sclérotis des légumineuses* (F). *Stem rot*, *Wilt of clover and alfalfa* (E). *Kleekrebs* (D).

فطر مجهري يركب بعض النباتات القرنية الهولية اخصها الفول والبقايع والبرسيم || مظهره الخارجي يقع عنية مبرمة تركب نصل الارواق ثم تنتشر فتنصب كامل النصل والمعلق وتنتد الى السوق فتذبلها وتلونها بعد ان تنمطها وبشاح من العفن الابيض الذي يثني النبات والثَّرة || يحسن تحفيض الثَّرة الكوم لصراف الماء لقصار واجتناب الزرادة في الارربة الرطبة القوية الاندماج .

#### ٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الْكَسْتَنْةِ\* ، نَرُوم

*Sclerotinia pseudo-tuberosa*, *Rhacodiella castaneae*, *Harziella castaneae* (S). *Pourriture noire des chélagènes* (F).

فطر مجهري يصيب ثمار الكستنة فيفسدها ويغضي عليها . مظهره الخارجي لطحلة طحلاء او سمرار اللون تملو القشرة

#### ٢٤٧٤٥ - لَحْنُ الثَّيْبِ\*

*Sclerotinia nicotianae* (S). *Maladie à sclérotis du tabac* (F).

فطر مجهري يصيب الثيب في سوقه واوراقه . يبدو على السوق لطح سمر طولها نحو ١٠ مم . يضرها ٦ . وهو على الارواق يقع صغرة لا قياسية الشكل والحجم تبدو كالبثور الحطية اللون الى ان تركبها عمرسات العفن الخليل الاخير || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الموقعية وبشدة البرد .

#### ٢٤٧٤٦ - لَحْنُ الثَّكَّارِ\* ، مَوَلِيَّيَه\*

*Sclerotinia fructigena*, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). *Rot-brun\* des arbres fruitiers à pépins* (F). *Brown rot* (E). *Monilia-fruchtfaule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهري يصيب اشجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والاكديا وقد شوه في ظروف خاصة على ثمار الكرز والخوخ والمشمش والدراراق || يصيب في بادئ امره بتلات الانزهار وتيجانها وانها ثم يمتد الى الانفان فيعطب اللحاء والارعية ويشل الحركة النسجية بعد ان يمتلئ الاعضاء للمصابة وبشاح من عمرسات العفن الخليل الاطحل || وقد يصيب الثَّار في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتشف كامل شربتها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء المصابة والبالغة المختلة . ثم باستعمال سائل يورود المحلول ١٪ على اثر سقوط بتلات الزهر . وتنضج الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات المعدل عندما تصبح الثَّار في نصف حبسها او في ثلثيه .

#### ٢٤٧٤٧ - لَحْنُ الثَّوْمِ\*

*Sclerotinia porri* (S).  
فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي يقع بيض ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

#### ٢٤٧٤٨ - لَحْنُ الْجَوْتَنِ\* ، زَعُوطُ الْجَوْتَنِ\*

*Sclerotinia bulborum* (S). *Morve de la jacinthe* (F).  
فطر مجهري يركب بصل الجون والاشقل والزعفران . مظهره الخارجي اصفرار وذبول يجلان بالاوراق فور سطوع الشمرخ الزهري . ثم يبور لبدة لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف بيض الداخلى تركب اسقاط البصل فتعطبها وتبرها || يكافح باقتلاع البصل الموبوء منه ظهور الورم وتطهير الثَّرة بالفرمول .

#### ٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الدَّكْبُوسِ\*

*Sclerotinia draytoni* (S).  
فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ وينتقل معه الى الثَّرة . مظهره الخارجي يقع عنية حطية زغبية مرامسة تركب اسقاط البصل واقرامه فتعطبها وتبرها || يكافح بتطهير البصل عند حفظه وقلي زهره بالفرمول وبالملاح الزئبق .

#### ٢٤٧٥٠ - لَحْنُ الزُّعْرُورِ\*

*Sclerotinia crataegi*, *Monilia crataegi* (S).  
فطر مجهري يركب الارواق فيؤذيها ويصيب الثَّار فيلونها او يحول دون نموها || يكافح بكثرة من اللخن .

#### ٢٤٧٥١ - لَحْنُ السَّقَرْجَلِ\*

*Sclerotinia linhartiana*, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia neans* (S). *Maladie du dessèchement des jeunes coings* (F).

فطر مجهري يركب الثَّار في اول عهدا فيفسد اطلاقها ويركب الارواق والانفان فيؤذيها || مظهره الخارجي



لحن الثَّار



لحن العفن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرضي المرجان .

Lychnis (S).

لُحْنَيْسُ

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtenke, Marienkreuzlein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جلس نباتات عشية من فصيلة القرنفليات . أنواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . أوراقها متعاقبة بيضية أو سنائية النصل . أزهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والارتكاز يكثر فيها الاحمر والابيض والموشح . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٥٣ - لُحْنَيْسُ أَرْجَوَانِي ، لُحْنَيْسُ سَاطِع

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللحنيس وهو عشية معمرة وريدة الساق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لاطئة سنائية ، نصلها مسن الحافة اذغب البشرة . أزهارها عتقولة التجميع ، هامة الارتكاز ، بتلاتها ارجوانية اللون ، رباعية التفصيص . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٤ - لُحْنَيْسُ الْحَدَّالِق ، لُحْنَيْسُ مَتَشَوُّرِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaria, Coquelourde des jardins, Cillet de Dieu, Passe-fleur (F).

نوع من اللحنيس الزينبي وهو عشية معمرة زياه تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها بيضية لسنة . نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها مستطيلة الاذن كثيرة العدد . بتلاتها قليلة التشرع عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب . أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٥٥ - لُحْنَيْسُ الشَّرْقِ الْأَدْنَى ، لُحْنَيْسُ خَلْقَدُولِيَّة

Lychnis chalcidonica (S).

Lychnide de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللحنيس وهو عشية معمرة تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . ضروبها الزراعية عديدة . سوقها وأوراقها مزجية . أوراقها لاطئة بيضية ، نصلها مسن الحافة اصفر الحفار . أزهارها مختلفة الالوان ، ضمية التجميع ، هامة الارتكاز ، منها المكسبة والمعادية ؛ بتلاتها مقعرة تبدو كالصليب مما جعلهم يدعونها صليب القدس أو صليب ماله . أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٦ - لُحْنَيْسُ الشَّشْرِ

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de Jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Cillet de Dieu, Fleur de Jupiter (F).

نوع من اللحنيس الزينبي وهو عشية زياه معمرة وريدة الساق تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لسنة ، نصلها خلي البشرة . أزهارها كبيرة القد ، بتلاتها ثنائية التفصيص قرمزية اللون . أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٧ - لُحْنَيْسُ بَرِّي

Lychnide sylvestre, Campanon rouge (F).

نوع من اللحنيس وهو عشية برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشية .

٢٤٧٥٨ - لُحْنَيْسُ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللحنيس وهو عشية معمرة تملو من ٢٠ الى

الخارجية قطعها . ثم يمتد الى لباب الثمرة فيسبب اغتلاحه وتحويله الى بؤرة من العفن الناشئ الاسود تتخلله عروق صفير يسقط منها عند انفلاقها غبار كالحباب || تفرز الثمار المغلوبة من السليمة بعد نمدها بالماء لان المغلوبة تطفو والسليمة تغور .

٢٤٧٥٧ - لَحْنُ النَّجَّسِ

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S).

فطر مجهري يركب الارراق عند ظهورها فيؤذيها ويهيئها الى نموها وازهارها || مظهره الخارجي عرصات مبعثرة طحلاء اللون تتركب نصل الارواق منه ظهورها ثم تتحول الى وثاق سود تنشو الارواق وتبقى نموها ونمو ازهارها وازهارها .

٢٤٧٥٨ - لَحْنُ نَاهِم

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapskrebs (D).

فطر مجهري يركب معظم الانواع النباتية في مختلف اصنافها التربة والهلوات || مظهره عرصات كالشور صغيرة لينة تبدو بيشاء اللون ثم تميل الى الزرقعة وتستقر على السمرة توحم سطح الاعضاء المويودة او تصيب السوق في مناطقها المكابية كما يحل في البطاطا والبنندوره والتبغ . وهو على كل حال لا يقرب الاعضاء السليمة بل يركب القشور الخادونة ويصيب النبات في الخلل ولا يفتن في الثمار والدرنات المخزونة || يكاثف بتطهير التربة بواسطة الفرمول او الحامض الخلي او الاملاح الزبقية .

٢٤٧٤٩ - لَحْنَتَة

Chou (F).

هي الملفوف ، اعلمه .

٢٤٧٥٠ - لَحْنَتَة

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس فطور من فصيلة الخشاريات ورتبة الرقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في الموائل الظليلة على المواد النباتية المتحللة . مجموعتها تمد من زوج الى ثلاثة ازواج . سوقها مجمدة . تكاثرها قصية الشكل او ترسية ، قفصها من ١ الى ٣ سم . قوائها الخارجية مهدبة القشار لونها الى الصفار الاصفر الباهت او الى الحمرة البرتقالية . صفحتها الداخلية بيشاء اللون . راحتها كريمة مستهجنة || اعرف انواعها واشهرها :

لَحْنَة تَرْمِيَّة

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لَحْنَة نَصْف دَائِرِيَّة

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥١ - لَحْنُومٌ \* لَحْنَلَيْسُ

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الكنيديات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار جزر الانتيل || اجسامها شبه اهلبيجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٧٠ الى ١١٠ سم . رؤوسها مخروطية . اشداقها معتدلة الرحابة . زعانفها الظهرية والشرجية والذيلية مجزأة بمناعس غشيرية مستطيلة . اولياها متباينة الالوان منها الاحمر والجواري والاخضر والانس والاخضر البحري . ظهورها اعيق لوناً من بطونها || لحمها متوسطة الصنف مأكولة باستثناء نوع واحد يدعى لحنوم كليبي (Lachnolaimus caninus) ثوبه الى الحفار الزيني . طوله نحو ١٠٠ سم .



لحن ناهم



لحنة ترسية



لحنة نصف دائرية



لحنم



لحنيس الشرق الادنى



لحنيس الششري

صغيرة ، محرمة . ظهراتها كامل الحنجية ، شارب ، كسني الشباك . رؤسها غشائيات . بطنها صغير الحجم . قوائمها نشيطة || مسرعا حراج السديان . قوتها نفع الارواق .



لُحْنَيْسٌ لَرَج

٢٤٧١٧ - لَدَائِيَّات ٥. *Ledridae, Scaridae (S).*

*Lédridés, Scaridés (F). Ledridae, Scaridae (E).*

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة . رؤوسها ضخمة . اعطائها صغيرة . عيونها جانبية صغيرة . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل الامتساوية . كسلها عريضة ، مزودة باطناف متباينة الاشكال . اجنتها كبيرة ، شاربة . رؤسها غشائية ، شفافة . بطونها صغيرة مبعدة . قوائمها نشيطة ، والحلفية منها مستعرة الاطوار المستنة كاللشاز .

٢٤٧٦٨ - لَدَعَّة ، لَسَعَة . *Piqûre (F). Prick (E).*

هي المرة من اللدغ بالفم ومن اللس بالغة .

٢٤٧٦٩ - لَدِيد . *Côté (F). Side (E).*

جانب المتق وجانب الوادي . اللديان : جانب الوادي وصفحتا المتق دون الاذنين . ولدنيد الشيء : ناحيته ج الة .

٢٤٧٧٠ - لَدَابَة سَوْدَاء ٥. *Empis nigricans (S).*

*Empis noirâtre (F).*

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، كثيف الملب ، متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١٢ م . ثوبها الى السرة السوداء يطولها في صدرها خمسة خطوط سود . مكرور . خطها متدل الطول . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، مفترقتان عند الانثى . زباناها صغيران ، الاعشاب . قنصها الذباب والحوام .

٢٤٧٧١ - لَدَابَة مِهْدَبَائِيَّة ٥. *Empis muscarius (S).*

*Empis gobe-mouches (F).*

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، وشي الشكل ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٩ م . ثوبها الى السرة الخطية . رأسها كبير الحجم ، شبه مكرور الشكل . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، فارتقتان عند الانثى ، لونها الى الحمرة المرجانية . خطها متدل الطول ، شديد النشط . زباناها مرتقيان ، اشقران . صدرها اسطواني الشكل ، كثيف الحمل . بطنها خماسي السكم ، مردي الشكل . قوائمها حطية || قوتها الذباب والحوام تقتنصها طائرة .

٢٤٧٧٢ - لَدَائِيَّات ٥. *Empididae (S).*

*Empidés, Empididés (F). Empididae (E).*

فصيلة حشرات خاتلة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار أو محرقة ، مبعة الملب . رؤوسها شبه مكرورة . عيونها كبيرة . فارقة عند الاناث ، متلاحة عند الذكور . اعطائها دقيقة متباينة الاجسام والصلابة . اغذاها

٥٠ م . اوراقها لامطة بيضية الشكل . نصلها متباعدة اللتين جمل الخشار . انزعارها ضمية التجميع محورية وعامية الارتكاز كبيرة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م . لونها الى الحمرة القرميدية ومنها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٩ - لُحْنَيْسٌ لَرَج \* . *Lychnis viscaria (S).*

*Lychnide visqueuse, Trape-mouches (F).*

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي . اوراقها لزجة . انزعارها ابيضانية اللون .

٢٤٧٦٠ - لُحْنَيْسٌ رَوْد السَاء . *Lychnis coelirosa (S).*

*Lychnide rose du ciel, L. facinée, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette (F).*

نوع من اللحنيس الزبني وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ م . ساقها وفروعها عادمة الزغب . اوراقها ضيقة جامدة النصل . انزعارها سحابي اللون مهدبة البتلات الكاملة . انزعارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٦١ - لُحْنَيْسٌ رَوْدِي \* . *Lychnis flos-cuculi (S).*

*Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Œillet des prés, Véronique des jardins (F).*

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ م . اوراقها لامطة ، سنانية النصل ، بحرية اللون . انزعارها مكسبة عديدة البتلات الارباعية التشرهم الوردية اللون || انزعارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٧٦٢ - لُحْنَيْسِيَّات . *Lychnidées (F).*

سبط من القترقيليات ، اشهر اجناسه اللحنيس .

٢٤٧٦٣ - لُحْنِيَّات . *Cobitidae (S).*

*Cobitidés (F). Cobitidae (E).*

فصيلة اسماك نهرية من رتبة مفتوحات المثانة لينات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، كانت تتبع في التصنيف الماضي ، فصيلة الشبوطيات . اعطائها معظم انهر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، متباينة الالوان . فلوها صغيرة ونحيلة . زعانفها الظهرية وحيدة تتوسط الظهر تقابلها الزعانف الخلفية من الجهة السفلى . وتتميز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥ . رؤسها البوموية ويضيق خياشيمها بما يجعلها تاراد ملح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها البغ .

٢٤٧٦٤ - لَدَاكَة ٥. *Rhodopaxille (F).*

هو اليلك ، فطر من فصيلة الفارغيفونيات ، اطلبه .

٢٤٧٦٥ - لَدَاكَة . *Malléabilité, Pliability (F).*

*Malleability, Pliability (E).*

القابلية الى الاتواء . وهي ايضا القابلية الى التصفيح في بعض المادان .

٢٤٧٦٦ - لَدَرَة بِقِطَّة ٥. *Ledra aurita (S).*

*Lédre attentive (F).*

حشرة من فصيلة الدريات . جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبها الى الخطي المنمش بالكسني والاسمر . رأسها مستعرض ضخم . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، ثلاثيا الفصل . كسلها مزود باطناف شاربة . حجبها



لُحْنَيْسٌ رَوْدِي

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالحز عصاره صغرى وانتجية تعرف بالبخور العادى اوراقها عادية العرف المسطح. لونها الى الخضار الازرق المابى. ثمارها كروية الشكل جزوية اللون، طمفا يراوح من ١٢ الى ١٥ م. وعرضها من ٨ الى ١٠، اشخاصا صناعية جيدة الصنف.

### ٢٤٧٧٩ - لَرَّان ، لَرَّان ، سِيْسُوس

Cytisus (S), Cytis (F), Broom (E), Kleestrauch (D), Citiso, Avornello (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة القرنيات الفراضية. انواعه نحو ٣٠ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عنقودية جالسة او متدلية تغلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سقية. يزورها عسيدة الشكل تحوى بعض المواد العنصرية الجحالية، ذيقها شديد الفعالية اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

### ٢٤٧٨٠ - لَرَّان اَبْيَض

Cytisus albidus (S).

Cytisus blanchâtre (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. بجلته فراء فناء متدنية تملو نحو ٥٠ سم. فروصها واقتها شائكة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المنقطة. ازهارها بياض اللون اعرفه يستمر من حزيران الى تموز.

### ٢٤٧٨١ - لَرَّان اُرْجُوَانِي \*

Cytisus purpureus (S).

Cytis à fleurs pourpres (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اهليجية النصل مائلة البثرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرقي اعرفه يستمر من ايار الى كيب.

### ٢٤٧٨٢ - لَرَّان عَطِيْطِي الرَّق

Cytisus linifolius (S), Cytis à feuilles linéaires (F).

نوع من اللزان البري الميول. بجلته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة عطيفة خلية البثرة تطول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ م. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الارتكاز صغيرة القد صفراء اللون اعرفه يستمر من اذار الى ايار.

### ٢٤٧٨٣ - لَرَّان سَلْبِي \*

Cytisus nigricans (S).

Cytise en épis (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها فراء زياء، زيفها اصفر اللون. اوراقها منقطة. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨ م. ازهارها سفلية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية اعرفه يستمر طوال شهر حزيران.

### ٢٤٧٨٤ - لَرَّان كَنْتَارِيَّة

Cytisus canariensis (S).

Cytise des Canaries (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. بجلته صغرى القد متدنية. ساقها فراء فناء. وريقاتها بيضية النصل تطول نحو ٧ م. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة العرف اعرفه يستمر من حزيران الى آب.

### ٢٤٧٨٥ - لَرَّان مَدِيرَا

Cytisus maderensis (S).

Cytise de Madère (F). نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منقطة وريقاتها اهليجية النصل تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. وتعرض من ١٠ الى ١٥.

وطايبها منخبة حادة مجهرة الخطف. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الارتكاز اعرفها اكبر قدما من ذكورها. تتجمع مكها في التربة وفي جذوع الاشجار النخرة اعرفها دودية، شبه اسطوانية، خماسية السكم، شائكة الحيد. رؤوسها صغرى قاسحة. تكثيرها ذرية. جميعها دامة او واجهة تعيش في التربة او في جلوع الانجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في امحال وواحال المناقع ويجاري الماء.

### Hématophage (F).

Hematophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يقتذى بالدم او قوته الدم.

### Lardizabal

جنس نباتات زراعية ليفية عارشة معمرة من فصيلة اللورديزاليات. مهدها امريكية الجنوبية. لها ثوران لورديزال الشيلي ولورديزال البرو اعرفها متعاقبة. ازهارها بنفسجية عاقبة. ثمارها لحمية خوخية فسقية اللون مأكولة يدعونها في بلاد الشيلي (كوفيل).

### Lardizabaleae (S).

Lardizabaleae (F).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القفالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البربريسيات والقمريات اعرفها تنمى جنبها الوحيد المسكن والبويضة اعرفها اجسامها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللورديزال واللاتي.

### ٢٤٧٧٦ - لَرْمُوس \*، لَرْمُوس

Larimus (S).

Larime (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد الحارة اعرفها اجسامها اهليجية الشكل معتدلة التيطيط تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها كبيرة، قصيرة الاعظام، رحية الاشدق. عيونها كبيرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابها الى الرتبة الفضية تعيق في الظهور ويعلمها تسليج اسود يتد الى ما يقارب ثلثي الاياطل. يطونها الى الشبهة الفضية الشديدة القعمان اعرفها جيدة الصنف، مرغوب في.

### Larinus (S).

Larin (F).

جنس حشرات خاضعة من مخديات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها الميثرات اخصها الاقوس اعرفها اجسامها شبه بيضية الشكل، صغرى القد، مستدقة المقدم والمؤخر. قرونها الاستشعارية مرفقة، دبوسية الاطراف. كاسلها واغادها ملحقة بفشاء من الطيلس الاصهب اللون اعرفها متنبية الاوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السمرة والطلحة.

### ٢٤٧٧٨ - لَرَّاب \*، عَوْعَر رَفِيع

Juniperus excelsa (S).

Génévrier de Tauride, G. en arbre (F), Greek juniper (E), Hoher Wacholder (D).

Ginepro di Crimes (I).

نوع من الرعر اعطانه تمتد من اليلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. شجرته كبيرة القد تملو



لرموس



لَرَّاب



لَرَّان ارجواني



لَرَّان سفلي

Neritidae (S).

Nérítidae (F). Neritidae (E).

فصيلة حلازين من الرخويات المحدثات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وبعضها بحري ونهرى .

Homophylle (F).

Homophyllous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات مثالي الأوراق المتساوية.

Lasioderme (F).

٢٤٧٩٨ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

Lasiostroma (S).

٢٤٧٩٩ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

Déprimage (F).

٢٤٨٠٠ - لَسْ  
رعي الماشية اول نبات المرج .

٢٤٨٠١ - لَسَّاس  
العشب ما دام صغيراً لا تستكن منه الراعية .

٢٤٨٠٢ - لَسَّاس  
اللساس عشب غشقة كلسان الثور وليست به ، (الحيط) .

٢٤٨٠٣ - لِسَان  
عضو عضلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه اللحم . وظيفته المضغ والمص والبلع وتكييف الصوت .

٢٤٨٠٤ - لِسَان  
سمكة تدعى الدرب ، اطليا .

٢٤٨٠٥ - لِسَان  
« عشب من الجنبه ها ورق متفرش اخشن كأنه المساحي يسمن ومن وسطها قضيب كالذراع طولا في رأسه ثورة كحلا » (اللسان) .

٢٤٨٠٦ - لِسَانُ الْبَحْرِ  
نبات يدعى جَارُ النهر ، اطليا .

٢٤٨٠٧ - لِسَانُ الثُّعْلِ  
« نبات كثير الفروع مربع طويل الاوراق فيه خشونة » (ابو حنيفة) .

٢٤٨٠٨ - لِسَانُ الثَّوْرِ الْحَزْنِيِّ  
هو الانثورة الحزنية ، اطليا .

٢٤٨٠٩ - لِسَانُ الْحَمَلِ  
جنس نباتات عشبية رية من فصيلة الحمليات . انواعه نحو ٥٠ منها الحولية والمسرمة جميعها مقرمة . اوراقها قرصية الانتساب معتقة او لاطئة . ازهارها سبيلية التجميع يحملها سمارح مصمت دقيق || اكثر انواعه من الاغشاب الطبية تنفع من السل والربو ونفث الدم وقروح الفم واللثة

٢٤٨١٠ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨١١ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

٢٤٨١٢ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨١٣ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

٢٤٨١٤ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨١٥ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

٢٤٨١٦ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨١٧ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

٢٤٨١٨ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨١٩ - لَزِيُوسْتَرُومَه  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . ونبته نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتحارة ثم ترتقي الى سطحها . بكتيناته كروية الشكل ، نخيلة ثم . يوبتاته فضية او مرديلة || له نوع واحد يدعى لزيوستروم الاجاص (Lasiostroma pitorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرحها ويفغها .

٢٤٨٢٠ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨٢١ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

٢٤٨٢٢ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة ، اطليا .

ازهارها طرفية التجميع صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال فصل الشتاء .

٢٤٧٩٦ - لَزَانُ مُسْهِل  
Cytisus purgans (S).

Cytis purgatif (F).

نوع من اللزان الطبي البري الميزبول . مجته تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة بسيطة ، فصلها لسن الصفحة البحرية اللون . ازهارها الی الصفرة . يزورها وجنورها مسهله || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٩٧ - لَزِيُودَرْمَه  
هي الثخيرة القانصة ، اطليا .

٢٤٧٩٨ - لَزِيُودَرْمَه  
Visqueux (F). Viscous (E).

ما به لزوج اي تملط وتمدد وودك يعلق باليه ونحوها .

٢٤٧٩٩ - لَزِيُودَرْمَه  
Viscosité (F).

٢٤٧٩٩ - لَزِيُودَرْمَه  
Viscosity (E).

٢٤٧٩٠ - لَزِيُودَرْمَه  
Emplâtre (F). Plaster (E).

دواء يلزم الجرح او الصدع حتى يبرأ .

٢٤٧٩١ - لَزِيُودَرْمَه  
Luzula (S).

Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasenbrotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Giunco peloso, G. secco (I).

جنس نباتات عشبية رية مرعوية علفية معمرة من فصيلة الاسيايات . انواعها المعروفة ٢٥ ، اعطائها البلاد الممتدة الحرارة من العالمين القديم والجديد . جذورها مذادة . سوقها فردية متعينة . اوراقها متعاقبة صفصية ، فصلها خلي البثرة ، مهذب الحافة ، غير المواج . ازهارها عثكولية التجميع ، طرفية الانتكاز . ثمارها حقية . تستعمل لتثبيت الأراضي الجبلية المنحدرة التي يخشى عليها من انجراف التربة .

٢٤٧٩٢ - لَزِيُودَرْمَه  
Falco erythropus (S).

Kobez (F). Red-legged falcon (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الصيد والشنق . عدد افراد سرها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي صغيرة القدر ريمه القامة طولها يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . اناؤها نمر . مناسرها ويحفن عيونها وسيقانها الى الحمرة . ذكورها سمى الرووس والاعتناق والصدور . اناؤها سمى الرووس والصدور || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واشكالها . تدفن في الاشجار العالية . اناؤها تضع من ٤ الى ٦ فئات تحضنها اربعة اسابيع || اعرف انواعها ما يلي .

٢٤٧٩٣ - لَزِيُودَرْمَه  
Falco erythropus amurantus (S). Kobez oriental (F).

نوع من اللزريق يحوم الشرق حتى روسيا ويستقر خسة شهور في الحبشة او مصر والسودان حيث يدفن ولكنه ويبيض .

٢٤٧٩٤ - لَزِيُودَرْمَه  
Falco erythropus vespertinus (S). Kobez vespéral (F).

نوع من اللزريق يحوم آسيه الصغرى واروبه ويستقر نحو خسة شهور بين جبال الاطلس والسنغال حيث يدفن ولكنه ويبيض .

٢٤٧٩٥ - لَزِيُودَرْمَه  
Nerita (S).

Néríte (F). Nerita (E).

جنس حلازين بحرية من اللزريقيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها قبيعية الشكل موطنها بحار وشواطئ البلاد الحساره .



لزولة



لزريق



لزريقه

## ٢٤٨١٧ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْجَبَلِيِّ

Cérinthe retournée (F). هو السرته المغلوبة ، اطبله .

## ٢٤٨١٨ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ

Cérinthe petite (F). هو السرته الصَّغِيرَة ، اطبله .

## ٢٤٨١٩ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ الْمُرِّ

يعرف باسم هَلَى ، اطبله .

## ٢٤٨٢٠ - لِسَانُ الْفَرَّالِ \*

Botrychium (S). Botryche, Botrych, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sfera cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . أنواعه نحو ٢٠ أعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقع الرطبة . تتميز بأكياس يوفها السبيلية لتجميع الباعدة الفتوح .

## ٢٤٨٢١ - لِسَانُ الْفَرَسِ

Langue de cheval (F). هو السفندر اللسان ، اطبله .

## ٢٤٨٢٢ - لِسَانُ الْكَلْبِ \* ، آذَانُ الْأَرْتَبِ ، آذَنُ الْفَرَّالِ

Cynoglossum (S). Cynoglosse, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمرة من فصيلة المحميات . ساقها زياء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها معتقة لسنة . نصلها ذرب الزام الاخير ، حلي البشرة على مسطحين . ازهارها عقودية تتجمع ، متجنوية اللون ، بيض الحمار || يقال ان جميع اجزائها طبية قابضة تنفع الالهاك والمفص . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٢٤٨٢٣ - لِسَانُ الْمُرْمَرِ

هو الكلم ، اطبله . هو الكلم ، اطبله .

## ٢٤٨٢٤ - لِسَانُ الْوَحَلِ

Langue de cerf (F). هو السرخس الخزي من النباتات الطبية ، اطبله .

## ٢٤٨٢٥ - لِسْتُوسُ أَزْرَقُ \* ،

Leistus caeruleus (S). Léiste bleu (F). Leistus caeruleus (E).

حشرة قافصة من فصيلة التبريديات ورتبة غدييات الاجنحة تألف الاحراج الغظلية والمواقع الرطبة والجائتان والحدائق . تخافها ويرقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وهوام ||

جسمها صغير اللد يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . فكاهها ذريان . زياتها خيطيان مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهورها متوسط الاحديدا ، مستدير الطرف اللافت ، ثماني التحزيز الغددي . ارساغها خماسية العقول || الاثنى اسنر

قاد من الذكر واهت ثوباً منه واقتصر زياتاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تسافد في ايلول . تتجمع المكن تحت الجلالة والطعالب والعليل ||

البرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مداسي الروابج . ثوبها الى السمره ، رأسها وشرجها ورواجبها الى السواد الفحمي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيث عودوي الغور تحفره البرقة على غق ٥ او ٦ سم .

والطحال والكل وحرقة البول والنزف شرباً والاورام غلاه والقروح غداً ، وتمنع الصرع وداء الفيل || اشهر انواعه ما يلي .

## ٢٤٨١٠ - لِسَانُ الْحَمَلِ السِّيَافِي \* ، آذَانُ الْكَبْشِ

Plantago lanceolata (S). Plantain lancéolé, Oreille de lièvre (F). Great ben plant, Rib-grass, Ribwort (E). Spitzwegerich (D). Plantagine lanceolata, Lingua di botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول . أوراقه سنانية لسنة . ازهاره الى البياض التيبي . منافعه الطبية عديدة كمنافع رفاقه .

## ٢٤٨١١ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْقَرْنِيِّ ، قَرْنُ الْأَيْلِ

Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronope (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschwegerich (D). Plantagine corno di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول ، أوراقه سنانية مستطيلة ملتفة المختار او منمقفة . ازهاره الى الصفرة الباهتة . منافعها الطبية منافع رفاقه الا ان مادته العنصرية اقل فعالية .

## ٢٤٨١٢ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ \* ، لِسَانُ حَمْدِ ، لِسَانُ الْكَلْبِ ، مَصَّاصَةٌ

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentinervi (I).

نوع من لسان الحمل وهو مبدول في المواقع الرطبة . أوراقه بيضية النصل ، مقنطرة القاعدة ، مستطيلة العنق ، بحرية الخصار . ازهاره الى الصفار الاخير . بزوره دقيقة ترغب فيها المصابير . وهو من النباتات الطبية ، أوراقه الخضر تنقد في التزييف والحروق والكدمات والحمره . تقطير قه الزهرية ينفع العين . وعصيره خلائص لحرارة ملطف للحموضة مفاد للذغ الهوام والحشرات .

## ٢٤٨١٣ - لِسَانُ الْحَمَلِ الْمُتَوَسِّطِ \* ، مَصَّاصَةٌ صَغِيرَةٌ

Plantago media (S). Plantain moyen, P. bâtard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبدول ، ازهاره وردية اللون . أوراقه قابضة مجففة تقصد في الجراح المزمنة والحمية . واذا أكلت مطبوخة بخل ويلى أذات في قرصة الامعاء والالهاك المزمن . والمضغفة بملي أوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . واحسائل عصيره في صوة يشفي قروح الرسم والروبويا التي تسيل منه (الانطاكى) .

## ٢٤٨١٤ - لِسَانُ الْحَيَّةِ \* ، نَقِيعَةٌ

Ophoglossum (S). Ophoglosse, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري معم من السراخس ، صغير اللد يملو نحو ٣٠ سم . أوراقه عادية العروق . يتكرر في المناطق والمواقع الرطبة . جذوره طبية تلم الجروح وتقيد الكسح .

## ٢٤٨١٥ - لِسَانُ الْفَصْبِ

هو شوك فرياس ، اطبله .

## ٢٤٨١٦ - لِسَانُ الْعُصْفُورِ

اسم شائع لا يجوز اعتاده لانه يطلق على عدة نباتات مختلفة انحصها الدردار والمران والعائق والسرته .



لسان الحمل السنياني



لسان الحمل الكبير



لسان النزال

لسان الحية



لسان الكلب



لستوس أزرق



الاستوائية || نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال . ازهارها سبلي الجميع . ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الالوان ، جميلة الألوان الزاهية . ثمارها نووية || اشهر اجناسها اللسيتم .

٢٤٨٣٤ - **لَسِيَّاتٌ** هي العلوك الفرنسي ، اطلبه .

٢٤٨٣٥ - **لَسِيَّاتٌ** Ligule (F). Ligula (E).

هنا في ورق النجيليات بين فصل العصفه ونحوها .



لَسِيَّاتٌ

٢٤٨٣٦ - **لَسِيَّاتٌ** Actinella (S). Actinelle (F).  
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها عريفة الرائحة مرة الطعم . اوراقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والقسيمة والجمالية . ازهارها صفراء اللون رؤيساتها الزهرية عديدة اللسينات ، تحترق عريانة . بذورها مدببة الشذور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **لَسِيَّاتٌ** Lingula (S).

Lingule (F). Lingula (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل وفصيلة اللسينات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المغمورة وبالنباتات البحرية || اصداؤها متساوية المصارع ، يفيضة الشوزن ، مستطيلة مسطحة ، مقطوعة الرأس ، مدببة العقب . مفصلاتها عادمة اللسيتين . لواقطها كثيفة الملب الناعم اللدقيق .

٢٤٨٣٨ - **لَسِيَّاتٌ حَطْبِيَّةُ الْوَرَقِ** Actinella linearifolia (S). Actinelle à feuilles linéaires (F).

نوع من اللسين المحول . ساقها منتصبة فروعها تحمل من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها بسيطة خطية النصل . رؤيساتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لسينات اهليلجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **لَسِيَّاتٌ كَبِيرَةُ الزَّهْرِ** Actinella grandiflora (S). Actinelle à grandes fleurs (F).

نوع من اللسين المعمر . ساقها مزهرة اللحاء منتصبة تحمل من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها ريشية مشرفة . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد ، يراوح قطرها من ٨ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .



لَسِيَّاتٌ

٢٤٨٤٠ - **لَسِيَّاتٌ تَجْمِيَّةٌ** Actinella scaposa (S). Actinelle acule (F).

نوع من اللسين المعمر العادم الساق . اوراقها جذعية الاثركار ، غنية الجميع ، مساوية النصل . رؤيساتها الزهرية مستطيلة اللسينات المتعقبة الى الخارج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **لَسِيَّاتٌ** Linguleae (F).

Lingulés (F). Linguleae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل اللاعضلية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها مسطحة كالسنان ملتصحة باصداؤها بسويقات طينية مسطحة قابلة الانحطاط || اشهر اجناسها واعرفها اللسينة .

٢٤٨٢٦ - **لَسِيَّاتِيَّةٌ** Lasthenia (S). Lasthénie (F).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فروعها تحمل من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة سنائية النصل . ازهارها رؤسية الجميع . ثقاتها قلافتها ملتحمة تشكل اقلاماً احفناً مؤلفة من ١٥ سناً . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٢٧ - **لَسَدٌ** Téter (F). To suck (E).

رضع . يقال لسد الظل امه ولدتها : رضع جميع ما في ضرعها .

٢٤٨٢٨ - **لَسَعَةٌ** راجع لدغة .

٢٤٨٢٩ - **لَسِيَّتُسٌ** Licin (S).

Licine (F). Licinus (E).  
جنس خنافس جاسة مفترسة من غديات الانجحة وفصيلة اللسنيويات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ م . يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اغمارها لاحقة ، مخددة ومحببة . اولها الى السواد الفحشي او الكستني الاسمر الاسفع || تعيش تحت الحجارة او في انفاق تحفرها قرب جذوع النباتات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتله من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٣٠ - **لَسِيَّتُونِيَّاتٌ** Licinidae (S).

Licinidés (F). Licinidae (E).  
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غديات الانجحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليلجية الشكل . رؤوسها بحرية . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . اغمارها لاحقة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازهارا لامتدالة وغالباً مشروبة . جوارسها ثنائية الفلق المخجنة . تأثيرها قصيرة وشقيحة . ملاسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها اللسنوس .

٢٤٨٣١ - **لَسِيَّتُونِيَّاتٌ** Phaneroglosses (S).

Phanéroglosses (F). Phaneroglossa (E).  
مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، عديمات الذنب ، تشمل على اثنين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تشتمع بوجود الفلق المخجنة . لمتاعها الخبيثات والوقسيات .

٢٤٨٣٢ - **لَسِيَّاتِيَّةٌ** Lacistema (S). Lacistème (F).

جنس نباتات حرجية من فصيلة اللسيتميات . انواعها المعروفة ١٥ اعطائها امريكة الاستوائية . جميعها اشجار وشجيرات . سوقها منتصبة فروعها . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهارها متبلي الجميع ، طرفي الاثركار ومحوري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها نووية لا تؤكل انما يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال الهلي .

٢٤٨٣٣ - **لَسِيَّاتِيَّاتٌ** Lacistemaceae (S).

Lacistémées (F). Lacistemaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق امريكة

إيلاجيا فتيدو زاهية اللون شغافة ثم خضراء زيتونية وتنتهي باللون الاسمر . أما الثآليل المصابة فتفيدو كأنها موشمة بتدو لا تباينة الشكل والحجم تحضيا اللون مختلفة قبل ان تستقر على الاسمر الذي يَحْتَمُ المظاف مع الادراك .

#### ٢٤٨٥٣ - لُصْفُ الْعَلَقِيَّ ، لُصْفُ الْعُوسَجِ \*

Elsinoe veneta, Plectodiscella veneta, Gloeosporium venetum, G. necator, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du framboisier, A. des ronces (F).  
وصم يصيب العوسج والعلقي في الفروع والاوراق والثآليل فيؤذيها ويوقع بها الاضرار . سببه فطر مجهري من الفطريات . مظهره الخارجي يقع حراء اللون او بنفسجية ، قطرها من ٣ الى ٥ م . تركيب الاضرار فتعطيها وتركيب الفروع قشورها ، أما الثآليل فتمحصرها || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلول ١ ٪ في اوائل الربيع .

#### ٢٤٨٥٤ - لُصْفَةُ CATAPLASMA

هي البليحة توضع على مكان الألم من الجسم .

#### ٢٤٨٥٥ - لُصُوفُ GLOEOSPORIUM (S).

جنس تطور مجهري من فصيلة الرغيفيات . انواعه عديدة معظمها مؤلف || مشجيه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتجمع ويتحول الى ريشة تقوم عليها الكائنات . قصباته قرصية او سرغولية . بويقاته وحيدة الخلية ، شغافة ، مستطيلة ، مستقيمة او منعققة || وصم متفاوت الاضرار والأذى يمتري الاوراق والثآليل والانفاد || اعرف انواعه ما يتبع .

#### ٢٤٨٥٦ - لُصُوفُ الْإِسْبَاحِ \*

Gloeosporium spinaciae (S).  
فطر مجهري تركيب اوراق الاسباح فيؤذيها ببغض البقع المستديرة المتلاصقة السمراء اللون التي تشوها وتثني في قيسها التجارية || يكافح باستعمال احد مركبات النحاس .

#### ٢٤٨٥٧ - لُصُوفُ الْيَنْ \* \*

Gloeosporium coffeanum (S).  
فطر مجهري تركيب اوراق البن فيؤذيها ويصيب الانفان فيقرحها || مظهره على الاوراق لعل حطية اللون مستطيلة تركيب حافة النصل فتقضي على خلايا النسج الادمية . وهو على الانفان قروح مستطيلة سمراء اللون تعطب اللحاء وتحيها || يكافح بالقطع الاضواء الموصومة وينضخ الاشجار عدة مرات ببغض السوائل المركزة على املاح النحاس .

#### ٢٤٨٥٨ - لُصُوفُ الْبَنْدُورَةِ \*

Gloeosporium phomoides (S).  
فطر مجهري تركيب ثمار البندورة عند اقترابها من الادراك . يبدو كالبقع الحطية او السمراء اللون يسببها مشج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى انصداها الذي يعقبه شيء من الحريان || يكافح باستعمال احد الفوطاير المركزة على الكبريت والنحاس .

#### ٢٤٨٥٩ - لُصُوفُ الْجُزْرِ \*

Gloeosporium epicarpi (S).  
فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيعطيه . مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل طحلاء اللون سمراء الحالة تركيب لباب الشرة . فان حصلت الاصابة في اثناء النمو اطاحت بالثمرة وان وقمت قرب الادراك سببت عفن اللباب || اغزارها غالبا محدودة لا تستوجب المكافحة لانها لا تفوق ٣ او ٥ ٪ .

#### ٢٤٨٤٢ - لُصْفَةُ الزَّهْرِ Liguliflores (F).

فنة من فصيلة المركبات .

#### ٢٤٨٤٣ - لُصْفُ اللش هو السباق او ثمره .

#### ٢٤٨٤٤ - لُصْفُ Echenels (S).

Echénéide, Rémora (F). Sucking fish, Remora (E).  
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الشكاليت . انواعه نحو ١٠ اقسامها مستديرة ، طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم . تتميز برووسها المكلفة بمجناات بيضية الشكل محدودة شاملة تمكثها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريد ا . وهي تلتصق بالحوت والبال والدلفين واللبانة والبلواخر .

#### ٢٤٨٤٥ - لُصْفُ انخضاب \*

#### Homochromie (F). Procrapsis (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكثها من الانخضاب بلون الاشياء التي تحيط بها .

#### ٢٤٨٤٦ - لُصْفُ Oxyria (S).

Oxyrie (F). Oxyria (E).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الطيلباطيات . منبتها جبال حوض البحر الابيض المتوسط .

#### ٢٤٨٤٧ - لُصْفُ Lachenalie (F).

هي الزيجيل من الزنايق ، اطليه .

#### ٢٤٨٤٨ - لُصْفُ Zygote (F). Zygote (E).

دور التطور الميوزي الذي يتميز بتلاصق النصب المتشابهة .

#### ٢٤٨٤٩ - لُصْفُ Fluorescence (F).

خاصة تمكث بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تلتقها الى اشعة ضوئية اطول موجة .

#### ٢٤٨٥٠ - لُصْفُ Câprier commun (F).

هو الكبر الشالك وهو ثمر الكبر .

#### ٢٤٨٥١ - لُصْفُ الثَّفَاحِ وَالْإِجَاصِ \*

Elsinoe piri, Plectodiscella piri, Sphaceloma, Phyllosticta rosarum (S). Anthracnose du pommier et du poirier (F).  
وصم يصيب الثفاح والاجاص والسفرجل في الانفان والاوراق والثآليل . سببه فطر مجهري من الفطريات || مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد منتشرة بدون ترتيب على نصل الاوراق ولحاء الانفان وبشرة الثآليل . وهذه البقع التي يبلغ قطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة مستديرة حراء اللون تتوسطها نقطة بيضاء || يكافح باستعمال احد الفوطاير النحاسية .

#### ٢٤٨٥٢ - لُصْفُ الخُصْفِيَّاتِ \* \*

Elsinoe fawcetti, Sphaceloma fawcetti, Sporotrichum citri, Cladosporium citri, Sphacelia citri (S). Scab des agrumes, Maladie des verrues (F).  
وصم يصيب اكثر انواع الحمضيات في اغنابها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على النواحي الفتية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة ستيفراد . لذلك فهو نادر الوجود في اقليم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تملو نصل الاوراق الفتية عند



لشك



لصف التفاح والاجاص



لصف الحمضيات



لصف البندورة

## ٢٤٨٦٠ - لُصُوفُ الزَّيْتُون \* ٥

*Glœosporium olivarum* (S). Lèpre des olives, Gaffa (F).

فطر مجهرى يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر أيلول، تركب الثآليل فيشوها ويغطيها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فتسبب انخفاض السطح ثم انصداع البشرة وغمرها بمادة لزجة رتقالية تنحرف إلى السمرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال أحد الموائل النحاسية.

## ٢٤٨٦١ - لُصُوفُ القُرَيْبَاتِ ٥

*Glœosporium caulivorum* (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية إحصاء النفل والبرسيم والقصبة والعرن || يركب السوق ومعاليق الاوراق فيشوها بقع حطية ثم سمراء اللون تصلع البشرة بعد ارتفاع النسج وانفلاته || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١٪ بعد تغيير موقع الزراعة.

## ٢٤٨٦٢ - لُصُوفُ الكَرْمَةِ \* ٥، سُودِيدُ الكَرْمُونِ

*Glœosporium ampelophagum* (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهرى يتطفل على الاوراق والسروع والمناقيذ فيغطيها ويوقع بها اشد الاذى || مظهره الخارجي بقع صفيرة، مستديرة، لا قياسية التجميع، تركب نصل الاوراق. تبدو حطية، قطرها من ١ إلى ٤ م. ثم تتسع فينحرف لونها إلى البياض الاغبر تحمقه حالة فحمية السمرة بتفحجية المراج، تقضي على النسج النشارة فتفونها وتغتها || وهو على السروع يقع مستطيلة مبيضة تركب اللحاء فتحرقها وتغور فيها حتى الشكبر والمكالك || وهو في المناقيذ يقع مستديرة منخفصة تركب الحب فتبدو حطية اللون مبيضة تكثر في المنطقة الهامية ثم تتسع فينحرف لونها إلى السمرة يحيطها اطراف ضيق اسود || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلو من ٢٪ ٣٪ او السائل البورغوني المخلو ٢٪. ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصومة.

## ٢٤٨٦٣ - لُصُوفُ اللُّوزِ ٥

*Glœosporium amygdalinum* (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهرى يصيب اللوز في اثنائه واوراقه وتماره. يبدو على الثآليل فروج لمولوية مستديرة، حطية اللون تلوح بالزئبق ثم تنخفض وتغور إلى الداخل || وهو على الاذنانش شحج يمرح تحت اللحاء ثم يحف على حين غرة قبل اكتمال نمو الاوراق || وهو على الاوراق يثور مبيضة سمراء اللون تجف وتنتح بسرعة || يكافح باستعمال سائل بورديو او أحد الموائل السلفوكسية.

## ٢٤٨٦٤ - لُصُوفُ اللَّيْمُونِ \* ٥

*Glœosporium limeticolum* (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهرى يركب بعض انواع الليمون إحصاء الليمون الحلو والنازيح || يبدو على نواحي الاذانان بقع حطية مستطيلة يقابلها على نصل الاوراق بقع شديدة الخضار الاسمر تغفن النصل وتقوده إلى الذبول فييبس مع الاذانان. ويركب الاذانان فيطوح بها. ويصيب الثآليل فيشوها ويوقف نموها بعد ان يوثها بنقط حطية اللون تكلف القشرة وتغور فيها || يكالغ باستعمال سائل بورديو المركب ٥/٣٪ من بفضات اليه ١٪ من الزيت قبل الاذانان وبمد الانعقاد.

## ٢٤٨٦٥ - لُصُوفُ المَطَاطِ ٥

*Glœosporium alborubrum* (S). Anthracnose de l'hévéa (F).

فطر مجهرى يصيب المطاط في اوراقه وجذوعه فيؤذيه اشد الاذى || مظهره على الاوراق الفتية بقع كبيرة لاقياسية الشكل، لونها إلى الكهية يملو مواج زري. وهو على الاوراق البالغة يقع فحسية صفراء اللون ثم حطية توسعها نقط سود تقضي على الاوراق فتعطيها || وهو على الجذوع اطلع مستطيلة يغطيها بقع غبراء اللون، قطرها ٣ م. تسبب تغفن اللحاء واسوداها ثم انصداع البشرة ووثل النسج مع العصارة || يكافح عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وانه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النمو الخضرى فتدوّن انتشار الروص.

## ٢٤٨٦٦ - لُصُوفُ المَوْزِ ٥

*Glœosporium musarum* (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهرى يصيب الموز في ثماره النامية وللدركة فيغطيها مظهره الخارجي بقع مستديرة او مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تغور فيها فتعطب اللب || يكثر في المواتع الرطبة الحارة. يكافح عند ظهوره باستعمال الفوطاير المركزة على الاملاح النحاسية.

## ٢٤٨٦٧ - لُصُوفُ بَخْشُورِ مَرَمِمْ ٥

*Glœosporium cyclaminis* (S).

فطر مجهرى يركب الاذانار يركب نواحي فيشوها او يذويها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب التوبج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتفترقه وتحمته. وهو على الاوراق يقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتعمرجه ووثل فيه حركة التبادل التنسي || يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المركز ١٪.

## ٢٤٨٦٨ - لُصُوفُ صُفْيَافِي ٥، هُو الدالين الايش، اطليه.

## ٢٤٨٦٩ - لُصَامَةٌ

*Indehiscence* (F).

*Indehiscence* (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تنلق تلقائيا عند الادراك

النام.

## ٢٤٨٧٠ - لُصِيمٌ

*Indéhiscant* (F). *Indéhiscant* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة او بذرة لا تنلق تلقائيا

أي طوعيا عند الادراك النام.

## ٢٤٨٧١ - لُطْ ٥

*Lecythis* (S).

*Lécythis, Marmite de singe, Quatèl* (F). *Monkey*

*pot tree, Sapauia-nut tree* (E). *Topfbaum* (D).

*Maudorlo della Colombia* (I).

جنس اشجار وشجيرات من اللبليات وفصيلة الآسيات. انواعه

نحو ٥٥. جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية

والامريكية. اوراقها متعاقبة معقنة اهليلجية. ازهارها

تاجية. ثمارها جراء عليه مستطيلة مبيكة الجوانب. سداداتها

قلنسوية تنفتح من فوق تحوى عدة بذور مرة الطعم تأكلها

القرود وتستعمل في بعض العلاجات الصدرية.

## ٢٤٨٧٢ - لُطْ ٥


*Lota* (S).

*Lotte* (F). *Eel-pout* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القادسيات. انواعه قليلة

تألف السمكيات وبياء الانهر الراكدة. اجسامها تطول

من ٣٥ إلى ٧٥ سم. حاشتها صغيرة دقيقة لزجة. اثوابها



لُصُوفُ الزَّيْتُون



لُصُوفُ الكَرْمَةِ



لُصُوفُ اللَّيْمُونِ



"لُطْ"



"لُطْ"

متعاقبة منعقة كاملة اهليلجية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن لحاء السوق مادة خضابية صفراء اللون . ازهارها خاسية والفصل والبيلات ، عديدة الاسدية ، ثمارها عنبية ، صغيرة القدة ، ملونة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطَّر الصَّبَاغِين (S). *Symplocos tinctoria*  
 Symplocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).

نوع من اللطر السورتي . مهدد البلاد الامريكية . ثمرته تملو من مَرَيْن الى سبعة امتار . افانها وافانها الى الصهبة . اوراقها عابلة ، نصلها شبيك الصفحة سكري الطعم . ازهارها ضمية التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازهراره يستمر طوال شهر نيسان .

٢٤٨٨١ - لُطَّر اليابَان (S). *Symplocos japonica*  
 Symplocos du Japon, Lotur du Japon (F).

نوع من اللطر الزبني مهدد اليابان . ثمرته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها ابيدة مألسة . ازهارها عقودية التجميع ، لونها الى الصفرة الباهتة . ثمارها حراء اللون . ازهراره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطَّر عَشْكَوِيّ (S). *Symplocos paniculata*, *S. crataegoides* (S). *Symplocos paniculata*, *Lotur paniculé* (F).

نوع من اللطر السورتي . مهدد الشرق . ثمرته تملو من ٤ الى ١٢ م . ساقها فراء . افانها زباء . اوراقها عابلة ؛ نصلها مسن الحافة ، خلي البشرة على صفحته السفلى . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها الى الالبيش او الاسفر . ثمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى الزرقه || ازهراره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطَّر عَشْكَوِيّ (S). *Symplocos en grappes*  
 هو الراكب يستخرج منه مادة قلبية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطَّرِيَّات (S). *Symplocaceae* (F). *Symplocaceae* (E).  
 فصيلة نباتية كانت في التصنيف الماضي سبطاً مسن الاصطركيات . اشهر اجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لَطِيَّات (F). *Lécythidées* (F).  
 سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بخلوها من الجيوب الانفرازية .

٢٤٨٨٦ - لَطِيَّيَّة (S). *Lepas* (S). *Lépas*, *Anatifé* (F). *Lepas* (E).

جنس دوبيات بحرية ونهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفصيلة اللطيسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار وانهر العالم || اجسامها صغيرة . عيونها مزودة . الحفها خاسية القطع . ارجلها الصدريه هداية . جميعها تتعلق بانابيب كلسية المادة تشبه التوالز تشيدها على الصخور المغفورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاغشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لَطِيَّيَّات (S). *Lepadidae* (F). *Lepadidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . اجناسها قليلة العدد اما انواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعاليلها التي تنشب في كل شيء . معمر من الصخور الى الاصماك .

الى الصفرة تعلوها زراكلش مخلفة . سماء اللون . تسرا في الشتاء من كانون الاول الى شباط || لحدها جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه .

٢٤٨٧٢ - لُطَّ بَحْرِيّ مَبْدُول (F). *Lotte de mer vulgaire* (F).

سمكة بحرية تدعى كواحة مبدولة ، اطلسيا .

٢٤٨٧٤ - لُطَّاس (S). *Molothrus* (F). *Molothre* (F).

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ جميعها من طيور القارة الامريكية . تألف السباب والمراعي وضفاف مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجمعاتها لاقامية العدد منها الفوج ونها السرب || اجسامها تطول من ١٧ الى ٢١ سم . مناقبها محروطة ، صغيرة وقوية . اجنتها معتدلة الطول . افانها مستديرة الاطراف . ارساغها معتدلة الارتفاع . اثليلها متباينة التخفيف . لانها اصفر قدماً من ذكورها وابنت خضابي . وهي لا تحسن البيض بل تقسمه في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضتين . يرجع انها تبيض في موسمها المحلي من ١٢ الى ١٤ بيضة || قوتها الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف انواعها واشهرها لطاس المشايه .

٢٤٨٧٥ - لُطَّاسُ المَاشِيَةِ (S). *Molothrus pecoris* (S). *Molothre des troupeaux* (F). *Cowbird* (E).

ماطر من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات امريكا الشمالية . يآلت المراعي وضفاف مجاري الماء . فوجه يمد من ٥ الى ٤٠ زوجاً || جسده ريش القوام يطول نحو ١٨ سم . ثوبه اسود اللون يعلو موج ازرق في الظهر والصدر . حافة عينه سوداء . مناقده ورساغ الى السرة السوداء . الاثني عادية الموالج الارزق || اخلاقه مرسة ، هنيئة . قوته الحشرات وبعض البذور البرية . يرافق قطمان البقر والبيسون فيجمع على ظهورها ويقضي على الاساريع والكرزود التي تكثف جلودها || الاثني تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير .

٢٤٨٧٦ - لُطَّحَاتِيَّات (F). *Dématiées* (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الككتيات . تتميز ببوغها الملون الشديد السمرة || اجناسها ثلاثة : الحشف والزرمية والشالطة .

٢٤٨٧٧ - لُطَّحِيَّات (S). *Dematiaceae* (F). *Dematiaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحفانيات ورتبة الزرميات . تتميز ببوغها وكثافتها السمره اللون ، ببوغها ثنائية الخلية ، شبيها فوعي الدؤل || اجناسها عديدة تجمعها اربع عمارات : الفخيات ، الريدانيات ، الزحاميات والزناخيات .

٢٤٨٧٨ - لُطَّحَة (F). *Macule* (F). *Macule*, *Stain*, *Spot* (E).

٢٤٨٧٩ - لُطَّر (S). *Symplocos* (S). *Symplocos*, *Symploque*, *Lotur* (F). *Lohd tree* (E). *Lotbaum* (D). *Simploco* (I).

جنس اشجار ونجيليات برية ويزينية من اللطريات . انواعه نحو ١٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها



لُطَّاسُ المَاشِيَةِ



لُطَّر



لُطِيَّة

الطول . ميناها صغيرتان ، ناشرتان . زباناها دقيقان  
كوسلها في الشكل . حنيتها صغيرة . حنيتها ظهورها  
ممشتان بالأحر والاسمر . ظهرها رمادي اللون ، اصفر  
العروق . روثها شفافان . بطنها الى الخيطي الاسمر .  
يطوقه حثار مصدف . قوائمها نسيطة ، حنطية ، سمر  
المزاج || تألف المروج والحقول والبساتين . قوتها ثلاث  
الازهار والاوراق الفتية .



لغوم

Lagopède (F).

٢٤٩٠٢ - لَغِيد

هو الغد ، اطلبه .

٢٤٩٠٣ - لَغِيرِيس الرُّقُوقِ

Lyris du prunellier (F).

فراشة مزودة مشهورة باسم ارقية الخوخ . اطلها .

Lagostome (S).

٢٤٩٠٤ - لَغُسْتُوم

Lagostome (F).

حيوان لين قاضم سجد الجنس والنوع من فصيلة الششليات.  
موطنه فياني امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول  
من ٥٠ الى ٦٠ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل .  
رأسه عريض القامة . مقضه قصير مقطوم . سباله  
كثيفة الملب الجامد . اذناه معتدلتان بارتان . جرمزه  
الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية  
الاصابع . اطافوه قوية حادة || جحره فصح الجرايم  
تألف من اربع رداء متراكبة فوق بعضها . مدخله ومخارجه  
اتفاق عديدة تمررها دهايز متصالية ، تتجمع فيها الاناث  
من ١٠ الى ٢٠ يحافظ عليها ويحميها ذكر واحد || قوته  
الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية ينقلها الى مدخل  
جحره || يعيش جماعات كبيرة العدد . تبلغ مساحة  
قوته في بعض مناطق الارغواي نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لغوريش

٢٤٩٠٥ - لَغَلُغ

هو اللغلق الاسود ، اطلبه .

٢٤٩٠٦ - لَغُو

هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - لَغُورِيش

Lagothrix (S).

Lagothrix (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السيميات موطنها البرازيل  
والغويان وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم .  
واذناها كذلك . التواها الى الكفة السوداء المزاج . شمارها  
ناعمة لينة وثيرة || له نعان يألان الغابات والاحراج  
الجبلية . قوتها النار .

٢٤٩٠٨ - لَغُورِيسَا

Lagoecia (S). Lagoecia (F).

نبات عشبي بري طبي من السكيات . يعلو نحو ذراع .  
اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللون . ازهاره خيمية  
التجميع لوها الى الزرق . زروره طيبة وهي دقيقة مستطيلة  
حنطية اللون مرة الطعم حريقة تغيد الصدر وتقي البلغم  
وتقضي على الرياح والمفسد .



لغونيا

٢٤٩٠٩ - لُفَّاح

هو اليربوع ، اطلبه . ويدي السابريك . قيل وينسي  
المقد . قال الانطاكي : « وهو يسكن غليان الدم والصفراء  
وحرة البول والخفقان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن  
الفرقان مطلقا وكذا الصداع دلاء . ويسبب فيمنع السهر  
والقلق » .

٢٤٨٨٨ - لُعَاب ، لَعَم ، لُعَام

Saliva (F).

Saliva, Spit (E).

اللعب واللعلم غليط حاصل من افراز اللعاب اللعابية  
والخاطية للفق . وهو نوعان : اللعاب التكني او المضفي  
واللعاب اللبني . أما اللعاب اللعابية فهي على ثلاثة انواع :  
التكنية والفكية واللسانية || أما اللعاب فهو زبد الجمل  
يقذفه من فيه .

٢٤٨٨٩ - لُعَابَات

Racines de mandragore (F).

Roots of the mandrake (E).

جذور الفلاح غواصها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - لُعَادَة

Ethologie (F). Ethology (E).

درس حياة احيوان ونشاطه الجسموري والخلي في محيطه  
الطبيعي .

٢٤٨٩١ - لُعَاعَة

Légume tendre (F).

New green (E).

كل نبات لين من احرار البقول . واللعاعة ايضا ج لعاع .  
وفي القول المأثور « انما الدنيا ساعة وبتاعها لعاعة » اي  
قليل البقاء كالنبت اللين .

٢٤٨٩٢ - لُعَل ، يَأْفُوتِ أَحْمَر

Rubis (F). Ruby (E).

حجر كريم من الالوين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة  
الصنائية الزاهية . اجوده ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - لُعَل

هو الماليزيه ، اطلها .

٢٤٨٩٤ - لُعْلَاع

Réfringent, Refracting (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما تحل بخاصية كسر الاشعة  
الضوئية اي تغير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - لُعْلُعَة

Réfringence (F).

Refringency (E).

العلمة خاصة تتميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للامعة  
الضوئية .

٢٤٨٩٦ - لَعَم

Saliva des reptiles apodes (F).

Saliva of apodous reptile (E).

اللعم لعاب الزحافات المرقاة أي العادة الدرجل كالحيات .

٢٤٨٩٧ - لَعَوَة

Chienne (F). She dog (E).

هي الكلبة ينهم من خصها بالكلية الخائل . قالت العرب :  
أجوع من لوعة وأضيق من لوعة .

٢٤٨٩٨ - لَعُوس

هو الذئب ، اطلبه .

٢٤٨٩٩ - لَعِيث

Lablé (F). Labiate, Lipped (E).

نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مغلوقة التويج كالشفتين .

٢٤٩٠٠ - لُعَارِيَمَة ، لُوعَارِيَمَة

Logarithme (F).

Logarithm (E).

علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - لُعَاس المُرُوج

Lygus pratensis (S).

Lygus des prés (F).

حشرة غاصلة من فصيلة الصمغيات . جسمها صغير القد  
يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشفحة والصفرة وشمشج  
ابيض واسمر وأحمر . رأسها صغير محرم . عظمها معتدل

وهو على الدرنات وشاح اسمر اللون يلحف البشرة بكاملها او يجزء منها فيعطها ويتلفها || يكافح باستعمال احد الفواطير الحديثة او محلول بوردو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو  
كلس حراق ٣ كيلو  
مساء ١٠٠ لير

وبهم من فصل محلول || يورفينين || المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو  
كربونات الصودا ٣ كيلو  
مساء ١٠٠ لير

### ٢٤٩١٨ - لَفَّاشَةُ التَّبَعِ \*

Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).

وصم يسببه فطر مجهري يركب التبغ في المثلث وفي الخلل. مظهره الخارجي على شتول المثلث يبدأ باسوداد وقطع السخن والجذور ثم ينتهي بالمريان والاضمحلال || وهو على شتول الخلل، في اول عهده ، بقع تظهر على الاوراق بيضيه الشكل ، لا قياسية الحجم . لكنها اشد اخضراراً من النسيج الذي يحوقها ثم يتحول تدريجياً الى الشقرة فالصبغة السوداء ضمن إطارات خفيفة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويعطب السوق ويسبب اسودادها من السخن وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتل المصابة يلو مكاها جافاً متفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المثلث باستعمال الفواطير المركزة على النحاس او الزنك ويكافح في الخلل باجتناوب الزراعة في المواعيد الربطية .

### ٢٤٩١٩ - لَفَّاشَةُ الشَّمْسِ

Coup de soleil (F). Sun scald (E). عارض يصيب لحاء الاشجار في خلايا نسيجها البشورية والوعائية سببه اشعة الشمس المحرقة التي ترشفها وتستوعبها قسراً لحاء السوق الممرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فجأة فيعطها ويسبب يباسها || يكافح بطسلي السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

### ٢٤٩٢٠ - لَفَّاشَةُ الصَّبَارِ ، لَفَّاشَةُ النَّفَمِ

Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des semis du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingsfäule (D).

وصم مؤق يسببه فطر مجهري يركب مختلف النباتات اللحمية وشاتل النباتات الحرجية ويمتري النجم بعصفه فيضيمه . مظهره الخارجي بقع شقر ثم سمر ، لا قياسية الشكل والحجم تقلب فيها الأسطالة ، تنعقب بالنسج فتضيق || يكافح كثيره من فطور اللعنة بمركبات النحاس او الزنك .

### ٢٤٩٢١ - لَفَّاشُ ، نَفَّاشُ \*

Distichodus (S). جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيله السلونيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملاحظها عديدة ، اعطائها مقلطحة . سهنها صغير القد مبراش الطرف . اثمار انواعه لفش التيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثوبه الى الخضار الغني المواج .

### ٢٤٩٢٢ - لَفَّالُونَ

Cuscute (F). هو الكشوث . اطلبه .

### ٢٤٩١٠ - لَفَّاشَةٌ \*

Salmo salvelinus (S). Ombie, O. chevalier, Salvelin (F). Char (E).

سمكة نهريه بيوض من السلونيات ، اعطائها منظم بحجرات اربوية وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم. ثوبها ، عند اكثال ثوبها ، ثنائي اللون ، ظهرها والقمم الاكبر من جانبيها الى الربعة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبيها الى الصغار البرتقالي يعلو موج ردي يبق عند حافة البطن . اما ثوبها في طور النمو فكثير النقط البيض || لحما فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .

### ٢٤٩١١ - لَفَّالَةُ الْوَرْدِ \*

Blennocampa pusilla (S). Rouleuse des feuilles, Tenthrède des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).

حشرة من الفطريات، جسمها صغير القد اسمر الثوب . ورقاتها مستدقة غبراء اللون تميش على ورق الورد فتلفه وتلتحف به ثم تثروده وتبقى عليه .

### ٢٤٩١٢ - لَفَّالِيَةٌ

Diplolène (F). جنس نباتات جنبيه من السذابيات تدعى عيتة ، اطلبه .

### ٢٤٩١٣ - لَفَّتْ \*

Brassica rapa (S). Rave, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wasserrübe, Weisses-Rübe (D). Rapa (I).

بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . جذرها مستدير الشكل مقطوع ، يؤكل طرياً ومطبوخاً وخلاً ، ومنه ضرب علفية كبيرة تأكلها الحوم والابقار والخنازير || يزود زيتية طيبة تحوي بعض الفسفور والمواد الحريفة المهيجة . وقد شاع استعمالها للانماط منذ زمن القراعة الذين اطلقوا عليها اسم (دمج) اي زر اللفت او زيت زر اللفت.

### ٢٤٩١٤ - لَفَّتْ بَرِّي

Raponce naine (F). هو قتيونه الزوسية ، اطلبه .

### ٢٤٩١٥ - لَفَّتِي

Napiforme (F). Napiform (E). تمت تعريفه وصي يعلق على الجذور القصيرة المستطيلة التي تشبه اللفت .

### ٢٤٩١٦ - لَفَّاشَةٌ

Phytophthora (S). جنس فطور مجهريه من عارة الوصليات وفصيله الصناتيات تتميز بنموها البولية الناجية الارتكاز والتشبب || انواعها عديدة . اشهرها واضرها للاقتصاد الزراعي لفعة البطاطا ولفعة التبغ ولفعة النعم .

### ٢٤٩١٧ - لَفَّاشَةُ الْبَطَاطَا \*

Phytophthora infestans, Botrytis infestans, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).

وصم وخم العاذية يسببه فطر مجهري يمتري منظم نباتات الفصيلة الباذنجانية واعصمها البطاطا والبنندوره || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الاوراق بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو خطية اللون ثم تنحرف الى السمرة يقابلها على صفحة النصل السفلي غبار ابيض فسجالي ، يلو حثار البقع فيحدها ويستقر بعض الوقت الى ان يشمل الذبول كامل النصل فيطوح به .



Pompilus (S). ٢٤٩٢٩ - لِقْ \* ، لِقْهٗ

Pompil, Centrolophe (F).  
جنس حشرات من فصيلة اللقيبات . انواع عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيفاء الجسم تطول نحو ٣ سم . ألوانها الى السواد الامع يعلو تجذيع متعرج احمر اللون او اسفر . تتميز بقتصصها وتغذرها الناكب التي تغذرها في مكائها كغذاء لبنيها الحديث النقب .

Inoculum (F). Inoculum (E). ٢٤٩٣٠ - لِقَاح

الجرثومة النقية الصالحة للتلقيح .

Vaccin (F). ٢٤٩٣١ - لِقَاح ، طْعَم

Vaccine matter (E).  
فوعة محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لوقايته بعد حدوث الشاعة المقصودة .

Eteules, Glanure (F). ٢٤٩٣٢ - لِقَاط ، لِقَاطَة

Gleanings (E).  
ما يخطئه الحاصد من السبليل فتلتقطه الناس .

Colaptes (S). ٢٤٩٣٣ - لِقَاط

Colaptes (F). Flicker (E).

جنس طير من فصيلة التفاريات ورثية المستقلات . انواعه المعروفة ستة جميعها امريكية الملهد الى اجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ الى ٣٠ سم . بسطها تخرج من ٤٠ الى ٤٥ سم . ألوانها الى السمره البهجة والمقرقشة بالاصفر والاحمر والاشهب . تتميز بتناقيدها المستعرضة القواعد وباراسغاها المستطيلة || قوتها الاسراع والديدان والنمل والحشرات والثمار البرية والبيور والبولوط . وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البيوط في تجاويف الاشجار ويحيوها فتون بذلك مؤنة فصل الشتاء || انثاها تدفن في تجاويف الاشجار وفي صدها وتبيض من ٦ الى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طلب القوت بعد التفنن باسبوعين || اشهر انواعه المعروفة :

Colaptes chilensis (S).

Colaptes du Chili (F).

Colaptes mexicanus (S).

Colaptes du Mexique (F).

Colaptes auratus (S).

Colaptes doré, Pic doré (F).

٢٤٩٣٤ - لَقَاعَةُ الْبَقَرِ \*

Hypoderma bovis (S). Hypoderme du bœuf, Varron (F).

Ox warble fly, Cattle grubs (E). Dasseliege (D).

حشرة من الصيدينيات ، طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم .

وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطم ، مستطيلة المزج . تمتص

مكها على ظهور البقر فينتفخ عن رقات غليظة هليية تنقلها البقرة بلسانها من جلدنا الى حلقها فيطها حيث

تنتسل وترقي حتى التسج الجلدية تنتفخ الجمع عن انتهاء دورها

البرقي وتنسقط على الارض فتشخب في الثراب وتنحول الى

كروم ثم الى حشرة تميد سيرتها الاولى .

٢٤٩٣٥ - لَقَاعَةُ الْعُلْجُومِ \*

Lucilia bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).

حشرة من الصيدينيات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ سم .

لونها الى الخضار القاتم تكثر في الاكاسير الرطبة . رقاتها

طفيلية تركب جمع الصفادح اغصانها العلجوم .

Lophotes (S). Lophote (F). ٢٤٩٢٣ - لَقُوتٌ \*

جنس اسماك بحرية من فصيلة التنجليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . اشهرها لقوت المتوسط .

٢٤٩٢٤ - لَقُوتُ الْمَتَوَسِّطِ \*

Lophotes cepedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).

نوع من اللقوت وهو سمكة بحرية مأكولة لحما متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم . زعنفتها الظهرية تمتد من قة الرأس الى طرف الذنب وتنتهي عند الرأس بقرن محدب مخروطي الجسم عظمي المادة . ثوبها الى الخضار الرصاصي تملو رقة بيضاء .

Laphygma exigua (S). ٢٤٩٢٥ - لَقِيعْغَة \*

فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ الى ١٤ سم . بسطها نحو ٢٥ سم . جسمها وروشنها الاثامين الى الرمادي العايق . روثانها الحلقيان الى البياض الاغبر ، اطارها واعصاها سمر || الاثني اكبر قدماً من الذكر تمتع مكها الذي يد نحو ٥٠٠ كتلا متفرقة لا قياسية الشكل والعدد على صفحات اوراق القطن القفل فينتفخ بعد مته بثلاثة او اربعة ايام عن رقات تسليخ خمس مرات . طولها البرقي يدم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وقد يطول اكثر من هذا في الشتاء . ثم تتحول في التربة الى عذراء || اجيالها الحولية عديدة . النسي يدوم نحو ٣ اسابيع والشتوي من ٤ الى ٦ اسابيع || رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء ، اطها .

Lévulose (F). ٢٤٩٢٦ - لَقِيزْلُوز ، لَقِيزْلُوز

Levulose (E).

سكر من السكر ينتهي الى فئة الغلوكوز يوزع في معظم ثمار الفاكهة وفي الحسان والصل .

٢٤٩٢٧ - لَقِيمُومٌ \* ، هُوَيْسَةٌ ، أَمْ هُوَسْ

Lophiomys imhausii (S). Lophiomys d'imhaus (F).

حيوان لبون قاصم من فصيلة اللفيومييات . موطنه يمتد من

حوض البحر الاحمر الى الحبشة . يألف الور والادغال

والخراج المتباعدة الاشجار . ملجنه الحيائي جماعي . جماعاته

قليلة العدد || جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم .

بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . يتميز بكثرة من

ألوير المستطيل الخشن تمتد من قعر الرأس الى اواخر الزام

الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ،

مبسط الجرم . سباله كثيف مستطيل . عيناها واذنا صغيرة .

قوائمها قصيرة ، خاصة الاصابع . ثوبه الى الكلسه السمره

معلوها تمتشج اغبر في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله

امرط عادم ألوير || مسرعه دجوي . يتسلق الاشجار بشفة

السنجاب . قوته الجلود والادراق والحبوب والبيور .

٢٤٩٢٨ - لَقِيمُومِيَاتٌ \*

Lophiomyidae (S). Lophiomyidae (F).

فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القرواح . اجناسها وانواعها

قليلة العدد . اعطائها يمتد من حوض البحر الاحمر الى

افريقية الشرقية والحبشة والسودان وافريقية الوسطى ||

اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة ألوير ،

مستطيلة السبال والاذناب الكاسية . قوائمها قصيرة ،

خاصة الاصابع . حادة البرائن القليلة التحصين || جميعها

شاجرة . قوتها الجلود والادراق والحبوب والامحار وبض

البور .



لقوت المتوسط



لفيفة



لقير



لق



لقاط



لقاعة البقر

Glanage (F). Gleaning (E).

اللقط واللقاط هو جمع السنايل التي يغطسها الحامد فتبقى في الحقل بعد الرجاء .

٢٤٩٤٧ - لَقَطَة

« بقلة طيبة تبعمها الدواب » ج . لقط .

Défaut apparent (F).

Visible default (E).

٢٤٩٤٨ - لَقَم

العيب الظاهر .

Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٤٩ - لَقَفَ

Parol (F). Coat (E).

٢٤٩٥٠ - لَقَفَ

القف جانب البئر والحوض . ج القاف .

Ciconia (S).

٢٤٩٥١ - لَقَلَقَ ، لَقَلَقَ

Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).

للقلق ج . لقالق . جنس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طول الساق . صوته لقلقة . انواعه خمسة جميعها من القواطع طويلة السيقان والاعناق والمنقار . قوتها الاناعي والبرذآن والحشرات والجيف والتفانيات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - لَقَلَقَ اَبْيَضَ \* ، بَلَارَجَ ، اُبُوْحَدِيْج

Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).

نوع من اللقلق ابيض الثوب ، اسود القوائم ، اجر الساقين والمنقار . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . مسرعه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يمضي فصل الشتاء ثم يعبر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - لَقَلَقَ اَسْوَدَ ، لَعْلَعُ ، عَنَزَ ، اَبُوْسَعِيد

Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E). نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم وهو اسود الثوب ، ابيض الكتفين والعنق والصدر والبطن والافنيك ، اجر الساقين والمنقار . مسرعه يشمل الهند ومنشورية وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية .

٢٤٩٥٤ - لَقَلَقَ الْاَقَاعِي

هو الكركم المتوج ، اطليه .

٢٤٩٥٥ - لَقَلَقَ حَبَشِي \* ، عُنَاز

Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopie (F). Ethiopian stork (E).

نوع من اللقلق ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابرتواني المواج . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . عقه ومنقاره وساقاه حر . يكثر في الجبشة ويحوي معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - لَقَلَقَ مَسْرُوجَ الْمِثْقَالِ

هو المكثير الافريقي ، اطليه .

٢٤٩٥٧ - لَقَلَقِي

هو البطر ، اطليه .

Ciconiidae (S).

٢٤٩٥٨ - لَقَلَقِيَّات

Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).

فصيلة طير من طول الساق ورتبة بلشونيات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها أبد اعطانه البلاد الاستوائية والحارة والبعض الآخر قاطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي || ملجئها الحيواني زوجي وجماعي . قوتها الصفاد

٢٤٩٦١ - لَقَاعَة حَمَلِيَّة \* Lucilia sericata (S).

Lucille soyeuse (F).

حشرة من الصديديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٠ مم . جسمها خيل البشرة يكثر يسودها من اذار الى تشرين الثاني . يرقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .

٢٤٩٦٧ - لَقَاعَة قِصْرِيَّة \* ، لَقَاعَة خَضْرَاء \* Lucilia caesar (S). Lucille impériale (F).

حشرة من الصديديات ، طولها براوح من ٧ الى ١٢ مم . تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقدار المعرضة لاشعة الشمس ، يرقاتها وانجة وهواكة . تركيب الحيوانات الفقارية .

٢٤٩٦٨ - لَقَاعِيَّات Calliphoridae (F).

هي الصديديات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٦٩ - لَقَاعِيَّة Freluche (F). Butterfly-net (E).

جيب ، مخروطي الشكل ، من النسيج الناعم المتين ، يستعمل لاقتناص الحشرات والفراشات .

٢٤٩٦٠ - لَقَامَة Phagocytose (F).

Phagocytosis (E).

عمل ارتشاف الهتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحبيريات الحيوانية .

٢٤٩٦١ - لَقَامَة Phagocyte (F). Phagocyte (E).

اللقامة حبيرة في الجسم الحيواني وظيفتها القامة . وتدعى راعية وفاغوسيت وعضامة .

٢٤٩٦٢ - لَقَامِي Phagocytair (F).

Phagocytic (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالقامة .

٢٤٩٦٣ - لَقَمَة سَوْدَاء Centrolophè nègre (F).

سمكة بحرية تدعى رطامة ، اطلبها .

٢٤٩٦٤ - لَقْس Epinephelus (S).

Epinéphèle (F). Epinephelus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات ورتبة شالكاك الزعانف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اجسامها اهليجية الشوزن ، متوسطة الحجم ، مستطيلة الرؤوس ، مقطوعة الاضطام ، مسنة الزعانف الاسامية في الظهر والبطن . الوابها كستنية اللون تعلوها رقشة ملونة وبعض الماجات الزاهية والمابقة || اشهر انواعه اللقس الجبار والصخري والرملي .

٢٤٩٦٥ - لَقْس جَبَّار \* ، صُرَّان جَبَّار Epinephelus gigas (S). Epinéphèle géant, Serran géant, Merou (F). Epinephelus gigas (E).

سمكة بحرية يبرض من اللقس . اعطائها البحر الابيض المتوسط . جسمها كبير القد اهليجلي الشكل ، بطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجوزة الخنطية السمراء المواج تعلوها رقشة غبراء منسوبة التوزيع تكتنفها من الرأس الى الذنب || رأسها مقنطوم الخطر الافطس . فكها كبيران . شدنها رجب . عيناها كبيرتان ، معتدلتا الشوزن . زعانفها الظهريّة والشرعية مستطيلة يعلوها في اقسامها الاولى مناعس حادة ، زعنفتها الذيلية منفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .



لقاعة قيصرية



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق جبهي



عابقة . تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة . مكها مستدير الشكل . ذري القذ . رقبتها قصيرة لظيفة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقاتها الصدرية الاول . خادراتها عاريات . بيئاتها لا قياسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس . فيه المتدني المائلة بمؤخرها والمطوقة المائلة ببطنها والمنسقة والسليبة . الخ .



لقمة الحمل الحبيفة

٢٤٩٦٧ - **لِقْنِيَّةُ الْبَازِيلَا** \* (S). *Lycaena baetica* (F).  
**Licène des pots** (F).  
 حشرة من اللقنيات كثيرة الانتشار في الجبل الحولي . اقليمها حوض البحر المتوسط . يستطاع نحو ٢٠ م . ثوبها الى الزرقاء الجنبيلة يملوه موج خلي واطار اغبر في الذكور ، اسمر في الاناث . قرونها الاستشعارية دقيقة ، قوية الشكل ، صقية الطرف || رقبتها عند اكبال تطورها تطلو نحو ٢٠ م . ثوبها الى الخضار المايق يملوه موج بني لا يخلو من الاحمر وسط اسمر قاطب وشطوط جانبية معتزلة غيراه اللون || تركيب البالزا والباقية واكثر القرنيات . تعيش داخل السفلات تلثم الحب وتقضي عليه .

٢٤٩٦٨ - **لِقْنِيَّةُ الصَّعْتَر** \* (S). *Lycaena arion* (F).  
**Licène arion** (F).  
 حشرة من اللقنيات صغيرة القد ، زرقاء اللون ، مزركشة الراشن . اناثها اكبر قدماً من ذكورها واهبل لوناً ولق زراکش || رقبتها دقيقة الجسم سمره اللون وودية المراج . تركيب الصعتر حتى السلاخها الرابع ثم تقسم قري السمل فتلثم الرصع .



لقمة النجمة

٢٤٩٦٩ - **لِقْوَةُ** (F). *Aigle femelle* (F). **She eagle** (E).  
 الغناب الانثى .

٢٤٩٧٠ - **لِقْوَسِيَّات** \* (S). *Leucosiidae* (F). *Leucosilides* (F).  
 فصيلة دوبيبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل محرجحات الافواه || اجناسها وانواعها قليلة العدد ، نحو ٥٠ ، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضيه الشوزن او مكورة . معدودة الطهر ، مفترسة المقدم والمؤخر . ملاقطها دقيقة ، مسطيلة ، سننة الشفار الداخلية .



لقينة البازيلا

٢٤٩٧١ - **لِقْوُطَةُ** \* (S). *Leucothoe* (F). *Leucothoe* (F).  
 الاسم العلمي من الميثولوبيا الاغريقية . جنس جنبات برية وزراعية تربيانية من فصيلة الخنجات . منها بعض الاصناف الامريكية . سوقها منتصبه تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها متعاقبة ، سننة الختار . ازهارها خاسية الفصل ، اسطوانية النويجات ، عشارية الاسدية ، يكثر فيها اللون الابيض || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٢٤٩٧٢ - **لِقْوُطَةُ حَسَفَة** \* (S). *Leucothoe catesbaci* (F). *Leucothoe spinulose* (F).  
 نوع من اللقوطة التربيانية . ساقتها فرعا تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها معتقة . اعتانها الى الحمرة . نصلها اهليلجية ذرية سننة الختار ، مسطيلة الانسان الحسفة الشائكة . ازهارها ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . نواهاها بيضاء اللون ، ناشطة العرف التله || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .



لقينة الصعتر

والبطاء والشعابين والاسماك والقشريات والقواضم الصغيرة والحشرات . بعض انواعها ، اخضها الكثير ، يعيش على الجيف وقد يتعدى النور التي تخشاه عندما تصيب جيفة || اجسامها عصبليية متباينة الهجوم ، منها الوسلي والكبير . تتميز باستطالة القوائم والمناظيد الكبيرة ، المستقيمة ، الذرية ، الوشيية الشكل . جميعها بكيمية ، عادمة الجهاز الصوت || تدنن اعاشتها في المواقع الرقيقة وفي اعالي الانجار الباسقة . اناثها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ٢٠ الى ٤٠ يوماً .

٢٤٩٥٩ - **لِقْمَةُ** (F). *Condyle* (F).  
 تنوء المفاصل او حيد مستدير في العظام .

٢٤٩٦٠ - **لِقْمَةُ الْحَمَلِ ، لُوْتِي ، تَمُول** (S). *Alternanthera* (F). *Chaf-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).  
 جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القيقبيات . انواعه نحو ١٠ جميعها اشباح حولية او معمرة . اوراقها كثيرة العدد لا قياسية الشكل والحجم . ازهارها منزورة عادمة الطلاوة يكثر فيها اللون الابيض . اوراقها صحية تنفع المعدة .

٢٤٩٦١ - **لِقْمَةُ الْحَمَلِ الْعَفِيَّة** \* ، **لِقْمَةُ الْفَرْك ، تَمُول لَاطِي** (S). *Alternanthera sessilis* (F). *Alternanthera sessile*, *Brède-chevette* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garneleukraut* (D). *Alternanthera di molucca* (I).  
 نوع من لقمة الحمل اوراقها كبيرة القد لاطية . توكّل مطبوخة . تنفع المعدة وتفيد النفس .

٢٤٩٦٢ - **لِقْمَةُ الْقَاضِي** (F). *Ottellie* (F).  
 هي اذن الشيطان ، اطلها .

٢٤٩٦٣ - **لِقْمَةُ النَّمْجَة** \* ، **كَبَاش ، مِشِيطَة** (S). *Plantago ovata* (F). *Plantain triomphe* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'agnello* (I).  
 نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي ، مقري ، بري ، طبي ، معمر ، يكثر في المواقع الرطبة .

٢٤٩٦٤ - **لِقْن** (F). *Lutage* (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لِقْنَة** \* (F). *Laguna* (F). *Lagoon* (E).  
 اللقنة كل بحر قريب القاع وقد تكثر فيه الحشاش والخورج . ج ليقنان .

٢٤٩٦٦ - **لِقْنِيَّات** \* ، **هَرَضِيَّات** \* (S). *Lycanidae* (S). *Lycanidae*, *Lycénidés* (F). *Lycanidae*, *Hainstreaks*, *Gossamer wings* (E). *Bläulinge* (D).  
 فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها متوسطة القد ، قوائمها الانامية ناقصة التركيب . ارساغ ذكورها وحيدة البقلة . قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس . اناؤها

Chêne chevelu (F).

٢٤٩٨٢ - لِكَاع

هو السديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لِكَاث ، لِكَانة

داه يأخذ الغنم في اشدتها وشفاها وهو مثل القرص .

٢٤٩٨٤ - لِكَاث

الكاث : الحجر البراق الاملس يوجد في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لِكَازَة

Lachésis (F). Lachesis (E).

جنس حيات سرلودة سامة من انبويات الارياخيد وفصيلة الافديات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اغصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيهة ببروس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بنقر واضحة بين العين والانوف . اعناقها دقيقة واذنابها كذلك . اذنبها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المنقعة كالكلاليب . اوثابها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاصفر والاشقر والاشهب || اشهر انواعها الكازة الصاعدة والكازة السانية .

٢٤٩٨٦ - لِكَازَة سِنائية \* ، سنان الرُومع

Lachesis botrops (S).

Lachésis lancéolé, Fer de lance (F).

نوع من الكازة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر وجودها في زراعات المصان والموز . قوتها القتران والجذران والصفاد والظاء والتانير الصغيرة والبطير || جسمها يطول نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى الصفرة النحاسية الموج . سمها ناعم . لدغها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

Lachesis mutus (S). ٢٤٩٨٧ - لِكَازَة صَامِيَة \*

Lachésis muet (F).

نوع من الكازة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآهلة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطيور || جسمها يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والاصفراني تملوه تزاويق سود ورقشة شهاب || سمها زافع . لدغها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لِكَاع \*

Odyneré (F). Odynerus (E).

الواحدة لكاعة . جنس حشرات قانصة وثابة ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المحصورة وفصيلة الدغيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم .|| اجسامها متوسطة القد ورحاتها كذلك . اوثابها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر الالصاني او البرتقالي وبعضها جزوي مجلج بالاصفر الفهبي ونبها الاحمر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفر في التربة والخيطان والاشجار النخرة وفي سلايات القصب . اصفاها رداء راحة غروطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريخ والدعاعيس تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفاها زادا لها ويريقاتها .

Rhaps (S). Rhaps (F). ٢٤٩٨٩ - لِكَاع \* ، رَيْسُ

الواحدة لكاعة . جنس نباتات ثريين من فصيلة النخليات .

٢٤٩٧٣ - لَقُوْطَة حَوْرِيَّة الورق \*

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها فراء تملو من مترين الى اربعة امتار . اغناها عادة الخمل والزغب . اوراقها باشرة المروق على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة الماعليق ، متدلية ، لونها الى البياض الماعلي || تويرها يستمر من حزيران الى آب .



لَقِط

٢٤٩٧٤ - لَقُوْطَة سُنَّيَّة \*

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة . يصفية النصل ، ذلفة الزام الاخير ، تطول نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يصفاء اللون || تويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Leucothoe Lobbii (S). ٢٤٩٧٥ - لَقُوْطَة لُبِّي \*

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من القوطة التريينية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها ابيدة ، جلدية النصل ، سننة الخمار ، تطول نحو ٧ سم . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الاذنكاز . ازهارها يصفاء اللون || تويرها يستمر طول شهر حزيران .



لِكَازَة سَانِيَة

Pompilidae (S).

٢٤٩٧٦ - لِقِيَّات \*

Pompilidés (F). Pompilidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقترسه من الحشرات والموام . تحفر مكاهي في التربة على اعماق يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تنشب عنها عدة سراديب تنهي رداء مستطيلة سدسة الاضلع تقصع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكناث تنقف بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها اللق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لِقِيَّس هو ما طال زين نمو . راجع قصب .



لَكَاع

٢٤٩٧٨ - لِقِط \*

Dracunculus muscivorus, Helicodicerus muscivorus (S). Serpenteira attrape-mouches (F).

نبات عشبي اردوي بري وتريين من فصيلة القلقاسيات . ارونه عسقرية مقطعة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد ، وريقاتها وريّة التجميع نصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمبقية بالاجر والاصفر . شراخه يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شرعانه خلي الصفحة الداخلية جزوي اللون يتوسطه ضبة محجة تكسوها الياث شرية الشكل .

٢٤٩٧٩ - لِقِصْفَة ، لِقِصْفَة

Ophioglosse (F).

عشبة طيبة تعرف بلسان احية . اطلها .

٢٤٩٨٠ - لِقِصْفِيَّات \*

Ophioglossaceae (S). Ophioglossacées (F).

فصيلة من السراخس تشمل بعض الاجناس والانواع اشهرها القيقفة ولسان الغزال .

٢٤٩٨١ - لِكَاع

Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

عصاره راتنجية صمغية صناعية تفرزها بعض الاشجار تلقائيا بعد جرحها او بواسطة الحشرات .



لَكَاع

## ٢٤٩٩٧ - لُكْتُارِيُوسُ حَرِيفٌ \*

Lactarius acris, L. sanguifluus (S). Lactaire acré, L. à lait rouge (F).



لُكْتُارِيُوسُ اشْحَق

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والغابات الطفيلية في الصيف والخريف. عصارته حراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٥ سم. نكهته حنطية يعلوها توشيح طوي أحمر المالح. قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم.

## ٢٤٩٩٨ - لُكْتُارِيُوسُ سَامٌ \*

Lactarius torminosus (S). Lactaire vénéneux, L. aux tranchées, L. à toison (F).

من الفطور الجحالية المؤذية يكثر في الإحراج والراعي. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكهته أقية الصفحة المهدبة، طويقة التخديد، زياها اختار والحافة، لوها إلى الوردي يعلو موج أصفر وتوشيح عائب.



لُكْتُارِيُوسُ رِقْطَالِي

## ٢٤٩٩٩ - لُكْتُارِيُوسُ لَدِيْذٌ \*

Lactarius deliciosus (S). Lactaire délicieux (F).

من الفطور المأكولة الذيدة العلم. يكثر في ظل الأشجار الصنوبر والسرور. عصارته حراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٧ سم. نكهته تلبو محمية ثم مسنوية أقية وتنتهي مقمرة. قطرها يراوح من ٥ إلى ١٥ سم. لوها إلى الحمرة البرتقالية تملوها رقة خضراء وأطواق عابطة.



لُكْتُارِيُوسُ حَرِيف

## ٢٥٠٠٠ - لُكْتُارٌ

Lactase (F).

هي اللبناز، اطلها.

## ٢٥٠٠١ - لُكْتُورُ

Lactose (F).

هي اللبوز، اطلها.

## ٢٥٠٠٢ - لُكْتُوسٌ \*

Lycet (S).

Lycet (F). Lycet (S).

جنس حشرات مؤذية من غديات الاجنحة وفصلية الككتوسيات. أنواعه المروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غاشبة لكنها لا تقرب من احشاش الفصيلة الصنوبرية || اعرف أنواعه واشهرها الككتوس الاسمر والخيطي والهند.



لُكْتُارِيُوسُ سَام

## ٢٥٠٠٣ - لُكْتُوسُ اسْمَرٌ \*

Lycet brunneus, Xylotrogus brunneus (S). Lycet brun (F).

حشرة غاشبة من الككتوس. طولها نحو ٣ م. قوفا إلى السمرة الخنطية العابطة || يرقبها تنية اللون، سمره الرأس، مستغلطة المقدم. تركيب الكتير من الاخشاب ومنها التينة فتفترها وتطعها. وعندما تستكن من المرقسوس. فلها تفصله على كل غذاء.



لُكْتُارِيُوسُ لَدِيْذ

## ٢٥٠٠٤ - لُكْتُوسُ خِيطِيْ \*

Lycet linearis (S). Lycet linéaire (F).

حشرة غاشبة من الككتوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ م. قوفا إلى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقبها مقوسة، مستغلطة المقدم، مستعدة المخزر، مالة القشار. سداسية الروابج، تينية اللون، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت اللحاء وتنشر الاعمدة والاخشاب المصنوعة لكنها لا تقرب احشاش الصنوبريات.

انواعه قليلة العدد اعطائها المناطق الحارة. جذوعها عند وجودها دقيقة مستقيمة كثيرة اللد ضمية التجميع تكسوها غشاوة من اللبب الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل، خوصها جبل الخضار الزاهي، كرها مستطيل الجرم سرح الصفحة أو شالك الجوانب || واللُكَاة يعيش في اقلم الحمضيات حيث يزرع في المراكن في الحدائق الخاصة التي لا تحصى القر. يتكاثر بالفلسل. اشهر انواعه التزيبية ما يلي.

## ٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

Rhaphis humilis, R. sirotski (S). Rhaphis nain (F).

نوع من اللُكَاة. ساقها جذعة. تتكاثر بالفلسل. تعيش في المراكن. اوراقها دقيقة الشكل. كرها منعطف الشكل الاسمر المتباعد الارتكاز.

## ٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوحِيَّةٌ

Rhaphis flabelliformis (S). Rhaphis en éventail (F).

نوع من اللُكَاة. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مروحية الشكل. خوصها جبل الخضار الزاهي. كرها قليل الشكل الحنطي المتباعد. تزرع في المراكن والحدائق. ترطب في الأثرية الدبالية الممتوشة الرطوبة.

## ٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

Rhaphis major (S).

Rhaphis major (F).

نوع من اللُكَاة. ساقها مستدقة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. خوصها فسقي اللون. كرها سرح الصفحة. تزرع في المراكن والحدائق. ترطب في الأثرية الدبالية الخصب.

## ٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شويكة تحنط لها سوقية قدر شبر لينة كانه سير ولها فروع مملوءة شوكة وفي خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقيش ثم يبقى الشوك فاذا جفت ابيضت » (اللسان).

## ٢٤٩٩٤ - لُكْتُارِيُوسُ ، لَبِيَّةٌ

Lactarius (S).

Lactaire (F).

جنس فطور من الفانريقيات انواعه عديدة منها المأكولة والجحالية جميعها دماعة اذا جرحت. عصارته لينة لزجة حلوة العلم أو حريفة المذاق. لوها يختلف باختلاف الأنواع، منها الابيض والاصفر والاحمر والاردم والبنفسجي || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

## ٢٤٩٩٥ - لُكْتُارِيُوسُ اشْحَقٌ \*

Lactarius rufus (S). Lactaire roux (F).

من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكهته اقية يعلوها توشيح طوي أحمر المالح. قطرها يراوح من ٦ إلى ٩ سم. لوها إلى الشفحة.

## ٢٤٩٩٦ - لُكْتُارِيُوسُ بُرْطَقَالِيْ \*

Lactarius volemus, L. lactifluus (S). Lactaire orangé, L. à lait abondant (F).

من الفطور المأكولة الذيدة العلم. عصارته كالحليب لوها ولزوجة وتديقا. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكهته تلبو قلسوسية في أول هدهدا ثم أقية وتنتهي مقمرة بتوسطها تملو غليظ. قطرها يراوح من ٨ إلى ٢٠ سم. لوها يستمر على الصفرة البرتقالية حتى التغير فينحرف إلى ذلك إلى الجوزي وهو يوجد في الغابات الطفيلية الرطبة من تموز إلى آب.

غبار اللون يملؤها موج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطراسها متعائلة الكثافة بنفسجية اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - لِكُعَّةٌ شَحِيحَةٌ \*  
Laccaria laccata (S).  
Laccalre laqué (F).

نوع من اللكة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، شعراء اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لوحتها الى الشقة الصفراء الالامعة. اطراسها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - لِكُو بَلَسْتِيد  
Leucoplaste (F).  
Leucoplast (E).

هي البوصية المادمة اللون اي مواد الحلية المادمة اللون.

٢٥٠١٣ - لِكَيَات  
Phytolaccaceae (S).  
Phytolaccées (F) Phytolaccaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٢٠. اعطائها المناطق الاستوائية والحارة. معظم انواعها اشجار ونباتات وبعضها جنبات لينة السوق واعشاب وحولية وعمرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا قياسية التجميع والارتكاز. ثمارها عنبية يتسخر منها صباغات ارجوانية. عصاره جلدها حلابية دقة لكة صناعية.

٢٥٠١٤ - لِكِيَّة \*  
Phytolacca (S).  
Phytolaque (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewöhnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكييات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنبات والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة يضيئة النصل او اهليجية. ازهارها عقنودي التجميع صغيرة القد، ملونة. ثمارها نورية غزيرة العصاره الحمراء تستعمل في صباغ الحمر. جلدها طيبة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٥٠١٥ - لِكِيَّة ثُنَائِيَّة الْمَسْكَن

Phytolacca dioica (S). Phytolaque dioïque, Belombr (F).  
نوع من اللكية الشائعة. شجرتها تملو من ٦ الى ١٥ م. ساقها فراء فناء، فلسوية القنة وارقة الظل. اوراقها يضيئة زلقة طولها ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينفض في كانون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المتناقد الاكبرية والاثاوية || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - لِكِيَّة عَشَارِيَّة الْأَسْدِيَّة

Phytolacca decandra (S). Phytolaque à 10 étamines (F).  
نوع من اللكية الزريرية. ساقها منتصبة فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليجية سائنة، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو يحمل النسيج احمر الصفحة: ازهارها عقنودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية الاسدية تبدو يبيضاء اللون ثم تتحول الى الارجواني. ثمارها بنفسجية عشارية الاضلع || تنويرها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - لِكَيْس \*

Donovania (S). Lachésis (F).  
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة المريقيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - لِكْتُوسٌ مُخَدَّدٌ \*

Lyctus unipunctatus (S). Lycte canaliculé (F).  
حشرة خاشية من اللكتوس. طولها نحو ٤ م. ثوبها الى الشبهة الخطية السمراء الموج، تعبق في الرأس والكتول وترتفع في عنقها المزدنين || يرتقا غبار اللون، جزوية الرأس. غليظة الصدر، مستدة المؤخر. تركب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء الصنوبريات.

٢٥٠٠٦ - لِكْتُوسِيَّات \*  
Lyctidae (S).  
Lyctides (F). Lyctidae, True powder-post beetles (E). Splintkäfer, Holzmehlkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد الشام || حشرات صغيرة القد، مستطيلة الشكل، ضيقة الانحدار الخطية، صقية الزباني، خاشية الفصم الرسنية || يرتقا خاشية تنخر وتوردب جميع انواع الاغشاب اخصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - لِكْتُوسٌ مُسْتَطِيل \*، قُتَب

Lixus elongatus (S).  
مُسْتَطِيل  
Lixe elongé (F). Lixus elongatus (E).

حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مغمدات الاجنحة. تألف زراعات الثوندر والمواقع التي يكثر فيها السرق. خنافسها تعيش على ما تقتضيه ومتحصنة من عصاره نصل الارراق. يرتقا تلخج الاسناخ وتسدنها فتعطيها ابلاد جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ م. ثوبها الى اللكية السمراء يملؤها طيسل جزوي. رأسها صغير الجرم ينهني بمك قاصر ثابت راشت. عيناه صغيرتان. زبابها مرفعتان صولجانان ظهرها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر الاصح. غذاءها متناهيته التحزير الدقيق القاطب. ارساقها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى اكبر قدًا من الذكر واهت ثوبًا منه واطول سرًا ومكًا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في البهار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكن ميحاديا في اسناخ الثوندر وفي سوق السرق || والبرقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الرواج، مبهر الحلب، حنطي اللون، اسمر الرأس والشرج واللدب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينفضي في التربة قرب النبات العائل.

٢٥٠٠٨ - لِكْع  
Piquer (F). To prick (E).  
لكع ولدغ ولسب ولسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - لِكُعَّة \*  
Laccaria (S).  
Laccaire (F). Laccaria (E).  
جنس فطور من فصيلة الفاريقوتيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها مأكولة لذينة العلم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - لِكُعَّة بَسَقْسَجِيَّة \*

Laccaria amethystina (S). Laccalre améthyste (F).  
نوع من اللكة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوياء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لكتوس مخدّد



لكتوس مستطيل



لكمة بنفسجية



لكمة شحمة



لكية



لكيس

25023 - لَمَاجِيَة تَامِيَة \*  
Clubiona erratica (S).  
Clubione erratique (F). Erratic clubiona (E).

دودية من العناكب الساعية القاصصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الهايجيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م. عند التكب ونحو ١٢ م. عند التكبنة . صدراسها مستطيلة الشكل ، اسمر اللون ، احمر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها ضليمان . فكها دقيقان . جزامزها مستطيلة ، نحيلة ، كثيفة الحب . بطنها اسمر اللون ، احمر المواج ، عابك التزيم || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في النهار . مخدعها سمنة بتدقية الشكل والقد تنسجها حيث تبني لانها جولة لا تستقر في مكان معين || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا تقصيا في مكديبة جوزية الشكل ، غبراء اللون ، جامدة الحليكة تنسجها تحت الهجارة وفي كل مكان امين || ملجئها الحياتي لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدوبيات النافعة .



نم

25024 - لَمَاجِيَة رِيْبِيَة \*

Clubiona nutrix, Chiracanthium puncturium (S).  
Clubione nourrice (F). Nutrix clubiona (E).

نوع من العناكب الساعية القاصصة ثنائية الروايا ، سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الهايجيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها متوسط القد بطول نحو ٢٠ م. عند التكب ونحو ٢٤ م. عند التكبنة . صدراسها اثوبي الشكل ، اسمر اللون احمر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها نسيطة العفان الدرية . فكها ضليمان . جزامزها مستطيلة مهدبة . بطنها وفي الشكل ، حطلي اللون ، جؤوي المواج تملوه رشة سوداء || تألف الادغال والسياجات حيث تكثر النباتات الشائكة . تسرح في النهار . قوتها الحشرات واساريعها || بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ الى ٢٠ اسبوعا . مأواها مكديبة صليجية الشكل لا تخنوقة الوسط ، وميتة الحليكة ، مدخلها من الجهة السفلى || تعيش نحو ثلاث سنوات . الانثى تموت بعد تقف المكان وحضن الصغار ، اما الذكر فيبعد الكوم اذ تقضي عليه الانثى || نشتها مؤيلة . سمها شديد الفاعلية يؤذي الانسان .



لَمَاجِيَة تَامِيَة

25025 - لَمَاجِيَة مُزَكَّشَة \*

Clubiona compta (S). Clubione parée (F).

نوع من الهاجبة الساعية القاصصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ م. عند الذكر ونحو ٨ م. عند الانثى . صدراسها مستطيل الشكل ، اسمر اللون ، اخضر المواج . عينها زيمثيان . شيفسها مجهزان بمقاف مجنة نحو الداخل . فكها صغيران . جزامزها نحيلة مستطيلة ، كثيفة الحب . بطنها اهليلجي الشكل ، اسمر اللون . احمر الزراكش . ينتهي برزالتين صغيرتين || تألف المروج والمراعي والرياض تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة . مخدعها مكديبة بلاطية الشكل ، حريرية الثواس ، يضاء اللون ، تحببها تحت قشور الاجار || تعتبر من الدوبيات النافعة .



لَمَاجِيَة مُزَكَّشَة

25026 - لَمَاجِيَات \*

Clubionidae (S).  
Clubionidés (F). Clubionidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الريتلوات . اجسامها وانواعها

العدد ، اصطناعا بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصطفائها غزوطية محزنة يملؤها تخنيد قلب وتجزير مترع يستمد من الفروغ الى القرب . فونها اهليلجية الانفرج ، جالسة الاريفة العادمة التفضين .

25018 - لَم \*  
Uria (S). Lumme, Guillemot (F).  
Guillemot (E).

جنس طير من عارة اللميات وفصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها المناطق الباردة القطبية ، تزوج عنها في فصل الشتاء والجلد الى المناطق المعتدلة الحرارة . ملجئها الحياتي جامعي اليق . جاعاتها اسراب لا يحصى لها عدد . قوتها الاسماك والقشريات والدعايمص || اجسامها كبيرة مناقيدها مستطيلة جالسة مدبة الاطراف المفروسة . مناقشها كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب الى جانب . اجنتها معتدلة الحجم ، ذلقة ، اذناها قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . ارساغها قصيرة ، سرديّة التشبيك . احطيتها تحيط بكامل الاسباع || وكناتها تقر في الواهر القضاة المشرفة على البحر . الاناث تحضن بمناوبة الذكر . بيضاء اجسامي الشكل والحجم بطول من ٨ الى ١٠ سم . الحضة بيضة واحدة والترغيم يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوما .

25019 - لَم اذَجَل

Uria troile (S).  
Lumme à capuchon, Guillemot à capuchon (F).  
Common foolish, Common guillemot (E).

نوع من اللم موطنه يستمد من التاروج الى جزر القطب . يتزوج في الشتاء الى بعض المناطق المعتدلة الحرارة اعصها الجزر البريطانية والشطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط || جسمه بطول نحو ٤٢ سم . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والركبي . منقاد الى الرودة السوداء المواج . حدة عينه الى الشقعة السمر . رساء الى السرة الختلية .

25020 - لَم اَعْتَس

Uria grylle (S).  
Lumme grylle, Guillemot grylle (F).  
Black-throated diver (E).

نوع من اللم . موطنه بعض المناطق القطبية . يتزوج في الشتاء نحو مجادح البليتيك . جسمه بطول نحو ٥٠ سم . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر ، ابيض البطن ويعلمو في مناكب الجناح والاباهر والكلل تجنيد معترض ابيض . حدة عينه حطية اللون . منقاد اسود . رساء الى الدهنة .

25021 - لَم عُرْتَنْدَة

Uria Manditi (S).  
Lumme de Mandt, Guillemot de Mandt. (F).  
Bridled Guillemot (E).

نوع من اللم . موطنه لواهر غرلندة ومجاده . يتزوج في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ سم . ثوبه الى البياض الناصع تملوه في الظهر رشة جؤوية ويعلمو في الرأس تقيج اسود احمر المواج وعطان جؤويان امين وايسر يمتدان من الشدق الى الظهر . حدة عينه عنابية اللون . منقاد ادهس ورساء كذلك .

25022 - لِمَا

Raja limma (S).  
سمكة من شفتين البحر اعطائها جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

## ٢٥٠٣٧ - لَمُفَا ، لَمُفَا ، لَمُفَا

Lympe (F). Lymph (E).

اخلاط صفراء اللون او عادية تنقلت مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

## ٢٥٠٣٨ - لَمُكْسِيلِيَّات

Lymexyliidae (S). Lymexyliidae (F).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلعة صلبة القشور وباستعراض الرأس وبكبر العين الجاحظة وباستطالة الزنابق المركبة من ١١ فصلة . اغمداء قصيرة لا تلحف كامل البطن . ارباغها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاثمار اليابسة او السائرة نحو الياس وعلى الاغصان المصنوعة || اشهر اجناسها الكمكيل .

## ٢٥٠٣٩ - لَمُنَارِيَّات

Laminariaceae (S). Laminariaceae (F).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السفى .

## ٢٥٠٤٠ - لَمُنَارِيَّة

Laminaria (S). Laminaria (F). جنس نباتات غشية من فصيلة المناريات تعيش على الصخور البحرية المغمورة بالماء . اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، فصلها اصفر اللون اسمر المخرج منها انوار مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جميعها سحادة تغيد التربة والنبات .

## ٢٥٠٤١ - لَمُنَارِيَّة سُكْرِيَّة

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrintang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I). نوع من المنارية المأكولة والعلفية . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشالية .

## ٢٥٠٤٢ - لِمْنَة

Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مغميات الارجل وفصيلة المنيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والمناقع || اصداؤها غشورية المادة ، شبه غدرورية الشكل ، محلزنة ، مدببة الاقناب ، شدها اللولب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مبطلة اللواس السنانة الشكل . عينها قاعدية الارتكاز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستدقة الخلفي .

## ٢٥٠٤٣ - لِمُنُورِيَّة

Limnoria (S). Limnorie (F). Limnoria (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا مساويات الارجل وفصيلة الدوبيريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية اللون ، نحيلة القوائم المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها المنورية ثاقبة الخشب المشهورة بالاضرار التي توفها في اغخاب الاسداد واحواض السفن غير المعالجة ضد هذه الافات .

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مغترسة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشانق ، شياضها مجهزة بمخاف محججة نحو الداخل || اثارها تراوح بين الصلبة والشفقة . تعيش في عكادب بلولوية الشكل ، حريرية النواص ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاشجار او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها الياج والكفاسة .

## ٢٥٠٣٧ - لَمُاس

Tactile

صفة التي الذي يتحسس باللمس .

## ٢٥٠٣٨ - لَمُاسَات

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المنكوبيات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها كهام ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ سم . اجسامها تنتهي بهيئة دقيقة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي المغاور الرطبة .

## ٢٥٠٣٩ - لَمُاعَة

Lemme (F). Lemme (E).

عرض تمهدي لآليات قضية . هو النعج الاخضر ، اطلبه .

## ٢٥٠٣٩ - لَمُام

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب. لمبرت (١٧٦١ - ١٨٤٢) وهو جنبة معمرة برية ورييية من فصيلة القضايات مهدا استرالية . ساقها قرعاء تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . فصلها ملتد الحافية ، شالك المقصعة لامع الصفحة العليا خلي السفل . ازهارها عشودية التجميع صغيرة القد ارجوانية اللون . ثمارها جرابية الشكل مسلمة بقرئين مستطيلين . تنوره يشمر من ثمرز الى آب .

## ٢٥٠٣٣ - لَمُبرُوش

Lampides boeticus (S).

فراشة من فصيلة اللقنات . اعطائها فصيلة الاجراء تشمل البلاد الاسيوية والافريقية . جسمها اطول اللون ازرق المواج . ذكرها يطول نحو ٣٤ سم . رواشه الى الزرق البنفسجية يعلمها تمشيح سنق عايق وبطونها اطار اسمر || انتاعها تطول نحو ٣٨ سم . رواشه زرق الانتشاب حنطية اللون يعلمها تمشيح اغبر || يرقاتها تركب سف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البور قبل ادراكها .

## ٢٥٠٣٥ - لَمُة

مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تميزت بصفات خاصة ثابتة . والمة لا تأتي الا عن طريق التعقيل والتفصيل . واذا تكاثرت باليدز فقدت صفاتها المميزت ولم تعد لمة .

## ٢٥٠٣٦ - لِمُدُور

Limodorum (S). Limodore (F).

جنس نباتات طفيلية من السحليات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متركبة حرشية الشكل وغلة وراقا . النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها عشيرة بنفسجية اللون || منبتها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



لميد السنف



لمنارية سكرية



لنة

الشاة . تتميز برؤوسها الجزلة وبقدورها الامامية الشديدة  
النشط المجهزة اما الخلف كما في السرعة او القفز كما  
في القرب بواسطة اطرافها الملتصقة الشكل || جمع اجناسها  
غائلة تعيش من قصها . اشهرها البعده .

#### ٢٥٥٥ - لَيْبِيَّة \* Gnathopode (F).

Gnathopodite (E).  
زائدة متحركة او عضوية تكون عند بعض القشريات .

#### ٢٥٥٦ - لَيْبِيَّة \* Limulus (S).

Limule (F). Limulus (E).  
جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفصيلة العنكبوتيات .  
انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بجانر البلاد الحارة ||  
اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحومة الظهر يدور  
مجنية وتعمل في مؤخراتها مراد مستطيلة حادة الاطراف .  
واجسامها هذه تتكون من جزئين ، جزء امامي ملحوف يحجب  
نصف دائري يغطي الصدر والعيون والذوائل وستة  
ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زواياها الصدرية  
تستعمل كجهاز للانتقال والذوائل . اما الجزء الثاني ففلاحة  
شبه محرم الشكل ينتهي بمردود حاد الطرف . وهو عند  
قاعته يلف خنجر ازواج من الجرايز المعدلة للسياحة ||  
بعض انواعها مأكول . احصها ليمطة اندونيسية وهناك  
نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٠٠ سم . يكثر وجوده  
في بجانر شمال الولايات المتحدة .



ليمزة



ليمدة

#### ٢٥٥٧ - لَيْبِيَّة أَلْدُونِيْسِيَّة \* Limulus moluccanus (S).

Limule des Moluques (F).  
نوع من الليمطة يكثر وجودها في مياه اندونيسية . جسمها  
كبير القد ، يطول من ٩٠ الى ١١٠ سم . بما فيه المردود ||  
لحمها مأكول ، مرغوب فيه .

#### ٢٥٥٨ - لَيْبِيَّات \* Limulidae (S).

Limulids (F). Limulidae (E).  
فصيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسوتيات . اجناسها  
وانواعها الغالبة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها  
سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يدعى ليمطة .

#### ٢٥٥٩ - لَيْمِين \* Lemmus (S).

Lemming (F).  
جنس حيوانات ليلية قاضية من الكبريات وفصيلة  
القاريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد وطولها  
الباردة تجوزها من الجنوب الى الشمال || اجسامها رابعة ،  
طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . واذنانها من ٢ الى ٣ سم .  
مقاومها مقنونة . اذنانها صغيرة . جرائرها خالية الاصابع .  
اظفارها حادة جاسنة . اذواها الى الفردة الصفراء يعطوها  
تبيج اسمر . يطونها الى الصفار الرلي . جرائرها واذنانها  
صفر || قوتها الاشباج والجذور والحزاز .

#### ٢٥٥٩ - لَيْبَارِيَّة Lanaria (S).

Lanarie (F). Lanaria (E). Lanarie (D). Lanaria (I).  
جنس نباتات عشبية جسمية مدادة معمرة من فصيلة  
الترجييات . انواعها قليلة منها نبات افريقية الجنوبية . تزود  
للتربين .

#### ٢٥٥٩ - لَنْجُور Semnophthèque (F).

نوع من القروء المقننة يدعى هبار ، اطلبه .

#### ٢٥٥٧ - لَنْجِيْطُس Lonchitis (F).

هو المنسم ، من النباتات الطبية والثرينية .



ليمين

#### ٢٥٥٤ - لَيْبِيَّات \* Limnidae (S).

Limnidae (F). Limnidae (E).  
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل  
ورتيبة الرخويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في معظم بجانر وبحيرات العالم . قوتها البوت المائية  
والفريع || اصداها لاحقة ، شبه خذروفية الشكل .  
محلولة الاطراف ، سدفا اللوب || اعرف اجناسها واشهرها  
السنة والياكم والدولاب والناصيل .

#### ٢٥٥٥ - لَيْمُونَة \* Lemonia (S).

Lemonia (F). Lemonia (E).  
جنس حشرات من فصيلة المونيات ورتبة حرشفيات  
الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٠ بعضها يألف الاقاليم  
الباردة والبعض الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة  
والحارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يغيرها الخمل .  
بسطها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية  
الشكل . عيونها صغيرة ، بارزة . اخطامها وملاسها  
قصيرة . قرونها الاستشعارية مشطية . اجنحتها كبيرة ،  
ملونة ، مجنحة وتنقطع . اذواها قليلة الخزفة || اسارها  
مثاقلة يطولها حلب دقيق . تألف البراري جميعها خاضعة  
تعيش على معظم ثبوت فصيلة المركبات واعصها المندب .

#### ٢٥٥٦ - لَيْمُونِيَّات \* Lemoniidae (S).

Lemoniids (F). Lemoniidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة الاطام  
وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها  
كبيرة ، عضلية ، يقلها خمل مستطيل . بسطها تراوح  
من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها  
صغيرة . اخطامها شديدة القص . ملاسها صغيرة .  
قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة . اجنحتها كبيرة  
عامة المزخرف . اذواها مزخرفة || اسارها مثاقلة القشار  
يعطوها بعض الحلب || اشهر اجناسها اللونة .

#### ٢٥٥٧ - لَيْبَات \* Uriens (F).

عمارة طير من فصيلة البيرقيات . اجناسها وانواعها  
قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة ||  
تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشها البلس ، بارساها  
السريرة ، ويمتازها المائلة الاكلا ، المعتدلة الاحدياب ،  
القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الم والمرغول  
والرخولان .

#### ٢٥٥٨ - لَيْبِيَّة \* Phymata (S).

Phymate (F). Phymata (E).  
جنس حشرات قاضية من فصيلة الليمديات . انواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة  
الحارة والحارة || اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٠ سم .  
اشكالها مستغربة لامألوفة . رؤوسها جزلة شاذكة . اخطامها  
قصيرة شديدة النشط . قوتها الامامية مجنحة الخلف ||  
اذواها مبيانية الاوان تكثر فيها الشقة والسرعة || جمع  
انواعها ناعمة لانها تنقص على الحشرات الصارة .

#### ٢٥٥٩ - لَيْبِيَّة يَات \* Phymatidae (S).

Phymatids (F). Phymatidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات  
الاجنح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البد معظمها  
من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال

Lennoa

## ٢٥٠٦٣ - لَنُوَا ٥

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النويات . أنواعها المروقة ثلاثة منبتها بلاد المكسيك .

Lennoaceae (S).

## ٢٥٠٦٤ - لَنُوَات ٥

Lennoaceae (F). Lennoaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العقالات . اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد . يعثر وجودها في بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . اوراقها سهقية . ازهارها صغيرة ، سننية الارتفاع || اشهر اجناسها اللنو .

Lignodes (S). Lignode (F). \* ٢٥٠٦٥ - لَيْسُود ٥

جنس حشرات خاضعة من عذبات الاجنحة وفصيلة السويات . انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يعثر وجودها على المران والبيكس والبام ، خاصة في زمن الازهار || اجسامها صغيرة ، شبه بيضبة الشوزن ، تطول من ٤ الى ٦ سم . اثوابها الى الشقعة السفلى بعولها ، في بعض الانواع ، تبقيج اسود مغناوي الرخابة يكتنف الامداد .

Lanio (S). \* ٢٥٠٦٦ - لَيْسُون ٥

Lanlon (F). Lanlo (E).

جنس طير من الجوام غروريات المناوير وفصيلة التنغريات انواعها المروقة خسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية . تألف الاجراج . ملجئها الحياتي جماعي باستثناء زمن التماسد والحضانة والتعليل ، جماعتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والذود والثار النبتية البرية والزراعية || اجسامها ردية تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . سنانقدها غرورية . اجنتسها مستطيلة ، ذلقة . اذنانها مقعرة شبه مفروقة . اثوابها تختلف مع الانواع فيها الاسفر والاحمر والادس والخضر الانس ، جميعها مبلقة او مبيضة بالادس || تدين اعشاشها في الادغال القريبة من سطح الارض . الاناث تحضن سعدا من ٥ الى ٧ بيضات بينا الذكور توتن لها الحماية والغذاء .

Epiglottis (F). \* ٢٥٠٦٧ - لَهَاسَة ، لِسَان المِزْمَار ٥

Epiglottis (E).

الهامة او لسان المزمار سقاط لبني - غسروني يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

## ٢٥٠٦٨ - لَهَاسَة الجرود ٥

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الارليات ورنية حرشيات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية الناحية . قوتها رحيق الازهار . سرتها خاضعة تعيش على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . بسطها نحو ٣٧ سم . رأسها حنطي اللون . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عظيمات عند الانثى . جوشها وبطنها الى الخيطي الاشعع المواج || رواشها عند الشقن الى الخيطي الاكثف بعولها في الزوج الامامي تحشج ابيض واغبر وبقعة وسطى شديدة السمرة تنتهي بشفيتين تتوسطها نقطة سمراء . ويملوه في الزوج الخلفي تحشج اسمر وعطان من الزراكش . اهدائها الى الشقعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في

Landolphia (S).

Landolphia, Vahé (F). African rubber tree (E). Kantschuklane (D). Landolphia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الدفليات . منبتها افريقية الجبوية ومذغسك . سوقها جالسة ، سالمة سماء اللون . اوراقها متعاقبة ، نصلها لامع الصفحة الجامدة . ازهارها تاجية || يستخرج من جلونها بالخر عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط .

Lentizes

## ٢٥٠٥٩ - لَنْزِيْت ٥

فطر من السيات يركب الاشخاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجي فطر صغير القد لونه الى الالوة ، نكتته ملفطة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الاصل مستدير التخديد ، تملو اخاديد حراشف ورير هيفية متناسبة البعد شبهاء اللون . لبابه قليل السابة ، لبني التركيب ، حنطي اللون . بوفياته اسطوانية الشكل قياها نحو ٣٨ ميكرون || مشبيجه يترى الاشخاب المقطوعة فيسب عنها وانحلالها يد ان ينطقها بوشاخ كندف القطن لونه الى الصفرة البرتقالية ثم ينحرف الى الحنطي || يكتاف بحرق الاشخاب المصابة ويتطير السلطنة بأحد المركبات الفعالة كالفيتول والكرولين .

Linsang (S). \* ٢٥٠٦٠ - لَيْسَان ٥

Linsang (F). Linsang (E).

جنس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات . انواعها المروقة ثلاثة موطنها الهنـد الصينية وجزر الزايج . تألف القنايات والرياض . ملجئها الحياتي فري الذكر يكوم عدة اناث والاثني تخالط عدة ذكور || اجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ الى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه غرورية الشكل . آذانها صغيرة ، كاسية . عينها صاخة ، حادة البصر . اذنانها مستطيلة ، سداسية او ثمانية الاطواق ، بالنسبة الى النوع . فرازها قصيرة الوبر اللد الناعم . اثوابها مبيضة ، مرقشة وبدرة || اناثها ثنائية الاثداء والجرار ، تضع على مرتين في الحول . المرة الاولى في اواخر شباط والثانية في اواسط آب || سرعها دجوي . قوتها الطير والحيوان الصغير || اما انواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

Linsang pardicolore (F).

Linsang gracilis (S).

Linsang gracieux (E).

Linsang maculose (S).

Linsang maculé (F).

Ammodytes lanceolatus (S). \* ٢٥٠٦١ - لَنْصُون ٥

Lancon (F).

سكة بحرية من فصيلة الرماليات . اعطائها معطر شطوط بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبسيط يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسها صغير الحجم مستطيل الخط . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية قاطبة يتقدمها منخس حاد . زعنفتها الشرجية تمتد من اواسط البطن الى الذيل . زعنفتها الذيلية فارقة ، ثوبها الى الرعدة الفضية يسمر ويميق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرقوب فيه .

٢٥٠٦٢ - لَنْف ٥

لَنْف هي اللغا ، اهلها .



لندلفيه



لنسان



لنسون



لنيدود



لنيدون



٢٥٠٧٨ - **لَهَيْبَة لَاطِئَة** (S). *Uvularia sessilifolia* (S).  
*Uvulaire à feuilles sessiles* (F).  
 نوع من الالهوية تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها لاطئة اهلجالية  
 نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم. صفته السفل الى الخصار  
 الازرق الملاج. ازهارها تولية الانتشاب صغيرة القد  
 تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها الى الصفرة الباحة .  
 ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



لهوة

٢٥٠٧٩ - **لَهَيْبَة مَشْقُوبَة** (S). *Uvularia perfoliata* (S).  
*Uvulaire perfoliée* (F).  
 نوع من الالهوية تملو من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مشقوبة  
 تحترقها السوق وهي متعاقبة سنانية الشكل، نصلها يطول  
 من ٤ الى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، اخضر العليا،  
 باعت السفل. ازهارها تطول من ٢ الى ٣ سم. يتلأها  
 مدنية الاطراف لونها الى الصفرة الجلييلة || ازهارها  
 يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٠٨٠ - **لَهَيْبَة مُهْدَبَة** (S). *Uvularia puberula* (S).  
*Uvulaire à feuilles ciliées* (F).  
 نوع من الالهوية السروية تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها  
 متعاقبة سنانية. نصلها جامد سنانية الشكل، اخضر اللون،  
 مهب الخافة، يطول نحو ٥ سم. ازهارها مقطوعة البتلات  
 تطول نحو ٢٥ سم. لونها الى الصفار الكبيرتي || ازهارها  
 يستمر من ايار الى حزيران .



لهوية

٢٥٠٨١ - **لَهَيْبَة ، حُمَيْرَاء** (S). *Ruticilla, Phoenicurus* (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).  
 جنس طير من فصيلة الشجوريات. انواعه كثيرة العدد  
 اعطاه العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعها  
 صغيرة القد، رشيقة القوام، قصيرة المتقار، مستطيلة  
 الجناح، رقيقة الرنح، رطلة الريش، جميلة النوب.  
 اوتاب انائها اقل زركشة وزهده من اوتاب ذكورها.  
 قوتها الحشرات على اختلاف انواعها. تنش في شجوايف  
 الصخور وتجاوليف الاشجار || اشهر انواعه ما يلي .

٢٥٠٨٢ - **لَهَيْبَ اسْوَد الرّاس** \*  
*Ruticilla tithys, Phoenicurus ochurus* (S). *Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).  
 طائر من اللهيب طوله نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهيب  
 الاسود الزور باستثناء الراس الذي يمه السود والاواهر  
 المبقعة بالابيض. تغريده شبي الالحان. حصفته تراوح  
 من ٥ الى ٦ بيضات تقوم بها الانثى دون الذكر.



لهيب اسود الرأس

٢٥٠٨٣ - **لَهَيْبَ اسْوَد الزَّوَر** \*  
*Ruticilla phoenicurus, Phoenicurus phoenicurus* (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).  
 طائر من اللهيب طوله نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الانوان  
 المتراكبة، رأسه الى الكهية الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء  
 تمتد الى الجبهة. زوره اسود، ظهره الى الكهية الرمادية  
 يطلها موج ازرق. جوشه وايلاه وزمكاه وذنبه الى  
 الصهبة الصنابية الزاوية. ريشه عزالانه وقوامه جناحه الى  
 السرة الخنطية، اباهره الى الصهبة. حدة عينه غنايبة  
 اللون. منقاره ويبراه الى السرة السوداء || انشاء تحضن  
 مرتين في العام، الاولى في اواسط نيسان والثانية في اوائل  
 حزيران. حصفتها تراوح من ٥ الى ٨ بيضات .



لهيب اسود الزور

اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تشرح من العصر  
 الى فحة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع  
 وتمتص المكن ميحادي على الصفحات السفل من نصال  
 الاوراق || السرة تطول نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني  
 الشكل، كثيف الملب القصير. ثوبها يماثل البيئة التي  
 تعيش فيها وهو يراوح من الخصار البحري الى الريدة  
 والشهية الصفراء يملو ثلاثة خطوط قاطبة الى الجفوة.  
 رواجها البطنية الوسطى ماسحة بما يحملها تنقوس عند  
 الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما  
 ينقضي في الجفالة .

٢٥٠٦٩ - **لَهَائِب** (F). *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).  
 للهايق: الثور الابيض. وكل ايض لاق ولواق. بقرة  
 لواق ولفة. شي، ملهق اللث: ابيضه .

٢٥٠٧٠ - **شَجَة ، نَحْطَة** (F). *Emphysème pulmonaire* (F). *Pulmonary emphysema* (E).  
 تعرف ايضا بانتفاخ الرئة، داء يصيب الهازم في صدورها  
 لا تكاد تسلم منه، وهو في الخليل من العيوب المبجلة  
 للبح .

٢٥٠٧١ - **لَهَم**  
 اللحم هو المسن من الحيوان واخصها حيوان القصابة  
 كالبقر والضأن والماعز. ج. لوم .

٢٥٠٧٢ - **لَهَم** (F). *Lehm* (F). *Loam* (E).  
 عن الامير مصطفى الشهازي. تربة مكونة من غرين ورمل  
 وصلصال بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر .

٢٥٠٧٣ - **لَهَوْب** (F). *Inflammable* (F).  
 قابل الالتهاب او سريع الاشتعال او الاحتراق .

٢٥٠٧٤ - **لَهَوِيَّة** (F). *Inflammabilité* (F).  
 هي قابلية الالتهاب او الاشتعال .

٢٥٠٧٥ - **لَهْوَة \*** (S). *Isothecium* (S).  
*Isothécion* (F). *Isothecium* (E).  
 جنس طحالين من جانبيات الهباء. انواعه المعروفة نحو  
 ٣٠ منبتها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم. تعيش  
 على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، نخيلة،  
 مدادة. اوراقها متراكبة شديدة الصغر. ضبابها جرابية  
 مستطيلة المالحيق المنصبة .

٢٥٠٧٦ - **لَهْوِيَّة \*** (S). *Uvularia* (S). *Uvulaire* (F).  
 جنس نباتات جذمورية عشبية زيبينية معمرة من فصيلة  
 الزنبقيات. انواعها المعروفة ستة. سوقها دقيقة، نخيلة  
 فرعاء. اوراقها لا قابية الشكل والانتظام. ازهارها  
 فردية او تولية الانتشاب، اطية الارتكاز، سدنية  
 البتلات المستطيلة المتدللة، لونها الى الصفرة || اعرف  
 انواعها ما يتبع .

٢٥٠٧٧ - **لَهْوِيَّة كَبِيرَة الزَّوَر** (S). *Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).  
 نوع من الالهوية السروية. تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم.  
 اوراقها متعاقبة سنانية، نصلها يطول من ٦ الى ١٠ سم.  
 وهو مائل الصفحة العليا الخصار، خلي السفل البطلاح.  
 ازهارها كبيرة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة  
 الجلييلة || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٥٠٧٨ - **لَهْوِيَّة كَبِيرَة الزَّوَر** (S). *Uvularia grandiflora* (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).  
 نوع من الالهوية السروية. تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم.  
 اوراقها متعاقبة سنانية، نصلها يطول من ٦ الى ١٠ سم.  
 وهو مائل الصفحة العليا الخصار، خلي السفل البطلاح.  
 ازهارها كبيرة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. لونها الى الصفرة  
 الجلييلة || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٥٠٨٤ - لهيئة \*

Crenilabrus (S).

Crénilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيديات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها شبه اهليجية الشكل تقطوع من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسطوانية. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مقطوعة. خراشيفها مائلة. الزوايا جبهة الالوان الماركية الزاهية تتركز على الرتبة القفصية تملأها خطوط وتجاويز ومجرات تراوح من الاحمر الى الاصفر والاحمر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكثات من الحث وتتفقد السرة وتحافظ عليه حتى التقف || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .



لهيئة طاووسية

٢٥٠٨٥ - لهيئة طاووسية \*

Crenilabrus pavo (S). Crénilabre pavo (F).

Crenilabrus pavo (E).

نوع من الهيئة. سمكة بحرية بيوض. اعطائها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اهليجي الشكل ، متعدل التبطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها متراكب الالوان القسطانية الجميلة. الذكر اكبر قدماً من الانثى واكثر تزويجاً ولحم خصباً. رؤسها مخروطي الشكل. فكاهها قويان ، متماثلان شقها متعدل الانفرج. عيناها كبيرتان ، جاحضتان ، باقوتيتان ، زعنفتها الظهرية مستطيلة ، لامتناهية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .



لهيئة مدولة

٢٥٠٨٦ - لهيئة مدولة \*

Crenilabrus melops (S). Crénilabre commun,

C. mélops (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من الهيئة. سمكة بحرية بيوض. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اهليجي الشكل متعدل التبطيط ، يطول نحو ١٨ سم. ثوبها متباين الخصب بين الذكر والانثى. اللون الجزوي يسود عند الذكر والاعخر المحنطي عند الانثى. ويملوه عند الشقين هلال اسود وراه كين وبقعة سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية. رؤسها مخروطي الشكل ، ذلق الحظير ، متعدل الشدق. عيناها كبيرتان ، جاحضتان. زعانفها ملونة. الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مغروب فيه .



لواب المتوسط

٢٥٠٨٧ - لواء

Torcou (F).

طائر من النقاقيات يعرف بابي لوي ، اطلبه .



لوازة

٢٥٠٨٨ - لواب

Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس متوغ من الثقريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الخيليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اجسامها متغايرة القد ، شديدة التباين الجسمي. تتميز بدروعها المصغرة وباستعداداتها الجانية التي تأخذ شكل الاسته او الحرايب. حمار دروعها الامامية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية مجاذبة الفصم الطرفية. ملاقطها مسنة ضليعة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط .



لوبياء

٢٥٠٨٩ - لواب المتوسط \*

Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللواب. اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الانمر والاديس والاصمر والاشفق والاسمر ويملوه في القسم الخلفي من درعه ثلاث نقط مستديرة جزوية اللون .

٢٥٠٩٠ - لواب الهند

Lupa tranquebarica (S). Lupa des Indes (F).

نوع من اللواب. اعطانه شطوط الهند الجنوبية . جسمه كبير القد يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجميلة فيه الازرق والاحمر والبرتقالي والاصفر والاشفق والصنابي .

٢٥٠٩١ - لواح

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivoros, Fallow-deer (E).

رتبة من الحيوانات اللبونة آكلات اللحوم . فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والديبات والضبعيات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - لوازة \*

Loasa (S). Loasa, Loase (F).

Loasa (E). Loasa, Nesselnalie (D). Loasa (I).

جنس نباتات شبيهة حولية ريشة وزبينة من فصيلة اللوزيات. انواعها قليلة جميعها زباء ، زغبها حارق كالفراس. اوراقها متعاقبة ، مفترضة . ازهارها فردية ، محورية الارتكاز ، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب ، جيلة الشكل ، نارية اللون تتعاقب بعض الوقت . ازهارها يستمر ملول الصيف .

٢٥٠٩٣ - لوازيات

Loasaceae (S). Loasacées (F). Loasaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القللات اجناسها . وانواعها قليلة ، معظمها اشباح حولية ومحولة . اعطائها ابريكة الاسوائية .

٢٥٠٩٤ - لوب

Abelles (F).

اللوب هو النحل والارب ايضا .

٢٥٠٩٥ - لوبياء \*

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية. ضرابه كثيرة العدد تزرع لقرنوها الخضراء القليلة او لبرورها الجافة || وهي تجود في جميع الارربة القليلة الانساج الممكن ردها . برورها وافرة المادة الغذائية تحوي مسا قدره :

- ٢٣,٢٤ ٪ من المواد الازوتية
- ١,٣٠ ٪ من المواد الدهنية
- ٥٦,٨٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٥٠٩٦ - لوبياء بلدية

Dolic de Chine (F).

هي الدر الصبي ، اطلبه .

٢٥٠٩٧ - لوبياء سودانية

Ambrevade (F).

هي البسلة الهندية ، اطلها .

٢٥١٠٧ - **لُوبِيْلِيَّة زَرْقَاء ، لُوبِيْلِيَّة السُّفْلِس**  
*Lobelia syphilitica* (S). *Lobélie syphilitique*, *Cardinale bleue* (F).

بجلة طبية وزينة معمرة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها سنانية ذلقة طول نحو ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سنانية التجميع تاجية الارتكاز طول نحو ٣ سم. لوئها إلى الزرقاء البنفسجية المواج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين. كانوا ولا يزالون يستعملون أزهارها وزورها وجوهرها في معالجة السفلس.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيْلِيَّة سَاطِعَة**  
*Lobelia fulgens* (S). *Lobélie éclatante* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع. أوراقها لاطئة لسنة ملتفة الاطراف ، نصلها جوي اللون خلي البشرة ، أزهارها كبيرة القد ، خلية القنابات الدرية ، برتقالية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيْلِيَّة قَاصِرَة**  
*Lobelia splendens* (S). *Lobélie splendide* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها لاطئة لسنة ؛ نصلها مسن الحافة ، اخضر الصفحة، جوي مختار. أزهارها كبيرة القد ، أرجوانية اللون ، برتقالية المواج || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني.

٢٥١١٠ - **لُوبِيْلِيَّة قَرَحَاء**  
*Lobelia ramosa* (S). *Lobélie ramifiée* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها أسطوانية زباء. أوراقها السفلى ريشية مخمرة. أوراقها العليا سنانية مدببة الزام الاخير. نصلها خلي البشرة أحمر اللون. أزهارها كبيرة القد لوئها إلى الزرقاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٥١١١ - **لُوبِيْلِيَّة قَرْمِزِيَّة**  
*Lobelia cardinalis* (S). *Lobélie cardinale* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، أوراقها لسنة سننة. نصلها مائل الصفحة يطول من ٥ إلى ١٥ سم. أزهارها قمرزية اللون لا تتساوية القنابات || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

٢٥١١٢ - **لُوبِيْلِيَّة كَرْلِيَّة**  
*Lobelia amoena* (S). *Lobélie de la Caroline* (F).

بجلة زينة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٤٠ سم. ساقها فراء. أوراقها اهليلية سنانية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سنانية التجميع ، تاجية الارتكاز، لوئها إلى الزرقاء الباهتة. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٥١١٣ - **لُوبِيْلِيَّة مُحْرِقَة**  
*Lobelia urens* (S). *Lobélie brûlante* (F).

بجلة طبية معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. تعيش في المناطق والاراضي الرطبة ، مهددا الخد. يقال أنها جراحية المادة قلتها تغيد المدة ، كثرها مؤذية. ساقها زباء اللحاء. أوراقها مزهجرة. زهبها محرق قارس. أزهارها وردية اللون.

٢٥٠٩٨ - **لُوبِيَّاء عُسْقُولِيَّة**  
*Dolique bulbeux* (F). هي التامر ، اطبله.

٢٥٠٩٩ - **لُوبِيَّاء لَبْلَابِيَّة**  
*Dolic lablab* (F). هي اللباب المصري ، اطبله.

٢٥١٠٠ - **لُوبِيَّاء مِسْكَات**  
*Dolique à œil noir* (F). هي الدجر ، اطبله.

٢٥١٠١ - **لُوبِيَّاء**  
*Lopezia* (S). *Lopézia* (F). *Lopezia* (E).

جنس نباتات عشبية برية وزينة من فصيلة الاخدريات. مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة ، مختلفة الاشكال. يكثر فيها السناني. أزهارها عقودي التجميع. أزهارها لانطامية ، متباينة الالوان ، رباعية الفصل والبلات اللانساوية ، ثنائية الاسدية المستعرضة الاطراف || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥١٠٢ - **لُوبِيَّاء زُرْجَنْجَرِيَّة**  
*Lopezia miniata* (S). *Lopézia cinabre* (F).

نوع من اللوزية. جنبة سبروتية معمرة. مهدا المكسيك. ساقها مخشوشية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة اهليلية مسنة التصل. أزهارها عقودي طرفي. أزهارها إلى الحمرة الزنجفريه اللامعة || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني.

٢٥١٠٣ - **لُوبِيَّاء كَثِيرَة الزَّهَر**  
*Lopezia grandiflora* (S). *Lopézia à grandes fleurs* (F).

نوع من اللوزية. جنبة سبروتية معمرة. مهدا غواتيمالا. ساقها منتصبة فراء تملو من ١٠٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها متعاقبة اهليلية النصال تطول من ٥ إلى ٩ سم. نصلها خلية مهددة الاطراف. أزهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ إلى ٣ سم. لوئها إلى الحمرة السفعا المواج || تنويرها يستمر طولا فصل الصيف والخريف.

٢٥١٠٤ - **لُوبِيَّاء مُتَوَجَّهَة**  
*Lopezia coronata* (S). *Lopézia couronnée* (F).

نوع من اللوزية. عشبة سبروتية زينة حولية. مهدا المكسيك. ساقها مضطعة مزوانية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة ، بيضيه التصل المسن المختار. أزهارها عقودي طرفي. أزهارها إلى الوردية الأرجواني المواج || تنويرها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٥١٠٥ - **لُوبِيْلِيَّات**  
*Lobeliaceae* (S). *Lobéliacées* (F). *Lobeliaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القنابات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، اشهرها اللوبيلية.

٢٥١٠٦ - **لُوبِيْلِيَّة \***  
*Lobelia* (S). *Lobélie* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللوبيليات. انواعها نحو ٢٠٠ معلها بري وبعضها طبي وزيني. أوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل. أزهارها لا نظامية التجميع والارتكاز ، جبلة الشكل مختلفة الالوان || احرف انواعها واشهرها ما يتبع :



لوبيلة

٢٥١٢٣ - **لَوْتُ** Polluer (F). To pollute (E).

وسخ الشيء باضافة الاقذار عليه كتلوث مياه الانهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - **لَوْلَدِيَّات** Eupaléodictyoptères (F). Eupaleodictyoptera (E).

رتبة حشرات منقرضة من طبقة المفكيات . احافئها تعود الى الحقبة الرابعة من الاباج الاولي المعروفة ايضا بالحقبة الكربونية || جمع حشراتا كبيرة القد خاضلة او دامة .

٢٥١٢٥ - **لَوْنِيَّة** Lucina (S). Lucine (F). Lucina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوئيئات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ بعضها من متحجرات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداؤها متباينة الاشكال والاحجام منها القمعية والبيضية والمالسة والمخددة والمضلة . جميعها ثنائية المثالب الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغنورة بالماء قرب الشواطئ والمجاذح .

٢٥١٢٦ - **لَوْنِيَّات** Lucinidae (S). Lucinidés (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة ، من غابرة ومعاصرة ، عديدة . الغابرة تميز العصر السيلوري اما المعاصرة فتنتشر في معظم ببحار العالم || اصداؤها لاقواسية الشكل والحجم يكثر فيها البيضوي المثلج . اطراف مصاريها مسننة الحتار او مائلة || اعرف اجناسها واشهرها اللوئيئة والكربيس .

٢٥١٢٧ - **لَوْنَحَة** Planche à dessin (F). Drawing-board (E).٢٥١٢٨ - **لَوْنَحَس كَبْرِيْتِي** Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاردن . فراشها جارية قوتها رحيق الزهور . سرقها تعيش على اوراق النباتات والاشجار الخرجية || جسمها مردي الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطتها نحو ٣١ سم . رأسها كبريتي اللون . عيناها كبريتان . زباناها خيطيان . جوشنها وبطنها الى الصفار الكبريتي || روشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي يطوه بتيجع عنابي وتشبيك بني . روشنها الخلفيان الى الشبهة الصفراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتع المكن لطعاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرقه تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل للقتار ، امفر اللون . اسود الملاقي . رأسها اسود . مذهبها ورواجبها الى السمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تنغم السرقه لمتلحف بجلباب من الطين .

٢٥١١٤ - **لَوْبِيلِيَّة هَانِكَة** Lobelia heterophylla (S). Lobélie hétérophylle (F).

عشبة حولية تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها مفصلة سرسحة قليلة الفروع . اوراقها السفلى ريشية مفردة ، اوراقها العليا اعطليجية او سنانية النصل . ازهارها عقدوية التجميع ، كبيرة القد ، خلية البشرة . لونها الى الزرقة يعلوها موج وردى او ابيض || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٥١١٥ - **لَوْتُ** Sciaena (S). Sciène (F). Sciaena (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البهاريات . انواعها نحو ٢٥ جميعها مفترسة ، قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزعانفها الظهرية . اثنوها الى الكهبة السمره يعلوها موج اسفع || اشهر انواعها لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - **لَوْتُ الْمَوَسَط** Sciaena aquila (S). Sciène aigle, Mègre, Persèque (F). Meagre (E).

نوع من اللوت الميزل في المتوسط . مسرحة غمن المياه الاقليلية ، جنته كبيرة القد تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبه الى الربدة الطحلاء السفهاء الموج . لحمه لذيق الطعم جيد الصنف .

٢٥١١٧ - **لَوْتُس** Lotus

هو اللوتس ، اطلب .

٢٥١١٨ - **لَوْتُيَة لَحِيَة الْهَبَل** Anthyllis barba Jovis (S). Anthyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter (F). Jove's beard, Jupiter's beard (E). Jupitersbart, Silberbart (D). Antillide, Barba Giova (I).

عشبة برية مرموعة من القرنيات الفراشية تكثر في الاراضي للمحاذ ، ساقها فروع مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها بيضية متقاربة . ازهارها ابطية وطرفية الارتكاز مستحبة العرف ، مغترية .

٢٥١١٩ - **لَوْتُيَة نَافَعَة** ، **حَشِيْشَة الْجِرْح** ، **حَشِيْشَة الدَّب** Anthyllis vulneraria (S). Anthyllide vulnérinaire, Trèfle jaune (F). Kidney-vetch, Layd's vernal (E). Echter Wundklee, Gelber Hasenklee (D). Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie (I).

عشبة برية طيبة مرموعة من فصيلة القرنيات الفراشية ، تكثر في الاربة الرملية القاحلة . ساقها مستقلة . اوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها بيضية متباعدة الارتكاز . ازهارها مستطيلة المالحق صفراء اللون وردية المواج . اوراقها طيبة تلثم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٥١٢٠ - **لَوْتُيسُوم** Lutécium (F). Lutecium (E).٢٥١٢١ - **لَوْتُيْن** Lutéine (F). Lutein (E).٢٥١٢٢ - **لَوْتُ** Essaim (F). Swarm (E).

هو ثول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . اما الثول من الهجرة الاولى فيسمى ديسماً .




لوت



لوتيا لحيه الهبل



لوتيا نافعة



لوتية



لوحس كبريتي

## \* ٢٥١٢٩ - لَوْحَسْ مُدَّهَب \*

Cosmia aurago (S). Cosmie dorée, Calymnie dorée (F). Cosmia aurago (E).

حشرة من الفسقيات حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والافاق واروية. قرايتها جارية قوتها رحيق الازهار. سرتها تمشي على اوراق وبشارق الزان والمائل || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م. بسطتها نحو ٢٣ م. رأسها الى الخطفي المذهب المراج. عيناها كبيرتان. زباناها عظيمان. جوشنها وبطنها الى الصفار المذهب المراج || روثاها الاماميان الى الصفار الكبريتي يملو تقطيع وتبضيع عثاني. روثاها الخلفيان الى الشبهة الثبراء تملوها مشعة تبارج بين الخطفي والاندس || لها جليل واحد في الحول. تظهر القراثة في آب وتبقى حتى اواخر ايلول. تسرح في الليل. تعامل يمد ظهورها بنحو خمسة اسابيع. وتفتح المكن لطلعا مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار غرنوبي اللون، زيتي المراج. رأسها الى الجؤرة. منها الى السمرة. وواجبها الى السمرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي في التربة حيث تنفخ السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

## \* ٢٥١٣٠ - لَوْحَف \*

Parmophorus (S). Parmophore (F). Parmophorus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وحيدات الاجهزة وفضيلة التقبوصات. انواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها البحر الاحمر وبعض البحار الاسيوية. تمشي على المديح قرب الشواطئ || جميعها سرقة وتحتوي النور فتنتفن في الحصىا وتفتح الرمال || اصداها شبه اطليجية الشكل، مقفولة المقدم، مستديرة المؤخر، نائرة التبع، قليلة الانفعاغ، تلتفت كامل الظهر. رؤوسها تنتهي باخظام اسطوانية. لؤاسها شبه مغروطة الشكل. عيونها جاحظة قاعدية. خياشيمها ظهريه الارتكاز تقوم في تجويد خاص يلامس المتق || اشهر انواعه لوفعة البحر الاحمر.

## \* ٢٥١٣١ - لَوْح \*

Cluytia (S). Clutie, Cluytie (F). Cluytia (E). Clutia (D). Clutia (I).

نبات عشبي ليني زيتي من فصيلة السوسيات مهده البلاد الاستوائية. ساقه كدنة، اوراقه خلية بجلة اخضر الاحمل. اذغاره زائفة الالوان البنية || يزرع في المراكن والمصارى.

## \* ٢٥١٣٢ - لَوْحَس \*

Claviger (S). Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة اللوحسيات ورثة غدييات الاجنحة. انواعها المعروفة سبعة اعطائها تمتد من الهند وايوان الى اروبة. تمشي مع بعض انواع التل اصعبها الكبار || اجسامها صغيرة تطول نحو ٣ م. رؤوسها ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرونها الاستشعارية صوبانية. تأثيرها وفكوكها صغيرة. ملاسها نحيلة. كؤاسها صغيرة، شبه بيضيه الشكل. بطونها اجاصية. اغادها قصيرة تلتف ثلث البطن. اثنائها الى الصخرة المساء المتفاوتة المجات || تمشي مع التل في قراه يغذيها ويلبس ما تنفضه مسام بطونها.

## \* ٢٥١٣٣ - لَوْحَسِيَّات \*

Clavigeridae (S). Clavigeridés (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم لانها تعيش في قري التل مع اكثر اجناسها || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها صغيرة، ضيقة، مستطيلة الشكل. عيونها طامسة. قرونها الاستشعارية صوبانية، سداسية الفصل. تأثيرها وفكوكها صغيرة. كؤاسها بيضيه الشكل، صغيرة الحجم. بطونها اجاصية الشكل. اغادها قصيرة تلتف ثلث البطن || تمشي مع التل الذي يلفها بالقلس والذي يلعب ما تنفضه مسام بطونها من مواد مائة || اشهر اجناسها اللوحس.

## \* ٢٥١٣٤ - لَوْر \*

Coregonus lavaretus (S). Lavaret (F). Gwyniad (E).

سمكة نهريه وبحيرية من فصيلة السلمونيات. جسمها اهلجليي الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبها الى الريدة الزرقاء ويلبها مارج فضي وتكت سود تكتنف الظهر من جانبيه. ترغب في المياه المسقية. تسرا في تشرين الثاني. لحمها لذية الطعم جيد الصنف.

## \* ٢٥١٣٥ - لَوْرَاسِيَا \*

Laurasia (F). Laurasia (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على المجموعة القارية التي كانت، قبل تجزئتها، تتألف من آسيا واروية وامريكة الشمالية.

## \* ٢٥١٣٦ - لَوْرَس \*

Mouette (F).

هو زج الماء، اعطيه.

## \* ٢٥١٣٧ - لَوْرُوس \*

Lorocera (S). Lorocère (F). Lorocera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة اللوروسيات ورثة غدييات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها هيفاء تطول من ٧ الى ١٠ م. رؤوسها كبيرة، نائرة. قرونها الاستشعارية عقدية الفصل المجهزة ببعض الهلب المستطيل. اغادها تأثيرها ضلعية. كؤاسها محدودة، منحسورة. ملاسها لاحفة، نحيلة التخديد القاطب. قوائها فطشة، مبعرة الهلب. اثنائها الى السمرة السوداء المتفاوتة المجات || الحشرة الجملانة قانصة، تألف المواقع الرطبة اغصها ضغاث المنائع. البرقة وانجة.

## \* ٢٥١٣٨ - لَوْرُوسِيَّات \*

Loroceridae (S). Lorocérédés (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من رثة غدييات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل، رؤوسها كبيرة. عيونها كبيرة، نائرة. قرونها الاستشعارية وفكوكها مستطيلة الهلب الشالك. تأثيرها بارزة الاطراف الخارجية للمسلكة. براجدها عادمة الزناد. اغادها نحيلة التخديد القاطب الذي يمد ١٢ اخدودا. قوائها معتدلة الطول، مبعرة الهلب || مكها شبه اسطواني الشكل، عجن الطرف الدقيق، تمتصه الاثنى افراديا في التربة. يرقاها سداسية القوام والمقل. حورياتها تنحور في التربة داخلا اوراقه انبوبية الشكل سطوية الرأس والمقل ||



لوحس مذهب



لوحف



لوح



لوروس



لور



لوروس

تعيش على غصان الابر والبجيرات والمناقع . معظم  
انواعها قاصص وبعضها خاضل || اشهر اجناسها اللورس .

٢٥١٤٤ - لورز البربر Olivier du Maroc (F).  
هو الأرقان ، اطلبه .

٢٥١٣٩ - لورنتس Loranthé d'Europe (F).  
هي البتوية ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - لورز الهند Amandier des Indes (F).  
هو الامليلج اللوزي ، اطلبه .



لورسية

٢٥١٤٦ - لورز حلو\* Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار غشوية كبيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الصروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الصروب ذات النواة الطرية الممكن قشها بالاصابع .  
انجار غليظة السوق تملو من ١٢ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدره :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية  
من ٢٣ الى ٢٥ ٪ من المواد الآحية  
وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - لورز مر ، مزج Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشيطة تملو من ٦ الى ١٥ م .  
زراعتها صعبة لانها تستعمل كطعم لضررب اللوز الحلو .  
ثمارها صلبة . لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الحامضية  
اغصانها الابيض الدالين (Amygdaline) التي ينشأ عنها  
الحامض السينيديريني او الحامض البروسي الشديد الفعالية  
السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت  
اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، خصال من  
الناصر السامة . أما الكسب الناجم عن عصره فهو سام  
يمت .

٢٥١٤٨ - لورزة Amande (F). Almond (E).  
هي ثمرة اللوز منها الحلوة والمرة .

٢٥١٤٩ - لورزة الوضاب  
هي اللدة اللامبية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - لوزلية\* Loeselia (S).  
Loesélie (F). Loeselia (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة  
القيصيات معقودة التعريف على اسم العلامة « لورل » .  
هدها بعض مناطق المكسيك . سوقها منتسبة تملو من  
٥٥ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضبة التصل او ستانية .  
ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسنة || انواعها  
المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - لوزلية زرقاء\* Loeselia coerulea (S).  
Loesélie bleue (F).

نوع من الوزلية . عشبة حولية تزيينية ، ساقها تملو من  
٥٠ الى ٧٠ سم . فروعها نحيلة صلبة ، خلية اللحاء .  
اوراقها بيضبة الشكل ، نصلها مسنة الختار . ازهارها  
زرقاء اللون . قناباتها صاملة وسردية || تنويرها صيفي .

٢٥١٤٠ - لورنسية\* Laurencia (S).  
Laurencia (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعها المعروفة  
تحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم || بعضها غشروي  
المادة والبعض الآخر حلاهي . الونان ترواح من الاصفر  
الى الاحمر || بعض انواعها الغشروفية حريفية الطعم  
تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - لوري\* Domicella (S). Lori (F).

جنس طير من الملسقات وفصيلة الببغاوات . انواعها  
المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزية  
والفلبين . ملجتها الحياتي جماعي الا في زين التساند  
والخلاصة . تألف الثبات والمروج وصفات مجاري الماء .  
قوتها حبوب التبجيات والثار || اجسامها مستدلة القد ،  
قرينة الشبه بالهام . اونها متباينة الالوان المراكبة يكثر  
فيها الاحمر الابيضوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق  
فالغلاي . اجنتها ذلقة ، اذنها متوسطة الحجم ،  
مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - لورز Prunus amygdalus (S).  
Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D).  
Mandorlo (I).

جنس اشجار مشمرة برية وزراعية من فصيلة الورديات .  
انواعه اثنان : لورز حلو ولورز مر ، فالحل هو الزراعي  
وهو كثير الصروب والثر هو البري . وبجربة اللوز من  
اي نوع كانت تحمل بذات الشؤفة الجلينة . جذورها  
وتدية تنفوز في التربة على اعماق بعيدة . ساقها مستقيمة  
غشنة . اغصانها منفرجة كثيرة الافناد . افنادها فناء .  
قنتها معتدلة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ،  
معنقة ، رحيمة ، ذلقة . نصلها يبدو اخضر اللون في اول  
عهده ثم ينحرف الى الفحلة ويستقر عليها حتى الذبول  
والايصال . ازهارها ثورية التجميع ، بيضاء اللون ، وردية  
المزاج . تتكون على الافناد الحولية والحولية . وهي تنور في  
اراسل الشتاء فيليلج زهرها ، في لبنان ، خلال الثيرة  
الثانية من شباط وذلك قبل الاوراق ببعض الوقت . ثمارها

لوزية مستطيلة مدببة المقصعة تتكون من غلاف لحمي اخضر  
اللون اطحل البشرة الكثيفة الحبل يحف مع الادراك وهو  
يخصن عجمة غشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون  
جامد المكسر وافر المادة الزيتية || واللوز يتكاثر  
بالبلد ومن المستحسن وضع البذور في مستقرها مباشرة  
دون اللجوء الى المشتال وذلك لان نقل الفرس من المشتل  
الى مستقرها يوجب قطع الجذور التودية العمل الذي  
يتساق مع سويبات هذه الشجرة || وهو يعيش ويزدهر  
في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يؤذي سوى الصقيع لانه  
يسبب اتملاص الزهر او العقد || وهو يحود في جميع  
الآثربة انما يربح المنتسطة الانسجام التي لا تفترق الى  
الكلس كما وانه لا يعمر كثيرا في الآثربة الطينية المنسجة .

٢٥١٤٣ - لورز الالكه\* Cacaoyer (F).  
هو الكاكاو ، اطلبه .



لوري



لوز حلو



لوطس



لوصة



لوطس ارجواني



لوطس اصفر



لوتس فلسطيني



لوطس قرني

نحو ١٠٠ مغطيا نبات عشبي وبمغصا جنبي. اوراقها مركبة، ثلاثية، اذنية، ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مفترية || اكثر انواعها علفية زرعاما الماشية بينها الطليعية العديدة القوائد، اشهرها.

### ٢٥١٦١ - لُوطُس اُرْجَوَانِي \* ، لُوطُس زِرَاعِي حَمَض سَكْرِي

Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpurens (S). Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pois café. (F). Garden winged pea (E). Rote Spargelerbs (D). Loto cultivato, L. rosso, Vacca pisella (I).

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سرولية حولية تملو من ٤٠ الى ١٥٠ سم. ساقها مستقيمة فراء. وريقاتها واذايتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، ابطة الارتكاز، حراء اللون. سنفاتها رباعية الاصلع. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

### ٢٥١٦٢ - لُوطُس اَصْفَر \* Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جذموري من فصيلة النيلوفرينات. جذاميره صفولية نشوية المسادة المأكولة. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة قطرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهاره صفراء اللون عادمة العرف قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. تركز على شمرايح تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

### ٢٥١٦٣ - لُوطُس النيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عَرُوس النيل ، وَرْدَةُ النيل

Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil (F). East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean (E). Lotus blume, Agyptische bohne, Nilililie (D). Loto sacro, Fava del Nilo (I).

نبات عشبي مائي جذموري من فصيلة النيلوفرينات. اعطائه مياه البلاد الحارة الهندية والافريقية. اوراقه زنادية كبيرة مستديرة، نصفها يوم على سطح الماء قطره يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زانداها فيطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ازهاره كبيرة القند وردية اللون قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. وهي ذكية العرف المطري. ثماره كروية الشكل نشوية المادة المأكولة || ازهاره يستمر طول الصيف.

### ٢٥١٦٤ - لُوطُس فِلِسْطِينِي \* ، عَفِيرَة

Lotus palaestinus (S). Lotier de Palestine (F). Four winged pea (E). Garten Spargelerbs (D). Loto di giardino (I).

نوع من اللوطس البري المرموي المعمر. اعطائه تشبه بلاد شرق البحر المتوسط. ساقه متعقبة فراء. ازهاره ابطة وطرفية الارتكاز صفراء اللون. زوره مأكولة تعتبر من المقويات الماددة المفعول الرجعي.

### ٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرْنِي \* ، قَرْنُ العَرَال ، كُنَيْهَة

Lotus corniculatus (S). Lotier corniculé, L. commun, Trèfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule (F). Bird's foot, Bird's-foot trefoil (E). Gemeiner Hornklee, Schotenklee (D). Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica (I).

نوع من اللوطس الطبي البري الطبي المعمر. ساقه متعقبة فراء. ازهاره الى الصفرة الزائفة يعلوها تيجيح احمر، وهو

### ٢٥١٥٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة \*

Loeselia coccinea (S). Loesélia écarlate (F).

نوع من اللوزية. عشبة حولية تزينة. ساقها تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنائية الشكل. نصالها سننة الحمار، بجلة الخصار الاديم. ازهارها قرمزية اللون تطول نحو ٣ سم. قناباتها صاملة || تنورها يستمر طول شهر حزيران.

### ٢٥١٥٣ - لُوزِيَّات

Arbres à noyaux (F).

Stone-plants (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب عجيبات.

### ٢٥١٥٤ - لُوزِيْن \*

اللوزين غلوكوزيد يوجد في لب عجات اللوز المر والدراق والكرز ... اللوزين تموي في الماء وتتحوّل الى غلوكوز وحامض سيانيدريك والدهيد بنزويك. وهي، في معدة الانسان، تتحوّل كما في الماء فتسبب عارض تسم قد يكون مميتاً.

### ٢٥١٥٥ - لُوسِيْت

Leucite

جيم يتكون في ودة الخلايا النباتية. ج. لوسيات.

### ٢٥١٥٦ - لُوتْسَب \*

Otocyon (S). Otocyon, Chien oreillard (F). Otocyon (E).

حيوان لاحم مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة الكلبيات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار. ملجئه الحياتي زوجي || جسمه قريب الشبه بجم اين اوى، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه متدل الجرم و ذلق الخطم. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه عريضتان كيرتان. ذنبه كاذب الثلب. ثوبه الى الكعبة الموضحة بالخطي. قوامه الى الكعبة السوداء. وخاصة الاصابع في القامتين الاماميتين، ورباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والحشرات اغصها الجراد.

### ٢٥١٥٧ - لُوتْمَة \*

Paralepis (S). Paralépis (F).

جنس اسماء بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الدوسميائ. انواعها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تيمشان في البحر الابيض المتوسط وواحدة في بحار التبال || اجسامها وشعبة الشكل، مستطيلة. رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السهف. عيونها كبيرة جاضطة. اعطاهما ربة الاشدق. زانفانها الظهريه كبيرة القند، خلفية الارتكاز. زانفانها الذيلية نازقة || الثواب الى الشبهة القفصية تقيم في الظهر ويعلوها موج يراوح من الوردي الى اليلكي في البطن || لحوبها جيدة الصنف، مغروب تها.

### ٢٥١٥٨ - لُوتُوق \*

Proscollé (F).

اللووق غدة مغنية سائلها شديد الزوجة يلسق الطلع عند السحليات.

### ٢٥١٥٩ - لُوطُس هو الاطلس، اطلبه.

Lotus (S).

Lotier (F). Lotus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفراضية. انواعه

Arum maculé (F).

٢٥١٧٣ - لَوْفُ مُبَعَّع  
هو الاروم ، اطبله .نبات طبي يلثم الجرح وينفع من البواسير . ينفع ازهاره  
يقضي على التهاب العين .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي . مهدد الهند . ساقه تطول من ٣  
الى ٦ امتار . اوراقه شديدة الخضار خاسية او مسباعية  
التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره  
مستطيلة ، عشارية الاصلع البازرة تطول من ١٥ الى  
٣٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ليها شائع الاستعمال .

Lorées (F).

٢٥١٦٦ - لَوْطِيَّات

سبط من فصيلة القرنيات الفراقية ، اشهر اجناسه اللوطس .

٢٥١٦٧ - لَوْطَانِيَّات ، سَبِيْجِيَّات

Loganiaceae (S), Loganiacées (F), Loganiaceae (E).  
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة الفعالات . تشمل  
٣٠ جنساً و ٣٥٠ نوعاً من النباتات الشبية والجانية  
والشجرية . اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة .  
ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الازتكاز . ثمارها كرابل  
مزدوجة ، متفلقة . اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية  
والحارة . معظمها جعالي يحوى بعض النامر السامة  
اخصها السركتين والبروسين .

٢٥١٧٥ - لَوْفِير الصَّنَوْبَر \*  
Lophyrus pini (S).  
Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine  
Kiefernblattwespe (D).

حشرة من المنشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم .  
اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انشاها لمطخة  
بالاصفر ، تحت مكنها على بناتج الصنوبر ينقش عن  
يرقات دقيقة مهمة تلتهم الاهداب النامية وتقضي عليها .

٢٥١٦٨ - لَوْف ، لَيْف ، قَبْلَجُوش

Luffa (S), Louffa, Luffa (F), Towel gourd (E).  
Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة القرعيات .  
انواعها ١٠ منها المناطق الحارة ، بعضها مستطيلة ، حولتها  
منشعبة . اوراقها متعاقبة ، متفكة ، قلبية الشكل ، خاسية  
او مسباعية التفصيص . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة  
القد ، صفراء اللون . ثمارها خيارية الشكل مستطيلة .  
نسجها خشن الليف الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر  
انواعها ما يلي .

٢٥١٦٦ - لَوْقَاس

٢٥١٧٧ - لَوْقَانِيَّات \*

Leucaeniidae (S).  
Leucanilidés (F). Leucanilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجسامها  
وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اعطائها  
العالم . تعيش على الاعشاب البرية والزراعية اخصها  
التجليات .

٢٥١٧٨ - لَوْقَانِيَّة

Leucania (S). Leucanie (F).  
جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقانيات . انواعها  
كثيرة منتشرة في معظم اسواق العالم . اجسامها صغيرة  
القد . وراشها قليلة الزراكش والاهداب يكثر فيها الاسر  
ومشتقاته || اشهرها واضرها لوقائية التجيل .

٢٥١٦٩ - لَوْفُ اسْفُوطَانِي \* ، لَوْفُ مَضْرِي

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppia fabiana (S).  
Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Tor-  
chon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vege-  
table sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D).  
Luffa d'Égypte, Petola, Petuola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من  
٣ الى ٧ امتار . اوراقه خاسية التفصيص الكلوي الشكل .  
ازهاره خاسية الاسدية . ثمار اسطوانية تطول من ١٥ الى  
٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ليها شائع الاستعمال  
المزلي .

٢٥١٧٩ - لَوْقَانِيَّة التَّجِيل \* (دودة الذرة)

Leucania loreyi (S). Leucanie du maïs (F).  
حشرة من اللوقانيات ، طولها نحو ١٧ مم . ثوبها حنطي  
اللون اسمر الموج . وراشها الى السمرة الوردية . رقبها  
دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجؤوة . ثوبها  
حنطي اللون وردي الموج يملو تخطيط اسمر قاطب ويمعرض  
تخلخله نقط سود نظامية الازتكاز || تركيب التجليات  
البرية والزراعية اخصها الذرة والمصان والحنطة فتؤذي  
المصنف وقد تقضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٧٠ - لَوْفُ الْحَبَّة ، أَذُنُ الرَّاهِب

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S). Ser-  
pentaire commune, Gouet serpenteire (F). Common  
dragon, Snake plant, Dragon arum (E).  
Drackenwurz, Schlangenkraut (D). Aro serpone,  
Dragontea, Serpentaria (I).

نبات عشبي ارموي بري وتربسي من فصيلة القلقاسيات .  
اروست عشولية مبطة . اوراقه برتنية مستطيلة الزناد .  
وريقاتها ورتية التيجع ، فصلها ستاني الصفحة الخضراء  
المزركمة والمبججة بالاسمر والاخر والاصفر . شمراخه  
يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينهي بصرعاف يحوق الفبة  
لونه الى الجؤوة المابقة .

٢٥١٧١ - لَوْفُ جَعْد

هو الاروم الايطالي ، اطبله .

٢٥١٨٠ - لَوْقَانِيَّة دِكْسَة \*

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

Leucania impura (E).  
حشرة من فصيلة اللوقانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة .  
موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق  
الداخلية المشاة . فراشها جارة قوتها رقيق الازهار .  
سرقها تعيش على عصف التجليات البرية || جسمها  
متوسط القد بطول نحو ١٤ مم . سبطها نحو ٢٣ مم . رأسها  
اكلس اللون اسمر الموج . عينها كبرتات . زباناها  
خيطيان . جرشها وبعثها الى الكلسه الصهباء الموج ||  
وراشها عند الشقين الى الكلسه تملوها مشعة سمره عند  
الذكر . شهابه عند الانثى || لها جيل واحد في الحول .  
تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في

٢٥١٧٢ - لَوْفُ عُسْطَرِي

Aristolochie serpenteire (F).  
هو الزاروند العباني ، من النباتات الطبية ، اطبله .

لوف اسطواني



لوفير الصنوبر



لوقائية التجيل



لوقائية دسنة



قسين ، القسم المايوي رصاصي الموج ، مبثر الحلب  
الشعشع الشاك ، وقسم سفلي اغبر الموج يعلو تجذيع  
اسود ككتف قواعد الرواجب . رأسها اسود اللون . وراجبها  
سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع  
ينقضي ضمن جراب تعلقه في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التدرج المنولي ، اطله .

٢٥١٨٩ - **لُوماسِيَّة** Lomatia (S). Lomatie (F).  
جنس نباتات جنينية برية وحدائقية من فصيلة الفصيات .  
انواعها المعروفة كثيرة مهددة بالاد امريكية واسرائيلية . سيقها  
افراء . اوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسنة  
والمقرضة . ازهارها عقديوي التجميع ، طرفي ومحوري  
الارتكاز . ازهارها جميلة الشكل ثنائية التركيب لونها  
الى الصغار الاغبر || اشهر انواعها الحداثيقية ما يتبع .



لؤلؤة البسج

٢٥١٩٠ - **لُوماسِيَّة بَهْشِيَّة الورق** Lomatia ilicifolia (S). Lomatie à feuilles de houx (F).  
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها  
بيضيه واهليجية وسنانية الشكل . نصلها اخضر اللون  
على صفحتيه ، مغرض الحلقه او مسنن . عناقيدها الزهرية  
مستطيلة رهله . تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسِيَّة حَدِيدِيَّة** Lomatia ferruginea (S). Lomatie ferrugineuse (F).  
نوع من اللوماسية جنبها تملو من مترين الى ٣ امتار .  
اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريش ، نصلها ماس  
الصفحة العليا خلي السفلى خله حديديي الموج عناقيدها  
الزهرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز .  
تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسِيَّة صِبَاغِيَّة** Lomatia tinctoria (S). Lomatie colorante (F).  
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين . اوراقها  
متوسطة القد لا قياسية التفريش ، نصلها لامع البشرة  
على صفحتيه . عناقيدها الزهرية صغيرة الحجم كثيفة  
التجميع . يزورها صباغية تخضب الماء بالاحمر اللودي .  
تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهَف** \* Serrasmo (S). Serrasme (F).

الواحدة لوهفة . جنس اسماك نهريه من مفتوحات المئاته  
وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر  
وجودها في بعض انهر امريكية الاستوائية || اجسامها  
مبطلة ، بيضيه الشوزن ، متباينة الاحجام . رؤوسها  
مقطوعة ، واسعة الاشداق ، مرصوقة الانسان الحادة .  
اثوابها الى الخضار البحري المتفاوت المواجه تكثر فيه  
الرقة . زعانفها الغليظة فاوقه || تتميز بجسامها الضائقة  
اذ انها تقسم كل ما تشاهده في الماء وكثيراً ما تترق شياك  
الصيادين || لحومها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُويَحِق** هو البازي ، اطله .

٢٥١٩٥ - **لُويَزَه** ، **لُيسِيَّة** Lippia (S). Lippie (F).  
جنس نباتات خشبشوية برية وزينية من فصيلة رعي الحام .  
انواعها زهاء ٩٠ اعطائها المناطق الاستوائية والحارة . اوراقها  
كاملة ، صغرة ، دقيقة السنن . انوعها لا قياسية  
التجميع يكثر فيها السنن والعتكولي || اشهر انواعها  
الزراعية ما يلي .



لوهف

الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان  
لطخاً على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة  
تطول نحو ٤٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، ماس  
القتار تملو نقط سود نظامية الارتكاز . رأسها الى الجوزة  
قوسها حطلي اللون ، احمر الموج يعلو تحطيط احمر قاطب  
ومعترض . مدبها الى السرة . رواجبها سود || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة  
حيث تنفخ السرفة متشعبة بجلباب من الطين .

٢٥١٩١ - **لُولَايَة** Grand Nacré (F).  
فراشة تدعى ارجينيس البراري ، اطلها .

٢٥١٩٢ - **لُوتَب** Vis (F). Screw (E).  
قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مفرضة حائزويًا تستعمل  
في اغراض شتى . اشهر القواب :

لُوب اُرجيس Vis d'Archimède (F).  
لُوب لا نهائي Vis sans fin (F).  
لُوب مضاعف Vis multiple (F).  
لُوب ماس Vis tangente (F).  
لُوب هولندي Vis hollandaise (F).

٢٥١٩٣ - **لُوتَب سُلَامِي** Cycle mérialith (F).  
هو الدودة السلاية ، اطلها .

٢٥١٩٤ - **لُوتِيِي** Spiral (F).

٢٥١٩٥ - **لُولُؤَة** Perle (F).  
هي الدرة . ج لؤلؤ ولؤلؤ .

٢٥١٩٦ - **لُولُؤِيَّات ، مُطَبِّقَة الأَجَنَحَة** Plecoptera (S). Plécoptères (F). Plecoptera, May flies, Ephemeral flies, Shad flies, Lake flies (E). Eintagsfliegen (D).  
رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الاجناح . انواعها عديدة  
زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض المفصائل والاجناس . تتميز بعيوناتها  
القاصرة الثلاثية التركيب وبناتلياق اجنحتها الى الوراء  
عند الراحة والحمود || رقاتها مائية تعيش عالقة على الصخور  
المنمورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولُؤِيَّة البِتَفَسَج** \* Boloria selene (S). Nacré des violettes (F). Boloria selene (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حشرقيات الاجنحة .  
موطنها يشمل الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط  
الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق  
الازهار . سرفتها تعيش على اوراق البسج البري والزراعي ||  
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ سم . يسطها نحو ٣٨ سم .  
رأسها كسني اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانها  
مرشفها دقيق الجرم . جوشنها ويعطها الى الكسني ||  
وراشها عند الشقن الى الصخرة الصناعية يعلوها تجذيع  
وتقيح وتنقيط وتشفه جميعها الى الكسني الحطلي الموج ||  
لها جيولان في الخيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان  
وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب . تسرح في النهار .  
تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتد المكان  
مباحداً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة تطلو  
نحو ٣٢ سم . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة  
الخفسراء يعلوها خطان جانبيين اسودان يفصلان الجسم الى

**٢٥١٩٤ - لوزة سكرتة ، ليبة سكرتة**  
*Lippia dulcis*, *L. asperifolia* (S). Lippie sucré (F).  
 نوع من اللوزة وهي عشبة سرولية ترابية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. ساقها فروع. اوراقها سكرية الطعم ، متقابلة ، معتقة . نصلها يضي الشكل ذلق الزام الاخير يطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها عكوكي التجميع ، ابطي الارتكاز او طرفي . ازهارها صغيرة القذ يضاء اللون فواحة العرف المعطري || تنورها يستمر طوال الصيف .



لوزة ليونيه

**٢٥١٩٧ - لوزة ليونيه ، ليبة ليونيه**  
*Lippia citriodora* (S). Lippie citronnelle, Citronnelle (F). Herb Louisa, Lemon verbena (E). Citronenkraut, Lemonkraut (D). Cedrina, Cetrina, Erba limoncina (I).  
 نوع من اللوزة الترابية وهي جنبه سرولية معمرة تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها منتصبه فروع. اوراقها معتقة ثلاثية او رباعية القمة. نصلها سناني الصفحة يطول من ٨ الى ١٠ سم. || ازهارها هربي الشكل. ازهارها بنفسجية اللون. اوراقها وازهارها فواحة العرف المعطري القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استعمال الشاي || تنورها يستمر من محز الى آب .



لوزة ثورية العقد

**٢٥٢٠١ - لوزة ثورية العقد ، ليبة ثورية العقد**  
*Lippia nodiflora*, *L. canescens* (S). Lippie fleuri aux noeuds (F).  
 نوع من اللوزة وهي عشبة ترابية معمرة . منبها الاصقاع الحارة . ساقها مستقيمة ممددة . قروصها تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها صغيرة القذ ، اهليجية الشكل ، نصلها سنن الحافة . ازهارها عكوكي التجميع ، عقدية الارتكاز. ازهارها صغيرة القذ تملو من ٣ الى ٥ سم. وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلية || تنورها يستمر من ايار الى ايلول .



ليا

**٢٥٢٠٢ - ليا ، قصص ، بلبك**  
*Lamie* (S). Lamie, Touille, Nasilarg, Requin-mar-souin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).  
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من الصفقيات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطلها مخروطي يشرف عل الفم . نياهما ضيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يمتد ويرزق مع اقترابه من شوج الظهر ويتر ويبيض عند البطن || حياتها جاعية سرها براوح من ٥ الى ٢٠٠ زوجا . تألف البعاب الباردة والمعتدة ، ويذهب منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لحمها مأكول . جنت منها واحدة عل الشاطئ الليباني قرب نهر الكلب ، في ضبيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .

**٢٥٢٠٣ - ليا ، قصص ، بلبك**  
*Lamie* (S). Lamie, Touille, Nasilarg, Requin-mar-souin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).  
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من الصفقيات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطلها مخروطي يشرف عل الفم . نياهما ضيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يمتد ويرزق مع اقترابه من شوج الظهر ويتر ويبيض عند البطن || حياتها جاعية سرها براوح من ٥ الى ٢٠٠ زوجا . تألف البعاب الباردة والمعتدة ، ويذهب منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لحمها مأكول . جنت منها واحدة عل الشاطئ الليباني قرب نهر الكلب ، في ضبيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .



ليا

**٢٥٢٠٤ - ليا ، قصص ، بلبك**  
*Lamie* (S). Lamie, Touille, Nasilarg, Requin-mar-souin (F). Lamia, Porbeagle, White shark (E).  
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من الصفقيات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطلها مخروطي يشرف عل الفم . نياهما ضيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يمتد ويرزق مع اقترابه من شوج الظهر ويتر ويبيض عند البطن || حياتها جاعية سرها براوح من ٥ الى ٢٠٠ زوجا . تألف البعاب الباردة والمعتدة ، ويذهب منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لحمها مأكول . جنت منها واحدة عل الشاطئ الليباني قرب نهر الكلب ، في ضبيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .



ليا أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. أوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، فواحة البرق المطر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

### ٢٥٢١٢ - ليبرتيه رشيقة \*

*Libertia pulchella* (S). *Libertia gracieuse* (F).

نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها نحيلة ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها شبه سنانية الشكل تطول من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها شبه عتكوئي التجميع . أزهارها مستطيلة الاذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

### ٢٥٢١٣ - ليبرتيه زرقاء \*

*Libertia coerulescens* (S). *Libertia bleutée* (F).

نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . أزهارها شبه صيرواني التجميع ، سنبل الترتيب . أزهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يعلوها تمسح اطحل || تنويرها صيفي .

### ٢٥٢١٤ - ليبرتيه كبيرة الزهر \*

*Libertia grandiflora* (S).

*Libertia à grandes fleurs* (F).

نوع من الليبرتيه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها كبيرة اللد تطول من ٣٠ إلى ٧٥ سم . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

### ٢٥٢١٥ - ليت

*Erythaea* (S). *Palmier bleu* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلات. أنواعها قليلة ، أصلها البلاد الحارة والاستوائية . أجدها منتصبه مستقيمة . أوراقها مدورة ثنائية . خوصها ثنائي التفلج جامد التصل المنتصب || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

### ٢٥٢١٦ - ليت سرح

*Erythaea edulis*, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).

نوع من اللبت الزراعي . شجرته شجرة تلو من ١٢ إلى ١٥ م . برمتها كثيفة الأوراق . أوراقها مستطيلة الأجزاء كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ١٥٠ إلى ١٨٠ سم . خوصها جامد التصل . جيل الخضار البحري الزاهي . ثمارها بلحية التركيب ، بيضيه الشكل ، صغيرة اللد ، سكرية الطعم ، مأكولة .

### ٢٥٢١٧ - ليت شالك

*Erythaea armata* (S).

*Palmier bleu piquant* (F).

نوع من اللبت الزراعي التريبي . شجرته تلو من ٤ إلى ١٢ م . برمتها معتدلة الكثافة . أوراقها ال الخضار الاذرق الغني المراج . قطرها يراوح من ٥٠ إلى ١٢٠ سم . خوصها جامد التصل ، جرائدها تطول من ٧٠ إلى ١٠٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحسف الاسود المحة .

### ٢٥٢١٨ - ليت

*Spire* (F).

*Single turn*, *Whoral* (E).

اللة دورة الخط الحلزوني .

### ٢٥٢١٩ - ليت

*Lela* (S). *Lela* (F). *Lela* (E).

جنس حشرات من فصيلة المرقصيات وربة ذوات الجنائين . أنواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الممتدة الحارة || أجسامها هيفاء تطول من ٤ إلى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية غيبطة . ملاسها رباعية العقل . مارشها نشيطة . كواسها شبه بيضيه الشكل . بطونها اهليلجية . ألوانها ملونة . رواشها قسطانية التخصيب يعلوها تجمعين وتبيج . قوائمها مستطيلة . ظنايبها مجهزة بمناسق قوية || تألف الحراج والغابات والمروج وصفاف مجاري الماء ، قوتها طلع الأزهار ورحيقها . اساريمها خاضعة او دائمة وبعضها عار .



ليت نافلة

### ٢٥٢٢٠ - ليتا ناطلة \*

*Lytta vesicatoria* (S). *Cantharide du frêne* (F). *Green cantharide* (E). *Spanische Fliege* (D).

حشرة طليقة نافلة من فصيلة الملويدات ، نوبها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطول من ١٥ إلى ٢٥ م . الذكر اصفر قدام من الانثى . مرتمها الاشجار الحرجية انحصا المران وقد تؤذيها بالتهامها أوراق . ريقاتها تميل على بعض النباتات المخرية || كانوا وما زالوا يلتقطونها لتجفيفها وصنعها واستعمال مسحوقها كنافط وناطف .

### ٢٥٢٢١ - ليت ، ليتو

وحدة المكاييل المئوية وهو عبارة عن ديسيمر مكعب . مضاعفاته الديكاليتر (١٠ ليت) والمكوكليتر (١٠٠ ليت) اما اجزائه فهي الليتير والستيليتير والمليتر .

### ٢٥٢٢٢ - ليتشي

*Litchi* (S).

*Litchi*, *Ponceau* (F). *Litchi* (E).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الملويدات. مهدها البلاد الاستوائية الاسوية . انواعها قليلة . أوراقها متعاقبة منعقة اهليلجية . أزهارها على التجميع ، محوري وتاجي الاوتكاز ، أزهارها صغيرة اللد بيضاء اللون . ثمارها ذكية العرف توكل وتستهمل في استحضار بعض الفساديده والمشروبات الروحية || اعرف انواعها وأشهرها ما يلي .

### ٢٥٢٢٣ - ليتشي أصفر \* ، رسيوطان

*Nephelium lappaceum* (S). *Néphélon*, *Ramboutan* (F). *Rambutan*, *Rampostan* (E). *Rampostan-Fruchte* (D). *Nefelio* (I).

نوع من الليتشي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحول شائع الاستعمال في الشرق .

### ٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني \*

*Litchi chinensis* (S). *Litchi de Chine* (F). *Litchi*, *Lee-chee* (E). *Litschibaum* (D). *Litchi* (I).

نوع من الليتشي الصناعي مهد الصين حيث تكثر زراعت الاستنارية . ثماره بيضيه الشكل والحجم حواء اللون مأكولة ويستخرج من عصيرها بعد تخميره وتقطيره قنديد كحولي لاذع شاعط ناشط شائع الاستعمال .

### ٢٥٢٢٥ - ليتو

هي قوبعة الثوندر ، اطلبها .

### ٢٥٢٢٦ - ليتوب \*

*Lithobius* (S). *Lithobie* (F).

*Lithobius* (E). *Brauner Steinkriecher* (D).

جنس دوبيات من فصيلة الليتوبيات . انواعها كثيرة المد



ليتشي اصفر



ليتشي صيني



ليتوب

**أَبُو عَوْفَيْتْ ، أَمْ عَوْفَيْتْ ، أَمْ قَيْسْ**  
Fourmi-lion, Myrméleon (F). Ant-lion, Myrmeleon (E).

جنس حشرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحساسة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشراتها مرتقعة تعيش على رقيق الازهار ، أما دعاميصها ففترسة تصيد الحشرات الصغيرة اغصنها النمل.

Licmetis (S).  
Licmetis (F). Licmetis (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها استراليا ونيبانية وجزر سليمان. تألف الغايات والمواقع الرطبة. ملجأها الحيواني جماعي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والتبصل والمساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها متندلة القد ، تطول من ٤٥ إلى ٥٥ سم. تتميز بمناقيعها المحجنة الذرية التي تطول من ٦ إلى ١٠ سم. ويقتصر اذناها المستديرة الاطراف. انثاؤها الى البياض المجاعي يعاود مولج اصفر او اخضر. يشمل الصفحة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطليان والافنيك. رؤوسها وعارسها وكشاتها الى الحمرة التي تختلف مواجها مع اختلاف الانواع.

Lithium  
٢٥٢٣٤ - **ليثيوم**  
فلزات قلوية توجد في الطبيعة وفي بعض النباتات اغصنها التبغ || وهو ابيض اللون فضي الوجة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوعي ٥٩. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

٢٥٢٣٥ - **ليثيجه**  
Ligia (S). Ligie (F). Ligia (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الظرمبوليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف الشطوط البحرية || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، متندلة التبيط. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحظة. قوتها الاستمارة مستطيلة ، مركبة. ملابسها الشرجية فارة الاطراف المستدقة المستطيلة.

Liche (F).  
٢٥٢٣٦ - **ليشة**  
سمكة بحرية تدعى سمندو ملساء ، اطلمها .

٢٥٢٣٧ - **ليدة**  
Lyda (S). Lyde (F).  
جنس حشرات من المنشاريات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنتها شفافه. ريقاتها مستدقة نهمة تركيب الاشجار الحرجية والمثمرة اغصنها الصنوبر والتوتوب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتقضي عليها || اشهر انواعها واغرها ما يلي .

٢٥٢٣٨ - **ليدة الإجاص**  
Neurotoma flaviventris (S). Lyde du poirier (F). Pear web-spinning sawfly (E). Gesellige Birnblattwespe (D).

نوع من الليدة وحيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع اصفر يجتد من الرأس الى الشرج || ريقها برتقالية اللون ، سوداء الرأس ، عديمة الارجل البطينة تظهر في الربيع . تركيب اوراق الاشجار المثمرة اغصنها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرامز منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

## ٢٥٢٣٧ - لِيْتُوب مَبْدُول

Lithobius forcipathus (S). Lithobie à tenailles (F). Lithobius (E).

دوبية مفترسة مبدولة من فصيلة الليتوبيات ورتبة الدخداخيات شقويات الارجل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المئين القدم والجليد جسمها قريب الشبه بجسم الحريش ، مبسط الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة. الذكر اصغر قدماً من الانثى بطول نحو ٣٥ م. والانثى تطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الحجم ، مستعرض الشكل . عيناها زنجيتان . شيفهاا ضليان ، مقصان ينبتان بكاشتين قويتين . زباناها مستطيلون اعوجان . جرامزها نشطة . ثوبا الى الشقة الحظية المواجه . مدها جبرازها الى الطلحة الثراء || تألف الاراضي الزراعية والملاحة . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والرخويات الصغيرة . غصنها مؤلة لكنها قليلة الاذى .

٢٥٢٣٨ - **ليثوبيات**  
Lithobiidae (S).  
Lithobiidae, Lithobies (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).  
فصيلة دوبيات من الدخداخيات الشقويات الارجل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليتوب .

## ٢٥٢٣٩ - لِيْتُوفَانَة سَمَرَاء

Lithophana semibrunnea (S). Lithophane semibrune (F). Lithophana semibrunnea (E).

حشرة من القشريات حشرشيات الاجنحة. موطنها بعض احراج الشرق الاقصى . فراشتها جارسة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيات . جوشها اسمر اللون ، حطلي المواجه . بطها حطلي اللون اسمر الحيد || روشنها الاماميان الى الحطلي الاسمر يطولها يتبع اسر قاتم . روشنها الخلفيان الى الحطلي الاخير يطولها يتبع اسود في الختار الخاخري . اهدابها حطية || لها جبل واحد في الحيل . تظهر القراشة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتد المكان لطعاً السرفة على الصفحات السفلى من نصال اوراق السديان || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار ، ارمد اللون ، اسمر المواجه يطولها غط ثجي اغير وتسعة خطوط جانبية معترسة صفراء اللون . رأسها مخروطي الشكل ، اسود . مدها ورواجبها الى السرفة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي في التربة حيث تنفخ السرفة ملتصقة بجلياب من العلين .

Lion (F).  
٢٥٢٣٠ - **ليث**  
الليث هو الاسد . ج. ليوث .

٢٥٢٣١ - **ليث** : لبيث : نبات ملتف (اللسان) .

٢٥٢٣٢ - **ليث عفريين** ، **بقرة بيتي إسرائيل** ،



ليثوب مبدول



ليثوفانة سمراء



ليث عفريين



ليث



ليدة الاجاص



ليدة الدراق



ليدرك سوسني العرف



ليدك شتم



ليدك عريان



ليدك مسيك



ليشية

انواعه المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط  
وجزر كثرية || جميعها نباتات نجمية قرعاء . اوراقها  
مركبة ، وقرية ، ثلاثية الوريقات ، وغلقة الشكل .  
ازهارها عقنودية طرفي . ازهارها صفراء اللون وارجوانية .  
ثمراها قرون مبطلة خلية القشار || اشهر انواعه اللذب  
المشعب والليذب اليوناني .

#### ٢٥٢٤٦ - لَيْذَبٌ مُشْعَبٌ

*Adenocarpus divaricatus* (S).  
*Adenocarpe divariqué* (F).

نوع من اللذب . طوي في جبال لبنان . فروعه مزغبة  
الساه . وريقاته الغلظية بيضيه النصال . اما العليا  
فستانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

#### ٢٥٢٤٧ - لَيْذَبٌ يُونَانِي

*Adenocarpus graecus* (S).  
*Adenocarpe de Grèce* (F).

نوع من اللذب . طوي في جرد لبنان . فروعه وكزوس  
ازهاره مزغبة وخلية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

#### ٢٥٢٤٨ - لَيْزُونٌ

هو الأسليخ ، نبات بري طبي ، اطلبه .

#### ٢٥٢٤٩ - لِيرِيودَنْدْرُونٌ

*Liriodendron* (F).

هي شجرة التوليب ، اطلبها .

#### ٢٥٢٥٠ - لَيْسِرٌ

*Lyse* (F). *Lysis* (E).

اسم تعريفي يطلق على الانحلال النسيجي الذي تسببه  
بعض العوامل المعنوية المعروفة باللايزين .

#### ٢٥٢٥١ - لَيْزُولٌ ، لَيْسُولٌ

*Lysol*  
سائل دهني كثيف المادة، جوزي اللون، اسمر الماجة، مركب  
من الكريوزوت والقطران والشحم والصابون . وهو من  
المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

#### ٢٥٢٥٢ - لَيْسِينٌ

*Lysine* (F). *Lysin* (E).

اللايزين مادة عضوية مجهولة الطبيعة تحلك عاصية تذيب  
الكريات الحمر وحجيرات النسيج والبكتريات .

#### ٢٥٢٥٣ - لَيْسَظُونٌ

*Leycesteria* (S).  
*Leycesterie* (F).

جنية معمرة برية وريبتينة من فصيلة الغابيات . منها  
البالد الاسيوية الحارة . ساقها منتصبة قرعاء جواء تملو  
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابطة متعاقبة ، نصلها  
بيضي الشكل ذات الزايم الاخضر يطول نحو ١٦ سم . ويعرض  
نحو ١٠ ازهارها حيلة القالب ، يضاء اللون ، وريضة  
التنحيش . ارجوانية القشابات ، عقنودية التجميع . متدلية .  
ثمراها عنية ججوية || تنويرها يستمر من آب الى ايلول .

#### ٢٥٢٥٤ - لَيْسَنٌ

*Chrysopogon* (S).  
*Chrysopogon* (F).

نبات عشبي بري مرموي حولي من النجيليات . يكثر  
في الاراضي الجبلية المدحاة . وهو من نباتات لبنان الطوعية .

#### ٢٥٢٥٥ - لَيْشِيَّةٌ

*Lichla amia* (S). *Liche amie* (F).  
سمكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليجليي الشكل ،

#### ٢٥٢٥٦ - لَيْشِدَةُ الدَّرَّاقِيْنِ \*

*Neurotoma nemoralis* (S). *Lyde du pêcher* (F).  
*Apple web-spinning sawfly* (E). *Gesellige Pfirsich-*  
*blattwespe*, *Steinobet-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من الليدة وحيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من  
٧ الى ٨ سم . لونها الى البعرة السوداء . رأسها مبضع بالاصفر  
يعطها جمعد بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتع  
مكثها على سلوح الاوراق السفلى فينقث عن ريشات  
منطقة نمة لونها الى الخضرة الغامقة تملوها خطوط سمر  
قائطة ، تركب بعض الاثمار المصرة اخضرها الدراق  
واللوز فتلتهم الاوراق بعد ان تمتطها بنواها المنكبوتي  
الدقيق .

#### ٢٥٢٤٠ - لَيْشِدَّةٌ \* ، لَدَّالَةٌ \* Rhodopaxillus (S).

*Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريفقيات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الغابات والحراج الجبلية .  
تتميز بالوانها الزائجة . جميعها مأكولة مستحبة الطعم  
والعرف || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية :

#### ٢٥٢٤١ - لَيْشِدَّةٌ سُوْسَتِي الْعَرَفِ \*

*Rhodopaxillus irinus* (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المنحلة .  
يوجد عند اطراف الغابات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،  
مستضخمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع ، غبراء اللون .  
ذكتة قلنسوية الشكل ، سوسية العرف ، ليلكيه اللون  
يطولها موج عناني ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها صفراء  
اللون || لحيتها مأكولة ، فاخرة الصنف .

#### ٢٥٢٤٢ - لَيْشِدَّةٌ شَتْمِيَّةٌ \*

*Rhodopaxillus saevus* (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه  
قصيرة ، مستضخمة ، بنفسجية اللون . ذكتة كبيرة القند  
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزده عند  
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيتها جيدة  
الصنف ، مأكولة .

#### ٢٥٢٤٣ - لَيْشِدَّةٌ عَرِيَّانٌ \*

*Rhodopaxillus nudus* (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من الليدك . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه  
معتدلة القلاطة والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليلكيه  
اللون . ذكتة صابجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها  
الى البنفسجي يطولها موج كسني اسفع . اطراسها ليلكيه  
اللون || لحيتها مأكولة فاخرة الصنف .

#### ٢٥٢٤٤ - لَيْشِدَّةٌ مَسِيكٌ \*

*Rhodopaxillus sordidus* (S).

*Rhodopaxille sordide* (F).

نوع من الليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات .  
ساقه معتدلة الجرم بنفسجية اللون . ذكتة منتشرة الصفحة  
المستديرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البنفسجي .  
اطراسها الى الغبرة اليلكيه الموج || لحيتها جيدة الصنف ،  
مأكولة .

#### ٢٥٢٤٥ - لَيْذَبٌ \*

*Adenocarpus* (S).

*Adenocarpe* (F). *Adenocarpus* (E).

جنس نباتات برية وتريبتينة من فصيلة القرنيات الفرائشية .

من عضوية ومعنية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

٢٥٢٦٧ - ليكوريس بهي<sup>٥</sup> Lycoris radiata (S).  
Lycoride rayonnante (F).

نوع من الليكوريس . عشية دوفسية سريرية منبتها الصين واليابان . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل تعرض نحو ٢ سم . نصلها الى الخضر البحري . أزهارها قصيرة الكؤوس منبسطة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الی الحمرة القرمزية يطوقها إطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٦٨ - ليكوريس مذمبي<sup>٥</sup>

Lycoris sanguinea (S). Lycoride rouge-sang (F).  
نوع من الليكوريس . عشية دوفسية سريرية . منبتها اليابان . شراخها يعلو من ٣٥ الى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة نخيلة ، تظهر بعد الازهار ، لونها الی الخضر الالامس . أزهارها معتدلة الجرم تطول من ٤ الى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها الی الحمرة الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٥٢٦٩ - ليكوريس مذهب<sup>٥</sup>

Lycoris aurea (S). Lycoride dorée (F).  
نوع من الليكوريس . عشية دوفسية جاحدة مطلية . منبتها الصين . شراخها يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها قدية الشكل ، نصلها الى الخضر البحري . أزهارها عادمة الريف تطول نحو ٨ سم . لونها الی الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥٢٧٠ - ليكوس<sup>٥</sup>

Lycus (S).  
Lycus (F). Lycus (E).  
جنس حشرات من فصيلة الليكوسيات . وربة مخدات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هيفاء ، تطول من ٧ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . كواسلها ملاسها صغيرة . قرونها الاستشارية خيطية . كواسلها شبه مربعة الشكل . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || الحشرة الجلجلة خاضعة وراشعة ، اما البرقة ففترسة .

٢٥٢٧١ - ليكوسيات<sup>٥</sup>

Lycidae (S).  
Lycidae (F). Lycidae (E).  
فصيلة حشرات من مخدات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبيط ، تطول من ١ الى ١٥ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة . اغمادها لاحفة . رشفة . ارساغها خاسية المعقل || أشهر اجناسها الليكوس .

٢٥٢٧٢ - ليكوفوسيه أرجوانية<sup>٥</sup>

Lycophotia porphyrea (S). Lycophotia pourpre (F).  
Lycophotia porphyrea (E).  
حشرة من الفسقيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كثير القد ، يطول نحو ١٠٠ سم . تتميز بمشطها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزعنفة الظهرية . اعطائها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في العمق . لحمها مأكول متوسط الصنف .

٢٥٢٧٦ - ليقة<sup>٥</sup> Pellicule (F). Pellicle (E).  
الليق : قشر القصب اللازم به . الواحدة ليقة .

٢٥٢٧٧ - ليقييات<sup>٥</sup> Lygaeidae  
فصيلة حشرات من نصفيات الجناح تدعى ايضاً طثريات . اطلبها .

٢٥٢٧٨ - ليف<sup>٥</sup> هو اللوف ، اطلبه .

٢٥٢٧٩ - ليفياني ، ليفي<sup>٥</sup> Filamenteux (F).  
ما كانت نسجه ليفية التركيب . Filamentous (E).

٢٥٢٨٠ - ليقة ، ليف<sup>٥</sup> Fibre (bot.)  
الليف خلايا مستطيلة مريدة الشكل ، خشبية الجدران تجتمع على شكل نسيج ليفي .

٢٥٢٨١ - ليفين<sup>٥</sup> ، بيتسوس<sup>٥</sup> Byssus (F).  
Byssus (E).

مادة ليفية شديدة النعومة تعزرها بعض الرغويات للاتصاق بالصخور المغمورة بالماء . وقد يحاك منها نسيج انم من الحرير لوناً الى الخيطي الذهبي المواج .

٢٥٢٨٢ - ليفي<sup>٥</sup> ، بيتسوسي<sup>٥</sup> Byssogène (F).  
Byssogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالليف كالعدة الليفية وغيرها .

٢٥٢٨٣ - ليفي<sup>٥</sup> Ligneux (F). Ligneous (E).  
نعت تعريفي يطلق على النباتات الخشوية السوق والفروع .

٢٥٢٨٤ - ليفين<sup>٥</sup> Fibrine  
هي الفبرين ، مادة آحية حيوانية او نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيوط بيضاء .

٢٥٢٨٥ - ليكاست<sup>٥</sup> Lycaste (S). Lycaste (F).  
جنس نباتات معمرة تارية او امعية من فصيلة السطليات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المركية التريينية في معظم اقطار المعمورة . سوقها دوفسية تطول من ٤ الى ٨ سم . أوراقها قليلة العدد معتقة ، كبيرة النصال تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . أزهارها وحيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ الى ٢٠ سم . تتركز على شاربين دقيقة ليفية تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم . اللون أزهارها عديدة اكثرا الابيض والاحمر والاصفر والابيض المرقش بالكتني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى اواخر اذار .

٢٥٢٨٦ - ليكوريس<sup>٥</sup> Lycoris (S).  
Lycoride (F). Lycoris (E).

جنس نباتات عشية دوفسية من فصيلة الترسجات . منبتها الصين واليابان . شاربها مصمتة . أوراقها ضيقة النصال . أزهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون او حمراء || تزروع للزين ضمن البيوت وفي الحدائق . قروب في الاتربة المنسوبة التركيب التعصري الوافرة المواد الغذائية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوب ارجوانية

الكورن الرابعة التسعين . بتلاتها رابعة التفصيص . اسديتها ثنائية التركيب . ثمارها جراء ثنائية المصارع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

### ٢٥٢٧٦ - لَيْلُكَ أَرْزُقْ ، لَيْلُكَ مَبْدُول

هو الأغران ، اطلبه .  
Lilas commun (F).

### ٢٥٢٧٧ - لَيْلُكَ أَزْبَحْ

Syringa pubescens (S).  
Lilas pubescent (F).  
نوع من الليك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعها جذوية اللون . اوراقها بيضيه ذرية ، نصلها حلي البشرة على صفحته . ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، ياسمينية العرف المستحب || ازهاره يستمر طوال شهر ايار .



ليكوفوسيه ناهمة

### ٢٥٢٧٨ - لَيْلُكَ حَمَلَايَا

Syringa emodi (S).  
Lilas de l'Himalaya (F).  
نوع من الليك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اهليجية الشكل نصلها اسم المروق ، حلي البشرة الشغل . ازهارها مزينة ، غبراء اللون ، كريمة الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

### ٢٥٢٧٩ - لَيْلُكَ رَيْشِي

Syringa pinnatifolia (S).  
Lilas à feuilles pennées (F).  
نوع من الليك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ريشية . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، نصلها ازغب الصفعة الشغل . ازهارها ودية اللون خاتبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

### ٢٥٢٨٠ - لَيْلُكَ صِينِي

Syringa chinensis (S).  
Lilas de Chine (F).  
نوع من الليك التريبي تجرته تملو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها سنائية النصل مستطيلة الاعناق الجذوية اللون . ازهارها الى البياض الثلجي شكل كريمة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٥٢٨١ - لَيْلُكَ عَرِيضُ الْوَرَق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).  
نوع من الليك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مستعرضة تطول وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها لامع البشرة على صفحته ، شبه الخشخاش الباق . ازهارها ليلية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره قصير الادم يدوم نحو ٢٠ يوما ابتداء من النصف الثاني من نيسان .

### ٢٥٢٨٢ - لَيْلُكَ قَارِصِي

Syringa persica (S).  
Lilas de Perse (F).  
نوع من الليك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . افتادها وانثائها نخلة . اوراقها سنائية ، نصلها جامد الصفعة زاهر الخشخاش يطول نحو ٤ سم . ازهارها بنفسجية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٥٢٨٣ - لَيْلُكَ يَابَانِي

Syringa japonica (S).  
Lilas japonais (F).  
نوع من الليك التريبي ، تجرته تملو من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها سنائية ذرية ، نصلها حلي الصفعة الشغل . بحري اللون ، ازهارها عادمة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قنوها كبير القد يطول نحو ٣٠ سم . ويرض نحو ٢٠ سم . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .



ليك

قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الخلدنجات واخصها السيم || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م .

يسقطها نحو ٣١ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زبانا غيطيان . مرشها معتدل الجرم والعلول . جوشها ويطها الى الكلفة المشيرة بالارجلوي || روشنها الامانيان الى الخمرة الاجوانية تملوها زركشة بيضاء وتزايق سود ورقية حنطية . روشنها الغلفيان الى الكلفة بملوها موج اشخ وحار اسمر يسبق الاهداب البنية || لها جيل واحد في الحول . تظهر . القراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن محابدا على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى الخفسار الاطحل تملوها ثلاثة عطلوط غبراء اللون يتوسطها الجذوي الاسود الموج . رأسها الى الجذوة . مدبا الى الطحلة . رواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينتفي في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

### ٢٥٢٧٣ - لَيْكُوفُوسِيَه نَاهِمَة

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).  
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات حشرقيات الاجنحة . موطنها عند من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية والبلاد الارريقية . فراشتها جارة قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضعة ناهمة تعيش على اوراق النباتات المختلفة من البقول الى النباتات الزراعية والصناعية والزينة والاشجار المشرة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ م . يسقطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زبانا غيطيان . مرشها معتدل الجرم والعلول . جوشها ويطها الى الخشخاش الاسمر الموج || روشنها الامانيان الى الجذوة السنائية الموج تملوها زركشة وتزايق سمراء اللون . روشنها الغلفيان الى البياض الاغبر يطوق حشار حنطي || لها ثلاثة اجيال في الحول . تظهر قراشة الجليل الاول في نيسان وقراشة الجليل الثاني في حزيران وقراشة الجليل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتماطل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتنتج المكن مجموعات متباعدة العدد على الصفحات السفلى من نصال الوراق التي تلتاس التربة || الطور الاسروي يستمر نحو ستة اسابيع في الجليل الاول والثاني ونحو ٢٧ اسبوعا في الجليل الثالث . والسرقة عند ادراكها الكمال الجسوري تطول من ٤٠ الى ٤٥ م . جسمها مستدق المقدم مستطيل المؤخر . قوتها متداخل السرعة والكهية يطعوه غط لبيبي اسود متمرزة نقط صفر . رأسها منقط بالاسود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، ينتفي في التربة ضمن جلباب من الطين .

### ٢٥٢٧٤ - لَيْلُ

Courlison (F). Whimbrel (E).  
الليل هو فرخ الكروان . يقال فلان اجبن من ليل .

### ٢٥٢٧٥ - لَيْلُكَ \* ، لَيْلُج ، لَيْلُج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flider (D). Lilacco, Siringa lilla, Sereenite (I).  
جس نباتات برية وتريبتية من فصيلة الزيتونيات . انواعه عديدة منها الجنبات والاشجار . افتانها واوراقها متقابلة . ازهارها قنوي التجميع ، ناجي الايزكاز . ازهارها قصيرة

الكهباة اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء الموج . وهي من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

## ٢٥٢٨٤ - تَبَيَّات

هي النسيقات ، فصيلة حشرات ، اطلبها .

## ٢٥٢٨٥ - تَبَيَّة

هي النسيقة من الحشرات ، اطلبها .

## ٢٥٢٨٦ - تَبَيَّةُ الْجُنَجُل \* هَيْتَالُ الْجُنَجُلْ

*Hepialus humuli* (S). *Hépiale du houblon*, *Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopfenwurzelbohrer* (D).

حشرة من الليليات ، جسمها غليظ الشكل حنظلي اللون ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . الاثنى اكبر حجما من الذكر . رواشها الى الصفرة الوردية يعولها تقيح احر . رواش الذكر فضية اللون جزوية الاهداب . جيلها الحولي واحد . يكثر وجودها من حزيران الى تموز . تعيش يرقها على جنور الينجل فتلعبا وتؤثيا .

## ٢٥٢٨٧ - تَبَيَّةُ قَارَضَةٍ

هي فراشة النودة القارضة ، راجعها .

## ٢٥٢٨٨ - تَبَيَّة

*Laelia* (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E).

جنس نباتات عشبية اعمية من فصيلة السحليات . شاربها لقياسية الارتفاع . اوراقها سمكية النصال القاسية . ازهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة بعضها عطرى العرف || انواعها المعروفة قليلة ، اشهرها التالية :

## ٢٥٢٨٩ - تَبَيَّةُ خَرَّاشِيَّة

*Laelia furfuracea* (S). *Lélie furfuracée* (F).

نوع من التبيية منبتها المكسيك . ساقها رفيعة تدار نحو ٧٠ سم . اوراقها عديدة اهليلجية النصال الخراشية الصفحات العليا . ازهارها كبيرة القند عطرة ، قطرها نحو ١٢ سم . لوها الى البياض الماجي يعولها في وسطها بقجة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف .

## ٢٥٢٩٠ - تَبَيَّةُ قَرْمَةٍ

*Laelia pumila* (S). *Lélie naine* (F).

نوع من التبيية . ساقها دقة مستطيلة منتصبة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل . زهرها وحيدة كبيرة القند ، وردية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . وهي فواحة العرف الطل ، ترتكز على شراخ يرتفع نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول وتشرين الاول .

## ٢٥٢٩١ - تَبَيَّةُ مُسْتَطِلَّةُ الْإِهَانِ

*Laelia pedunculata* (S).

نوع من التبيية . منبتها المكسيك . ساقها شراخية قصيرة تحمل ورقة واحدة اهليلجية النصل المقطوم الطرف . ازهارها وردية اللون مبتجة بالبنفسجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٥٢٩٢ - لَيْمَنْدَة \*

*Limanda vulgaris* (S).

سمكة بحرية من الملساوات الاجانبات العوم تنتمي الى جنس احساك موسى . جسمها بيضي الشكل مبسط القالب يطول نحو ٣٠ سم . وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وبارتكاز عينيها الواحدة فوق الاخرى على الصفحة اليمنى



لَبَيَّةُ الْجُنَجُل



لَبَيَّةُ خَرَّاشِيَّة



لَيْمَنْدَة



لَيْمُون

## ٢٥٢٩٣ - لَيْمُونُغَالُ عَقَّاس

*Limnogaes mergulus* (S). *Limnogaie plongeur* (F). حيوان لبون حاشر من فصيلة المذاليات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف ضفاف مجاري الماء . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القند مكرهم يطول نحو ٢٦ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم . رأسه فيه مخروفي الشكل مستطيل الخطم . عيناه واذناه صغيرتان . جوارزه قصيرة . جميع اصابعه مخفية مما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشقعة السمراء . وبره دقيق ناعم || الاثنى ثور تقصع في كل رص من ٨ الى ١٠ جراه .

## ٢٥٢٩٤ - لَيْمُونُفِيلِيَّات

*Limnophiliidae* (S). *Limnophiliidés* (F). *Limnophiliidae* (E). فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجم . اثارها تراوح من الطحلة الى السمرة . ملاسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور ، خماسيتها عند الاناث . رثامها موجودة . اجنحتها الامامية رقيقة يعولها بعض الخمل المبتر . قوائمها الامامية معجزة بمنحس ظنبوي الارتكاز . قوائمها الوسطى ثلاثية المناحس || اساريمها تعيش في الماء ملحوقة بمجلايب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمخروطية والمهرمسة والمبطلة . اشهر اجناسها :

*Limnophilus* (S). **الليمونيل**  
*Anabolia* (S). **الانابوليا**  
*Grammotaulius* (S). **الغراموتولوس**  
*Colpotaulius* (S). **الكولتولوس**  
*Mesophylax* (S). **الميزوفيلاكس**  
*Halesus* (S). **الهلسوس**  
*Drusus* (S). **الدروسوس**  
*Enicocla* (S). **العتيل**

## ٢٥٢٩٥ - لَيْمُونُ \*

*Lemur* (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات . انواعها المعروفة اربعة . مهداة مضارب وبرنقات جزيرة مدغشقر . جميعها مستسلمة الشكل ، مستطيلة الاجسام الرشقة والاذنان الجلفة || تألف الغابات . تسرح في الليل او في النهار . قوتها الحشرات والغطاء وتختلف الزخافات والطير والبار .

## ٢٥٢٩٦ - لَيْمُونِيَّات

*Lémuriens*, *Prosimiens* (F). رتبة حيوانات لبونة من القرصيات اللمشيات تشمل ا فصائل تضم بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها صغيرة القند ، رشقة القوام ، مستطيلة الاذنان .

## ٢٥٢٩٧ - لَيْمُونُ

*Citrus* (S). جنس اشجار وتجويرات مشمرة زراعية من الحمضيات . انواعها عديدة اعطائها البلاد الحارة . سويتها منتصبة فراءه ، فناء ، حسقة . اوراقها معتقة ، نصالها مستطيلة لامعة الخضار . ازهارها خنثوية مثنوية عطرة . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . يغلب فيها الاخضر الاصفر



منها الحلوة المأكولة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة . أشهر أنواعها ما يلي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ أَصَالِيَا \* ، بَرْغَمُوت ، زُبُون**  
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamottier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tensitrone (D). Bergamotta (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد . تكثر زراعته الصناعية في بعض سواحل المتوسط اخصها السواحل الإيطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر الربغوت . ثمرته صغيرة القد ، اغصانها منفرجة . اثمارها وولونها خضراء اللون . اوراقها مستطيلة الاضلاع . ازهارها بيضاء اللون ، فواحة العرف المطري . ثمارها برمية الشكل مقطوعة الرأس . قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة . عصارة حمضها حامضة .

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ أَقْنَدِي \* ، يُونُف أَقْنَدِي ، يُونُفِي ، مَنْدَارِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. delictosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المشتهر . غروبها واصرامه عديدة ، مهدا الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة اخصها البحرية . اثمارها صغيرة القد تملو من مَرْن إلى سبعة اثمار . سوقها منتصبة ، اغصانها منفرجة ، اثمارها فناء . اثمارها دقيقة مستطيلة ، اوراقها متعاقبة ، معتقة ، بسيطة . نصلها اهلجيلي الشكل ، ذلق الزام الاخير ، لونه الى الخضرة الباقية . ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها مستديرة منتفخة القطنين ترض من ٥ الى ٧ سم . قشورها متعللة رافعة تفيض لا تلصق بالحمض . وهي غيرة المسود العطرية الذكية العرف . لونها عند الادراك براوح من الاصفر الاخضر المالح الى الاصفر الصناعي الاجر التويج . لباب حمضها مستحب التكهة ، سكري الطعم غني ببعض الحولص الصحية النافعة . (راجع جدول التسومة (Satsuma)) ثمارها زاهية اللون الاصفر الصناعي ، حامدة البذر ، معتدلة العرف والتكهة . ثمرتها متوسطة القد تتحمل الصقيع خاصة اذا كان طعمها ليمون بري || واليوسني رقيق في الارربة العميقة النور ، الحصىة والقليلة الاندماج . متطلباتها الغذائية لا تقل عن متطلبات البرتقال لانه شمه يستوف العناصر العضوية والمعدنية بسرعة .

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ \***

Ximenia americana (S). Ximénie, Prune de mer (F). جنية مشمرة من فصيلة ال زيتونيات . مهدا المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية . ساقها فروع . قشورها اقنية الاثناكز قصيرة القاب . اوراقها متعاقبة ، سنانية النصل الجامد ثمارها خضوية الشكل والقد ، حامدة الطعم ، مأكولة .

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ الْجَنَّةِ \* ، كُورْفُوت ، كُورْفُون**  
Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grapefruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomeli (I).

ضرب من الليمون الهندي الزراعي . ثمرته تملو من ٨ الى ٨ اثمار . ساقها وانفاها قليلة الحسث القصير ، اغصانها فارقة . اثمارها قليلة الكثافة . اوراقها كبيرة القد بيضوية الشكل . ثمارها كثار الليمون الهندي شكله وحجمه ولونها الا انها اجد عصارة واقل مرارة وحوضه وهي توكل مع السكر .

Oranger

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتَقَال**  
هو البرتقال ، اطلبه .

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**

Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان . ثمرته سبروتية صغيرة القد تملو نحو ٣ اثمار . ساقها منتصبة حشفة فروعها . فروعها قليلة الانفرج متوسطة الاتناد والافان . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاتها اهلجيلية النصل المسن المقطوم الطرف . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون خافتة العرف . ثمارها بحجم التفاحة الصغيرة وهي حامدة مرة لا توكل . قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت . وهو شائع الاستعمال كالتارنج لانه يبرز للتطعم نظراً لنشائه ومناعته وسرعة اثماره وقوة احماله الصقيع .

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِص \***

Citrus medica (S). Citronnier, Limonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenitrone (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبروتي . مهد المشرق الهند الصينية وجوارها . غروبها واصرامه عديدة . اثمارها تملو من ٣ الى ٦ اثمار . سوقها وفروعها حشفة . حشفها حاد الحمة يطول نحو ٣ سم . اغصانها فارقة . اثمارها ونوابها موشحة بالبنفسجي . اوراقها متعاقبة معتقة . اثمارها عادمة الجناح ، نصلها بيضيه الصفحة المستطيلة المشارة الحافة . ازهارها خماسية الفصل ، فواحة العرف المطري ، لونها الى البياض تشوبه ماجة أرجوانية . ثمارها بيضيه منتصبة تنتهي بنذلة صغيرة عادمة الطوق . عصارة حمضها حامضة الطعم عادمة المرارة .

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو \***

Citrus aurantium foliola, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone douce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الثمار . ثمرته تملو من ٥ الى ٧ اثمار . ساقها وفروعها حشفة . اغصانها متوسطة الانفرج . اثمارها ونوابها فسقية اللون . اوراقها مجنحة الاعناق . نصلها بيضيه المنتفخة ، معتقة الحافة . ازهارها عطرية ، بيضاء اللون ، صفراء المالح . ثمارها مستديرة تنتهي بحليمه مقطوعة . قشورها ماسية ، باهتة الصفار . حمضها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني .

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كُمُكَات \* ، كُمُكَات ٥**

Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي المشتهر ، مهد اليابان وفرونا ثمرته تشبه ثمره اليوسني ، اوراقها سنانية النصل العباقي الحفصار . ثمارها توكل بكاملها عند الادراك وهي صغيرة الحجم كروية الشكل او مستطيلة . قشورها ماسية صميكة اللباب ، حمضها دقيقة لا تخلو من الحموضة || اقليمه اقليم البري وقد يستزله مناعة واتساعاً اذا طعم على الليمون البري . غروبها المشهورة اثنان المستدير والمستطيل . راجع ككات .



ليمون اضاياي



ليمون افندي



ليمون البحر



ليمون الجنة



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون ككات

٢٥٣٠٧ - **لِيمُون مَالِح \* ، لِيمُون مِصْرِي ،**

**بَشْزَهِير**  
Citrus limonum pusilla (S).  
Limon d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian small lime (E). Ägyptische kleine Limonenzitronen (D). Limone piccolo, Limoncello calabrese (I).

نوع من الليمون الحامض . أصله البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر والهند وبعض المناطق الأمريكية . ثمرته صغيرة القذ تعلو من ٣ إلى ٥ أمتار . اغصانها متعرجة . افتانها خفاء . أوراقها بحرية اللون ، مجنحة الأضلاع ، بيضيه النصل . أزهارها صغيرة القذ بيضاء اللون ، ثمارها صغيرة شبه كروية . قشورها مألسة رقيقة ، حصوصها غزيرة الصارة الشديدة الحموضة .



ليمون مالح

٢٥٣٠٨ - **لِيمُون هِنْدِي \* ، قَرَاكِين**

Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier, Chaddèq tree, Schaddock tree (E). Pampelmusorangenbaum (D). Pompa di Genova, Pompelmo (I).

نوع من الليمون الزراعي ، مهدد المقدر جزر الزايج . ثمرته تعلو من ٥ إلى ١٠ أمتار . ساقها واغصانها حقة . افتانها زباد اللحم . أوراقها كبيرة القذ تعلو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ اضلاعها مجنحة ، نصلها بيضيه جامدة لائمة الخضار . ازهارها عشقودي التجميع يغم من ٦ إلى ١٠ انزار كبيرة القذ ، يضاء اللون ، مستحبة العرف الطعري . ثمارها مستديرة ، منخفضة الرأس والعقب . قشرها براوح من ١٠ إلى ١٥ سم . قشورها مميكة خشنة لونها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة الصارة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٠٩ - **لِيمُونَات ، سِيْتَرَات**

Citrate  
٢٥٣١٠ - **لِيمُونَة**  
Citron (F). Citron, Lemon (E).  
هي ثمرة الليمون الحامض .

٢٥٣١١ - **لِيمُونَة حَنْوَة**

Limette, Lime (F).  
Lime (E).  
هي ثمرة الليمون الحلو .

٢٥٣١٢ - **لِيمُونَة هِنْدِيَة**

Pompoléon, Pométo, Pamplemousse, Chaddock (F).  
هي ثمرة الليمون الهندي اي القراسكين .  
٢٥٣١٣ - **لِيمُونِيْت ٥ ، هِيْمَاتِيْت أَسْمَر ٥**  
Limonite, Hématite brune (F). Limonite, Brown haematite (E).



ليمون هندي

مدن حديدية اسمر اللون يعرف كياويو بأكسيد الحديد الهيدراتي الطبيعي . وزنه براوح من ٣٦ إلى ٤ وصلابته من ٥ إلى ٥٫٥ وهو تسري عدم التبلور والانتظام . اشكاله عديدة اخصها الليمونيت التي اللون والليمونيت البطلل المعروف بالمرق الصفراء والليمونيت الشاكي والليمونيت المحجوب .

٢٥٣١٤ - **لِيمُون الْجِلْد**

Malacoderme (F).  
Malacodermatous (E).  
نعت تمريني يطلق على كل حيوان لين الجلد ان من الرغويات او غيرها .

٢٥٣١٥ - **لِيمُون الْعَظْم**

Ostéomalacie (F).  
Osteomalacia (E).  
شائية تصيب البشر الحلوب سبها نقص في الفسفور يعمد الى قلة نسبه في الاعشاب والاعلاف التي تتجنمها الابقار .

٢٥٣١٦ - **لِيمُونَا الْحَوَز** هي نصارية الحور ، اطلبها .

٢٥٣١٧ - **لِيمُونَات الزَعَانِف**  
Malacoctérygiens (F).  
Malacocterygii (E).  
رتبه من الاسماك .

٢٥٣١٨ - **لِيمُونَات الصَدَف**  
Malacostracées (F).  
Malacostraca (E).  
صفيغ حيوانات من القشريات .

٢٥٣١٩ - **لِيمُونَات الْغِمْد**  
Malacodermes (F).  
Malacoderma (E).  
لمسة من الحشرات الغمدية الاجنحة شلت عن ريقانها لكنونها لينة الأحماد . نصلها عديده اشهرها البراريات .

٢٥٣٢٠ - **لِيمُونَارِيَة ، حَبَابِيْب**  
Linaria (S).  
Linaire (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخنازيريات .

انواعه نحو ١٢٠ منها الاشباب والجنبات الحولية والمعمره . أوراقها واغصانها لا قياسية الشكل والتجميع والانتظام والارتكاز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٣٢١ - **لِيمُونَارِيَة أَرْجَوَانِيَة**

Linaria purpurea (S). Linaire pourpre (F).  
نوع من الليناريه المعمره وهي بجملة جاسده تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها خفيقه خطيه . السفلى منها غميه التجميع والعليا متعاقبه . ازهارها عشقودي ارجوانيه اللون صغيره القذ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٢ - **لِيمُونَارِيَة أَسَلِيَّة**

Linaria spartea (S).  
Linaire jonciforme (F).  
نوع من الليناريه الحولية وهي عشب سريوتي تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها خفيقه مستطيله اسليه الشكل ، السفلى منها غميه التجميع ، أما العليا فتعاقبه وهي بحرية اللون قليلة المدد . ازهارها الى الصفار الباهت ، قواعدها برتقاليه الموج . يزورها نمخده عاده المناح || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٥٣٢٣ - **لِيمُونَارِيَة بَاهِيَة**

Linaria pallida (S).  
Linaire pâle (F).  
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مداده تعلو نحو ٨٠ سم . أوراقها متعاقبه معنقه كبيرة القذ . نصلها مستدير الصفحه ، سباعي الفصوص . ازهارها عطريه العرف تعلو نحو ٢ سم . لونها الى الزرقه الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٤ - **لِيمُونَارِيَة حَرْشَاء ، حَبَابِيْب أَحْرَش**

Linaria elatine (S). Linaire élatine, Muflier élatine, Velvete, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed leaved toad-flax (E). Spiessleinkraut (D). Elatine, Linaria veronica, Veronica femmina (I).  
نوع من الليناريه المعمره وهي بجملة خفاء حرشاء تعلو نحو ٦٠ سم . ترغب في الأثرية الطيبه . أوراقها ستانيه ، خفيقه ، متعاقبه . ازهارها صفراء اللون صغيره القذ . ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٣٢٥ - **لِيمُونَارِيَة خَمْلِيَّة**

Linaria pilosa (S).  
Linaire velue (F).  
نوع من الليناريه المعمره . ساقها مداده تعلو نحو ١٢٠ سم . أوراقها كبيرة القذ كثيره التفصيص . نصلها خلي البشره الحبلل اللون . ازهارها متوسطه القذ لونها الى الزرقه اللينسجيه || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٢٥٣٢١ - لينارية دلماسية

Linaria dalmatica (S). Linaire de Dalmatie (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها لاطئة متعاقبة. نصلها ساني الشكل، مستعرض القاعدة، مجري اللون. أزهارها كبيرة القذ تطلو من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

## ٢٥٣٢٧ - لينارية صناعية ، حجاب الشقوق

Linaria cymbalaria (S). Linaire cymbalaire, Cymbalaire, Ruines de Rome, Lierre des murailles (F). Cymbalaria, Ivy leaved toad-flax, Kenilworth-ivy (E). Zimbelkraut, Gemeines Zimbelkraut (D). Linaria cimbalaria, Rovine di Roma (I).

نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران القديمة. ساقها مستقيمة تطلو نحو ٨٠ سم. أوراقها متعاقبة مستعرضة خاسية الفصوص. نصلها احر الصفرة السفل. أزهارها ليلية اللون صغيرة القذ || أزهارها يستمر من ايار إلى تشرين .

## ٢٥٣٢٨ - لينارية عادية \* ، حجاب مبدل

جوز أرماتيس ، مخلص

Linaria vulgaris (S). Linaire commune, L. vulgaire, Muffler bâtard, Lin sauvage (F). Butter and eggs, Dragon-bushes, Toad-flax (E). Flackskraut, Frauenflachsleinkraut, Leinkraut (D). Linaria comune, Abrotano salvatico, Urinaria (I).

نوع من اللينارية البرية الطيبة المبدولة المعمرة ، تكثر في البور وعلى حافة الطرقات . يمتلأ تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها متعاقبة ، نصلها ضيق الصفرة ثلاثي الورق مجري اللون . أزهارها إلى الصفار الباهت يعلوها عند قواعدها مواج اسف || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول . أوراقها وأزهارها كريمة الرائحة تستعمل ضد البواسير .

## ٢٥٣٢٩ - لينارية كبيرة الزهر

Linaria grandiflora (S). Linaire à grandes fleurs (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٧٠ إلى ١٤٠ سم. أوراقها غنية التجميع ، نصلها خطي الشكل مجري اللون . أزهارها نورية ، كبيرة القذ تطلو نحو ٤ سم. لونها إلى البنفسجي يعلو بتجميع ارجواني وبشعة صفراء . أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول .

## ٢٥٣٣٠ - لينارية كركهانية

Linaria amethystea (S). Linaire améthyste (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشية مثولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها إلى الخضار البحري . أزهارها كركهانية اللون يعلوها عند قواعدها مواج بنفسجي || أزهارها يستمر من تموز إلى آب .

## ٢٥٣٣١ - لينارية مراكشية

Linaria maroccana (S). Linaire marocaine (F).

نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سريرية تملو من ٢٥ إلى ٣٥ سم. أوراقها مدنية لا قياسية التجميع والارتكاز. نصلها خلي البشرة اطلل اللون . أزهارها كبيرة القذ بنفسجية اللون ارجوانية المواج || أزهارها يستمر طولا فصل الصيف .

## ٢٥٣٣٢ - لينارية مقدونية

Linaria macedonica (S). Linaire de Macédoine (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي مجلة سريرية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها لاطئة، نصلها يفضي الشكل ذات الزوايا الأخير . أزهارها مستطيلة الاذن، متوسطة الحجم، لونها إلى الصفرة الزاهية . أزهارها يستمر طولا فصل الصيف .

## ٢٥٣٣٣ - لينارية ورقية

Linaria genistefolia (S). Linaire à feuilles de genêt (F).

نوع من اللينارية المعمرة وهي مجلة سريرية صغيرة القذ تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها لاطئة ، متعاقبة ، نصلها كالزوايا وهو جامد الصفرة مجري اللون . أزهارها متوسطة القذ ، قصيرة الاذن باهتة الصفار || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

## ٢٥٣٣٤ - لينيت ٥ ، لجنتيت

Lignite هو الخشب المتفحم والقحم الاذكن . نوع من الفحم الحجري الحديث العهد المتوسط الصلابة .

## ٢٥٣٣٥ - لينين

Lignine هي اللينين ، المواد الكيماوية الطبيعية ، التي تطلو الصلابة والقوة في النج النباتية الخشبية .

## ٢٥٣٣٦ - ليوت ٥ \*

Alstroemeria ligtu (S).

Liuto (F).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الترجسيات . اصلاته البلاد الامريكية . تكثر زراعته في البيرو والشيلي . درناؤه مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبوب يدعى « شونو » لذية الطعم شائع الاستعمال يقيد المرعى واصحاب المدة والامناء الضعيفة لانه سريع الحضم عادم الانفعال مع اي طعام كان .

## ٢٥٣٣٧ - ليوت عفرين

Myrmelionides (F).

Myrmelionides, Ant-lions (E).

هي المويفيات ، فصيلة حشرات من عصبيات الجناح .

## ٢٥٣٣٨ - ليود ٥ \*

Liods (S).

Liods (F). Liods (E).

جنس حشرات من فصيلة الليوديات ورقية غمديات الاجنحة انواعه المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، اعطائها تشمل معظم اقاليم النصف الشمالي من الكرة الارضية || اجسامها صغيرة ، محدبة ، اهليجية الشكل ، تطلو من ٤ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . ملاسها قصيرة . قربها الاستشعارية صولجانية . كواسلها مستعرضة . اغداها لاحقة ، تحلة التخديد القاطب . قوائمها نشيطة . مهدبة . اثوابها ملونة لامة || تعيش على الفطور الدالة وفي الاعشاب النخرة .

## ٢٥٣٣٩ - ليودييات ٥

Liodidae (S).

Liodidae (F). Liodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، محدبة ، تطلو من ٢ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملاسها قصيرة . قربها الاستشعارية صولجانية . كواسلها



لينارية عادية



ليوت



ليود

فرعاء تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،  
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مألّة الصفحات  
اللامعة . ازهارها علقى التجميع ، طرفي الارتكاز .  
ازهارها بيضاء اللون ، متاكمها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية  
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .



مستعرضة . اغمارها لاحقة . اثلواها ملوئة لماعة || تميش  
عل القطور الذابلة والمنحلة وفي الاخشاب النخوة والدردي  
وتحت اللحاء || اشهر اجناسها اللّسود والليفيل .

٢٥٣٤٠ - لبوفيل بقسيّ الورق °

*Leiophyllum buxifolium* (S).

*Leiophyllum à feuilles de buis* (F).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها



٢٥٣٤٨ - مَات - Diluer (F). To dilute (E).

مات الشيء اذا به . مات الملح في الماء . مات الكلس في الماء .

٢٥٣٤٩ - مَالِيَّة \* Candélabre (F).  
Pyramidal fruit-tree (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المسند ويسمى شمعدان .

٢٥٣٥٠ - مَاجَة ، مَوَاج ، Reflet (F). Reflection (E).

٢٥٣٥١ - مَاجِدَة ٥ ، زَهْرَة المَجْد

Cilanthus (S). Cilanche (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Cilanto (I).  
جنس نباتات زربية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها المعروفة قليلة . اعطانها جزر المحيط الهادي . سوقها مخشوشة ، اوراقها وزرية التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل . سميت زهرة الجدة لان جهالها يمجّد الخالق || اعرف انواعها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - مَاجِدَة بَهِيَّة \* Cilanthus speciosus (S). Cilanche de Dampier (F).

نوع من الماجدة وهي بجلة سرورية تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنانية الشكل . نصلها نام للمس ، ففي البشرة . ازهارها خاسية او سداسية التجميع ، كبيرة القد ، تطول من ٨ الى ١٠ سم . لونها الى الاخمر الابرجواني يطوها عند قاعدة الزهرة بقعة جزوية لامة . ازهارها يستمر طول الصيف .

٢٥٣٥٣ - مَاجِدَة عَاشِيَّة \* Cilanthus punicens (S). Cilanche ponceau (F).

نوع من الماجدة وهي جنبة سرورية عارضة تسلو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشوكة الفروع . وريقاتها اعليجية .

٢٥٣٤١ - مَاء Eau (F). Water (E).

جسم سائل عادم اللون والطعم والرائحة ، ثقله النسبي ١ وزنه الانبوبي ١٨ يجمد عند بلوغه درجة الصفر وما دونها من المقياس الستيرادي وينغل عند بلوغه نحو ١٠٠ مسغ في الضغط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشاراً . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات : حالة بخار في الجو . وحالة جاد في المواقع الباردة فيكون جليداً عند القطبين وتليجا في الجبال العالية . وحالة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كايوناً هو نتيجة تآلف حبيبي يتم بين الاكسجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

٢٥٣٤٢ - مَاء التَجِير Eau résiduaire (F).

Residuum water (E).  
هو الماء الناتج من معاليل السكر والنشا والتقطير .

٢٥٣٤٣ - مَاء الجَنِين Eau fontales (F).

سائل لزج خاص يشتر الجنين في الرحم .

٢٥٣٤٤ - مَاء الرُغْس Eau aux jambes (F).

وصم يصيب الخليل في رصنها وحشيتها فيحدث فيها تشققات تسيل منه مادة مائعة كبرية الرائحة .

٢٥٣٤٥ - مَاء التَّعَابِي ، مَاء التَّجَارِي Eau d'égoûts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والشوارع .

٢٥٣٤٦ - مَاء التَّحَايِش ، مَاء الكُفْ Eau-vannes (F). Sewage (E).

هو خليط من الماء والبول والرجيع الصادر عن الكف .

٢٥٣٤٧ - مَاء التَّزَال Purin (F). Dung-water (E).

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزيل .



مائلة



ماجدية بهية

Substance (matière) (F). **مَادَّةٌ** - ٢٥٣٦٣  
Matter (E).

Article (jur.) **مَادَّةٌ** - ٢٥٣٦٤  
تقسم القوانين والمراسم والقرارات والعقود الى مواد. والمادة هي النص الواضح الشيء المقصود.

Corpus delicti (F). **مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ** - ٢٥٣٦٥  
Corpus delicti (E).  
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفها.

Adjuvant **مَادَخ** - ٢٥٣٦٦  
المواد المادخة، مواد قليلة تصاف الى بعض الادوية او الشحنتات الغذائية فزيد نفعا الغذائي.

Nématocide (F). **مَادُوْدَة** - ٢٥٣٦٧  
Nematocide (E).  
كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية.

Matérialisme (F). **مَادِيَّةٌ** - ٢٥٣٦٨  
Materialism (E).  
المادية مذهب القائلين بان لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وحركة، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحطيل المادة والحركة.

Madi (S). Madi, Madie (F). **مَادِيَّةٌ** \* - ٢٥٣٦٩  
Madi, Tarweed (E). Olmadie (D). Madia (I).  
نبات عشبي ينجم صناعي من فصيلة المركبات، مهدد الاصيل بلاد الشيلي زرع لبزوره التي يستخرج منها مادة دھنية تستعمل في صناعة الصابون. وقد زرع ايضا لاستعمال كسهاد خضري.

**مَادِيّ** - ٢٥٣٧٠  
المادي: السِّلّ الأبيض او الجديد او خالسه.

Capra falconeri (S). **مَارْحُورٌ** \* - ٢٥٣٧١  
Bouquetin markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي بمعنى آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها. وهو نوع من الوعل ضروبه المعروفة اربعة اعطائها اسراج ومقرعات التبت والافغان وكشمير... يتميز باستطالة وانتصاب قرونه الخلزونية الضخيمة. جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويعمل نحو ١٠٠م. الاثنى اصفر جنة وقربا من الكرك. خلفها ثنائي الفرض وهي تقنع من جدي الى جبينين || والمارخور يعيش جماعات اجلها يده من ٢٠ الى ٥٠ و ٧٠ نفراً وهو يتصالب مع الماعز وتناجه تحسب السليلة.

Canna des Indes (F). **مَارْزُونَان** - ٢٥٣٧٢  
هو قننا الهند، اطلبه.

**مَارْزُونَانِيَّاتٌ، قَنُونِيَّاتٌ** - ٢٥٣٧٣  
Cannaceae (S). Cannaceae (F). Cannaceae (E).  
فصيلة نباتية من رحيذات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان.

Enrymère (F). **مَارِغ** - ٢٥٣٧٤  
مارغ او مارقة نمت تمرين يطلق على كل حشرة تركيب النباتات في جميع اعضاءها اخصها الهوائية من الساق الى الورقة والشررة.

نصلها خلي البشرة، حريري الملمس، فضي اللون. ازهارها خماسية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم. لوها الى الاربواني، قاعدة رايها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

Majidae (S). **مَاجِيَّاتٌ** - ٢٥٣٥٤  
Majidés (F). Majidae (E).

فصيلة من القشريات عشاريات الارجل. قشريات الذيل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها مجار البلاد المعروفة الحرارة || اجسامها متباينة القد، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم. تتميز بدروعها المثنية الشائكة الاطراف وملاقطها الكبيرة الضخيمة || بعض انواعها مأكول، مستحب الطعم.

Jaune d'œuf (F). **مَاح** - ٢٥٣٥٥  
Yolk of an egg (E).  
المح: صفرة البيض.

Improductif (F). **مَاحِلٌ، مِمْحَالٌ** - ٢٥٣٥٦  
Unproductive, Idle (E).  
ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط.

Manettia (S). Manettie (F). **مَاحُوزٌ** \* - ٢٥٣٥٧  
جنس نباتات جنينية عارشة معمرة من فصيلة القويات. انواعه قليلة معظمها بري وبعضها زريبي. سوقها دقيقة متشعبة. اوراقها ابيدة متعاقبة متعقبة. ازهارها قمية الشكل محورية الارتكاز او تاجية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

Manettia ignita (S). **مَاحُوزٌ قِرْمِزِيّ** - ٢٥٣٥٨  
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).  
نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة لولبية تطول نحو اربعة امتار. اوراقه اهليجية الشكل، نصلها مقطوم القاعدة ذلق الزام الاخضر. ازهاره محورية وتاجية الارتكاز، قمرزية اللون، لامة الملاج. قطر قمعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

**مَاحُوزٌ قَلْبِيّ الْوَرَق** - ٢٥٣٥٩  
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en coeur (F).

نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار. اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخضر. ازهاره كبيرة القد، ارجوانية اللون السوي، قطر قمعها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

**مَاحُوزٌ مُرْدُوجِ اللَّيْن** - ٢٥٣٦٠  
Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).

نوع من الماحوز الزريبي. ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار. اوراقه سنائية مستطيلة الاضناق، نصلها ذروب القاعدة والطرف. ازهاره قمرزية الانبوب، ارجوانية القسم، صفر الحنار والحافة. قطر اقاعها براوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

Makaire (F). **مَاحِرَّةٌ** - ٢٥٣٦١  
سكة بحرية تدعى سارية، اطلبها.

Amouillante (F). **مَاحِضٌ** - ٢٥٣٦٢  
About to calf (E).

الائى من الحيوان ان حجير او بقره او ناقة او نجة او عن حان وضعها.



ماحوز



مادي



مارخور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. gentil (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellershals (D). Laureola gentile, Blondella, Mezereon (I).

نوع من الدفنة عديد القروب يعلو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه متعاقبة مستطيلة، نصلها مالمس البشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. ازهاره عطرية، خمية التجميع عوروية الارتكاز، تسبق الاوراق. الباثا تختلط مع القروب منها الابيض والآخر والوردي || ثماره عنب لونها الى الحمرة. يستخرج منها ومن الاوراق مادة فعالة سامة يقال ان القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضغط الكل.

Daphné alpestris (F). **مازويون جبلي**  
اطلب دفنة ابية.

Daphné camellée (F). **مازويون مكبس**  
نبات من الدفنة، اطلب دفنة سفيرة.

٢٥٣٨٩ - **مازويون هندي \* ، هرج ، بطريرة ترنات**  
Clitoria ternatea (S).

Clitoria de Ternate (F). Blue clitoria, Butterfly-pea (E). Blau Clitorisblume (D). Fagiolo indiano, Fior celeste (I).

نوع من البطرية من فصيلة القرنيات القرشية. وهو نبات عشبي زراعي متسلق يعلو نحو ٩٠ سم. اوراقه مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضيه لسة ازهاره كبيرة اللد زرقاء اللون تميز بعدم انتظام بتلاتها. وفي تستعمل في الهند لتدوين الرز المطبوع وبعض الحلويات. اما ثماره فسنية دقيقة مستطيلة، بزورها صغيرة مستديرة سمراء اللون.

٢٥٣٩٠ - **مازويونيات**  
Thymelaeaceae (S).  
Thymélacées (F). Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة العتلات. اجناسها وادواها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جبني منه الطبي والصيافي والراتنجي.

٢٥٣٩١ - **مازين**  
Œufs de fourmis (F).  
Eggs of the ants (E).

٢٥٣٩٢ - **مازوت**  
Mazout (F). Oil fuel (E).  
سائل وقود تخرج من تقطير النفط الخام.

٢٥٣٩٣ - **مازور**  
Dacelo (S). Martin-chasseur (F).  
جنس طير من المازوريات. انواعه عديدة اعطائها فسيحة الاجزاء تشل معظم شطوط المحيط الهادي. جميعها مستعرة المتاخر الكبرية المتدلية الصفحة السفلى. اجسامها ربة. اجنتها متندلة الطول، اذناها مستعرة، اصرافها قصيرة وقوية || يالئ الحياة الجاهية. اسرايه تعد من ١٠ الى ١٠٠ || اعرف انواعه واشهرها المازور الجبار.

٢٥٣٩٤ - **مازور جبار \***   
Dacelo gigantea (S).  
Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).

طائر من المازور، قال في الجاهظ: « طائر مبارك يتيمان به اصحاب السفن » طوله يراوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. بسطه نحو ٦٥ سم. ثوبه عايق اللون. رأسه مستطيل الريش اللدلب الاسمر. محصره مستعرة الخط الاسود. ظهره الى السمرة. بطنه الى الصهبة يعلوها مزاج اسود. جناحها الى الزرق العايق. قوادمه الى السواد اللامع. ذنبه الى الجوزة

Dolichotis patagonica (S).

٢٥٣٩٥ - **مازوه \***   
Mara, Lièvre de Patagonie (F).

حيوان لبون قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثردفيات. موطنه الهول والمراي الايركية القائمة بين مندوزا ومضيق ميران || جسمه متوسط اللد طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. راسه صغير اللد. عيانه مستطيلتان اذناه كبيرتان. عنقه طويل. كفله غليظ مستدير. قوائمه رفيعة دقيقة. برائه قوية حادة. ثوبه الى الصهبة الريداء يعلوها توشم ابيض. بطنه عاجي. وبره دقيق وكثيف، تشيد اللعنة، نام الملس || يعيش بجاعات يراوح عدد افرادها من ١٠ الى ٣٠ يسرح في النهار. قوته الاعشاب البرية اخصها النفل || اثناء تقصم مرتين في العام وتنتج كل مرة جرورين. جبره ردهة كبيرة يحفرها عل عمق ١٠٠ سم. مدخلها ويخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار.

٢٥٣٩٦ - **مازوت \* ، شمر الكتب ، بابوتج تسن**  
Maruta (S).

Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).

نبات عشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقحوان يكثر بين الزروع فيصبح من الاعشاب الضارة وهو كرية الرائحة عند اللمس. ازهاره صفراء اللون.

٢٥٣٩٧ - **مازوم ، مازون**  
Marum (F).  
هو صمغ الحر، اطلبه.

٢٥٣٩٨ - **مازيرة**  
Oryx (F).  
هي الارخ، اطلبه.

٢٥٣٩٩ - **مازيرة افريقية**  
Oryx beisa (F).  
هي الارخ الافريقي، اطلبه.

٢٥٣٨٠ - **مازيرة البادية**  
Oryx callotie (F).  
هي ارخ البادية، اطلبه.

٢٥٣٨١ - **مازيرة الجزيرة**  
Oryx beatrix (F).  
هي ارخ الجزيرة، اطلبه.

٢٥٣٨٢ - **مازيرة الصحراء**  
Oryx gazelle, Pagan (F).  
هي ارخ الصحراء، اطلبه.

٢٥٣٨٣ - **مازيرة سودانية**  
Oryx de Nubie (F).  
هي الارخ السوداني، اطلبه.

٢٥٣٨٤ - **مازيريش \***  
Bryopsis (S).  
Bryopsis (F). Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضرة. انواعه المعروفة نحو ٢٥. اعطائها تشل معظم بحار العالم || كلالها صغيرة. سوقها دقيقة، شبه اسطوانية الشكل متتامة الانفاذ المتراكبة الريشية النصال.

٢٥٣٨٥ - **مازكة**  
Nitrière (F). Nitrebed (E).

المكان الذي يصنع فيه الازوت او يتحول فيه الى نترات والماتة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الازوت.

٢٥٣٨٦ - **مازويون \* ، دفنة سامة ، أم**  
Daphné mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-reum officinal (S). Daphné mézéréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - مَاشِيَّة ، بُهْم ، قَتَم ، مَال  
Bétail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).  
الابل والبقر والغنم والماعز . اخصها ما كان منها للسل  
والقنية . سميت ماشية لرعيها وهي تحمي وقيل لكثرة نسائها ،  
ج. موشي .

٢٥٤٠٥ - مَاصَات  
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).  
هي الحفليات الانواع رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - مَاصَّة  
Pipette (F). Pipet (E).  
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل . راجع شفاعة .

٢٥٤٠٧ - مَاصِر  
Enclos (F). Enclosure, Close (E).  
الماصر هو الحاجز تؤصر به الخيل والبقر والمواشي لحصرها  
في مكان معين ومنعها عن ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - مَاصِعة  
البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - مَاصُوع  
Cephalosporium (S).  
جنس فطور مجهرية من الماصوعات وفصيلة الوطيطات .  
انواعه عديدة معظمها ربي يعيش ويتكاثر على المواد  
النباتية المنحلة . امشاجها حزيلة مادة تركب سطوح  
عواثلها .

٢٥٤١٠ - مَاصُوعِيَّات  
Céphasporiées (F).  
Cephalosporieae (E).  
عارة فطور مجهرية من فصيلة الوطيطات . اجناسها ثلاثة  
وهي التريكوذيه والطلوسية والمناشوع .

٢٥٤١١ - مَاصِر  
Acescent  
لعت تمريني يطلق على جميع المواد الممكن ان تحبس .  
فالبقول والثمار والحليب تعتبر من المواد الماصرة لأنها قابلة  
للتحمض .

٢٥٤١٢ - مَاصِر  
Pliqué (F). Sour (E).  
يدعى ماصراً كل مشروب يصير نحو التخليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - مَاطِر ، مُمَطِر ، شَات  
Pluvieux (F).  
Rainy, Wet, Pluvieux (E).

٢٥٤١٤ - مَاعِز  
Ovis capra (S).  
Chèvre (F). Goat (E).  
الماعر للذكر والانثى ج. معز ومعز ومعزى . ويقال  
للذكر تيس والانثى معز . والماعز حيوان مجتر داجن من  
فصيلة التفتيات . انواعه عديدة تمت بذوات الشعر تميزاً  
لها عن ذوات الصوف وهي الغنم . وهي تميز ايضاً بقصر  
اذنانها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق  
الصخور . اناثها اصفر قدماً من ذكورها . ضرورها ثنائية  
الخلف . يحلبها بدوم ١٥٤ يوماً تضع عند تمامه من جدي  
الى ثلاثة جداء . والماعز يربي لحليبهِ وشره . اشهر  
انواعه ما يتبع .

٢٥٤١٥ - مَاعِزِ التَّيْت  
Chèvre de Thibet (F).  
Tibetan goat (E).  
نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم اللب له لكنه يأتي  
بهد الكثير من حيث الجودة .

الحيدة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يألف  
الشطوط ويجاري الماء والادغال ، قوته الاسماك والنظام  
والروز والغار والحشرات والحيات || انشاء تضع من  
٣ الى ٤ بيضات تحضنها ومدها نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - مَازُونِيَّات  
Dacéloniens (F).  
عارة طير من القرلايات تشمل المازور والقيش والقيون  
والهليل . اصطناعها البلاد الاسبوية والافريقية وجزر  
اقيانية || طيورها تتميز بمناقيرها المستعرضة القاعدة ،  
الحفرة الصفحة السفلى ، اللدبية الملقط . ريشها متوسط  
الكثافة ، اثوابها متدلة الزعاج والللمة || تألف الاجراع  
والمناقع والشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها الديندان  
والخشرات والقشريات والاسماك . تدثن في تجاويف جلوج  
واغصان الاشجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - مَاس  
Diamant (F). Diamond (E).  
هو السامور المشقول حررت صفحاته بالنتح .

٢٥٣٩٧ - مَاسِج  
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).  
الماسح والمساح والأرقي هو الذي يمسح الارض فيرسمها  
ويقسم طولها وعرضها الخ .

٢٥٣٩٨ - مَاسِكَة  
Jonchale, Jonchère, Joncherate (F).  
Bed or plantation of rushes (E).  
منقع وما اشبه كثر في الأصل .

٢٥٣٩٩ - مَاش  
ماش المطر الارض : سمحا فهو مطر مثير .

٢٥٤٠٠ - مَاش \* كُشْرِي  
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola,  
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-  
bohne, Schwarzebohne (D). Fagolo a zigzag (I).  
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات  
الفراشية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فراء  
قائمة . اوراقه متعقبة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضيه  
النصل المتجمع المذهب المعقصة . ازغاره ضمية التجميع ،  
زنادية الارتكاز ، صفر اللون ، غضر الموج . ثماره  
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بزوره كروية الشكل  
سمراء اللون او غضراء ملطخة بالاسود . تحوي من العناصر  
الغذائية مسا قدره :

٢٣,٨٠ ٪ من المواد الازوتية  
١,٤٦ ٪ من المواد الدهنية  
٦٢,١٥ ٪ من المواد النشوية

زراعته مروية بيلز عارة على عقير الحنفلة بعد تريض  
المزدود وسحره . يذار الغنم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو  
وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - مَاشِ شَرِي  
Dolic de Chine (F).  
هو الدجر الصيني ، اطلبه .

٢٥٤٠٢ - مَاشُونِيَّات  
Mandibulates (F).  
فئة من المفصليات تشمل الحيوانات المجهرية يتأثير وزباني .  
اشهر صفاتها القشريات والذغذخاقيات والحشرات .

٢٥٤٠٣ - مَاشُوط  
Cheimatable (F).  
حشرة مؤذية تدمي ارضية الشتاء ، اطلبها .



مازور جبار



ماش



ماعز النوية





ماعز انقره



ماعز سوري



ماعز كشمير



ماكلا الفات



ماكلا بونون



ماكلا ريس

وربة التجميع . وريفاتها لا قياسية العدد الذي يراوح من ١٩ إلى ١٩ ، نضلها ايليحي الشكل ، مالب الصفحة العليا خلي السفل . اذهرارها عتقودي التجميع . اذهرارها صفيرة لبد يبيض اللون خضراء الموج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

**٢٥٢٦ - مأكلا** Macacus (S). Macaque (F), Macacos, Macaques (E). Makaken (D). جنس قرد ذئالة من فصيلة المبرسات . انواعه ١٩ ، موطنها تختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اعظامها بارزة اذهارها وسية . قوائمها قوية . اياها طويلة . ذناها لا قياسية . اذها لا تختلف مع الانواع || تعيش جهاات متوسطة او كبيرة العدد . تألف الاجراج والحضاب الصخرية والشطوط . قوتها الثار والحبوب والخشرات والمنع والنعاء والصفاد || انماها جبرا واحدا يبلغ كامل نشاطه بمره سنوات .

**٢٥٢٧ - مأكلا التبت** Macacus thibetanus (S). Macaque du Thibet (F). موطنه احرال التبت الشرقية وبنشورية . جسمه متوسط القد ، رقيق القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه جمل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء زرع عند البطن وتبعق عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تعد من ٦٠ الى ١٢٠ .

**٢٥٢٨ - مأكلا الفات** Macacus silenus (S). Ouanderou (F). Wanderoo (E). موطنه تهاام مليبار والغات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، جمل الشعر المستطيل . حمار وجهه افرق الجبهة ، ابيض اللون || تألف الغابات الكثيفة النائية ، جماعتها تتألف من ذكر وخمس او ست اناث وبعض الصفار .

**٢٥٢٩ - مأكلا بونون** Macacus cynomolgus (S). Macaque de Buffon, M. crabier (F). موطنه مناطق واذغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاجنار ويسبح ويفوص || جسمه بطول نحو ٥٦ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الخطي المنحرف الى الاكعب الاسمر . حمار وجهه اغير البياض . جماعته قليلة العدد تتألف من ذكر وخمس اناث وبعض الصفار .

**٢٥٣٠ - مأكلا ريسيس** \* Macacus rhesus (S). Macaque rhesus, Rhesus (F). Rhesus (E). موطنه فسح الاربعاء يمتد من الهند الى الانام والصين ، جسمه متوسط القد ، صمغوي الشكل ، كثيف الشعر ، بطول نحو ٥٦ سم . ويرتفع نحو ٤٤ . ثوبه الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجؤة مع اقترابه من ثيج الظهر . وجهه واذا الى السرة الصفراء . ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته الثار والحبوب والحشرات يتسلق الاجنار ويسبح ويفوص || يعيش جماعات كبيرة العدد .

**٢٥٣١ - مأكلا شائع** \* Macacus sinicus (S). Macaque commun, Bonnet chinols (F). Bonnet macaque (E). موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الغابات الكثيفة ويغزو الحقول والمزارع والساكر . طوله نحو

**٢٥٤١٦ - ماعز النوبة \*** Chèvre de Nubie (F). Nubian goat (E). نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة اللد تملو من ٦٠ الى ٦٥ سم . يتميز بروثو العجل المفلطحة العادة للحي وبقضية افة الخدود وبقر شعره . الاثني جيدة اللد ، خضرها متوسط الحجم . مجموع درها الحولي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

**٢٥٤١٧ - ماعز انقرة \*** Chèvre d'Angora (F). Angora goat (E). نوع من الماعز المشهور باستمالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والعتق ، غث اللحية موصوف بؤرة شعره الناعم .

**٢٥٤١٨ - ماعز سوري \*** Chèvre de Syrie, Ch. mambrine (F). Syrian goat (E). نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه بطول ٦٠ الى ٧٠ سم . وهو اقلع الرأس ، اكث اللحية ، كثير الاذن للتدلية الفارشة . الاثني جاد الرأس كبيرة الصرع . متوسط مجموع درها الحولي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

**٢٥٤١٩ - ماعز كشمير \*** Chèvre de Cachemire (F). Cashmirian goat (E). نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري الموج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستثمرن شعره .

**٢٥٤٢٠ - ماعز** Miauler (F). To mew (E). ماع السنور : ما ، ومغا .

**٢٥٤٢١ - ماعز** Polycarpique (F). Polycarpic (E). ماعل م . ماعلة نعت تريفني يطلق على كل نبات معمر يزهر ويثمر اكثر من مرة في الحول .

**٢٥٤٢٢ - ماعفوط** Vermicide (F). هو كل مادة تستعمل لقصاء على الديدان .

**٢٥٤٢٣ - ماقبل الحيوان** Protérozoïque (F). Proterozoic (E). اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بلاضافة الى المادراج الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

**٢٥٤٢٤ - ماقبل الكمبري** Précambrien (F). Precambrian (E). اسم يطلق على الاباج البدائي من تاريخ تكوين صفور الارض . وهذا الاباج الطويل الامد ، الذي تم فيه تنسيد الصخور ، والذي يمثل خسة اسداس عمر الارض ، يقسم الى ثلاث حقب : حقبة التكوين ثم الحقبة الصحيحة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

**٢٥٤٢٥ - ماقية** Masckia (S). Masckie (F). نبات معقود التبريف على اسم اليوناني الرومي « ماق » والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب العود اسر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

Rouleau (F). Roll (E).

٢٥٤٤٢ - **مَالِك**  
المالكي والملققة: محدة اسطوانية تستعمل في حذل التربة او تحليتها. راجع ملاءة.

Propriétaire (F).

Proprietor, Owner, Holder (E).

٢٥٤٤٣ - **مَالِك**

هو الذي له حق الملكية.

Héron (F). Heron (E).

٢٥٤٤٤ - **مَالِك الحزين**

هو البيلشون، اطلبه.

Courtillière (F). Mole-cricket (E).

٢٥٤٤٥ - **مَالُوش**

حشرة مؤذية تدعى الحالوش والعنجوس، اطلبيها.

Mammoth

٢٥٤٤٦ - **مَامُوث**

هو الصناجة، اطلها.

Glaucium (S).

٢٥٤٤٧ - **مَامِيْشَا، مَمِيْشَا**

Glaucie, Glaucière (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه قليلة منها الحولية والممرعة، اوراقها حاضرة، متعاقبة، كبيرة القد مفترسة. ازهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع. ثمارها حقبة. يزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية عادمة الحوامض تستعمل في الطب كزيت الخشخاش. وهو ينفع من السمة والروطوبات واسترخاء الجفن وضعف البصر كحلا، والاورام والمفاصل الحادة مزلة ويقطع الدم والاسهال مطلقا. وجهه يسمن جدا وهو يضر للطحال ويصلحه للوز.

٢٥٤٤٨ - **مَامِيْشَا حَمْرَاء، \* حَشَخَشَاف فينيقي**

Glaucium corniculatum (S). Glaucie corne, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).

نوع من الماميشا الحولية ساقها هليبة للحاء تملحو نحو ٥٠ سم. ازهارها حمراء اللون، كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. ثمارها مبعة الحنف، حقبة الشكل، تطلو من ١٠ الى ٢٠ سم. || تزرع للزيت وللاستخراج الزيت من بزورها. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٥٤٤٩ - **مَامِيْشَا صَفْرَاء، \* حَشَخَشَاف مَقْرَن**

Glaucium flavum (S). Glaucie jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Parallo (I).

نوع من الماميشا الحولية. ساقها مرطاة تملحو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها الى الصفراء الذهب. قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم. سقاها مقوس الشكل يطولو من ١٥ الى ٣٠ سم. || ترغب في السواحل الرملية. تزرع للزيت وللاستخراج الزيت من بزورها || ازهارها يستمر من حزيران الى آب || والماميشا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة، قابضة، كانت تستعمل في الاكحال. وتصير زهرا قطرة لليربون.

Curcuma (F).

٢٥٤٥٠ - **مَامِيرَكان**

اطلب كركم صباغي.

Renoncule ficaroides (F).

٢٥٤٥١ - **مَامِيرَكان صغير**

هو الحوذان التبي، اطلبه.

٢٥٤٥٢ - **مَكان** هو القردمان، اطلبه.

٥٠٠ سم. وذنبه ٥٥٠ سم. ثوبه الى الكهبة الخضراء يملوها موج اسمر. وجهه واذناه ويدها الى السمرة العابقة || جماعته تعد من ١٢ الى ٥٠.

٢٥٤٣٢ - **مَأكك مَتُوج \*** Macacus pileatus (S). Macaque couronné (F).

موطنه جزيرة سرنديب. يألف الغابات الكثيفة وينزو الحقل والحدائق. جسمه ربع الوجة. طولُه نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٠ سم. ثوبه الى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن قوائمها الى البياض الاخير. حمار جبهته منتصب الشعر، تاجي الشكل. جماعته تعد من ١٠ الى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - **مَأكك مَمِيُون \*** سَمِير

Macacus nemestrinus (S). Macaque maimon, Singe-cochon (F). Pig tailed macaque (E).

موطنه برمانيه وبلق وجزر الزايج. جسمه يطولو نحو ٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل الخلم. قوائمها قوية وعظيمة، ذنبه مقوس يطولو نحو ١٨ سم. ثوبه الى السمرة يعقب مع اقترابه من ثوب الظهر.

Comestible (F).

Edible, Eatable (E).

٢٥٤٣٤ - **مَأكُول**

هو الصالح للأكل.

Ovicide

٢٥٤٣٥ - **مَأكُون**  
الماكون هو كل دواء يقضي عسل مكن الحشرات، ج. مواكين.

Aristotelia macqui (S).

Maqui de Chili (F).

٢٥٤٣٦ - **مَأكِي**

نوع من الاريتوتيلية، جنسية زراعية من فصيلة اليزونوفيات. ساقها منتصبة تملحو نحو ثلاثة امتار. اقتناها حر السحاب. اوراقها ابيدة، متعاقبة، بيضيه النصال الالامية المسنة الخفاف، تطلو من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٦ سم. ازهارها عنقودي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها عنبية ارجوانية اللون مأكولة تعتبر من المرطبات النافعة.

Machine (F).

Machine, Engine (E).

٢٥٤٣٧ - **مَأكِيْنة**  
كل جهاز آلي هذه الاقتصاد يدعى مأكينة. لذلك فالماكينات كثيرة العدد اشهرها الصناعية والكهربية والزراعية والتجارية.

Biens (F). Weals (E).

٢٥٤٣٨ - **مَال**  
المال ما ملكته من جميع الاشياء. يقال هو المال وبهي المال. قال الشاعر:

«المال تلدي باقوام ذوي حسب»

Malate

٢٥٤٣٩ - **مَالَات**

ملح حمض التفلح.

Maltine (F).

٢٥٤٤٠ - **مَالْتِين**

هي الملتين، اطلها.

٢٥٤٤١ - **مُأَلَفَة**

Blocénose (F). Biocenosis (E).  
منج مسلكي تتبعه بعض الحشرات في كامل دورتها الحياتية او في جزء منها.



مأكك شائع



مأكك متوج



مأكك ميون



ماميشا حمراء



ماميشا صفراء

٢٥٤٥٣ - **مائيس** Pangolin (F).  
جنس حيوانات لبوية من الدرد . اسمها الشائع ام قرق .  
أما مائيس فهو ترجمة الاسم العلمي .

٢٥٤٥٤ - **مانع** Fort (F).  
نمت تمريني يطلق على كل تبغ يتحل بسورة مائة مركزها  
المتصيني دون العالسة وفوق الناطقة .

٢٥٤٥٥ - **مانع** Empêchement (F). Hindrance (E).  
مانع يحول دون اتمام عمل ما كالأزواج مثلاً وذلك لانعدام  
احدى الشرائط القانونية المطلوبة . ولما كان قد يكون :

مانع حاصر Empêchement prohibitif (F).  
Prohibitive hindrance (E).

مانع معطل مانع فاسخ Empêchement dirimant (F).  
Invalidating impediment (E).

٢٥٤٥٦ - **مائور** Menura (S). **مائور** Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).  
جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعه المعروفة ثلاثة ،

اعطائها بلاد استرالية حيث تألف المرحاج والغابات ||  
اجسامها متوسطة القد . مناقيدها قوية ، قليلة الاحديداد  
والتسنين . اجنتها قصيرة . ارسافها متوسطة الطول حبيبية  
البشرة . انقادها جرداء || ذكورها كبيرة الاذناب  
القشيارية الشكل . انثاها عديمة الزينة .  
اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

مائور ألبرتي Menura Alberti (S).

مائور فيكتوريا Menura Victoriae (S).

مائور ميهول Menura superba (S).

نخص منها بالوصف المانور الميهول ، اطلبه .

٢٥٤٥٧ - **مائور مبدول** ، **مائور أليق** ،  
**طائر القشيرة الأليق**

Menura superba (S). Ménure commun, M. superbe, Oiseau-lyre superbe (F).  
نوع من المانور . مهد ارجاج استرالية . جسم الذكر

يطول نحو ٤٥ سم . وذنبه ٦٠ سم . جسم الانثى ، بما فيه  
الذنب ، لا يتجاوز ٦٠ سم . || ثوبه الى اربعة الخطية  
العابقة . افنيكه جويو المرحاج . زور احمر . يطنه الى  
الريدة الرمادية . قوادمه ياباهه ومناكه الى السمرة الخطية  
الحمراد المرحاج . ذنبه قشيري الشكل لونه الى السمرة الخطية  
المجعدة بالريدة الفضية . ثوب الانثى داكن الالوان القليلة  
الزهاء || يألف الارحاج التي تتخللها الصغور والاراضي  
المخساة . يردد جميع اصوات الطير والحيوان ونسبا العواء  
والنباح || قوته الحشرية والدبدان يلتفتلها اينها كانت  
وفي الجفلة التراكمة || يدفن عشه في الادغال او في  
الاجار المخسوة الشائرة على اسنق الادوية . حصنته بيضة  
واحدة ترجها الانثى دين الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

٢٥٤٥٨ - **مائوري** Blade (F).  
سمكة بحرية تدعى حنجلة ، اطلبه .

٢٥٤٥٩ - **مائوريات** Menuridae (S).

فصيلة طير من الجرائم لاقتلت النمل وريقات المنابر .

اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها جبال استرالية



مانور مبدول

٢٥٤٦٢ - **ماهوتيه بهشيه الورق** Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).  
جنبة سبروتية تملو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . وريقات اوراقها

بشيه الشكل تمد من ٣ الى ٩ ، نصلها ضيق الصفحة  
اللامعة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحمر .  
عناقيدها الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها  
يستمر طوال شهر آذار .

٢٥٤٦٣ - **ماهوتيه حزيريه** Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنبة سبروتية فراء تملو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم . وريقات  
التسني الثالث . عناقيدها الزهرية كيفية التجميع تطول  
نحو ٨ سم . ازهارها صفيرة القد سفراء اللون || ازهارها  
يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٦٤ - **ماهوتيه رباعية العروق** Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

مجلة سبروتية مثبونة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . وريقات  
اوراقها تمد من ٩ الى ١٧ ، نصلها باعت الخصار ربابي  
العروق البارزة . عناقيدها الزهرية تطول من ١٠ الى  
٢٠ سم . ازهارها الى الصغار الكبيرتي || ازهارها يستمر  
من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٥ - **ماهوتيه مددكة** Mahonia repens (S). Mahonia rampant (F).

مجلة ركوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقات  
اوراقها تمد من ٣ الى ٧ ، نصلها بيني الشكل ، مقطوم  
القاعدة ، بحري الصفحة المدادة اللمعة . ازهارها الى الصفرة  
السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٦٦ - **ماهوتيه نباتية** Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنبة سبروتية شائعة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات  
اوراقها تمد من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق الصفحة ،  
جبل الخصار اللامع . عناقيدها الزهرية تطول نحو ٣٠ سم .  
ازهارها كبيرة القد مجلة الصغار المذهب || ازهارها  
يستمر طوال فصل الربيع .



ماهوتيه

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤  
معمل لبرش الجذور وتقطيعها او سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥  
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦  
Pilchard (small) (E). المبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرَزَة ، مَبْرَزَة** ٢٥٤٨٧  
هي البزرة ما يزرع من البقول ويختلف النباتات العشبية للحصول على بزورها . ج. مبرزات و بزاري .
- ٢٥٤٨٨ - **مَبْسُوطَة**  
المبسطة او القدم المبسوطة نجم ثير من كوكبية برج التولمين مركزة على الركبة اليسرى من التولم المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩  
Omnivorous (E). نعمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scraper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠  
Oignonière (F). Onionbed (E). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩١  
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْطَرِي** ٢٥٤٩٢  
Duck-pond (E). غدير خص بالبط او غدير حضير لصيد البط البري .
- Melonnière (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٣  
المبطحة حقل الشمام .
- Culture de pastèque (F). **مَبْطَحَة** ٢٥٤٩٤  
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْطَلَة** ٢٥٤٩٥  
Kitchen-garden (E). هي البستان الممد لزراعة الخضار .
- ٢٥٤٩٦ - **مَبْكَار ، مَبْكَال ، مَبْكَور ، مَبْكَر**  
Hatif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات السريع النمو والقريب الادراك .
- Drosomètre (F). **مَبْلَال** ٢٥٤٩٧  
Drosometer (E). المبلال جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سدى وندى في وقت معين ؛ غالبا من الغروب الى الشروق .
- Accrescent ٢٥٤٩٨ - **مَبْتَق**  
نعت تعريفي توصف به يختلف اعضاء الزهرة ، دون المبيض ، التي تتابع نموها بعد الانحصاب .
- Houssale (F). **مَبْهَنْة ، مَبْهَنْة** ٢٥٤٩٩  
Holly-grove (E). منبت البهية .
- Mabouya ponctué ٢٥٥٠٠ - **مَبُونِيَّة مَقْطَعَة**  
هي الحكاة المنشقة ، اطلبا .
- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة يَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧  
Mahonia du Japon (F). جنبه سروتيية فراءه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات أوراقها تعد من ٩ الى ١٩ ؛ تصلها خسيق الصفحة ، ذرب الزام الاخضر ، يطول نحو ١٢ سم . عناقيدها الزهرية معتدلة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . أزهارها متوسطة القد جميلة الصفار الزاهي . أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .
- Métaphysique (F). **مَاهُورَاكِيَّة** ٢٥٤٩٨  
Metaphysics (E). هي الميتافيزيك ، اطلبا .
- Liquide (F). Liquid (E). **مَالَع** ٢٥٤٩٩  
Hydraulique (F). Hydraulic (E). **مَالِي** ٢٥٤٧٠
- Ruche (F). Hive (E). **مَبَاة** ٢٥٤٧١  
لللباة والكوارة والقفير هي مأوى النحل .
- Guâpier (F). **مَبَاة الرُكَايِر** ٢٥٤٧٢  
Wasps' nest (E). هي خلية الزنايبر .
- ٢٥٤٧٣ - **مَبَادِل ، مَبَايِض**  
Coéchangiste, Copermutant (F). Permuteur (E). هو احد الطرفين في عقد البديل او المقايضة .
- Réciprocité (F). Reciprocity (E). **مَبَادِلَة** ٢٥٤٧٤  
هي الاتفاق على موضوع معين .
- Concours (F). Concourse (E). **مَبَارَاة** ٢٥٤٧٥  
هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٤٧٦ - **مَبَارِيَاَت زَرْاعِيَّة**  
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقييم الحكومة والجمعية والتماوين الزراعية توزع فيها الجوائز المالية والشهادات . وهي تتناول الحيوانات والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الغاية منها تشجيع الزراعة بسائر فروعها وتنشيط الجودة والاتقان .
- ٢٥٤٧٧ - **مَبْشَر ، مَبْشَر**  
Cisailles (F). الخضير  
Shears, Clipper (E). مقص كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الافنان الزائدة في جنبات واجنار التريين .
- ٢٥٤٧٨ - **مَبْشَار**  
Evaporimètre (F). مقياس القوة البخرية في الجو .  
Evaporimeter (E).
- ٢٥٤٧٩ - **مَبْشَال**  
Convertible
- ٢٥٤٨٠ - **مَبْشَر**  
Semoir (F). آلة تستعمل في نثر البذار او الاسمدة .  
Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E).
- ٢٥٤٨١ - **مَبْشَرَاش** \*  
Cténioide (F). Ctenoide (E). نعت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو اطرافها الطليقة بعض الاحداط الدرية الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٤٨٢ - **مَبْشَرَاك ، مَبْشَرَاك**  
Fulgurimètre (F). مقياس قوة الكهرباء الجوية .  
Fulgurometer (E).
- ٢٥٤٨٣ - **مَبْشَرَش**  
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تهرش الجذور المسقوليّة كالشوندر والجندر...



مَبْرَشَة حَرْشَقَة الفَرْخ



منع

Divergent ٢٥٥١٥ - مُتَبَاعِد ، مُتَبَاعِدِي قَبَاعِدِي  
ما كان مختلف الاتجاه .

Dissemblable (F). ٢٥٥١٦ - مُتَبَايِن  
Dissimlar (E).

Volatil (F), Volatile (E). ٢٥٥١٧ - مُتَبَقِّر

Fissuré (F), Cracked (E). ٢٥٥١٨ - مُتَبَدِّح

Dispersé (F), Scattered (E). ٢٥٥١٩ - مُتَبَعِّثَر

Touatière (F). ٢٥٥٢٠ - مُتَبَعِّثَة  
كل تربة تزرع تبداً عدة سنوات متتابعة . ج متابع .  
والذي يتماثل زراعة التبغ يدعى تبغاً .

Fenil (F), Hayloft (E). ٢٥٥٢١ - مُتَبَعِّثَة ، مُتَبَعِّثَة  
مقبة لحفظ الحشيش والتبن .

Homoptera (S), Homoptères (F), Homopters (E). ٢٥٥٢٢ - مُتَبَعِّثَة الأَجْنَحَة  
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها وأنواعها  
عديدة معظمها صغير القدر يمتص وبمضها حدى الجناح .  
تطورها تدريجي . أخطامها ثاقبة مامة تمكها من ارتشاف  
النسج . أشهر فصائلها الأرقيات والحماطيات والمغريات  
والزبزيات ...

Pondre (F). ٢٥٥٢٣ - مُتَبَعِّث ، مُتَبَعِّثَة ، مُتَبَعِّثَة  
To lay (E).  
يقال باض الطير ورأ السلك ومنح الحشرات .

Endosmètre (F). ٢٥٥٢٤ - مُتَبَعِّث  
Endosmeter (E).  
مقياس التحال أو التنافذ .

Fossiles (F), Fossils (E). ٢٥٥٢٥ - مُتَبَعِّثَات  
هي الاحافير ، اطباها .

Homofocal ٢٥٥٢٦ - مُتَبَعِّثَة البُؤْرَة

Monadelph (F). ٢٥٥٢٧ - مُتَبَعِّثَة الخُويَطَات  
Monadelphous (E).

Concentrique (F), Concentric (E). ٢٥٥٢٨ - مُتَبَعِّثَة المُرَكَّز ، مُتَبَعِّثَة المُرَكَّز

Gamosepale (F), Gamosepalous (E). ٢٥٥٢٩ - مُتَبَعِّثَة الفَصَلَات ، مُتَبَعِّثَة الكَأْسَات  
صفة الزهرة الملتصبة الفصولات الكأسية .

Gamopétale (F), Gamopetalous (E). ٢٥٥٣٠ - مُتَبَعِّثَة التَّعَالَات ، مُتَبَعِّثَة  
التَّوْبِيَّات ، مُتَبَعِّثَة البَتَلَات  
صفة الزهرة الملتصبة التعلات أي التويجات والبتلات .

Réductible (F), Reducible (E). ٢٥٥٣١ - مُتَبَعِّث  
مكن تحليلة .

Acidifiable (F). ٢٥٥٣٢ - مُتَبَعِّث  
نمت تعريفه يطلق على كل مادة قابلة التميض .

Focometre (F), Focometer (E). ٢٥٥٣٠ - مِثْر  
جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

Ceiller (F). ٢٥٥٣٢ - مِثْرَة  
Cellar, Store-room (E).

Diagramme (F), Diagram (E). ٢٥٥٣٣ - مِثْرَان  
هو البيلال ، اطباها .

Léthifère (F). ٢٥٥٣٤ - مِثْرَان ، مِثْرَان  
Lethiferous, Deadly (E).

Ovalre (F), Ovary (E). ٢٥٥٣٥ - مِثْرَان  
المبيض في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه البيض  
أو البويضات || والمبيض في النبات هو الجزء الأسفل  
المتنفخ من المدة ، يحوى من بويضات ال عدة بويضات  
ويصير ثمرة بعد الانغاص .

Mûrle, Mûrrele (F). ٢٥٥٣٦ - مِثْرَانَة  
Mulberry plantation (E).  
بستان التوت .

Odometre (F), Odometer (E). ٢٥٥٣٧ - مِثْرَان  
آلة تقاس بها المسافة .

Gynécée (F). ٢٥٥٣٨ - مِثْرَان \* ، وَرِيم  
Gynaeceum (E).

Métaldéhyde (F). ٢٥٥٣٩ - مِثْرَان دِهيد  
Metaldehyde (E).  
مادة كهاوية فعالة تستعمل في القضاء على جميع أنواع  
الرغويات التي تركب المزروعات . تحفر بمعدل ٥ %  
وليس أكثر زوجة بالنفالة أو بنشارة الخشب وتنتشر على  
التربة حيث الحزرون والبرايق وغيرها فتقضي عليها جميعها .

Méthane (F), Marsh gas (E). ٢٥٥٤٠ - مِثْرَان  
غاز ملتب عديم اللون .

Phaneroptera fascata (S). ٢٥٥٤١ - مِثْرَان \*  
Phanéroptère (F).  
حشرة من الجنادب وقصيلة القربوطيات . جسمها صغير  
القد ، أخضر اللون ، اسمر النسفة والمشفة ، يطول عند  
الذكور من ١٢ الى ١٥ سم . ويطول عند الإناث من ١٦  
الى ١٨ سم . جناحها بطولان من ٢٠ الى ٢٣ سم . ورياقها  
من ١٨ الى ٢٢ . مرز الاثنى غليظ الحجم احسن الشكل  
يميل الطرف المستدق بطول من ٥ الى ٦ سم . || اناتها  
تحت السرة في حثار الوراواق والمصنف داخل اللون فينفذ  
عن يد نهمه ثرود حافة التصل قبل ان تتمكن من السير  
والنط .

Consistance (F), Consistence (E). ٢٥٥٤٢ - مِثْرَانَة  
Figuerie (F).

٢٥٥٤٣ - مِثْرَانَة  
مئة كرم التين أو المكان الذي تكثر فيه اشجار التين .

٢٥٥٤٤ - مِثْرَانَة  
مئة كرم التين أو المكان الذي تكثر فيه اشجار التين .



مِثْرَان

انواعها المرفوعة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي. تعيش على الصخور المنمورة قرب الشواطئ || اصداؤها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع. سفاط اصداؤها يتطور مع العمر ويصبح كالنفسوة. اجسامها مخروطية. رؤوسها شبه اسطوانية. عيونها قاعدية. لواسها انبوبية قليلة الاستطالة. خياشيمها نظامية. ارجلها وحيدة مبطلطة.

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأَبْعَاد** ٢٥٥٤٨  
Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتِّجَاه** ٢٥٥٤٩  
Isotropic (E).

Equilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأَضلاع** ٢٥٥٥٠  
Equilateral (E).

Equidistant **مُتَسَاوِي البُعد** ٢٥٥٥١

Equiangle, isogonex (F). **مُتَسَاوِي الزَوَايا** ٢٥٥٥٢  
Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل** ٢٥٥٥٣  
Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضَّغْط** ٢٥٥٥٤  
Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضُّلْعَيْن** ٢٥٥٥٥  
Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القُوَّة** ٢٥٥٥٦  
Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيَات الأَرْجُل** ٢٥٥٥٧  
Isopods (F). Isopods (E). Asellin (D).  
رتبة حيوانات من القشريات.

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّقَات** ٢٥٥٥٨  
Climbers (E).

رتبة من الجوزحيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الاشجار. فصائلها عديدة اشهرها البيسارات والبقاقيات والطروغويات والطوقايات والقهقريبات والنقاريات.

Grimpante (F). **مُتَسَلِّقَة** ٢٥٥٥٩  
Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والمارجة هي التي تتميز سوقها عن الانتصاب بدون عائل.

Accipiens **مُتَسَلِّم** ٢٥٥٦٠  
المتسلم أو القايض هو من يقبض المقود عليه أو الملكية.

Homologue (F). Homologous (E). **مُتَسَاوِيَة، مُتَنَاسِب، مُتَنَاطِر** ٢٥٥٦١

Isomère (F). **مُتَسَاوِي الأَجْزَاء** ٢٥٥٦٢  
Isomeric (E).

Isotope (F). **مُتَسَاوِيَة الخَوَاص** ٢٥٥٦٣  
Isotopic (E).

Démagogue (F). **مُتَشَرِّع** ٢٥٥٦٤  
Demagogue (E).

المُتَشَرِّع من يتظاهر بخدمة الشعب لامتلائه اليه.

Lézardé (F). **مُتَشَقِّق، مُنْصَدِّع** ٢٥٥٦٥  
Cracked (E).

Converti (F). Converted (E). **مُتَحَوِّل** ٢٥٥٣٣

٢٥٥٣٤ **مُتَنَج**  
متن الجراد : إذا رز ذنبه وغرزه ليبيض .

Hibernant (F). Hibernating (E). **مُتَحَدِّر** ٢٥٥٣٥  
صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متخدراً باستمرار النوم .

Catométopes (F). **مُتَحَفِّيات** ٢٥٥٣٦  
Catometopa (E).

لغة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى مرتبة قصار الذيل || اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطة . تتميز بدروعها شبه المربعة والقليلة الأحدياب.

Intercalaire (F). Intercalary (E). **مُتَحَدِّل** ٢٥٥٣٧  
صفة الاشياء المتخلطة . راجع بيني .

Interlobaire (F). **مُتَحَدِّل الفُصُوص** ٢٥٥٣٨  
Interlobular (E).

Adaptation **مُتَّحِد** ٢٥٥٣٩  
هو الالاب والالزاب .

Mètre (F). Metre (E). **مِثْر** ٢٥٥٤٠  
وحدة قياسية وضعتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساوياً لجزء واحد من عشرة ملايين جزء التي تولدت زام الحاضرة بين القطب ونقط الاستواء || اجزاء المتر هي الدسيمتر اي عشر المتر، والسنتيمتر اي جزء من مئة، والمليمتر اي جزء من الف . اما مضاعفات المتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار والميكسومتر اي مائة متر والكيلومتر اي الف متر.

Métrier (F). To measure (E). **مِثْر** ٢٥٥٤١  
قاس بالمتر .

Centiare, Mètre carré (F). **مِثْر مَرَبَّع** ٢٥٥٤٢  
Hundreth part of an are (E).

وحدة مساحة يقاسها الطولي والعرضي متر واحد .

Mètre cube (F). **مِثْر مَكْعَب** ٢٥٥٤٣  
Cubic meter (E).

وحدة حجمية يقاسها الطولي والعرضي والارتفاعي متر واحد .

٢٥٥٤٤ **مِثْرَاح**  
نعت تعريفي يطلق على كل حلوب من بقرة ونعجة ومُز وناقة ينقطع ذرها بسرعة . تقول بقرة مُثْرَاح . ج متاربع .

Conjugué (F). **مُتَرَافِق، مُتَوَافِق** ٢٥٥٤٥  
Conjugate (E).

٢٥٥٤٦ **مُتَوَرِّجَات الأَسنان**  
Opotérodontes, Typhlopidae (F). Typhlopidae (E).

مرتبة من الحيات تكون أسنانها إما في الفك الاعلى او في الفك الاسفل .

٢٥٥٤٧ **مُتَوَرِّلَة \***  
Mitrularia (S). Mitrulaire (F). Mitrularia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيادات الاجهزة وعضيلة الهينيسيات .



متولة

هو من يملك الغير تبرعاً سواء هبة في حياته أم بوصية المتلف كوكبة نجوم جنوبية الموقع مشهورة باسم باعية ، بعد مماته .  
اطلها

Amfiteola Homomorphia (E)  $(H^1_{\text{hom}} = 200 \text{ \AA})$  النصل التحين .

فصلية حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
عادات الروس || أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة ،  
جميعها من متحجرات الأياح الثاني . من مميزات حماكة  
الأصداف والتضاربت البين في مصاريحها وأحجامها ||  
أصوف أجناسها وأشهرها الثلثة .

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان أصابعه متماثلة العدد في قوائم الأربعة .

Denticètes, Odontocètes (F).  
Tenderer (E).  
التسديد (E).

٢٥٥٧٢ - مَتَّعَهُدٌ هو الملتزم أو المَقُول .

هو الذي يتعهد تداول الاذن من بائع الى آخر ثم يسوي ٢٥٥٨٨ - مَتَمَاسِك ، مُنْذَمِج Compact الحسابات التي استوجبتها هذه البيوع .

نعت تعريفي شامل يطلق على البكتيريات والميكروبات

One working by the job (E). عامل أجرته منوطة بما يقوم به من عمل.

هو الذي لا يستمر على حال . Discontinuous (E). ٢٥٥٩١ - متن Châtrer (F).

هو في النبات الجزء العلوي من العضو الذكري في الزهرة . واستخرج خصاها .  
راجع النثرة .  
٢٥٥٩٢ - ٢٥٥٩٣

**مُتَكَّ** - ٢٥٥٧٨ Rostre (F), Rostrum (E).  
هو في الحشرة مقدم الرأس عندما يكون على شكل الجمل .  
وهو الأترج أو الكباد .

صفة الازهار الوحيدة الشئ المجردة بسداة ومثبر اي متك . من الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم

Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

محرث ذو مقليين يقلبان التراب يمة ويسارا فتصبح  
انلاما



دون سواها. تلتد في تجاويف الاشجار. اناتها تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران. ذكرتها تتناب مع اناتها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين.

**٢٥٦١١ - مَتَوَقِّلُ الْغَابِ (S). Certhia familiaris (S). Grimpereau des bois (F). Tree-Creeper (E).**

ماتر من المتوقلات. اعطانه تشمل الشرق الادنى واروبى. يأنف المناطق الجبلية واخصها ارجاج التنب والتبرين || جسمه صغير القد بطول نحو ١٤ سم. يسفته نحو ١٦ سم. ثوبه متداخل الالوان. راسه ورداؤه وظهوره وصغره الى الشققة السمراء تعلوها رقشة بيضاء. جناحاه جذعان بالابيض. زوره وصدره وبعته الى البياض العاجي تشوبه مشحة فراء. ذنبه متوسط الطول رتاجي الريش، اسر اللون، اشجع المواج. متفاده بين الاحديداد اسر اللون. رساء قصيرتان صخيتان. مثالبه صبيحة، حادة الاطراف، سوداء اللون || يأنف معطر ارجاج الجريد. يتسلق ساق الشجرة حتى القنة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها متقباً عن الحشرات ويرقاتها ومكبها. طيرانه قصير الشوط وانتقاله على الارض رقصة خرقاء || يدن عشه في تجاويف الاشجار. الانثى تبيض مرتين في الدم الاول في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران. الذكر يتناب الانثى في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين. يبضها عاجي اللون تملوه رقشة جؤوبية تتكاثف عند العقب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكبها لذلك فهو من الطيور الجزئية النفع.

**٢٥٦١٢ - مَتَوَقِّلَات (S). Certhidae (S). Certhidés (F). Certhidae (E).**

فصيلة طير من الجواثم رقيات المناقير. اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة. قوتها الحشرات.

**٢٥٦١٣ - مَتَوَنِي (F). Méténien (F). Metonic (E).** م متن (Métén) اسم علم. نعت تعريفي يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة، تدعى الدورة المتونية، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر. والدورة المتونية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٣٩٧ يوماً و ٧٠ ٪ من اليوم.

**٢٥٦١٤ - مَتَبَّاسِر (F). Lévygyre (F). Levogyrate (E).** ما كان سطح استقطابه متجهاً الى اليسار.

**٢٥٦١٥ - مَتَبَّاسِم (F). Dextrogyre (F). Dextrogyrate (E).** ما كان سطح استقطابه متجهاً الى اليمين.

**٢٥٦١٦ - مَتَبَّزَّة (F). Mutisia (F). Mutisie (F).** جنس نباتات جنينية عمرة عارشة من فصيلة المركبات. انواعها المعروفة ٣٠ اعطائها بلاد امريكا الجنوبية. اوراقها متعاقبة لا قياسية التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تلتبي بمخاوي دقيقة مستطيلة. وريقاتها شائعة متعاقبة. ازهارها كبيرة القد متراكبة اللبسات الثلاثية التسنين. بزورها مخروطية مستطيلة تلتبي بقنازع ريشية || اشهر انواعها التزيينية ما يتبع.

**٢٥٥٩٦ - مَتَبَّبَة (F). Sapinière (F). Fir wood, Fir-grove (E).** مغرس تنوب او حرجية تنوب.

**٢٥٥٩٧ - مَتَبَّبَج (F). Récessif (F). Recessive (E).** نعت تعريفي يطلق على الصفات الوراثية المسودة.

**٢٥٥٩٨ - مَتَبَّبَة (F). Oryx beisa (F).** هي الارغ الافريقي، اعطيه.

**٢٥٥٩٩ - مَتَبَّبَدَج (F). Hydrogéné (F). Hydrogenated (E).** مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين.

**٢٥٦٠٠ - مَتَبَّب (F). Inculpé (F). Défendant, Accused (E).** هو من وقع عليه الاتهام.

**٢٥٦٠١ - مَتَوَازِي، مَتَوَازِي، مَتَوَازِي (F). Parallèle (F). Parallel (E).**

**٢٥٦٠٢ - مَتَوَازِي الْحَرَارَة (F). Isotherme (F). Isotherm (E).** مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة.

**٢٥٦٠٣ - مَتَوَازِي السُّطُوح (F). Parallélopipède, Parallelepiped (E).**

**٢٥٦٠٤ - مَتَوَازِي الْمُسْتَطِيلَات (F). Parallélopipède rectangulaire (F). Rectangular parallelepiped (E).**

**٢٥٦٠٥ - مَتَوَالِيَة، مِرْقَاة (F). Progression** وقد تكون متوالية حسابية.

**٢٥٦٠٦ - مَتَوَالِيَة هندسية (F). Progression arithmétique (F). Arithmetical progression (E).**

**٢٥٦٠٦ - مَتَوَالِيَة هندسية (F). Progression géométrique (F). Geometrical progression (E).**

**٢٥٦٠٦ - مَتَوَالِيَة (F). Matuta (S). Matute (F). Matuta (E).**

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل الاحمرحات وفصيلة الكوكليات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها شواطئ البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافضة الدروع الحمودية المجهرية بسنتين جانبيين كبيرين. ارجلها الخلفية والاسامية ملقية الاطراف. ملاقطها كبيرة ونشطة || عوبها كاعنة الصنف لا تؤكل.

**٢٥٦٠٧ - مَتَوَجَّب، وَاجِب (F). Doit (F). Debit (E).** هو المطلوب من صاحب الحساب.

**٢٥٦٠٨ - مَتَوَسِّطُ الطَّوْلِ (F). Médoligne (F).** نعت تعريفي توصف به بعض سلالات الحيوان والطير كالخيل والابغار والاعظام والمنازع واللجاج المتدلة الطول.

**٢٥٦٠٩ - مَتَوَسِّطُ نِسْبِي (F). Moyenne proportionnelle (F). Geometrical mean (E).** المتوسط النسبي والمتوسط المناسب والمتوسط التناسبي واحد.

**٢٥٦١٠ - مَتَوَقِّل (F). Certhia (S). Grimpereau (F). Tree creeper (E).** جنس طير من فصيلة المتوقلات. انواعه عديدة جميعها نافعة. تألف المناطق الجبلية اعصها الحرجية. قوتها الحشرات



متوة



متوقل



متوقل الغاب



متبزة



levkoje Matthiole (D). Violacclocco (I).

نوع من المتيولا الرّيبينية. ضرورها عديدة، جميعها حولية أو محولة تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فراءه. أوراقها بحرية اللون عنايقدها الزهرية كبيرة القند. أزهارها مكبسة مختلفة الألوان يكثر فيها الأحمر والبني. جميعها فواحة العرف المستحب || أزهارها يستمر طول فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مَكْبَلَة ، المشا ، هو القراش.

Emblavement, Emblavage (F). مَنَارَة

Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبذر وأثير.

Prototype

٢٥٦٢٨ - مَنَارَة

هو السب ، اطلبه.

Vessie (F). Bladder (E). مَكْبَلَة ، مَبْلَكَة

عضو رئيسي في الجهاز البولي. والثانة تتكون من جراب عضلي يستلوي البول ويجمعه بعض الوقت.

Fixateur (F).

Fixing solution (E).

٢٥٦٢٠ - مَبْلَكَة ٥  
نمت تعريف ي يطلق على كل مادة تتميز بخاصة الثبيت. ج مثابت.

٢٥٦٣١ - مَبْلَكَة ٥ ، مَبْلَكَة ٥

Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).

جهاز يستعمل في تقدير اوضاع مستوى البحيرات والاهوار.

Mixtion

٢٥٦٣٢ - مَبْلَكَة  
مشج التي : خلطه.

٢٥٦٣٣ - مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة

Siphon مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة

٢٥٦٣٤ - مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة ، مَبْلَكَة

Siphoneae (S). Siphonées (F). Siphoneae (E).

فصيلة من الخفيات الحفر.

Tarière (F). Auger, Drill (E).

٢٥٦٣٥ - مَبْلَكَة  
هي البريمة ، أداة تستعمل للثقب.

٢٥٦٣٦ - مَبْلَكَة

Trematoda (S). Trématodes (F). Trematoda (E).

صف من الديدان العريضا.

Trypanosoma (S).

Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).

٢٥٦٣٧ - مَبْلَكَة  
حيوانات دنيا طفيلية من الاوالي السوطيات.

Orbicole (F). Orbicol (E).

٢٥٦٣٨ - مَبْلَكَة ٥

نمت تعريف ي يطلق على كل حيوان او نبات يستطيع

الايراد في مختلف اقاليم المعودة.

٢٥٦٣٩ - مَبْلَكَة

Perversité (F). Perversity (E).

المثلية عيب خلقي او فساد في الاخلاق. مثاب الحكم

والقضاء.

٢٥٦١٧ - مَبْلَكَة حَظِيَّةِ الْوَرَقِ

Matutia linearifolia (S). Mutisie à feuilles linéaires (F).

نوع من الميزة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها خطية الشكل. نصالها متفصاة الاطراف تنتهي بجواثق مستطيلة. أزهارها ثنائية السينات ، كبيرة القند ، قمرية اللون || أزهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٥٦١٨ - مَبْلَكَة حَظِيَّةِ الْوَرَقِ

Matutia decurrens (S).

Matutia decurrens (F).

نوع من الميزة ، ساقها دقيقة فراءه تملو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ساعدة كاملة ، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتهي بطفة فراءه || أزهارها برتقالية اللون تملو من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٥٦١٩ - مَبْلَكَة مُسْتَعْرِضَةِ الْوَرَقِ

Matutia latifolia (S). Mutisie à feuilles larges (F).

نوع من الميزة ، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها ساعدة لائفة قلبية الشكل ، نصلها مسن الحافة ثلاثي الأذينات. أزهارها وردية السينات ، صفر الاقراص ، مزينة القلائد ، حافة القنابات الفارشة || أزهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

٢٥٦٢٠ - مَبْلَكَة مَبْلَكَة

Matutia clematicis (S).

Matutia clematicis (F).

نوع من الميزة ، ساقها دقيقة تحيلة تملو من ٦ إلى ١٠ امار. أوراقها مركبة ، وريقاتها شفعية التجميع ثمانية او عشارية الازواج. نصالها اهليجية الشكل ، خلية البشرى. حولها ثلاثية الانشعاب. أزهارها كبيرة القند ، حواء اللون ، مستطيلة الانعاق ، متدلية || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٢١ - مَبْلَكَة ٥

Matisia (S). Matisie (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة النجديات مهددا بعض مناطق امريكا الاستوائية || اشجارها كبيرة داحجة. سوقها منتصبه تملو من ١٢ الى ١٥ م. أوراقها متعاقبة ، معقة. نصالها سنانية الشكل ، جامدة الوثل ، ناشرة العروق السباعية الازواج. أزهارها فسي التجميع. أزهارها مستطيلة الانعاق ، بيضاء اللون ، وردية المواج. ثمارها نووية ، بيضية الشكل ، خماسية الخلود ، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش.

٢٥٦٢٢ - مَبْلَكَة

Matico (F).

هو التامول الضيق الورق.

٢٥٦٢٣ - مَبْلَكَة

Méthylène (F). Methylene (E).

كحول مستطير من الخشب.

٢٥٦٢٤ - مَبْلَكَة

Matthiola (S). Matthiole (F).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة ، معظمها بري منه العسر والحويل والحويل. جميعها قريبة الشبه من الخيري ، سوقها وأوراقها زياء. أزهارها عقودية ، طرية ، ثمارها غردلية ثنائية الخلد. زورها دقيقة مبطلة حنطية اللون.

٢٥٦٢٥ - مَبْلَكَة مَبْلَكَة ٥ ، مَبْلَكَة لَبْلِي

Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giro-

flée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مَبْلَكَة



مَبْلَكَة

Fruiterie (F). Fruit-loft (E). **مُتَمَرَّة** - ٢٥٦٥٤  
المكان المد لحفظ الثمار.

Jardin fruitier (F). **مُتَمَرَّة** - ٢٥٦٥٥  
Orchard, Fruit-garden (E).  
هي بستان الاشجار المثمرة الفاكة .

Octogone (F). Octogon (E). **مُتَمَّن الزَوَايا** - ٢٥٦٥٦

Cystite (F). Cystitis (E). **مُتَن** - ٢٥٦٥٧  
التهاب المثانة او وجعها .

**مُتَنَان** \* ، **كُرْمَدَاكَة** ، **دَفْنَة لاحِفَة** - ٢٥٦٥٨  
Daphne gnidium, Thymelaea hirsuta (S). Daphné gnidium, Garou, Thymelée, Salnbos (F). Gnidium, Spurge flax (E). Purgierstrauch, Rispenblütiger Seidelbast (D). Barbosa, Dittineira, Laureola lupina (I).  
نوع من الدفنة تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروعها مستقيمة عديدة. اوراقها منتصبه لاحفة الفرع والقند. تصلها جلدي التسيج، جامد التركيب، مستطيل القد. ازهارها عنقودية التجميع، هامية الازتكاز، بيضاء اللون، فواحة العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول. يستخرج من لحائها وجذورها واوراقها بعض المواد الفعالة الشائعة الاستعمال الصمي والطبي.

Periculture (F). **مُتَنِيَّة** - ٢٥٦٥٩  
المثنية هي تربية الشمع وغيره من الحمار المغول في احواض خاصة وبناحيات معينة لاستخراج القز الذي يتكون في اجوافها بعد سبع او ثمان سنوات .

**مُتَج** ، **مُتَجَّج** - ٢٥٦٦٠  
حب الماش .

Pigeonneau (F). **مُتَج** - ٢٥٦٦١  
Young pigeon (E).  
المج : فرخ الحمام .

Suc (F). Juice (E). **مُتَجَاة** - ٢٥٦٦٢  
مجانة الشيء : عصارتها .

Culture de noyers (F). **مُتَجَاة** - ٢٥٦٦٣  
الحجازة : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

Champ (F). Field (E). **مُتَجَال** - ٢٥٦٦٤

**مُتَجَال مَغْنَطِيسِي** - ٢٥٦٦٥  
Champ magnétique (F). Magnetic field (E).

Vesicaria (S). **مُتَجَال** \* - ٢٥٦٦٦  
Vésicaire (F). Bladder-pod, Bladder-seed (E). Blasenschötchen (D). Vescicaria (I).  
جنس نباتات عشبية برية وتربيتين من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها حوض البحر المتوسط. وبعض مناطق امريكا الشمالية. سوطها منتصبه وغالباً فردية. اوراقها كاملة متناقة اهلبيجية، تصلها لزع البشرة. ازهارها عنقودية التجميع، طرفية الازتكاز، صفراء اللون او ارشوانية.

Exhibitionniste (F). **مُتَجَالِج** - ٢٥٦٦٧  
Exhibitionist (E).

نمت ترميني يطلق على كل امرء به علة تتسلط على جهازه المبني فتحة وتدفعه على عرض شواره .

Terné (F). Ternate (E). **مُتَلَت** - ٢٥٦٤٠  
نمت ترميني توصف به الاعضاء النباتية الثلاثية الاجزاء او التركيب .

Triangle **مُتَلَت** - ٢٥٦٤١  
شكل هندسي ثلاثي الاضلاع والزوايا .

Tribasique (F). **مُتَلَت الاساس** - ٢٥٦٤٢  
Tribasic (E).  
مثلث الاساس او مثلث القاعدة كل حافض فيه ثلاث ذرات هيدروجينية تستبدل بذرات قاعدية .

Trilatéral (F). **مُتَلَت الاضلاع** - ٢٥٦٤٣  
Trilateral (E).

Triangle austral (F). **مُتَلَت الجنوبي** - ٢٥٦٤٤  
Triangulum australe (E).  
مثلث الجنوب كوكبة نجوم متحدة بين المذبح المربع والحل ومطائر الفردوس والملاويس || نجم الزاوية العليا من المرتبة الثالثة والنجمان الاخران من المرتبة الرابعة .

Triangulaire (F). **مُتَلَت الزوايا** - ٢٥٦٤٥  
Triangular (E).

Triangle boréal (F). **مُتَلَت الشمال** - ٢٥٦٤٦  
Triangulum borealis (E).  
مثلث الشمال كوكبة نجوم متحدة بين ساويس والمرأة المسلسلة والحبل || اجمل نجومها تشكل مثلثاً قائم الزاوية لامساوي الاضلاع .

**مُتَلَت قائم الزوايا** - ٢٥٦٤٧  
Triangle rectangle (F). Right-angled triangle (E).

**مُتَلَت مُتَسَاوي الضلعين** - ٢٥٦٤٨  
Triangle isocèle (F). Isosceles triangle (E).

Glacière (F). **مُتَلَنجة** ، **مُتَلَدَة** - ٢٥٦٤٩  
Ice-house, Freezing-machine, Ice-cave (E).  
المكان المخصص لحفظ الديك . والمكان الجبل المد لحفظ اللحوم والوسائل السريعة الاختيار. وآلة المدة لاصطناع الصقيع .

Sphaerulites (S). **مُتَلَنَة** \* - ٢٥٦٥٠  
Sphérulite (F). Sphaerulites (E)  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المتصلبات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدانها حلزونية الشكل ، مخددة ، متلعة ، تركز على قواعد اسطوانية مجوفة تغلف مع اقترابها من القمة واطراف الجملون .

Fongible (F). Fungible (E). **مُتَلِي** - ٢٥٦٥١  
المتليات او الاشياء المتلية هي كل موزون او مقيس او مكيل يصلح بعضه بديل من البعض الاخر . وان لم تكن كذلك فهي قيمة (Non Fongibles).

Fructifère (F). Fructiferous (E). **مُتَمِر** - ٢٥٦٥٢

Fruiter (F). Fruit-bearing (E). **مُتَمِر** - ٢٥٦٥٣  
ذو ثمر .



مثلث



مُتَنَان



مُتَجَال

تنتهي إلى عدة فصائل، منها الأليات والبقرات والجمليات والزرايات والنفليات الخ.

٢٥٦٧٦ - **مِجَنَّة**، **مِجَنَّة** (F).  
Extirpateur (F).  
Weeder, Weeding-tool, Spud (E).  
محراث خاص يستعمل لقتلاع الأعشاب الرديئة.

٢٥٦٧٧ - **مِجَنَّا** (F). Grubbing (E).  
Essoucheur (F).  
جهاز آلي يستخدم في اقتلاع أرويات الاجار.

٢٥٦٧٨ - **مِجَنَّم** (F).  
Juchoir, Perchoir (F).  
Roosting-place, Roost (E).  
خشبيات معترفات في الغم يحط عليها الدجاج. ومن الجاهم الطينية المشهورة:

٢٥٦٧٩ - **مِجَنَّم** (F). Heronry (E).  
Héronnière (F).  
Corbeautéière (F).  
مِجَنَّم البشون  
مِجَنَّم الغربان

٢٥٦٧٩ - **مِجَنَّم** (F).  
Terrain improductif (F).  
هي التربة التي لا تنحب قط.

٢٥٦٨٠ - **مِجَنَّدَاب**، **مِجَنَّدَاب**، **جَدَّاء**،  
جَدَّاء، **مِجَنَّدَاب**، **مِجَنَّدَاب** (E).  
Terrain improductif (F).  
هي التربة التي لا تنحب قط.

٢٥٦٨١ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Littoral, Rivage (F).  
Sea-coast, Sea-board (E).  
المِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٨٢ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Régénérateur (F).  
Regenerator (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٨٣ - **مِجَنَّدَا**، **نُطَّار** (F).  
Epouvantail (F).  
Scarecrow (E).  
ما ينصب في الحدائق والزرورع مزينة للطيور والوش.

٢٥٦٨٤ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Alie (F).  
Wing (E).  
هو الجناح أو السقط. مجدفا الطائر: جنسها.

٢٥٦٨٥ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Radicant (F).  
Radicant, Radicating (E).  
نمت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

٢٥٦٨٦ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Aviron, Rame (F).  
Oar, Scull (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٨٧ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Bec droit (F).  
Straight bill (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٨٨ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Radicant (F).  
Radicant, Radicating (E).  
نمت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

٢٥٦٨٩ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Aviron, Rame (F).  
Oar, Scull (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩٠ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Bec droit (F).  
Straight bill (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩١ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Radicant (F).  
Radicant, Radicating (E).  
نمت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

٢٥٦٩٢ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Aviron, Rame (F).  
Oar, Scull (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩٣ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Bec droit (F).  
Straight bill (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩٤ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Radicant (F).  
Radicant, Radicating (E).  
نمت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

٢٥٦٩٥ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Aviron, Rame (F).  
Oar, Scull (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩٦ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Bec droit (F).  
Straight bill (E).  
مِجَنَّدَا هو ساحل البحر. ج. مجادح.

٢٥٦٩٧ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Radicant (F).  
Radicant, Radicating (E).  
نمت تعريفي نباتي توصف به السوق التي تخرج جنوداً هوائية تتدل حتى التربة.

٢٥٦٩٨ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Exhibitionnisme (F).  
هي الجلعة، اطلها.

٢٥٦٩٩ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٠ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠١ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٢ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٣ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٤ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٥ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٦ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٧ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٨ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٠٩ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٠ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١١ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٢ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٣ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٤ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٥ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٦ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٧ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٨ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧١٩ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٢٠ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٢١ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.

٢٥٧٢٢ - **مِجَنَّدَا** (F).  
Satyrus circe (S).  
Satyre circé, Silène (F).  
Satyrus circe (S).  
حشرة من فصيلة المِجَنَّدَا ورتبة حشرقيات الاجنحة.



مِجَنَّدَا

Aloyau (F). Sirloln (E). مَجَسَّةُ الْحَقْوَيْنِ ٢٥٧٠٧

Travers (F). مَجَسَّةُ الْخِصَارَةِ ٢٥٧٠٨

Breadth (E).

Maniement des abords مَجَسَّةُ الْعَجَزَيْنِ ٢٥٧٠٩

Avant-cœur, Paleron (F). Shoulder-blade, Chuck (E). مَجَسَّةُ رَأْسِ الْكَتِفِ ٢٥٧١٠

Bord (F). Edge (E). مَجَسَّةُ رَأْسِ الْوَرَكِ ٢٥٧١١

Tétraèdre (F). مَجَسَّمُ مُرَبَّعِ الْوُجُوهِ ٢٥٧١٢

Tetrahedron (E).

Ellipsoids (F). مَجَسَّمُ نَاقِصٍ ٢٥٧١٣

Ellipsoid (E).

٢٥٧١٤ مَجَسُّوسِيَّةٌ، مَلْمُوسِيَّةٌ

Palpabilité (F). Palpability (E).

Gypsomètre (F). مَجْصَاصٌ ٢٥٧١٥

Gypsumeter (E).

ويقيس مقياس الجبس، جهاز يستخدم في قياس الجبس

لهرفة مقداره ونسبته.

Exoaceae (S). مَجْعَدَاتٌ ٢٥٧١٦

Exoacées (F). Exoaceae (E).

فصيلة فطور طفيلية من الزقيات. اجناسها وانواعها عديدة

جميعها عسارة؛ بعضها يركب اوراق الاتجار المشمرة فيؤذيها.

Exoascus (S). مَجْعَدَةٌ ٢٥٧١٧

جلس فطور مؤذية من فصيلة المجدبات يطلق عليه اسم

تفريته، اطلها.

Four à dessécher, مَجْفَافٌ ٢٥٧١٨

Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).

بناء خاص تجفف في داخله بواسطة الحرارة بعض المحاصيل

الزراعية اخصها تبوغ السيكار وتبوغ فوريجينية.

Etuve (F). مَجْفَافَةٌ \*، مِجْمٌ ٢٥٧١٩

Stove (E).

جهاز يحكم السد، اختياري الحرارة، يستخدم في شئ

الاعمال الانشائية والتلهيرية والتعقيمية.

Arillé (F). Arillate (E). مَجْفَتَةٌ ٢٥٧٢٠

نعت تعريفي يطلق على كل بذرة مجهزة باريل اي جنت.

٢٥٧٢١ مَجْلٌ

المجل : انشقاق من العضبة في اسفل عروق الفرس، وهو

من عيوب الخيل.

Ovoscope مَجَلَّةٌ \* ٢٥٧٢٢

جهاز خاص يستعمل في استبعاد بيض الترخيم لانقضاء

المزكوم الصالح وترك الجديب.

Sérimètre (F). مَجَلَّةُ الْحَرِيرِ ٢٥٧٢٣

Serimeter (E).

جهاز يبين وزن خيط الحرير وصلابته ومرونته.

المجدافية الشكل. فصائلها واجناسها واتواعها كثيرة العدد.

اصطناعها جميع البحار والمياه العذبة تعيش متقلة على الاسماك.

Multiple مَجْدُور ٢٥٦٩١

المجدور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه.

Foetus (F). Foetus (E). مَجْرٌ ٢٥٦٩٢

الجر : ما في بطون الحوامل من الغنم وغيرها من ذوات

الظلف.

Bief (F). Reach, Level (E). مَجَرٌ ٢٥٦٩٣

قناة مصطنعة لجر الماء.

٢٥٦٩٤ مِجْرَامٌ \*، هِلْمِيتَرٌ

Héliomètre (F). Heliometer (E).

جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الاجرام السماوية.

Voie lactée (F). مَجْرَّةٌ، شَرْجُ السَّمَاءِ ٢٥٦٩٥

Galaxy, Milky way (E).

بياض يرى في السماء يتكون من ألوف النجوم المتقاربة

التي طمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها سحب ابيض.

وفي ترى في الشتاء اول الليل في ناحية من السماء. وري

في الصيف اول الليل في وسط السماء. وفي تنور دورة

رحوية فتراها نصف الليل ممتدة من المشرق الى المغرب وفي

آخر الليل من الجنوب الى الشمال.

Houe cintrée (F). Hoc (E). مَجْرَعَةٌ ٢٥٦٩٦

اداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه.

Courant d'eau (F). مَجْرَى مَاءٍ ٢٥٦٩٧

Current, Stream (E).

Tondeuse (F). Shearer, Clipper (E). مَجْرَ ٢٥٦٩٨

اداة يذوية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن.

Balsamine des jardins (F). مِجْرَاعَةٌ ٢٥٦٩٩

هي البسما من النباتات التريينية، اطلها.

٢٥٧٠٠ مِجْرَاعِيَّاتٌ هي البسمينيات، اطلها.

Contre-espallier (F). مَجْرَعَاتٌ ٢٥٧٠١

Espallier facing another (E).

هي الاشجار المثمرة القائمة على الاسلاك وقد صارت تشذيبها

وفقاً لقناعة.

Filet (F). Dash (E). مِجْرَعَةٌ، شَبَكَةٌ ٢٥٧٠٢

الشبكة يصاد بها السمك.

Manet, Maniement (F). Handling (E). مَجَسٌ، مَجَسَّةٌ ٢٥٧٠٣

ما يجتس باليد من جسم الحيوان لهرفة سمته أو هزاله.

٢٥٧٠٤ مِجْسَادٌ \* Stéréoscope (F).

Stereoscope (E).

منظار جسم. جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم

بقشاشها بفعل التنفيد الذي تولته النظارتان.

٢٥٧٠٥ مِجْسَادِي Stéréoscopique (F).


Stereoscopic (E).

Oreillette, Oreillon (F). مَجَسَّةُ الْأَذُنِ ٢٥٧٠٦

Auricle, Earlet (E).



مِجْدُور



مِجَلَّةُ



مِجَلَّةُ

٢٥٧٢٧ - **مِجَنَّاخِي** ° Pterygoidien (F).

Pterygoidien (E).

نعت تعريفي يطلق على بعض عظام الفك الجناحية الشكل.

٢٥٧٢٨ - **مُجَنِّح** Alifère (F).

Aliferous, Aligerous (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تحمل اجنحة .

٢٥٧٢٩ - **مُجَنَّنَاتُ أُمْلَى** Pterygotes,

Pterygogénéens, Ptilotes (F). Pterygotes (E).

مطابقة من الحشرات تشمل معظم شرب ورتب الحشرات المعروفة وقدها ٤ شرب ١٤ وطبق ٣٦ رتبة . أما فصائلها واجناسها فعدة آلاف .

٢٥٧٣٠ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَرْجُل** Pteropoda (S).

Pteropodes (F). Pteropoda (E).

رتبة من الرخويات المعدي التي تتميز بأرجلها المنحنية .

٢٥٧٤١ - **مُجَنَّنَاتُ الْأَيْدِي** Cheiroptera (S).

Cheiroptères, chauves-souris (F). Cheiropters (E).

رتبة حيوانات ليلية راسمة تتميز بجناح جلدي يكتنف قوائمها فيمكنها عند انتشاره ، من الطيران || اجسامها كدبوس ، صغيرة القد ، رؤوسها بيضاء . اذنتها متباينة الاشكال والاحجام . تسليها كامل الانظام ، مفترقات العدد الذي يختلف مع الاجناس . اعتنقها قصيرة . ارجلها خاسية الاصابع ، دقيقة المالحب الشديدة الانعكاف . ايها فردية الاصابع || انثاها اكبر قدماً من ذكورها ، وهي ثنائية الثدي ، حولية الحمل ، يحملها يدم من ٣٨ الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه جرراً واحداً يكتسي ويتسع بعد الوضع ستة ايام ، ويبيض بعد اليوم العاشر . ترضعه الام ويتعلق بصدرها حتى الفطام اي نحو سبعة اصابع || انواعها المعروفة نحو ٩٠٠ تنقسمها عشرات الاجناس تنقسم الى ست فصائل تنتمي الى مرتبتين ، مرتبة الطوايط ومرتبة الخفافيش كما هو موضح في الجدول التالي للاسفل .

٢٥٧٤٢ - **مُجَنَّنَف** ° Talus (F). Slope (E).

المنحرف الارض المنحدرة على شكل جلود .

٢٥٧٤٣ - **مُجَهَّر** \* Microscope

جهاز بصري يستخدم لتكبير وتوضيح المراتب الصغيرة الدقيقة . وهو على انواع البسيط، والمركب والالكتروني والوحيد النظارة والثنائي النظارات .

٢٥٧٤٤ - **مِجَهَر** Microscope (F).

Microscopium (E).

المهر كوكبية نجوم جنوبية الملقح كركوها تحت برج الجدي || يجوبها قليلة العدد جميعها من المرتبة السادسة والسابعة .

٢٥٧٤٥ - **مِجَهَرِيَّات** ° Microzoaires (F).

Microzoarian, Microzoön (E).

المهر يات حويينات دنيا لا تشاهد الا بواسطة المهر .

٢٥٧٤٦ - **مَجْهَرَد** Effort, Tension (F).

Stress, Strain (E).

هو ما تستطيع حله الوحدة السطحية من الباطن دون ان تتأذى . يعبر عن الحمل بالكيلو غرام ومن الوحدة السطحية

٢٥٧٢٤ - **مِجَلَّةُ الْحَلِيب** Lactoscope (F).

Lactometer (E).

جهاز يستخدم لمعرفة مقدار المواد السنية الموجودة في الحليب .

٢٥٧٢٥ - **مِجَلَّةُ السَّحَاب** ، **مِشْحَاب** °

Néphoscope (F). Nephoscope (E).

آلة تستخدم لمعرفة اتجاه السحب وسرعها .

٢٥٧٢٦ - **مِجَلَّةُ الْوُلُوْث** ° Lucidoscope (F).

Lucidoscope (E).

جهاز يستعمل في التمييز بين الالوان الطبيعية والمزودة او الصنية .

٢٥٧٢٧ - **مِجَلَّاح** \* ، **دِكَوَيْل** Dicotyles (S). Pécarl (F). Pecary, Mexican hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات موطنه امريكا الوسطى والجنوبية ، طوله نحو ١٠٠ سم . علوه ٤٠ وذنبه ٢ سم . نظيفته مستطيلة اذناه صغيرتان منتصبان . جسمه كثيف الحلب الفيلظ . قوائمها مخيلة || يعيش جماعات كبيرة تفردا الفصول المأمنة . يألف الاحراج والادغال الرطبة وصفات الانهر . قوته الجلود والثمار والحبوب . مسرحه من الغروب الى الفجر ، لا يقرب الاماكن الآهلة || انثاه تضع جروين مرة واحدة في السنة || اعرف انواعه واشهرها :

Dicotyles labiatus (S). **مِجَلَّاحُ ابْيَضُ الْبَرَامِط** Pécarl à lèvres blanches (F).

Dicotyles angulatus (S). **مِجَلَّاحُ الْمَكْسِك**

Pécarl du Mexique (F).

Dicotyles tajacu (S). **مِجَلَّاحُ تَجَاكُو** ، **مِجَلَّاحُ مَطْوَق**

Pécarl Tajacou (F).

٢٥٧٢٨ - **مِجَلَّاد** Pagoscope

هو الخدار ، مكشاف الجلد ، اعلمه .

٢٥٧٢٩ - **مِجَلَّة** ، **نَقَّاطَة** ، **بَيْلَة** Ampoule (F). Ampulla (E).

٢٥٧٣٠ - **مِجَلَّةُ دَوْ** Glacière

راجع مئجلة .

٢٥٧٣١ - **مِجَلَّةُ زَوْ** ° Coudrale (F). Hazel-copse (E).

مفرس اشجار البندق .

٢٥٧٣٢ - **مِجَلَّسُ وَصَايَة** Conseil de tutelle (F).

مجلس قانوني مؤلف من بعض اقرباء القاصر او المجهور عليه، مهمته حاية القاصر ومراقبة اعمال الوصي او القيم .

٢٥٧٣٣ - **مِجْتَمَع** Académie (F). Academy (E).

تعبير يطلق على مجتمع من العلماء يجتمعون لاجل النظر في المسائل العلمية العائدة الى اختصاصهم .

٢٥٧٣٤ - **مِجْتَمُوع** Total

٢٥٧٣٥ - **مِجْتَمُوعَة** ، **رَكْمَة** ° Agrégat (F).

Aggregate (E).

مجموعة مواد مختلفة متراكمة .

٢٥٧٣٦ - **مِجَنَّاخ** ° Pterygoide (F).

Pterygoid (E).

ماكان شكله كالمجناح .



مِجَلَّاح



مِجَهَر

## مُجَنَّحات الأيدي Cheiroptères

Genre	جنس	Sous-Famille	عائلة	Famille	فصيلة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شُفَّاحة			Pteropodidés	وطوايطات	Mégachiroptères	وطاويط
Cynonyctéris	رداسة						
Epomophores	حيثر						
Cynoptères	سَقَطُوم						
Harpie (Céphalote)	مَسَاخنة						
Macroglosse	لثانة						
Eonyctéris des cavernes	سرحاب						
Nésonyctéris	حيثوش						
Rhinolophes	عمَّاش			Rhinolophidés	عمَّاشيات	Microchiroptères	عطافيش
Trienops	خناطيل						
Phyllorhines	دُبَّاش						
Authops orné	دملوح						
Cælops	ذُنَّيَّاب						
Mégadermes	منطاب			Nyctéridés	وحرَّيات		
Nyctères	وحرّة						
Oreillards	طمروق			Vespertilionidés	خَفَّاشيات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	خَشَّاف						
Scotophiles	ذُحَّاط						
Vespertillions	خَفَّاش						
Minioptères	زُنَّيَّاع						
Furies	دومس	رَمَّاسات	Emballonuriné	Emballonuridés	رَمَّاسيات		
Saccoptéryx	غَضُوف						
Diclidures	دَمَّاس						
Noctilions	نَكِيل						
Emballonures	رَمَّاس						
Taphiens	شُقْدَان						
Rhinopomes	عِينُوم						
Chiromèles	زَغْدَاب	Molossinés	هيمرات				
Molosses	هيمرة						
Nyctinomes	ضَفُوع						
Mystacops	غُوبِر						
Vampires	نَرَّاف			Phyllostomidés	ورَّيات		
Phyllostomes	ورَّية ، فِلِسْتِم						
Glossophages	مَضَّاص						
Desmodes	عَلُوق						
Diphyllies	عولق						

بالمتجهز المربع . ويختلف المجهود باختلاف العرض المطلوب لذلك فهو قد يكون :

**مجهود أمن** Effort de sécurité (F).  
Safe stress or strain (E).

**مجهود التواء** Effort de torsion (F).  
Torsional stress (E).

**مجهود ضغط** Effort de compression (F).  
Compressive stress (E).

**مجهود شد** Effort de traction (F).  
Tensile stress (E).

**مجهود كسر** Effort de rupture (F).  
Ultimate stress (E).

٢٥٧٤٧ - **مجنوء** ، **مستحاح** ، **مسكك** o  
Aéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧٤٨ - **مجنوقات** ، **لاحشريات**  
Coelentérés (F). Coelenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا اعضاء لها فيها تجويف واحد له فتحة واحدة الى الخارج تقوم مقام الفم والامتصاص .

٢٥٧٤٩ - **مجنوقات القرون**  
Cavicornes (F).  
Cavicornes (E).

قسم من المجترات ذوات القرون الحنيفة كالبقرة والغنم والظباء .

٢٥٧٥٠ - **مجنيل** \*  
Magilus (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة المجليلات .

انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع الرخايا || اسدانها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، ناعمة التحزير ، صفراء ، مكورة ، ثلاثية الوباب او رباعية في اول عيدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالقشر الاسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - **مجنيليات** o  
Magilidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة || اعرف اجناسها واشهرها المجل .

٢٥٧٥٢ - **مجن** ، **مجن** ، **مجن**  
Vitellus

صفرة البيض ، وهو العرقل .

٢٥٧٥٣ - **مجنات** هي الخلطي القرمزي ، اعليه .

٢٥٧٥٤ - **مجناجة** o  
Phytotomie (F).

Phytotomy (E).

الحاجة او القيترومي علم يبحث في تشرح النبات .

٢٥٧٥٥ - **مجنح** o  
Pauciflore (F). Pauciflorous (E).

نمت ترميز يدل على قلة الزهر في اي شكل كان من اشكال الانزهار . تفقد نساها ومناقيدها وشاكلها ونورها محاج .

٢٥٧٥٦ - **مجنار** ، **استردية** ، **استرداؤن**  
Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة المحاريات . انواعها

كثيرة العدد تقسم الى فئتين الاولى تشمل محار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل محار المياه العذبة التي تعيش في الانهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضعيفة الاحساس ، القليلة الحركة ، يتغذى بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل فم مع الماء .

٢٥٧٥٧ - **مجنار مائوف** \* ، **تراق**  
Ostrea edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من المحار المينول المأكول . يكثر على الصخور المنصورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربى في احواض خاصة مؤهبة فيتكاثر بسرعة .

٢٥٧٥٨ - **مجنارة**  
الحاربان هما رأسا الورك المشفران اللذان تدور فيها رؤوس الفخذين .

٢٥٧٥٩ - **مجنارة** ، **قوف** ، **صيون**  
Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

راجع قوف وصيون .

٢٥٧٦٠ - **مجناري**  
Ostréicole (F).

**مجناريات** ، **استرداؤنيات**  
Ostreidae (S). Ostreidés (F). Ostreidae (E).

فصيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - **مجناس** \*  
Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجواثم حاميات الشكل وفصيلة الترونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع افريقية الاستوائية والحارة . ملجها الحياتي جامعي . افواجاها متوسطة العدد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها الزور والحبوب وبعض الثمار البرية والحشرات والدوديات || ارساها شبيهة بالحمام الزايل . مناقيدها مستفلة . ارساها كاسية . افواجاها تختلف من الانواع جميعها حادة الالوان السفء اللمعة .

٢٥٧٦٣ - **مجناسب**  
Comptable (F).

Accountable, Responsible (E).

الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - **مجناسبة** ، **مسك** ، **الدكاير**  
Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - **مجناق** ، **مجناق** ، **مجناق**  
الحاق او الاقتان وجه من اوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الارض والشمس ويكون نصفه المضي متجهاً نحو الشمس فتستحيل رؤيته . والحاق يتسبق حرف الحلال بيو .

٢٥٧٦٦ - **مجناكيات** o  
Anelytropidae (S).

Anelytropidés (F). Anelytropidae (E).

فصيلة حيوانات زساعة من رتبة العظاء فصيرات الاسنة . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها سبعة . موطنها افريقية الاستوائية والجنوبية وبعض مناطق المكسيك . جميعها حادة تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها دودية الشكل ، عادمة القوائم ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم .



مجل



محار مائوف



مجناس

الاسم الفرنسي	التاج	الحبل باليوم	الحیوان	Transmission (F). Transmission, Transmittal (E).	٢٥٧٦٧ - مَحَالَّة
Guenon	١	٢١٠	دحية	جهاز ميكانيكي .	٢٥٧٦٨ - مَحَالَّة
Lièvre	٥-٣	٣٣	دراة	Poule de transmission (F). Pulley (E).	٢٥٧٦٩ - مَحْبِل
Fouine	٧-٢	٥٦	دلق	هي البكرة العديدة السفات التي تستعمل في رفع الاثقال .	٢٥٧٧٠ - مَحْبِل
Louve	٦-٣	٦٨	ذئبة	Egrappoir (F).	٢٥٧٧١ - مَحْبِل
Lale	٨-٥	١٣٠	رث	آلة تفصل حب العنب عن التفروق اي العلووش .	٢٥٧٧٢ - مَحْبِل
Renne	١	٢٤٦	رثة	Terre fertile (F). Fruitful soil (E).	٢٥٧٧٣ - مَحْبِل
Civette	٤-٣	٧٢	زيادة	الحيار : الارض الدفنة السريعة النبات . « لنا جبال وحي بحار » ج . محابر .	٢٥٧٧٤ - مَحْبِل
Rat des moissons	٩-٣	٢٢	زبانة	Granulaire, Granuleux (F). Granular, Granulous (E).	٢٥٧٧٥ - مَحْبِل
Girafe	١	٤٥٠	زرافة	Jus de grenade (F). Juice of pomegranate (E).	٢٥٧٧٦ - مَحْبِل
Muscardin	٧-٢	٢٨	زغبة	الحبرم : ماء حب الوبان .	٢٥٧٧٧ - مَحْبِل
Belette	٨-٣	٣٥	سرعية	Stalle, Box (F). Stall, Box (E).	٢٥٧٧٨ - مَحْبِل
Marte	٦-٢	٥٦	سمور	الحبس واليكس : مرقة الفرس الواحد في الاصطبل .	٢٥٧٧٩ - مَحْبِل
Ecreuil	٤-٣	٢٨	سمناب	Désoperculeur (F).	٢٥٧٨٠ - مَحْبِل
Chamois	٢-١	١٦٥	شمواة	Gestation (F). Gestation, Pregnancy (E).	٢٥٧٨١ - مَحْبِل
Chat sauvage	٤-٣	٥٦	فسيون	الحبل هو مدة الحمل ، اي زين تكوين الجنين ، يستمر من الاعصاب الى الوضع    مدته تختلف مع نوع الحيوان، اقصرها ١٣ يوماً وأطولها نحو ٧٦٠    وقد ذكرنا في الجدول التابع اشهر انواع الحيوان ومدة حملها باليوم ومدد نتاجها :	٢٥٧٨٢ - مَحْبِل
Taupe	٥-٣	٢٨	طوبون	Chacal	٢٥٧٨٣ - مَحْبِل
Biche	١	١٨٥	طبية	Putois	٢٥٧٨٤ - مَحْبِل
Campagnol	٧-٤	٢٢	عكبر الحقل	Furet	٢٥٧٨٥ - مَحْبِل
Chèvre	٣-١	١٥٤	عز	Opossum	٢٥٧٨٦ - مَحْبِل
Eléphant	١	٧٦٠	عشوم	Anesse	٢٥٧٨٧ - مَحْبِل
Blaireau	٥-٣	٦٥	غريراء	Moufflon	٢٥٧٨٨ - مَحْبِل
Gazelle	١	١٥٤	غزالة	Elan	٢٥٧٨٩ - مَحْبِل
Souris	٨-٥	٢١	فأرة	Baleine	٢٥٧٩٠ - مَحْبِل
Jument	١	٣٤٥	فرس ، حجر	Vache	٢٥٧٩١ - مَحْبِل
Lérot	٦-٤	٢٨	فرناب	Renarde	٢٥٧٩٢ - مَحْبِل
Tigresse	٥-٣	١٠٠	فزارة	Lapine	٢٥٧٩٣ - مَحْبِل
Morse	١	٢٦٠	فظ	Rat	٢٥٧٩٤ - مَحْبِل
Phoque	١	٢٧٦	فقمة	Castor	٢٥٧٩٥ - مَحْبِل
Léoparde	٥-٣	٩٦	فهدة	Zèbre	٢٥٧٩٦ - مَحْبِل
Hermine	٨-٥	٦٠	قائم ، هرين	Chauve-souris	٢٥٧٩٧ - مَحْبِل
Hamster	٧-٣	١٦	قداد هستر	Truie	٢٥٧٩٨ - مَحْبِل
Loir	٦-٢	٢٨	قرقدون	Ours	٢٥٧٩٩ - مَحْبِل
Loutre	٣-٢	٦٣	قضاة	Mulot	٢٥٨٠٠ - مَحْبِل
Hérissonne	٦-٤	٤٨	قنفذة		
Rhinocéros	١	٥٥٠	كركدن		
Chienne	١٠-٣	٦٣	كلية		
Cobaye	٥-٢	٦٨	كوباي		
Lama	١	١٦٨	لاما		
Lionne	٣-٢	١١٠	لبوة		
Mara	٢	٦٠	مارة		
Maïmotte	٦-٢	٣٥	مردوط		
Mandrill	١	٢٧٠	ميمون		
Chamelle	١	٣٢٠	ناقة		
Brebis	١	١٤٧	نمجة		
Panthère	٥-٣	٩٦	نمرة		
Chatte	٧-٥	٦٠	هرة		
Lynx	٤-٢	٦٣	رشق		
Bouquetin	١	١٦٧	وعل		
Chevreuil	٢-١	٢٧٠	يأسور		



محبس





عجيين



عذار



محراث الفلاح



محراث اللقّب



محراث برابان



محراث ذو مقطعين



محراث عادي



محراث كثير المقاطع

Calorifère (F). Heat-conveying (E). **مِحْرَر** - ٢٥٧٩٠

يحمل الحرارة وينقلها. جهاز ينقل الحرارة.

Bolomètre (F). **مِحْرَر طَبْيِيّ** - ٢٥٧٩١

Bolometer (E).

ميزان حرارة ينقل بالمقاومة الكهربائية.

Charrue (F). Plough (E). **مِحْرَارُ** - ٢٥٧٩٢

أغراث أداة الحراث. ج محارث. وأغراث عديدة

الاشكال تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة.

**مِحْرَارُ الْجَثِّ** - ٢٥٧٩٣

Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E).

هو المحراث الممد لاختراع اروبام الانجار.

**مِحْرَارُ الْفَلَجِ** ، **مِحْرَارُ الْجَدَاوِل** ، - ٢٥٧٩٤

**محراث المشاير**

Charrue rigoleuse, Ch. fossoyeuse (F). Ditching

plough (E).

محراث تفلج به جداول الاسقاء.

**مِحْرَارُ النَّقْبِ** \* ، **نَقَابَة** - ٢٥٧٩٥

Charrue défonceuse (F). Trenching plough (E).

محراث يستعمل في نقب التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم.

**مِحْرَارُ الْهَوَمِ** - ٢٥٧٩٦

Fouilleuse, Sous-soleuse (F). Subsoil-plough (E).

محراث فيه اصابع تحرك الهوم مع استيقاظ تربة في مكانه.

**مِحْرَارُ بَرَابَان** \* - ٢٥٧٩٧

Charrue brabant (F).

محراث يقلب التربة رأساً على عقب. (E) Belgian plough

**مِحْرَارُ ذُو مَقْطَعَيْنِ** \* - ٢٥٧٩٨

Charrue bise (F). Bi-share plough (E).

محراث مركب من بلاستين.

**مِحْرَارُ عَادِي** \* ، **مَيْكَمَة** - ٢٥٧٩٩

Araire (F). Swing-plough (E).

هو المحراث الذي يشق التربة.

**مِحْرَارُ كَثِيرِ الْمَقَاطِعِ** \* - ٢٥٨٠٠

Charrue polysoc (F). Polyshare plough (E).

هو اغراث العديد البواسن وهو يستعمل لزحف التربة.

**مِحْرَارُ** - ٢٥٨٠١

Thermomètre enregistreur (F).

Self-registering thermometer (E).

هو الابيات ، اطبلية.

**مِحْرَارُ الْقُصْوَى وَالْذُّبَا** \* - ٢٥٨٠٢

Thermomètre maxima-minima

نوع من ميزان الحرارة الثنائية الجيوب العازلة والاعمة

الزئبقية التي يدل كل واحد منها على حرارة.

**مِحْرَارِي** - ٢٥٨٠٣

Brûleur (F). House-burner (E).

جهاز يسهل وينفط احتراق المواد الملتهبة.

**مِحْرَارَان** - ٢٥٨٠٤

Graine de coton (F).

Cotton seed (E).

هي حبة القطن. ج محارين.

**مِحْرَد** - ٢٥٨٠٥

مفصل المنق.

**مِحْرَد** - ٢٥٨٠٦

هو المشفر. ج محارذ.

**مُحَرِّبِينَ** - ٢٥٧

بن نجهان من برج الجدي مركزها على الذنب واحد  
الاثنين انور من الآخر ويدعى اخفى النجمين.

**مِحْثَاة** - ٢٥٧

Grésière, Grésier (F).

Sandstone quarry (E).

لح الحجر الرملي

**مِحْجَج** - ٢٥٧١

مجم العمود : قشره.

**مِحْجَار** - ٢٥٧١

Lithophage (F).

Lithophagous (E).

رأس الحجرارة.

**مُحْجَر** - ٢٥٧١

Lithoxyle (F). Lithoxyle (E).

ل نبات تحوّر مايمته الخشبية الى مادة حجرية دون

ير في الشكل يدعى محجراً.

**مَحْجَر** - ٢٥٧٨

Parc (F). Park (E).

لحجر هو الحديقة ماذا قاله لبيد. وفي التذويب : الحجر:

لحصى المنخفض ، ج محاجر.

**مَحْجَر صَحْي** - ٢٥٧٨٢

Lazaret (F).

Lazaretto (E).

مزل مخصص لايلاء الحيوانات القادمة من بلاد وبّة.

**مَحْجَن** - ٢٥٧٨٣

Bec (F). Beak, Bill (E).

عجين الطائر : منقاره ومنقاده ومنسره.

**مَحْجِن** \* - ٢٥٧٨٤

Streptopus (S).

Streptope (F).

عشب نباتات تر يبيته جذمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات.

انواعه المعروفة قليلة. سوقها فزاع موققة. اوراقها متعاقبة

سنانية النصل الساخذ الانتشاب. ازهارها فردية التجميع،

ابطية الانكاز ، جرسية الشكل ، مستطيلة الزنناد، متدلية.

لونها يختلف باختلاف النوع، منها الابيض الاخضر المواج

والاخر والارجواني. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

**مُحَدَّبُ الْأَطْرَافِ** - ٢٥٧٨٥

Busqué, Convexilinear (F). Convexilinear (E).

نمت وصفي تعريفي يستعمل في تصنيف الدواجن اصحصها

الخليل.

**مَحْدُون** - ٢٥٧٨٦

Demi-sang (F). Half-bred (E).

الغوث ج. محادوث هو كل حيوان ناتج عن سلالة

عتيقة صريحة عتبت بسلالة لا رسن لها.

**مَحْدَر** \* ، **مَيْكَنَافُ الْجَلْدِ** ، **مَيْجَلَاد** - ٢٥٧٨٧

Pagoscope

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ناشف ورطب. يستعمل

للدلالة على حالة الرطاب الجوي وبالناتج على اسكانية

حصول الصبر والملاح الاسود. وقد يثنى من الحدث قبل

وقوعه بيشع ساعات.

**مَحْرَر** - ٢٥٧٨٨

Amérir, Amerir (F).

To alight (E).

حط بطائرته المائية على سطح الماء.

**مَحْرَر** - ٢٥٧٨٩

Amérissage, Amerissage (F).

Allighting (E).

الحر وصول الطائرة المائية الى سطح الماء.

٢٥٨٢٣ - مَحَشَّش محش الجلد : قشره من اللحم .

2٥٨٢٤ - مَحَشَّش Brouissure, Brûlure (F).  
Blight, Frost-nip (E).

المحش الاحتراق في البشرة . الصقيع يحمش البشرة والنصل  
اي يحرقها .

2٥٨٢٥ - مَحَشَّش \* ، مَحَشَّة Faucheur, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mower,  
Mowing-machine (E).  
آلة ميكانيكية تستعمل لحش كلاً المروج .

2٥٨٢٦ - مَحَشَّش مَائِي Faucardeur (F).  
آلة ميكانيكية تستعمل لحش النباتات المائية في الانهار .

2٥٨٢٧ - مَحَشَّة \* Râtelier (F). Rack (E).  
وعاء خاص بركز فوق المعلق العادي يوضع فيه الكلال  
والثمن لتأخذ البهائم شيئاً شيئاً دون ان تبعدها .

2٥٨٢٨ - مَحْصَّة Grève (F). Strand (E).  
المحصة شط مسطح بحري او نهري تغمره الحصى والرمال  
الحشة . ج محاسب .

2٥٨٢٩ - مَحْصِد ، مَحْصِدَة ، حَصَادَة .  
Moissonneur (F). Reaper (E).  
راجع حصادة ونها الحاصدة والرابطة الخ .

2٥٨٣٠ - مَحْصُول ، حَبْتِي ، حَبْتِي ، حَلَّة ، نَزَل Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).  
ما يحشى من زراعة الارض .

2٥٨٣١ - مَحْفَر Procès-verbal (F).  
Official report (E).  
عقد يدون فيه المأمور الموجع الوقائع المادية والاعمال التي  
قام بها .

2٥٨٣٢ - مَحْفَن ، مِرْحَم Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).  
هو المرث ، اطلبه .

2٥٨٣٣ - مَحْفَب \* ، مَعْضِد Serpe (F).  
Bill-hook, Hedge-bill (E).  
اداة حادة منقعة الطرف تستعمل في تشذيب الاشجار  
وقطع الاشخاب .

2٥٨٣٤ - مَحْفَب Assiette (F).  
اشجار الحرج المعدة للقطع .

2٥٨٣٥ - مَحْطَّة جَوَائِيَّة Station météorologique (F). Meteorological station  
(E).  
مركز مجهز بما يلزم لتتوّن الاحوال الجوية ودرسها .

2٥٨٣٦ - مَحْطَّة زَرَاعِيَّة Station agronomique (F). Agronomic station (E).  
مركز علمي وعمل يبحث في مختلف النباتات والتوّن  
الزراعية والاقتصادية لاستخلاص نتائجها .

2٥٨٣٧ - مَحْطَار Sirax  
جنس حشرات من فصيلة الحظاريات . انواعها المعروفة ١٢  
اجسامها اسطوانية الشكل طويلاً يراوح من ٣٠ الى ٤٠ مم .

Triangulaire (F).  
Triangular (E).

٢٥٨٣٧ - مُحَرَّمَة

ما كان شكله مثلث الزوايا .

Oxystomes (F).  
Oxystoma (E).

٢٥٨٣٨ - مُحَرَّمَات Oxystomes (F).  
لثة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتيبة قصار  
الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد جميعها  
من عظم بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة . تتميز  
بدرورها المستديرة وبانواعها الخرسية الشكل || اشهر  
فصائلها الكوليبيات .

2٥٨٣٩ - مُحَرَّك Moteur (F). Motive, Motor (E).  
كل كائن حي او جهاز آلي يقوم بعمل ميكانيكي . لذلك  
فالحرركات تقسم الى حية وجمادة . الحركات الحية كالرجل  
والفرس والثور... والحركات الجمادة هي الآلية التي  
تسيرها احدى القوى المتصرفة كالمياه والرياح والكهرباء  
والحرارة ، الخ .

2٥٨٤٠ - مُحَرَّك جَسَادِي Moteur inanimé (F).  
Inanimate motor (E).

2٥٨٤١ - مُحَرَّك حَرَوِي Moteur thermique (F).  
Thermic motor (E).

2٥٨٤٢ - مُحَرَّك حَيّ Moteur animé (F).  
Animated motor (E).

2٥٨٤٣ - مُحَرَّك كَهْرَبَائِي Moteur électrique (F).  
Electric motor (E).

2٥٨٤٤ - مُحَرَّك مَائِي Moteur hydraulique (F).  
Hydraulic motor (E).

2٥٨٤٥ - مُحَرَّك هَوَائِي Moteur aérien (F).  
Aerial motor (E).

2٥٨٤٦ - مُحَرَّوْنَة الحرونة واحدة الحرونة ، بحرة يفساء تعمل في الملح لا  
تخالط شيئاً الا غلب ريحها عليه وتنبت في البادية وهي  
ذكية الريع جداً . (عن ابن شبل ، اللسان) .

2٥٨٤٧ - مِجَر \* Inciseur, Coupe-sève,  
Pince-sève (F). Ringing-knife (E).  
اداة تستعمل لحز الاشجار المطلوب استغلال عصارها .

2٥٨٤٨ - مِجَزْمَة Botteloir, Botteleuse (F).  
Binder, Sheaf-binding machine (E).  
اداة تستعمل في ضم صالغ الحليون وتجزئها .

2٥٨٤٩ - مِجَسَّة Etrille (F). Curry-comb (E).

2٥٨٥٠ - مِحْشَر ، مِحْشَر Cheek (E).  
هو الجزء الجانبي من الرأس في الحيوان والطير ومن البخنق  
في الخشرات ، وما عماران .


2٥٨٥١ - مِحْشِيرِي ، خَدَّي Jugal

2٥٨٥٢ - مِحْشَل Ebarbeur (F).  
Paring machine (E).


آلة ينزع بها شعاع الشمر بعد المدرس .



عُجَار القَصْوِي والدَنِيَا



عِز



عُش



عُشَد



عُشَد



عُطَب

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَةٌ  
Cour, Tribunal (F).  
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء.

### ٢٥٨٥١ - مَحْكَمَةُ الاسْتِثْنَاءِ

Cour d'appel (F). Appel court (E).  
هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً.

### ٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَةُ الْبِدَايَةِ

Cour de première Instance (F). قضاء أول درجة.

### ٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour internationale d'arbitrage (F).  
انضمت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في حلها. مركزها مدينة لاهاي.

### ٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَةُ التَّمْيِيزِ ، مَحْكَمَةُ التَّقْضِ

Cour de cassation (F). Highest court (E).  
هي أعلى المحاكم درجة لأنه يطلب منها النظر في الأحكام التي صدرت عن محاكم الدرجة النهائية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون أو تفسيراً خاطئاً له.

### ٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَةُ الْجَنَائِيَّاتِ

Cour d'assises (F). Assize court (E).  
هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتلّف من ثلاثة أعضاء تعيّنهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون أحدهم رئيساً.

### ٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَةُ الْعَدْلِ الدَّوْلِيَّةِ

Cour Internationale de Justice (F). International Justice court (E).  
هي الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لايتها تشتمل كل ما هو منصوص عليه في الميثاق والمعاهدات والاتفاقات المملوكة بها.

### ٢٥٨٥٧ - مَحَلّ الْإِقَامَةِ

Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).  
هو المكان الذي يقيم فيه المرء دون أن يكون لزماً موطنه القانوني.

### ٢٥٨٥٨ - مِحْلَاب

Galactophore (F).  
Galactophorous (E).  
نمت تمريني يطلق على كل وعاء ينقل الحليب أو يقوده الى الخارج.

### ٢٥٨٥٩ - مِحْلَال

Bordereau (F).  
Memorandum, Schedule, Account (E).  
هو البيان التفصيلي الذي يوضح الاعمال والحسابات.

### ٢٥٨٦٠ - مَحَلَب \*

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucienholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillegio mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).

نوع من الكرز البري، شجيرة كبيرة اللد منتصب الساق تملأ نحو ١٠ امتار. فروعها وأغصانها منفردة. أوراقها صغيرة النصل. أزهارها نورية التجميع. ثمارها حمضية

اللونها مخضفة، قرونها الاستشعارية خيطية، مرزاتها منتظية || ريقاتها خاشية تركب الصنوبريات تقسردب الشكير والخشب.

٢٥٨٦٨ - مِخْطَارُ أُسُودٍ \*  
Sirex juvencus (S). Sirex noir, Sirex commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D).

مِخْطَارٌ كبير القد، طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى السواد الازرق. جرازمه الى الحمرة. مرزه مخززي الشكل. يمتد مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير فينبث عن رقات تسردب الشكير والخشب بانفاق مستطيلة ومنعرجة.

### ٢٥٨٦٩ - مِخْطَارُ جَبَّار \*

Sirex gigas, Urocus gigas (S). Sirex géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D).

نوع من المِخْطَارِ ، طوله نحو ٤٠ سم. رأسه وجوشته وحلقات بطنه الوسطى سود. سائر جسمه مع جرازمه الى الصفار الناري. مرزه ينتهي بشعلة حادة || ريقاتها خاشية تركب جمع الصنوبريات تقسردب الاخشاب وتعطبها.

٢٥٨٦٠ - مِخْطَارِيَّات \*  
Siricidae (S).  
Siricidés (F). Siricidae, Horntails (E). Holz-wespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها قليلة العدد. اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها اسطوانية الشكل، كبيرة القد، طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. || ريقاتها خاشية مؤذية تعيش على الصنوبر والتوتوب.

### ٢٥٨٦١ - مِخْلَافَة ، قِلَاعَة

Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).  
آلة تستعمل لقلع الباطا والشوندر والجزر.

### ٢٥٨٦٢ - مِخْطَار

Sablère (F).  
Sand-pit, Gravel-pit (E).  
هو المرملة، منجم يستخرج منه الرمل.

### ٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَات ، كُنْسِرَوَات

Conserves (F). Preserves (E).

### ٢٥٨٦٤ - مَحْشٍ

الحق: الشجر المقارب بينه في الغرس.

### ٢٥٨٦٥ - مَحْفَلَةٌ

Ferme (F). Farming, Farm (E).  
الحقله هي المزرعة. ج محال. وفي الحديث «ما تصنعون بمحافلكم».

### ٢٥٨٦٦ - مِحْثَن

Injecteur (F).

### ٢٥٨٦٧ - مِحْثَنَةٌ \*

Seringue (F).  
Syringe, Squir (E).  
اداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه.

### ٢٥٨٦٨ - مِحْكَة ، مِشْجَب

Raclette, Raclor (F). Scraper (E).

### ٢٥٨٦٩ - مِخْكَالَة

Tribomètre (F).  
Tribometer (E).  
الحكالك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك.



مِخْطَارُ أُسُود



مِخْطَارُ أُسُود



مِثْنَة



مَحَلَب

Axile, Axillaire (F). **مَحْوَرِيّ** ٢٥٨٨٠  
Axial, Axillary (E).

Herbe d'inde (F). **مَحْوُوط** ٢٥٨٨١  
نبات بري طبي يعرف باسم اخيرايتوس ، اطلبه .

Fascié (F). **مُحَوَّر ، مُشْتَمَل** ٢٥٨٨٢  
Fasciated (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مسوم بمصائب ،  
وعلى النباتات المصاب بالشملة اي الاغراب .

Biennal, Bisannuel (F). **مُحَوِّل** ٢٥٨٨٣  
Biennial (E).

Transformateur (F). **مُحَوِّل** ٢٥٨٨٤  
Transformer (E).

جهاز يغير درجة توتر التيار الكهربائي .

Teneur (F). **مَحْوِيّ** ٢٥٨٨٥  
Tenor, Percentage (E).  
هو ما تحواه كل مسادة معينة من العنصر المطلوب او  
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .

Cercle (F). Circle (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٦  
هو الدائرة ، اطلبه .

Océan (F). Ocean, High sea (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٧  
البحر هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية.  
المحيطات المحدودة اربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ  
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب  
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ  
مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط  
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .  
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

٢٥٨٨٨ **مُحِيط الدائرة ، مُحِيط دَائِرَة**  
Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,  
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,  
Perimeter (E).

Petites fourmis (F). **مُحِيل** ٢٥٨٨٩  
Small ants (E).

الحيل : اصغر الذرّ . قال الاخطل :

« ولو بات يسري الذر فوق جلودها  
لأثر في اشرارهن محيلها »

Méillot à petites fleurs (F). **مُحِيلَة** ٢٥٨٩٠  
هي الخنثوق الصغير ، اطلبه .

Moelle (F). **مُخ** ٢٥٨٩١  
هو النخاع وهو المكك ، اطلبه .

Tenants (F). Adjacent lands (E). **مُخَارَج** ٢٥٨٩٢  
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة العرض .

Docks, **مُخَارِز عُمُومِيَة** ٢٥٨٩٣  
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

٢٥٨٩٤ **مَخَّاس الزُّعُرُور ، مَخَّاس لَسَانِي**  
النَّقْط

Cryptocephalus  
octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F).  
Cryptocephalus octopunctatus (E).

حشرة غاصلة من النضاريات مفدمات الاجنحة . تألف

القد ، سوداء اللون ، حريقة العلم . اختشاه صلبة  
معروفة طيبة الرائحة مرغوب فيها || والهلل يستعمل خاصة  
كعظم لبعض انواع الكرز لانه نبات سروتي يعيش في  
معظم الارربة || « ثماره مفرحة مغوية الحواس  
مطلقاً ، تفتح الخفقان والبهير ورضيق النفس والبلغم ، وتفتي  
العدة واوجاع الكبد والكل والطحال والخصى وعسر البول  
شرباً . ويطلق به فيقلع الكلف والجرب . »

Escargotière (F). Snailery (E). **مَحَلَّة** ٢٥٨٦١  
هي المكان المدة لتربية الحلزون .

Réducteur (F). Reducer (E). **مُحَلِّل** ٢٥٨٦٢

Solution **مَحْلُول** ٢٥٨٦٣

Bouillie (F). Wash (E). **مَحْلُول ، سَائِل** ٢٥٨٦٤

Vernaculaire (F). Vernacular (E). **مَحَلِّيّ** ٢٥٨٦٥  
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

Pâte-acide (F). **مِخْصَاص** ٢٥٨٦٦  
Acetometer (E). مقياس او ميزان الحوامض .

Edulcoré (F). Sweetened (E). **مُحَمَّل** ٢٥٨٦٧

نعت تعريفي يطلق على كل دواء تافه العلم او مرّ أخفيف  
اليه بعض السكر تحسناً للمذاق .

Acidifiant (F). Acidifying (E). **مُحَمِّص** ٢٥٨٦٨  
نعت تعريفي يطلق على كل مادة تقود الى التخميص .

Mammoth (F). **مُخَمَّر** ٢٥٨٦٩  
هو الصناجة ، اطلبه .

Scammonée d'Alep (F). **مُخَمَّرَة** ٢٥٨٧٠  
هي السقمونيا ، اطلبه .

Convolvulaceae **مُخَمَّر يَات** ٢٥٨٧١  
فصيلة نباتية مشهورة باسم اللباليات ، اطلبه .

Cumulo-nimbus **مُخَمَّرِيّ** ٢٥٨٧٢  
هو الركام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

Test **مَخْن ، قَحْص** ٢٥٨٧٣

٢٥٨٧٤ **مَخَوَّاة** كثيرة الحيات . يقال ارض مخوَّاة .

Axe (F). Axis, Axon (E). **مِخْوَر** ٢٥٨٧٥  
هو نقطة الارتكاز .

٢٥٨٧٦ **مِخْوَر أَقْصِيّ ، مِخْوَر سِنِيّ**  
Abscisse (F). Abscissa (E).

Thawleg **مِخْوَر التَّهَر** ٢٥٨٧٧  
اعرق خط في قامه . واذا كان النهر بين دولتين عد  
محوره حدّاً بينهما .

Ordonnée (F). **مِخْوَر صَادِيّ** ٢٥٨٧٨  
Ordinate (E).

Peupleraie (F). **مَخَوَّاة** ٢٥٨٧٩  
Plantation of poplar trees (E).

مغرس الحور وكل مكان فيه حور .



مَخَّاس الزُّعُرُور

## ٢٥٨٩٧ - مَخَاسِ لَسَانِي النُّقْطِ

Cryptocéphale octoponctué (F).

هو غُصَّاس الزعرور ، اطلبه .

## ٢٥٨٩٨ - مَخَاسِ حَبِيب

Cryptocéphale distingué (F).

هو غُصَّاس العُشْبِ ، اطلبه .



مَخَاسِ العُشْبِ

Dentelure du limbe (F).

## ٢٥٨٩٩ - مَخَاسِش

Indenting of limb (E).

اسنان حافة فصل الورقة .

Prise à partie (F).

## ٢٥٩٠٠ - مَخَاصِمَةُ الْقَاضِي

وسيلة طعن غير عادية مؤداها رفع دعوى على القاضي امام محكمة الاستئناف او التقصير والارام يطالب فيها بتبويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويمقاب عليه القانون .

Gué (F). Ford (E).

## ٢٥٩٠١ - مَخَاضَة

كل مكان من النهر قليل العمق والماء يمكن اجتيازه على الاقدام .

Ecrémuse (F).

## ٢٥٩٠٢ - مَخَاضَة \* ، قَرَاة

Separator (E).

آلة تستعمل لفرض الكتأء من الحليب .

## ٢٥٩٠٣ - مَخَاضَرَة

بيع الثَّارِ ويخرى خضر لم يبد صلاحها .

Sébastien (F).

## ٢٥٩٠٤ - مَخَاطَة

هي شجرة السبستان وتسمى اطباء الكلية .

Mucilagineux (F).

## ٢٥٩٠٥ - مَخَاطِي ، لُعَابِي

Mucilagnous (E).

الاجسام المخاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين واليديرولين توجد في عدة نباتات .

Myxinidae (S).

## ٢٥٩٠٦ - مَخَاطِيَّات

Myxinidés (F). Myxinidae (E).

فصيلة السمك المخاطي من قسم الماصات .

Quittance (F). Receipt (E).

## ٢٥٩٠٧ - مَخَاصِمَة

هي الابرار .

Contravention

## ٢٥٩٠٨ - مَخَالَفَة

العمل الذي يقوم به المرء خلافاً لاحكام القانون او النظام .

Braconnage (F).

## ٢٥٩٠٩ - مَخَالَفَة الصَّيْدِ

Poaching (E).

عدم التقيد بأنظمة الصيد المرعية الاجراء .

Tube à essai (F).

## ٢٥٩١٠ - مَخْبَر

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

## ٢٥٩١١ - مَخْبَر

هو المختبر ، اطلبه .

Fournil (F). Bake house (E).

## ٢٥٩١٢ - مَخْبَز


بناء الفرن وادوات الخبازة .

Boulangerie (F).

## ٢٥٩١٣ - مَخْبَزَة ، خَبَاكَة

Baking (E).

صناعة الخبز ومكانها .



مَخَاضَة



مَخْبَر

البراري والاحراج المبعثرة الاشجار . خنافسها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبقوق والبنق والنباتات النملية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان ، كوسلها الى السمرة السوداء طولها تزاريق عاجية . ظهرها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثنائي العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن مبيحداً على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكال الجسوري تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، سداسي الارباب ، حنطي اللون ، اصفر الموج ، اسمر الرأس والارباب .

## ٢٥٨٩٥ - مَخَاسِ الْعُشْبِ \* ، مَخَاسِ حَبِيب

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocéphalus primarius (E).

حشرة غاضلة من النضاريات مغذات الاجنحة . تألف البراري والاراضي الملحاة . خنافسها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الالوان . رأسها وكوسلها وبطنها وبرازها الى السوداء الاخضر الموج . ظهرها الى الحمرة الاربانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان . زياتاها خيطيان . ظهرها متشدد الاحدياب مقطوم الطرف اللاحف . غذاءها نباتية التحيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن على الصفحات السفلى من نصال المعص والالوراق || والبرقة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الارباب ، اغبر اللون ، اصفر الموج ، اسود الرأس ، يملو من جانبيه غط من النقط السر المتبوعة بزوج من الحلب القصير || طور الاكمال ينقي في التربة ضمن حبيرة جرابية الشكل .

## ٢٥٨٩٦ - مَخَاسِ الدَّسْرِين \*

Cryptocéphalus Mariae (S). Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F). Cryptocéphalus Mariae (E).

حشرة واشعة غاضلة من النضاريات مغذات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار الدسرين والعصر والابهل والدرام ... يرقاتها تعيش على الالواق فتتغصم الخنصيب بين الثروق ثم تلمغ النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقعة الصفراء البرتقالية الموج . كوسلها ثلاثي التزاريق السود . ظهرها مخدع بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || والبرقة عند ادراكها الكال الجسوري تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثني اللون ، اسمر الرأس والارباب تملو ثلاثة خطوط قاطبة سمراء اللون || طور الاكمال الذي يعيش نحو اربعة اسابيع ينقي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المجفوة بالبراز والرياح .

Rayonneur (F). **مِخْبُطٌ** \* - مِخْبُطٌ \*  
Drill (E).

جهاز ثنائي أو ثلاثي أو خماسي الاسنان يستعمل في تخديد التربة خطوطاً مستقيمة متساوية الابعاد البينية .

Canaliculé (F). **مِخْبُطٌ**  
Channelled, Furrowed (E).

نمت وصني يطلق على بعض اعضاء الحشرات كالكواسل والاعواد الميزابية التخديد .

Narcotique (F). **مِخْبُطٌ** \*  
Narcotic (E).

كل نبات يحوي اشياء قلبية مخدرة كالتيغ والحشاش وما اشبه .

Dominant (F). **مِخْبُطٌ** \*  
Dominating, Ruling (E).

هو العفار الذي ينتفع من الارتفاع .

Employeur (F). Employeur (E). **مِخْبُطٌ**  
الخدم او المستخدم هورب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

2٥٩٣٠ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hachoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E).

آلة لا لقياسة الشكل والحجم تستعمل في اغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

2٥٩٣١ - **مِخْبُطٌ**  
غمر الارضين : شها للزراعة . او ارسل فيها الماء لتجمد .

2٥٩٣٢ - **مِخْبُطٌ** \*  
Stylée, Stytaire (F). Stylar (E).  
شكل من زياتي الحشرات ونصال الاوراق يشبه الخرز .

2٥٩٣٣ - **مِخْبُطٌ** \*  
Cueille-fruits (F).  
اداة تستعمل لقفط الثمار .

2٥٩٣٤ - **مِخْبُطٌ**  
Cône (F). Cone (E).

2٥٩٣٥ - **مِخْبُطٌ**  
Conique (F). Conical (E).

2٥٩٣٦ - **مِخْبُطٌ** \*  
Conoide, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E).  
نمت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

2٥٩٣٧ - **مِخْبُطٌ** \*  
Conifères (F).  
فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

2٥٩٣٨ - **مِخْبُطٌ** \*  
Conirostres (F).  
رؤية من الطيور الجوارح تشمل عدة فصائل ، اشهرها الششوريات والقريبات والقرقفيات .

2٥٩٣٩ - **مِخْبُطٌ** \*  
Conicité (F). Conicalness (E).

2٥٩٤٠ - **مِخْبُطٌ** \*  
Clapier (F). Hutch (E).  
مكان تربية الارانب ان يقفص او رديعة .

2٥٩٤١ - **مِخْبُطٌ** \*  
Official  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

2٥٩٤٤ - **مِخْبُطٌ** \*  
Malaxeur (F).  
Kneader (E).

2٥٩١٥ - **مِخْبُطٌ** \*  
Laboratoire (F). Laboratory (E).  
مكان التجريات والفحوصات والتحليل المختلفة .

2٥٩١٦ - **مِخْبُطٌ** \*  
Mixtiligne (F).  
Mixtilineal, Mixtilinear (E).

كل رسم يختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .

2٥٩١٧ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétéromères (F).  
Heteromera (E).

رؤية حشرات من مفندات الاجنحة .

2٥٩١٨ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétérocardes (F).  
Heterocarda (E).

رؤية حيوانات من الرخويات المدعية الامانيات الخياطين .

2٥٩١٩ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétéropodes (F). Heteropoda (E).

رؤية حيوانات بحرية من الرخويات مدعيات الارجل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها شقية ، مية ، مفترسة . ملجئها الحيواني جماعي . تعيش في عرش البحر ولا تقرب الشقوق . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتعمل على ظهورها ، بطونها موهبة نحو سطح الماء . اجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي باخطام متفانية الطول . ارجلها زعنافية الشكل تناسب الحياة البنية لا اشهر فصائلها الاصلطيات والعريانات .

2٥٩٢٠ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétérocères (F).  
Heterocera (E).

رؤية حشرات من حرشفيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . اشهرها القريبات والتاريات والنسقيات والحوليات والارقيات والفنقيات والقناتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكبة العادية الزعاج وبقرنها الاستنعارية اللاقياسية . غادراتها مجلبة بشرفة .

2٥٩٢١ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétérotriches (F).  
Heterotriches (E).

رؤية حيوانات دنيا من المدهيات او النقيبات الهديبة .

2٥٩٢٢ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétéroptères (F).  
Heteroptera (E).


رؤية حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . منظمها متوسط القد او صغير . ضبا الهجنة والعامة الجناح . قرونها الاستنعارية قصيرة . اخطامها ثقاة ماصة تمسكها من ثقب الانسجة النباتية وانصصاص النسج . من ميزات بعض فصائلها ما تنقلده ، عند الدفاع عن النفس ، من سرائل كريمة الرائحة تخزنه في غدد خاصة || اشهر فصائلها : النسمجيات والبقيات والطرثريات والفايساليات .

2٥٩٢٣ - **مِخْبُطٌ** \*  
Hétérocarpe (F).  
Heterocarpous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقياسية الثمار .

2٥٩٢٤ - **مِخْبُطٌ** \*  
Fosse à fumier (F).  
Midden-pit (E).

حفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادره .



مِخْبُطٌ




مِخْبُطٌ



مِخْبُطٌ

وفي عرم السباد المدد لتكاثر الفطور المأكولة كالغاريقون المرئي وغيره || مظهره الخارجي كتل ندية الشكل يضاه اللون او صفراء تركب طبقة العرمة السطحية حيث تتشب غيوطها المتشابكة التي تحول دون نشوء الغاريقون وغيره || يكافح باجتناح الاسمدة التي يملؤها اللغن والاسمدة العضوية الكثيرة المواد المنحلة التي قمل فيها التحخير .



مخضل

Rayonneur (F). Drill (E).  
آلة تستعمل لتخطيط صفوف الفرس ، راجع مخداف .

Mégamètre (F).  
Megameter (E).  
جهاز آلي يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lolipes (S). Lolipède (F). \*  
مِخْطَاف \*  
طائر وحيد الجأش والنوع من عمارة العماليات وفضيلة دجاجيات الارض . طوله نحو ٢٠ سم . ثوبه اسم الظهر يعلو تنسيق ورقيط . بطنه وصدره واثنيكه بيض . رأسه اسود القمة ابيض الحاسر . عيناه مكشطان بالاسود . منقاره مقطوع الطرف . ارساغه قصيرة وقوية . اصابعه مفصصة الحظاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويعوم كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والقشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الانثى تدثن في البر ، قرب الماء ، بين الاشجار . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



غضير لوتيا

Graphique (F). Graphic (E).  
مِخْطَاط  
هو الخط البياني .

Zébré (F).  
Striped like the zebra (E).  
مِخْطَاط ، زَرَبِي  
نعت تعريبي توصف به الاثواب الحيوانية المخططة بخطوط معترضة كما في سمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).  
مِخْطَاط  
هو الفك أي فك منقار الطائر وما يشابه . ج مخاطم .

Mandibule (F). Mandible, Jaw (E).  
مِخْطَاطَات الرُّؤُوس \*  
Rhynchocéphales (F).

رتبة من الزحافات يعود ظهورها الى الاباح الثاني وقد افترضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخبريه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثال المسب الاول .

Levier (F). Lever (E).  
مِخْلَب  
هو الرافعة والمثلة ، اعطابها .

Musette (F). Nose bag (E).  
مِخْلَاف  
كيس صغير يوضع فيه العلف ويعلق برأس الدابة .

Acétomètre (F).  
Acetometer (E).  
مِخْلَال  
المخلال جهاز يستعمل في قياس حموضة الخل . ويدعى ايضاً قياس التحليل .

Griffe, Serre (F).  
Claw, Talon (E).  
مِخْلَب  
ظفر سباع الطير كالبرئ من سباع الوحش .

Xylomètre (F).  
Xylometer (E).  
مِخْشَاب \*  
جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترهلها تلك القطعة .

Glacière (F).  
مِخْشَف  
راجع مثلبة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E).  
مِخْشَلَة  
أداة تستعمل لفرز الحبوب والأتار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

Ligneux (F).  
Ligneus, Woody (E).  
مِخْشَوْشَب ، لِيْنِي  
يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، ومكسه النبات العشي . وما بين الفئتين يسمى النبات امخشوب أي الليني .

Éliminé (F). Eliminate (E).  
مِخْشُول \*  
كل هجين من الحيوان صار النبات صار ابعاده لنقص في صفاته المطلوبة او المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E).  
مِخْشَاب  
هي التربة الجيدة الاتارة العادمة الجلب .

Fécondateur (F).  
Fecunder (E).  
مِخْشَب ، مَزْكِم  
المخشب والمزكم من الحيوان من كان يحمل طاعة الاخصاب .

Barattage (F). Churning (E).  
مِخْشَف  
فرز الكتانة بعد مزجها لاجتماع واندمام الكريات الزبدية وانفصالها عن الخيض .

Gazonnant (F).  
Grassy, Turfy (E).  
مِخْشَوْفِر  
ارض كثيفة العشب الاخضر المعمر . راجع خضير ويغضور .

Gazon (F).  
Grass, Turf, Sward (E).  
مِخْشَرَة  
ارض كثيفة العشب الاخضر المعمر . راجع خضير ويغضور .

Psychromètre (F).  
Psychrometer (E).  
مِخْشَل \*  
أداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E).  
مِخْشُون \*  
المخشون الشبيه بالاج .

Myceliophthora (S).  
مِخْشَوْفِر \*  
جلس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . يتميز بكتائده القصيرة الشعب ، الصغيرة القد ، البيضيه الشكل ، للانقباضية التجميع اذ انها تحوي الفردية والفصية || انواعه قليلة ، امرفها مخضير لوتيا .

Myceliophthora lutea (S).  
Ver-de-gris du champignon de couche (F).  
مِخْشَوْفِر لُوتِيَا \* ، مِخْشَوْفِر أَصْفَر \*  
نوع من المخضير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد العضوية



مخطاف

ازهارها نورية التجميع . ثمارها تفحة لونها الى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُخَمِّلِيَّة**  
Linaire commune (F).  
عشبة مشهورة باسم لينارية عادية ، اطباها .

٢٥٩٧٧ - **مَخْلُوق** (F). Creature (E).  
كل كائن حي يدعى مخلوقاً . والمخلوقات الحية تقسم الى ملكيتين مملكة الحيوان وملكة النبات || مملكة النبات تقسم الى نحو ٢٠٠ مليون نوعاً تنتمي الى مئات الفصائل والرتب والصقوف || اما العدد التقريبي يختلف انواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ومائتي عشر ألفاً كما هو مبين في الجدول التالي .

العدد التقريبي لاختلاف أنواع الحيوان المعروفة

Nombre approximatif d'espèces animales connues

صف	صيف	عدد الانواع	Sub-Class	Classe
فقاريات	٦.٠٠٠			Vertébrés
مفصليات	حشرات متكويبات قنريات دعماحيات	٧٥.٠٠٠	Insectes	Anthrôpodes
		٣.٠٠٠	Arachnides	
		٢.٥٠٠	Crustacées	
		٨.٠٠٠	Myriapodes	
رغويات	١.٠٠٠		Mollusques	
حليقات	٨.٠٠		Annélides	
حويئات طليعية	٤.٠٠		Bryozoaires	
شوكيات	٥٧.٠٠		Echinodermes	
سليكات	١.٠٠٠		Nématodes (vers ronds)	
حريقات	١٤.٥٠		Vers plats	
مجموعات	١.٠٠٠		Coelentrés	
إسبنجيات	٤٣.٠٠		Spongiaires	
أركبات	٣.٠٠٠		Protozoaires	
دورات	١٥.٠٠		Rotifères	
مخلف	٢.٠٠		Divers	
		١٠٨.٠٠٠		

٢٥٩٧٨ - **مِخْمَار** \* (F). Zymosimètre, Zymoscope (F).  
Zymosimeter (E).

المخار جهاز تقاس بواسطة درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُخَمِّلِس**، **مُخَمِّلِسُ الزَوَايَا**، **مُخَمِّلِسُ الْأَضْلَاع** (F). Pentagone (F).  
Pentagon (E).  
من الاشكال الهندسية وغيرها ما هو مركب من خمس زوايا او خمس اضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُخَمِّلِسِي**  
Pentagonal  
ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مُخَمِّلِيَّة** \* (F). Tagetes (S). Tagète (F).  
Marigold (E). Samtblume, Studentenblume (D).  
Tagete, Puzzoloni (I).  
جنس نباتات من الشرنقيات وفصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . اوراقها لا قياسية الشكل والارتكاز . ازهارها صفراء اللون او برتقالية . بتلاتها خلية الملس يفرح منها عند اللس رائحة مسهجة || اشهر انواعها الازينية ما يلي .

٢٥٩٨٢ - **مُخَمِّلِيَّة جَسَدِيَّة**، **قَرْتَنُفُلُ الْهِنْد**  
Tagetes patulus (S). Tagète touffue, Cillet d'Inde, Veloutine, Passe-velours (F).  
نوع من الحمليّة الازينية المشهورة . غروبها عديدة

٢٥٩٦٧ - **مِخْلَب**  
Griffe (Hort.) (F). Root (E).  
كلمة تطلق على جذور وقصوص وبجذامير بعض النباتات لقرب شبهها بالخلع .

٢٥٩٦٨ - **مِخْلَبُ التَّنِين**  
Pterospira (S).  
Pterospora (F). Dragon-root (E). Drachenroot-baur (D). Pterospora (I).  
عشبة طفيلية ممرية في فصيلة الخنجنيات . اعطائها انبلاذ الباردة . تتميز بازهارها المتعددة التجميع الطرية الشكل .

٢٥٩٦٩ - **مِخْلَبُ الْعُقَاب**  
Astragale (F).  
هو الاسطراغالوس ، من نباتات الفصيلة القرنية ، اطباها .

٢٥٩٧٠ - **مُخَمِّلَات**  
Crassulaceae (S).  
Crassulacées (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة لحمية صغيرة . ازهارها ، في الغالب ، عشوية وهي ابليّة او هامة الارتكاز ، جيلة الشكل ، زاحية الالوان . نباتاتها رضية تمشي في جميع الارربة وقد تفضل القليلة الحصب .

٢٥٩٧١ - **مُخَمِّلِدَة** \*، **دَمُ الْعَاشِقِ**، **زَرْحَنِي**  
Gomphrena (S). Gomphrène, Amarantoïde (F).  
Globe amarant (E). Gemeiner Kugelamarant (D).  
Amaranto, Amarantoïde (I).  
جنس نباتات عشبية مزينة من فصيلة القطيفيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراقها لاطئة متعاقبة . ازهارها نورية التجميع ، ابليّة الارتكاز او طرية || اشهر انواعها الازينية ما يلي .

٢٥٩٧٢ - **مُخَمِّلِدَة بَرْتَقَالِيَّة**  
Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphrène orange, Amarantoïde de Haage (F).  
عشبة حولية جادسة فراء تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها بيضية النصل . ازهارها برتقالية اللون ، نوربها ثلاثية الازهار الكبيرة القد || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُخَمِّلِدَة كَرَوِيَّة**  
Gomphrena globosa (S). Gomphrène globe, Amarantoïde globe, Amarantine, Immortelle violette (F).  
وتس (عاشق وممشوق) عشبة حولية فراء مثنوية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النصل . ازهارها بتفسجية اللون ، نوربها ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُخَمِّلِدَة لَطِيْفِيَّة**  
Gomphrena pulchella (S). Gomphrène gracieuse, Amarantoïde gracieuse (F).  
عشبة حولية مبروتية فراء تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها سنانية ضيقة تطول نحو ٥ سم . ازهارها ودية اللون ، نوربها ثلاثية او خماسية الازهار ، قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || ازهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مُخَمِّلِس**  
Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).  
نوع من الصربة وهي شجرة برية فراء رمعية الشكل تملو من ٣ الى ١٥ م . اوراقها منعقة ، متعاقبة ، عابطة . نصلها يطول من ٦ الى ١٤ م . ويعرض من ٤ الى ٩ سم .



مخلدَة



مخلس



مخار



مخلية



٢٥٩٩٥ - **مَخَيَّرَكَة** (F). Culture de concombre  
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مَخِيض** (F). Babeurre, Lait écrémé (F).  
Whey, Buttermilk (E).  
الحليب الباقى بعد فرز قشده ، ويعرف أيضاً بالمخوض .

٢٥٩٩٧ - **مَخِيضُ الْمَاءِ \*** Ceyx  
جنس طير من القريبات. أنواعه ثمانية موطنها البلاد الآسيوية.  
تتميز بمنقارها الكبيرة القند اللطيفة القاعدة الحمراء اللون .  
اجنحتها طويلة . أذناها وراسها قصيرة . لوهاها الى  
الصهوة البرتقالية . رؤوسها واجنحتها سود ملتحما بحشة  
بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها  
الاسماك والقرشريات والحشرات على اختلاف فصائلها .  
انها تألف في صدور الصخور تبيض من ٧ الى ٩ بيضات  
تحضنها نحو الاسويين .

٢٥٩٩٨ - **مَخِيْطَة** (F). Sébeste (F). Sebesten (E).  
ثمره الخاطئة اي اللب . كانت ولا تزال تستعمل في الطب  
لتلين الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مَخِيْطَات** (F). Cordiaceae (F).  
Cordiaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها كثيرة  
العدد ، اعطانها البلاد الحارة والاستوائية . اشهر اجناسها  
الحطاة المعروفة بالسبستان .

٢٦٠٠٠ - **مَخِيْلَة** Nimbus  
هي الدججة ، نوع من الغيوم ، اطلسها .

٢٦٠٠١ - **مُدَّ**  
المد ، مكيال لا يقاسي الحجم يختلف من بلاد الى بلاد  
ومن منطقة الى منطقة في ذات البلاد . ج امداد وبعدة  
وبداد .

٢٦٠٠٢ - **مُدَّاخِل** Aboutissants (F).  
Bordering upon (E).  
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهة الطول .

٢٦٠٠٣ - **مُدَّاد** Plagiotrope (F).  
نعت وصفي يطلق على كل نبات نوعة فطره اقلية  
الانتشاب .

٢٦٠٠٤ - **مُدَّاد \*** Hemidactylus turcicus (S).  
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).

حيوان بيوض من الغطاء وفصيلة الزفريات . جسمه صغير  
القند يطول نحو ١٠ سم . رأسه بيضي اللون . عيناها  
مستحاثان . اجفانه شفافة ثابتة . اذناه رافعتا الفشل  
الصواني المكفوف . لسانه نغلق الطرف . ظهرو مثقل  
بطنه كثير الحراشيف الصيقة . ذنبه سريع الانقسام .  
قوائم صغيرة . اصابعه نصفية الخطاب مجزئة بلواقط  
عززة تمكنها من السير على السقف || ثوبه الى الصهوة  
الخطية المرقشة بالانمز والاعبر ، لكنه يمان الخيط  
المجود فيه || يألف المواقع الكثيرة الجارية والمساكن  
الارضية . يسرح في النهار وفي الليل . قوته اللباب والبومض  
والعناكب والديدان || يعتبر من الزحافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مُدَّاد** Traçant (F). Running (E).  
نعت تعريفي يطلق على الجلود الاقلية الانتشاب وتل  
الوق التي تفرش التربة .

فلواقها قند النبات ولون الانزعاج . جميعها حولية تملو من  
٢٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية  
التصل . ازهارها عطقية التجميع ، تاجية . لوها الى الصفرة  
للتفاوتة التوشج والمواج || تنورها يستمر من تموز  
الى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَيِّلَةٌ لَامِعَة** Tagetes lucidus (S).  
Tagète luisante (F).  
عشبة سرويتية معمرة ، طرخونية الرائحة والطعم ، تملو من  
٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة . نصلها ساني  
الشكل ، مسن الحافة ، لامع الصفحة الشديدة الخضار .  
ازهارها احداق متتابعة كالعنقود . ازهارها لبد نارية  
اللون || تنورها يستمر من آب الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَيِّلَةٌ مَرْقِطَة** Tagetes signatus (S). Tagète mouchetée (F).  
عشبة سرويتية معمرة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها  
متعاقبة مفردة وسنتة . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها  
ذهبية اللون مرقطة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز  
الى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَيِّلَةٌ مُنْتَصِبَة ، وَرْدَة الهند** Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).  
عشبة سرويتية حولية تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها  
لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشرم القدي المسن . ازهارها  
عطقية التجميع ، كبيرة القند ، لوها الى الصفار الكبيرتي  
اللامع || تنورها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مَخْن** غن العود : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مَخِيْثَات ٥** Androgyne (F).  
Androgynous (E).  
نعت تعريفي يوصف به كل نبات يحمل الازهار الذكرية  
والانثوية معاً كالجوز مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مَخْفِق** Etouffer (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مَخْيِيَّات ٥** Hyalostilbacées (F).  
Hyalostilbaceae (E).  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الكميبيات . تتميز باعضائها  
المهوائية الشفافة . اجناسها وانواعها عديدة اما المؤذي منها  
قليل . اشهر اجناسها المؤذية الازارية والكحية .

٢٥٩٩٠ - **مَخْيِي ، مَخْيِيَّي** Sensorial (F).  
Sensorial (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى الخبيخ .

٢٥٩٩١ - **مَخِيْط** Hétérogame (F).  
Heterogamous (E).  
نعت تعريفي يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً  
ذكوراً واناثاً في تزويج واحد . راجع مبيزن .

٢٥٩٩٢ - **مَخِيْطَال** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مَخْيِيْخ** Sensorium (F). Sensorium (E).  
الخبيخ مركز الحواس في الدماغ اي انه المركز الذي يتلقى  
الاحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مَخْيِر ، مَدْيَق ، مَهْر** Lait mouillé (F). Milk and water (E).  
هو الحليب المعرب بالماء .



مخيط الماء



مداد

## ٢٦٠١٧ - مَدَاهِين صَفْصَافِي الرَّقَى \*

*Helianthemum salicifolium* (S). Héllanthème à feuilles de saule (F). Willow leaved rock-rose (E). Sonnenröschen, Citröschén (D). Elantemo (I).  
بجلة سبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منفردة مسترسلة. اوراقها معقوفة صفصافية الشكل. ازهارها عذكويلة التجميع، محورية الارتكاز، لونها الى الصفار الذهبي اللامع تملو رقة ارجوانية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Traitement (F). Treatment (E). مَدَاوَة ٢٦٠١٨  
هي المالجة، اطلبها.

Acuminé (F). مَدَّيَب ، مَوْتَف ٢٦٠١٩  
Acuminate (E).

تعت تعريفي توصف به اعضاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحمة وبنقها.

Tannerie (F). مَدَّيَعَة ، مَتَفَفَة ٢٦٠٢٠  
Tannery (E).

Délai (F). Delay, Time (E). مِدَة ٢٦٠٢١

Entélégyes (F). مَدَّكَرَات ٢٦٠٢٢  
Entelegyna (E).

فتة من العناكب تتميز بوضوئها المركبة من ثمان زلأم وبالنسوات الشَّوْرَاية المذشرة عند الذكور والاناثا.

Notacanth (F). مَدَّج ٢٦٠٢٣ ، مَشَّق ٥  
Notacanthus commun (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة المدجيات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم. اجسامها مستطيلة الشكل مدنية، تطلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة. اخطاها منقبضة صغيرة. عيونها مستديرة بارزة. زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة. انفاها الى السمرة الرصاصية يملوها موج اسفح. لحومها مأكولة متوسطة الصنف.

٢٦٠٢٤ - مَدَّج مَبْدُول \* ، مَشَّق مَبْدُول  
Notacanthus vulgaris (S). Notacanth commun (F). Common Notacanthus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة المدجيات ورتبة شائكيات الزعانف. اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثنات المتوسطة الغور || جسمها سطوي الشكل ، مستطيل الذنب، معتدل التبطيط، يطول نحو ٤٠ سم. ثورها الى الطحلة الرصاصية السفاه الموج. ظهرها شديد السمرة. بطنها باهت الخفصاف. رأسها شارف الجبهة. منقبض الخطر، صغير الفم، قصير الشق العريض. اسنانيا صغيرة، ذرية. عيناها صغيرتان، بارزتان. حذقة عيناها سوداء لامعة. زعنفتها الظهرية كثاية عن ستة مناسخ متتابعة منقبضة، شائكة. الصدرية تساعية الشع السرحة. الخوضية بطنية الارتكاز، سباعية الشع. الشرجية مستطيلة، خفيفة، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناسخ حادة الاطراف. ذيلها عادم الزعقة، دقيق الطرف || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

Poulailler (F). مَدَّجَجَة ٢٦٠٢٥  
Hen-house, Hen-roost (E).

هي زريبة الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتصيات الصحية.

Verminière (F). مَدَادَة ٢٦٠٠٦  
حفرة يرقي فيها البود الذي يعمل طعاماً للسك.

Orbite (F). Orbit (E). مَدَّار ، فُلُك ٢٦٠٠٧  
طريق الكوكب السيار.

Orbitale (F). Orbital (E). مَدَّارَة ، وَقَبَة ٢٦٠٠٨  
المدارة خط سير اجرم المتحرك.

٢٦٠٠٩ - مَدَّارِي ، فُلُكِي ، وَقَبِي  
Orbital (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بخط سير الاجرام المتحركة.

٢٦٠١٠ - مَدَّاقَة  
كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها تدعى مَدَّاقَة.

Vin ٢٦٠١١ - مَدَّام  
هو الخمر والتبذد وابن الحاة وابن اللذ.

Oenologie (F). Oenology (E). مَدَّامَة ٢٦٠١٢  
هي علم الخمر، علم يبحث في صنع الخمر وسففلها.

Eau salée, Eau de mer (F). مَدَّان ٢٦٠١٣  
الماء الملح، ماء البحر.

Plectranthus (S). مَدَّان \* ٢٦٠١٤  
Plectranthe, Germaine (F). Plectranth, Chinese basil (E). Hahnensporn (D). Plectranco (I).  
جنس نباتات جينية معمرة عطرية من فصيلة الشفويات. انواعه زهاء ٤٠ معظمها بري وبعضها تربي. سوقها فروعها تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. فروعها خفيفة الانفراف زياه اللحاء. اوراقها كاملة متقابلة معتقة. نصلها قلبي الشكل، مسن الحافة، خلي البشرة صلي صفحتيه. ازهارها صغيرة القند زرقاء اللون عذكويلة التجميع فواعة العرف المستحب الذي ينفر منه العث.

٢٦٠١٥ - مَدَاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس  
Helianthemum (S). Héllanthème (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الاديديات. انواعه عديدة، معظمها بري منبته الجبال والخصاف وبعضها تربي. زرع بين الصخور. سوق فروعها. فروعها مستطيلة. اوراقها لا قياسية الارتكاز والشكل. ازهاره صغيرة القند متعددة الالوان. وهو يرغب في الموامع الجافة وفي المراض الجنوبية الكثيرة الفصح || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٦٠١٦ - مَدَاهِين شَالَع \*  
Helianthemum vulgare (S). Héllanthème commun (F).  
Herbe d'or (F). Sun-rose, Common rock-rose (E). Echtes Sonnenröschen (D). Panacea, Chironia, Erbo d'oro (I).

نوع من المداهين، ضروبه الزراعية عديدة، تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة. اوراقها متقابلة اذنية. نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ الى ٤٠ م. ويعرض ٥ الى ١٥، ازهارها بسيطة او مكسية تعرض من ٢ الى ٤ سم. الوانها عديدة تختلف باختلاف الفروم منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من ايار الى آب.



مدان



مداهين شائع



مداهين صفصافي الرق



مدج مبدول

تنقيض وتكثور عند الطاب . بغض اجناسها أدر والبغض الآخر جزئي التسين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار .

Ferme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدْعَة ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من أي جنس كانت . وهي تشمل الأرض وما عليها من ابنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدْرَوَان \* Crocethia alba (S).

Cocorili des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزرقاقيات . مشاه بعض شطوط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . صيفه شطوط البحار الشمالية . قوته البديدان والقشريات والرخويات التي تلتفها الأمواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصيفي إلى السواد تملو رقعة صناعية يتخللها الأبيض في الرأس والرداء والجناح والذنب ، صدره إلى الشقعة ، بطنه أبيض . منقاده وساقه إلى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي إلى الزبداء في الرأس والرداء والجناح والذنب وإلى البياض الناصع في الصدر والبطن . الأني تتحل بنفس الثوب || يذئن انغموسه في الرمال . الأني تحضن وحدها من ٣ إلى ٤ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٧ يوماً .



مدخه

٢٦٠٤٣ - مَدْسُج دويبة تلجج كالمتكبريت (اللسان) .

Tropisme (F). Tropism (E).

شذوذ عرضي في نحو بعض اعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تؤثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والاختفاء .



مدروان

Déversoir (F).

Overfall, Waste-Weir (E).

المدرق المكان الذي يفيض منه الماء المجهوز .

٢٦٠٤٦ - مَدَشَاشَة زَبَاء \* Henicopus pilosus (S). Henicope poilu (F).

Henicopus pilosus (E).

حشرة واسعة قانصة من فصيلة المملحات ورثية معدقات الإجنسة . تألف البراري والمخولق المزدرة . خنافسها تعيش على رقيق الازهار وبلاستها . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وراء اساريع الحشرات الخائبة لاقتناصها || جسمها صغير القد ، كثيف الزغب والهلج ، يطول من ٧ إلى ٨ سم . لونها صفيرتان بارزتان . زباناها غيبطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللائح ، تحيل التحزيز الغمدية . ارساغها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . ترحس في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح المكن مباحداً تحت لحاء الاشجار وشورها وتحت الانفاض وفي الجملانة والعلب || البرقة عند بلوغها الادراك التام تعطل من ١٢ إلى ١٤ م . جسمها اسطواني الشكل ، مستطيل الرأس ، اسمر اللون الكادمي ، سداسي البرواجب التنحيلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .



مدشاشة زباء

٢٦٠٤٧ - مَدْعَر ، طَالِب Requéant, Demandeur (F). Plaintiff, Petitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدْعَة جورة التارجيل المفرقة من لها يغرف بها .

Notacanthidae (S).

٢٦٠٢٧ - مَدَجِيَّات ٥

Notacanthidés (F). Notacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكانت الزعانف . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها المدج .

Pondol d'autruche (F).

٢٦٠٢٨ - مَدَحِي ٥

Nest of ostrich (E).

انحوص تحفزه القارص اي النعامة الانثى في الرمل . قطره نحو ١٠٠ سم . وعقه نحو ٣٠ سم . تضع فيه من ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بمتابعة الظلم .

Rechaussement (F).

٢٦٠٢٩ - مَدَحْج ٥

علبة زراعية قوامها حشن جذع الشجرة او ساق الشتيلة الفتية بقليل من التراب للحماية .

Fumivore (F).

٢٦٠٣٠ - مَدِخْكَان ٥

Smoke-consuming (E).

نعت تعريفي يطلق على كل جهاز يمتص الدخان فيحرقه .

Polypler (F). Polyp (E).

٢٦٠٣١ - مَدِخْخَة \* ٥

مجموعة من المديخ تعيش على قاعدة كلية واحدة .

Provision (F).

٢٦٠٣٢ - مَدِخْخَر ٥

Provision, Store (E).

المدرس هو الذخيرة ، اطلها .

Apport (F).

٢٦٠٣٣ - مَدَد ٥

Lactigène (F).

٢٦٠٣٤ - مَدَرَّار ، مَرْدَغَاد ٥

Lactigenous (E).

كل ما ينشط اللبن ويزيد من قدره .

Tubérigène (F).

٢٦٠٣٥ - مَدِرَّان ٥

نعت تعريفي يطلق على الجين المدرة الشكل .

Glèbe, Motte de boue (F). Glebe, Sod, Clod (E).

٢٦٠٣٦ - مَدَرَّة ، تَلْعَمَة ٥

الكثلة من التراب المماسك .

Galéa (F).

٢٦٠٣٧ - مَدَرَّة ٥

هي المكنتاة ، اطلها .

Processus (F). Process (E).

٢٦٠٣٨ - مَدَرَّج ٥

التطور التدريجي للنتيق المتتابع .

Bateuse (F).

٢٦٠٣٩ - مَدَرَّس ٥

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدس الحنطة والشعير .

Armadille (F).

٢٦٠٤٠ - مَدَرَّع ٥

هو التاتو ، حيوان صفن الجلد المدرع ، اطلها .

Dasypodidae (S).

٢٦٠٤١ - مَدَرَّعَات ٥

Dasypodidés (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها ملهوفة بدروع عظمية وغضروفية حزامية التركيب

Dopé (F). Doping (E). ٢٦٠٦٤ - **مُدْهَوْش** \*

من اجترع الدمشة ان كان انساناً او جرّع الدمشة ان كان حيواناً .

Cuverie, Cuvier (F). ٢٦٠٦٥ - **مُدْكَه** \*  
السرداب او البناه الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). ٢٦٠٦٦ - **مُدْكَر** \*  
شبه من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس نكت  
تخالف سائر لونه .

Oléomètre (F). ٢٦٠٦٧ - **مِدْهَكَان** \* ، **مِزْيَات** \*  
Oleometer (E).  
جهاز تقاس به كثافة الادعان والزيت .

٢٦٠٦٨ - **مُدْهَوْب** \*  
Nécrosique, Nécrotique (F). Necrotic (E).  
المدهوب من النبات ما كان مصاباً بالذهب ابي النخر .

Orbiculaire (F). Orbicular (E). ٢٦٠٦٩ - **مِدْوُكَار** \*

Spatule rose (F). ٢٦٠٧٠ - **مِدْوَالَس** \*  
هو الملاحقي آلوردي، طائر من طول الساق ، اطلبه .

Trochanter (F). ٢٦٠٧١ - **مَدْوَر** ، **مِدْوَر** \*  
عضو يجمع الحرقنة الى الفخذ .

٢٦٠٧٢ - **مِدْوَر** \*  
Cyclomètre (F). Cyclometer (E).  
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - **مُدْوَس** \* ، **مَدْوَر** ، **قَرَجَ الْبَحْر** \*  
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).  
الواحدة مدوسة ومدوسرة . جنس حيوانات هلامية بحرية .  
انواعها واشكاله عديدة تغلب فيها الاستدارة .  
الوانها تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني .  
وهي تضيء في الليل وتبدو في بعض الظروف والحالات  
شفافة كالزجاج . واذا ذرعت من شيء قلفته برشاش نافط  
يلدغ كثرشار النار . اشهر انواعها قنديل البحر وربة البحر .

٢٦٠٧٤ - **مُدْوَسِيَّات** \*  
Méduses (F). Medusae (E).  
حيوانات هلامية بحرية صغيرة القند تتنسى الى عدة فصائل  
واحدتها مدوسة .

٢٦٠٧٥ - **مَدْوُكَة** \*  
Madoqua (F).  
جنس ظباء افريقية متوسطة القد ، ربعة الجسم ، جميلة  
الشكل ، حنطية الثوب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب .  
انثاها جهاء . قرون ذكورها صغيرة القد ، مبطلة القواعد  
المتتابعة المحيصة ، مائلة الاطراف المستديرة المدببة .  
انواعها المعروفة ستة . اعطائها شاسعة الاطراف تمتد من  
تمام البحر الاحمر الى السودان والحيشة والصومال وكنيا .

٢٦٠٧٦ - **مِدْوَل** \*  
Médulle (F). Medulla, Pith (E).  
اسم يطلق على كامل المكك النباتي ، الداخلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - **مُدْوَلَم** \* ، **دَوْلَمِي** \*  
Dolomitique (F). ٢٦٠٧٧ - **دَوْلَمِي** \*  
Dolomitic (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه الدولوم .

Plaignant (F). ٢٦٠٧٩ - **مُدْعِي** \*  
Plaintiff, Complainant (E).  
هو من رفع ظلامته او دعواه امام المحكمة .

Défendeur (F). ٢٦٠٥٠ - **مُدْعَى عَلَيْهِ** \*  
Defendant (E).  
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

Conjuguees (F). ٢٦٠٥١ - **مُدْعَمَات** \*  
Conjugate (E).  
فصيلة نباتية من رتبة اخشيات الخضر . اجناسها وانواعها  
عديدة، جميعها من نباتات المياه العذبة، تتميز باشكالها  
الخطيطة الماعدة الفروع .

Alléomorphe (F). ٢٦٠٥٢ - **مُدْعُوش** \*  
نعت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المتناقضة المختلطة .

Amont (F). ٢٦٠٥٣ - **مُدْقَق** \*  
Up-stream, Up-river (E).  
المدقق او عالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه  
الجارية . يقابلها المسيب .

Enfouisseur (F). Burier (E). ٢٦٠٥٤ - **مِدْقَنَة** \*  
هي المطرسة ، أداة تصاف الى المخرات فتوجه الزبل في التلم  
ليطمره مقلب المخرات .

Légende (F). Legend (E). ٢٦٠٥٥ - **مِدْقَال** \*  
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير  
والأوان الخ .

٢٦٠٥٦ - **مِدْقَة** \*  
Pistil  
هي طرف المتاع اي عضو التأنيث في الزهرة . وهي عند  
ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جدورات الطلع من  
الالتصاق للاخصاب .

Pistillé (F). Pistillate (E). ٢٦٠٥٧ - **مِدْقِي** \*  
صفة الاثمار الرسيمة الشق المهزجة بمذقات اي اعضاء  
انثوية .

٢٦٠٥٨ - **مِدْدَال** ، **أندريس** \*  
Indice (F). Index (E).

٢٦٠٥٩ - **مَدْبَلَة** \*  
Platanale (F).  
Plantation of plane-trees (E).  
غابة الدلب والارض الكثيرة الدلب .

٢٦٠٦٠ - **مِدْبَلَج** \*  
Hérission (F).  
هو القنفذ ، اطلبه .

٢٦٠٦١ - **مِدْمَاك** \*  
Cordon du maçon,  
C. du charpentier (F). String, Strand (E).  
المدماك هو خيط البناء والتجار . وقد شاع استعماله للدلالة  
على ساف الحجارة البنية .

٢٦٠٦٢ - **مِدْمَكَة** \*  
Râteau (F). Rake (E).  
اداة تنثبي تجشبه ممرضة تتخللها اسنان من حديد تدم  
بها التربة اي تسوى .

٢٦٠٦٣ - **مُدْمَدِي** \*  
Fluviatile (F). Fluvatile (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة .  
وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها ويرفها .



مدقة



مدوس



مدوكة

Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإدراك التناسلي الذي يحصل بين الإغصاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات.

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مَدَاقِي

الفرس السريعة جداً.

٢٦٠٩٠ - مَدَال \* ، مَشْرِق مَبْدُول

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).  
Tanrec, Tenrec (E).

حيوان ليون حاشر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المذليات. موطنه جزيرة مدغشقر. يألف المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس. مسرعه دجوي. قوته البندان والحشرات وبعض جلود النبات || جسمه مكرهم صمغوي يطول نحو ٤٠ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل، مستطيل الخط. فكه الأعلل يتقدم الأسفل. عيناه صغيرتان. أذناه مستعرضتان. ذنبه ماسح لا وجود له. جرابه قمصية. أصابعه قوية. أطافره مخبئة، حادة الأطراف. عليه لبد قصير تتخلله مسال ذرية الأطراف متباعدة الطول والشحانة تكثف الرأس والعتق ويخرج الظهر حتى الكفل || يباته الشتوي ويستمر نحو خمسة أشهر. جرحه نفق مستطيل يحترقه في التربة || الأنتق ثلور تضع في كل رصص من ١٥ إلى ٢٠ جرواً.

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مَدَالِيَّات \*

Centetidae (F). Centetidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة. اجناسها وأنواعها قليلة العدد أعطتها جزيرة مدغشقر || اجسامها صغيرة، مكرمة، منقبضة، أخطاها مستطيلة جرابها قمصية. أطافرها قوية، ذرية. بعضها كثيف الوبر الناعم، قصير الذنب أو مستطيلة والبعض الآخر ماسح الذنب أو عادم، هليبي الوبر وتطو سلال متباعدة الشحانة والظليل || اعرف اجناسها المذال واليسل والبرقولي والميكروغال واليسنغال.

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مَدَبَاب \*

هو أكتال الذباب، اطليه.

Muscipidae (S).

٢٦٠٩٣ - مَدَبَابِيَّات \*

Muscipidae (F). Muscipidae (E).

فصيلة طير من الجواثم السليان المتناثر. أنواعها نحو ٣٧٥ جميعها من المصافير الصغيرة البند. أعطها تشمل مختلف مناطق السلال القديم. تألف اللغابات والحدائق والجائن. قربنا الحشرات اغصها الذباب.

Autel, Vesta (F). Ara (E).

٢٦٠٩٤ - مَدَبَح مَرِيح

المذبح المريح كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها تحت ذنب العقرب || عدد نجومها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة.

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مَدَحَاة

الارض البور لا شجر فيها.

Gäter (F).

٢٦٠٩٦ - مَدَوَر

To spoil, To damage (E).

مذرت البيضة: فسدت فهي مَذَرَة. والجوزة كذلك.

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٧٨ - مَدِيخ \*  
جنس حيوانات بحرية من المحفوات. أنواعه عديدة. اشكالها كالتبات. افرازها كلسي المادة سريع التحجير تعيش عليه وفي داخله.

Barbotage (F). Mess, Mash (E).

٢٦٠٧٩ - مَدِيْد

شراوب مرطب للدواجن يرتكز على اللقيق وبفض النخالة.

Cynanchum (S).

٢٦٠٨٠ - مَدِيْد \*

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamonea (I).

جنس نباتات مداة من فصيلة الصقلابيات. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم. معظمها بري وبعضها تربي. سوقها مداة عطفة يستخرج منها عصارة لبنة طيبة. أوراقها معقة متقابلة مزاوية التصل. أزهارها خاسية التركيب، صيوانية التجميع، محورية الارتكاز. اعرف أنواعه واشهرها المديد المعطر.

Cynanchum indicum (S).

٢٦٠٨١ - مَدِيْد عَطِطَر

Cynanche odorant (F).

جنية معمرة متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها عפרية اللحاء الخلفية. أوراقها مستطيلة الاضلاع. نصلها خلي الصفحة يطول نحو ١٤ سم. ويعرض نحو ٨. أزهارها جرسية الشكل، صفراء اللون، عطرية الرائحة اللبنة بالياسمين || أزهارها يستمر من أواسط تموز الى أواسط آب.

٢٦٠٨٢ - مَدِيَّة \*

Turbo (S).

Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة المذنيحات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة القد، متساقمة، محزنة الاغقاب، لؤلؤية الصفحات الداخلية، فسيمة القوفا شبة المستديرة || لحومها مأكولة واصداها صناعية.

Turbinidae (S).

٢٦٠٨٣ - مَدِيَّات \*

Turbinidae (F). Turbinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اميات الخياشيم. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداها غليظة متساقمة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدعة والبعض الآخر يشبه المداس || اعرف اجناسها واشهرها المديعة والدرعوسه والنبخفة.

Débiteur (F). Debtor (E).

٢٦٠٨٤ - مَدِين  
هو في الشؤون من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصص من كان عليه الدين.

Débit (F).

٢٦٠٨٥ - مَدِيُونِيَّة ، مَطْلُوب

Debit (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه.

Intestins (F).

٢٦٠٨٦ - مَدَاخِر

Intestine, Bowel, Gut (E).

هي الامعاء. يقال ملأت الدابة مَدَاخِرَها.

٢٦٠٨٧ - مَدَاَع

Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الابيض الذنب، اطليه.



مَدِيْد



مَدِيَّة



مَدَال

الى الصفرة يملؤها تجذيع معترض لا قياسي الشكل اسود اللون. روشنها الخلفيان مذهبان وبمفتاح بالاحمر والاطمحل. تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والدرناق والحوخ والكرز فينبف عن رقات خاضلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

### ٢٦١٠٧ - مِذْرَاب مَقُون \* ، مَقُون \*

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القد من عمارة المذاببات . جسمها اسمر اللون . بسطها لا تقل عن ٧٥ م . روشنها الى الصفرة يملؤها بمجانب وتنبق وتنسق وتسجيل متراكبة الالوان يكتر فيها الاسود والاطمحل والاحمر . روشنها الخلفيان مذهبان. تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجزر والشمار فينبف عن رقات تعيش على الاوراق فتلثمها .

### ٢٦١٠٨ - مِذْرَابِيَّات \*

Papilioninae  
عمارة حشرات من فصيلة الفراشات ورتبة حشرجات الاجنحة صوبليات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاتها متوسطة القد وكبيرة . الوانها متباينة الالوان الفاقمة . اشهر اجناسها المذاب والمذاب والميضام .

### ٢٦١٠٩ - مِذْرَب \*

Comète (F). Comet (E).  
كوكب طالع منتقل تتبعه سحابة مضيئة . حركة دورانه حول الشمس مستطيلة المدار || مد المذاببات المعروفة حتى الآن يتنازع ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ وظهر ايضا عام ١٩٨٦ .

### ٢٦١١٠ - مِذْرَب \*

Urodèle (F). Urodele (E).  
نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دوية او يرقعة او اسروع مجهزة بذنب او بزايدة تشبه الذنب .

### ٢٦١١١ - مِذْرَبِي \*

Sperme (F). Sperm (E).  
هو مني الحيوان عامة ، راجع مني .

### ٢٦١١٢ - مِذْرَبِيَّاب ، حَال \*

Solvant (F). Solvent (E).  
٢٦١١٣ - مِذْرَب

Dissolvant (F). Dissolvent (E).  
٢٦١١٤ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي

Lait mouillé (F). Whey (E).  
اللبن والمخيض والمهز ، مزيج من اللبن والماء .

### ٢٦١١٥ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي

Croc, Trident (F).  
Hook, Trident (E).  
اداة تستعمل في الزراعة لقلب التراب .

### ٢٦١١٦ - مِذْرَبِي

Amer (F). Bitter (E).  
نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

### ٢٦١١٧ - مِذْرَبِي

Myrrhe (F). Myrrh (E).  
صنع راتنجي يستخرج من سوق نجر المر . قال الدكتور ريزي مفتاح في احياء المذكرة عن الانطاكي ما حريفه : « هو السري في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة بالغرب فيجعد قطعاً الى حرة صافية ، منه ما يريد على ساق الشجرة وقد جد كالجواهر وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحسكي يبيض السمك في دسوته وصغره

### ٢٦١١٧ - مِذْرَاة \* ، مِذْرَبِي

Fourche (F).  
Fork, Pitchfork (E).  
اداة من خشب او حديد تلدى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزبل وغيرها .

### ٢٦١١٨ - مِذْرَبَة

Semoir (F).  
هي المبدر .

### ٢٦١١٩ - مِذْرَب

المذرع من الخيل والبقر وسائر الدواجن من كانت امه اشهر سلاله او عرقا واجود اصلا من ابيه .

### ٢٦١٢٠ - مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي ، مِذْرَبِي

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E).  
هو المزج بالماء كخسل اللبن بالماء فهو مذيق وغير .

### ٢٦١٢١ - مِذْرَبَة

Polyphyllie (F). Frenching (E).  
علية جمشورية قليلة الاذى شائعة في جميع بلاد العالم ترمي التبع تشبه نصال اوراقه وتقفي على صفه || مظهرها الخارجى اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة النصل وينتشر تدريجيا نحو الداخل الى ان يتناغم الضلع فنيو الورقة صفراء النسيج ، خضراء الضلع والعروق ، رافعة الوثين النخين || وفي حال اشتداد الة فاتها تسبب وباط الشتله وترا كب الاوراق التي تصعب مذكرة ، مستطيلة النصل الضيقة ، متعصبه الاطراف ، ملتوية الرؤوس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة اخصها قلبية التربة وطرط رطوبتها وضعت بمحوها الازوتي وقلة موادها الصفوية وصعوزها الجربوي || يقول العالم « ستينبرج » ان المذرة علة مجذها فديان خاص يفرزه نقطور تري ينس بايلوس سروس . وان هذا الفديان الذي يسبب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكوّن الحوامض الامينية اللطيفة التي تمعد هذه الشرايب او تقود اليها .

### ٢٦١٢٢ - مِذْرَب ، مِذْرَب

Adulte (F). Adult (E).  
من دخل في الدور الثاني من حياته وهو الدور القام بين الفتوة والشيوخة .

### ٢٦١٢٣ - مِذْرَبَة

Mémoire (F).  
Memorandum, Bill (E).  
عريضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

### ٢٦١٢٤ - مِذْرَبَة

Travail (F). Trave (E).  
آلة تربط بها احيوانات الكبيرة لتدل فتسهل مداواتها .

### ٢٦١٢٥ - مِذْرَاب الحَبِيَّات \*

Papilio alexanor (S).

فراشة متوسطة القد من عمارة المذاببات . جسمها اصفر اللون يملو غط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ م . روشنها الى الصفرة يملؤها بمجانب اسود اللون مختلف الاشكال والاحجام . روشنها الخلفيان مذهبان وبمفتاح بالاحمر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على معط نباتات الفصيلة الصبوانية فينبف عن رقات خاضلة تعيش على الاوراق تلثمها .

### ٢٦١٢٦ - مِذْرَاب اللوز \*

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambé (F).  
فراشة متوسطة القد من عمارة المذاببات ، جسمها حنطى اللون يملو غط قاطب اسود يتقطع عند مؤخر الظهر ثم يعود فيملو البطن الى الشرج . بسطها نحو ٦٥ م . روشنها



مِذْرَاة



مذاب الحبيبات



مذاب اللوز



مذاب مقون



مِذْرَب

وسهوكته وليس بالريء. ومنه ما يصغر فيسيل ماء ثم يجمد مثلاً إلى السواد ويحكي الميعة السائلة ويسمى المر الحظي وهو دهن الثاني || وهو دهن عظيم في المراهم والاكحال على اختلاف أنواعها. وهو ينفع سائر التلذات والصداع...

يكتسل به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل الرمد بلين النساء. والقرحة بماء الورد الحلي. ويدمل سائر القروح اذا ثر فيها وقد غسلت قبله بماء لسان الحمل. ويشد اللثة ويزيل قروحها ووجعها الانسان بالخمر والزيت مضغمة. والسعال ووجع الظهر. وخشونة القصبة استحباً في الثم. ووجع الكبد والكل، والمثانة والبنات شرباً خصوصاً مع الترس والافستين. وامراض الارحام خصوصاً الصلبة والكتن حتى يحاله ولو بماء الاس. ويلجم الفتق اذا تمودي عليه ويعل عرق النساء والمفاصل والقرص مطلقاً. ويزيل ثنّ الجمل بالشمب وضعت الشعر. وانتاره بالخمر والاددن ودهن الاس، والقولنج بالسل، والتآليل والاكار كلها. دخانه ينبت شعر الاجفان وينوم بنفسه شاماً ويحفظ المرق طلاء مع دهن اللوز المر ينفع في امراض الاذن، ومع التنعم امراض الانف، وهو يفسر المثانة ويسقط الاجنة ويصلحه السمل وشرته الى ثلاثة ويده فلفل او قسط او جذبادستر.

٢٦١١٨ - مَر \* Commiphora myrrha (S). Commiphore, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I). نوع من البسان من فصيلة البخوريات. شجيرة صغيرة القذ شائكة، يقطر الصمغ من ساقها على شكل دموع حراء اللون شاحبة مغبية. اوراقها معتقة مركبة ثلاثية الورقيات. اغشائها بخارها عطرية الرائحة القاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - مَر افريقي Commiphora schimperi (S). Commiphore d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I). نوع آخر من المر، اعطانه البلاد الافريقية يكثر في الجزائر ومراكش. شجيرة صغيرة القذ شائكة. يستخرج من صمغ صمغ راتنجي المادة جيد الصنف عنابي اللون، شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - مَر حَبَشِيّ، مَر حِجَاوِي Commiphora abyssinica (S). Commiphore d'Abyssinie (F). Coarse myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I). نوع من المر، اعطانه الحبشة وسائر افريقية الشرقية وجزيرة العرب. شجيرة صغيرة القذ شائكة. ثمارها مجع المجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية. صمغ راتنجي المادة جيد الصنف يأتي بعد المر الافريقي جودة.

٢٦١٢١ - مَرَسِيَّات Métayer (F). Métayer (E). هو من استعمل الارض بالمزارعة، الطب مزراع.

٢٦١٢٢ - مَرَّة مُسَلْسَلَة Andromède (F). Andromeda (E). المرأة المسلسلة كوكبة نجوم موقعها قرب القطب النجالي. عدد نجومها ٥٩ اشتهر بها تير الرأس والسر والقدم ووجد بالقرب من هذه الكوكبة قديم لولبي اكتشف عام ١٩١٢ يبعد عن الارض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - مَرَّة Enflourage (F). طريقة صناعية لاستخراج العطر ترتكز على مرث الازهار في الدهن او الشمع.

٢٦١٢٤ - مَرَّاح Etable (F). Scable (E). هو مأوى البقر والغنم ولغز وسائر الدواب، اي موضع راحتها في الليل.

٢٦١٢٥ - مَرَّار Centauree étoilée (F). هو القنطريون النجمي، اطبه.

٢٦١٢٦ - مَرَّارَة Vésicule biliaire (F). Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - مَرَّارَة Amertume (F). Acerbity (E). وصف ميكروبي يمتري ا لحم فيفسدها بعد ان يعيب طعنها اذ يجعله مر المذاق.

٢٦١٢٨ - مَرَّارَة الحَشَش \*، قُنْطَرِيْن صَغِير، قِصَّة الحَيَّة، طَوْرَة

Erythra centaurium (S). Erythrée centauree, Petite centauree, Herbe à la fièvre (F). Earch-gall, Centaury, Fever wort (E). Eches Tausendgülden-kraut (D). Centaurea minore, Blondella, Caccia-febbre (I).

نوع من الاريثريا وهو نبات عشبي بري حولي طلي صغير القذ. ساقه فراء مستدقة. اوراقه متقابلة صغيرة. تفصلها ضيق الصفعة، خلي البشرة، اطحل اللون، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القوم الزهرية والاوراق. وفي مقوية المعدة دافعة للحصيات. ويحضر منه منقوع هاضم يستعمل في حالات زيادة الحموضة والقرحه المعديّة او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاملاح القلوية بنسب كبيرة لها منافعها الطبية.

٢٦١٢٩ - مَرَّارَة الصَّحَاوِي Chicotin (F). هي الخنظل، اطبه.

٢٦١٣٠ - مَرَّاس \* Ophonus sabulicola (S) حشرة من فصيلة الهربصيات. طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. رأسها وكوسلها الى السمرة السوداء. عمداها الى الزرقعة يعلوها مواج اخضر || تكثر في الارربة الكلسية. تركب ازهار نباتات الفصيلة الصبوانية وتلتهم البذور منذ تكوينها || يرقاتها خاضعة قليلة الاذى.

٢٦١٣١ - مَرَّاس \* Chiroteuthis (S). Chiroteuthis (F). Chiroteuthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاجرل وفصيلة المراسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل. زعانفها مستديرة طرفية الارتكاز. رؤسها اسطوانية. عيونها كبيرة صامعة. ثمانية من جرائزها طليقة معجبة متقاربة الطول واثنان شديداً الطول عادتا المهاجم تنهبان برحى سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - مَرَّاسِيَّات Chiroteuthidae (S). Chiroteuthidae (F). Chiroteuthis (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاجرل، ثنائيات الخياشيم، عشاريات الجرامز. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مَر



مَرَّة الحَشَش



مَرَّاس



مَرَّاس

تينة اللون صناعية. اوراقها طيبة وعلقية || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل معرفتها وهي مرققة خافضة للحرارة. أما الاوراق فتفيد التوسمة والنقرس. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٦١٤١ - **مرّان أبيض** Fraxinus alba (S).  
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).  
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدا امريكة الشالية. اوراقها تطول نحو ٣٠ سم. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩، نصلها سناني الصلصة يطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو احمل اللون مدبب المقصه سنن الحافة. ازهارها عشكولي، طرفي وبحوري الارتكاز، يطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون.

٢٦١٤٢ - **مرّان احمر** Fraxinus pubescens (S).  
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).  
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩، نصلها اخضر اللون يحمر في الخريف وهو سناني الشكل مدبب المقصه، سنن الحافة يطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها عشكولي، طرفي وبحوري الارتكاز، يطول نحو ١٥ سم. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٣ - **مرّان أسود** Fraxinus nigra (S).  
Frêne noir, F. à feuilles de bureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassino nero (I).  
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. غراعيها خضر نمشة بالاسود. وريقاتها تعد من ٩ الى ١١، نصلها بيضي الشكل، لاملي الانتشابه، حابق الخصار. ازهارها عشكولي التجميع، كبير القد. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٤ - **مرّان ذرب الورق** Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).  
شجرة متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براعها الى الشقة السفعاء المواج. وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ نصلها سناني الشكل ذرب الزام الاخير، صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها عشكولي التجميع طرفي الارتكاز. ازهارها بيض.

٢٦١٤٥ - **مرّان شامخ** Fraxinus excelsior (S).  
Frêne élevé (F).  
اكبر انواع المران واشمخا واسرعها نمو واعرها. ثمرته سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غراعيها استوائية، براعها سود. وريقاتها تعد من ٩ الى ١٥، نصلها سناني الشكل، سنن الحافة. ازهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز وبحوري. ازهارها بيض يطولها مواج اخضر. يستخرج من سيقانها بالخر من لا بأس به سكري الطعم يحوى نحو ٧٠٪ من المنيث.

٢٦١٤٦ - **مرّان شائع** \* **مرّان زهرّي**، **مرّان متقي** Fraxinus ornus (S).  
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).  
شجرة سبروتية مبدولة تملو نحو ١٥ م. فروعها حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشعية الشكل او جرابية. زعانفها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطيلة. عيونها كبيرة ماحمة. جرابها لامتناهية الطول والشكل || اعرف اجناسها واشهرها المران والمراس والمريس.

٢٦١٣٣ - **مرّاش** \* Spinax (S).  
Spinax (F). Spinax (E).  
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المراسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة، شبه وشعية الشكل. اعطائها ذلقة شارفة. اسنانها منشارية، حادة تقطع كل شيء. جلودها مبيحة. زعانفها كبيرة. الذيلية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعه واعرفها المرّاش الاسود (S. niger) الذي يجوب البحر الابيض المتوسط.

٢٦١٣٤ - **مرّاشة** Mulch  
مواد عضوية مختلفة اخصها الورق والقص تقش على التربة لحفظ رطوبتها ولتغنى تكتار اعشائها الطوية ولوقايتها من قسوة البرد.

٢٦١٣٥ - **مرّاشيات** Spinaciaceae (S).  
Spinaciaceae (F). Spinaciaceae (E).  
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها يحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها وشعية الشكل، متباينة القد والحجم، منها الصغير والوسط والكبير || اخلاقتها شرسة ماحكة، لا تمر بسكة الا قمصتها الى شطرين.

٢٦١٣٦ - **مرّافعة** Plaidoirie, Plaidoyer (F).  
Pleading, Speech for the defence (E).  
المرافعة هي عرض وقائع الدوى ومطالب المتقاضين شفهيا امام القضاة. وهي حق يحضه القانون لكل متقاض.

٢٦١٣٧ - **مرّاق** المراق نجم نير من كوكبة الدب الاكبر.  
٢٦١٣٨ - **مرّاكزة** Dosimétrie, Titrage (F).  
Dosimetry, Titration (E).  
فن قياس التركيز والاخلاط.

٢٦١٣٩ - **مرّامري** \* Kobus (S). Cobe, Kob (F).  
جنس حيوانات لبونة من الغنم الكبيرة القد. انواعه خمسة اعطائها البلاد الافريقية. اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تطول من ١٧٠ سم. وتعلو من ٢١٠ سم. وريقاتها تعد من ١٥ الى ١٥٠ م. ألوانها الى الخنثي الاحمر المواج ومنها البلقا. للذكر منها قرنان كبيران لولبيان. أما الانثى فليما وفي رباعية الاخلاف، اصغر قدأ من الذكر || يألث السبب والفايات ويجاري الماء. -جله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفراً.

٢٦١٤٠ - **مرّان**، **لسان المصفور** Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassino (I).  
جنس اشجار حرجية ورّيقية من المراسيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه عديدة منها الجنيات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوراقها مركبة وزرية متعاقبة عابلة. ازهارها عشكولي. ازهارها يبيضه اللون او فستقية. ثمارها جناحية. براعها سود. لحاء سيقانها واغصانها الى الريدة السمراء. اغصانها



مرّاش



مرامري



مران احمر



مران شامخ



٢٦١٥٥ - مرَبَّيَّي (Epigé (F), Epigenous (E).  
نمت تمريني يطلق على البزور التي ترتفع زياراتها عند  
الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ - مرَبَّيَّة (Lais (F), Staddle (E).  
المرباة . ج مرابي . هي الشجرة الباقية عند قطع الغابة .



مران شائع

٢٦١٥٧ - مرَبَّيَّي (Fraxinus chinensis (S).  
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحظ) .

٢٦١٥٨ - مرَبَّيَّة (Frêne de Chine, Orne de Chine (F).  
شجرة سبروتية تر يينية مهددا الصين تملو من ١٢ الى  
١٥ م . براعها سودي في الشتاء حمري الريع . وريقاتها  
تعد من ٥ الى ٧ ، نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٣  
سم . ويعرض نحو ٦ سم . عروق بارزة ، تسنية منشاري .  
ازهارها عتوكولي طري يطول نحو ١٨ سم . ازهارها بيضاء  
اللون . ثمارها جلوية .

٢٦١٥٩ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Enclos pour caprins et ovins (F), Paddock (E).  
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Carré (F), Square (E).  
شكل هنسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ - مرَبَّيَّي الزوايا (Fraxinus floribunda (S).  
Quadrangulaire (F), Quadrangulaire (E).  
شكل هنسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦٢ - مرَبَّيَّي الزوايا والفلوع (Fraxinus floribunda (S).  
Tétragone (F), Tétragone (E).  
شكل هنسي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦٣ - مرَبَّيَّي منحنيف (Fraxinus floribunda (S).  
Trapèze (F), Trapezium (E).  
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى .

٢٦١٦٤ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Confitures (F), Preserve (E).  
المربيات هي الثمار المبطونة بالسكر .

٢٦١٦٥ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
« بقلة تنطري على الارض لها ورق مثل ورق الهندباء  
او اعرض ولها نورة صفراء وارومة بيضاء وتقطع عن اروعها  
فنسل ثم تؤكل بالخل والحلزون وفيها عليقة سيرة » (عن ابي  
حنيفة) ، ج مر وأمرار .

٢٦١٦٦ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Heron gollath (F).  
هو البشون الجبار ، اطلبه .

٢٦١٦٧ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Lithophage (F).  
هو الحجار ، اطلبه .

٢٦١٦٨ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Vivarium (F), Vivarium (E).  
المرتق قفص لاقامي الطول والعرض والارتفاع ، غالباً  
مزيج او مغلف بشريط شقيق النواطب ، يستعمل لتربية  
الدويبات والحشرات .

٢٦١٦٩ - مرَبَّيَّي (Fraxinus floribunda (S).  
Fastigie (F), Fastigiate (E).  
نمت تمريني يطلق على الفروع الباقية المرتفعة الاطراف  
نحو العلاء .

٢٦١٧٠ - مرَبَّيَّي جوي (Fraxinus floribunda (S).  
Anticyclone (F), Anticyclone (E).  
نمت تمريني يطلق على اثمار النباتات المرتفعة المبيض  
من ففة المتحدات القعالات .

٢٦١٧١ - مرَبَّيَّي المبيض (Fraxinus floribunda (S).  
Superovariée (F), Superior ovary (E).  
نمت تمريني يطلق على اثمار النباتات المرتفعة المبيض  
من ففة المتحدات القعالات .



مران كبير الزهر

الحماء ، صفر التمشيح . وريقاتها تعد من ٥ الى ٩ ،  
نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ٩ سم . ويعرض نحو ٥  
تسنية مستدير الاطراف . ازهارها عتوكولي ، طري ،  
لبد التجيج ، يطول نحو ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون .  
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %  
من الميت .

٢٦١٤٧ - مرَّان صيني (Fraxinus chinensis (S).  
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).  
شجرة سبروتية تر يينية مهددا الصين تملو من ١٢ الى  
١٥ م . براعها سودي في الشتاء حمري الريع . وريقاتها  
تعد من ٥ الى ٧ ، نصلها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٣  
سم . ويعرض نحو ٦ سم . عروق بارزة ، تسنية منشاري .  
ازهارها عتوكولي طري يطول نحو ١٨ سم . ازهارها بيضاء  
اللون . ثمارها جلوية .

٢٦١٤٨ - مرَّان كثير الزهر (Fraxinus floribunda (S).  
Frêne floribond, Orne florifère (F), Bitter-ash (E).  
شجرة سبروتية مهددا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م .  
وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصفحة يطول  
نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٥ وهو مائل البشرة ، دقيق  
التسنية الحاد . ازهارها عتوكولي طري يطول نحو ٢٥ سم .  
ازهارها بيضاء اللون غبراء الملاج .

٢٦١٤٩ - مرَّان مَعِينِي الْوَرَق (Fraxinus parvifolia (S).  
Frêne rhomboidale, Orne de Bunge (F).  
جنبة تر يينية سبروتية مهددا الصين تملو نحو ٢٠٠ سم .  
وريقاتها تعد من ٣ الى ٧ وهي مربعة الشكل تطول نحو  
٤ سم . وتعرض نحو ٢ ، نصلها سنن الحافة ، عتقا  
مؤثر الحماء . ثمارها الزهرية طرية الانكاز تطول من  
٥ الى ٧ سم . ازهارها بيضاء اللون .

٢٦١٥٠ - مرَّان منشوروي (Fraxinus mandshurica (S).  
Frêne de Mandchourie, F. du Japon, Tamo (F), Japanese ash, Tamo (E),  
Japanese Esche, Tamo (D), Fraxino giapponese, Tamo (I).  
شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهددا منشوريا .  
فروعها رباعية التصلب . وريقاتها تعد من ٧ الى ١١ ،  
نصلها شقيق الصفحة ، مدبب العنصة ، مستطيل النقت،  
يأخذ الحصار البحري . ازهارها عتوكولي التجميع مستطيل  
الشكل . ازهارها بيض ، خضر الملاج .

٢٦١٥١ - مرَّانَة (Fraxinus floribunda (S).  
Ash-grove or plantation (E).  
منرس المران او حجرة المران .

٢٦١٥٢ - مرَّانِيَّات (Fraxinées (F).  
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ - مرَّانين (Fraxétine, Fraxine (F).  
غلوكوزيد يكثر ريجوده في غام المران . ويوجد ايضاً في  
غام القندل الهندي . يستخرج من الحاء بعد نطقها بالماء  
وغليانها . بلوره ايزي الشكل ابيض اللون . طعمه مرّ  
حرّيف . يلوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ - مرَّابَة (Fraxinus floribunda (S).  
المرب : الارض الكثيرة النبات .

٢٦١٨٢ - **مَرْتِينِيَّة** \* Martynia (S), Martynie (F).  
جنس نباتات عشبية من المرتينيات. أنواعها قليلة، جميعها أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينية. أوراقها معتقة لا قياسية الشكل والأزهار كالأزهار جيلة القالب، زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والأزهار كالأزهار جيلة القالب. أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٦١٨٣ - **مَرْتِينِيَّة حَوَلِيَّة** Martynia annua,  
M. diandra (S), Martynie annuelle (F).  
عشبة حولية زباه غدية لزجة تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها معتقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلي البشرة لخامس التنس. أزهارها بيض القنار أرجوانية الأطراف. ثمارها بيض مالة تثبت ثالثة متقادية الشكل قصيرة. أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٦١٨٤ - **مَرْتِينِيَّة خَرْطُونِيَّة** Martynia proboscidea (S), Martynie à trompe, Bicornie trompe d'éléphant, Cornaret, Ongles du diable (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها معتقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزناد خلي الصفحة المتصعة المستعرضة التنس. أزهارها كبيرة القد، معوجة القنار، فائضة الأطراف الخامسة التفريخ. قنارها إلى البياض الأصفر المواج يملو تنمش أخضر وأحمر، أطرافها موحجة بالبنفسجي يملو مواج أرجواني. ثمارها خروطية الشكل تطلو نحو ١٥ سم. || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٦١٨٥ - **مَرْتِينِيَّة صَفَرَاءَ الزَّهَر** Martynia lutea (S), Martynie à fleurs jaunes, Bicornie jaune (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها معتقة، متقابلة قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلي البشرة مسن أخافة. أزهارها عبقودية التجميع مذهبة اللون يملوها عند انتشاهها مواج أحمر || أزهارها يستمر طوال شهر آب.

٢٦١٨٦ - **مَرْتِينِيَّة عَطْرَة** Martynia fragrans (S), Martynie odorante, Bicornie odorante (F).  
عشبة حولية زباه لزجة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها معتقة متقابلة ثلاثية القوس. نصلها خلي الصفحة المتقاربة التنس. أزهارها عطرية، بنفسجية اللون، أرجوانية الشحنة، سنبلية التجميع. ثمارها تطلو نحو ١٢ سم. أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

٢٦١٨٧ - **مَرْتِينِيَّة كَفِيَّة** Martynia craniolaria (S), Martynie craniolaire, Craniolaire (F).  
عشبة زراعية حولية زباه غدية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها معتقة متقابلة كفية الشكل مسننة أخافة. أزهارها بيضاء اللون كبيرة القد تطلو نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة كروية المصافير، مخروطية الزائدة. جدورها حنزابية الشكل، مأكولة ورتب.

٢٦١٨٨ - **مَرْت، مَرَس** Macération (F),  
Maceration (E).  
نقع جسم صلب في الماء أو في سائل آخر ليبلن أو لإذابة بعض أجزائه الكيماوية.

٢٦١٧٢ - **مَرْتَقَق، حَادِم** Dominé, Servant (F).  
المترقق والمترقق به. هو الذي عليه حق ارتفاق لعقار آخر.

٢٦١٧٣ - **مَرْتَقَق** Dominant (F).  
المقار المترقق أو المخدوم هو الذي ينتفع من الارتفاق.

٢٦١٧٤ - **مَرْتَك، مَرْتَك، مَرْدَاسَج** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F), Li-charge (E).  
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون.

٢٦١٧٥ - **مَرْتَكِبُ الْجُنَّة، مَجْرَم** Délinquant (F), Delinquent, Offender (E).  
هو الذي يرتكب فعلة يعتبرها القانون الجنائي جنحة يعاقب عليها.

٢٦١٧٦ - **مَرْتَنَسِيَّة \*** Mertensia (S), Mertensie (F), Blue-bells (E), Lun-genwurz (D), Mertensia (I).  
جنس نبات من فصيلة الحمحميات معقود التعريف باسم العليبيب مرتس (١٧٦٤-١٨٣١). أنواعها المعروفة ١٥، جميعها عشبية معمرة. أعطائها البلاد المعتدلة الحرارة. أوراقها كاملة متقابلة. نصلها موشة بنده شفافة. أزهارها عبقودية التجميع. تويجات أزهارها انبوبية الشكل. أشهر أنواعها الزينية ما يلي.

٢٦١٧٧ - **مَرْتَنَسِيَّة لُجْبَانِيَّة** Mertensia echinoides (S), Mertensie vipérine (F).  
عشبة من المرتنسية تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وفروعها مزينة للحاء. أوراقها سنائية الشكل، نصلها خلي البشرة على سفحيتها. أزهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لونها إلى الأزرق العابقة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٧٨ - **مَرْتَنَسِيَّة سِيْبِيرِيَّة** Mertensia sibirica (S), Mertensie de Sibérie (F).  
عشبة عشوشية من المرتنسية تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها وفروعها سرسة. أوراقها قلبية الشكل معتقة، نصلها ناعم النسيج المتجمع. أزهارها بنفسجية اللون منتصبة. أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٦١٧٩ - **مَرْتَنَسِيَّة عُنْكَوَلِيَّة** Mertensia paniculata (S), Mertensie paniculée (F).  
عشبة من المرتنسية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. ساقها وفروعها مهدبة للحاء. أوراقها سنائية النصل المستطيل الضيق. تنويرها عكوكلي التجميع بخلاف سائر أنواع جنسها. أزهارها إلى الأزرق الليلية. تويجات خلي الصفحة، مسن أخافة. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٨٠ - **مَرْتَنَسِيَّة فِيرْجِينِيَّة** Mertensia virginica (S), Mertensie de Virginie (F).  
عشبة من المرتنسية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها وفروعها مريطة. أوراقها اهليلجية منقطعة تطلو من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. أزهارها كبيرة القد متدلية، لونها إلى الأزرق الجميلة. أزهارها يستمر من آذار إلى حزيران.


٢٦١٨١ - **مَرْتَنَسِيَّات** Martyniaceae (S),  
Martyniacées (F), Martyniaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. أجناسها وأنواعها قليلة العدد، أشهرها المرتينيتية.



مرتنية



مرتنية



مرجات

Pageau, Pagel (F).

٢٦٢٠٠ - مَرْجَان

هو الفربيدي، جنس سمك من فصيلة الاسبوريات .

Zoanthaires (F).

٢٦٢٠١ - مَرْجَان زَهْرِي

Zoantharia (E).

رَبِيَّة حيوانات بحرية عديدة الفصائل والاجناس . جميعها  
جسدية الافراز كالمرجان، مداخلها فسيحة الاجزاء تتكون  
منها الشعاب والمستمرات والجزر .

Coralliaires (F).

٢٦٢٠٢ - مَرْجَانِيَّات

شعبة حيوانات بحرية من صف المحرقات .

Berberidopsis corallina (S).

٢٦٢٠٣ - مَرْجَانِيَّة

Berberidopsis coral (F).

جنية ترابيية معمرة من فصيلة النضيبات . ساقها سريعة  
الفروع متسلقة تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها  
ايدة، متعاقبة، متعق، قلبيية الشكل . نصلها جامد  
الصفحة الالامية ، مدبب التسنين الشالك . انزهارها عنقودي  
التجميع ، طرفي الارتكاز . انزهارها تساعية البتلات والفصل ،  
سباعية الاسدية ، مرجانية اللون ، كروية الشكل ،  
متدلية || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

Coralline (F).

٢٦٢٠٤ - مَرْجَانِيَّة

عشبة تدعى ثور الماء ، اطبله .

Chaudière, Cuisleur,

٢٦٢٠٥ - مَرْجَل

Ebullanteur (F). Copper, Boiler (E).

قدر كبير من النحاس او الحديد يغل في الماء .

Fronde (F). Sling (E).

٢٦٢٠٦ - مَرْجَمَة \*

هي الصفحة السفلى من نصل ورقة السرخس حيث توجد  
الحفاق . وقد تستعمل بصيغة الجمع فتدل على مجموعة  
الصفحات السفلى من اوراق السرخس الواحدة .

Praticulture (F).

٢٦٢٠٧ - مَرْجَوِيَّة

المرجوية علم يبيث في زراعة المروج والمراعي .

Praticole (F).

٢٦٢٠٨ - مَرْجِي

نعت تعريفية يطلق على كل حشرة او طائر او حيوان  
مأواه المروج .

Emerginula (S).

٢٦٢٠٩ - مَرْجِيُولَة \*

Emerginule (F). Emerginula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الارجل  
امانيات الخياشيم الحلقية وقصيلة الصدبيات . انواعها  
المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٠ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة  
الحرارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداؤها  
شبه مخروطية الشكل ، مضلفة السطوح الهززة اقنفاً ،  
شبه بيضية الشكل ، قطرها من ١ الى ٣ سم . || اجسامها  
رسمية الاربدة القضاضة ، صغيرة  
الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة القائمة على قواعد اللواس  
الخارجية . لواسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة ،  
مستعرضة ، ملوكة بزوائد انبوبية الشكل .

Epler (F). To ear (E).

٢٦٢١٠ - مَرْج

مرج الزرع : خرج سنبله .

Etagère (F). Whatnot (E).

٢٦١٨٩ - مَرْثَلَة

رف مستقل لا يستند الى حائط ، ج مرثله .

Couvolo (F).

٢٦١٩٠ - مَرْثَلَة ، مَحْضَن

Incubator (E).

عش في سلة او في صندوق وما اشبه ترخم فيه الدجاجة  
الرفقاء حضنتها . وهو ايضا بناء تجمع فيه الحواضن والحضنات .

Nex (F). Nose (E).

٢٦١٩١ - مَرْثَم

المَرْثَم والمِرْثَم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان .  
ج مَرثَم .

Faire paltre (F).

٢٦١٩٢ - مَرْج

To graze, to feed, to tend (E).

مرج الدابة : ارسلها رعى في المرح .

Prairie (F).

٢٦١٩٣ - مَرْج

Meadow, Grass-land (E).

ارض نسبية معشوبة ينبت فيها العشب طويلا او يزار  
وتمرج فيه الماشية او يحش ويغلف . نباتاته مختلفة  
وعديدة اشيعها من القنطاريات والنجيليات . والمرج قد  
يكون :

Prairie artificielle (F).

مرجاً صناعياً

Artificial meadow (E).

ترتكز اعشابه على القنطاريات كالبرسيم والفصة والباقية . . .

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E).

مرجاً طبيعياً

وهو المرج المعروف بالرعى او المنتجع .

Prairie temporaire (F).

مرجاً وقتياً

Temporary meadow (E).

هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه  
من النجيليات والقنطاريات .

Pré-verger (F).

٢٦١٩٤ - مَرْج قَامِر

Orchard-meadow (E).

مرج طبيعي غرس فيه شجر مشمر كالاجاص والتفاح  
للاستفادة من العشب والثمار معاً .

Piézographe (F).

٢٦١٩٥ - مَرْجَجَاك

Piezograph (E).

المرجاج جهاز يستعمل في قياس القوى الاهتزازية وضغطها .

Faneuse (F). Hay-making (E).

٢٦١٩٦ - مَرْجَاد

اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوة اجتناباً لسطها  
وتجفيفها في جفافها .

Sonde (F).

٢٦١٩٧ - مَرْجَاس

هو السبار ، اطبله .

٢٦١٩٨ - مَرْجَاف \* ، مَرْجَمَة

Séismographe, Sismographe, Trommètre (F).

Seismograph, Tromometer (E).

آلة تسجل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلزال وصفه .

Corail (F). Coral (E).

٢٦١٩٩ - مَرْجَان \*

حيوان بحري من المنخ المحرقات وهو من الحيوانات الركنية  
التي تعيش راسخة على صخور واعشاب القاع . افرازها جمعي  
عديدة الانواع يكثر فيه الاحمر الوردى ( المرجاني )  
من عايق وباهت . والاسود والابيض . اما الابيض  
فنادر الوجود .

مرجبتولة

٢٦٢٢٣ - مرذ قوش، مرذ كوش، برذ قوش،  
مرزنجوش، ريحان داود، سمنس  
Majorana (S), Marjolaine (F).

نبات عشبي عطري بري وزراعي من فصيلة الشفويات .  
انواعه عديدة جميعها مخشوشة زياه اللحاء . اوراقها لا  
نظامية . ازهارها سفلية التجميع . يستخرج من اوراقها  
وازهارها عطر صناعي شائع الاستعمال || اعرف انواعه  
واشهرها ما يلي .

٢٦٢٢٤ - مرذ قوش بستاني \*

Majorana hortensis, Origanum majorana (S). Mar-  
jolaine des jardins, M. à coquille (F). Knotted mar-  
joram, Sweet marjoram (E), Echter Majoran (D),  
Maggiorana (I).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها فراء جوية .  
فروعها منفردة . اوراقها معتقة كاملة اهليلجية ، نصلها  
خلى البشرة على سفنتيه . ازهارها بيضاء اللون و وردية .  
وهو نبات طبي ينفع من الصداع ويحسب الزكام كيثما  
استعمل . طيبخه يجل اوجاع الصدر والربو والسعال وضيق  
النفس . ويقال انه يفتت الحصى ويدار البول . دهنه  
يذهب العرشة والفالج .

٢٦٢٢٥ - مرذ قوش وزري

Majorana onites, Origanum onites (S). Marjolaine  
onites (F).

بجلة مبولة طيبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فراء .  
فروعها منبسطة . اوراقها لائحة اهليلجية . نصلها مسنن  
الحافة ، خلى البشرة على سفنتيه . ازهارها سفلية التجميع  
وردية اللون . منافعها الطبية لا تختلف عن منافع المردقوش  
البستاني .

٢٦٢٢٦ - مرذ كوش احمر ، قوبسة مهيجمة

Horminum (S). Hormin, Horminelle (F). Common  
sage, Annual clary (E). Buntschopsalvei (D). Ormi-  
no, Salvia ormino (I).

بجلة برية طيبة مبولة معمرة من فصيلة الشفويات . تملو  
من ١٥ الى ٣٠ سم . ساقها عادمة الفروع . اوراقها  
غمضية ، سفلية ، تطلو من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من ٢  
الى ٥ . ازهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، زرقاء  
اللون || اوراقه واذاها تنفع الانعام وتبيح الحفم .

٢٦٢٢٧ - مرذل ٥  
Radula, Radule (F).  
Radula (E).

المردل نصل قرني المادة تملو اسنان صغيرة متساوية  
الترتيب المترس . وهو من اعضاء الجهاز القيمي عند  
الرخويات باستثناء صفيحات الخياشيم . اما وظيفته فسحق  
الطعام .

٢٦٢٢٨ - مرذلة مُعَصِّبَة \*

Mordella fasciata (S). Mordelle bandé, Mordelle  
à fascies (F). Mordella fasciata (E).

حشرة واشعة خاضعة دامتة من فصيلة المردليات ورتبة  
مفعدات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها  
الصيوليات . خنافسها تعيش على بتلات الازهار واوراق  
النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة والصائرة  
نحو الاخلال || جسمها صغير القد يطلو من ٥ الى ٧ سم .  
لونها الى السواد الدايق يملو في عمدة زوجان من البقع  
البيض . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخلف . عيناها

Guitare (F).

٢٦٢١١ - مرّح

سمكة بحرية تدعى غباط ، اطلها .

Sérale (F). Seral (E).

٢٦٢١٢ - مرّحكي

نمت تعريف يطلو ، في علم التنوخ اي في علم اثر  
البينة ، على طور من اطوار المتتابع النوعي في النبات .

٢٦٢١٣ - مرّح

شجر سريع الوري يقتلح به ؛ الواحدة مرشة (اللسان).

Détendeur (F).

٢٦٢١٤ - مرّحاء ٥

Pressure reducer (E).

جهاز يستعمل لتخفيف ضغط الغاز . ج مرّح .

Microchirus (S).

٢٦٢١٥ - مرّخيرة \*

Microchire (F).

جنس اسماك بحرية من رتبة المسارات وفصيلة جانبيات  
العموم . انواعها المعروفة قليلة جميعها من اسماك البحر  
الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || اجسامها  
مبطلة مفلطحة شبيهة بسلك موسى . زعانفها الظهرية  
قائمة تمتد من الخلف الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية  
والخوضية شديدة الصغر . زعانفها الشرجية تقابل الظهرية .  
اما الذيلية فستديرة الشكل || اشهر انواعها واعرفها :

٢٦٢١٦ - مرّخيرة صفراء

Microchirus luteus (S). Microchire jaune (F).

مولتها بمثل من البحر الابيض المتوسط . جسمها يطول  
نحو ١٢ سم . لونها الى الشبه الصفراء يملو مواج ذهبي ||  
لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٢١٧ - مرّخيرة مرزوقة

Microchirus variegatus (S). Microchire panaché (F).

مولتها تمتد من البحر المتوسط الى المحيط الاطلسي .  
جسمها يطول نحو ١٥ سم . لونها الى الشبه الصفراء  
تملوا زونقة سوداء تمتد الى الزعانف || لحمها فاخر  
الصنف ، مرغوب فيه .

Effeuiller (F).

٢٦٢١٨ - مرذل

To strip of leaves (E).

جرذ التقصيب او الشجرة من الورق .

Intérêt (F).

٢٦٢١٩ - مرذل ، مرذلة

راجع فائدة .

٢٦٢٢٠ - مرذاء

Arbre dépourvu de feuilles, Terre dépourvue de  
plantes (F).

المرداء : الشجرة لا ورق عليها . والارض الخالية من  
النبات .

٢٦٢٢١ - مرذاس ، مرذس

Cylindre compresseur (F). Compressor cylinder (E).

Litharge (F).

٢٦٢٢٢ - مرذاسنج

هو المرزك اي بر وكسيد الرصاص .



مرخيرة



مردقوش بستاني



مردقوش احمر



مردلة مُعَصِّبَة



مردولة البريق

٢٦٢٣٢ - مِرْدُون Mouche des narcisses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد التبرجس .

٢٦٢٣٣ - مِرْدَر Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

٢٦٢٣٤ - مِرْدَر Oviscapte (F). Oviscapt (E).

جهاز متع السرة أو المكن في بعض الحشرات، ويصنع أبرة، أطليا .

٢٦٢٣٥ - مِرْدَر حاكين Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقق بها التربة لأغراض شتى أخصها التطهير والتسميد للملحني المائع .

٢٦٢٣٦ - مِرْدَرَاغ \* ، مِرْطَاب ، مِرْطَب ،

مِقْيَاس الرُّطوبَةِ Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة إلى درجة الحرارة .

٢٦٢٣٧ - مِرْدَرَاغ شَعْرِي ، مِرْطَاب شَعْرِي

Hygromètre à cheveux (F).

مرداغ يرتكز على تمدد وانكماش الشعر الذي يتأثر بالرطوبة

٢٦٢٣٨ - مِرْدَرَاك \* Balance de précision (F).

هو ما يدعونه ميزان الدقة لانه دقيق التركيب يتأثر بكسور المليمترام .

٢٦٢٣٩ - مِرْدَرَة Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من عمارة المزيات وفصيلة الصقريات، أنواعه عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم، جميعها من الكواسر التي تقتنص القوافض والجذران والعصافير والمظاء والحشرات. أجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اجنحتها وأرجلها وأذناها طويلة. أنوفها إلى البعثة المرقطة. تدن في الأشجار الحرجية الباسقة أو على الحضيض وفي أوقاب الصخور. أناتها تحضن من ٣ إلى ٤ فرائد مدة ٤ أسابيع || أشهر أنواعها الأربعة التالية .

٢٦٢٤٠ - مِرْدَرَة البَطَّاحِ Circus strigiceps (S).

Busard blafard, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المردة صغير الجثة، أحمر اللون المرقط بالأسمر، أسود المنسر، أحمر العينين والرجلين. وهو من القواطع يألف السبب والبطاح، قوته الزحافات من مظاء ومحيات ودويبات وبعض الحشرات .

٢٦٢٤١ - مِرْدَرَة الدَجَاجِ \* ، صَكْرُ الْفِرَّانِ

Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المردة، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب. ثوبه إلى البعثة المرقطة بالأسمر، وهو أسود المنسر، أصفر العينين والرجلين. يصيد القوافض والعصافير والفسفاد والمظاء والحشرات وفراخ الدجاج. يدن وكته على الحضيض بين القصب والفرار .

٢٦٢٤٢ - مِرْدَرَة الْمَنَافِعِ \* ، دَرَّاعِ

Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المردة، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم. ثوبه إلى الصبغة المرقطة. وهو من القواطع يألف

كيرتتان. زباناها غطيان. ظهراتها لا يلحف كامل البطن. يعلتها مستطيل السمكة الشرجية المدنية الطرف || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في أواخر نيسان وتعيش حتى أواخر آب. تشرج في النهار. تسلف في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموري طولها نحو ١٢ سم. جسمها مبطل الشكل، مستطيل المقدم، سداسي الرواجب، ضخم الرأس، ضلع التأثير الفكية، أطحل اللون، يسود في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينتهي تحت اللحاء طليقا من كل غلاف .

٢٦٢٤٩ - مِرْدَلِيَّات \* Mordellidae (S).

Mordellidés (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غدييات الاجنحة || اجناتها وأنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الحارة. غشائها تألفت نباتات الفصيلة الخيمية . يرقها دائمة تعيش على المواد النباتية السائرة نحو الانحلال || جميع حشرات صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ١٠ م. أجسامها لاقياسية الشكل . اغمادها لا تلحف بطونها الزانطرة المستطيلة المدية الاطراف الشرجية . زباناتها عيطة، مستطيلة، مركبة من ١١ فصلة . ارساغ جرابها الخلفية رباعية المقل اما ارساغ الجراب الوسطي والامامية فغاسية || أشهر اجناتها المردة والزحلوقة والبريشة .

٢٦٢٣٠ - مِرْدَن ، مِرْدَرَن Quenouille (F).

Distaff (E).


شكل من اشكال الهيكله المتبعة في تشذيب بعض الاجنار الشمرة والثرينة || والشكل المردني يكون اضيق قاعدة وجسما من الوشي واكثر ارتفاعا .

٢٦٢٣١ - مِرْدَرَة الْبَرَقُوقِ \* Odonestis pruni, Gastropache pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة اللجفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اربوة . فراشتها صيغة تعيش على غزونها الامدائي . سرقها تعيش على اوراق البرقوق والزعرور والاجاص ... || جسمها مستطيل مكرم يطول نحو ٢١ م. بعلتها من ٤٤ م. رأسها حنطي اللون . عيناها كيرتتان . زباناها مشطيان . مرقها جعدة . جوشها وعلتها الى الحنطي الاكلف || روضها الاماميان الى الحنطي الاكلف ملوحة حارة وغض متربص اسمر ونقطة وسطى بياض . روضها الخلفيان الى الحنطي الافتح . ادهابا الى الشقة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائد في تموز . تشرج من الغروب الى الفجر في اليالي المقمرة . تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة ايام وتضع المكن لعلها على لحاء الجذوع والافانص || السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م. جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الحنطي الاسمر المواج يعلون في الرأس الى الشرج خط عريض من الملب القصير تتخلله عنه كل مفصل حديي غمة من الملب المستطيل . مدبا وشرجها ورواجها كاسية . شرجها ينتهي بزايدة صغيرة مثلولية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي تحت القشور وبين اللحاء ضمن صلجة يعلها غشاء كالنخاعة اغبر اللون .



مردان



مردة البطاح



مردة الدجاج

٢٦٢٥٤ - مرسوم. Décret (F). Decree, Order (E).  
هو كل قرار يوقمه رئيس الجمهورية. وتختلف اسماء  
المراسم باختلاف موضوعاتها فتكون جمهورية وسكوية  
وعامة وتنظيمية وخاصة.

٢٦٢٥٥ - مرسوم قانون. Décret-loi (F).  
Order in council (E).  
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في اثناء غياب  
المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس،  
عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - مرسونية. Marssonina, Marsonia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات. يتميز بكتائله  
الشفاة الثنائية الخلية البيضية الشكل او المستطيلة المنعقفة.  
يركب الاوراق فيلطحها. قصاته ادمية الارتكاز تصدع  
البشرة || انواعه عديدة لكنها قليلة الاذى. اعرفها مايلي.

٢٦٢٥٧ - مرسونية البرسيم \*. Marssonina medicaginis (S).  
فطر مجهرى من المرسونية يصيب البرسيم والقصة والتفل  
في سوقها واوراقها. مظهره الخارجي بثور صغيرة لا قياسية  
الشكل، حنطية اللون، سمراء الاطار، تركيب السوق  
والاوراق فتؤذيها || يكافح بالخش عند ظهور الوصم  
ومنهم من سرح الماشية في المقاضب لترعاها.

٢٦٢٥٨ - مرسونية التامول. Marssonina betulae (S).  
فطر مجهرى من المرسونية يصيب التامول في اوراقه.  
مظهره الخارجي بثور صغيرة مستديرة شقراء اللون حنطية  
الاطار لا قياسية الترتيب تركيب نصل الاوراق عسل  
صفحاتها العليا || اغصانه زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٦٢٥٩ - مرسونية الحور. Marssonina populi (S).  
فطر مجهرى من المرسونية يصيب اوراق الحور ويعملها.  
مظهره الخارجي بثور متتابعة طحلاء اللون جزئية الاطار  
تركيب نصل الاوراق وقد تشاهد برمة قشيب الذبول  
والاحبال.

٢٦٢٦٠ - مرسونية الخس. Marssonina panattoniana, M. perforans (S).  
فطر مجهرى من المرسونية يصيب الخس فيؤذي. مظهره  
الخارجي يقع مستديرة لونها الى السمره قطرها من ٢ الى  
٣ سم. ثيلو مبعثرة على صفحات نصل الاوراق الخارجية  
ثم تمتد وتتلاقى وتركيب الاوراق الواحدة تلو الاخرى  
حتى الساق || يكافح بقتلح النباتات الموصومة وينفخ  
النباتات الباقية بحلول كرويات النحاس او سائل بورود  
الحديد المركز ٠.٨ ٪ || ومن الواجب تطهير البذار قبل  
استعماله بواسطة الاغصير المكنكي (Vert malachite)  
المركز ١ ٪.

٢٦٢٦١ - مرسونية الصفصاف. Marssonina salicicola (S).  
فطر مجهرى من المرسونية يصيب اوراق بعض انواع  
الصفصاف. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم،  
مسنة الاطار، حنطية اللون، تركيب نصل الاوراق  
فتبدو كالبيثور الراضعة || اغصانه زهيدة لا تستوجب  
المكافحة.

المنافع والبحيرات ويجاري الماء. قوته القواضم والطيور  
المائية والصفاف.

٢٦٢٤٣ - مرزة زمداء، عقيب. Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne (F).  
Montagn's harrier (E).  
طائر من المرزة، متوسط القد، اريد الثوب المتباعد الرقطة،  
اسود المنسر، اصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع،  
يألف الجبال والمنافع والبحيرات وشطوط الانهار. قوته  
العطاء والصفاف والحشرات.

٢٦٢٤٤ - مرزة. Rizière (F). Rice-plantation (E).  
هي محقطة الارز او الارض المغروسة رزاً.

٢٦٢٤٥ - مرزح، مسالك، مشحط. Charasson, Echalas, Etaçon de vigne, Pisseau (F).  
Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).  
مسند يستعمل لدعم الكرمة او لرفعها عن التربة.

٢٦٢٤٦ - مرزوم، مرزوم. Flamant (F).  
Flamingo (E).  
هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والمتق، اعوج  
المنقار، في اطراف جناحيه سواد، اطلب نحام.

٢٦٢٤٧ - مرزوم. الميرزسان نجان مع الشعيرين.

٢٦٢٤٨ - مرزوم الذراع. مرزوم الذراع نجم تير يعرف ايضاً بالذراع المبسوطة، اطلبه.

٢٦٢٤٩ - مرزويات. Busards, Circlens, Circlins (S).  
عارة طير من فصيلة الصقريات. انواعها عديدة تتميز  
بقدها الرشيق الاهيف. مناسرها قصيرة عجينة. سواطيلها  
مستطيلة. اذناها صفيقة. ارساغها مستندة معتدلة الطول.  
غالبها عامرة || اعطائها الماء. تألف الاماكن الرطبة.  
قوتها القواضم والزحافات والحشرات.

٢٦٢٥٠ - مرستب. Précipité (F).  
Precipitate (E).  
المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٥١ - مرستوميات. Mérostomes (F).  
Merostoma (E).

صف من المفصليات المتحجرات ورتبة ممدبات الاجنحة.  
بين القشريات والعنكبوتيات || من هذا الصف يوجد  
رتبة واحدة معاصرة تدعى مروديات الاذناب.

٢٦٢٥٢ - مرستج \*. Amphicomma (S).  
Amphicome (F).  
جنس خنافس من فصيلة العمليات ورتبة ممدبات الاجنحة.  
انواعه عديدة، اعطائها الشرق الاسط. اجسامها متوسطة  
القد زياء. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشعارية صفيحية  
التركيب. ارساغها خاسية الفص. اناثها اكبر قدماً من  
ذكورها || تعيش على بتلات الانهار والاوراق الغنية.  
رقاقها مقوية الشكل، سداسية الارجل تعيش في التربة  
على المواد العضوية والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٦٢٥٣ - مرستن. Nez des solipèdes (F).  
Nose of soliped (E).  
المرستن هو انف ذوات الحافر.



مرزة المنافع



مرج



مرسونية البرسيم

Robot (F). Robot (E). ٢٦٢٧٤ - مَرُؤِنَةُ ٥

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في اجاز بعض الاعمال .

Parasité ٢٦٢٧٥ - مَرُؤِنُونَ ٥

٢٦٢٧٦ - مَرُؤِنَةُ الْجَوَائِثِ

Observatoire météorologique (F). Meteorological observatory (E).

مكان مجهز بالعدة اللازمة لرصد العوامل الجوية .

Adhérent (F). ٢٦٢٧٧ - مَرُصِقُ ٥

يقال جوز مَرُصِقٌ ومَرُصِقٌ اذا تمدد خروج له .

Maladie (F). ٢٦٢٧٨ - مَرَضٌ ، وَصَمُ ٥

Illness, Diseases (E).

انحراف صحي سببه تقاوس الضوء عن القيام بوظيفته على الوجه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات عديدة منها داخلية وخارجية وطفيلية وميكروبية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرَضُ الْبُثورِ السَّارِي ، دَرْمِيتُ

Dermite (F). Poli-evil (E).

وصم سار يصيب الخيل والبقرة .

Lépidorthose (F). ٢٦٢٨٠ - مَرَضُ الْحَرَاثِفِ ٥

Lepidorthosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بجراحها .

٢٦٢٨١ - مَرَضُ الْخُرْبِزَاتِ

Coccidiose, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارنب خاصة والطيور الداجنة صفة .

Bleime (F). ٢٦٢٨٢ - مَرَضُ الصَّحْنِ ٥

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن حافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرَضُ الظِّلْفِ ، تَعَقُّنُ الظِّلْفِ

Necrosis bacillaris (S). Piétin (F). Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اظلاف الفأان .

٢٦٢٨٤ - مَرَضُ الْفُطْرِ الشَّعَاعِي

Actinomycose (F). Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب المواشي وينتقل الى الانسان . سببه الفطر الشعاعي . مظهره قباب في الفك واللسان . عوارضه هزال وضعف وصح وانخفاض في الوزن . وقد يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة بجلده .

٢٦٢٨٥ - مَرَضُ الْقُمَّلِ ٥

Phtiriase (F).

Pthiriasis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقراد...

٢٦٢٨٦ - مَرَضُ الْمُتَمَتِّعَاتِ ٥

Spirilliose (F).

Spirillosis (E).

وصم ينشأ عن وجود المتتمعات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرَضُ بَكْتِيرِي ٥

Maladie bactérienne (F). Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرَضُ جِلْدِي ، دَرْمَتُوزُ

Dermatose (F). Skin disease (E).

تعبير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مما كان سببها .

٢٦٢٩٢ - مَرُؤِنِيَّةُ الْقَيْبِ ٥

Marssonina acerina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق القيقب وقد يمتد الى الافنان والافناد . مظهره الخارجي بقع صغيرة مقرنة الزوايا تبدو سماء اللون ثم تتحرف نحو الصبهة البيضاء . تركب نصل الوراق ولحاء الافنان والافناد . اغراضه زهيدة لا تستوجب المكافحة .

٢٦٢٩٣ - مَرُؤِنِيَّاتُ ٥

Merciérées (F).

سبط من فصيلة الجربسيات يشمل الكثير من الاجناس والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زبني .

٢٦٢٩٤ - مَرُؤِسِيَسُ ٥

Peuplier de l'Euphrate (F).

هو الحور الفراتي الجميل الشكل ، اطلبه .

٢٦٢٩٥ - مَرُؤِيلَةُ ٥

Marsilea (S).

Marsilée, Marsille (F). Marsilea, Nardoo (E).

Marsille, Kleoforn (D). Marsilea (I).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة المرسيليات ، انواعها قليلة العدد . سوقها جذمورية مدادة تنسج في الماء . جذورها نخيلة تنمو في السبل تقابلها اوراق مستطيلة الزناد رباعية الوريقات المتقابلة الطافية على سطح الماء . اشهر انواعها :

مرسيلة السنغال ٥

Marsiles senegali (S).

Marsilée pygmée (F).

Marsilea aegyptiaca (S).

Marsilée d'Egypte (F).

٢٦٢٩٦ - مَرُؤِيلِيَّاتُ ٥

Marsileaceae (S).

Marsiliacées, Marsiliacées (F). Marsileaceae (E).

فصيلة نباتية من المتغيرات . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها اشباح جذمورية مدادة تعيش في اسماح المياه للقليلة النور .

٢٦٢٩٧ - مَرُؤِسِيَنُ ، مَرُؤِسِيَنُ ٥

Myrte commun (F).

هو الآس الجوي ، اطلبه .

٢٦٢٩٨ - مَرُؤِسُ ٥

Terre Imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسكبة التي اذا امطرت سالت سريعا ، ج مروض وامراض .

٢٦٢٩٩ - مَرُؤَسَاءُ ٥

Stérile (femelle) (F).

Sterile (female) (E).

المقور من كل حيوان .

٢٦٣٠٠ - مَرُؤَسَادُ ٥

Robotologue (F).

Robotologist (E).

من تعامل المرشة .

٢٦٣٠١ - مَرُؤَسَةٌ \* ٥

Arrosoir (F). Watering-pot (E).

وعاء لاسقاء بالرش .

٢٦٣٠٢ - مَرُؤَسْدَةٌ ٥

Robotologie (F).

Robotology (E).

المرشة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من اجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٣٠٣ - مَرُؤَسْتُ ، مَرُؤَسْتُ ٥

Suoir, Trompe d'insecte (F). Sucker (E).

جهاز ابروي ثاقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرشة

## ٢٦٣٠٣ - مِرْعَاوِيلَا شَرِيقِيَّة

Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها هليبية اللحاء، حلها خيطي مستطيل أكثره أبيض اللون وبضه احمر. اوراقها جامدة النصل الخامسي التفريش، الشائك الحافة. ازهارها وردية وبض، ورؤسائها متوسطة القد.

## ٢٦٣٠٤ - مِرْعَاوِيلَا لَرَجِيَّة

Echinops viscosus (S). Boulette visqueux, Echinope visqueux (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع الغدية اللزجة. اوراقها كثيرة القد، قلبية التفريش، زغبية النصل الغدي اللزج، شائكة الحافة. ازهارها غبراء اللون، ورؤسائها صغيرة الحجم.

## ٢٦٣٠٥ - مِرْعَاوِيلَا وَضِيحِيَّة

Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).

عشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها قطنية البشرة على صفحتها. ازهارها زائفة الزرقة، قطر الرؤسية نحو ٤ سم.

## ٢٦٣٠٦ - مِرْعَاة

Porzana (S).

Porzane (F). Porzana (E).

المرعة. ج. مرع. جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفلقيات، أنواعه المعروفة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم. اجسامها متوسطة القد وصغيرة. اثوابها الى الصهبة الخطئية يعلوها رتقن ابيض وتبيح اسود || اعطائها تمتد من الهند الى اوروبا ومن الصين الى مراكش. معظمها من القواطع يحوي منافع البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. أحرف أنواعها وأشهرها المرعة الشائعة.

## ٢٦٣٠٧ - مِرْعَاة شَالِيَعَة \* ، مِرْعَاة مِرْوُطَة

Porzana maruette (S). Porzane marouette, Marouette (F).

طائر من المرع، قدره قدر السباقي، ثوبه الى الصهبة الخطئية السمراء الموج، رأسه منمش بالابيض. زوره ويطنه الى البياض الناصع. صدره الى الطحلة الخطئية الموج. ظهره اسود التيقيق ابيض الحثار. جناحه مجذع بالاعبر. منقاره جالس الازتكاز، اسمر القاعدة، احمر الطرف. ساقه الى الخضار الاسفر || يألف المنافع وضفاف البحيرات والانهار. قوته الحشرات والبراغ وبزور النباتات المائية. مرتع من الغروب الى الظلمة ومن الضحى الى الفجر. يدن شته وسط جم السعادي. اثناء تحضن نحو ١٢ بيضة.

Chèvre d'Angora (F). مِرْعَز \*  
هو ماعز انقره، اطلبه.

Prairie (F). Meadow (E). مِرْعَاوِي ٥

Embouche, Gagnage, Herbage (F). مِرْعَاض \*  
Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E).  
مرج طبيعي تسوم الماشية اعشابه.

Clio (F). مِرْعَاضِ الحُوت

جنس حيوانات بحرية من الرخويات تدعى عروسة، اطلبها.

Hygrophyte (F). مِرْعَاض ٥  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢٦٢٨٩ - مِرْص دُودُ الْأَمْعَاء Helminthiasis (F).

Helminthiasis (E).

هو الملمستياز، وصفه تسببه الديدان في الأمعاء.

٢٦٢٩٠ - مِرْص سَاي، مِرْص وَيْسِل، وَتَاء

Maladie Infectieuse (F). Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من حيوان الى آخر.

٢٦٢٩١ - مِرْص فُطْرِي

Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور، مجهية كانت او غير مجهية.

٢٦٢٩٢ - مِرْص مُعْدِي

Maladie contagieuse (F).

Contagious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من فرد الى فرد.

٢٦٢٩٣ - مِرْصَاوِي ٥

Sialagogue (F). Sialogogic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب.

٢٦٢٩٤ - مِرْصَاخ، مِرْصَاخَة

Concassee (F).

هو الجاروش، اطلبه.

٢٦٢٩٥ - مِرْطَاب، مِرْطَب

Hygromètre (F).

هو المرزاق، اطلبه.

٢٦٢٩٦ - مِرْطَاب شَعْرِي

Hygromètre à cheveux

هو المرزاق الشعري، اطلبه.

٢٦٢٩٧ - مِرْطِيش، مِرْطُوشَة

Améthyste (F).

هو الكركمان، اطلبه.

٢٦٢٩٨ - مِرْع

مرع ومرع المكان: اخصب بكثرة الكلا.

٢٦٢٩٩ - مِرْعَان

Clématite toujours verte (F).

هو الملحى العمي، اطلبه.

٢٦٣٠٠ - مِرْعَاوِيلَا \* ، شَوْك الْجِمَال

Echinops (S). Echinope, Boulette (F).

جنس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر. انواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمرة. سوقها فراء. اوراقها كثيرة القد شائكة النصل. ازهارها رؤسية كروية الشكل || اعرف انواعها وأشهرها ما يلي:

٢٦٣٠١ - مِرْعَاوِيلَا زَرْقَاء

Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. اوراقها كثيرة القد فلقية التفريش. نصلها اخضر الصفحة العليا المائلة، ابيض السفل الحليية، شائك الحافة. ازهارها زرق. قطر الرؤسية براوح من ٣ إلى ٤ سم.

٢٦٣٠٢ - مِرْعَاوِيلَا شَالِيَعَة ، شَوْك الْجِمَال

الشائع، رعي الابل، سَكَاوِي

Echinope commun (F).

نوع من المرعاويلا، مشهور باسم رعي الابل، اطلبه.



مرعاويلا



مرعة شائعة



## ٢٦٣١٣ - مرغفة

المرغفة والمرغ : الروضة الكثيرة النبات .

## ٢٦٣١٤ - مرغوفد الياسمين

Margarode du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فراشة من المرغوفيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرتبطها مؤذية .

## ٢٦٣١٥ - مرغوفيت

Reine Marguerite (F).

Queen Margaret (E).

نبات تزيني حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

## ٢٦٣١٦ - مرغوفين

Margarine زبدة صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

## ٢٦٣١٧ - مرغوف

Marcgravia (F).

جنس نباتات برية وتزينية عارضة من فصيلة المرغوفيات . منبتها اللطوي بعض مناطق امريكا الاستوائية || انواعه المعروفة قليلة العدد منها السريعة ومنها المتسلقة الازهرها اوراقها مزديسة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهرها عتودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حراء اللون .

## ٢٦٣١٨ - مرغوفيات

Marcgraviaceae (S).

Marcgraviacées (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اعطائها بعض اصناف امريكا الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاجبار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة النصال المسنة الاطراف . ازهرها لاقياي التجميع منه الصيواني والعتودي والسنبلي ، جميعها مستطيلة المالحق . ازهرها لاقياية الحجم . كؤوسها لانظامية التركيب منها الثنائية الفصل والثلاثية والحادية . عدد بتلات توجيهاها بمائل عدد الفصل . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، دواء ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرغف .

## ٢٦٣١٩ - مرغونة

Mérogonie (F). Merogony (E).

المرغنة اخصاب بويضة متشعبة بمحوي منوي .

## ٢٦٣٢٠ - مرغوني

Mérogonique (F).

Merogonic (E).

نعت تعريفية يطلق على كل ما له صلة بالمرغنة كقوك اخصاب مرغني .

## ٢٦٣٢١ - مرغوسة

Prolifique (F). Prolific (E).

نعت تعريفية توصف به الانثى الكثيرة التناج .

## ٢٦٣٢٢ - مرغوف

Mergulus (S).

Mergule (F). Mergulus (E).

جنس طيور بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها مناطق الدائرة القطبية . لا تترك اللحم الى اليابسة الا في زمن الترخيم والعيالة . الرحالة القطبية تلحقها بطير الجليد || ملجئها الحيواني جماعي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الهوام والخشرات والدعابين والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعه واغربها واعما انتشاراً الميرغوف القترم او الميرغولة .

## ٢٦٣٢٣ - مرغوف قترم ، مرغولة

Mergulus alle (S). Little auk, Dovekie (E).

جسها صغير القد ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدلاً لجرم ، قصير المتقاد الاسود . حذقة منها كسنتية اللون . ذنبها مخروطي الشكل . قصير . رسغها الى السرة الصفراء المواج . ثوبها الصفي اسود الرأس والرداء والذنب والصفحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفحة السفلى من الجناح . اباهرها يبيض الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليحل محله الاكعب || الانثى امير قدام الذكر وتحتل بنفس الثوب . موكلها نقرة بين حضور المحاجد . الانثى تخضع بمناوبة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يموغ على سطح الميم بعد التفق ياسبور .

## ٢٦٣٢٣ - مرغوي

Casarca (F).

هو الشهران ، طائر من الدجل مشهور باسم ابو فررة .

## ٢٦٣٢٤ - مرغوي ، سينو بيري

Felis tigrina (S). Margay, Chat tigré (F). Margay (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصناف امريكا الوسطى والبرازيل . يألف الاحراج ولا يبتعد عن الماء حيث يكثر قتصه . ملجئه الحيواني غربي اي ان الذكر يكوم عدة اناث || جسمة اهيف القوام وشعرها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه معتدل الجرم . اذنان صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكملتان . ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوها بتيجع وتندبر اسود . صدره الى الصهبة الغراء المشيرة بالاسود . بطنه الى الصهبة الخطية المرقشة بالاسر . ذنبه متتابع الاطراف اسود || سرعه دجوي . يتسلق الاشجار بخلعة ويدوم على الارض بسرعة . قوته الطير والجردان والفار والزحافات والفضاد .

## ٢٦٣٢٥ - مرغويط

Erodium à feuilles de bryone

هو الجراب الفاشري الورق ، اطلبه .

## ٢٦٣٢٦ - مرغاق

Grue (F). Crane (E).

آلة رافعة ، تنهض الانتقال وتنقلها .

## ٢٦٣٢٧ - مرغاق

Élévateur (F). Elevator, Lift (E).

جهاز ثابت او نقال يستعمل في رفع وتنشيط البراميل والصناديق والبالات الخ .

## ٢٦٣٢٨ - مرغقي ، مرغقي

Coude (F). Elbow (E).

موصل الذراع من العنقد . ج مرغقي .

## ٢٦٣٢٩ - مرغقي

المرقق نجم ثير من كوكبة سيابس .

## ٢٦٣٣٠ - مرغقي الثريا

مرغقي الثريا نجم من كوكبة الجبار .

## ٢٦٣٣١ - مرغقي

Coudé (F). Elbowed (E).

شكل من الزباني ، قائم الزاوية ، يشبه المرقق .

## ٢٦٣٣٢ - مرغفين ، مورفين

Morphine (F).

Morphia (E).

مادة شبه قلووية مخدرة ومسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرغوي

Composante (F). **مُرَكَّبَة** - ٢٦٣٤٩  
Component (E). وهي قد تكون افقية أو رأسية .

Centre, Point central (F). **مُرَكَّز** - ٢٦٣٥٠  
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). **مُرَكَّز النِّقْل** - ٢٦٣٥١  
Centre of gravity (E).

**مُرَكَّز الدَّائِرَة ، نُقْطَة الدَّائِرَة** - ٢٦٣٥٢  
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre astatique (F). **مُرَكَّز مُطْلَق** - ٢٦٣٥٣  
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). **مُرَكِّم** - ٢٦٣٥٤  
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). **مُرَكَّن ، قَارُورَة** - ٢٦٣٥٥  
وعاء من فخار تزرع فيه النباتات أو تستنبت ريشاً تنقل إلى مستقرها . ج مراكن وقوارير .

Investi (F). Invest (E). **مُرَكُون** - ٢٦٣٥٦  
نعت تعريفى يطلق على الاموال ، اخصها غير التقدية ، المملوطة لعمل ما أو لمشروع معين .

Merlus, Merluccius (S). **مُرَلُوش** - ٢٦٣٥٧  
Merluce (F). Hake (E).  
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفادسيات . اعطانها بحار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها اهليجية . رؤوسها كبيرة . اشدافها مسلحة باسنان قوية هربية الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ، خالية من المناسخ الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش المبلول الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط والمرلوش الامريكى المعروف أيضاً بمرلوش الشيلي .

**مُرَلُوش مَبْدُول** - ٢٦٣٥٨  
Merluccius merluccius (S).

Merluce commune, Merlu (F). Common Hake (E).  
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مقرسة نهمة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || سرها وافر العدد . مسرحتها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقرب من المحاذى إلا في زمن الترسه || جسمها شبه اهليجي الشكل ، يطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير الجرم . ثوبها الى الطحلة الغبراء السفءاء الموج . غطها الجانبى اسود . بطنها الى الغيرة البهفاء || زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف . كبدها وافر المادّة الزيتية الجيدة .

**مُرَمَّاحُور** - ٢٦٣٥٩  
Amaraque (F). هو المرو ، اعطيه .

Germandrée ambrée (F). **مُرَمَّاحُور** - ٢٦٣٦٠  
هو الطوريون الكوري ، نبات عطري مدي مقو للأعصاب ومفيد لها . وهو منه وقابض ومضاد للتشنج .

Babine, Babouine (F). **مُرَمَّة** - ٢٦٣٦١  
Lip (pendulous) (E).  
المرة والمرة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

Barbe du blé (F). Beard (E). **مُرَق** - ٢٦٣٣٣  
هي حسكة السنبله وتسمى سفا وشعاع . ج أمراق .

Puccinia **مُرَق** - ٢٦٣٣٤  
وصم فطري يمتري النبات ويؤذيه ، اعطى سحام .

Progression (F). **مُرَقَّة** - ٢٦٣٣٥  
هي المتواليه وقد وضعها لانها تؤدي معنى التوالي والمزيد وهو المطلوب .

Uranomètre (F). **مُرَقَاع** - ٢٦٣٣٦  
Uranometer (E).  
جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين الكواكب او بينها وبين الارض .

Aplatisseur (F). **مُرَقَّعة** \* ، **مُرَقَّعة** - ٢٦٣٣٧  
Grain-crushing mill (E).  
آلة لتريق الحبوب العلفية ، مركبة من اسطوانتين تدوران في اتجاهين معاكسين تسحق الحبوب التي تمر بينهما دون ان تكسرها .

Apode (F). Apod (E). **مُرَقَال** - ٢٦٣٣٨  
هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرأقيل .

Télescope (F). **مُرَقَب** \* ، **رَاصِدَة** - ٢٦٣٣٩  
Telescope (E).  
آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

Stalle (F). Stall (E). **مُرَقَد** - ٢٦٣٤٠  
شفة الفرس الواحد في الاصطبل .

Pyrite (F). Pyrites (E). **مُرَقَشِيَّتا** - ٢٦٣٤١  
هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض . راجع بيريت .

**مُرَقَّى عَشْرِي ، مَقْبَاس عَشْرِي** - ٢٦٣٤٢  
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

Doseur (F). **مُرَكَّاز** \* ، **مُنْشَاع** - ٢٦٣٤٣  
Doslmeter (E). جهاز المراكزة أو قياس التركيز .

Sarcloir (F). Spud (E). **مُرَكَّاش** - ٢٦٣٤٤  
اداة لركش التربة ، يستعمل باليد .


**مُرَكَّب الفَرَس** - ٢٦٣٤٥  
مركب الفرس نيم ثير من كوكبة السفينة .

Composé (F). Composed (E). **مُرَكَّب** - ٢٦٣٤٦

Multiple (F). **مُرَكَّب** - ٢٦٣٤٧

Compositae (S) **مُرَكَّبَات** - ٢٦٣٤٨  
Composées (F). Compositae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة الغلالة سفلية الاسدية . تتميز من اكبر الفصائل النباتية ، انواعها عدة آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشعاعية وانوبية الزهر . ولسينية الزهر . منها الازهار والشجيرات والجنات والاعشاب . عصاريتها مألعة أو لينة . اوراقها متعاقبة أو متعاقبة .



مرقاق



مرقب



مرلوش مبدول

## ٢٦٣٧٣ - مَرْمَرُوطُ الْقُطْب ، مَرْمَرُوطُ كَنْدَا

Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotte monax, M. de Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).

نوع من المرموط، موطنه يمتد من كندا إلى كليفورنيا. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ١٧ سم. وبره كثيف التجميع، متوسط الطول. ثوبه الى اللوحة السوداء، بطنه اصفر المراح.



مرموط

## ٢٦٣٧٤ - مَرْمَرُوطُ بُولُونِيَّة

Arctomys bobac (S). Marmotte bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).

نوع من المرموط موطنه يشمل بلاد بولونية وغاليسيه وروسيا الجنوبية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ٩ سم. ثوبه الى الصبغة. حنار عينيه الى السرة. طرف ذنبه الى السواد. وبره ليد التجميع متوسط الطول.

## ٢٦٣٧٥ - مَرْمَرُوطُ حِمَالِيَا

Arctomys himalyanus (S). Marmotte de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).

نوع من المرموط، صغير القد، كثيف الوبر الناعم المتوسط الطول. موطنه جبالا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م. عن سطح البحر.

## ٢٦٣٧٦ - مَرْمَرُوطُ شَالَع \*

Arctomys marmotta (S). Marmotte commune (F). Common marmot (E).

نوع من المرموط يعيش من ٩ الى ١٠ سنوات. موطنه جبال اوروبية. جسمه يطول من ٢٨ الى ٤٥ سم. وذنبه من ١٦ الى ١٨ سم. وزنه في الخريف قبل بيانه الشتوي يراوح من ٧ الى ٨ كيلو. ثوبه الى الصبغة الخفيفة يملؤها مراح صناعي يتنحرف الى الاجر العتيق مع استطالة العمر. رأسه وأطراف قوائم ذنبه الى السرة. اناء نضع جروين في اواسط شهر حزيران.

## ٢٦٣٧٧ - مَرْمَرُوطُ مَذْهَب

Arctomys aureus (S). Marmotte dorée (F). Golden marmot (E).

نوع من المرموط صغير القد كثيف الوبر الناعم. ثوبه الى الصبغة الصفائبة الملهبة. موطنه بعض جبال الهند والباير.

## ٢٦٣٧٨ - مَرْمِرِيَّة \*

Meromyza (S). Meromyze (F). Meromyza (E).

جنس حشرات من فصيلة الخرباقيات ودية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة، هيا، تقوّل من ٣ الى ٦ سم. رؤوسها مكورة، عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشارية قصيرة، تنتهي بنسيلة دقيقة. ملاسها صفيرة. اعطائها معتدلة الجرم. كواسلها مستطيلة، مرقوشة. بطونها انسائية الشكل. رواشها كبيرة، قسطانية التخفيف. انعقادها الخلفية ضخمة تمكّنها من القفز || الحشرة الجملانة واحة مرتعا البراري والمروج. البرقة تعيش على سيق النجيليات وقد تركب القمح والأرز فتسبب اعلاص زهر السابل.

## ٢٦٣٧٩ - مَرْمِرِيْس

Rhinoceros (F). هو الكركدن، اطلبه.

## ٢٦٣٨٠ - مَرْمَر

Surmulot (F). هو جرد الماشاب، اطلبه.

Marbre (F).

## ٢٦٣٨٢ - مَرْمَر

هو الرغام، اطلبه.

## ٢٦٣٨٣ - مَرْمَرِيّ

Marbré (F). Marbled (E). نعت ترميى يطلق على ما كان يشبه المرم.

## ٢٦٣٨٤ - مَرْمِرِيْسِيَّات

Myrmicidae (S). Myrmicidae (F). Myrmicidae (E).

فصيلة حشرات من شثايات الاجنحة المحصورة وثفة الحمويات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والقطبية || اجسامها شبيهة بالجسم النمل. انوثاها الى الجؤوة المتفاوتة المجات. جميعها مجتحة. حاما دقيقة. ذربة، معتدلة الطول || اشهر اجناسها المرمس (Myrmique).

## ٢٦٣٨٥ - مَرْمِرِيَّة

Arénacé (F). Sandy (E). نعت ترميى يطلق على كل ثربة خرواة كثر فيها نسبة العنصر الرمي.

## ٢٦٣٨٦ - مَرْمَلَّة ، مَحْفَار

Sablère, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E). منجم يستخرج منه الرمل.

## ٢٦٣٨٧ - مَرْمَلَّة

Jardin de grenadiers (F). هي بستان الرمان.

## ٢٦٣٨٨ - مَرْمَرُورَة

Pagel marbré (F). المرمورة سمكة بحرية تدعى فرديسي مسج، اطلها.

## ٢٦٣٨٩ - مَرْمَرُورَة

Marmoset (F). هو اقبال من القردة اللبية.

## ٢٦٣٩٠ - مَرْمَرُورَة \* ، زَمْرُورَة ، دِمَشْقِيَّة ، حَافِرِيَّة

Calceolaria (S). Calceolaria (F). Slipperwort (E). Pantoffelblume, Schuhblume (D). Calceolaria (I).

جنس نباتات عشبية ليفية ومخوشبة من فصيلة الخنازريات. انواعها عديدة، منها الحولية والمهولة والمعمرة، معظمها يري وبعضها تربوي كثير الضروب والاصرام. سوقها زبه. اوراقها متقابلية كاملة. ازهارها غريبة الشكل تشبه الخف. الوانها متباينة عديدة تراوح من الالبيص الى الاحمر الغام.

## ٢٦٣٩١ - مَرْمَرُوط

Arctomys (S). Marmotte (F). Marmot (E). Murmeltier (D).

جنس حيوانات لبونة قاضة من فصيلة السنجايات. انواعها المعروفة ١٥، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة. رؤوسها مستديرة. اذانها صغيرة مستديرة. اذانها قصيرة جللة. صوفها متوسط النعومة || اعطائها الجبال العالية. بيئاتها الشتوي يدوم نحو اربعة اشهر. تعيش جماعات في اجمار تحفرها في الهوم على اعماق تراوح من ٩٠ الى ١٢٠ سم. جحرها نفق قطره نحو ١٥٠ سم. وطوله من ٨ الى ١٠ امتار ينتهي برده هزها ٢٠٠ سم. اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

## ٢٦٣٩٢ - مَرْمَرُوطُ الثَبَت

Arctomys robustus (S). Marmotte robuste (F). Tibetan marmot (E).

اكبر انواع المرموط، موطنه جبال التبت. ثوبه الى السرة الخفيفة. وبره كثيف، لين، مستطيل.



مرموط شائع



مرنة



مرنة قصية



مرنة هندية



مرها



مرو



مرواز



مرواز مسجل

٢٦٣٨١ - مَرْبِئَة Clapier (F). Hutch (E).  
اقفاص الارانب وكل مكان خصص لتربية الارانب  
وتكاثرها .

٢٦٣٨٢ - مَرْبِئَة Coregonus maraena (S).  
Corégone, Marène (F).

سمكة نهرية من مفتوحات المائنة وفصيلة السلمونيات .  
اعطانها معظم بحيرات الشرق الاوسط واروبة الوسطى ||  
جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، بطول نحو ٣٠ سم .  
ثوبها الى الرينة الفضية المواج يبقى في الرأس والظهر وينير  
في البطن . زعنفتها الذيلية فارقة ، شبه هلالية الشكل ||  
لحمها ان مدخن او ملح رائع السوق في اربوبة الوسطى .

٢٦٣٨٣ - مَرْبِئَة Mœhringia (S). Méringie (F).

عشبة معمرة من فصيلة القرزنفليات . مهدها فضاب وهّام  
بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . ساقها نحيلة فروعاً .  
اوراقها سنائية تطول من ٢ الى ٣ سم . نصلها مقعرة  
السطوح ، بحرية الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة  
القد . ترغب في المواقع البويرة والارربة الكلسية || تنويرها  
يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٣٨٤ - مَرْبِئَة Laurière (F).

كل موقع تكثر فيه اشجار الرند اي الفار يدعى مرئدة .

٢٦٣٨٥ - مَرْبِئَة Maranta (S).  
Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-  
pflanze (D). Cannacoro, Erba da freccle (I).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية من المرئطيات  
وفصيلة النجيليات . انواعها المعروفة خمسة ، منها المناطق  
الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزنيد الحامضة . نصلها  
سنائي الشكل بارز العروق . ازهارها سنبلية او عنقودية  
التجميع بيضاء اللون || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة  
التالية .

٢٦٣٨٦ - مَرْبِئَة أُسْلِيَّة Maranta juncea (S).  
Marante élancée (F).  
نوع من المرئدة الزراعية ترغب في الارربة الرطبة . اوراقها  
سنائية كبيرة منتقصة . شامختها الزهرية تعلو من ١٠٠  
الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع || جذاميرها  
دقيقة مستطيلة قليلة المادة الشوية .

٢٦٣٨٧ - مَرْبِئَة قَصِيَّة \* ، اُرْوَوَة Maranta arundinacea (S).  
Marante arundinacée (F).  
نوع من المرئدة الصناعية الشائعة الاستعمال ، تُزْرَع من  
اجل جذاميرها الشوية اللباب التي يستخرج منها الارروت  
وهو نوع من النشا الغذائي ، دقيقه يحوي :  
١٢,٥ ٪ من المواد الازوتية  
٠,٢٠ ٪ من المواد الدهنية  
٨٥,٧٥ ٪ من المواد الشوية والسكرية

٢٦٣٨٨ - مَرْبِئَة هِنْدِيَّة \* Maranta indica (S).  
Marante de l'Inde (F).  
نوع من المرئدة الزراعية ترغب في الارربة البدالية الخصبة .  
يستخرج من جذاميرها الارزوت الهندي الجيد الصنف  
والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الارزوت القصي .

٢٦٣٨٩ - مَرْبِئَات Marantacées (F).  
Marantaceae (E).  
سبط من فصيلة النجيليات ، اشهر اجناسه المرئدة .

٢٦٣٩٠ - مِرْهَاء Hypsometre (F).  
Hypsometer (E).  
جهاز آلي يمكن المروء من تحديد ارتفاع المكان او الشيء .

٢٦٣٩١ - مِرْهَاء نعت وصني يطلق على الامكنة القليلة الشجر كقولك حديقة  
مرها . او غابة مرها . او ارض مرها .

٢٦٣٩٢ - مِرْهَبِل Impondéré (F).  
Unweighed (E).  
المربهل ما كان عادم الوزن او القياس .

٢٦٣٩٣ - مِرْهَة Etang artificiel (F).  
Artificial mere, A. pond (E).  
هور صني تخزن فيه مياه الشتاء .

٢٦٣٩٤ - مِرْهَم Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Un-  
guent, Ointment, Pomade (E).  
مركب طبي دهني يختلف العناصر والالوان . استعماله خارجي .

٢٦٣٩٥ - مِرْو Quartz  
ضرب من الصوان يختلف الاشكال البلورية والاحجام  
المثبائية .

٢٦٣٩٦ - مِرْو \* ، حَبِق الشَّيْخُ ، حَرَبَشَاء ، مِرْمَاحُوز ، بَرْد قُوش مُعَقَّد ، زَعْبَر  
Origianum maru, O. amaracus, Majorana maru (S).  
Amaraque, Marjolaine vrale (F). Amaracus (E).  
Amarakuschtblume (D). Amaraco (I).  
بجلة معمرة عطرية وزراعية من فصيلة الفويات .  
تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها جوية اللون .  
فروعها منفرجة مسترسلة . اوراقها لائفة كاملة اهليلجية ،  
نصلها خالي البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع .  
ازهارها قليلة العدد وردية اللون || ينبت من التوابل  
وهو مقو للعدة ، منه ، طارد الرياح . يستخرج منه  
بالتقطير زيت طيار كافوري الرائحة له استعماله الطبي .

٢٦٣٩٧ - مِرْوَاء Maerua (S).  
Maerua (F). Maerua (E).  
جنس نباتات بحلية وجبلية معمرة من فصيلة الكريات .  
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الافريقية  
اخصها المشرقة على البحر الابيض المتوسط || سيقانها فروعاً .  
اوراقها بيضبة النصال الجامدة ، صغيرة الاربالات .  
ازهارها عنقودية التجميع . ازهارها معتدلة الاحجام ملونة  
من الابيض الى الاصفر والاخضر والاريجاني . ثمارها  
عنقية وقرية البذور او شتعية || تنويرها ربيعي .

٢٦٣٩٨ - مِرْوَا زُ \* ، بَارُوِسْتَر Baromètre (F).  
Barometer (E).  
جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون  
عادة من وعاء للزئبق وانبوبة شمعية تنغس في الوعاء وسام  
دقيقة تنفذ منها الهواء وسواق مدرج يدل على ارتفاع  
الضغط او انخفاضه .

٢٦٣٩٩ - مِرْوَا زُ مُسَجِّل \* Baromètre enregistreur (F). Registrar barometer,  
Self-registering barometer (E).  
مرواز جهاز بالعدة اللازمة لتكوين انفعالات الضغط الجوي .

Palimpsestis or, \* مَرُوش الحَوَر \*  
Cymatophore or (S). Cymatophore or, l'Or (F).  
Palimpsestis or (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات ورثة حشرقيات الاجنحة .  
موطنها بين من الشرق الاسط الى اربوة . فراشها واسعة  
قوتها رقيق الازهار . سرتها تميش على اوراق الحور  
والصفصاف . جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م .  
بسطها نحو ٣٤ م . رأسها خطي اللون . عيناها كيرتان .  
زباناها غطيانا . مرشها مستدل الطول . جوشنها وبظها  
الى الخنطلي المذهب المراج || روشناها الاميان الى الخنطلي  
الاثير تملو رقة الى الصخرة وخطوط معتزة الى السمرة .  
روشناها الخلفيان الى الخنطلي الكلف المذهب المراج  
تعلو حدة وسطى هلالية سمره || لها جيلان في الحول .  
تظهر فرائة الجبل الاول في نيسان وتظهر فرائة الجبل  
الثاني في تموز . تسرح من العصر الى فحة الليل . تعاظ  
بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتنتج المكن لطعا على  
الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها  
الكامل تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،  
مالس القشار . ثوبا الى الخضار البحري الجرع بالايف  
والاصفر . رأسها جزوي اللون . مذهبها ورواجها الى  
السمرة || طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما  
ينقضي ضمن صلجة تحبها السرعة تحت القشور او بين  
شقوق الحاء .



مَرُوش التبع



مَرُوش الحور

Laité (F). Soft-roed (E). \* مَرُوش \*  
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشلغي مليء بالروول  
تمت بالروول . كقولك طرسوج مريول .

Irriguée (F). مَرُوي ، مَسْقُوي \*  
Irrigated (E). هو النبات أو الزرع الذي يسقى .

Œsophage (F). مَرِيء \*  
Œsophagus, Gullet (E). جزء من انبوب الهضم مركزه بين البلعوم والمعدة .


Anémomètre (F). مَرِيح \* ، مَكْرَار \*  
Anémomètre (E). جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وشغلها .

Rentable (F). مَرِيح ، مِفْعَال \*  
Profit-earning (E). كل استثمار يعود على صاحبه بإيراد سنوي يغطي الاكلاف  
ويؤتي بعض الدخل الصافي .

Prolifère (F). مَرِيخ ، مُخْلِف \*  
Proliferous (E). صفة الشيء الذي يتكاثر . ونعت تعريفي توصف به الازهار  
والثمار التي تنبت باهر مورة .

Mars (F). مَرِيخ ، بَهْرَام ، بَهْرَمَج \*  
Mars (F). Mars (E).

كوكب سيار من الخلف ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي .  
بعده عن الشمس يأتي بعد الارض . لونه الى الصفار الاحمر .  
جره يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكتلته نحو  
عشر مرات . سرعة دورته الانقلابية في الفضاء نحو  
٨٦٧٩٦ كيلومتر بالساعة . دورته الفلكية حول الشمس  
تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دورته المحورية الذاتية تستمر



مَرِيخ

Ballota (S). مَرُوب \*  
Ballote, Marrube (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات .  
انواعه المعروفة متوسطة المدد . اعطانها تشمل بعض مناطق  
الشرق الاسط والاذى واروبة وافريقية الشالية || سورها  
عقائية فراء تملر من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعاقبة ،  
اهليلجية النصال الخشنة المسنة الختار . ازهارها محوري  
الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون ومنها الالبيص الاصفر  
المراج . ازهارها واوراقها فوحة العرف اللامستحب ||  
تؤبرها صيفي .

Eventail (F). مَرُوشَة \*  
شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروحة .

Palmier éventail (F). مَرُوشَة \*  
هي القبل نوع من النخل التريسي .

Flabellé, Flabelliforme (F). مَرُوشِي \*  
Flabelliform (E). نعمت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروحة .

Stylot (F). مَرُود \*  
كل انبوب من مجموعة الانابيب التي تشكل قلم المدقة  
في الزهرة . وهو محور البكرة والحديدة التي تدور في اللجام  
وكل نصل دقيق مثلوث . ج مرود .

Xiphosures (F). مَرُودِيَّات الأذُناب \*  
رتبة من المفصليات الشيفسيات المرسوبيات . نصالها  
واجناسها وانواعها كثيرة المدد . معظمها الساحق من  
متحجرات الاحقاب الاول || المعاصر منها الآن فصيلة  
واحدة تدعى لميطيات .

Epithrix parvula (S). مَرُوس التبع \*  
Flea beetle (E).

حشرة من مفصليات الاجنحة وفصيلة النضاريات . جسمها  
صغير القذ يطول نحو ٢ م . ثوبا الى السمرة العابقة .  
وفي من الحشرات التي تطير وتقفز حسب تقضي الحاجة .  
اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . اناثها تمتع المكن  
على الاعشاب البرية فينتفخ عن رقات دقيقة تحبل غبراء  
اللون يبلغ طولا عند كمال تطورها نحو ٤ م . || اغزرها  
تمد الى الحشرة والبرقة . الحشرة تقضم نصال التبغ على  
صفحاتها العليا في المشتل وتطحن وتغسل في الحقل  
فتتو الاوراق وتطحن من قبتها . اما البرقة التي تميش  
على المراد الضموية في التربة فانها لا تتأخر عن قرض  
جذور الشتلات الناشئة || مكافحتها نظرا لسرعة حركتها  
واختباؤها في التربة وبين الاعشاب تبدأ بتنظيف المشتل  
او الحقل من جميع الاعشاب البرية واذا كان لا بد من  
دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية . كاخضر باريس  
وزرنيخات الرصاص والروتينون .

Rejet, Rejeton (F). مَرُوش \*  
Shoot, Sprout (E). هو الرشد والفسيلا والنبلة والفرخ وقد يحسن تخصيصه  
برك النبات المخشوب .

سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ مترًا . ثمارها وشعبة الجراب الذي يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ويعرض نحو ٤ سم . بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، لونها الى السرة الصنائية يعلوها تيجيق ذهبي . راحتها سريعة ، مقسة . طعمها يبدو كطعم البندي ثم يتحول فوراً الى مرارة العظم . يستخرج منها نحو ٣٢٪ من الدهن الجمالي الطيبي الاخضر اللون .

### ٢٦٤٢١ - مَرِيخَة الْغَابُون ، مَرِيخَة لَطِيفَة

*Strophantus gratus* (S). *Strophante agréable* (F).  
نوع من المربية . مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكونغو . جنبها داسية او سرعية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . لونها الى السرة الكستنية الزيتية المواج . راحتها سريعة ، مقسة ، لا تقبل الالتئاس . طعمها شديد المرارة منذ الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطيبي الاخضر اللون .

### ٢٦٤٢٢ - مَرِيخَة تَشَاد ، مَرِيخَة كُومْب

*Strophantus Kombe* (S). *Strophante de Kombe* (F).  
نوع من المربية ، مهدا مناطق تشاد وبحيرات افريقية الوسطى . جنبها داسية في المسانف ، عارشة في الغابات . ثمارها اصفر قدماً من ثمار مريرة السودان اما بزورها فاجسم وقد يبلغ طولها نحو ٣٠ سم . لونها الى السرة الخضراء المواج . راحتها قليلة الصرامة النوية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطيبي الاخضر اللون .

### ٢٦٤٢٣ - مَرِيخَس \* *Histioteuthis* (S). *Histioteuthis* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الارجل وقصيلة المراسيات . انواعها المعروفة قليلة أعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستقلة الاعقاب . عيونها كبيرة ماصحة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤوسها اسطوانية كبيرة مندرجة مع الاجسام . جرابها متباعدة الاشكال منها ستة حذبة مصحجة متساوية الطول والثلاثان طليقتان محبستان والثلاثان مستطيلتان تتهبان برسي ستانية الشكل عادمة الحاجم .

### ٢٦٤٢٤ - مَرِيخَس *Myrris* (F).

هو السرفل العطري ، اطلبه .

### ٢٦٤٢٥ - مَرِيخ *Fertile* (F). *Fertile, Fruitful, Rich, Fat* (E).

صفة الخصب في التاج والانتاج والثمار والواتا .

### ٢٦٤٢٦ - مَرِيخَة \* *Laemargus* (S). *Laimargue* (F).

جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمندويات . انواعها المعروفة اربعة ، منها نواص بحريان بحار الشمال ونوع يحوي المحيط الهندي والاربع يحوي البحر الابيض المتوسط وهو اصفرها قدماً لانه لا يطول اكثر من متر بيتا الانواع الاخرى تطول من ٤ الى ٦ امار || وتتميز مريخة

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة || والمريخ كالارض له بحار وجو ويور في فلكه قران « مَرِيخَس » و« مَرِيخَس » ، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة . ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١ دقيقة || والمتجنمون يسمونه النحس الاصفر لانه دون زحل في النحوة . واضافوا اليه البطش والقتل والتهور .

### ٢٦٤٢٦ - مَرِيخ *المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن .*

### ٢٦٤٢٧ - مَرِيخَس \* *Picris* (S). *Picride* (F). *Yellow succory* (E). *Bitterich* (D). *Picride* (I).

جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات اللبينية الزهر . انواعها عديدة جميعها برية . سوقها فروع غزيرة العصارة اللبينة المرّة الطعم . اوراقها متعاقبة ، لاطفة ، سنانية الشكل صغيرة القد . نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة على سطحه ، بحري اللون . ازهارها ورؤية جميلة الصفار || والمرير يزيل الجرب والحكة ويدير البول وينفع من ضعف الكبد والقنصة واذا اخذ مع التبنوة فتحت الحصى واطلق البول وهو يصنع وتصلحه الكثيراء .

### ٢٦٤٢٨ - مَرِيخَة *Chondrilla* (F). *Chondrilla* (E).

هي الخنثويل ، نبات طيبي ، اطلبه .

### ٢٦٤٢٩ - مَرِيخَة \* *Strophantus* (S). *جيففكَة* \* *Strophante* (F).

جنس نباتات برية ، طيبة ، معمرة ، من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة ٥٥ مهدا المناطق الاستوائية والاقاليم المتاخمة من البلاد الافريقية والهندية . تحديد انواعها ومنابتها الطوية هو التالي :

افريقية الشرقية والوسطى	تثبت ١٥ نوعاً
افريقية الشالية	تثبت ١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تثبت ١١ انواع
مدفسكر	تثبت ٣ انواع
اخذت وباليزية	تثبت ١٢ نوعاً

سوقها رويها كلها متباعدة الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والعواش والسرعية الفروع والداسية . يبدو ان شكلاتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التنوعية ، اخصها الضح . اوراقها اهليلجية ، معتقة ، لاقياسية الانتظام ، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقنصة ومنها المائلة النصال والمزجية . ازهارها عذقية التجميع ، طرفية الارتكاز ، مخلفة الالوان . كبرها قمية ، تحامية الانفتاح . بتلاتها قدية مستطيلة . ثمارها سهمة ، مدببة الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، تنتهي بقزعة من الهلب المستطيل الدقيق الناعم || يستخرج من بزورها ، باستثناء القزعة ، مادة جمالية طيبة . شديدة المرارة تدعى ستروفنتين (*Strophantine*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل جاهل افريقية في علاج التيسال السامة . وتستعمل طيباً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النبض والقضاء على ضيق التنفس || أشهر انواعها الطيبة الثلاثة التالية .

### ٢٦٤٢٠ - مَرِيخَة السُودَان ، مَرِيخَة مَرِيخَة *Strophantus hispidus* (S). *Strophante hérissé* (F).

نوع من المربية . مهدا السودان ومغيبه ونيجيريا . جنبها



مَرِيخ



مَرِيخَة



مَرِيخَس



مَرِيخَة

المتوسط باستعانة غطها ويحبها الاطلال الارزق المواج الذي يقع مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن || مسوكها فاخرة الصنف مرغوب فيها . غوبها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الصلصة مادة زيتية شائعة الاستعمال .



مرقة

### ٢٦٤٣٥ - مَرْقَمَة صَفْرَاءُ الزَّهَر

*Morina culteriana* (S). *Morine de Coulter* (F).  
بجلة تزيينية تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فراءه فناء . اوراقها خيطية، نصلها يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . ازهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع ، ابطية وتاجية الارنكاز || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

*Morina bulleyana* (S). *Morine de Chine* (F).  
بجلة سرىوتية تزيينية تعلو نحو ٦٠ سم . ساقها فراءه تملوها خطوط مستطيلة من الزغب الاطلال . اوراقها سنانية

تطول من ١٢ الى ١٥ سم . ازهارها بيضاء اللون ، ثورية التجميع ، طرفية الارنكاز || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



مرقن

*Morina persica* (S). *Morine de Perse* (F).  
جنبة سرىوتية تزيينية تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فراءه . اوراقها مقابلة خفيفة ، نصلها يطول نحو ١٥ سم . ويعرض نحو ٣ سم . صفحته خلية البشرة متباعدة

الستين النقي الحشف . ازهارها ابطية وطرفية الارنكاز ، وردية اللون ، خلية الصلصة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

### ٢٦٤٣٨ - مَرْقَمَة مُسْتَقِيمِلَة الزَّرَق

*Morina longifolia* (S). *Morine à longues feuilles* (F).  
جنبة تزيينية تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها فراءه . اوراقها خفيفة ، نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . حثاره مبالغ الحافة ، دقيق الحشف . ازهارها متوسطة القد، ابطية وطرفية الارنكاز ، تلبو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي وتستقر على الحمرة القانتة . ازهارها يستمر من تموز الى آب .



مرينة

*Mérinos* (F). *Morino sheep* (E).  
ضأن بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بغزارة صوفه ونعومته وجودة صنفه .

*Murenidae* (F). *مَرْقَمَات*  
هي فصيلة الشقيبات ، اطلها .

*Mérione* (F). *مَرْقَمُون*  
هو الزيد ، اطله .

*Alibite* (F). *Nutritive* (E). *مَرْقَمِي*  
المادة او المواد الغذائية القابلة للتشثيل المباشر في الجسم .

*Vin de bon goût* (F). *مَرْز* ، *مَرْزَاء*  
الحمر اللذيذة الطعم .



مرينوس

### ٢٦٤٤٤ - مَرَادُ الْإِتِمَامِ

*Adjudication au revidage*, A. à la revision (F).  
هو المزاد الذي يخضع لانتقاد قوم تأمروا على ان لا يتناسوا في المزايدة العلنية وذلك ليسو المطروح بضمن

*Margaritana* (S). *Margaritana* (F). *Margaritana* (E).  
جنس حيوانات مائية من الرخويات فصليات الخياشيم

وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات افريقية واروپية وآسية وامريكة || اصداها شبه بيضية الشكل ، محدبة ، مستطيلة ، لامتناهية الصاريح والاضلع . بعض انواعها ينتج اللؤلؤ الفاخرة تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

*Carthame* (F). *مَرْقِي* ، *مَرْقِي*  
هو القرم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطله .

*Murex* *مَرْقِي*  
جنس حيوانات بحيرية مفرسة من الرخويات المعديات ذات الاصداغ . انواعه عديدة اشهرها المريق الفينيقي (ابو دينار) والمريق اليوناني || اصداغه مدنية شالكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الغابر خضابا ارجوانيا ثابثا يستعمل في صبغ انفس الثياب .

*Muricidae* (S). *Muricidés* (F). *Muricidae* (E). *مَرْقِيَّات*

فصيلة حيوانات بحيرية مفرسة من الرخويات معديات الارجل وحيادات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة . كان لها شهرة في الزمان الغابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الابيض المشهور || اعرف اجناسها واشهرها المَرْقِي وَالْمَرْقُورَةُ وَالْكَيْسِي .

*Marica* (S). *Marique* (F). *Marica* (E). *مَرْيَكَة*

جنس نباتات عشبية جذمورية سرىوتية من فصيلة السوسنيات . منبتها البرازيل ، شجارها منتصب ، رفيعة . اوراقها خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . ازهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزرع للزئين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

*Marica coerules* (S). *Marique bleue* (F). *مَرْيَكَة زَرْقَاء*

نوع من المريكة . منبتها البرازيل . شجارها مستظلل الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها صغيرة الحجم ، خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، قتلها نحو ١٠ سم . لونها الازرق اليلكي المواج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

*Sauge officinale* (F). *مَرْيَكَة*  
نبات طبي ، يعرف بالقويسة الخنزرية ، اطلها .

*Morina* (S). *Morine* (F). *Whorl flower* (E). *Quirkarde* (D). *Morina* (I). *مَرْيَكَة* ، *مَرْيَكَة*  
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الدبسياسيات . انواعها

٢٦٤٥٧ - مَزَايِدَة (F). Enchère (F). Auction (E).  
هي عرض مبلغ أعلى من الثمن الأساسي أو من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .

٢٦٤٥٨ - مَزَايِدَة (F). Beurrerie (F). Butter factory (E).  
هي معمل الزبدة، بناء خصص لصنع الزبدة ويبيعها .

٢٦٤٥٩ - مَزَايِدَة (F).  
هي الخفاة ، أطلبها .

٢٦٤٦٠ - مَزَايِدَة (F). Mazus (S). Maze (F). Mazus (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخنازيريات . أنواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من نباتات الهند والبيض الآخر من استراليا وتسمانيا || سوقها قصيرة أو جعدة أو مدادة . أوراقها اهليلجية ملوقة . أزهارها عنقودي التجميع ، شراخي الارتكاز || أعرف أنواعها وأشهرها النوعان التاليان .

٢٦٤٦١ - مَزَايِدَة (F). Mazus rugosus (S). Maze rude (F).  
نوع من المَزَايِدَة . ساقها فروع قصيرة تملأ من ١٠ إلى ٢٠ سم . أوراقها مشرمة غشنة . عناقيدها الزهرية تطلو من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها إلى الزرقة الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من أيار إلى أيلول .

٢٦٤٦٢ - مَزَايِدَة (F). Mazus pumilio (S). Maze pygmée (F).  
نوع من المَزَايِدَة . ساقها جعدة . أوراقها غشمية مستتنة النصال . شواذيتها الزهرية قصيرة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٦٤٦٣ - مَزَايِدَة (F). Amandier amer (F).  
هي شجرة اللوز المر . ج. مزج ، أطلبها .

٢٦٤٦٤ - مَزَايِدَة (F).  
المزجل : الموضع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .

٢٦٤٦٥ - مَزَايِدَة (F). Concurrentiel (F). Competitive (E).  
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزاخة .

٢٦٤٦٦ - مَزَايِدَة (F). Sep (F). Frame of plough (E).  
قطعة من المحراث ترسفت في قمر التلم عند الحراث .

٢٦٤٦٧ - مَزَايِدَة (F). Terroir (F). Soil (E).  
هو الميعص ، أطلبه .

٢٦٤٦٨ - مَزَايِدَة (F). Binaire (F). Binary (E).  
هو كل مركب من عنصرين .

٢٦٤٦٩ - مَزَايِدَة (F). Bilateral (F). Bilateral (E).  
هو كل اتفاق أو عقد ملزم للجانبين المتعاقبين .

٢٦٤٧٠ - مَزَايِدَة (F). Diotocardes (F).  
قسم من الرنويات المدية .

٢٦٤٧١ - مَزَايِدَة (F). Amphipodes (F). Amphipoda (E).  
رتبة من القشريات .

جنس من أحدم فيبيونه ويقسمون الفرق بين الثنتين وهو من الأعمال غير المشروعة التي يعاقبها القانون .

٢٦٤٤٥ - مَزَادُ التَّنْهَوْر ، مَزَادُ الْأَسْتِرْسَال (F). Adjudication sur folle enchère (F).  
هو ما يعرف بإعادة المزاد على ذمة الملتزم .

٢٦٤٤٦ - مَزَادُ التَّنَاقُصَة (F).  
Adjudication au rabais (F).  
هو أن يرسو الالتزام أو المبيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالمعمل على الوجه المفصل والمشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي المرفوض لتنافس المتنافسين .

٢٦٤٤٧ - مَزَادُ جَبْرِي (F).  
Adjudication sur saisie immobilière (F).  
هو المزاد الذي يتم عقب حجز العقار بعد الاجراءات القانونية المعروفة من تسجيل ونشر .

٢٦٤٤٨ - مَزَادُ قَضَائِي (F).  
Adjudication judiciaire (F).  
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني أو امر رسمي بعد استكمال الاجراءات القانونية .

٢٦٤٤٩ - مَزَادُ تَعَدُّرِ الْقِسْمَة (F).  
Adjudication sur licitation, Licitation (F).  
هو مزاد يقع على عقار شائع بين ملاك كانوا اشتروه أو ورثوه ولا يمكن قسمته شيئاً .

٢٦٤٥٠ - مَزَاوَكَة (F). Bletissement, Bletcissure (F).  
Becoming over-ripe or sleepy (E).  
المزارة كالقوب والقفل هو زيادة نضج الثمر أو ابتداء ذبوله بعد تمام نضجه .

٢٦٤٥١ - مَزَاوَرَع ، مَزَاوَرَع ، مَزَاوَرَع ، مَزَاوَرَع (F).  
Métayer (F). Metayer (E).  
هو من استعمل الأرض بالمزارة .

٢٦٤٥٢ - مَزَاوَرَعَة ، مَزَاوَرَكَة (F).  
Métayage, Colonage (F). Metayage (E).  
هي اجارة مزرة إلى أجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها إلى المؤجر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزارع . وهذه المزارة قد تكون :

مزارة المحاصة  
مزارة مستديمة

٢٦٤٥٣ - مَزَاوَرَعَة بِالتَّوَكِيل (F).  
Absentéisme (F). Absenteism (E).  
استغلال الأرض بالمزارة على أن يشغل صاحب الأرض بوكيل .

٢٦٤٥٤ - مَزَاوَع (F).  
Hérission (F).  
هو القنفذ ، أطلبه .

٢٦٤٥٥ - مَزَاوَلَة الْعَمَل (F).  
Vacation  
هو الوقت الذي يقضيه بعض الأشخاص المنوط بهم عمل معين في القيام بأعباء هذا العمل أو المهمة .

٢٦٤٥٦ - مَزَايِد حَقِيقِي (F).  
Command (F).  
هو الذي يستمر يوم المزايدة حتى يرسو المزاد على سواه ظاهراً في حين أنه صاحب الصفقة .



## ٢٦٤٨٣ - مَزْرَقَة

المزقة. ج. مزارق. هي الحيات في التربة وقد حاصلت بها الدرة يحبس فيها الماء حتى تمتلئ ثم يساق الماء إلى غيرها.



مزرق

Cloaque (F). Cloaca (E).

## ٢٦٤٨٤ - مَزْرَق

فوعة المسالك البولية والمعوية والتناسلية عند بعض الفقاريات وأخصها الطير.

Boinés (F).

## ٢٦٤٨٥ - مِزْعَامِيَّات ٥

عمارة من فصيلة البوليئات. اجناسها وانواعها عديدة. معظمها من علم المناطق الاستوائية الامريكية ويجزر المحيط الهادي، اخصها مدغشكر. وبعضها اسبوي وافريقي || اجسامها متباينة الاطوال التي تراوح من متر الى عشرة امتار || اشهر انواعها :

Anacunda (F).

## أناكندة

Boa constrictor (F).

## بواء مقلصة

Boa arc-en-ciel (F).

## بواء لطفانية

Boa de Cook (F).

## بواء كوك

Boa javelot (F).

## دسامة

Epinette (F).

## ٢٦٤٨٦ - مَزَقْ \*

Spinet, Box for fattening poultry (E).

قفس يرب فيه الدجاج الممد للتسمين.

Luscinia succia (S).

## ٢٦٤٨٧ - مَزَقَة \* ، مُسْهِر

Gorge-bleue à miroir roux (F).

طائر من الحزاز وفصيلة الدعليات. صغير الجثة طوله نحو ١٥ سم. ثوبه متركب الالوان الجميلة التنسيق والزخرفة. صفه مقلد بالازرق || وهو من القواطع محبوب البلاد في طلب الرزق. قوته الحشرات والديدان وبعض الحار العنينة التي تدرك في الحريف. يألف المتاع ويجاري الماء ووضافت البحيرات. يدفن انجمه بين الادغال وفي المقاصب. انثاء تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً.



مزقة

Gaveuse (F).

## ٢٦٤٨٨ - مَزَقَة

Cramming apparatus (E).

أداة لرق الطير.

Hybride (F).

## ٢٦٤٨٩ - مَزَكُوب ٥

Hybrid, Mongrel (E).

المزكوب كالمساج، نمت تعريتي يطلق على كل حيوان او نبات جبين.

Fécondé, Imprégné (F).

## ٢٦٤٩٠ - مَزَكُوم ٥

Imprégner (E).

نمت تعريتي بوصف به البيض المكوش الصالح للترسيم.

Glissière (F). Slide (E).

## ٢٦٤٩١ - مِزْلَاق

Glotte (F). Glottis (E).

## ٢٦٤٩٢ - مِزْمَار

هو فم الحجرة او فم قصب الرنة.



مِزْمَار الراعي

Alisma (S). Alisme, Flûteau (F). Water plantain (E).

Froschlöffel, Wasserliesch (D). Alismo (I).

جنس نباتات جلمودرية مائية معمرة من فصيلة الزمباريات. انواعها عديدة معظمها يعيش في الازهار والمناقع المغمورة

## ٢٦٤٩٣ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).

رتبة من البوليئات منها الخنازير والجمال.

## ٢٦٤٩٣ - مُزْدَوِجَات التَنَفُّس

Dipnés, Dipneustes (F). Dipnoi (E).

طائفة من الاسماك تعتبر حلقة الانتقال بين الاسماك والقرابين.

## ٢٦٤٩٤ - مُزْدَوِجَات الخَيْشُوم

Dibranches (F).

رتبة حيوانات من الرخويات الرأسيات الاربيل.

## ٢٦٤٩٥ - مُزْدَوِجَة التَقْطِيع

Décussée (F).

Decussate (E).

هي الاوراق المتقاطعة اثنتين اثنتين تقاطعاً عمودياً.

## ٢٦٤٩٦ - مُزْدَوِجَة التَنَفُّسَة

Dicotylédone (F).

Dicotyledon (E).

احد قسمي مستورات البزور من النباتات. راجع ثنائية الفلقة.

## ٢٦٤٩٧ - مُزْدَوِجَة القَلَم

Distyle (F).

Distyle (E).

نمت تعريتي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة اقلام

## ٢٦٤٩٨ - مُزْدَوِجَة المِيسَم

Distigmate (F).

Distigmat (E).

نمت تعريتي يطلق على كل نبات ازهاره مزدوجة المياس.

## ٢٦٤٩٩ - مِزْرُ

Bière (F). Beer (E).

هو الجعة تحضيماً وهو القندي المستخلص من سائر الحبوب النشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

## ٢٦٤٩٠ - مَزْرَبَ الخَنَازِير

Porcherie (F).

راجع زريبة الخنازير.

## ٢٦٤٩١ - مُزْرَد \* ، مُدْرَع جَبَّار

Priodontes giganteus (S).

Priodonte, Tatou géant (F).

حيوان لبون ادر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المدرعات.

موطنه معظم غابات امريكة الجنوبية. يألف المواق القريبة من الماء. مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر.

ملجته الحياتي فردي الا في زين التسايف والحفانة التي تستمر نحو ست اشهر. وجاره نفق نسيج مستطيل يتحفر بين جدران الانجار.

قوته المضاء والحيات والوزغ والفئران وبعض المواد النباتية || جسمه شبه اطيالجي الشكل، قليل الفلطة، بطول نحو ١٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم. رأسه مخروطي الشكل. اذناه بوقيتان قصيرتان.

جرامزه قصيرة خاسية الاصابع الامتساوية الطول المسلحة باظافر حادة اخصها اظافر الاصابع الثالثة والرابعة من الجرامز الامامية. رأسه وجسمه وذنبه ملطوفة بدرع من الزرد العظمي المادة. ثوبه اسود اللون باستثناء الرأس والبطن والذنب فإنها الى البياض الاخير.

## ٢٦٤٩٢ - مُزْرَعَة ، مُشَارَة ، جِرْبَة ، كُرْد ، عَزْبَة

Ferme, Métairie (F).

Lease, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٥٠٢ - مَزُونَاة Parallax (F). Parallax (E).  
المزواء زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

٢٦٥٠٣ - مَزُونَاة Pantomètre (F).  
Pantometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

٢٦٥٠٤ - مَزُونَاة Clinomètre (F).  
Clinometer, Inclinator (E).  
المزوان جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خط مستقيم وخطاً أفقي .

٢٦٥٠٥ - مَزُونَاة Gonliomètre (F).  
Goniometer (E).  
هو المنقل، جهاز يستعمل في قياس زوايا الأرض عند مسحتها .

٢٦٥٠٦ - مَزُونَاة Anguleux (F). Angulus (E).  
نمت تعريفي وصفي يطلق على ما كان شكله كائزواوية .

٢٦٥٠٧ - مَزُونَاة Crèche (F). Manger (E).  
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مَزُونَاة  
المزود والملطف والثرة ثلاثة أسماء لنجم ثير واحد من كوكبة برج السرطان .

٢٦٥٠٩ - مَزُونَاة Masoreus (S).  
Masorée (F). Masoreus (E).

جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غحديات الاجنحة . انواعها المعروفة عشرة اصطلحها بعض مناطق افريقية والمهند واربوية . بعض انواعها اصبح عكاشي للانتفاخ مع الفسقت السوداني الى جميع مراقي العالم الى اجسامها صغيرة ، معتدلة التبسيط ، تقوّل من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . تأشيرها وفكوكها وملامسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مقلطحة . اغادها لاحقة ، سباعية الاخاديد النحيلة القاطية ، يملعوا بعض الهلب . غلظايا قوائمها مجهزة بمنخاس متشارية التسنين الى الحشرة الجلجلة مقرسة ودائمة والبرقة ايضاً .

٢٦٥١٠ - مَزُونِيَّات Masoreidae (S).  
Masoreidae (F). Masoreidae (E).

فصيلة حشرات من مجديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة الى اجسامها صغيرة تقوّل من ٤ الى ١٠ مم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القفن . عيونها ناشرة . تأشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة ، ضيقة القواعد المحصورة . اغادها سباعية الاخاديد النحيلة القاطية ، يملعوا في حنارها بعض الهلب . قوائمها نشيطة . متشارية التسنين . تألّف الحقول المزدرة وريال السواحل . جميعها دائمة ومقرسة . اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفسقت السوداني .

وبعضها يكثر على ضفاف البحيرات والانهر . اوراقها اربوية الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . انزعارها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة السط . قال الانطاكي : « نباتات طيبة الرائحة يزورها تحلل الاروام والسوم مطلقاً وارجاع الارحام وتدر البول وتفتت الحصى وتخلل الانتفاخ والمغص مع بذر الحذر والصل . واذا غسل به الشعر طوله وعليق رائحة الرأس . »

٢٦٤٩٤ - مَزِمَار الراعي المائي \* ، اذان العنثر Alisma plantago (S). Flûteau plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echter Froschlöffel (D). Plantaggine acquatica, Barba silvana (I).  
نوع من مزمار الراعي تكثر زراعته في احواس الماء للترزين . عشبتة تقوّل من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها كبيرة القد بيضية الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . انزعارها كثيرة العدد صغيرة الحجم لوّسها الى البياض الموشج بالوردي . وهو نبات طيب عصبه مرطب خافض للحرارة ويدر البول .

٢٦٤٩٥ - مَزِمَارِيَّات Alismaceae (S).  
Alismacées (F). Alismaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جلمورية متغية او مائية . اوراقها اربوية الانتشاب معتقة . انزعارها عنقودية التجميع مستطيلة الزناد المختص .

٢٦٤٩٦ - مَزِمَهَج Luxuriant (F). Luxuriant (E).  
نمت وصفي يطلق على النباتات الريان النضر الرمح .

٢٦٤٩٧ - مَزِمُون Alismaceae (S).  
Myzomèle, Misomèle (F).

جنس طير من الجوارم وقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعها المعروفة نحو ١٥ مولد من استرالية الى ماليزية . ملجنها الحياتي جامعي . جاعاتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات المجنحة والديدان وريق الانزعار اجسامها صغيرة القد تقوّل من ١٢ الى ١٥ سم . مناقيرها محدة الاطراف المدببة . اجنحتها معتدلة الجرم . اذانها مقلطحة . اقوابها متباينة الالوان جميعها زاهية الغضاب . اناتها ابنت غضاباً من ذكورها . تدثن اعشاشها في الادغال . اناتها تحضن بتباوية الذكور ، على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٢٦٤٩٨ - مَزِمَم Intrusif (F). Intrusive (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزيم .

٢٦٤٩٩ - مَزِمَهَاة Multiflore (F). Multiflorous (E).  
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار .

٢٦٥٠٠ - مَزِمَهَارِيَّات Anthozaires (F).  
Anthozoa (E).

فئة حورينات بحرية من المغزوات تتميز بمدانجها المشفاة بالانزعار البحرية .

٢٦٥٠١ - مَزِمَهَر Florifère (F). Floriferous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .



مزمار الراعي المائي



مَزُون



مَزُون



مَزُون

يسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مستديرة، خناباتها انبوتية الشكل فارقة || تعيش جماعات قليلة العدد. تأثت الانجبار الحربية الطويلة. مسرحها من الفسق الى الفجر. قوتها الجار على اختلاف انواعها.

Pot (F).

٢٦٥٢١ - مَسَاد

نحي السنن أو العسل.

٢٦٥٢٢ - مَسَادِع مَسَاعِيَة

Paramètres climatiques (F).  
Climatic parameters (E).

المساعد المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقليم معين أو كورة أو بقعة || اهمها ملجن الاطوار وكثيها وقوزيها. التبخر. الاشعاع الشمسي. الحرارة القصوى والدنيا والرياح. الرطوبة الجوية النسبية. الرؤية. الرياح. الضغط الجوي.

Electrode

٢٦٥٢٣ - مَسَار

هو اللابح، اطلبه.

Mésentré (F).

٢٦٥٢٤ - مَسَارِيح ، مَسَارِيَقَة

Mesentery (E).

هي طباط الصفاق.

Mesorchium

٢٦٥٢٥ - مَسَارِيح الْخَصْبِيَة

Mesovarium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِيح الْمَبِيض

Allisme (F).

٢٦٥٢٧ - مَسَاس

نبات طبي جذموري مائي يعرف بجمدار الراعي، اطلبه.

Anredra (S). Anrédère (F).

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة

جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة السرمقيات. انواعه قليلة منها البرية والزراعية التريينية. اطلانها البلاد الحارة. ازهارها جميلة الشكل ملونة.

Assistance (F).

٢٦٥٢٩ - مُسَاعَدَة

هي الاسعاف، راجحه.

Ball à complant

٢٦٥٣٠ - مُسَاعَاة ، مُسَاعَاة

هي ان يؤجر المالك مزرعة مغروسة أو غير مغروسة فيلزم المستأجر أما بتمه اغراسه أو بغيره مقابل مقدار معين من الثار. ويشترط فيه وجوب قيام المستأجر بالتزامه على اكل ربه والا تغصب الاجارة حتما بدون مقاضاة.

Passéiste (F).

٢٦٥٣١ - مُسَالِف

المسالف المشايخ المنجب بالمعالي.

Conduits génitaux (F). Genital ducts (E).

٢٦٥٣٢ - مَسَالِيك تَنَسُّلِيَة

هي الموادر التناسلية.

Poreux (F). Porous (E).

٢٦٥٣٣ - مَسَامِي

ذو مسام.

Porosité (F). Porosity (E).

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَة

كون الشيء ذا مسام.

Actionnaire (F).

٢٦٥٣٥ - مُسَاهِم

Shareholder (E).

هو كل من يملك سهماً في شركة سامية.

٢٦٥٣٦ - مَرْوَزَقَة \* ، كَبْدَمَة مَرْوَزَقَة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).  
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكيتم. سمكة بحرية بيوض. اطلانها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهاج والخاصات || جسمها اهليجي الشكل، يطول من ٢٢ الى ٣٠ سم. ثوبها قليل التباين بين الشقين. اللون السائد هو الاخضر يحن وتشتد لونه عند الظهر ويغير عند البطن. غصاب الذكر اعيق ولع من غصاب الانثى || رأسها مخروطي الشوزن. فكاهما متعادلان. شفتها متوسط الانفراج. اسنانها كبيرة، حادة. عيناها كبيرتان جاحظتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، ارجوانية اللون يعلوها تبيج ازرق واخضر. زعانفها الصدرية والشرجية تتحلل بخضاب الظهرية. الحوضية جزئية اللون اما الذيلية فسنانية الشكل، جزئية اللون يعلوها كالظهرية تبيج ازرق واخضر || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

Gnomon, Cadran solaire (F).

٢٦٥٣٧ - مِرْوَلَة \*

Sun-dial, Gnomon (E).  
هي الساعة الشمسية، قوامها قضيب عمودي ميل ظله يحدد الوقت.

Goniométrie (F).

٢٦٥٣٨ - مَرْوَلَة °

Goniometry (E).

هي علم قياس الزوايا.

Dasyphyllé (F).

٢٦٥٣٩ - مَرْوَلَة

من الارياق ما كانت نصالها كثيفة الزوبر.

٢٦٥٤٠ - مِرْوَات °

هو المعدان أو مقياس الادعان.

Oléagineux (F).

٢٦٥٤١ - مِرْوَات °

Oleaginous, Oily (E).

هي الاغضاء النباتية، اغصنها البزور والثار، الغنية بالمواد الزيتية.

٢٦٥٤٢ - مَسَاح ، مَسَاح

Arpenteur, Géomètre (F). Surveyor, Geometer (E).

الذي يمسح الارض يقين طويلاً ويعرضها لمعرفة مساحتها. راجع اربي.

Superficie (F).

٢٦٥٤٣ - مِسَاحَة

Superficies, Area (E).

قياس سطح الشيء.

Cadastre (F).

٢٦٥٤٤ - مِسَاحَة

Cadastral survey, Survey (E).

المساحة هي مجموعة القفاط والرسوم والخرائط التي تدل على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والمعارات وتخطيطها وتقسيمها على وجه التفصيل في البلاد. ويراد بها ايضاً الاعمال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيون الذين تنوط بهم الادارة هذه المهمة. الغرض الرئيسي من هذه الاعمال هو تحديد الملكية المقاربة بالذقة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يقوى الملاك على دفعها منظراً فيها الى ثمن الايلاك ودخلها.

٢٦٥٤٥ - مَسَاحَة °

Harpyia (S).

Harpie céphalote

جنس حيوان من فصيلة الطوطيات. انواعه المعروفة ثلاثة، موطنها الشرق ويبرز المحيط الهادي حتى استراليا. اجسامها صغيرة اللد، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم.



مَرْوَزَقَة



مَرْوَلَة



مَسَاحَة

Intimé (F). **مُستأنف عليه**  
Respondent, Defendant (E).  
هو المتداعي الذي استأنف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). **مُستجيد** °  
Neophyte (E).  
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). **مُستجلي** \*  
أداة خاصة بفحص البيض على الضوء الصناعي تمييزاً  
للمزكوم من غير المزكوم .

Creux (F). **مُستجوف**  
نمت تمرني يطلق على التبروغ العادية الطعم المألوف أو  
التي يتميز طعمها ببعب فاضح يجبه اللوق .

Lapidifique (F). Lapidific (E). **مُستحجر**  
صالح للتحجر .

Bénéficiaire (F). Beneficiary (E). **مُستفيد**  
° **مُستحق** ° **مُستفيد**

Emulsion **مُستحلب**  
سائل مائع يعمل رذاذاً من المواد الدهنية أو الراتنجية  
المعلقة .

Sensitive (F). **مُستحسنة**  
عشب تزيينية مركنية تدعى حساسة ، اطلبها .

Employeur (F). Employer (E). **مُستخدم** ° **مُخدوم**  
رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستعملهم .

Employé (F). **مُستخدم**  
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة المنومة به .

Extrait (F). Extract (E). **مُستخرج** ° **مُخلص** ° **عُلاصة**  
هو جزء من عقد رسمي أو حكم يُلغى بحرفه ويسلم إلى  
طالبه ويكون له قوة الاتبات التي لسنه الأصلي .

Polygalées (F). **مُستدرات**  
هي البولوغالنيات ، اطلبها .

Latier (F). **مُستدرة**  
هي البولوغالان ، اطلبها .

Echauffant (F). Heating (E). **مُستشيط**  
نمت تمرني يطلق على الاعلاف والحبوب التي تنشط حرارة  
الجسم وتسبب الادفاه .

Commodataire (F). **مُستعير**  
هو الذي يأخذ المين المارة من المير في عقد العارية .

Firme (F). Firm (E). **مُستقل** °  
Firme agricole, **مُستقل زراعي** °  
Exploitation agricole (F). Farming (E).

Futurisme (F). **مُستقبلية** °  
Futurism (E).

المستقبلية نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

2٦٥٣٦ - **مُساهمة** ° **مُساهمة المُرماء**  
Contribution  
هو ان يسام كل واحد من الرما دفع دين مشترك في  
دفع حصة من هذا الدين عن الجميع .

Equivalent **مُساو** ° **مُكافئ**  
Egalité (F). Equality, Parity (E). **مُساواة** °

Limnomètre (F). **مِسباح** °  
Limnimeter (E).  
هو المثاق جهاز يستعمل في تقدير أرواخط مستوى  
البحيرات .

Sonde (F). **مِسبار** \* **مِرْجاس**  
Sounding-line, Lead (E).  
أداة السبر ، تقع على اشكال مختلفة . تستعمل في الطب  
والزراعة والارض .

2٦٥٤١ - **مِسبال** ° **أبو سبال** ° **قُرُف**  
المقاصب °  
Panurus (S). **مِسبال** °  
Panure, Mésange des roseaux (F).

جنس طير من فصيلة القرقفيات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد ، اعطائها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والشرقية .  
اجسامها واذاها مستطيلة . اجنحتها معتدلة القد ،  
منقربة الاطراف . منقارها قصيرة مستعرجة القواعد ،  
مستقيمة اطراف الخاطم العليا البيضة التيجين || اعرف  
انواعه واشهرها المسبال الفضي .

2٦٥٤٢ - **مِسبال فُهي** °  
Panurus blairicus (S). Panure à moustaches (F).  
Bearded titmouse (E).

طائر من المسبال . طوله نحو ١٧ سم . سبال لطفة سوداء  
خلية تمتد من الزند وقاعدة الجفن إلى طرف العنق . رأسه  
إلى الزقعة الرمادية الموج . عنقه ووجهه إلى البياض  
الفضي . ظهره إلى الصهبة الصنابية . جناياه إلى السرة  
الخطية الجذعة بالبياض . بطنه إلى الصهبة الفاتحة . ذنبه  
زنجبي الريش المتراكب ، اسمر اللون ، حنطلي الموج .  
منقاره وحيدة عنقه إلى الصفار الدايق . رصاه وأصابعه إلى  
الردة الرصاصية || اعطائه الشرق الاوسط واروبة الجنوبية  
والشرقية بألف المناطق والمقاصب وجراري الماء || قوته  
الحشرات ونبذر النباتات المتفتحة والمالية || يدفن في  
الادغال والاسل . عشه كالجواب تقع فيه الانثى من ٦  
إلى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً .

2٦٥٤٣ - **مِسبلك** ° **مُصنر**  
Fonderie (F).  
المعمل المهنر لتلويب المعادن وصباها . Foundry (E).

2٦٥٤٤ - **مُسبل** ° **عُملل**  
Organe mâle des insectes (F). Manly organ of in-  
sects (E).  
المُشو الذكري في الحشرات .

2٦٥٤٥ - **مُسناجر**  
Locataire (F).  
Tenant, Lodger (E).  
هو الذي يتنقد الاجارة من مالك المين باسمه .

2٦٥٤٦ - **مُستأنف**  
Appellant (F). Appealing (E).  
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مِسبار (١)



مِسبار (٢)



مِسبال فضي



مُسبَل

## ٢٦٥٧٧ - مُسْتَكْنَفُ الْحَلِيبِ \*

Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).  
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .

## ٢٦٥٧٨ - مُسْتَكْنَفُ الزُبْدَةِ

Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).  
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن أي مقدار المواد السنية في الحليب أي اللبن .

## ٢٦٥٧٩ - مُسْتَقْلَقُ

Décombant (F). Decumbent (E).  
نمت تعريفى وصنى يطلق على غثث الجذوع والقروص النباتية المسترخية التي لا تستطيع الانتصاب .

## ٢٦٥٨٠ - مُسْتَصِفَّةُ

Absorptiomètre (F).  
Absorptiometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس مسمّ الخمر القوارة للفساز الكربوليكى .

## ٢٦٥٨١ - مُسْتَنْبَتُ

Pépinière (F). Nursery (E).  
هو المشتل ، اطلبه .

## ٢٦٥٨٢ - مُسْتَدُّ

Document, Titre (F).  
Document, Titre (E).  
هو السند ، اطلبه .

## ٢٦٥٨٣ - مُسْتَقْفِي

Héliode (F).  
نمت تعريفى يطلق على كل ما له صلة بالمستقعات كالثباتات المستقيمة والحيمات المستقيمة .

## ٢٦٥٨٤ - مُسْتَوْبَةُ \*

Mycetobia (S).  
Mycétobie (F). Mycetobia (E).

جنس حشرات من فصيلة المستويات ورقية ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || أجسامها صغيرة ، نحيلة ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مكورة . عيونها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملاسها مستطيلة . اعطائها صغيرة وقصيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية . رواشلتها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة للظانيب || اسرارها عارضة ، تمش على الفطور .

## ٢٦٥٨٥ - مُسْتَوْبِيَّاتُ

Mycetobiidae (S).  
Mycétobiidés (F). Mycetobiidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، تطول ٢ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متباعدة عند الاناث ، متقاربة عند الذكور . رزقاتها ثلاثية عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملاسها ملونة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها سلكية تمش على العصارى النباتية التي ترشع من الجروح || اشهر اجناسها المستوية .

## ٢٦٥٨٦ - مُسْتَوْدَعُ ، مَخْزَنُ ، حَاصِلُ

Dépôt (F). Depot, Warehouse (E).

## ٢٦٥٨٧ - مُسْتَوْدَعُ عَقَاقِيرِ

Officine (F).  
Dispensary (E).

الاكثار الخالية التضاربة . ركيزتها مادة مديرة مستمرة التجديد . وعمل الكلمة ان تستحث الشعور وإلا فلا لزوم لها .

## ٢٦٥٩٥ - مُسْتَقَرَّاتُ الْحَيَاثِيمِ

Pérennibranches (F).

فئة من السرفويات تتميز باستمرار وجود جهازها الخيشوي في مختلف اطوارها الحياتية ، من الطور البلوطي الى الطور البائي .

## ٢٦٥٩٦ - مُسْتَقْطَبُ

Polarimètre (F).  
Polarimeter (E).  
مقياس الاستقطاب .

## ٢٦٥٩٧ - مُسْتَقْطَبُ

Polarisant (F).  
Polarizant (E).

## ٢٦٥٩٨ - مُسْتَقْلَةُ الْقِيعَالَاتِ

Dialypétales (F).  
Dialypetalous (E).

نمت تعريفى يطلق على النباتات ذات الازهار المستقلة البتلات .

## ٢٦٥٩٩ - مُسْتَقِيمُ الْأَطْرَافِ

Rectiligne (F).  
Rectilinear (E).

الحيوان الذي تشكل اطرافه خطوطاً مستقيمة لا احدياد بها ولا تقعر .

## ٢٦٥٩٠ - مُسْتَقِيمُ الرُّبَانِ

Recticorne (F).

نمت تعريفى يطلق على كل حشرة مستقيمة الزبان .

## ٢٦٥٩١ - مُسْتَقِيمُ الْمُنْقَادِ

Rectirostre (F).

نمت تعريفى يطلق على كل طائر متقاده مستقيم الشكل .

## ٢٦٥٩٢ - مُسْتَقِيمَاتُ الْجَنَاحِ

Orthoptéroïdes (F). Orthopteroids (E).

طبقة حشرات تنتمي الى شعبة الرقائيات وطائفة المحجمات اصلاً . تشمل حالياً خمس رتب يبي اللؤلؤيات والاشيانيات والفصصيات ومستقيمة الاجنحة والجلفقيات . جميعها كبيرة اتخذت مستطيلة الساق . ارساغها مفصليّة تتكون من ثلاث عقل او اربع . اناثها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلحة بمرزات قوية .

## ٢٦٥٩٣ - مُسْتَقِيمَاتُ مَقْلَافِيَةٍ

Lignes droites concourantes (F).

## ٢٦٥٩٤ - مُسْتَقِيمَةُ الْأَجْنَحَةِ

Orthoptera (S). Orthoptères (F). Orthoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيّات الاجنح . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تشمل اكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة القد . اجسامها واشكالها والوانها عديدة || من اشهر فصائلها الجندجديات والجراديات والقبوطيات .

## ٢٦٥٩٥ - مُسْتَقِيمَةُ الْعُرْوَى

Rectinerve, Rectinerviée (F).

نمت تعريفى يطلق على كل ورقة متوازية العروق المتجهة من القاعدة الى القمة .

## ٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْنَفُ

Aréomètre, Densimètre (F). Aræometer, Densimeter (E).  
مقياس الكثافة .



مستكنف



مستكفف الحليب

Triangulation ٢٦٦٠٣ - مَسْحَقَةٌ ٥  
عملية تأريخ ورسم بواسطة المثلثات تمهيداً لكليل المساحة.

Oserale (F), Osler-bed (E). ٢٦٦٠٤ - مَسْحَرَةٌ ٥  
منبت السحر أي الصفصاف .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - مَسْحَق ٥  
Breaking machine (E).  
آلة تستعمل لسحق المساقط والكسب وما أشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - مَسْحَق مِسْحَق ٥  
آلة للسحق والمُشَقّ أَكْل من المسحق العادي .

Brole (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - مَسْحَقَةٌ ٥  
آلة تسحق بها سوق القنب والكتان قبل مشقها .

Gourmette (F). ٢٦٦٠٨ - مَسْحَل ٥  
Curb, Curb-chain (E).  
سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الشكّمة تكون تحت جفلة الفرس السفلى .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - مَسْحَلَةٌ ٥  
هي التحليل بالاملاسة أو الإختلال بمجرد ملامسة مادة أخرى لا تتغير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - مَسْحَلِي ٥  
Catalytic (E).  
هو ما يتميز بالإختلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - مَسْحُوقِ الدَّم ٥  
مركب عضوي تجدد فيه السج النباتية والحيوانية مغلف المواد الغذائية اللازمة لحياتها . وهو يستفجر من الدم بعد تجفيفه ومعالجته للقضاء على رائحته الكريهة . مظهره الخارجى حبيبات دقيقة سمره اللون سواء المواجه للامع . يستعمل في أعلاف الدواجن على اختلاف أنواعها ويستعمل في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لأنه يحوي من ١٠ إلى ١٤ ٪ من الأزوت . وهو من أنشط الاسمدة الطبيعية لكنه يبطئ الانفعال والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ ٥  
سماد فسفوري عضوي يصنع من العظم الذي يحوي الكثير من فسفات الكلس وكربونات الكلس || أشكاله التجارية المستعملة ثلاثة : الخام واللاشحي واللاهلامي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ الْخام ٥  
هو المتأخر من سحق العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الجافس الفسفوري  
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

غير أن ما يحوي من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب وينشط بعض الأوصام البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

Poudre d'os dégraissée (F). ٢٦٦١٤ - مَسْحُوقِ الْعَظْمِ اللَّاشِحِي ٥  
هو المتأخر من سحق النظام بعد استخلاص ما فيها من شحم . وهو يحوي :

من ١٥ إلى ٢٠ ٪ من الجافس الفسفوري  
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت

وهو قليل الاستعمال كسحق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - مَسْتَوَاتِ الْبُرُور ، وَعَالِيَاتِ الْبُرُور  
Angiosperms (F), Angiosperms (E).

أحد قسمي باديات الزهر وهو يشغل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وبزرتها في ثمرة || تقسم مستورات البرور إلى قسمين : وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين .

٢٦٥٨٩ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَر ، خَفِيَّاتِ الْوَلَج  
Cryptogames (F), Cryptogames (E).

قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة أعضاء التناسل تجتمع إلى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوعائية ، الطعلبيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - مَسْتَوَاتِ الزَّهَرِ الْوَعَائِيَّة  
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F). Vascular cryptogams, Pteridophyta (E).

صف من النباتات الخفيات الأعضاء التناسلية . أشهر نباتاتها السراخس والكنبانيات التي تحمل ثلاثة أعضاء فقط وهي الجنذور والسوق والأوراق .

٢٦٥٩١ - مَسْتِيك ، مَعْتَجُونِ التَّطْعِم  
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).

مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم أو التقليل لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - مَسْتِجَالَةٌ ٥  
Marrière (F), Marl-pit (E).  
المسجالة هي مقلع السجيل .

٢٦٥٩٣ - مَسْتِجَلَةٌ ٥  
Marrière (F).  
هي المسجالة

٢٦٥٩٤ - مَسَح ٥  
Arpentage (F).  
Land-measuring (E).  
قياس مساحة الأرض .

٢٦٥٩٥ - مَسْحَاء ٥  
Terre plate (F), Flat land (E).  
أرض مستوية ذات حصى صفار . ج. مساح وساسي .

٢٦٥٩٦ - مَسْحَاب ٥  
Néphoscope (F).  
Nephoscope (E).

جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - مَسْحَاة ٥  
Niveleur (F), Leveller (E).  
أداة يستعملها البستاني لتبسيط الاكواد وصنع اعضادها .

٢٦٥٩٨ - مَسْحَاة آليَّة ٥  
Ravale (F).  
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتسويته .

٢٦٥٩٩ - مَسْحَاة ٥  
Anémographe (F).  
Anemograph (E).


جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ومقدارها .

٢٦٦٠٠ - مَسْحَاة ٥  
هو المجراة ، اعطيه .

٢٦٦٠١ - مَسْحَاة ٥  
Aérifère (F).  
Aeriferous (E).

نمت تعريفية يطلق على ما هو غنص ينقل الهواء اللازم لتنفس عند النبات والحيوان . نسيج مسحامي ، فموات مسحامية ...

٢٦٦٠٢ - مَسْحَال ٥ ، وَسِيط ٥  
Catalyseur  
جسم يحدث التحليل بالاملاسة .



مسحاج

## ٢٦٦١٥ - مَسْحُوقُ الْعَظْمِ اللَّاهُتَامِي

Poudre d'os déglutiné (F).

هو الناتج من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وعلام. مظهره الخارجي مسحوق ناعم أبيض اللون يحوي: من ٢٦ إلى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري ومن ٥.٦ إلى ١٥.٢ ٪ من الأزوت وهو جزييل الفائدة شائع الاستعمال.

## ٢٦٦١٦ - مَسْحُوقُ الْقَرْنِ

Poudre de corne (F).

Horn meal (E).

سماد عضوي ينتج من سحق القرون والظلوف بعد تحميصها أو معالجتها بالبخار. وهو يحوي: من ١٠ إلى ١٥ ٪ من الأزوت من ٤ إلى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري من ٦ إلى ٧ ٪ من الكلس يعتبر من الأسمدة الجزييلة النفع الطويلة الأجل لانه يخدم في التربة أكثر من حولين.

## ٢٦٦١٧ - مَسْخ

Monstruosité (F).

Monstrosity (E).

ج. مسوخ. شاذ عارضة أو وراثية تشوه الشكل المألوف.

## ٢٦٦١٨ - مِسْخَقَة \*

Cultivateur (F).

Cultivator (E).

آلة تستعمل للحرث السطحي تفتق التربة دون أن تقلبها وتيعثر ذراتها.

## ٢٦٦١٩ - مَسْخُود \*

Sympode (F). Sympode (E).

نعت تعريفي يوصف به كل حيوان أو نبات شذت بعض أعضائه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي تحتل رجليه. وكما هي حال القاعية في النبات.

## ٢٦٦٢٠ - مَسَد

Fibre

ج. ساد وأساد.

## ٢٦٦٢١ - مِسْدَاس \*

Sextant

جهاز يمكن من قياس الابعاد المزاوية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق.

## ٢٦٦٢٢ - مِسْدَاس

Sextant,

Sextant d'Uranie (F). Sextans (E).

المسداس كوكبة نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المسداس ||

نجومها قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها.

## ٢٦٦٢٣ - مِسْدَاس \*

Nébuluse (F). Cloudy (E).

إداة آلة تستخدم في ذر المساحيق فتعثرها كالمهاب.

## ٢٦٦٢٤ - مِسْدَاس

Hexagone (F). Hexagon (E).

شكل هندسي سدس الزوايا والأضلاع.

## ٢٦٦٢٥ - مِسْدَسُ السُّطُوح

Hexaèdre (F).

Hexahedron (E).

٢٦٦٢٦ - مِسْدُوم

Obnubilé (F).

نعت تعريفي يطلق على الأشياء التي ينشأها الضباب أو الغمام أو الدخان ...

## ٢٦٦٢٧ - مَسَدِي

Fibreux (F). Fibrous (E).

٢٦٦٢٨ - مَسْرَأ

Frayère (F).

Spawning place or season (E).

المكان حيث يبويض السمك.

## ٢٦٦٢٩ - مِسْرَاء

Oviducte (F). Oviduct (E).

الممرارة قناة البيض.

## ٢٦٦٣٠ - مَسْرَبَة

Poi glanduleux (F).

Glandulous down (E).

عضو ليفاني خلي ادب ينشأ على مختلف أجناس النبات.

ج. مسارب.

## ٢٦٦٣١ - مَسْرَط ، مِسْرَط

Esophage (F).

Esophagus (E).

هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى البلعم والرء.

## ٢٦٦٣٢ - مَسْرُوك

Balzane haut-chaussée (F).

الفرس مسرول اذا بلغ التجيب الركبتين أو المرقوبين.

## ٢٦٦٣٣ - مَسْرَى

Régime (F) Rule (E).

هو مجموعة القواعد المفروضة أو المنية.

## ٢٦٦٣٤ - مِسْطَاح \*

Planimètre (F).

Planimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السطح.

## ٢٦٦٣٥ - مِسْطَار ، مِسْطَارَة

Moût (F). Must (E).

عصير العنب الجديد قبل أن يستحيل إلى خمر.

## ٢٦٦٣٧ - مِسْطَاح ، صَفْرَة

Palier (F).

Landing, Stair-head (E).

٢٦٦٣٨ - مِسْطَاح مِسْطَاحِي الْأَضْلَاح

Parallélogramme (F). Parallelogram (E).

٢٦٦٣٩ - مِسْطَاح مِسْطَاحِيل

Parallélogramme rectangle (F). Rectangular paral-

lelogram (E).

## ٢٦٦٤٠ - مِسْطَاح مَعِين

Parallélogramme oblique (F). Oblique parallelo-

gram (E).

## ٢٦٦٤١ - مَسْطَرَّة ، أَنْمُودَج

Echantillon (F).

Sample, Pattern (E).

هي العينة والعينة.

## ٢٦٦٤٢ - مَسْطَرَّةُ الْإِرْتِفَاع

Mire (F). Slight (E).

هي المير، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي.

## ٢٦٦٤٣ - مِسْعَار \*

Calorimètre (F).

Calorimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة.

## ٢٦٦٤٤ - مِسْعَرِي ، حَرَكَرِي

Calorifique (F).

Calorific (E).

نعت تعريفي توصف به الاشياء التي تولد الحرارة.

## ٢٦٦٤٥ - مِسْعِرِيَّات

Calorimétrie (F).

Calorimetry (E).

درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة.



مسففة



مساس



مسطح



مساس

Arrhes (F).

Earnest, Deposit (E).

هو البرين الذي يدفعه احد طرفي العقد الى الآخر  
ساعة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - مِسْكَبَة ، كَوْدَه

Planche à semis, Plancher surélevée, Plate-bande (F).  
Border, Bed, Seed-bed (E).مستطيل من التراب ارفع من سطح التربة مستقيم الاضواء  
محاط بممر ضيق .

Bouillon blanc (F).

٢٦٦٦٥ - مِسْكِر الحَوْت

هو البوصير ، اطليه .

Local d'habitation (F).

Dwelling-local (E).

المسكن او محل السكن هو المكان الذي يختصه المرو  
لسكناء .

Habitation rurale (F).

Rural residence (E).

كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او  
تدود حل الريف مها كانت طبقة الاجتماعية . راجع  
بيت زراعي .

Massicot

٢٦٦٦٨ - مِسْكُوت

هو بروكسيد الزنك الاصفر اللون .

Moschifère (F).

Moschiferous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاجهزة الخاصة التي تفرز مادة  
المسك ويجمعها عند الحيوان .

Muscat (F).

٢٦٦٧٠ - مِسْكَاة ، مِسْك

صفة العنب المسكي العرف وفي الكرومة غروب عديدة  
مشهورة بهذا العرف المذاقي .

Moschins (F).

٢٦٦٧١ - مِسْكِيَات

نفة من فصيلة الأليات تشمل جنساً واحداً يدعى أيل  
المسك .

٢٦٦٧٢ - مِسْلَاح

النخلة التي يكثر بمرها وهو اخضر . وفي حديث مسا  
يشترطه المشتري على البائع انه ليس له مِسْلَاح ولا مخضار .

Erode (F).

٢٦٦٧٣ - مِسْلَة

نوع من الجزاب ، مشهور باسم ابو مشقة ، اطليه .

٢٦٦٧٤ - مِسْلَاح ، مِهْيَاح

المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F).

Slaughter-house (E).

المكان المد لتحر وسلخ وقصاة الحيوانات ويدهى المخزر .

٢٦٦٧٦ - مِسْلَقَة ، مِسْلَق

Scarificateur (F). Scarificator, Hoeling-machine (E).  
اداة تيمر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع  
الاعشاب .

Malcolmia (S). Malcolmie (F).

٢٦٦٧٧ - مِسْمَاح

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات .

Pal injecteur (F).

Soil injector, Root injector (E).

أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لمكافحة بعض الحشرات  
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F).

Hom:othermal (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F).

٢٦٦٤٨ - مِسْقَار

سمكة بحرية تدعى مصقار ، اطليا .

Masca (F).

٢٦٦٤٩ - مِسْقَة

سمكة بحرية تدعى أيضاً غليود ، اطليا .

Projection

٢٦٦٥٠ - مِسْقَط

٢٦٦٥١ - مِسْقَط أفقي

Projection horizontale (F). Horizontal projection (E).

٢٦٦٥٢ - مِسْقَط رأسي

Projection verticale, Élévation (F). Vertical projection,  
Elevation (E).

Projection

٢٦٦٥٣ - مِسْقَط عمودي

orthogonale (F). Orthogonal projection (E).

Cypraea (S).

Porcelaine (F).

٢٦٦٥٤ - مِسْقَلَة ، وَدَعَة  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المدليات . انواعها  
عديدة . اسدائها صغيرة القد ، شبه بيضية ، مبطلة .  
تكثر في بحار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين الدواب .

Irrigué (F). Irrigate (E).

٢٦٦٥٥ - مِسْقُوتِي

المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Peau de poisson (F).

Fish skin (E).

٢٦٦٥٦ - مِسْك

المسك هو جلد المسك . ج مِسْك .

Musc (F). Musk (E).

٢٦٦٥٧ - مِسْك

مادة دهنية عطرية سمره اللون يفرزها ايل المسك .

٢٦٦٥٨ - مِسْك الجَن

اسم يطلق على عدة نباتات اغصنها حشيشة الريح  
والقيصوم .

٢٦٦٥٩ - مِسْك اللَقَاتِر

هي الحاسبة .

Tubéreuse (F).

٢٦٦٦٠ - مِسْك زُومِي

هو الزنبق نبات تزييني من النرجسيات .

Saccharimètre (F).


Saccharimeter (E).

٢٦٦٦١ - مِسْكَار \*  
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في  
السوائل . ويدعى أيضاً مقياس السكر ومسقار .٢٦٦٦٢ - مِسْكَاك \*  
هو المجرأ ، اطليه .

مسقة



مسكار



مسلفة



Brousse (F). Bush (E). ٢٦٦٨٨ - مَسْتَف ٥

المست كل فلاة أو فيفاء أو سهب تعلوها بعض الاشجار  
المبشرة التجميع . ج مسائف .

Odontoglosses (F). ٢٦٦٨٩ - مَسْتَنَات الأَسِنَّة

فئة من الرغويات تحمل في اطراف السنتها بعض الانسان  
الصغيرة الذرية .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٠ - مَسْتَح ٥

Wind current (E).  
مر الريح وبجراها في اي مكان او موقع كان .

Gorge-bleue (F). ٢٦٦٩١ - مَسِير

هو المزقة ، طائر من الدغليات ، اطلسا .

Aristolochie siphon (F). ٢٦٦٩٢ - مَسَهْرُورَة

هو زراوند سيفو ، اطلسه .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٣ - مَسَهْك

Air current (E).  
هو المسح اي مرّ الريح او مجرى الهواء .

Purgatif (F). ٢٦٦٩٤ - مَسِيل

Purgative, Purging (E).  
دواء يطلق البطن . اشهر مسيلات الحيوآن : سلفات السؤذا  
وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

Cheval demi-sang (F). ٢٦٦٩٥ - مَسَهْم ، مَسَهَب

Half-bred horse (E).  
الفرس الهجين .

Spatule (F). ٢٦٦٩٦ - مَسَوَاط

Spatula, Palette-knife (E).  
أداة من خشب تستعمل لطيح الزبدة وسائر المعجونات .

Cadran (F). Dial-plate, Dial (E). ٢٦٦٩٧ - مَسَوَاق

Oldenlandia (S). ٢٦٦٩٨ - مَسَوَاك \*

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).  
جلس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القويآت . أنواعه  
نحو ٢٠٠ ، اعطائها البلاد الحارة . معظمها بري وبعضها  
زراعي صناعي يستخرج من جذوره مادة صيفية حمراء  
اللون .

Passorage (F). ٢٦٦٩٩ - مَسَوَاك الرّاعي

هو العصاب ، نبات من فصيلة السليبيآت ، اطلسه .

٢٦٧٠٠ - مَسَوَة ، مَسَبَة ، مَسَبَة

Présure (F). Rannet (E).  
خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منقعة الجدي الرقيق .  
تستعمل في تجميد الحليب .

Dominé (F). ٢٦٧٠١ - مَسَوْد ، مَسَوْدَة

Dominated (E).  
نمت تمرير على كل شجرة لا يزيد ارتفاع سنتها  
عقب قنة الشجرة السائدة .

Eau saumâtre (F). Briny (E). ٢٦٧٠٢ - مَسُوس

المسوس الماء بين العذب والملح . قال الرازي :  
ولو كنت ماء كنت لا عذب للمذاق ولا مسوسا

انواعها عديدة منهاها حوض البحر المتوسط . سوقها فرعاء  
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . أوراقها متعاقبة اهليلجية مقطوعة .  
تصلها خلي البثرة سنن الحافة . ازهارها طرفي الاوتكاز ،  
عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض  
والاحمر والقرنزي || اشهر انواعه الزينية ما يتبع .

Malcolmia maritima (S). مساح بحري

Malcolmia bicolor (S). مساح ثنائي اللون

Malcolmia littorea (S). مساح مجاحي

Palisseau (F). Vine-stick (E). ٢٦٦٩٨ - مَسَاك

هو المرزح ، مسند يستعمل لدم الكرمة او لرفعها عن التربة .

Acanthe-ursine (F). ٢٦٦٩٩ - مَسَس

نبات يدعى اقنثا رهلة ، اطلسها .

٢٦٦٨٠ - مَسَسْكَار ، مَسَسْكَران

Aristolochie cotonneuse (F).  
هو الزراوند الازغب ، اطلسه .

Piscine, Vivier (F). ٢٦٦٨١ - مَسَمَكَة

Fish-pond, Fish-well, Stew (E).  
حوض كبير تربى فيه الاسماك .

Digue (F). Dike, Embankment (E). ٢٦٦٨٢ - مَسَمَة

حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها او لتخفيف  
سرعة انسيابها .

Bigarré, Rayé (F). ٢٦٦٨٣ - مَسَج

Motley, Streaked, Striped (E).  
صفقة الشيء المجزع .

Anergic (F). ٢٦٦٨٤ - مَسَجَل

نمت تعريفي يطلق على من اضمحلت فيه عوارض الانهادف .

Tuteur (F). Prop (E). ٢٦٦٨٥ - مَسَنَد

هو كل عود يوضع بجانب القرمة او الشجيرة لتسند اليه .  
لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط قطره  
عن ٤ سم . افضلها اصلية كالسنديان والبلول... تقطع  
المساند في اواخر الربيع فتخلّف وتنشر اطرافها العليا  
بالمخارص وتثبت اطرافها السفلى التي تستغل التربة بالمنجل  
او بالقدوم ثم تقطع بمحلول سلفات النحاس وتثبت  
كذلك حتى ينضج المحلول من قة المسند . والمحلول يتركب  
من كيلو سلفات النحاس في عشرة لترات ماء . وهو يحفظ  
المساند من النخر نحو سبعة ايام . ويحميها من المهرقان  
الذي ان اصابها تفشي الى جميع الاغراس والاشجار .

Espalier (F). ٢٦٦٨٦ - مَسَنَد

الخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندآت .

Mussaenda (S). Mussende (F). ٢٦٦٨٧ - مَسَنَدَة \*

جلس نباتات جنينية من فصيلة القويآت . انواعه المعروفة  
زهاء ٥٠٠ جميعها من نباتات العالم القديم . اعطائها البلاد  
الاستوائية والحارة . سوقها فرعاء . أوراقها متعاقبة اهليلجية .  
ازهارها عذقي التجميع ، تاجي الاوتكاز . ازهارها خماسية  
التركيب ، مسطيلة الانابيب . لحاء سوقها واغصانها خافتة  
اوراقها تدمل الفروع . ازهارها تنفع الصدر وتذهب بالسعال  
وتقلل الجروح .



مسندة



مسوك

٢٦٧١٢ - مَسْبَس \* ، شَجَرَة الجِرْح ، تَبِغ  
Nicotiana glauca (S).

نوع من تبغ رستنيكا وهو جنية برية معمرة في المناطق الحارة ، حولية في المعتدلة . يعيش على السواحل اللبنانية . ساقه خشبية منتصبة فراءا تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه متعاقبة ، متبادلة الارتكاز ، معققة ، مستطيلة الزناد . نصلها رمعي الشكل ، جامد الصلابة ، بحري اللون . ازهاره خماسية التركيب ، طرفية الارتكاز ، صفراء اللون . ثماره جراء رباعية الفلق تلتف بعض الزهور الدقيقة ، الكروية ، الكستنية اللون || يقال ان اوراقه طبية تقيد الجراح وتلأها .

٢٦٧١٣ - مَسْبَكَة  
Terre imperméable (F).  
Impermeable soil (E).

المسكة من الارضين التي تمتلك الماء وتمنع انصرافه .  
٢٦٧١٤ - مَسْبَكَة  
Armoise dorée (F).

هي القيصوم الكافوري ، اطليه .  
٢٦٧١٥ - مَسْبَكَة  
Erodium mosqu岸 (F).

هي الجذاب المسكي ، اطليه .  
٢٦٧١٦ - مَسْبَل  
Hydromètre (F).

مقياس كثافة السوائل وقوة اندفاعها .  
Hydrometer (E).

٢٦٧١٧ - مَسْبِل  
Baradine (F).

هو الخندق الذي يصنع في الارض الجبلية المتحدرة لبيع الامطار وتوجيهها خوفاً من اضرارها .  
٢٦٧١٨ - مَسْأَ - هو الجزر وقيل نبت يشبهه .

٢٦٧١٩ - مَسْأَ \*  
Périlpédicéien (F).

المشاء من اتبع فلسفة ارسطو .  
Perilpatic (E).

٢٦٧٢٠ - مَسْأَلِي ، تَرْمَدَ آفِي  
Pépinieriste (F).

هو من تعاطى استئثار المشاتل .  
Nurseryman (E).

٢٦٧٢١ - مَسْأَرَة \*  
Apomixie (F).

هو التكاثر أتلل العادم الاخصاب .  
٢٦٧٢٢ - مَسْأَرَة  
Ferme, Métairie (F).

ارض زراعية يديرها صاحبها بعقد .  
Farm, Small farm (E).

٢٦٧٢٣ - مَسْأَرَة ، إِشْتِرَاط  
Stipulation (F).

هي كل شرط او اتفاق او قيد ينص عليه في العقد .  
٢٦٧٢٤ - مَسْأَرَة التَحْكِيم  
Clause compromissoire (F).

Stipulating arbitration of clause (E).

Solarium (S).

Solarium, Cadran (F). Solarium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وقصيلة المشقيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداؤها مدوّارة حمززة الخنار والصفحة ، ملوّنة ومرتقوة اجسامها مستطيلة . رؤوسها قصيرة عادمة الاطظام ثنائية اللواس المعروفة . اطفاؤها قرينة المادة .

٢٦٧٠٤ - مَسْوَلِيَّات \*  
Solarilidae (S).

Solarilidae (F). Solarilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل امابيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداؤها مدوّارة ، صاجية السطح ، حمززة الخنار ، ملوّنة ، مرتقوة ، متساوية الزخرفة والرفشة || اعرف اجسامها واشهرها المسوقة .

٢٦٧٠٥ - مَسْوَلِيَّة  
Responsabilité (F).

Responsability (E).

هي الالتزام بازالة الضرر الواقع على الغير بفعل المرم او سببه او بفعل غيره . وتستعمل في الصيغ التالية :

مسؤولية الاعسار (F).  
مسؤولية المرم عن فعل غيره

Responsabilité du fait d'autrui (F).

مسؤولية المرم عن فعل حيوانه  
Responsabilité du fait des animaux (F).

مسؤولية المرم عن الاهدات  
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

مسؤولية المرم عن مبانیه  
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

مسؤولية تعاقدية  
Responsabilité contractuelle (F).

مسؤولية قانونية  
Responsabilité légale (F).

مسؤولية مخففة  
Responsabilité atténuée (F).

مسؤولية مدنية  
Responsabilité civile (F).

مسؤولية مشتركة  
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٠٦ - مَسْبِيع \*  
Capacimètre (F).

Capacimeter (E).

جهاز يستعمل في قياس السعة الكهربائية .



مسوقة



مسيس

٢٦٧٠٧ - مَسْبِل \*  
Fluximètre (F).

Fluximeter (E).

جهاز يستعمل في قياس سيولة الدفع المغناطيسي واستدلالة .

٢٦٧٠٨ - مَسْبِيب \*  
Aval (F). Down-stream (E).

المنب أو ساقلة النهر هي الجهة التي تتسلي المياه الجارية . يقابلها المنقف .

٢٦٧٠٩ - مَسْبِيج ، مَدْيِب  
Dissolvant (F).

Dissolvent (E).

٢٦٧١٠ - مَسْبِد \*  
Codominant

نعت تعريفي مرجعي يطلق على الانجبار المشتركة في السيادة . فالشجرة المسيدة هي التي تكون قمتها او جزء منها تحت مستوى قن الانجبار السائدة .

٢٦٧١١ - مَسْبِير  
Trajectoire (F). Trajectory (E).

خط سير الاجرام المتحركة . ج مسائر .

Haras (F).

Breeding-stud, Stud (E).

مُوسَة تَعْنِي بِكَرَامِ الْخَيْل الْمُدَّة لَزْو.

Caniveau, Emissaire (F).

Channel stone, Gutter, Overflow channel (E).

قَنَاة لَصْرَف الْمِيَاء، وَهِيَ قَنَاة الصَّرَف الْإِسْأَسِيَّة الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا مِيَاء الْإِسْرَابِ وَمَا شَب.

Amentifère (F).

مُشَبَّرَق ٥

مِن النَّبَات مَا كَانَ أَزْهَارُهُ قَدْ ذِي الشَّكْل كَالشَّجَرَةِ.

Rassasiat (F).

مُشْبِع

نَمَت تَعْرَبِي يُطْلَق عَلَى كُلِّ تَبْغ مُنْجِم الصِّفَات الْمَذَاقِيَّة الَّتِي تَتَمَرَّكُ دُونَ الْقَاعَةِ وَفَوْق الْمَوْزُونَةِ.

Imprégné (F). Impregnated (E).

مُشْبِع، مُشْرَب، مُغَمَّر

Prévenu (F).

مُشْبُو، فَطِين

Accused (E).

هُوَ الَّذِي تَلْقَى عَلَيْهِ شَبَّة أَقْرَابِ الْجَرِيمَةِ.

Dispersif (F). Dispersive (E).

مُشْتَات ٥

جِهَاز آَلِي يَسْتَعْمَل لِاسْتِخْرَاج الْعَسَل مِنَ النِّعَارِيِبِ وَذَلِكَ بِتَأْتِيرِ الْقُوَّةِ الْثَابِتَةِ.

Extracteur (F). Extractor (E).

مُشْتَارَك ٥

جِهَاز آَلِي يَسْتَعْمَل لِاسْتِخْرَاج الْعَسَل مِنَ النِّعَارِيِبِ وَذَلِكَ بِتَأْتِيرِ الْقُوَّةِ الْثَابِتَةِ.

Indivisaire (F). Co-parcener (E).

مُشْتَرَك ٥

مُشْتَرَكَات ٥

Hamamelidaceae (S).

Hamamelidacées (F). Hamamelidaceae (E).

فَصِيلَةٌ نَبَاتِيَّةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْفَلَقَتَيْنِ. نَبَاتَاتُهَا الْأَجَارُ وَشَجِيرَاتُهَا أَوْ رَاقِحَاتُهَا مَدَنَّةٌ أَذْنِيَّةٌ. أَزْهَارُهَا خَشْوِيَّةٌ. ثَمَرُهَا جَرَاهُ صَغِيرَةٌ. مَعْظَمُ أَنْوَاعِهَا بَرِّي وَبَعْضُهَا طَبِيعِي وَزَيْتِي.

Hamamelis (S).

Hamamelle, Hamamélis, Noisetier sorcier (E). Witch hazel (E). Zanbernuis (D).

Amamelide, Trilopo (I).

جَنْسُ شَجِيرَاتٍ وَجَنْبَاتٍ بَرِّيَّةٍ وَزَيْتِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمُشْتَرَكَاتِ. أَنْوَاعُهَا قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ. أَوْرَاقُهَا مُتَمَاثِلَةٌ مَدَنَّةٌ عَابِلَةٌ. نَعْلَمُهَا بِبَعْضِ الصِّفَةِ سَمِّنِ الْخَلْفَةِ. أَزْهَارُهَا مَحْجُورَةٌ (الْإِنْكَازُ)، جِلَّةُ الشَّكْلِ، وَبِأَيْضِهَا أَوْ خَاسِيَةُ الْبِتَلَاتِ || أَوْرَاقُهَا وَطَاءُ سَوَاقِهَا طَبِيعِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْمَلَاغِيَّاتِ الصَّدْرِيَّةِ.. أَشْهُرُ أَنْوَاعِهَا الْزَيْتِيَّةُ مَا عَلَى.

Hamamelis mollis (S).

Hamamélis veloucé (F).

شَجَرَةٌ مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ فَارِشَةٌ تَعْلُو نَحْوَ ١٠ أَسْأَارٍ. مَهْدُهَا الْعَمِيمُ. أَوْرَاقُهَا خَلِيَّةُ الْبُشْرَةِ عَلَى صَفَحَاتِهَا السُّفْلَى، أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ، خَافَتِ الْمَرْفُ، لَوْنُهَا إِلَى الصُّفْرِ الزَّاهِي، كُؤُوسُهَا خَرَبِيَّةٌ عَابِلَةٌ || أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنَ الْوَسْعِ كَانَتْ إِلَى الْوَسْعِ إِذَا ر.

مُشَبَّأَة ٥

٢٦٧٢٧ - مُشَاش هُوَ الْعَظْمُ الطَّوِيلُ، أَعْلَاهُ.

٢٦٧٢٨ - مُشَاشَة لِعَظْمِ الْخَرْتَمِ

Notopterus (S).

Notoptère (F). Notopterus (E).

جَنْسُ إِسْمَاكٍ بَحْرِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَشَاطِيَّاتِ. أَنْوَاعُ الْمَرْفُوقَةِ قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ مُنْتَشِرَةٌ فِي بَعْضِ الْإِنْدِيَةِ الْإِسْرِيَّةِ أَخْصَحُهَا أَنْهَرُ وَأَخْوَارُ الْعِرَاقِ وَأَمْدَنُ. جَمِيعُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ تَطُولُ مِنْ ٦٠ إِلَى ١٠٠ سَم. زَعَانِفُهَا الظَّهْرِيَّةُ صَغِيرَةٌ ضَعِيفَةٌ. زَعَانِفُهَا الْبَطْنِيَّةُ وَالشَّرْبِيَّةُ مُتَمَاثِلَةٌ كَالْمَشَطِ. لَحْيُهَا مَأْكُولَةٌ مُتَوَسِّطَةُ الصَّنْفِ || أَشْهُرُ أَنْوَاعِهَا مُشَاشٌ، شِيلَاتَا (Notop-terus chilata) الَّذِي لَا يَقِلُّ طَوْلُهُ عَنْ ١٠٠ سَم. وَالَّذِي يَكْثُرُ وَجُودُهُ فِي أَخْوَارِ الْهِنْدِ وَمَلِيزِيَا.

Notopteridae (S).

Notopteridés (F). Notopteridae (E).

فَصِيلَةُ إِسْمَاكٍ بَحْرِيَّةٍ وَزَيْتِيَّةٍ مِنْ مَفْتُوحَاتِ الْمَتَانَةِ. أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَرْفُوقَةُ قَلِيلَةٌ الْبَدَدُ جَمِيعُهَا مِنْ إِسْمَاكٍ مَنَاطِقِ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ || أَشْهُرُ أَجْنَاسُهَا الْمَشَاطِ.

Indivis (F). Undivided (E).

مُشَاق ٥

الْمَلِكِيَّةُ الشَّامِلَةُ غَيْرِ الْمُنْقَسَةِ.

Pecten (S).

Peigne (F). Pecten (E).

جَنْسُ حَيَوَانَاتٍ بَحْرِيَّةٍ مِنَ الرِّخَوِيَّاتِ صَفِيحِيَّاتِ الْخَيْشَمِ وَفَصِيلَةُ الْمَشَاقَاتِ. أَنْوَاعُ الْمَرْفُوقَةِ عَدِيدَةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي مَعْظَمِ دَوَارِ الْعَالَمِ وَأَخْصَحُهَا الْبِلَادُ الْمُتَمَدِّلَةُ الْخَرَارَةِ || أَصْدَانُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ، شَبَّهِ رَمْسِيَّةِ الشَّكْلِ، شَعَاعِيَّةُ التَّخْذِيدِ، لَا تَسْتَوِي الْمَصَارِيحَ، الْإِيْمَنُ مِنْهَا شَدِيدُ التَّخْذِيدِ قَلِيلُ التَّخْذِيدِ || تَعْمِشُ طَلِيْقَةً عَلَى الرِّمَالِ وَتَتَقَلَّبُ بِسَرْعَةٍ. لَحْيُهَا مَأْكُولَةٌ جَيِّدَةُ الصَّنْفِ.

٢٦٧٣٣ - مُشَاقَّة، مُشَقَّة، هُبُر

Filasse (F). Filasse, Hari, Tow (E).

مَا خَلَّصَ بِالْمَقْطَعِ مِنَ لُحَاةِ النَّبَاتَاتِ اللَّيْثِيَّةِ كَالْكَنْكَانِ وَالْقَنْبِ قَبْلَ غَزْلِهِ.

٢٦٧٣٤ - مُشَاقَّة (F). Hemp-herb (E).

هِيَ قَشْرُ الْقَنْبِ وَالزَّرَبُونِ.

Pectinidae (S).

Pectinidés (F). Pectinidae (E).

فَصِيلَةُ حَيَوَانَاتٍ بَحْرِيَّةٍ مِنَ الرِّخَوِيَّاتِ صَفِيحِيَّاتِ الْخَيْشَمِ الرَّبَاعِيَّةِ عَادَمَاتِ الْمَتَابَعِ. أَجْنَاسُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَرْفُوقَةُ عَدِيدَةٌ مَعْظَمُهَا مِنْ مَحْجَرَاتِ الْأَرَاكِسِ الثَّالِيَةِ. أَنْوَاعُهَا الْمَاعِزَةُ مُنْتَشِرَةٌ فِي مَعْظَمِ بَحَارِ الْبِلَادِ الْمُتَمَدِّلَةِ الْخَرَارَةِ || أَصْدَانُهَا مُتَمَاثِلَةٌ الْإِشْكَالِ وَالْإِحْجَامِ، بَالِغَةُ التَّخْذِيدِ، لَا تَسْتَوِي الْمَصَارِيحَ || أَعْرَفُ أَجْنَاسُهَا الْمَاعِزَةُ الْمَشَاقُ.

Narthécie (F).

٢٦٧٣٦ - مُشَان هُوَ الْكِرْمَدَانُ، أَعْلَاهُ.

Péripatétisme (F).

Peripateticism (E).


الْمَشَاقِيَّةُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى فِلَسْفَةِ أَرِسْطُو لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَلْقَى دُرُوسَهُ إِلَّا مَاثِيًا بِصَحْبَةِ تَلَامِيذِهِ.



مَشَاط



مَشَاق



مَشَار



مَشَرَكَة

Dendromètre (F). **مِشْجَارٌ ٥** ٢٦٧٥٩  
Dendrometer (E).  
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير علو والحجم .

Bois (F). Wood, Forest (E). **مَشَجَرٌ ٥** ٢٦٧٦٠  
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

Nigrospora (S). **مِشْحَارَةٌ ٥** ٢٦٧٦١  
جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة اللطحيات. تتميز  
بهيئتها الثنائي التكوين والشكل . الخصب منها بسيط  
التركيب ، فردي التجميع ، منتصب الارتفاع ، عايق  
اللون . أما الماقر ففسي التجميع مداد . كئاشدا  
كروية ، متتامة ، كثيرة العدد || أعرف أنواعه مشحارة  
الذرة ومشحارة الموز .

Nigrospora oryzae (S). **مِشْحَارَةُ الذُّرَّةِ ٥** ٢٦٧٦٢  
فطر مجهرى يركب عرائس الذرة قرب ادراك حبا فيفسد  
بهيئتها بعد ان يسبب انحلالها واسودادها مما يؤدي الى  
تساقط الحب قبل الانعاش والقفاف || يدارك باجتنب  
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق ثيرلان تمفيرا  
على النبات .

Nigrospora musae (S). **مِشْحَارَةُ المَوْزِ ٥** ٢٦٧٦٣  
فطر مجهرى يركب ثمار الموز المخفوفة فيسبب اللبالب  
ويقوده الى الانحلال دون ان يبدو على القشرة ما يتم من  
الاصابة || يكافح عند ظهور اول اصابعه بفضخ الكيمايات  
المخفوفة بسائل ثيرلان المركز من ١ الى ٢٪ .

Racloir (F). Scaper (E). **مِشْحَبٌ ٥** ٢٦٧٦٤

Teinte (F). **مِشْحَةٌ ٥** ٢٦٧٦٥  
Tint, Shade, Hue (E).

Faulde (F). **مِشْحَرَةٌ ، مِشْحَمَةٌ ٥** ٢٦٧٦٦

Charasson, Palseau **مِشْحَطٌ ٥** ٢٦٧٦٧  
هو المرنجح اي المسوك ، عويد يوضع تحت قضيب الكر  
يرفعه عن التربة .

Lactomètre, Pèse-lait (F). **مِشْحَابٌ ٥** ٢٦٧٦٨  
Lactometer (E).  
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد  
السمية الموجودة في الحليب .

Baliveau (F). **مِشْحَلٌ ، مِشْحَلٌ ٥** ٢٦٧٦٩  
Saddle (E).  
كل فرع او شجرة من الخيس تركت بدون قطع لتكبر  
وتصير عجة . ج . اعجاز .

Serpette (F). **مِشْحَلْبٌ ٥** ٢٦٧٧٠  
Pruning-knif, Serpette (F).  
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان المرضية  
وفي التطعيم .

٢٦٧٧١ - **مَشَرٌ ، مَشَرٌ ٥**  
مشر ومشر الشجر : خرج ورقة واكتسى خضرة .

٢٦٧٥١ - **مُشْتَرَكَةٌ رَيْبِيَّةٌ ٥**  
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis prinianer (F).  
جينة سريرية تملو نحو ٢٠٠ سم . مهدا البلاد الامريكية .  
ساقها فضاء . فروصها منتصبه . اوراقها تطول نحو ٦ سم .  
نصلها مائل الصفحة . ازهارها عطرية الرائحة ، حر  
الكؤوس ، صفر البتلات || ازهارها يستمر من  
كانون الثاني الى اواخر اذار .

٢٦٧٥٢ - **مُشْتَرَكَةٌ فِيرَجِينِيَّةٌ ٥**  
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).  
جينة سريرية تملو من ٣ الى ٤ امتار . مهدا امريكا  
الشالية . اوراقها مائلة الصفحة تطول من ٥ الى ٨ سم .  
ازهارها صفراء اللون . ازهارها ينتنؤ عند اعيال الورق  
ويستمر من اواسط ايلول الى اواسط كانون .

٢٦٧٥٣ - **مُشْتَرَكَةٌ يَابَانِيَّةٌ ٥**  
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonais (E).  
شجرة سريرية صغيرة القذ فائزة تملو من ٤ الى ٧ امتار .  
مهدا اليابان . ضروبها الازينية اربعة . الوان ازهارها  
تختلف باختلاف ضروبها منها الاصفر الذهبي والكبريتي  
والبيروني والبرتقالي . جميعها عطرية مستحبة العرف .  
ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

Jupiter (F). **مُشْتَرِي ، بَرَجِيسٌ ٥** ٢٦٧٥٤  
Jupiter (E).

المشتري او البرجيس اكبر كوكب في مجموعة النظام  
الشمسي . يمتد الى كوكب بعد الزهرة . موقعه بين المريخ  
وزحل . جرم كتله يفوق جرم الارض نحو ١٢٩٥ مرة  
وقطره يفوق قطر الارض نحو ١١ مرة . سرعة دورته  
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .  
دورته المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة  
اليوم البرجيسي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه اربعة  
اقار كبيرة وثمانية صغيرة . اسماء الكبيرة : ايو ، اروب ،  
غانيد ، كليتيو . اما الصغيرة فاراقها من ٥ الى ١٢  
لانها لا تحمل اسماء || والمشتري يسمن المشتري السعد  
الاكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا اليه الخيرات  
الكثيرة والسعادات العظيمة .

Dérivé (F). **مُشْتَقٌ ٥** ٢٦٧٥٥  
Derivative, Drifted (E).

٢٦٧٥٦ - **مِشْحَلٌ ، مُسْتَنْبَتٌ ، دُلْدَالَةٌ ٥**  
Pépinière (F). Nursery (E).  
مكان تستنبت فيه الفراس والنباتات المختلفة فنشأ فيه  
وتكثرت فترة من الزمن الى ان تنقل وتزرع في مستقرا .

Plantoir (F). **مِشْحَلُونٌ ، شَاوِلٌ ٥** ٢٦٧٥٧  
Dibble (E).  
أداة من حديد او خشب تستعمل في التشثيل اي غرس  
الشثول .

Filière (F). Spinneret (E). **مِشْحَنٌ ٥** ٢٦٧٥٨  
المشَنّ القوقعة التي يخرج منها الخيط عند بعض الحشرات  
كخيط الحرير عند دودة القز وكالتواس عند الرقيا ||  
وهو ايضاً جهاز من الفولاذ يستعمل في جذب المعادن  
ومدها وتحويلها الى اسلاك .



مشثلون



مشحارة الموز



مشحباب



مشحلب



مشط



مشط الراعي



مشط الراعي البري



مشط الزهراء

غشب فيها انسان تسوى بها القصاب ويغلى بها الحب .  
وللمشط اشكال ، اعلمها استعمال :

Herse en bois (F). مشط خشبي  
Herse rotative (F). مشط دوار  
Herse tralante (F). مشط زاحف  
Herse canadienne (F). مشط كندي  
Herse émotteuse (F). مشط مدري  
Herse souple (F). مشط مرن  
Herse articulée (F). مشط مفصل  
Herse norvégienne (F). مشط زروحي

26789 - مُشَط ، تَمَشِيط

Hersage (F).  
Harrowing (E). حراثة سطحية بالمشط، القصد منها تنعيم التربة وتنظيفها من الاشباة .

Chromis (F). مُشَط 26790  
هو البلطي، جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات.

26791 - مُشَط الدُفْب

« ثبت صغير طيب الرائحة يقارب الكزبرة » .

26792 - مُشَط الراعي \* ، شَوْلَةُ الدَّرَاج

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkarde, Kardendistel (D). Cardo del lanajoli, Dissaco, Lattugoni (I). نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة الدبسيات . رؤوساته الزهرية حوافث شائكة متراكبة متراصة منبسطة الاطراف تؤلف كإبراً اسطوانية تستعمل في تهذيب الصوف.

26793 - مُشَط الراعي البري \*

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Venus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Verga da pastore (I).

نبات عشبي بري شائك من فصيلة الدبسيات . بزوره مأكّل للمصافير اغصنها احسن واشباهه . يستعمل في النباتات الضارة لانه يطغى على سائر النباتات التي تعيش بقربه .

26794 - مُشَط الرجل

Métatars (F).  
Metatarsus (E).

26795 - مُشَط الزَهْرَاء \* ، مُشَطِيَّة

Scandix جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة ١٠ ، جميعها برية . اوراقها متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهارها غيبية التجميع يبعث اللين . تكثر بين الزروع وتوجد في جميع البلاد . اشهرها واعمها مشط الزهراء الطويل.

26796 - مُشَط الزَهْرَاء الطَوِيل

Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Venus, Aiguille de berge (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandice, Forsasacco, Pettine di venere (I).

نوع من مشط الزهراء يكثر في الارض البور وبين الزروع فيعيقها ويؤذيها .

26797 - مُشْرَاب °

Liquomètre (F).  
Liquometer (E).

المشرب هو ميزان المشروبات، جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في المشروبات الروحية .

26798 - مُشْرَكَة

Thalle (F). Thallus (E).

هي جهاز شجاع خفيات الزهر كالفلطور والالغ .

26799 - مُشْرَكَة

طائر صغير مديح كانه ثوب وشي (اللسان) .

26800 - مُشْرَطَة

Couleuvre à échelons (F).

هي الخفث الاشقر ، الحلبه .

26801 - مُشْرِف على الوَصِي

Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E).

هو الذي يقوم مقام الوصي على القاصر اذا تضاربت مصالحها، أما مهمته الاصلية فهي مراقبة اعمال الوصي .

26802 - مُشْرِفَة

Ecimeuse (F).

هي المصفة، آلة تحش الزرع عالياً غشية من الصمغان .

26803 - مُشْرُوب

Boisson (F).  
Drink, Beverage (E).

26804 - مُشْرُوج ، لَاشِغِي

Agame (F).  
Agamous (E).

26805 - مُشْرُوع ، تَصْنِيع

Projet (F).  
Project (E).

26806 - مُشْرُوعُ اسْتِيبَاقِي

Projet préalable (F).  
Previous project (E).

26807 - مُشْرُوعُ إِعْدَادِي

Avant-projet (F).  
Advance project (E).

26808 - مُشْرُوعُ الْعَقْد

Avant-contrat (F).  
Advance contract (E).

راجع عقد الوعد .

26809 - مُشْرُوعُ قَانُون

Projet de loi (F).  
Draft bill (E).

هو المشروع الذي تضعه الحكومة وتقدمه الى المجلس النيابي باسم رئيس الجمهورية ليقره ويصبح قانوناً .

26810 - مُشْرُوبات المتأخيرات ، سَنِيَّات المتأخيرات

Dentirostres (F). Sicklebill (E).

رقيقة من الطيور الجارم تشمل بعض الفصائل ، اشهرها الدغليات والذغريات والشحوريات والصدريات .

26811 - مُشْرِيات ، نَبَاتَات عَكَلِيَّة

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم بدني فطري أو ثلاثي . وهي عادمة الجذور والسوق والاوراق والازهار . اجناسها وانواعها تعد بضعه الاف تجمعها ثلاث شعب : البكتريات والخفيات والفطريات .

26812 - مُشَش

Suros (F). Splint, Tumour (E).


حلة تترى الخيل وهي تريدات في الرظيف .

26813 - مُشَط

Herse (F). Harrow (E).

اداة تستعمل لتمشيط التربة . وهي « شعبة من حديد او

- Actinales ٢٦٨١١ - مُشَعَّات  
رتبة من المرجانيات تشمل العديد من الفصائل والجناس  
والأنواع.
- Indicateur (F). ٢٦٨١٢ - مُشَعَّار °  
Indicator, Indicatory (E).
- Radiomètre (F). ٢٦٨١٣ - مُشَعَّاع  
Radiometer (E).  
المشاع جهاز يستعمل في قياس شدة اشعة النور .
- Compte-gouttes (F). ٢٦٨١٤ - مُشَعَّاف  
Dropper, Drop-tube (E).
- Terebellum (S). ٢٦٨١٥ - مُشَعَّبَة \*  
Térébelle, Tarière (F). Terebellum (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل  
وفصيلة الدلاعيات . أنواعها المعروفة عديدة ، بعضها من  
متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر  
منتشر في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي ||  
اصداؤها صاروخية الشكل ، مستطيلة الفرعة الثقيلة  
الانفراج . اجسامها صغيرة القد ، غروطية الاغظام  
المستطيلة .
- Fané (F). Faded (E). ٢٦٨١٦ - مُشَعَّون  
نمت تمرني توصف به الاعضاء النباتية الذابلة .
- Atelier, Local de travail (F). ٢٦٨١٧ - مُشَعَّول  
Work shop (E).  
هو المكان المد للشفل .
- Ænanthe (F). ٢٦٨١٨ - مُشَعَّيل  
هو الرازيانة ، نبات من الصبوانيات ، اطلها .
- Phellandre (F). ٢٦٨١٩ - مُشَعَّيل مَالِيّ  
اطلب رازيانة مالية .
- Pneumatique (F). ٢٦٨٢٠ - مُشَعَّاط °  
Pneumatic (E).
- Diaphanomètre (F). ٢٦٨٢١ - مُشَعَّاف °  
Diaphanometer (E).  
جهاز يمكن من درس وتحديد شفاف الاجسام والسوائل .
- Babine du chameau (F). ٢٦٨٢٢ - مُشَقَّر ، مُشَقَّر  
المشقر من البعير كالجملغة من الفرس . ج مشافر .
- ٢٦٨٢٣ - مُشَقَّ سمكة بحرية مشهورة باسم مدج .
- ٢٦٨٢٤ - مُشَقَّ مَبْدُول  
Notacanthé commun (F).  
سمكة بحرية تدعى مدج مبدول ، اطلها .
- ٢٦٨٢٥ - مُشَقَّ ، مُشَقَّر  
Teillage (F). Stripping (E).  
فصل المشاقة اي القشرة من سوق القنب والكتان وما  
اشبه .
- Ebroutage ٢٦٨٢٦ - مُشَقَّ ، مُشَقَّاق ، هَتَّ  
فصل ورق التوت عن الصاليج قبل تقديمه الى دود القز .
- Dérayure (F). Water-furrow (E). ٢٦٨٢٧ - مُشَقَّق  
منخفض يترك بين السكتين في الحراثة تسهيا لصرف  
المياه .
- Métacarpe (F). ٢٦٦٩٧ - مُشَطَّ الَيْدَة  
Metacarpus (E).
- Fissifolié (F). ٢٦٦٩٨ - مُشَطَّوَر التَّصَل  
Fissifoliat (E).  
نمت تعريف ي يطلق على كل نبات يحمل أوراقا نصالها  
مشطورة الأطراف .
- Diatomaceae (S). ٢٦٦٩٩ - مُشَطَّوَرَات  
Diatomacées (F). Diatomaceae (E).  
فصيلة من الئث السمر . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد  
جميعها نباتات مجهرية من وحيدات الخلية . تعيش في  
المياه المالحة والمذبة .
- Kigélie (F). ٢٦٨٠٠ - مُشَطَّوَرَة  
هي الكيجلية ، اطلها .
- Pinnal, Pinné (F). Pinnate (E). ٢٦٨٠١ - مُشَطَّي  
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط .
- Pectiné (F). Pectinate (E). ٢٦٨٠٢ - مُشَطَّي  
شكل من الزباني يشبه المشط .
- Ctenodonte (F). ٢٦٨٠٣ - مُشَطَّي الأَسْنَان  
Ctenodonte (E).  
من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالشط .
- Bipectiné (F). ٢٦٨٠٤ - مُشَطَّي مَزْدُوج  
Bipectinate (E).  
شكل من الزباني يشبه المشط المزدوج من جهتي الطول .
- Chromidae (S). ٢٦٨٠٥ - مُشَطَّيَات  
Chromidés (F). Chromidae (E).  
فصيلة اسماك من رتبة شالكاك الزعانف .
- Ctenophores (F). ٢٦٨٠٦ - مُشَطَّيَات  
Ctenophora (E).  
رتبة حيوانات دنيا من شعبة مجوفات البطن .
- ٢٦٨٠٧ - مُشَطَّيَات الخِيَّاشِيم  
Ctenobranches (F). Ctenobranches (E).  
رتبة من الرخويات مديات الاربيل امانيات الخياشيم .  
فصائلها واجناسها وأنواعها عديدة . جميعها وحيدة المشط  
الخيشوي والاذين والحقو . وجميعها أيضا يميَّنة الاعضاء  
لأن الاعضاء اليسارية المقابلة غامرة لا عمل لها .
- Rétribution (F). ٢٦٨٠٨ - مُشَقَّ °  
Remuneration, Reward (E).  
المشع عجالة تدفع اجرا او مكافأة لمن يقوم بعمل .  
فالمعاش والراتب والجزاء والشكر والانتداب والبللة والمالة  
والتعويض جميعها تعتبر من الامشاع .
- Radiomètre (F). ٢٦٨٠٩ - مُشَقَّ ، مُشَعَّاع  
Radiometer (E).  
مقياس شدة اشعة النور .
- Flustra (S). ٢٦٨١٠ - مُشَعَّاب °  
Flustrelle (F). Flustra (E).  
جنس حيوانات طحلبية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش  
على الفوقس .



مشعة

البصرة ، من الحافة . ازهارها خشوية كبيرة القد ، يضاف اللون ، وريدة المواج . ثمارها لحمية السوط ، لا قياسية الشكل ، خلية البصرة ، قصيرة الامن ، لذينة العلم ، مستحبة العرف والتكفة . صمغها بيضيه خشية مطيعة وبفلطحة تخضن ورزة جامدة للساب الابيض . وثمره المشمش لؤلؤ طازية ورطب وتجفف ويصنع من صمغها رب ناشف لدن جالسك الاجزاء صفيحي الشكل يدعى قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية .

مهدد :

قبل انه من نبوت العجم او ارمينيا وقد انتفخ اخيراً على انه من نبوت الصين لانهم عرفوه واستمروه منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد ، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالعجم فالعراق فارمينا فتركيا فالبلقان فايطاليا .

الليمه :

لو لم يكن المشمش من النباتات البكره الاقرار ولو لم يكن ازهاره يستحق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات المتدلة توافقه . لذلك فهو رطب في الاساكين الدافئة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الرياح الموسما .

تربسه :

ينمو ويجود في جميع الارربة ولا يألف من كثرة الحمى اما يحض شدة الالتصاق والرطوبة المستحكة || وهو من الاجنار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضر من الجفاف .

تكاثره :

يتكاثر بالبذر والتعلم . والتعلم يتم عادة بالرقعة ، معلوم وفي . اما الاجنار التي يحسن تغذيتها كاملها فهي اللوزي في الارربة الكلسية والخوخ في الارربة المنجبة والدرافق في الارربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمش الكلالي في سائر الارربة .

فروبه :

فروبه عديدة تقسم الى فئتين : فئة المشمش الكلالي وهو ما كانت بلوره مرة العلم غنية بالحامض السيانيدريكي وفئة المشمش اللوزي (المشور) وهو ما كانت بلوره مأكولة عادمة الحامض السيانيدريكي || اشتهر فروبه الوطنية ما يتبع :

- السوسي : ثمرته متوسطة القد قارشة . ساقها جوية اللون قليل التشقق . اوراقها عابقة الخضار صغيرة القد . ثمارها كبيرة الحجم غاربة الى الحمرة وهي لذينة العلم خافتة العرف والتكفة . بزورها حلوة مأكولة .

- البجلي : اثماره عديدة ، اشهرها المارودي والخشاني . ثمرته متوسطة القد كروية الشكل . ساقها جوية اللون عريقة الشقوق . فروعه منبسطة متراسة . اوراقها كبيرة القد زاهية الاخضرار . ثمارها كبيرة الحجم برتقالية اللون لذينة العلم يكثر استعمالها في التفوق . بزورها حلوة مأكولة .

- الحموي : له صرمان « البكير » و « اللقيس » ثمرته كبيرة القد ساقها مرء كثيرة الشقوق . اغصانها منبسطة متراسة . اوراقها زاهية الاخضرار . ثمارها متوسطة الحجم لذينة العلم ذكية العرف والتكفة لونها الى الصفرة الذهبية . بزورها حلوة العلم مأكولة .

- السنهالي : ثمرته كبيرة القد شائعة . ساقها كهاه اللون مرء المواج . اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة المتق

٢٦٨٢٨ - مُشَقَّاسِي ° Commensurable  
نمت تعريفه يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بقياس واحد مشترك .

٢٦٨٢٩ - مُشَقَّاسِيَّة ° Commensurabilité (F).  
Commensurability (E).  
امكان قياس كيتين او اكثر بقياس واحد .

٢٦٨٣٠ - مُشَقَّة Filasse (F). Tow (E).  
هي الشاقة أي ما خلص بالمشق من لحاء النباتات الليفية كالقنب والكتان .

٢٦٨٣١ - مُشَقَّن Scarificateur (F).  
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة .

٢٦٨٣٢ - مُشَقَّقُ الْجَنَاح Fissipenne (F).  
Fissipinna (E).  
نمت تعريفه يطلق على كل طائر مشقوق الجناح .

٢٦٨٣٣ - مُشَقَّقَاتُ الْأَرْجُل Schizopodes, Fissipèdes (E).  
رعية حيوانات من الفشريات .

٢٦٨٣٤ - مُشَقَّقَاتُ الْأُنْسَةِ Fissilingues  
رعية من الطغليات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسنبها المستطيلة المشققة الفارقة الاعادة .

٢٦٨٣٥ - مُشَقَّقَاتُ الْمَتَافِير Fissirostres (F).  
Fissirostrous (E).  
رعية من الطيور الجوانم .

٢٦٨٣٦ - مُشَكَاة Guirlande (F).  
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - مُشَكَاة Allotropique (F).  
Allotropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكاربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجكاري .

٢٦٨٣٨ - مُشَكَطَا Menthe aquatique (F).  
هو الفوتنج المائي ، اطلبه .

٢٦٨٣٩ - مُشَكَاة Fraisière (F).  
Strawberry-bed (E).  
قطعة ارض مفروسة شجلاً . ج مشاك .

٢٦٨٤٠ - مُشَلُوز هو المشمش اللوزي المحلول المخ . الواحدة مشلوزة .

٢٦٨٤١ - مُشْمَاس Hélioscope (F). Helioscope (E).  
منظار الشمس .

٢٦٨٤٢ - مُشْمَاسِي Hélioscopique (F).  
Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ - مُشْمِش \*  
Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echte Aprikose (D). Albicocco, Armeilini, Melico (I).  
شجرة صمرة من فصيلة الورديات . تلثم من ٧ الى ١٥ م . ساقها قصيرة . اغصانها وفروعه منبسطة . ثمرورها تكون في اول صيفها سلاخ ثم تتلفق مع مرور الزمن . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، منقطة ، قلبية الشكل . لصلها مالم



مشمش

**٢٦٨٥٣ - مِشْشِشِي**  
Hypogée (F).  
Hypogean, Hypogean (E).  
نمت تعريفي يطلق على البزور التي تستقر زباراتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تماكس بذلك البزور المربابية التي ترتفع زباراتها فوق سطح التربة .

**٢٦٨٥٤ - مَشْطُوط \* ، مَشْطُوط الغُرَاب**  
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Fullfern (D). Acrostico (I).  
جنس نباتات برية وزيينية من المرشخيات البسباجيات . انواعه المعروفة قليلة ، تربي في المناطق والمواقع الرطبة الظليلة . اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تحجبها لا يتعدى حدود الزايم الثالث . تشريحها مشاري الشكل ، مستدير السن .

**٢٦٨٥٥ - مِشْشِش**  
Etrape, Etrapiore (F).  
Small sickle (E).  
منجل خاص يستعمل في تشويل الجداول .

**٢٦٨٥٦ - مَشْبِطَة**  
Hétérosis (F). Heterosis (E).  
المشبات هو هجلا السب الاول اي السلالة الاول عندما يكون عظم القدر . وحيث ان صفات المشبات صفات اتفاقيه لا مستقرة ولا وراثية فهجلا السب الثاني لا يكون مشباطا لانه يرد الى صفات دحه وعده . ج. مشاييط .

**٢٦٨٥٧ - مِشْبِطَة**  
Hétérotique (F).  
Heterotic (E).  
نمت تعريفي يطلق على بعض العوامل او الصفات الميزية التي تقود الهجن الى الشباطة او التفوق الشياطي .

**٢٦٨٥٨ - مَشْبِطَاع**  
Diagmètre (F).  
Diagmeter (E).  
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية النقل الحراري في الاجسام .

**٢٦٨٥٩ - مَشْبِطَة**  
Allure (F). Carriage (E).  
طريقة سير أثيل وسائر الدواب كالخطوط والمطبعة والمطبخ والعدو .

**٢٦٨٦٠ - مَشْبِطَة**  
Musschia (S). Musschie (F).  
جنس نباتات زيبينية عشبية عشوشية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، مهدا حوض البحر المتوسط . سوقها متضبة فضاء . اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسنة الاطراف . نصلها رهلة مسترخية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها صفراء اللون او حراء تطول من ٤ الى ٥ سم . || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

**٢٦٨٦١ - مَشْبِطَة الفُطُر**  
Mycélium (F).  
Mycellum (E).  
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع نامية تعمل البوغ في الفطور . ج. امشاج .

**٢٦٨٦٢ - مَشْبِطَة**  
Plantain triomphe (F).  
هي لقمة النجمة ، اطلبا .

**٢٦٨٦٣ - مَشْبِطَة**  
Scandix (F).  
هي مشط الزهراء ، اطلبه .

باعتة الخضار . ثمارها الى الصفرة اللامعة وفي قرية الشبه من الحوي لكها دونه لذة وذكاء . بزورها حلوة مأكولة .  
**العصبي** : شجرتة كبيرة القد شاخعة . ساقها جذوية سرء كليلية التشقيق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضيه الصفحة ، كليلية القاعدة ، حيلة الخضار القائم . ثمارها كبيرة القد حيلة الشكل صفراء اللون خضراء الموانج لابلها جامد المكسر سكري العلم غالت العرف والنكهة .  
- الكلاي : الكلبسي : اصناما عديدة . اثماره شاخعة ، سوقها جذوية اللون متوسطة الخشونة والتشقيق . اغصانه منفردة . اوراقه كليلية مدببة المقص . نصلها قليل الاخضرار والزهرة . ثماره كروية الشكل صغيرة القد غزيرة المعصرة تستعمل في صناعة قر الدين . بزوره مرة العلم .  
- اللوزي ، المشلوز ، القيسي : شجرتة متوسطة القد فارشة ، اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كروية الشكل متوسطة القد حيلة اللون الابيض تشوبه حرة وريدة . لابلها غزير المعصرة لذيق العلم ذكي العرف والنكهة . بزورها حلوة مأكولة .



مشطلة مبدولة

**٢٦٨٤٤ - مِشْشِش اليابان**  
Kaki (F).  
هو الكاكي ، اطلبه .

**٢٦٨٤٥ - مِشْشِش اَمْرِيكَة**  
Mammée d'Amérique  
شجرة مشمرة مشهورة باسم جيباس امريكة ، اطلبا .

**٢٦٨٤٦ - مِشْشِشَة**  
Abricot (F). Apricot (E).  
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتامينات .

**٢٦٨٤٧ - مِشْشِشَة**  
Mespilus (S). Néflier (F).  
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرسة . اوراقها عابلة متفكة اهليجية ، نصلها يارز العروق عشن الملسس خلي البشرة . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون . ثمارها كيار الاكيدنيا لكها اصفر حجما واقل سذقا ، لوها الى السرة الكستنية || اشهر انواعها المشطلة المبدولة .

**٢٦٨٤٨ - مِشْشِشَة مَبْدُولَة \* ، زُغُرُور جِرْمَانِي**  
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Merlier, Nèle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespolo (I).  
نوع من المشطلة في شجيرة زراعية تملو من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها سرسة . اوراقها اهليجية مستطيلة ، نصلها يارز العروق ، خلي البشرة ، اطحل اللون . ازهارها كبيرة القد تطول نحو ٤ سم . ثمارها كستنية اللون شديدة الحموضة الحامضة تؤكل بعد تمام قبورها .

**٢٦٨٤٩ - مِشْشِشَة يَابَانِيَة**  
Néflier du Japon (F).  
هي الاكيدنيا ، اطلبا .

**٢٦٨٥٠ - مَشْن**  
المشن هي الجلدوش او الخشوش التي ينسبها البرد في الثار والاوراق || الثار المششونة هي الثار التي عليها البرد .

**٢٦٨٥١ - مَشْن**  
مشن البقرة والناقة : حلب ما في ضرعها .

**٢٦٨٥٢ - مَشْنَق \***  
Local de pente (F).  
هو المشنوق المند لتشنيك مشاكيك التبغ او خيوطه ريبا يعين وقت التصفيط والرزم .



مشن



مشط



٢٦٨٧٥ - **مُصَاعَة**  
Plantain majeur (F).  
هي لسان الحمل الكبير . ج. مصاص .

٢٦٨٧٦ - **مُصَاعَة صَغِيرَة**  
Plantain moyen (F).  
هي لسان الحمل المتوسط ، اطبله .

٢٦٨٧٧ - **مُصَاع ٥**  
Pleospora (S).  
جنس فطور مجهرية من السخانيات وفصيلة السخانيات . تتميز بأصنافها البسيطة التي تبتدئ غائرة في نسيج النبات المتناحر ثم تظهر منتصبة ملطاة . يوهنا يبيض الشكل ملون تفصله الوثائر المستمرجة المستطيلة || أنواعه عديدة أعرفها ساً يتبع .

٢٦٨٧٨ - **مُصَاع البُرْتُقَال ٥**  
Pleospora hesperidearum, Macrosporium hesperidearum, Sporodensium piriforme (S). Noir de l'orange, Nebbia (F).

فطر مجهرى يصيب ثمار البرتقال فيعطيلها || مظهره الخارجي يقع خلية تيلو باعثة اللان ثم تملأ الى السرة والسوار تركب الثمار فتجفئ قشورها وتصلب كالسفن . وهو على نمل الاوراق نكت سمر كالنمش || يكافح باستعمال احد الفواطير الفعالة .

٢٦٨٧٩ - **مُصَاع البُقُول ٥**

Pleospora herbarum, Stemphylium botryosum, Macrosporium commune, M. parasiticum, M. allorum (S).

فطر مجهرى يؤذي العديد من البقول ، نحو : ه . لوباء ، منها بعض النباتات القرنية والصلبية والسيوانية ، تركب يصيب البندورة وورق الشاي وثمار الحمضيات الخضرية || مظهره الخارجي نكت سمر كثيفة تملأ نمل الاوراق فتؤذيها وتؤثم الثمار المخنوقة تسبب الحفن الاسود الذي يقضي عليها || يكافح باستعمال الفواطير المايده .

٢٦٨٨٠ - **مُصَاع التفاح ٥**

Pleospora mali, Hendersonia mali (S).  
فطر مجهرى يصيب اوراق التفاح يؤذيها || مظهره الخارجي يقع سمر مهدبة الاطراف البنفسجية تركب نمل اوراق التفاح فتعطيل وتحمه عن القيام بعمله الحيوي على الوجه الاكل || يكافح ان طلى ، غوفاً من قفاه شرة ، باستعمال احد الفواطير وانحاصها سائل يورد .

٢٦٨٨١ - **مُصَاع الجوتون ٥**

Pleospora hyacinthi, Cladosporium fasciculare (S).  
فطر مجهرى يصيب الجوتون على اختلاف انواعه فيعطيل وقد يصيب جفافه || مظهره الخارجي يقع مستديرة لونها الى الجؤوة يطولوا وشاح من الخمل الاسمر تركب اسفاد البصل الخارجية || أضراره قاعده اذا لامته العوامل الجوية ورطوبة التربة لانه يسبب اتحاد الخلايا ومغنيا . يكافح باقتلاع البصل عند ادراكه وبصره فليس مدة من الزمن ، خارج المكان الموبوء ، قبل حبه ونزعه .

٢٦٨٨٢ - **مُصَاع الحشخاش ٥**

Pleospora papaveracea, Helminthosporium papaveris, Dendryphium penicillatum (S). Helminthosporiose de Poëillette (F).

فطر مجهرى يصيب الحشخاش يؤذي وقد يسبب يلباسه . مظهره الخارجي يكون على الشتول الحديثة العهد يقع سمر تركب سنج السوق فتذبلها وتقضي على النبات . ويكون على الشتول البالغة يقع حنطية تركب نمل الاوراق تسبب

٢٦٨٦٤ - **مُشَيْك ٥** Brunia (S). Brunnie (F).

الواحدة مشيكة ، جنس نباتات جنينية برية وتزيينية من فصيلة المشيكيات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اما ضروبه التزيينية فعديدة . سورها منتصبة معتدلة التفنيد . اوراقها متعاقبة ، صفيرة النصال . ازهارها خاصة التركيب ، عديدة الالوان ، يكثر فيها الازرق والاصفر والوردي .

٢٦٨٦٥ - **مُشَيْكِيَّات ٥** Bruniaceae (S).

Bruniaceae (F). Bruniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتئين عديدة العائلات . اجناسها واثوعها المعروفة متوسطة العدد ، منها بعض اصقاع افريقية الجنوبية || جميعها جنبات معمة . سورها فراء . اوراقها متعاقبة شكلية . نصالها خلية البشرة . ازهارها خاصة التركيب . بزورها صغيرة تكثر فيها الاستدارة || اشهر اجناسها المشك .

٢٦٨٦٦ - **مُشَيْمِيَّات ٥** Placentaires (F).

Placentalia (E).

شعبة من صف الفرصيات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد تجتمع الى ١٢ رتبة : الدرد والطحيات ومفردات الاصابع وبزودجات الاصابع والخرطوبيات والقوقام والخريرات والزمعشقيات الاقدام واللوامح ومجنحات الاليدى والليوريات والزليسات .

٢٦٨٦٧ - **مُشَيْمَة** Placenta, Arrière-faix (F).

Placenta (E).

الجيب الغشائي الذي يتكون فيه الجنين داخل الرحم ويخرج معه عند الوضع .

٢٦٨٦٨ - **مُشَيْمَة** Choroid (F). Choroid (E).

غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية .

٢٦٨٦٩ - **مُص ٥** Exsuction, Exsuction (F).

Sucking up or out (E).

٢٦٨٧٠ - **مُصَاع**

نبت له قشور كالبصل فيها فوق بعض كلما قشرت امصوخة ظهرت اخرى (اللسان) .

٢٦٨٧١ - **مُصَادَرَة** Confiscation

مقوينة موضعها استعفاء مال المحكوم واستيلاء الحكومة عليه .

٢٦٨٧٢ - **مُصَارِف كَيْدِيَة**

Frais frustratoires (F). Frustratory expenses (E).  
هي التي تنفق دون وجه في الدعوى فتبقى على عائق متفقا .

٢٦٨٧٣ - **مُصَاص ٥** Glossophaga (S).

Glossophaga, Mange-langue (F).

جنس خفافيش من فصيلة اللورقيات . انواعه عديدة ، موطنها البلاد الحارة . انوثها الى السرة الفاحة . اجناسها صغيرة اللد . فراطبيها مستطيلة ، ضيقة ، ذلقة . ألبنها فائقة الطول منتفخة سلسلة عجليات خيطية منتفخة الى الزواء || تميش منفردة . ذكورها تقرب اناتها عند الكرم . تألت تجاريد الاجار وأواب الصخور . مسرجها يدوم طوال الليل . قوتها الحشرات والحلازين .

٢٦٨٧٤ - **مُصَاصَة ٥** Absorptivité (F).

Absorptiveness, Absorptivity (E).

هي قوة الانصصاص .



مصاص



مصاع البرتقال



مصاع البقول



مصاع التفاح



مصاع الجوتون

٢٦٨٩٣ - **مَصَّت**  
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج ما فيه .

٢٦٨٩٤ - **مَصْح ، مَصُوح** ، Virescence (F).  
هو التبدل الطارئ في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - **مَصْحَقَاتُ القَشَار** ، Placophores (F).  
رتبة من الرخويات اصدانها مصقفة القشار . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - **مَصْحَر** ، Saxatile  
نمت تعريتي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور وفي الحاجر .

٢٦٨٩٧ - **مَصْد**  
المصد والمصاد : الحفصة العالية ، وقيل اهل الجبال .

٢٦٨٩٨ - **مَصْدَر ، مَصْنَع ، مَصْنَأ**  
Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - **مَصْرَاب** ، Lacto-fermentateur (F).  
جهاز يستعمل في قياس حموضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - **مَصْرَاد** ، Frileux (F).  
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - **مَصْرَاع** ، Valve (F). Valve, Clack (E).  
احد اجزاء الغلاف الثري في الثآليل المفتحة .

٢٦٩٠٢ - **مَصْرَاعِي** ، Valvulaire (F). Valvular (E).  
٢٦٩٠٣ - **مَصْرَد**

Claie à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wattle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).  
غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - **مَصْرِف** ، Drain, Bardeau (F).  
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).  
مسيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية عقب ردها ، وقد شاع استعمال انابيب الأجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالبرب . والمصارب تنتهي بالمشيرة .

٢٦٩٠٥ - **مَصْرَف ، بَنْك** ، Banque (F). Bank (E).  
هو كل محل انشئ للتجارة بالنقد او الأوراق ذات البدل المالي .

٢٦٩٠٦ - **مَصْرَف الإصدار**  
Banque d'émission (F). Issuing house (E).  
هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار أوراق النقد من الحكومة .

٢٦٩٠٧ - **مَصْرَف زراعي ، بَنْك زراعي**  
Banque agricole (F). Agricultural bank (E).  
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعية بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - **مَصْرَف عَقَارِي ، بَنْك عَقَارِي**  
Crédit foncier (F). Loan society (E).  
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن العقار .

جفاف التسج || يكافح بتطهير البذار بمادة الفورمول المركز ٢٥ .. ١ / او تعقيراً بأحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - **مَصَاعُ الشُّونْدَر** \*  
Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).  
فطر مجهري يصيب أوراق الشوندر فيؤذيها ويسبب ذبولاً .

مظهره الخارجي يقع سفيرة مستديرة حنطية اللون ، تركب الاوراق فتسبب جفاف التسج يعقبه الذبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير المعتدلة المنصر للفعالة .

٢٦٨٨٤ - **مَصَاعُ العَفَن**  
Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).  
فطر مجهري يركب أوراق الشوندر في اواخر عهدها اي قبيل الاتلاع بمدة وجيزة || مظهره الخارجي يقع مهدبة لا قياسية يملؤها خل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل لا يفوتها منه الا العنق والزمار الاول || اغزاره زعيدة الا اذا استحسك في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال احد الفوطاير العادية المتوسطة المادة الفعالة .

٢٦٨٨٥ - **مَصَاعُ الهَنْدِيَاء**  
Pleospora albicans, Phoma albicans (S).  
فطر مجهري يركب هازر الهندباء فيؤذيها ويسبب انحلاص اغزارها وقتدها || مظهره الخارجي يقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصهبة ، اطرافها المهدب ينحرف من الحنطى الى الاسود وعند وصولها الى هذا الطور يذولها في وسطها شحمة خلية بيضاء . تركب نصل الاوراق وسويقات الازهار || يكافح عند ظهوره على الاوراق باستعمال احد الفوطاير العادية المعتدلة المنصر للفعالة .

٢٦٨٨٦ - **مِصَاعَة** ، Botryomycose (F).  
Botryomycosis (E).

المصاعة مرض جلدي يمتري الحيوان . مظهره الخارجي دمل صفيرة ممتقة شبيهة بالمصع تسببها بعض الميكروبات اخصها الكروية .

٢٦٨٨٧ - **مِصَالَة** ، Sérologie (F). Serology (E).  
هي درس الامصال وغوامسها المختلفة وانفعالاتها ونتائجها .

٢٦٨٨٨ - **مِصَالَة ، مِصَل** ، Petit lait (F). Whey (E).  
الماء الذي يخرج من الحليب المجبن عند اصطناع الجبن .

٢٦٨٨٩ - **مِصَالَة ، تَسْوِيفَة** ، Transaction  
هو الاتفاق الذي يقدّمه المتنازعون ليفسروا به نزاعاً قائماً او متوقفاً بظول كل منهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - **مِصَالِي** ، Sérologique (F). Serologic (E).  
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - **مِصَان** ، Canne à sucre (F).  
هو قصب السكر ، اطلبه .

٢٦٨٩٢ - **مِصْبَة ، مِغْوَر** ، Embouchure (F).  
Embouchure, Mouth (E).  
ملقى مياه الانهر بالبحر .



مَصَاعُ الشُّونْدَر

Laminoir (F). ٢٦٩٢٦ - مُصَفَّاح ٥

Flattening-mill, Rolling-mill (E).  
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .

Dolichocephale (F). ٢٦٩٢٧ - مُصَفَّح الرَّأْس

Dolichocephalic (E).  
نمت تصنيفي يميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الأهلية كالإبقار والأغنام .

Conchacé (F). ٢٦٩٢٨ - مُصَفَّد

نمت تمريني يطلق على الإصداق الثنائية المصراع .

Courbine (F). ٢٦٩٢٩ - مُصَفَّار ، مُصَفَّار

سكة بحرية تدعى لوت المتوسط ، أطلها .

Sérum (F). Serum (E). ٢٦٩٣٠ - مُصَلِّ

Petit lait (F). ٢٦٩٣١ - مُصَلِّ

هو المصالة ، أطلها .

Tuberculin (F). Tuberculin (E). ٢٦٩٣٢ - مُصَلِّ السِّلِّ ، لَنْفَاكُوسُ

مصل كاشف تحقن به الإبقار للتيفن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسل البقري .

Bec-croisé (F). ٢٦٩٣٣ - مُصَلَّب

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، أطله .

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E). ٢٦٩٣٤ - مُصَلِّحات زراعية

هي التي تصلح التربة بزيادة غصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد العضوي والغضري والمعدني والإسقاء والعرف والتربيل والتدليل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). ٢٦٩٣٥ - مُصَلِّحة

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه إذا هو زائل حقا أو أقام دعوى .

Service des haras, S. de remonte ٢٦٩٣٦ - مُصَلِّحة الخيول ، مُصَلِّحة الخيول

دائرة حكومية تابعة للبطاية البيطرية في وزارة الزراعة تعني بشؤون خيل النزو .

Plein (F). Full (E). ٢٦٩٣٧ - مُصَنَّت ، مُلْتَكِّ

نمت وصفي يطلق على ما لا يوفى له كالقرن مثلاً .

Cervicornes (F). ٢٦٩٣٨ - مُصَنَّات القُرُون

فئة من الحيوانات ، قرنها مصمتة غير مجوفة كالأيل .

Gummifère (F). ٢٦٩٣٩ - مُصَنَّع

Gummiferous (E).  
ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصطنعه .

Réservoir (F). Reservoir (E). ٢٦٩٤٠ - مُصَنِّع

خوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضاً باسم حاووز .

Cynomoir (F). ٢٦٩٤١ - مُصَرَّر

هو الطروث ، أطله .

Cynomoriées (F). ٢٦٩٤٠ - مُصَرَّرَات

سبط من الطروثيات يشمل بعض الأجناس والأنواع .

Dépense (F). Expenditure (E). ٢٦٩٤١ - مُصَرَّرُف

هو المال المنقوع .

Faux frais, Menus frais (F). Incidental expenses, Petty expenses (E). ٢٦٩٤٢ - مُصَرَّرُفَات ثَرَوِيَّة

نماء من زجاج ، يلحف أو يستر عند الحاجة ، تستثبت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .

Serre (F). ٢٦٩٤٣ - مُصَرَّرِي \* ، وَام

Greenhouse (E).  
بناء من زجاج ، يلحف أو يستر عند الحاجة ، تستثبت فيه نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل البرد .

Serre froide (F). ٢٦٩٤٤ - مُصَرَّرِي بَارِدَة

Conservatory (E).  
هي التي يكنى فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .

Serre chaude (F). ٢٦٩٤٥ - مُصَرَّرِي حَارَة

Hot-house (E).  
هي التي تستعمل حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح معدلها من ٢٤ إلى ٢٨ في زين البرد والشتاء .

Trieur (F). ٢٦٩٤٦ - مُصَفِّغِيَّة ، فَرَاة

Sorting-machine (E).  
آلة تفرق الفلك عن الحب والحب عن بعضه بعض بالنسبة إلى حجمه .

Lentisque (F). ٢٦٩٤٧ - مُصَفِّكَة

هو البطم الشرقي ، أطله .

Mûre de ronce (F). ٢٦٩٤٨ - مُصَفَّة ، مُصَفَّة

Blackberry (E).  
ثمرة المليق وأنباعه من عوج وغيره وهي حمراء اللون تؤكل .

Anode ٢٦٩٤٩ - مُصَفَّد ، أَنْوْدَة

هو لاجب التيار الإيجابي في المفلط .

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E). ٢٦٩٥٠ - مُصَفَّد

جهاز يستعمل في رفع الأشخاص والأثقال .

Sublimé (F). Sublimate (E). ٢٦٩٥١ - مُصَفَّد

Paratonnerre (F). ٢٦٩٥٢ - مُصَفِّة

Lightning-conductor (E).  
رابع دافع الصاعقة .

Liqudateur (F). Liquidator (E). ٢٦٩٥٣ - مُصَفِّ

من تناط به أعمال التصفية .

Raffinerie (F). Refinery (E). ٢٦٩٥٤ - مُصَفِّاة

معمل مجهز بالمادة اللازمة للتصفية .

Filtre (F). Filter (E). ٢٦٩٥٥ - مُصَفِّاة ، رَاشِح

أداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من خزف أو رمل أو ناعم الخ ...



مصري

## ٢٦٩٥٢ - مَصَامَة أَمْرِيكِي

*Evonymus americana* (S). *Fusain d'Amérique* (F).  
نوع من المصامات، جنته صغيرة القند تملو من ١٠٠  
الى ٢٠٠ سم. فروعه منتصبة مائلة. أوراقها عابلة  
تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣، نصلها  
خلى الصفحة السفلى عادم التنين. أزهارها وردية اللون  
رباعية البتلات، حقايق مستديرة جوزية اللون رباعية  
الفلق || أزهارها يستمر طول شهر حزيران .

## ٢٦٩٥٣ - مَصَامَة عَرَبِيَّ الصَّق

*Evonymus latifolia* (S). *Fusain à larges feuilles* (F).  
نوع من المصامات المبلول، جنته تملو من ٢ الى ٥  
امتار. فروعه مائلة. أوراقها عابلة تطول من ٨ الى  
١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامد الصفحة،  
سمن الحافة. أزهارها خماسية البتلات الأحمر. حقايقها  
قمرية خماسية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى  
حزيران .

## ٢٦٩٥٤ - مَصَامَة قَرْم

*Evonymus nana* (S). *Fusain nain* (F).  
نوع من المصامات، جنته صغيرة القند مشوة تملو من  
٥٠ الى ٨٠ سم. فروعه مجذارية مستقيمة. أوراقها  
عابلة متبادلة سنائية، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم.  
ويعرض نحو ١. أزهارها رباعية البتلات والاسدية، ثلاثية  
التجميع لوها الى الحفرة الحمراء المواج. حقايقها وردية  
اللون رباعية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران.

## ٢٦٩٥٥ - مَصَامَة مَبْدُول \*، مَصَامَة أُرْبُي

*Evonymus vulgaris*, *E. europaeus* (S). *Fusain commun*, *F. d'Europe*, *Bonnet de prêtre*, *Bois à lardoir* (F).  
نوع من المصامات المبلول، يجيرته تملو من ٣ الى ٦ امتار.  
فروعه رباعية التصلب مائلة. أوراقها عابلة سنائية  
تطول من ٧ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤، نصلها  
مالس الصفحة الجامدة، سمن الحافة. أزهارها الى الحصار  
الاصفر. حقايقها رباعية الفلق الأحمر. بزورها وردية.  
أزهارها يستمر من نيسان الى أيار .

## ٢٦٩٥٦ - مَصَامَة مَجْدَار

*Evonymus radicans* (S). *Fusain radican* (F).  
نوع من المصامات، جنته مشوة صغيرة القند. ساقها مجذارية.  
فروعه دقيقة مجرية اللون. أوراقها أبيضه تطول نحو ٥ سم.  
وتعرض نحو ٢، نصلها جامد الصفحة المستجة بالايض  
الوردي. أزهارها رباعية البتلات والاسدية، زيتية اللون،  
حقايقها وردية رباعية الفلق || أزهارها يستمر من  
حزيران الى آب .

## ٢٦٩٥٧ - مَصَامَة يَابَانِي \*

*Evonymus japonica* (S). *Fusain du Japon* (F).  
نوع من المصامات، يجيرته منتصبة تملو من ٣ الى ٨ امتار.  
فروعه مفصلة خضر اللحاء. أوراقها أبيضه تطول من ٧  
الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦، نصلها جامد الصفحة  
المستجة والمزركشة بالايض والاصفر. أزهارها رباعية  
البتلات والاسدية لوها الى الحصار الفسفي. حقايقها حر  
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٦٩٥٨ - مَصَامَة ٥

*Intégration* (F). *Integration* (E).  
المصامات الحلق شيء بأخر لإتمامه أو لإتمام كماله .

## ٢٦٩٤١ - مَصْنُوعَةٌ ٥

*Sépiophores* (F).  
المصنوعة والمصنوعات فئة من الرغويات ثنائيات الخياشيم،  
عشاريات الأرجل، مجهزة بصنخ كالحبائر وأمثاله .

## ٢٦٩٤٢ - مِصْنَر

*Haut-fourneau* (F).  
*Blast-furnace* (E).  
موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتذويب الحديد  
تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

## ٢٦٩٤٣ - مَصُونَات

*Sonomètre* (F). *Sonometer* (E).  
جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

## ٢٦٩٤٤ - مَصُوح

*Virescence* (F).  
هو المصح، التبديل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي.

## ٢٦٩٤٥ - مَصَادَ الحَيَوِيَّة، مُرْد، أَنتِيْبِيَوِي

*Antibiotique* (F). *Antibiotic* (E).  
مادة ينتجها كائن معيّن تمارض نحو غيره من الكائنات ||  
المضادات الحيوية المعروفة حتى الآن تقسم الى فئتين :  
- فئة الفنجيات كالبنيسلين والستريبتوميسين والتتراسيكلين.  
- وفئة البكتيريات كالتيوتريسين والبايسيتراين .

## ٢٦٩٤٦ - مَصَادَ السَّكَّال

*Béchique* (F). *Bechic* (E).  
٢٦٩٤٧ - مَصَارَغة ٥

*Polygamie* (F). *Polygamy* (E).  
المفارقة تعدد الزوجات عند الرجل .

## ٢٦٩٤٨ - مَصَام

*Eau saumâtre* (F).  
*Brackish water* (E).  
المصام : الماء لا يطلق ملوحة وضده القطيع وهو الصائي  
الزلال .

## ٢٦٩٤٩ - مَصَام

*Evonymus* (S).  
*Fusain* (F). *Spindle tree* (E). *Spindelbaum*, *Pflaenhütchen* (D). *Fusano*, *Evonimo* (I).  
جنس اشجار وجنات برية وتربيتية من فصيلة القاتيات.  
انواعه عديدة، اعطائها فسيحة الاربعاء تشمل الشرق  
والغرب وامريكا. أوراقها متبادلة منفعة كاملة مرطاب.  
أزهارها عذكوكة التجميع ابطية الارتكاز. ثمارها جرداء  
مستديرة مفصصة. بزورها مرة الطعم مقية وسهلة  
اختياها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال  
الصائي. فحمها يستعمل في التصوير وفي صناعة  
البابرد || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

## ٢٦٩٥٠ - مَصَامَة أَسَد \*

*Evonymus atropurpurea* (S). *Fusain noir* (F).  
نوع من المصامات، يجيرته تملو من ١٢ الى ٧ امتار. فروعه  
مائلة. أوراقها عابلة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦.  
نصلها سمن الحافة خلى الصفحة السفلى. أزهارها رباعية  
البتلات الازرقاوية. سقايقها الى الجوزة السوداء المواج.  
أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٦٩٥١ - مَصَامَة أَكْتَلَت

*Evonymus verrucosa* (S). *Fusain verruqueux* (F).  
نوع من المصامات، جنته تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.  
فروعه ثملوية اللحاء. أوراقها عابلة بيضيه ذرية، نصلها  
سمن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣. أزهارها  
جوزية اللون رباعية البتلات. ثمارها رتقالية اللون،  
رباعية الفلق || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .



مَصَامَة أَسَد



مَصَامَة مَبْدُول



مَصَامَة يَابَانِي

Embryon humain (F). **مُضَيِّع** ٢٦٩٧٣  
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية.

Embryonnaire (F). **مُضَيِّع، جَنِينِي** ٢٦٩٧٤  
Embryonic (E).  
نمت تعريفي يطلق عل ما هو مختص بالصفحة أو الجنين.

Polygone (F). **مُضَلِّع** ٢٦٩٧٥  
Polygon (E).

**مُضَلِّع دائري، مُضَلِّع مستدير** ٢٦٩٧٦  
Polygone circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلِّع رُباعي** ٢٦٩٧٧  
Quadrilateral (E). شبه مربع رباعي اضلاع.

Polygone régulier (F). **مُضَلِّع مُنْتَظِم** ٢٦٩٧٨  
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضْمَر** ٢٦٩٧٩  
Horsemanship (E). اليلدان المد لتفسير الخيل.

**مُضْمَمَة** ٢٦٩٨٠  
صوت الحية من لسانها.

Acescence, Plaque (F). **مُضَوْر** ٢٦٩٨١  
Acescence (E).

Photomètre (F). **مُضَيِّع** ٢٦٩٨٢  
Photometer (E).  
جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته.

Entomophyte (F). **مُضَيِّع** ٢٦٩٨٣  
Entomophyte (E).  
نمت تعريفي يطلق عل كل نبات من غقيات الولىع  
تنظلل عليه الحشرات.

Hampe (F). **مُطَا** ٢٦٩٨٤  
Stem, Flower-stalk (E). المطا هو السراخ. مشناه مطوان. ج. أمطاء.

**مُطَاَرَة** ٢٦٩٨٥  
الارض الكثرية الطير.

Caoutchouc (F). **مُطَاَط** ٢٦٩٨٦

Phanérogames parasites (F). **مُطَالِيل** ٢٦٩٨٧  
Entomophyte (E). هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجعفل والكشوث.

Fins (F). **مُطَالِب** ٢٦٩٨٨  
راجع اغراض.

Réclamation (F). **مُطَالِبَة** ٢٦٩٨٩  
Complaint, Request, Claim (E).  
الالتاس او الادعاء باقرار حق او حالة.

Revendication (F). **مُطَالِبَة** ٢٦٩٩٠  
Claiming (E).

رفع دعوى يطلب رافها الاعتراف بل حق الملكية عل  
مال معين.

Plastique (F). **مُطَاوَع، مُطَيِّع** ٢٦٩٩١  
Plastic (E). هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل.

Pompe (F). **مِصْحَة** ٢٦٩٩١  
Pump (E). آلة تستعمل في رفع او دفر المياه والسوائل وقد تكون يدوية  
او محركه. أما اشكالها فثلاثة وهي:

**مِصْحَة دافعة** ٢٦٩٩٢  
Pompe foulante (F). Force-pump (E).

**مِصْحَة رافعة** ٢٦٩٩٣  
Pompe aspirante (F). Suction-pump (E).

**مِصْحَة رافعة ودافعة** ٢٦٩٩٤  
Pompe aspirante foulante (F).  
Suction-force pump (E).

Acescence (F). **مِصْفَر** ٢٦٩٩٥  
Acescence, Acidifying (E). ابتداء الحموضة في كل مادة.

Piqué (F). **مِصْفَر، مِصْفَرِي** ٢٦٩٩٦  
Sour (E). ما كانت فسلته الحموضة من خر وجعة وما اشبه.

Harpagus (S). **مِصْرَح \*** ٢٦٩٩٧

Diodon, Harpagus (F).  
جنس طير من عارة البراة وفصيلة الصفريات. انواعه  
قليلة جميعها ريشة الفراء صغيرة القد. اثوابها موشية تلب  
فيها الجؤوة الخطية الملوّج. بطونها غير نمره. ازوارها  
بيض. اوصافها سر. || موطنها الغابات الكثيفة. تعيش  
منفردة، قوتها القوام والمصاير والحشرات. تدن في  
الانجار الرفيعة، اناثها تحضن من ٣ الى ٥ زفئات مدة  
٤ اسابيع.

Pyromètre (F). **مِصْرَم \*** ٢٦٩٩٨  
Pyrometer (E). جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية.

Multiplcande (F). **مِصْرُوب يه** ٢٦٩٩٩  
Multiplcand (E).

Multiplcateur (F). **مِصْرُوب يه** ٢٦٩٩٥  
Multiplier, Multiplying (E).

Factorielle (F). **مِصْرُوب كذا** ٢٦٩٩٦  
Factorial (E).

Himanthalia (S). **مِصْرُوعَة** ٢٦٩٩٧  
Himanthalia (F). Himanthalia (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السر. انواعها المعروفة  
قليلة العدد اعطائها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة  
الحرارة || كلالها شديدة القصر. قواضعها قدسية الشكل  
ينشب في قمرها غصة من السيور الفرقة يراوح طولها من  
متر الى ثلاثة امتار.

Diplostème (F). **مِصْغَف** ٢٦٩٩٨  
نمت تعريفي يطلق عل كل عليل او جش يكون عدد  
اسديته صنف عدد التمايلات او الفصل.

Narcisse tazette (F). **مِصْغَف** ٢٦٩٩٩  
هو الترجس الشرقي، اطليه.

Mastication **مِصْغ** ٢٦٩٩٠

Chiquer (F). **مِصْغ التبن** ٢٦٩٩١

To chew tobacco (E).

Compresseur (F). **مِصْغَاط** ٢٦٩٩٢  
Compressor (E).

اسم يطلق عل مختلف الاجهزة الضاغطة اخصها المألمات  
ومضاطيط الغاز.



مصرح



مصرم

Tourbière (F). ٢٧٠٠٣ - مِطْبَية \*

Peat-bog, Peat-moss (E).

هي التربة ، منجم التراب العضوي .

Gaufrier (F). ٢٧٠٠٤ - مِطْبَية \*

Waffle-iron (E).

جهاز مدني كاس يصطنع رقائق الشمع الممدة لتجهيز القدير اي خلية النحل .

Pluvial (F). ٢٧٠٠٥ - مِطْرِي ، شَتْوِي

Pluvial, Rainy (E).

Porte-grefre, Sujet (F). Stock (E). ٢٧٠٠٦ - مِطْعَم

الاصل الذي يركب فيه الطعم او الاصل الذي يفرس في الارض .

Pantogrefre (F). ٢٧٠٠٧ - مِطْعَمَة

اداة للتطعيم تطعم بضعة قصبان في آن واحد .

Billot à patée (F). Clog (E). ٢٧٠٠٨ - مِطْعَمِيَة

Greffon (F). Graft (E). ٢٧٠٠٩ - مِطْعُوم

هو الطعم ، اطلبه .

Parasite (F). ٢٧٠١٠ - مِطْفَال \*

Parasite, Hanger-on (E).

نعت تمريني يطلق على كل نبات يعيش طفلياً على غيره من النباتات .

Argillière (F). Clay-pit (E). ٢٧٠١١ - مِطْفَلَة \*

المقع الذي يستخرج منه الطفل اي الصلصال .

Diplodia (S). ٢٧٠١٢ - مِطْق \*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . يكتشفاته فردية كروية تنشأ محفوفة ثم ترقى وتثرف . جوفها سميك الغلاف ، حنطلي اللون يملو مق صغير . غلبتها ثنائية ، سنطية اهلبيجية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبتها ثنائية ، عنقوة الوثيرة الفاصلة || انواعه قليلة ، جميعها مؤذية ، اعرفها .

Diplodia griffoni (S). ٢٧٠١٣ - مِطْق الاجاص \*

فطر مجهري يركب اغصان وانفساد الاجاص والتفاح فيعطبها ويهبطها || مظهره الخارجي بشور كثيفة التصبغ تركب اللحاء فتصدع البشرة بعد ان تقرر الادمه وتشوهها . يكالغ بقطعاق الاغصان الموصوبة وبظهور الجروح مع العلم ان هذا الفطر يتعدى على الانجبار الضعيفة دون سواها .

٢٧٠١٤ - مِطْق الدَّرَّة الصَّفراء \*

Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche des épis (F).

فطر مجهري يصيب الدرة الصفراء في سبوتها ومطروها وعصفها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الحجم والشكل حراء اللون سريمة الاتساع تركب المصف فتؤذيه . وهو في السبال والامطار مشيج اغبر اللون ثم يتحول الى السمرة فيبدو كالعفن الاسود الجاف || يكالغ بتطهر البذار بواسطة املاح الزئبق . ومن المستحسن اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدرة في الاثربة المويومة نحو ثلاث سنوات .

Dame (F). Dam (E). ٢٦٩٩٢ - مِطْبَة

اداة من خشب او حديد تضرب بها الارض لترس .

Plecoptera (S). ٢٦٩٩٣ - مِطْبَقَة الأجنحة

Plécoptères (F). Plecoptera (E).

هي اللؤلؤيات ، رتبة من الحشرات ، اطلبها .

٢٦٩٩٤ - مِطْبَحَة

المطبخ هي مؤخر ظلف الشاة وقيل هنة كالفلكة في رجلها تسبح بها الارض .

Minoterie (F). ٢٦٩٩٥ - مِطْبَحَة

Flour-mill, Flour-store (E).

البناء الملد لمصنع الطحين وهو يحوي جميع اجهزة الطحن ومستودعات الدقيق .

Pluie (F). Rain (E). ٢٦٩٩٦ - مِطْر

المطر هو الماء المنهمر من السحاب . ج امطار . والمطره هي الدفقة من المطر .

Rafle (F). ٢٦٩٩٧ - مِطْر

Head of maize stripped of all its fruit (E).

سنبول الدرة والذعن واشباهها . ج امطار .

٢٦٩٩٨ - مِطْرَاق

الائني المطراق هي القرينة المهد يتركب الفحل اياها . تستعمل في التمنية والمزنة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - مِطْرَاق البَحْر \*

Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Marteau (F). Hammer-head (E).

من اسمائها : ابو مطرقة وسكة الاسكندر . جنس اسماك بحرية بيوض ولون من فصيلة القرشيات ورتبة الاشراق . انواعها المعروفة ستة جميعها من الاسماك المفترسة الشرسة الخفية . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه سبيلاً في البحر || اعطائها مياه مجاذج واخوار البلاد الحارة || اجسامها وشعية الشكل تقطع من ٣ الى ٥ امتار . اثوابها الى الكهبة تعمق او تزعم وتغير مع اختلاف الانواع . رؤوسها كطرفة النحات ، اسطوانية الشكل ، ممتزعة الارتكاز يفرق طولها ربع طول الجسم . عيونها كبيرة ، مستديرة ، بارزة ، تحتل اطراف المطارق المقطوعة . اعطائها لاطنة لكنها كبيرة الشدق وسلحة بثلاثة صفوف من الاسنان الذرية الحادة القوية للتحركة . زعانفها سبع تحكها من سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الشرجية فارقة هالية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٠٠٠ - مِطْرَاق البَحْر الأطلَسِي

Sphyrna zygaena (S).

نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اعطائها مجاذج البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ امتار .

٢٧٠٠١ - مِطْرَاق البَحْر المَحْشُوسَط

Sphyrna tudes (S). Maillet (F).

نوع من مطراق البحر . اعطائها مجاذج البحر الابيض المتوسط . طولها يراوح من مترين الى اربعة امتار .

٢٧٠٠٢ - مِطْرَاق البَحْر الهِنْدِي

Sphyrna blochi (S).

نوع من مطراق البحر . اعطائها تمتد من مجاذج الهند الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر فصيق زنجبار . طولها يراوح من ٣ الى ٤ امتار .



مطارق البحر



مطرقة



مطق الاجاص

## ٢٧٠٢٦ - مَطْبَرَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).  
مادة فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثلاً حامض الفينك والليزول . الخ.

## ٢٧٠٢٧ - مَطْوَار

Polyphasé (F).  
Polyphase, Multiphase (E).  
كثير الأطوار .

## ٢٧٠٢٨ - مَطْوَرَة

Montacuta (S).  
Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مسطحة الجوانح وفصيلة البرسونيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من علم بحار المناطق الشالية . اجسامها صغيرة القد . اصدانها بيضيه اللون ، قليلة الاحدياد ، ناشرة السن المصرية . الوانها سوية تزاوج من الانيص التي الى المصفد .



مطوط منبول

## ٢٧٠٢٩ - مَطْوَر

Calandre (F).

طائر من فصيلة التبريات يدعى علم ، اطلبه .

## ٢٧٠٣٠ - مَطْوَرَة

Couleuvre à collier (F).

هي الحفّات المطوّق ، اطلبه .

## ٢٧٠٣١ - مَطْوَرَة ، أم حَسْرَة

Aspius (S).

Aspe (F).  
جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبوبيات . انواعها المعروفة قليلة يكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وانهر الشرق الاوسط واروية الجنوبية . اجسامها مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القد عادة الحشف . اسنانها الامامية السفلية بحجة كغالب الطير . لحمها مأكولة متوسطة الصنف .

## ٢٧٠٣٢ - مَطْوَر

Longe (F). Lunge, Tether (E).

المقود أو الحبل الذي يربط من مرسل الدابة لجروا .

## ٢٧٠٣٣ - مَطَى ، طَعَام الأَرْتَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طيب من فصيلة المركبات . مهدد البلاد المتندلة الحارة . يوجد في المراعق الرطبة من الوسط البنانية . اوراقه متعاقبة ، لسة ، صغيرة القد . ازهاره ضخمة التجميع ، هامة الارتكاز ، مستطيلة المالحق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافعه الطبية مهمة .

## ٢٧٠٣٤ - مَطْبَاع

Tropophyte (F).

Tropophyte (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات يتكيف مع عوامل البيئة حيث يعيش فلا يتأذى بحداف ولا تؤذي رطوبة .



مطاهر

## ٢٧٠٣٥ - مَطْبَاع

Plastique (F). Plastic (E).

هو المطاوع ، ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

## ٢٧٠٣٦ - مَطْبَاف

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E).  
مناظر طلي ، مجلّة الاشباح .

## ٢٧٠٣٧ - مَطْبَرَة

Oisellerie (F).

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وفي ايضاً محل تربية الطيور .

## ٢٧٠١٥ - مَطَق الصَّوْبَر

Diplodia pinea (S).  
فطر مجهري يركب اهداب الصنوبر فيعيلها ويقود البياض التي فقدت اهدابها الى الذبول واليباس .

## ٢٧٠١٦ - مَطَق قَاتَال

Diplodia natalensis (S).

فطر مجهري يصيب النخل في كربه واصول سغه . مظهره الخارجي يقع فسيحة مستطيلة غبراء اللون ثم سمراء . تركيب بشرة النسخ فتؤذي البسر تنطبه || يكافح عند ظهوره باستئصال سائل بودو الحلو نحو ١ ٪ يضاف اليه مثيل النسبة اي ما يصادد نحو ١ ٪ من الزيتون الششوية .

## ٢٧٠١٧ - مَطَاب

Problème (F). Problem (E).

## ٢٧٠١٨ - مَطْلُوب

Débit (F). Sale, Retail (E).

ما عل المرد من حساب أو ما هو مطلوب منه .

## ٢٧٠١٩ - مِطْبَر ، زَيْق

Fil du maçon (F).

Mason-line (E).

خيط البناء .

## ٢٧٠٢٠ - مِطْبَرَة

هي المدفنة ، اطلها .

## ٢٧٠٢١ - مَطْمُورَة

Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي السيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والاعلاف .

## ٢٧٠٢٢ - مَطْمُور

Momot (F). Momot (E).

جنس طير من فصيلة المطمويات . انواعه المعروفة ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية الحارة . تألف الاحراج والغابات . تتميز باستعالة اذنانها الرتاجية التركيب الثنائية الرقال المربعة قدر ثلاثة اصابع قبل الاطراف . مناقرها عظيمة مستطيلة شارقة المخاطم العليا المستنة الطغاف || قوتها احشرات والدوبيات والوزغ والفقران . تدلّش اوكاها في اوقاب الصخور . تضع الانثى من بيضتين الى ثلاث بيضات فضفاضا بمنأوى الذكر نحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه المطموط الميزول .

## ٢٧٠٢٣ - مَطْمُور مَبْدُول

Prionites momota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطموط . اصنائه تشمل معظم مناطق البرازيل والقوقيان . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره واعالي جناحيه الى اغضار الزيتي . مناكبه الى الزرقه السنجيرية . عنقه وذوره وجوشنه وبعثه الى الصبهة النحاسية المواج . صخره وقة رأسه سود . جبته خضره اللون يقابلها من الوراء حثار اخضر يطلق القفن . عيانه الى الجزء . منقاره اسود . رصاه الى الريدة السمراء || يألف الاحراج البعيدة عن كل عرآن . قوته الحشرات والوزغ والفقران .

## ٢٧٠٢٤ - مَطْمُورِيَّات

Momotidae (S).

Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

فصيلة طير من الجوامئ سنيات المناقير . انواعها المعروفة عديدة يجمعها جنس واحد يدعى مطموط || مهدها معظم احراج امريكة الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات والوزغ والفقران .

## ٢٧٠٢٥ - مَطْهَار

Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل يحكّ السد ترتفع فيه الحرارة والبخار المغسوط ، يستعمل للتطهير .

٢٧٠٤٩ - مُعَادَلَة بَيَّانِيَّة ، مُعَادَلَة تَفْصِيلِيَّة  
Equation graphique (F). Graphic equation (E).

٢٧٠٥٠ - مُعَادَلَة سِنِّيَّة  
Formule dentale (F). Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - مُعَار ٥  
Aptère (F).  
Apterous, Wingless (E).

هي كل حشرة عادمة الروشن أو الغمد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارِض شَرْعِي  
Contradictoire légitime (F). Legitimate adversary (E).  
« هو ما كان يمثل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم المتنازع في نسبة الموجودين والاحتاليين » .

٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَة مِنَ الْغَيْر  
Tierce-opposition  
« هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون المعارض طرفاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد أجحف بحقوقه » .

٢٧٠٥٤ - مُعَاص ٥  
Milieu (F). Medium (E).  
هو البيئة ، اطلبها .

٢٧٠٥٥ - مُعَاكَلَة ٥  
Ligne de conduite (F).  
Ligne de conduct (E).

الملك منج السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَالَ كَسْتِي \*

Hyliactes castaneus (S). Mégalyonx châtain (F).  
طائر من الجوارم سنيات المناقير وفضيلة لاقتفات التمل .  
موطنه بلاد الشبيل . ملجته الحياتي زويجي . يألف البراري  
الدغلة ، يختلس قصص غيرة من الطير . قوته الحشرات  
والتمل || جسمه ربة بطول نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر  
المنقاد والجناح والذنب . ساقاه وأصابعه شديدة النشاط  
تمكّنه من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء  
والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن .  
بطنه مجذع بالكستني . منقاد وساقاه الى الطحلة السمراء ||  
الانثى تتحمل بطوب الذكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالَجَة ، مُدَاوَلَة ، عِلَاج

Traitement (F). Treatment (E).  
حلة وسائل العناية بالحيوان أو النبات لانتفاء الامراض  
أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية أو شافية .

٢٧٠٥٨ - مُعَالَجَة بِاتَّصُل  
Sérothérapie (F).  
Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالِم الْأَرْض

Aboutissants et tenants (F). Adjacent lands (E).  
هي قطع الارض المجاورة لملك من جهتي الطول والعرض .

٢٧٠٦٠ - مُعَالَسَة  
Informatique (F).

هي الاستقصائية ، اطلبها .

٢٧٠٦١ - مُعَالَهَة ، مُسَاهِلَة ٥

Alternative (F). Alternative, Alternate (E).  
نعت ترميى يطلق على كل شجرة تحمل عاماً وتخلت آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَّات ، فُطُور مُعَدِّيَة  
Gastéromycètes (F). Gasteromycetes (E).

فصيلة فطور من الدعاميات .

٢٧٠٣٨ - مُطَيَّرَة  
Volière (F). Large bird-cage (E).  
البناء المد لتربية الطير .

٢٧٠٣٩ - مُطَيِّع ٥  
Chambre à humidification (F).  
Damping room (E).

حجرة رطبة يوضع فيها التبغ الجاف ليلين .

٢٧٠٤٠ - مُطِيل  
Ductile (F).  
ما كان يتصف بخاصة المط .

٢٧٠٤١ - مُطْ  
Grenadier sauvage (F).  
Wild pomegranate-tree (E).  
هو الزمان البري ، جلناره مغربي يجرسه النحل فيكثر عمله .

٢٧٠٤٢ - مُطَاعَة \*

Umbrella (S).  
Ombrelle (F). Umbrella (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل  
سقطيات الخياشيم وفضيلة المظايعات . انواعها المعروفة  
قليلة المدد اشهرها مظاعة الهند ومظاعة المتوسط || اصدافها  
مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تغلف الغليل من الجسم .  
اجسامها بيضية الشوزن ، متساكنة . عيونها كبيرة  
قاعية . ارجلها وضيعة ، كبيرة ، مبططة ، مالة  
الصفيحة السفلى .

٢٧٠٤٣ - مُطَاعِيَّات ٥  
Umbrellidae (S).  
Umbrellidés (F). Umbrellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل  
سقطيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة المدد  
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصدافها صغيرة  
مظلية الشكل . ارجلها فارشة بيضية الشوزن أو مستديرة ||  
اعرف اجناسها المظاعة والتيلودين .

٢٧٠٤٤ - مُظْمَعَائِي ، مُظْمِي  
Culture sèche (F).  
Dry farming (E).  
الذي تسقيه السماء من الزرع .

٢٧٠٤٥ - مُعَات ٥  
Expédient (F). Expédient (E).  
المعات الطريقة المناسبة .

٢٧٠٤٦ - مُعَادِل ، تَطْيِير  
Pair (F).  
Equal, Even (E).

٢٧٠٤٧ - مُعَادَلَة  
EQUIPOLLENCE  
التعادل في القوة أو القيمة .

٢٧٠٤٨ - مُعَادَلَة  
Equation  
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة للشئ ان في النسبة  
أو في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية  
Eq. du second degré (F). المعادلة الثانية  
Eq. du temps (F). المعادلة الزمنية  
Eq. annuelle (F). المعادلة السنوية  
Eq. réciproque (F). المعادلة العكسية  
Eq. simultanée (F). المعادلة المعية  
Eq. incompatible (F). المعادلة المتأيلة



مظاعة



معال كستي



- 27080 - مُعَدَّكَة ، رِيَسَات Rhéostat (F).  
Rheostat (E).  
جهاز يزيد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- 27081 - مُعَدَّن Mineral, Métal (F). Metal (E).  
المعادن اجسام طَبيعية تتميز بصفاتها الكيماوية النوعية وبخواصها الفارقة سبأ الصلابة وقابلية الصهر والسحب والطرق باستثناء الزئبق المائع في الحرارة العادية .
- 27082 - مُعَدَّن ، صَالِفُور Epierré (F).  
Cleanser (E).  
آلة تغلق الحجارة من الارض وتجمعها .
- 27083 - مُعَدَّنَة Minéralisation (F).  
Mineralization (E).  
المعدنة والتبدين واحد .
- 27084 - مُعَدَّنِي Minéral (F). Mineral (E).  
نعت .
- 27085 - مُعَدَّنِيَة Minéralogie (F).  
Mineralogy (E).  
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الحكي والكيماوي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- 27086 - مُعَدَّنِيَّات ، مُعَدَّنِيَّات الأُرْجُل Gastéropodes (F). Gastropoda (E).  
صف حيوانات من الرخويات .
- 27087 - مُعَدَّنِيَّات رُثِيَّة Gastéropodes pulmonés (F). Pulmonate gastropoda (E).  
صنف من الرخويات المعذبة .
- 27088 - مُعَدَّنِي \* Erminette, Herminette (F).  
Adze, Howel (E).  
أداة تستعمل لمزق التربة واقتلاع الاشجار الفساة .
- 27089 - مُعَدَّن ، مُعَدَّنِي (E).  
Peu profond (F). Little deep (E).  
تربة مرة : قليلة العمق وقليلة النبات .
- 27090 - مُعَدَّن Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).  
الممر : سقوط الشعر والريش .
- 27091 - مُعَرَّاج  
قال القزويني : دابة عظيمة حبيبة مثل الارنب صفراء اللون على رأسها قرن واحد أسود لم يرها شيء من السباع والذئاب الا حرب (الجاسط) .
- 27092 - مُعَرَّابَة Hibernie (F).  
هي معربة الشجر ، اطلبها .
- 27093 - مُعَرَّكَة ، عُرَّة Tic  
كل عادة مستقيمة يتنادها الفرس كصكك الانسان وبلغ الهواة ونفس الجدران والارتجاج يمنة ويسرة الخ...
- 27094 - مُعَرَّشَة  
في المنشرة ، اطلبها .
- 27095 - مُعَرَّض Exposition (F). Exhibition (E).  
المعدل جهاز التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .
- 27096 - مُعَارِبَة Etalonnage (F).  
Gauging, Standardization (E).  
27097 - مُعَارِبَة Symbiose (F). Symbiosis (E).  
هي الاشتراك التين في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والعنقيل وراثته .
- 27098 - مُعَارِبَة Visite (F). Visit, Search (E).  
في الجينكو ، اطلبها .
- 27099 - مُعَرَّشَة ، مُعَرَّشَة Liane (F). Liana (E).  
كل جنبه متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .
- 27100 - مُعَرَّشَة Herbivore (F).  
Herbivore, Herbivorous (E).  
ما كان قوته الشب .
- 27101 - مُعَرَّشَة Elué (F).  
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق تدعى معتوق .
- 27102 - مُعَرَّشَة Fumigant (F).  
27103 - مُعَرَّشَة Hâtif, Précoce (F).  
Early, Precocious, Forward (E).  
صفة النبات الذي ينمو ويدرك سرياً .
- 27104 - مُعَرَّشَة Pétrin (F).  
Kneading-trough (E).  
27105 - مُعَرَّشَة Mastic à greffer (F).  
Graft mastic (E).  
ويدعى صمغ التطعيم وطلاء التطعيم ، اطلب « مستيك » .
- 27106 - مُعَدَّن هو البقل الرخص والتمر الغض .
- 27107 - مُعَدَّنَات زَرَاعِيَّة Matériel agricole (F).  
Agricultural material (E).  
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- 27108 - مُعَدَّنَات Statoscope (F).  
Statoscope (E).  
المعدل مرزاز تفاضل يتأثر باضمت تقالبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- 27109 - مُعَدَّنَة ، مُعَدَّنَة Estomac (F).  
Stomach (E).  
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند الحلياليات ومرتبة عند المفترسات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه || اما اقسام المعدة المرتبة فاربعة وهي : أم التلافيف والألفحة والقلنسوة والكروش .
- 27110 - مُعَدَّن Taux (F).  
راجع حق .
- 27111 - مُعَدَّن Statocyste (F). Statocyste (E).  
المعدل جهاز التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .

مرة حاملة لها استعمالها الطبي || اشهر انواعها المزرون  
المبذول .

### ٢٧١٠١ - مَعْرِضُون مَبْدُول \*

Cneorum tricoccon (S). Camélé commun (F).  
نوع من المزرون وهو جنية سرورية مبذولة تملو من  
٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فراء. اوراقها ابيضاء زيتونية  
الشكل. نصلها وحيد البرق، ملتصق الحمار، لامع  
الصفحة البحرية اللون. ازهارها صغيرة القذ ثلاثية التجميع  
سفراء اللون. ثمارها الى الخضرة الشديدة الاسمرار.  
يستخرج من اوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسهلة.

Cneoraceae (S). مَعْرِضُونِيَّات \*  
Cnéoracées (F). Cneoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات الفصائل  
مرفعات المبيض. اجناسها وانواعها عديدة، اعطاهما  
الاقليم المعتدلة. اشهر اجناسها المزرون.

Blieuse (F). Hoer (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
جهاز زراعي يستعمل في عزق التربة تجره الدواب او  
الحركات.

Caprinés (F). Caprinae (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
اجد قسي فصيلة الغنيمات .

Lait (F). Milk (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
الحس هو اللبن، يقال ما في التجمعة مس.

Tubériss (F). مَعْرِضُونِيَّات \*  
Déshebant (F).

كل مادة عاشوية تقضي على بعض الاعشاب الضارة  
تدعى معشابا.

Herbier du littoral (F). Herbal of littoral (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
المعاشب الجداحية هي المواقف القريبة من المجادح والشلوط  
والتي تكثر فيها الثبوت والاعشاب البحرية.

Décagone (F). Decagon (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
٢٧١٠٩ - مَعْرِضُونِيَّات \*

٢٧١١٠ - مَعْرِضُونِيَّات \*  
Pressoir (F). Press (E).

كل آلة تستعمل للصر من عصر الباز الى الحبوب لذلك  
فالمصارع عديد الاشكال والاجسام.

Brontomètre (F). Brontometer (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
٢٧١١١ - مَعْرِضُونِيَّات \*

جهاز آلي يسجل العوارض والظواهر الجوية (لأرولوجية)  
اثناء الزوايح والمواسم والاعاصير. من البرق والصاعقة  
والرعد الى هبوب الرياح وسرعتها الخطية والارولوجية الى اقطار  
وغزاراتها الى البرد وحجمه الى الضغط الجوي.

Echenilloir (F). Branch-opper (E). مَعْرِضُونِيَّات \*  
٢٧١١٢ - مَعْرِضُونِيَّات \*

اداة تستعمل في الاعصال تمكن العامل من الوصول للقضاء  
على الاساريع والديدان الخفية في اعالي الاجبار.

Nimbus مَعْرِضُونِيَّات \*  
هي الدجعة نوع من الغيوم، اعطاهما.

Exposition agricole (F). مَعْرِضُونِيَّات \*  
Agricultural exhibition (E).

مكان يعرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النبات  
والآثار والحيوان والادوات والمعدات.

Déchaussé (F). مَعْرِضُونِيَّات \*  
٢٧٠٩٧ - مَعْرِضُونِيَّات \*

٢٧٠٩٨ - مَعْرِضُونِيَّات \*  
Hibernia defoliari, Erannis defoliari (S). Hibernie  
défeuillante, Phalène effeuillante (F). Mottled-  
umber moth (E). Grosser Frostspanner (D).

حشرة من فصيلة الذارعات، ذكرها صغير القذ اصفر  
الجسم والارواش المسنجة والمزركشة بالاحمر والاسمر.  
انتاعها معاداة سمراء اللون مستطيلة الجرازم والازباني والاشرة.  
تمنع كبحها في اوائل الخريف عند انتشاب الاقنان فينشف  
في اوائل الربيع عن رقات نمة تلتهم البراعم والارواق  
الغنية || تركيب معظم الاجبار الحرجية وبعض المشرقة  
كالسنديان والداردار والازنار والتبولا والترزفون والخلص  
والزعرور والبنق والتفاح والاجاص || تكافح في الشتاء  
باستعمال احد الماكن الفعالة.

٢٧٠٩٩ - مَعْرِضُونِيَّات \*  
Hibernia leucophaearia, Erannis leucophaearia (S).  
Hibernie grisâtre, Phalène du chêne (F).  
Hibernia leucophaearia (E).

حشرة من الارقيات حرشيات الاجنحة. ذكرها جمجمة  
اناثها معاد. موطنها البلاد المعتدلة الحارة من الشرق  
الاسوط الى اوروبا. فراشها صفة تعيش على غزونها  
الاعمال. سرقها تعيش على اوراق السنديان والمقص ||  
جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٩ مم. بسطة نحو  
٣٤ مم. رأسه الى الريدة. عتاه صغيرتان. زبانه  
مشطيان. جوشه ويطه الى الريدة السراء الموج. رواشته

رمادية اللون يعلوها تيجج سؤوي وتسلج اسمر. اهدابها  
الى الريدة القصية || الانثى معراة. جسمها اهليجي  
الشكل يطول نحو ١٠ مم. وينتهي بمز حد. ثوبها  
الى الريدة السراء تملوها رقة سراء. جرائزها مستطيلة  
نظيفة تكتبها من الانتقال بسرعة ومن تعلق الاجبار في

ها جيل واحد في الحول. تظهر في نيسان. تسرح في  
الليل. تماطل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتد  
المكن مباديا على اباط الارواق || السرقة عند بلوغها  
الاكامل تطول نحو ١٨ مم. جسمها اسطواني الشكل،  
مبهر اهلل الدقيق القصير. ثوبها الى الكهبة تملوها ثلاثة  
خطوط سود قاطبة منها خط ثجيبي مضاعف الغرض. رأسها  
الى الجؤوة. سرجهام محذوب الشكل ينتهي بزايدة ذلقة.  
روايجها البطينية الوسطى شديدة القصر مما يحجبها تقصر  
عند الانتقال || طور الاكامل يستمر نحو ٣٨ اسبوعا  
وينقضي في التربة ضمن غلاف من العطن والبراز المجنون  
بالريال.

Cneorum (S). مَعْرِضُونِيَّات \*  
Camélé, Chamélé, Gousse (F). Spurge olive,  
Widow-wall (E). Knester Knopspricke (D). Ca-  
meles, Calmolea (I).

جنس شجيرات وجنيات برية من فصيلة المزرونيات.  
انواعها عديدة، جميعها من نباتات المناطق المعتدلة. اوراقها  
ابيدة متعاقبة. ازهارها خنثوية ابوية الارتكار وسيدة  
او ثلاثية التجميع. ثمارها ثلاثية الغلافات الناشقة بزورها



معرية الشجر



معرية ريداء



مزعرون مبذول



معصار



معصال



Hydroscope (F). **مِعْيَان** ٢٧١٥٤  
Water-diviner (E).  
هو الذي يستكشف الينابيع ويمن مواتها .

Terror (F). Soil, Ground (E). **مَعْيَص** ٢٧١٥٥  
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك معيص جيد  
الاتاء ، ومعيص كرم ، وطعم المعيص .

Losange, Rhombe (F). **مُعِين** ٢٧١٥٦  
Lozange, Rhomb, Rhombus (E).  
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مَعْيَنَة** ٢٧١٥٧  
Water-divining (E).  
علم استكشاف الينابيع وتعيين مواتها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مُعِينِي** ٢٧١٥٨  
Oculifère (F). **مَعْيُون** ٢٧١٥٩  
المعين من كان يعمل عيناً . راجع جاحم .

Miauler (F). To mew (E). **مَعَا** ٢٧١٦٠  
معا وماغ وماء السور : صوت .

Glossostemon (S). **مُعَات** ٢٧١٦١  
Glossostémon (F).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبائيات .  
انواعها قليلة العدد ، اصطلحها الشرق الاوسط . اوراقها  
متعقة متناقبة كلفة . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر  
انواعها المغاث العجمي .

Glossostemon brugueri (S). Glossostémon de  
Perse (F). **مُعَات عَجَمِي** ٢٧١٦٢  
نوع من المغاث وهو عشبة برية طيبة تملا من ٥٠ الى  
١٠٠ سم . جذرها حنزلي الشكل احمر المادة اسود القلفة .  
ساقها وفروعها زبده اللحاء . اوراقها مستطيلة الاحناء  
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد يبيض اللون || جلوره  
تستعمل مسحوقة وتدخل في عدة مركبات تقيء المرأة النفساء .

Avaries (F). **مُعَارِم** ٢٧١٦٣  
Damages, Averages (E).  
هي الوار ، راجعه .

Magas (S). **مُعَاس** ٢٧١٦٤  
Magas (F). Magas (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الاجرل  
وفصيلة التفيديات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من  
متحجرات الاباج الاول .

Magas (S). **مُعَالِير** ٢٧١٦٥  
المغافر والمغافير : صنع ينفسه المرطوب وهو حلو يؤكل  
الا انه مقت الرائحة .

Hétérotrope (F). **مُعَاِير** ٢٧١٦٦  
Heterotropous (E).  
نمت تعريفية يطلق على كل نبت (ملقوسة نباتية) رأس  
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧  
Nephelometer (E).  
جهاز يمكن من درس القش وتعديله .

Vivace (F). Perennial (E). **مُعَمَّر** ٢٧١٦٨  
نمت تعريفية يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من  
سنتين .

Novale (F). **مُعَمَّر ، مَعْمُورَة** ٢٧١٦٩  
Newly broken-up (E).  
كل ارض عيرة مستعدة .

Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E). **مَعْمَل ، مَصْنَع** ٢٧١٧٠  
٢٧١٧١ - **مَعْمَل البيرة ، مَعْمَل الجعة ، مَعْمُورَة**  
Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).  
معمل تصنع فيه البيرة اي الجعة .

Glucose (F). **مَعْمَل الجلوكوز** ٢٧١٧٢  
Glucose-house (E).  
معمل يحول فيه النشا الى جلوكوز .

Grapperie (F). **مَعْبِيَة** ٢٧١٧٣  
Grapery, Vinery (E).  
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السفى وبفس الجوارب  
مجهز بعدة التفتة يستعمل لفرس الكرمة ونتاج العنب  
خلالاً لزمان الانتاج الطبيعي .

Insectarium **مَعْبِد الحشرات** ٢٧١٧٤  
مؤسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكنها من تربية  
الحشرات لدرس اطوارها وبيوتها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مَعْمُور له** ٢٧١٧٥  
هو الذي اوصى له بمال وفرض عليه دفعه للمستحق  
المهدي .

Métamérisé (F). **مُعَمُور ، مَتِيل** ٢٧١٧٦  
نمت تعريفية يطلق على الاعضاء المائلة المتماثلة في كامل  
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مَعْمُول \*** ٢٧١٧٧  
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واسماجه  
عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Coeliaque (F). Coeliac, Celic (E). **مَعْرِي** ٢٧١٧٨

Intestin (F). **مَعْنِي** ٢٧١٧٩  
Intestine, Bowel, Gut (E).  
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى الاست وهو  
يقسم الى عدة اقسام اخصها المعى الدقيق والمعى الغليظ .

Intestin grêle (F). **مَعْنِي دَقِيق ، عَصِيج** ٢٧١٨٠  
Small intestine (E).  
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مَعْنِي صَالِم** ٢٧١٨١  
المعنى الصائم جزء من المعى الدقيق مركزة بين المعج وبين  
المعنى الغليظ .

Côlon (F). **مَعْنِي غَلِيظ ، مُصْرَان** ٢٧١٨٢  
Colon (E).  
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في الاست .

Iléon, Iléum (F). Ileum (E). **مَعْنِي لَقِيف** ٢٧١٨٣  
المعنى اللقيف هو القسم الثالث والاطول من المعى الدقيق ،  
مركزة بين المعى الصائم والاغور .



معول



مقاس



مغث اخضر

٢٧١٧٦ - **مَغْثُ غُرَوِيّ** \*  
*Alnus glutinosa* (S). Aune glutineux, Auline, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erle, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancetano, Aunera, Verna russa (I).  
 نوع من المغث المبلول . فروعه عديدة تملو من ه الى ٣ م. منبها المناقع ويجاري الماء . سويها جالسة قشورها الى السرة السوداء . فروعه زياه . اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص . نصلها عديد المروق الدبقه ، لامع البشرة المأللة على صفحتيه .

٢٧١٧٧ - **مَغْثُ قَلْبِيّ الزَوْق** \*  
*Alnus cordata* (S). مغث قلبي الزوق  
 Aune à feuilles en coeur (F).  
 نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تملو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعه مأللة . اوراقها قلبية الشكل تملو من ه الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ١٠ سم . نصلها مسنن ، الحافة خلي الصفحة السفلى . مخاريطها فردية التجميع جوزية القد .



مغث اريد

٢٧١٧٨ - **مَغْثُور ، مَغْثُور ، مَغْثُور** \*  
*Mlellat* (F). مغثور  
 Honey dew (E).  
 مواد سكرية لزجة تنفصها سمام اوراق بعض النباتات فيجربها النمل وتعيش عليها بعض الفطور المجهرية كغطر السمام .



مغث غروي

٢٧١٧٩ - **مَغْثِيَّات** \*  
 Nectarinidées (S). Nectarinidées (E).  
 فصيلة طير من الجوارم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها زهاء ١٢٠ ، جميعها صغيرة القد ، بجلة الشكل ، زاهية الالوان المرائية ، مستطيلة المناقير الدقيقة || مهددا البلاد الحارة . تجرس ريشق الازهار والبال السكرية .

٢٧١٨٠ - **مَغْثِيَّة** \*  
 Melica (S). Méléque (F). Melic, Melick (E). Nickendes (D). Melica (I).  
 جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها عديدة جميعها علفية ترهاها الماشية . وهي تنبت في معظم الاصقاع المتندلة الحارة . سويها نخلة منتصبة . اوراقها عصفية ، متباعدة ، قليلة . ازهارها صغيرة القد ، عذكويلة التجميع ، عطرية العرف ، غزيرة الرحيق يجربها النحل .



مغثيرة

٢٧١٨١ - **مَغْدَد ، مَغْدَد** \*  
 Mélongène (F).  
 نبات زراعي مشهور باسم بادنجان ، اطليه .

٢٧١٨٢ - **مَغْدَاق** \*  
 Pluvioscope (F). Pluvioscope (E).  
 الملقاق جهاز يسجل زمن وقوع المطر وبعدة استمراره ومقداره .

٢٧١٨٣ - **مَغْدَق** \*  
 Rame (F). Oar (E).  
 الملقق جهاز مجذائي الشكل يكون عند بعض المفصليات والروغويات والقشريات والحشرات .



مغذّيس الكرّز

٢٧١٨٤ - **مَغْدَلِيس الكرّز** \*  
 Magdalis cerasi (S). Magdalis des cerisiers (F). Magdalis cerasi (E).  
 حشرة غاصلة خائبة مؤذية من فصيلة السوسيات ورثة منمذات الاجنحة . تألف جناتها الاجبار الشجرة من قنّاح واجاص وكرز وغوخ ... غناضها تعيش على نصال الاوراق . يرقاها تخليج الاناداد والانفصان حتى

٢٧١٨٥ - **مَغْتَمِلَة ، مغثيم** \*  
 Vache taurélière  
 هي البقرة الغللة المألتمدة الوداق أو الاستحرام .

٢٧١٨٦ - **مَغْثُوم** \*  
 Echaudé (F). Scalded (E).  
 الملقوم من النبات : الذي لفسحه الحمر .

٢٧١٩٠ - **مَغْثُ ، مَغْثُ ، مَغْثُ ، جَار الماء** \*  
 Aune (S). Aune (F).  
 جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة البتليات . انواعها ١٦ ، اعطائها البلاد المعتلة . تعيش على ضفاف البحيرات ويجاري الماء . اوراقها عابلة . ازهارها قدية ، الكثرية منها تظهر في الخريف والانثوية تأخر الى الربيع . اشخاصها شائعة الاستعمال الصناعي لا يعطها الماء . فحمها يستعمل في صناعة البارود . قشورها وافر الطعان تصلح للداغة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٧١٩١ - **مَغْثُ اخضر** \*  
 Alnus viridis (S). Aune vert, Aunâtre (F). Green alder, Mountain alder (E). Grünerle, Drosle (D). Drosia, Drosle, Trosage (I).  
 نوع من المغث وهو شجرة جبلية مبلولة تملو من ٢ الى ٦ امتار . اوراقها بيضيه ذلقة . نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم . ويعرض من ٢ الى ٥ سم . وهو ثنائي التستين . اخضر الصفحة العليا خلي السفلى .

٢٧١٩٢ - **مَغْثُ اُرْمَد** \*  
 Alnus incana (S). Aune gristère, A. de montagne, Aune blanche (F). Black alder, Hoary alder, Scalded alder (E). Weisserle, Grauerle (D). Auzano, Marassola, Ontanella (I).  
 نوع من المغث المبلول . فروعه عديدة ، اشجاره صغيرة القد تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراقها مزرقية تملو من ٤ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٩ سم . نصلها باحث المخصرة ، اورد اللون ، كثير المروق ، مزدوج التستين .

٢٧١٩٣ - **مَغْثُ اليابان** \*  
 Alnus japonica (S). Aune du japon (F).  
 نوع من المغث ، مهدد اليابان . شجرته متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٨ م . فروعه مضلمة زياه . اوراقها سنائية تملو من ٦ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٦ سم . نصلها قليل الزغب ، متباعد التستين ، ينتهي بهدية مستدقة مستطيلة .

٢٧١٩٤ - **مَغْثُ بحري** \*  
 Alnus maritima (S). Aune maritime (F).  
 نوع من المغث ، شجرته صغيرة القد تملو من ٨ الى ١٠ امتار . فروعه مأللة . اوراقها تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ سم . نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى لا قياس التستين ينتهي بهدية قصيرة || وهو يرغب في المواقع الرطبة الساحلية ويجود قرب الماء .

٢٧١٩٥ - **مَغْثُ صِبَاغِي** \*  
 Alnus tinctoria (S). Aune tinctorial (F).  
 نوع من المغث ، مهدد اليابان وميتوروبا . شجرته متوسطة القد تملو من ١٢ الى ٢٠ م . ساقها قشبة سمراء اللحاء . فروعه الفضية مغزيرة . افنانها قطنية الحمل . اوراقها اهليلجية مدوارة مقطوعة للقاعدة تطول من ٦ الى ١٢ سم . وتعرض من ٥ الى ١١ سم . نصلها مجري اللون خلي الصفحة السفلى || قشورها صبغية شائعة الاستعمال .

2٧١٨٨ - **مِغْرَقَةٌ** (F). Scoop, Ladle (E).  
رفش مقعر يستعمل في اغتراف الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِغْرُودٌ** (F).  
هو الكرم الأحمر ، اطلبه .

2٧٢٠٠ - **مِغْرِيٌّ** (F).  
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند أو فجل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِغْرَلٌ** (F). Distaff (E).  
هو المردن ، شكل من اشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِغْشِيلُ الْوَرْدِ\*** (F).  
Megachilles centuncularis (S). Megachile (F).  
حشرة من المنشيليات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الورد

والقمل فتتغذى نصل الارواق وتنقل الفئات الى غشائها الذي تقيمه في بعض التجاويف الخشبية حيث ترصق الفئات سفناً متتامة يتخللها المكان ، يفشاه ويحيط به شيء من العسل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يؤذي اوراق الورد والقمل .

2٧٢٠٣ - **مِغْشِيلِيَّاتٌ** (F).  
Megachilidés (F). Megachilidae (E).  
فصيلة حشرات خاضعة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة .

اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشبه من النحل . جميعها صغيرة القدر ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقيم غشاً وأنها في تجاويف الاغصان اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مِغْضٌ** (F).  
Colique (F). Colic, Stomach-ache (E).  
عارض يعتري بعض الحيوانات كالحيل والبق . اسبابه مختلفة وانواعه ايضاً اغصها الكولي والعموي .

2٧٢٠٥ - **مِغْضَنٌ ، مِغْضَدٌ ، مِغْضَبٌ** (F).  
Ebranchoir (F). Pruning-tool (E).  
اداة تستعمل في قطع الاغصان والافاندا .

2٧٢٠٦ - **مِغْضٌ** (F). Momordica (S). Momordique (F).  
جنس نباتات عشبية مدادة وعارضة من فصيلة القتانيات ، انواعه ١٢ منها الحولية والمعمرة . اوراقها متعاقبة ، منعقة ، كفية ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القدر ، وحيدة المسكن . ثمارها بيضيه الشكل ، ثعلولية القشور . بزورها مبطة ، حنطية اللون ، بارزة التسنيج والازراكن || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مِغْضُ الْكُوْشْنِشِينِ** (F).  
Momordica cochinchinensis (S). Momordique de Cochinchine (F).  
نوع من المغض المعمر ، منته الكوشنشين والهند . جذوره عشقولة ، ساقه تطول نحو ٨ امتار . حوافه بسيطة . اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص . ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضلعة بالاسود . ثماره بيضيه حمر اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مِغْضُ بِلْسَمِي\*** (F).  
Momordica balsamina (S). Momordique baumier, M. balsamine, Pomme de merveille, Pomme de Jérusalem (F). Apple of Jerusalem, Balsam apple (E). Balsamapfel, Wunderapfel (D). Momordica, Pomo Balsamo, P. di meraviglia (I).  
اشهر انواع المغض . اعطانه فسيحة الاربعاء تمتد من الشرق

الاقبال فتعلبها وتؤذيها || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السواد الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بمشك قاصم ثاقب . عينها كبيرتان . زباناها صولجانان . ظهرها مستدير المؤخر اللامع القارق الطرف . ارساغها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساقد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . قرر المكان في لواء الافاندا والاصناف في ثقبوت تتخلجها بمشكها || البرقة مرقاة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ سم . جسمها اهليلجي الشكل ، حنطي اللون ، اصفر المواجه اسمر الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف النفق الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مِغْدٌ** (F).  
Nutritif (F). Nutritive, Nourishing (E).  
نعت تعريفي تصوف به المواد الغذائية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِغْرَاسٌ\*** ، **مِغْشَالٌ** (F).  
Transplantoir (F). Garden trowel (E).  
اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تحجوب التربة لتسكيها من اقبال الشتول المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِغْرَاسٌ كَلِي\*** (F).  
Transplantoir mécanique (F). Transplanting-machine (E).  
جهاز آلي يؤمن غرس الشتول في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مِغْرَبٌ** (F).  
Albinos (F).  
هو الاحصب ، اطلبه .

2٧١٨٩ - **مِغْرَةٌ** (F).  
Ocre (F). Ochre (E).  
تراب صلبالي يستعمل في التخصيب .

2٧١٩٠ - **مِغْرَةٌ حَمْرَاءٌ** (F).  
Ocre rouge (F). Red ochre (E).  
تراب صلبالي اخر الخضاب .

2٧١٩١ - **مِغْرَةٌ صَفْرَاءٌ** (F).  
Ocre jaune (F). Yellow ochre (E).  
تراب صلبالي اصفر الخضاب .

2٧١٩٢ - **مِغْرَدٌ** (F).  
Scare bridé (F).  
راجع ابو معقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مِغْرُوزٌ** (F).  
المغز او مغز الذهب نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مِغْرُوزٌ** (F).  
Empattement (F). Footing (E).  
2٧١٩٥ - **مِغْرُوزُ السَيْبِ** (F).  
Ecamoussure (F).  
مغز نصاب الحشرات .

2٧١٩٦ - **مِغْرُوزُ الطَّعْمِ** (F).  
Enture (F). Cut, Incision (E).  
الموضع الذي يوضع فيه العلم من المظلم .

2٧١٩٧ - **مِغْرُوسٌ** (F).  
Birone, Haque (F). Truck (E).  
اداة من حديد مخروطية الطرف تغرز في التربة فتفتح حفرة توضع فيها الفرس .



مغراس



مغشيل الورد



مغض بلسمي

- الاذن الى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم . حوالقه دقيقة .  
اوراقه ثلاثية او خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم .  
نصلها مائل الصفحة الالامعة ، مسن الحافة . ازهاره  
صفراء اللون ، اهليجية البتلات . قناباتها قليلة الشكل ،  
مسنة ، طرية الازنكاز . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول  
نحو ٨ سم . وهي تؤكل خضراء في اول عهدها وتصبح طيبة  
عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات دالة ومفيدة .

### ٢٧٢٠٩ - مغنّس خَلْبِي الْوَرَق \*

*Momordica charantia* (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Papareh (F).

نوع من المغنّس ، منته البلاد الحارة . جذوره ليفية التركيب .  
ساقه عارضة تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه  
خماسية او سباعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، خل  
البشرة قبالة العروق البارزة . ازهاره صفراء اللون ، خفيفة  
البتلات . قناباتها تتوسط المالحق . ثماره برتقالية اللون ،  
مستطيلة الشكل ، ذرية الرأس والمقب ، ثملولة القشرة  
الخشنة ، تطول الى ١٥ الى ١٨ سم . لبها احمر اللون  
ماكول .

### ٢٧٢١٠ - مغنّس قَلْبِي

*Momordica involucreta* (S). Momordique à involucre (F).

نوع من المغنّس ، منته افريقية الجنوبية . ساقه عارضة  
تطول نحو ٢٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد  
خماسية التفصيص ، نصلها مسن الحافة يطول ويعرض  
من ٤ الى ٦ سم . ازهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات  
قناباتها قلبية طرية . ثماره ارجوانية ، بيضيه الشكل  
تطول نحو ٥ سم . لبها احمر .

### ٢٧٢١١ - مغنّير

المغنر والمغنّرية حشرة واحدة مشهورة باسم قمرزية .

### ٢٧٢١٢ - مغنّيريات ، قُرْمِزِيَّات

*Coccidae* (S). *Coccidées* (F). *Coccidées* (E).

فصيلة حشرات من تصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها  
كثيرة العدد تتميز بصغر قننها وبازدواجها الشكل والشبي  
وبافرازاتها الشمعية او اللكية || ذكروها تحيلة الجسم  
جمجمة . اناتها معار يفضيه الشكل او مكرورة تعيش  
على النسج النباتية فتتغذى وتتخص عصارتها .

### ٢٧٢١٣ - مغنّيرية النَّصَّاح المَدَكْبَة

هي قمرزية النَّصَّاح ، اطلبها .

### ٢٧٢١٤ - مغنّيرية الحَمْضِيَّات

*Pseudococcus citri* (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).

حشرة من القرمزيات ، بيضيه الشكل ، صغيرة القد ،  
مبططة الجسم ، ععدة الظفر ، صفراء اللون ، تحيلة الغلاف  
الشمعي اللبكي التركيب || تركيب الحفصيات والمغنو  
وبعض نباتات الزينة . اضرارها محدودة . تكاثرها كثيرا  
من القرمزيات .

### ٢٧٢١٥ - مغنّيرية البَاسِمِين

*Orthesia insignis* (S). Cochenille du jasmin (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها الى الخضار البني  
ينفشاها ندف شبي بمنطقها من كل صوب . طولها مع  
كيس مكها يبلغ نحو ٧ مم . تركيب الباسمين والكرمزات  
وغيرها من نباتات الزينة || تكاثر كاسر القرمزيات .

### ٢٧٢١٦ - مغنّيرية مَدَكْبَة

*Serpette* (F). هي قمرزية قُورِمَزَا ، اطلبها .

### ٢٧٢١٧ - مُغْنُور هو المغر ، اطلبه .

### ٢٧٢١٨ - مَكَلَة

النسبة والمغر التي تنتج في عام مرتين . ج مغال .

### ٢٧٢١٩ - مُغْلَق (F). Indehiscent (E).

نمت تمرني يوسف به ما لا يفتح او لا يتشقق من  
البرور وغيرها .

### ٢٧٢٢٠ - مِغْلِم راجع منفلة .

### ٢٧٢٢١ - مَغْنَسَا ، صَهَارَة

*Magma* (F). *Magma* (E).

المغا ، فيزيائيا وكيميايا ، كل مادة رغو شبه مائنة  
كازجاج المصهور أو كالطع الذي يقدف به البركان  
عند ثورانه .

### ٢٧٢٢٢ - مُغْمَدَة الْاَجْنَحَة

*Coléoptères* (F). *Coleoptera* (E).

رتبة من الحشرات تعرف بغمدية الاجنحة ، اطلبها .

### ٢٧٢٢٣ - مَغْنَسْ

*Ensacheur* (F). *Sacking* (E).

اداة تجمل الكيس قائما مغنسا فيسول ملو حبا .

### ٢٧٢٢٤ - مِغْنَسَاط ه

*Magnétomètre* (F). *Magnetometer* (E).

جهاز يستعمل في قياس الانقلاب المنطقة .

### ٢٧٢٢٥ - مَغْنَطِيسِي ، مَغْنَطِيسِي

*Magnétique* (F). *Magnetic* (E).

### ٢٧٢٢٦ - مَغْنَة \* ، مَوغْنُور ، مَاهُون

*Swietenia mahagoni* (S). *Mahogoni*, *Mahogoni*, *Acajou* à meuble (F). *Mahogany tree* (E). *Mahogoni* *baum*, *Acajou* *baum* (D). *Mogano*, *Acagiu* (I).

شجرة متوسطة القد من فصيلة الازدرعيات . مهدها المناطق  
الحارة الافريقية . خشبها اصفر اللون ، امير المواج ،  
ناعم الزقمة ، فاخر الصنف ، يعتبر من أجود أنواع  
الاكاجو . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه  
عازل طبيعي للحرارة القوية المشنة .

### ٢٧٢٢٧ - مَغْنَطَ (F). To magnetize (E).

### ٢٧٢٢٨ - مَغْنَطَة

*Magnétisation* (F). *Magnetization* (E).

### ٢٧٢٢٩ - مَغْنَطَة حَيَوَالِيَة

*Zoomagnétisme* (F). *Zoomagnetism* (E).

علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

### ٢٧٢٣٠ - مَغْنَطِيس ، مَغْنَطِيس

*Aimant* (F). *Magnet* (E).

### ٢٧٢٣١ - مَغْنَطِيس كَهْرَبَائِي

*Electro-aimant* (F). *Electro-magnet* (E).

### ٢٧٢٣٢ - مَغْنَطِيسِي كَهْرَبِي

*Magnéto-électrique* (F). *Electro-magnetic* (E).



مغنّس خلبى الورق



مغنة

## ٢٧٢٤٠ - مَغْطِيسِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر

*Magnolia grandiflora* (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها كبيرة القد هربية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . أوراقها أبيضه تطلو من ١٢ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم . نصلها لامع البشرة عايق الخضار عل صفحته العليا ، أسفم اللون الزنجاري عايق صفحته السفلى . أزهارها مكبسة تلبية اللون ، عطرية العرف ، قطرها براوح من ١٨ إلى ٢٠ سم . يتلاتها تند من ٩ إلى ١٢ ، أقلام اسديتها ارجوانية || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٧٢٤١ - مَغْطِيسِيَّة كَبِيرَة الْوَرَق

*Magnolia macrophylla* (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها متوسطة الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م . افئافها وزعماتها خلية البشرة . أوراقها عابلة كبيرة مستطيلة ، طولها براوح من ٢٠ إلى ١٠٠ سم . وعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم . نصلها أهليجي الشكل مقطوم القاعدة . أزهارها عظيمة القدر ، قطرها براوح من ٢٠ إلى ٣٢ سم . وهي فواحة العرف ، بيضاء اللون ، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٢٤٢ - مَغْطِيسِيَّة مَدْدُونَة

*Magnolia coco*, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها مثدولة تملو من ٢ إلى ٤ أمتار . أوراقها أبيضه سنائية ذرية تطلو من ٨ إلى ١٥ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . أزهارها صغيرة القد ، قطرها نحو ٣ سم . وهي ثلاثية الفصل الأخضر ، سداسية البتلات ، فواحة العرف العطري ، عابية اللون . أزهارها يستمر طوال السنة .

## ٢٧٢٤٣ - مَغْطِيسِيَّة مَحْزِيَّة

*Magnolia officinalis* (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية ، مهدا الصين . شجرتها هربية الشكل تملو من ٦ إلى ١٦ م . أوراقها عابلة كبيرة تطلو من ٣٥ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا ، خلى السفلى البهيرة اللون . أزهارها مكبسة كبيرة القد قطرها براوح من ١٥ إلى ٢٠ سم . يتلاتها بيض اللون ، أقلام اسديتها قمرية . || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

## ٢٧٢٤٤ - مَغْطِيسِيَّة مَظَلِّيَّة

*Magnolia tripetala*, *M. umbrellae* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها مظلية الشكل تملو من ٥ إلى ١٠ أمتار . أوراقها عابلة أهليجية مستطيلة ، طولها براوح من ١٢ إلى ٦٠ سم . نصلها مالمس البشرة جبل الخضار الزاهي . أزهارها بيضاء اللون . مستهجة العرف ، تساعية البتلات المستطيلة ، قطرها براوح من ٨ إلى ١٢ سم . || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٢٤٥ - مَغْطِيسِيَّة مُؤَنَقَة

*Magnolia acuminata* (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . جنبها سرورية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم . وهي في أقلها وبديتها شجرة شائعة تملو نحو ٣٠ م . أوراقها عابلة بيضيه ذرية ، نصلها يطلو من ١٢ إلى ٢٢ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٢ سم .

Magnétisme (F).

Magnetism, Mesmerism (E).

## ٢٧٢٣٣ - مَغْطِيسِيَّة

*Magnolia* (S).

*Magnolier*, *Magnolia* (F). *Magnolia* (E). *Magnolie*, *Lilienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنات برية طيبة وآزيبينية من فصيلة المغنوليات . أنواعها عديدة . أوراقها متعاقبة ، كاملة ، جلدية النصل اللامع . أزهارها كبيرة القد ، ثلاثية الفصل ، عديدة البتلات المتركة ، كثيرة الاسدية ، فواحة العرف العطري . ثمارها تخاريط صغيرة القد ناشقة || أشهر أنواعها ما يلي :

## ٢٧٢٣٤ - مَغْطِيسِيَّة بَحْرِيَّة الْوَن

*Magnolia glauca*, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque*, *M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية ، شجرتها تملو من ٥ إلى ٢٠ م . أوراقها أبيضه بحرية اللون خلية الصفحة السفلى . نصلها يطلو نحو ١٨ سم . ويعرض نحو ٦ . أزهارها عطرية ، مكبسة ، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

## ٢٧٢٣٦ - مَغْطِيسِيَّة بَهِيَّة

*Magnolia denudata*, *M. conspicua*, *M. precisa* (S). *Magnolia magnifique*, *M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها عابلة ، لامة الصفحة ، تطلو من ٧ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم . أزهارها عطرية ، تساعية البتلات المنصبة ، قطرها براوح من ١٠ إلى ١٥ سم . لوها إلى البياض الثلجي ونها شروب وزدية اللون أو حواء . أزهارها يستمر طوال شهر نيسان .

## ٢٧٢٣٧ - مَغْطِيسِيَّة زَنْبِيَّة الزَّهَر

*Magnolia liliflora* (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . ضروره وأصرامه عديدة ، جميعها جنبات فرعاء تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها عابلة بيضية ، نصلها مقطوم القاعدة ذرب الطرف يطلو من ١٠ إلى ١٥ سم . ويعرض من ٦ إلى ١٠ سم . أزهارها زنبية الشكل ، سداسية البتلات الملونة ، فواحة العرف العطري . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

## ٢٧٢٣٨ - مَغْطِيسِيَّة صَغِيرَة الزَّهَر

*Magnolia parviflora* (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابلة تطلو من ١٢ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . نصلها مالمس البشرة كثير العروق الواضحة . أزهارها بيضاء اللون ، عطرية العرف ، سداسية البتلات ، قطرها براوح من ٨ إلى ١٠ سم . || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٧٢٣٩ - مَغْطِيسِيَّة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

*Magnolia salicifolia* (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية . شجرتها هربية الشكل تملو من ٣ إلى ٦ أمتار . أوراقها عابلة ، صفصافية الشكل ، بحرية اللون تطلو من ٦ إلى ١٦ سم . وتعرض من ٣ إلى ٩ سم . أزهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، ثلاثية الفصل ، سداسية البتلات ، قطرها براوح من ٨ إلى ١٢ سم . أزهارها يستمر طوال شهر نيسان .



مغنولية



## ٢٧٢٥٦ - مِفْصَلَةٌ ، مُمَايَزَةٌ

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفصلة أو المايزة الارتدادية ، بيولوجيا ، رجوع المحبيرات أو الخلايا الى الحالة المصغية عند زرع الانسجة .

## ٢٧٢٥٧ - مُفْتَتِحُ التَّابِين

Apériteur (F).

هو الموزن الذي يفتتح عقد التابين بفتحيه والزامه بمبلغ معين . وهو الذي يفاوض وليس على المؤمنين الآخرين الذين يقومون المقد الأملق القبول .

## ٢٧٢٥٨ - مُفْتَرِشَةٌ ، قَارِشَةٌ

Etalée (F).

Spread (E).

نمت تعريفي توصف به النباتات التي تلحف التربة بأوراقها ولاشياء المنبسطة الصفحات الكبيرة .

## ٢٧٢٥٩ - مَفْتُوحَاتُ الْمَنَاطَاتِ

Physostomes (F).

رقبة من الاسماك تعرف أيضاً بلبينات الزعانف .

## ٢٧٢٦٠ - مُفْتَحٌ

Carbonifère (F).

Carboniferous (E).

## ٢٧٢٦١ - مُفْرَدُ التَّحْدُبِ

Plan convexe (F).

Convex plane (E).

## ٢٧٢٦٢ - مُفْرَدُ التَّقَعُرِ

Plan concave (F).

Concave plane (E).

## ٢٧٢٦٣ - مُفْرَدُ الدَّوَرِ

Monophasé (F).

Monophasis (E).

## ٢٧٢٦٤ - مُفْرَدَاتُ

Simples (F).

هي النباتات الطبية التي يعالجون بها بعض الامراض .

## ٢٧٢٦٥ - مُفْرَدَاتُ الْأَصَابِعِ

Périssodactyles (F).

Perissodactyla (E).

رقبة حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الخيليات والكركنيات والتايريات .

## ٢٧٢٦٦ - مُفْرَصَدٌ

Acinaire (F).

Acinous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات تعلق لحاء ساقه او اغصانه حويصلات صغيرة تشبه للفرد ، وهي تزايدات طبيعية لا علاقة لها بأي وسم كان .

## ٢٧٢٦٧ - مُفَرَّقٌ

Potentiomètre (F).

Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

## ٢٧٢٦٨ - مُفَرَّمَةٌ

Hachoir (F).

هي المخذعة ، راجعها .

## ٢٧٢٦٩ - مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ

Multilobé (F).

Multilobate (E).

ما كان كثير الفصوص أو الفلق .

## ٢٧٢٧٠ - مِفْصَلَةٌ

Ecosseuse (F).

Sheller (E).

آلة تستعمل لأنتزاع زبور القريليات من سنفها .

## ٢٧٢٧١ - مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ ، مِفْصَلٌ

Lobé, Lobulé (F).

Lobate, Lobed (E).

## ٢٧٢٧٢ - مِفْصَلَةٌ ، مِفْصَلَةٌ

Seringue (F).

Syringe (E).

صفحة العليا بحرية اللون لامة ، صفحة السفلى خلية طلاء . ازهارها غادة البرق ، فسقية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . ثمارها كالحبات الصغيرة تبدو بحرية الخضار ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الادراك || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

## ٢٧٢٦٦ - مَقْنُولِيَّةٌ نَجِيَّةٌ

Magnolia stellata (S). Magnolia étoilé (F). نوع من المَقْنُولِيَّةِ التَّيْبِيَّةِ . ثمرتها هريمية الشكل تعلق من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها عابلة مائلة زاهية الخضار تعلق من ١ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها مكبة نجية الشكل تعد من ١٢ الى ١٨ بطة ، قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها عطرية العرف ، يفضاء اللون ، قدبة الصفحة ، مدببة الطرف ، منبسطة الارتكاز || ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .

## ٢٧٢٦٧ - مَقْنُولِيَّاتُ

Magnoliaceae (S).

Magnoliacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديدة القعالات . اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها اشجار وحميرات . اوراقها متعاقبة بسيطة جلدية النصل . ازهارها خطرية او وسدية المسكن ، فردية او عنقودية التجميع . منبها البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والتزيينية .

## ٢٧٢٦٨ - مَقْنِيٌّ

Villa (F).

هي الدارة ، اطلبها .

## ٢٧٢٦٩ - مَقْنِيَّيُومٌ

Magnésie (F). Magnesia (E).

هي اكسيد المغنيزيوم ، يعتبر في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الاولية .

## ٢٧٢٥٠ - مَقْنِيَّيُومٌ

Magnésium (F).

Magnesium (E).

مدن صلب ، لونه الى البياض الفضي ، رمزه (Mg-) وزنه الاتومي ٢٤,٣٢ . نقله النري ١,٧٥ ينصهر في ٦٥٠°سج . وهو يمتزق في الهواء الطلق ، اشتعاله باهر اللهب الواجبة . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملح فسهل شديد الفاعلية .

## ٢٧٢٥١ - مَقْنِيَّاسٌ

Hygrophile

نمت تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش الا في المواق الرطبة .

## ٢٧٢٥٢ - مَقْنِيَّالٌ

Touffu (arbre) (F).

Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الاغصان الكثيرة الورق .

## ٢٧٢٥٣ - مَقْنِيَّةٌ \* ، حَشِيَّةُ السَّاطِ

Mollugo (S). Mollugine (F). Mollugo, Carpet-weed (E).

Mollugo (D). Mollugo (I).

جنس اشباب برية حولية من المَقْنِيَّاتِ . انواعه نحو ٣٠ ، اصلها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها مرصوة تستحبها الماشية .

## ٢٧٢٥٤ - مَقْنِيَّاتُ

Molluginae (S).

Molluginées (F).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجيليات . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها برية مرصوة .

## ٢٧٢٥٥ - مَقْنِيَّسٌ

Mare (F). Pool, Pond (E).



مَقْنِيَّةٌ

Epouilleuse (F).

Cleansing apparatus (E).

صندوق صغير يوضع فيه الطائر باستثناء رأسه لمعالجة ضد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

Funiculé (F). Funiculat (E). ٥ - مُفْتَقِل

نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز بفنقل .

Argument a fortiori ٢٧٢٩١ - مَفْهُومُ الْاَوْتَرِيَّةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان هناك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة اولى من تطبيقه على المنصوص عليها .

٢٧٢٩٢ - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

Argument a contrario (F).

حجة ثبوتية للتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص القانوني .

Argument a pari (F). ٢٧٢٩٣ - مَفْهُومُ الْمَوَافَقَةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها لان اسبابها تضاهي اسباب الحالة المنصوص عليها .

٢٧٢٩٤ - مَفْرُوضُ الْيَاتُوعِ

Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E).

المفروض له بالتوقيع هو الذي يوكله غيره بالقيام بمقامه في بعض ما له من سلطة .

Eléphantiasis (F). ٢٧٢٩٥ - مَقْبُولَةٌ ، دَاءُ الْفِيلِ

Elephantiasis (E).

التهاب مزمن يعترى جلد قوائم الخيل والبقر .

Ostiole (F). Ostiol (E). ٢٧٢٩٦ - مَقْ

هو الشق الدقيق المستطيل الذي يتفلق عن البوغ عند الادراك .

٢٧٢٩٧ - مَقَارِ الْقُطْبِ ، مَقَارِ رَاهِبٍ ٥

Fratercula arctica (S).

Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).

Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).

نوع من الخمار ، طائر مائي من فصيلة البطريقيات . اعطاه المناطق القطبية الاسيوية والاروپية والامريكية . ينزع في زمن الشتاء العاصف الى البلاد الشمالية التي لا يفترها الجليد || ملجئه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد . قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات ||

جسمه ربعة ، كثر ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بمنقاده البريمي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي الى السواد الاسم . ثوبه السفلي وبصره الى الياض الناصع . عنقه مطوق بقلادة عريضة الجعدة من لون الرأس والرداء . منقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، احمر الطرف . حدقة عينه عاجية . اجفانه وكحلة عينه الى

الجزوة . رساه الى الحمرة البرتقالية الموج | الاثنى امير قداً من الذكر وتحتل بنفس الثوب . وكنته نفرة يعني بحفرها وترتيبها في اعل مرتفعات الجبال المدة للحسن .

الحضنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الاثنى بمناوبة الذكر ،

ينجز في الليل فقط .

Articulé (F). Articulata (E). ٢٧٢٧٣ - مِفْصَلِي

نعت تعريفي يطلق على كل عضو مركب من فصل ، كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

Arthropodes (F).

Arthropoda (E).

صنف من الحيوانات يشمل شعب الحشرات وكريرات الارجل والعنكبوتيات والقشريات .

Desmodie (F).

نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم ارقيس .

Desmodie du Bengale ٢٧٢٧٦ - مِفْصَلِيَّةُ الْبَنْغَالِ

نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلبه .

Champignonnière (F).

Mushroom bed (E).

المكان المد لزراعة الفطور .

Muselière (F).

هي الكأمة ، اطلها .

Octographe (F).

المفعال ٢٧٢٧٩ - مِفْعَال ٥  
هي لمعة مهي نشاط .

Aphromètre (F).

Aphromet (E).

جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر القوارزة .

Rentable (F). Profit-earning (E). ٢٧٢٨١ - مِفْعَال

راجع مرياح .

Van (F). Fan, Van (E).

اداة خاصة تستعمل في ذر الببادر لفصل البر عن الدق . ج مغازل .

Voltmètre (F). Voltmeter (E). ٢٧٢٨٣ - مِفْلَاط

مقياس التحليل الفلطي .

Failli (F).

Bank-rupt, Insolvent (E).

هو كل صاحب مستقل او متجر حكمت المحكمة بشهر افلاسه .

Pleuronectidae (S).

Pleuronectidés (F). Pleuronectidae (E).

هي جانبيات الموم ، اطلها .

Décussé (F). Decussate (E).

صفة المنسوب النباتي المتساوي الانفلاق العلوي .

Fissiflore (F).

Fissifloral (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات متفلق التويجات الزهرية .

Mouflon d'Europe (F).

٢٧٢٨٨ - مَقْلُون  
نوع من الاروية يسمى اروية كورسيكة ، اطلها .



مَقَارِ الْقُطْبِ

27308 - **مُتَاوِل رَادِف** (F). Sous-entrepreneur (F).  
Sub-contractor (E).

هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

27309 - **مُقَاوِمَة** (F). Résistivité (F). Resistivity (E).

27310 - **مُقَايَسَة ، مَبَيِّن تَفْصِيلِي** (F). Devils (F).

بيان مفصل بالأعمال المقصودة مقروناً بشئ كلفها .

27311 - **مُقَايَضَة ، قِيَاض** (F). Echange, Troc (F).

Exchange, Barter, Truck (E).

عقد يدفع أحد طرفيه إلى الآخر شيئاً أو يتنازل له عن حق مقابل عين أخرى أو حق آخر . وفي كانت المقايضة بيع أعيان أو حقوق بأعيان أو حقوق فهي القياض .

27312 - **مُقَابِلَة** (F). Rétrocession (F).

Retrocession (E).

التنازل إلى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

27313 - **مُقَايِس** (F). Mesures (F). Measures (E).

27314 - **مُقَبَض ، مِقْوَم** (F). Mancheron (F).

Stilt (E).

من أجزاء المحراث ، الحشبة التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

27315 - **مُقَبِط** (F). Mélangeur (F). Mixer (E).

آلة تستعمل لخلط الأشياء كالأسمنت وغيرها .

27316 - **مُقْبُورَات** (F). Recettes (F).

Receipts, Returns (E).

المقبورسات نجم ثمر من كوكبة برج التوأمن مركزه على الركنة اليسرى من التوأمن المؤخر .

27318 - **مُقْتَى** (F). هو القنأه ، اطلبه .

27319 - **مُقْتِير \* ٥** (S). Mactra (S).

Mactre (F). Mactra (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وقصيلة المختبرات . أنواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠

منتشرة في معظم بحار العالم || أصدانها شبه قروية الشوذن مائلة السطوح . مثابها معتدلة الطول مزدوجة || تعيش

في الرمال المنمورة بالماء قرب المصببات والأغوار || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

27320 - **مُقْتِيرِيَّات ٥** (S). Mactridae (S).

Mactridés (F). Mactridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المعروفة كثيرة المدد جميعها معتدلة الحجم ،

متشابهة الأشكال ، ثنائية المضارع ، مستغلة العلاقات الدفاعية || أصدانها منظم بحار العالم أخصها بحار المناطق

المعتدلة الحرارة || أشهر أجناسها المختير والصمرح والصلفة والكومنتجة .

27321 - **مُقْنَنَة** (F). Culture de concombre flexueux (F).

زراعة القنأه وموضع هذه الزراعة كالملبحة البطيخ .

27298 - **مُقَارَض ، مُضَارِب** (E).

Commanditaire (F). Sleeping partner (E).

هو الشريك في إحدى شركات القراض أو المضاربة فلا يفتن من ديون الشركة إلا قدر ما يوزي حصته فإذا كانت شركة القراض بالسهم أطلق على المقارض اسم المساهم .

27299 - **مُقَاَسَمَة الْمُتَنَازِع فِيهِ** (F).

Pacte de quota litis (F).

شرط يتنقذ بين المتنازعي والمحامي على أن أتأب القضية تكون جزءاً من كسبه وهو محظور في اللوائح المهنية .

27300 - **مُقَاَصَة** (F). Compensation (F).

Compensation (E).

«هي إحدى وسائل الوفاء ، ترميها الشامل أن يتوافق التزامان متبادلان بين شخصين ويكون محل الالتزامين مبلغاً من النقد أو أشياء مثلية من نوع واحد . ويكونان مستحقين الدفع غايلين من الزراع واجبي الوفاء في مكان واحد . وإذا أدى أحد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الأدنى فقط » || والمقاصة قد تكون :

Compensation totale (F).

Total compensation (E).

مقاصة تعاقدية - بالتراضي

Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية

Compensation partielle (F). Partial compensation (E).

مقاصة قانونية

Compensation légale (F). Legal compensation (E).

مقاصة قضائية

Compensation judiciaire (F). Judicial compensation (E).

27301 - **مُقَاَصَاة الضَامِن** (F). Poursuite (F).

Suit, Proceedings (E).

«هي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي أو حكم . وهي في القانون الجنائي الإجماع والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني أو المجرم .»

27302 - **مُقَاَصَاة الضَامِن** (F). Appel en garantie (F).

«إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يكون عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حتى يجعل من الضمون له ما يمكن أن يحكم به عليه .»

27303 - **مُقَاَط** (F). Colporteur (F).

Hawker, Pedlar (E).

هو البائع الجوال .

27304 - **مُقَاَطِع** (F). Tâcheron (F).

One working by the job (E).

هو العامل المتقيل .

27305 - **مُقَام** (F). Dénominateur (F).


Denominator (E).

27306 - **مُقَاوِس** (F). Jockey (F).

هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

27307 - **مُقَاوِل ، مُقْتَرِم ، مُتَعَهِّد** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).

هو الذي يرتبط بمقدد المقاوله وبأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقير

٢٧٣٣٧ - مَقْرَأْ\* ، مَقْصَ السُّتَانِي ، مِقْصَ  
التَّقْلِيم ، مِقْصَ الشَّجَر (F).  
Sécateur (F).  
Pruning-scissors (E).  
مقص تقليم به أغصان الشجر .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون\*  
Macrodon (S).  
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات الخانة وقصيلة القرصانيات  
انواعه المعروفة اربعة اعطائها أنهر وبحيرات المناطق  
الاستوائية الامريكية || اجسامها مستطيلة الشكل ،  
متدلة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها  
متوسطة الحجم . اشداقها رحيه . اسنانها كبيرة ، ذرية ،  
فردية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية محدلة الحجم  
يغلب فيها الشكل المربع . زعانفها الحوضية غليظة  
الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها  
الذيلية مستديرة الاطراف عند جميع الانواع . اذنيها تراوح  
من الرتبة الى الكهبة . رؤوسها وتظهرها اعين خضابا  
من بطونها || لحومها متوسطة الصفت ، مأكولة || اعرف  
انواعها واشهرها مقردون ترابيرا (Macrodon trahira)  
الذي يكثر وجوده في أنهر البرازيل والفوايا .

٢٧٣٣٩ - مَقْرَط  
Pinceuse-rogneuse (F).  
اداة تستعمل لقطع سروع الكوية .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة  
Courgerie (F).  
منبت القرع ويوضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَات  
Ascoceratidae (S).  
Ascoceratidae (F). Ascoceratidae (E).  
مرتبة من الرغويات تنتمي الى رتبة رباعيات الخياشيم  
فصلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها من  
متحمرات الازمنة الغائبة .

٢٧٣٤٢ - مَقْرِنُس\*  
Macrorrhinus (S).  
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).  
جنس حيوانات لبونة ، مائية ، من فصيلة الفقعيات .  
انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق المحيط  
المحادي || اجسامها كبيرة القد . ذكورها اكبر من اناثها  
واضخم . رأس الذكر عذوب المقدم ، غليظ الشكل ،  
ينتهي بظفر احسن فكه العلوي يشرف على السفلي . عنقه  
وقوائم قصيرة || قوتها الاسماك والرغويات والقشريات . عنقه  
الانثى تضع جروا واحدا في العام || تصاد من اجل جلدها  
وزيوتها وضامها || اعرف انواعها الصرغامي والصيق  
الحلم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرِنُس صِرْغَامِي\*  
Macrorrhinus leoninus (S).  
Macrorrhine léonin (F).

نوع من المقرنيس . اعطائه مناطق جنوب المحيط المحادي .  
طوله نحو ٩ امتار . فوه كستني اللون يمتد عند الظهر  
ويصغر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرِنُس صَبَّيْخُ الخُطْمِ\*  
Macrorrhinus angustirostris (S).  
Macrorrhine à rostre étroit (F).

نوع من المقرنيس . اعطائه مجاذع المكسيك وكليفلورديه .  
طوله نحو سبعة امتار . ثوبه الى الجلوده السفعاء المواج  
تتبع عند الظهر وتصغر وتنبثر عند البطن .

٢٧٣٣٧ - مِفْطَحَة\* ، مِفْطَحَة  
Ratissoire (F).  
Scraper (E).  
نصل عريض قاطع مركب على عصا تتحط به الاقدار  
والاشباب .

٢٧٣٣٨ - مِفْطَحَ خَارِجِي\*  
Exopodite (F).  
المفد الخارجى ، انتوبولوجيا ، جزء مفصل من الفك  
مركزة في الجانب الخارجى من الحرقوة حيث يشرف على  
الركبة || والمفد الخارجى ، زوولوجيا ، جزء من  
زوائد المفصليات يملو ، مع المفد الداخلى ، القسم  
القاعدي .

٢٧٣٣٩ - مِفْطَحَ دَاخِلِي\*  
Endopodite (F).  
المفد الداخلى ، زوولوجيا ، جزء من زوائد المفصليات  
يملو القسم القاعدي .

٢٧٣٤٠ - مَقْدَمُ الإِرْث  
Avancement d'hoirie (F).  
هو التبرع لاحد الورثة الاحتماليين بجزء من نصيبه في  
تركة المتبرع .

٢٧٣٤١ - مَقْدَمُ الجِسم ، مَقْدَمُ الجِسم  
Avant-main (F). Fore hand (E).  
في الخيل والانعام وما اشبه .

٢٧٣٤٢ - مَقْدَمُ الجَوْشَن  
Prothorax  
هو في الحشرات القسم الاول من الجوشن او الحلقة  
الصدرية الاولى .

٢٧٣٤٣ - مَقْدَمُ المِحْرَاث ، مَقْدَمُ المِحْرَاث  
Avant-train (F). Wheels (E).  
الجزء الامامى من المحراث حيث يوجد الناظم والمجتلان .

٢٧٣٤٤ - مَقْدَمَات  
Primates  
هي الرئيسات ، رتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات  
والقرديات والليموريات .

٢٧٣٤٥ - مَقْدَمُورُ القِسْمَةِ ، قَابِلُ القِسْمَةِ ،  
مُنْقَسِم  
Divisible  
هو ما كانت قسمته جائزة .

٢٧٣٤٦ - مَقْدَمُوتْس  
Persil (F).  
نبات بقلي مشهور باسم بقدونس ، اكلية .

٢٧٣٤٧ - مَقْر  
Amer (F). Bitter, Harsh (E).  
مقر الشئ : صار مرأ فهو مقر .

٢٧٣٤٨ - مَقْر ، مَقْعَدَان  
Aloès (F).  
هو الألوة ، نبات صناعى وزيتي .

٢٧٣٤٩ - مَقْر  
Acaule (F). Acaulous, Stemless (E).  
النبات العديم الساق ويدعى ايضا نجمة .

٢٧٣٥٠ - مَقْرَأْس ، مَقْرَأَة  
Réfrigérateur (F).  
Réfrigérateur (E).

٢٧٣٥١ - مَقْرَأَص\*  
Greffoir (F).  
Grafting-knife (E).  
سكين خاصة منقطة الطرف تستعمل في التطعيم .



مِفْطَح



مَقْرَأَص




مَقْرَأَص




مَقْرَدُون



مَقْرِنُس صِرْغَامِي



مقصب



مقاع



مقبي



مقل

Cotonnerie (F). **مَقْطَنَة** - ٢٧٣٦٣  
Cotton-plantation (E).  
الارض التي تزرع فيها القطنان . ج مقطن .

Chapon (F). Capon (E). **مَقْطُوش** - ٢٧٣٦٤  
هو الطوئون اي فرخ الدجاج الخفي . ج مقاطيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْطُوم** - ٢٧٣٦٥

Epicyrus (S). Epicyrte (F). **مَقْطِي** \* - ٢٧٣٦٦  
جنس اسماك نهريه من مفتوحات المائنه وفصيله السلونيات.  
انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض انهر البلاد  
الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اهليجية منبطة  
تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها مستطلة . قصيرة .  
عيونها كبيرة جاحظة . اشداها رجيبة . ظهورها ربيعة .  
مقدمها يشرف على الرأس . تتميز بزغافنها الشرجية  
المستطيلة وبالظهريه الثنائية العدد المتفاوتة الحجم .  
انوارها الى الريكة يملوها موج نفسي || غولها مأكولة .

Aloès (F). **مَقْعَدَان** - ٢٧٣٦٧  
هو الألوّة والمقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْعَر** - ٢٧٣٦٨  
نعت تعريفي توصف به الاشياء المقعرة السطوح ومنها  
الاوراق والازهار .

Concavilligne (F). **مَقْعَر الاطراف** - ٢٧٣٦٩  
Concavilline (E).  
نعت تعريفي وسني يستعمل في تصنيف الدوائن اخصها  
الخليل والافطار . ويكون مقعر الاطراف ذا جبهة مقعرة  
وحجاج بارز وكفل منحني الخ...

\* **مَقْل** - ٢٧٣٧٠

Balsamodendron africanum, Heudelotia africanum  
(S). Balsamé d'Afrique, Arbre à baume (F). Bal-  
samodendron kna, Bdellium tree (E). Afrikanischer  
Balsambaum (D). Albero balsamo d'Africa,  
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيله البخوريات ، منته البلاد الافريقية .  
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . شجيرة متوسطة القد  
فرواه . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية الشكل  
المغطية الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب .  
ثمارة جراء رباعية الفلق . يستخرج من ساقه عصارة  
وراثنية بخورية فائرة الصنفر ويستعمل من زهره عطر  
حزير .

Marrube blanc (F). **مَقْل الصَيْف** - ٢٧٣٧١  
هو الفراسيون الابيض . اطله .

Bdellum Indicum (S). **مَقْل الْبَهْود** - ٢٧٣٧٢  
Balsamé de l'Inde (F). Indian bdellium tree, False  
myrrh, galgal (E). Indisches Bdelliumbaum (D).  
Bdellio (I).

نوع من اللسان وفصيله البخوريات . يكثر في بعض  
الاصقاع الهندية . شجيرة صغيرة القد . اوراقه مركبة  
ثلاثية او خاسية الوريقات . ازهاره رباعية التركيب  
قواحة العرف || يستخرج من سوقه عصارة راثنية بخورية  
تستعمل في المايد ويستعمل من ازهاره دهن عطري  
مغروب فيه .

Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٤٥  
Kneading, Working (E).  
مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض وقيلها لتتجانس  
اجزائها بعد طرد الهواء منها .

Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٤٦  
هو الدبيق ، شجرة حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٤٧  
Crémometer (E).  
مقياس القشدة .

Ebogueuse (F). **مَقْشَر** - ٢٧٣٤٨  
آلة تنزع القشور الشائكة التي تغلف ثمار الكستنا .

Décortiqueur (F). **مَقْشَرَة** ، **مِكْشَطَة** - ٢٧٣٤٩  
Disbarked (E).  
اداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار  
من القشور اليابسة .

Sécateur (F). **مَقْص الْبُسْتَانِي** - ٢٧٣٥٠  
Pruning-shears (E).  
مقص البستاني . ويقص التقليم ومقص الشجر والمقراض  
واحد .

Canale, Roselière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥١  
Cane-plantation, Reed-bed (E).  
كل مكان زرع فيه القصب بكرة او نبت طيبيا .

Faux (F). Scythe (E). **مَقْصَب** \* - ٢٧٣٥٣  
اداة كالمنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد  
والخش .

Luzernière (F). **مَقْصَبَة** - ٢٧٣٥٤  
Lucerne-field (E).  
المكان المخصص لزراعة القصب اي الفصة .

Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٥٥  
هو بيع التجوال .

Multipolaire (F). **مَقْطَاب** - ٢٧٣٥٧  
Multipolar (E).  
كثير الاقطاب .

Microtome \* ، **مَقْطَاع** - ٢٧٣٥٨

Distillerie (F). **مَقْطَرَة** - ٢٧٣٥٩  
Distillery, Still-house (E).  
صناعة التقطير وبصل انتاجه .

Section **مَقْطَع** - ٢٧٣٦٠  
Soc (F). Ploughshare (E). **مَقْطَع** - ٢٧٣٦١  
جزء رئيسي من محراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع  
كتلة التراب انقيا .

Griffe (F). Root (E). **مَقْطَم** - ٢٧٣٦٢  
القطم ج مقاط : هي الفروع الناشئة عن ارمدة الحليين  
واشباذه من النبات .

## Lip (F). ٢٧٣٨٥ - مَقَمَّة ، مِقَمَّة

Thick lower lip (E).  
هي المومة اي شفة الحيوانات المجترية كالابقار والاعنام  
وللماعر .

## Patte (F). Paw (E). ٢٧٣٨٦ - مَقَنْب

كف الامة ، مخبط الامة في مقنبه . ج قنوب .

## Chênevière (F). Hemp-field (E). ٢٧٣٨٧ - مَقَنْبِيَّة

مزدراع القنب مها اتسع .

## Mimule (F). ٢٧٣٨٨ - مَقَنْبِيَّة

هي الدندل ، اطليه .

## Calyptraea (S). ٢٧٣٨٩ - مَقَنْبِيَّة \* ٥

Calyptrée (F). Calyptraea (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديبات الارجل  
وحيدات الاجهزة وفصيلة القرويعيات . انواعها المعروفة  
عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطباشيرية والثالثة  
والبعض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم . جميع  
انواعها تحضن الشلق على الصخور ملحوظا بارجلها ||  
اصداؤها يرمعية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوقة المقدم .  
اقواها مستديرة . لواصها مستطيلة . عيونها صغيرة قاعدية .  
غياشيمها حلبيبة الشكل ، قاسمة .

## Miconia (S). Miconie (F). ٢٧٣٩٠ - مَقَوَانِيَّة

Indian bush (E). Mikonie (D). Miconia (I).  
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القرايات .  
انواعها زهاء ٥٠٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية .  
اوراقها لا قياسية الشكل والترتيب . ازهارها ابطية وطرفية  
الارتكاز . مجارها حلمية مستديرة قاسية القشور . منها انواع  
حمية . اوراقها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها طيبة  
يستعملون مجارها في معالجة علل المرارة . ومنها صناعية  
صبغية غضاها اصفر اللون جيد الصنف .

## Licol, Licou (F). Halter (E). ٢٧٣٩١ - مَقَوَد

اداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

## Starter ٢٧٣٩٢ - مَقَوَس

حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقاروس .

## Bouleté, Juché (F). ٢٧٣٩٣ - مَقَوَس الحَوْشَب

Upright on fetlock-joint (E).  
تقويس في حوشب القرس يعتبر من عيوب الخيل القاسية .

## Arqué, Brassicourt (F). ٢٧٣٩٤ - مَقَوَس الرَكْبَة

Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).  
نعت يوصف به القرس المقوس الركبة طبيعيا لا عن مرض  
ولا عن هرم .

## ٢٧٣٩٥ - مَقَوَس

«طائر معروف مطوق سواده في البياض كالحمام» . (الجاحظ) .

## Machson (F). ٢٧٣٩٦ - مَقُون

فراشة من المذانيبات ، يرقها تعيش على اوراق الجزر  
والشار . راجع مذئاب مقون .

## ٢٧٣٧٣ - مِقْلَاب ٥ ، دَاثِرَة الْإِنْقِلَاب

Tropique (F). Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي  
الانقلاب الصيفي والشتوي اي دائرة السرطان ودائرة  
الجدي .

## Tropical (F). Tropical (E). ٢٧٣٧٤ - مِقْلَابِي ٥

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقولك  
المناخ القلاني والامطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي  
أحر مناطق الكون .

## Atmomètre (F). ٢٧٣٧٥ - مِقْلَاص ٥

Atmometer (E).

جهاز خاص تقاس بوسلته مقادير سوائل تبخرت في  
مدة معينة .

## Versoir (F). Mould-board (E). ٢٧٣٧٦ - مِقْلَب

جزء محراث الذي يقبل كتلة التراب بعد أن يقطعها  
المقطع .

## ٢٧٣٧٧ - مِقْلَبِيَّة ٥ ، تَمَقْلُب ٥

Tropicalisation (F).

المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وغيرها لا تتأثر  
بالمناخ القلاني .

## ٢٧٣٧٨ - مِقْلَبَة الْقَاصِي \* ، يَطْبِخ شَوْكِي

Melocactus (S). Mélocacte, Mélocactus, Melon-car-  
don (F). Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E). Melon-  
enkactus (D). Papone spinoso (I).

جنس نباتات حلمية شائكة من فصيلة السباريات . انواعه  
نحو ٣٠ منظرها زينة . اصطابها البلاد الحارة . سوقها  
بطيحية الشكل ، مخززة ، شائكة ، عادمة الورك . ازهارها  
اورصوية الارتكاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والالوان  
الزاهية . ثمارها ، عنية حمراء اللون ، ملساء البشرة .

## Fauchard (F). Slash-hook (E). ٢٧٣٧٩ - مِقْلَد

المنجل يقطع به القت والغشب .

## Carrière (F). Quarry (E). ٢٧٣٨٠ - مِقْلَع

ويدعى المنجر والمقلع ، هو المكان الذي تستخرج منه  
الحجارة .

## Déplantoir (F). ٢٧٣٨١ - مِقْلَع

Garden-trowel (E).

اداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع شي من التراب  
يحفظ شروشها ريثما تنرس في مكان آخر .

## Dégazonneuse (F). ٢٧٣٨٢ - مِقْلَعَة الْخَضِير

Unturfer (E).

محراث مفلطح المقلع العريض القصير ، له سكتيان ، يستعمل  
في اقتلاع الخضير .

## Conserves (F). ٢٧٣٨٣ - مِقْلَعَات ٥

Conserves, Preserves (E).

هي الاطعمة المحفوظة المقطوع عنها الهواء . وينهم من  
ساما معلبات . ويدعونها ، في مصر ، الكنسرة  
والكنسروات .

## ٢٧٣٨٤ - مِقْلَم

قصب الثور والتميس والجلمل . والمقلعة : وهاء القصب .



مقلّة القاصي



مقعة

## ٢٧٤١٠ - مِقْيَاسُ الْغُلُوكُوز ، مِيزَانُ الْغُلُوكُوز

Pèse-mûlt, Glucomètre, Glucomètre (F), Glucometer (E).

أداة تقاس بها المواد السكرية في عصير العنب أو في الخمر .

## ٢٧٤١١ - مِقْيَاسُ الْعَبْلَان

Ebulliomètre, Ebullioscope (F), Ebullimeter (E).

جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لغيان كل جسم أو مائع .

## ٢٧٤١٢ - مِقْيَاسُ الْقَشْدَة ، مِيزَانُ الْقَشْدَة

Butyroscope, Crémomètre (F), Creamometer (E).

هو المكثاة ، أداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

## ٢٧٤١٣ - مِقْيَاسُ الْقُوَّة

Dynamomètre (F).

Dynamometer (E).

هو المنشاط ، أطلبه .

## ٢٧٤١٤ - مِقْيَاسُ الْكُحُول

Pèse-esprits (F).

هو المكحال ، أطلبه .

## ٢٧٤١٥ - مِقْيَاسُ الْكِلْس

Calcimètre (F).

Calcimeter (E).

هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

## ٢٧٤١٦ - مِقْيَاسُ اللَّسَان

Glossomètre, Glottomètre (F), Glossometer (E).

هو اللسان ، جهاز يقاس به خطوط النحل لمرقة الانواع الاصلح من غيرها في ارتشاش رحيق الزهر .

## ٢٧٤١٧ - مِقْيَاسُ اللَّوْن

Colorimètre (F).

Colorimeter (E).

هو الملوان ، جهاز يقاس به مقدار تلوّن السوائل والماتعات

لا سيما الأحمر ، أطلبه ملوان .

## ٢٧٤١٨ - مِقْيَاسُ مِثْوِي

Centésimal (F).

Centesimal (E).

## ٢٧٤١٩ - مَقْيَر \* ، مَكْيَر

Makaira (S).

Makaire (F).

جنس اسماك بحرية كبيرة القد من شائكات الزعنائف  
وفصيلة الاسقمريات . انواعه المروفة ثلاثة جميعها قريبة  
الشبه من سياف البحر ، اشهرها المغير الاسود الذي لا  
يقال طوله عن اربعة امتار وهو يتميز بكثر زعنفته الظهرية  
التي تشبه الشراخ وبجهازه العظمي الذي يمتد من فكه الاصل  
على شكل السيف .

## ٢٧٤٢٠ - مِقْيَف

Ehretia (S), Ehrette,

Cabrillet (F), Ehretia (E), Ehretie (D), Ehretia (I).

جنس الشجار ومججيرات من فصيلة الحمحميات . انواعه  
نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية .  
اوراقها متفكة ، متفابلة أو متنامية . ازهارها عشكوية التجميع ،  
ابطية الارتكاز وطولية . ثمارها مأكولة لكنها تفتح وهي  
نوروية ، لحية ، قدرها قدر الحمصة الكبيرة || اشهر  
انواعه ما يلي .

## ٢٧٤٢١ - مِقْيَف كَبِير الْوَرَق

Ehretia macrophylla (S), Ehrette à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).

نوع من المقيف ، ثيبرته سبروتية تملو من ٥ إلى ٨ امتار .

## ٢٧٣٩٧ - مِقْوَنَة \*

Mucuna (S).

Mucuna, Pois à gratter, Pois poulleux (F), Cowitch, Cowage (E), Jackfasel, Stechende Echte Fasel (D), Fagiolo di Rio Negro (I).

جنس نباتات عارشة من فصيلة الزينات القرشية . انواعها  
نحو ٢٥ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . سوقها لولية  
التبريش ، حواملها ثنائية . اوراقها مركبة ، طويلة الزناد  
ثلاثية الوريقات . ازهارها كبيرة القد حمراء اللون ، سفناتها  
مطلقة مجنحة مستطيلة الهدبة الطرفية الشائكة . بزورها  
مستديرة ، مبطلة ، هلبة البشرة ، تغفل عند لسها ما يفعله  
الفراس .

## ٢٧٣٩٨ - مِقْيَاس

Echelle, Mesure (F).

Ladder, Scale (E).

## ٢٧٣٩٩ - مِقْيَاسُ اخْتِمَارِ اللَّبَن ، مِضْرَاب ٥

Lacto-fermentateur (F).

أداة تترف بواسطها جودة اللبن . اسائها أن الحليب  
الودي يروب قبل الحليب الجليد في حرارة معلومة .

## ٢٧٤٠٠ - مِقْيَاسُ الْأَدْهَان

Oléomètre (F).

Oleometer (E).

أداة تقاس بها كثافة الادهان وتدعى مدعان .

## ٢٧٤٠١ - مِقْيَاسُ الْاِسْتَوَاء

Niveau (F), Level (E).

هو الفادن ، أطلبه .

## ٢٧٤٠٢ - مِقْيَاسُ الْأَشْعَة

Actinomètre (F).

Actinometer (E).

آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سيما الاشعة الشمسية .

## ٢٧٤٠٣ - مِقْيَاسُ الْأَمْلاح

Pèse-sels (F).

Araeometer for salt liquids (E).

مستكشف يبين بسرعة درجة كثافة الاملاح .

## ٢٧٤٠٤ - مِقْيَاسُ الْجِص

Gypsomètre (F).

Gypsumeter (E).

هو المقيصاص ، أداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس  
في الخمر .

## ٢٧٤٠٥ - مِقْيَاسُ الْحَبِيب

Aphromètre (F).

Aphrometer (E).

هو المقفعا ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في  
قناني الخمر الفوارة .

## ٢٧٤٠٦ - مِقْيَاسُ الرُّطُوبَة

Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

هو المرطاب ، أطلبه .

## ٢٧٤٠٧ - مِقْيَاسُ السُّطُوح

Planimètre (F).

Planimeter (E).

هو المسطاح ، أطلبه .

## ٢٧٤٠٨ - مِقْيَاسُ التُّكْر

Saccharimètre (F).

Saccharimeter (E).

هو المسكار والمسقار ، أداة تبن مقدار السكر المذاب  
في السائل المقصود .

## ٢٧٤٠٩ - مِقْيَاسُ الشَّجَر

Dendromètre (F).

Dendrometer (E).

هو المشجار ، أداة تستعمل لتقدير علو الشجرة وحجمها .



مقونة



مقي

Imperméable (F). **مِكْتَم** - ٢٧٤٣١  
Impermeable, Impervious (E).  
صفة التربة التي تملك الماء .

Acquis (F). **مِكْتَسَب** - ٢٧٤٣٢  
Acquired, Secured (E).  
نعت تعريفي تمت به الصفة المكتسبة من الحيوان او النبات حسنة كانت ام سيئة . وكلمة مكتسب هي نقيض خلقي اي فريحي .

Acquêts (F). **مِكْتَسَبَات** - ٢٧٤٣٣  
An acquisition (E).  
هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في اثناء الزواج .

**مِكْتَل** - ٢٧٤٣٤  
Vendangeoir, Vendangeret (F). Grape-basket (E).  
وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المعصرة .

**مِكْتَل** - ٢٧٤٣٥  
Bréviligne (F). Breviline (E).  
نعت تصنيي يطلق على الحيوانات القصيرة الجال الهيكل بالنسبة الى متوسط جال نوصها او سلاتها .

**مِكْتَلَفَة** - ٢٧٤٣٦  
Enclave (F). Enclave, Gore (E).  
كل ارض لا طريق لها ، والقانون يعطي صاحبها حق المرور .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٧  
Mycterus (S). Myctère (F). Mycterus (E).  
جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستطيلة الاضراس . عيونها بارزة . تاشبهها وكوكوها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قلادية . كواسلها معدودة . اغامها لاحقة . قوائمها نشطة . انثواها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفحمة والجلوة . كواسلها واغامها مغلفة بمخل دقيق اشبه اللون او اخضر . تألف الحراج والبراري والحدائق . جميعها واسعة . اما البرقة فنادرة .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٨  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

**مِكْتِير** - ٢٧٤٣٩  
Mycterla (S). Jabiru (F).  
جنس طير من اللقائي ، انواعه المعروفة ثلاثة : المِكْتِير الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز بمنقبتها الغليظة المستطيلة المرسوبة القاعدة . اجنحتها رافلة . اذنانها قصيرة مربعة . ارساغها رفيعة . اصابعها كبيرة القد صغيرة الخياط والخال || اعرف انواعه واشهرها المِكْتِير الافريقي .

اسطوانات فسيحة الاجزاء تمتد من الهند الى اليابان . ساقها اسطوانية . فروصها مضلعة زياه اللحاء . اوراقها متعاقبة ، بيضية ، مقطوعة الطرف ، تطول نحو ٢٠ سم . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

**مِفْيَت مَدْبَب الْوَرَق** - ٢٧٤٢٢  
Ehretia acuminata (S). Ehretia à feuilles acuminées, Cab. illet à feuilles acuminées (F).  
نوع من المقيف وهو شجيرة جاحدة تطول من ٦ الى ١٦ متر . مهددا الهند . ساقها وفروصها اسطوانية ملسة . اوراقها متعاقبة ، سنائية الشكل ، ذرية ومديبة . نصلها يطول من ١٠ الى ١٠ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل المنق ، مسنن الحافة ، لامع الصفحة || ازهارها بيضاء اللون . ثمارها مأكولة .

**مِفْيَت** - ٢٧٤٢٣  
Emétique (F). Emetic (E).  
Terrier (F).  
Burrow, Hole (E).  
هو جحر القرواع اي الارنب البري ونحوه . ج اماء .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٤  
Lepidium meyenii (S). Maca (F).  
نبات حولي يقل من فصيلة السليبيات . مهدد بعض مرتفعات جبال الاند الايريكية . ساقه لغنية الشكل والقد ، مأكولة . اوراقه قوسية الانشعاب ، مركبة ، ريشية . شمرانها الزهري يطول نحو ٤٠ سم . ازهارها عككولي . ازهار صغيرة القد ، وردية اللون . غريباته بحيلة مستطيلة . يزوره كروية دقيقة || يتكاثر باليزر . منبته الاقاليم الجبلية . يرغب في التربة الخلوة الوفرة العناصر الغذائية .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٥  
Certhilauda (S). Sirli (F).  
Bifasciated lark (E).  
جنس طير من فصيلة القربيات . انواعها ستة ، بعضها صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادنى واروبة وطسا جميعها تصيد في الجو رهيبون وهي في ذلك تمكرو وتصفر . اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . انثواها متعادلة الانوان يكثر فيها الاخرج والاضحل . صدورها موشية . اعناقها بيضاء . منقبتها قوية مستطيلة منقرفة الطرف . خالها نشيطة ، حادة الاظفار ، تمكسها من استنار التربة || تألف الغمام والاراضي للمحاسة قوتها الحشرات واليزور البرية || تدن عشها في افحوص بين الاذغال والحش . فضتها حولية تتألف من ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناورة الذكر .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٦  
Emolument (F).  
Remuneration (E).  
هي ما يمنح من تعويض عن القيام بأمد التأدية .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٧  
Moelle (F). Pith (E).  
القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٨  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٢٩  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٠  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣١  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٢  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٣  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٤  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٥  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٦  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٧  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٨  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٩  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .

**مِكَا** - ٢٧٤٣٩  
Médullaire (F).  
Medullary, Medulla (E).  
Press (F).  
Pressure, Throng (E).  
آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة صناعات لغايات معينة .








مِكْنَاة



مِكْحَال



مِكْحَال الحمر



مَك



مِكْرَة مَبْدُولَة



مَكْرُور نَفْثِي



مَكْرُور مَبْدُول

القاعدة ذرب الزام الاخير، يبدو احمر اللون ويستقر على الخضار البحري تملوه حلة كثيفة. بتلات ازهارها صغيرة ضيقة تطول نحو ٢ سم. ثمارها حامضة لا تؤكل.

### ٢٧١٥٤ - مَكْرَة مَبْدُولَة \*، بَشْمَلَة

*Amelanchia rotundifolia*, *A. vulgaris* (S). *Amélan-chier commun* (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E). *Felsenbeer*, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*, *Traubenbirne* (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مبدولة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضيه مستديرة الطرف تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها يبدو قطبي الصفحة السفلى ثم يستقر على الحزمة. بتلات ازهارها خلية البشرة. ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم.

### ٢٧١٥٥ - مَكْرَة يَابَانِيَّة

*Amelanchia asiatica* (S). *Amélan-chier du Japon* (F). نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تطول من ١٢ الى ١٢ م. اوراقها شتائية، نصلها خلي الصفحة مسنن الحافة يطول نحو ٧ سم. ويعرض نحو ٤ سم. بتلات ازهارها قدية الشكل خلية الصفحة الخارجية. ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

*Cerisae* (S). *٢٧١٥٦ - مَكْرُوزَة*  
*Cherry-orchard* (E). هي مزروع الكرز.

### ٢٧١٥٧ - مَكْرُورُوم السَخْل

هو زعنوق السخل، اطلبه.

### ٢٧١٥٨ - مَكْرُور

*Macurus* (S). *Macroure*, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F). *Macurus*, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات. انواعه المعروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة. جميعها مستطيلة الاخطام الذلقة، قصيرة الاشداق السفلى، كبيرة العين الجاحضة، مستطيلة القدم، مستدقة المؤخر العادم الزعفة. سفنها مثلث الزوايا، مستطيل الطرف الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المبدول والنفسي.

### ٢٧١٥٩ - مَكْرُورُوفِي \*٥

*Macurus trachyrrhynchus* (S). *Macroure argenté*, *Lépidolèpre argenté* (F).

نوع من المَكْرُور يكثر وجوده قرب الساحل الافريقي من البحر المتوسط والخليج الاطلسي. طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الطحلة الفضية الملاج يعقب مع اقترابه من الظهر ويبيض عند البطن. لحمه متوسط الصنف مأكول.

### ٢٧١٦٠ - مَكْرُورُ مَبْدُول \*٥

*Macurus caelorrhynchus* (S). *Macroure commun*, *Lépidolèpre commun* (F). *Common Rat-tail* (E).

نوع من المَكْرُور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط. طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الريدة البنفسجية الملاج يعقب عند الظهر ويميل الى الفضي عند البطن. لحمه متوسط الصنف مأكول.

### ٢٧١٦١ - مَكْرُورِيَّات

*Macrouridae* (S). *Macrouridés*, *Macruridés* (F). *Macrouridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من المملاتوات شاكيات الزعانف. اجناسها وانواعها متوسطة العدد. اعطائها بحار المناطق

سواء. اساق الى الكعبة العابقة يملوها مواج احمر || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان. يأنث مجاري الماء وخصاف الاثر وشواطي البحر. قوته اخشرات والمظاه والحيات والاسماك. يئن في الانجبار. انشاء تحضن اربع بيضات.

### ٢٧٤٤٠ - مِكْنَاة

*Crémomètre* (F). *Creamometer* (E). اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب.

### ٢٧٤٤١ - مِكْنِاف

*Densimètre* (F). *Densimeter* (E). اداة تستعمل لمدرة الثقل النوعي في كل جسم.

### ٢٧٤٤٢ - مَكْنُف

*Condenseur* (F). *Condenser* (E).

### ٢٧٤٤٣ - مِكْنَفَة

*Condensateur* (F). *Condenser* (E).

### ٢٧٤٤٤ - مِكْحَال \*٥

*Alcoolomètre* (F). *Alcoholometer* (E). هو ميزان الكحول، جهاز ينفط في السائل الكحولي فيبين نسبة ما يحويه من كحول.

### ٢٧٤٤٥ - مِكْحَال الخَمْصَر \*٥

*Vinomètre*, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E). جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر.

### ٢٧٤٤٦ - مَكْنَلَة

*Jacinthe muguet* (F). نبات تربيني ينضج جاست. شرقي، اطلبه.

### ٢٧٤٤٧ - مَكْد

*Râteau* (F). *Rake* (E). اداة تستعمل لتضيق التربة.

### ٢٧٤٤٨ - مَكْدَس

هو السقيفة، اطلبه.

### ٢٧٤٤٩ - مَكْدَسَة

*Botteuse* (F). *Binder*, *Sheaf-binding machine* (E). جهاز يلوي أو آلي يستعمل لكس القش والبن وما اشبه.

### ٢٧٤٥٠ - مَكْر

مَكْر الارض: سقاها. امكرو الارض فانها صلبة ثم اخروها. والمكرو هي السقية. ج مكر ومكور.

### ٢٧٤٥١ - مِكْرَارَة \*٥، مَكْرَرَة

*Rectificateur* (F). *Rectifying* (E). جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك باعادة التقطير.

### ٢٧٤٥٢ - مَكْرَة

*Amelanchia* (S). *Amélan-chier* (F). جنس شجيرات وجنات برية وتربينية من فصيلة الورديات. انواعها عديدة، اعطائها بالعام. سوقها فروع. اوراقها بسيطة عابطة، نصلها كثيفة البروق. ازهارها عنقودي التجميع محوري الارتكاز. ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات البيضاء. ثمارها نورية، صغيرة القد، بنفسجية اللون || اعرف انواعها سنا بل.

### ٢٧٤٥٣ - مَكْرَة كَنْدِيَّة

*Amelanchia canadensis* (S). *Amélan-chier du Canada* (F).

نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٠ امتار. اوراقها مستطيلة، نصلها بيضي الشكل قلبي

## \* مَكْرُوسِيورِيوم الموز \* ٢٧٤٦٨

*Macrophoma musae, Phoma musae* (S).  
وصم بعثري الموز سببه فطر مجهري يركب الاوراق  
والثمار || مظهره الخارجي يقع مستديرة متتامة حنطية  
او سمراء اللون تقطع النصل من الفلج الى الحافة . وهو  
ان الثمار يقع سود صغيرة متتامة تشبه القشور دون  
ان تؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بودود وبتغليظ  
معلق الكيما عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او  
المستعمل من اي صنف كان .

*Mucron* ٢٧٤٦٩ \* مَكْرُون ٥  
من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بعض  
الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او  
على وثيرة . ج . مكارن .

*Macronyx* (F). ٢٧٤٧٠ \* مَكْرُونِيكس  
هو الزهدل ، اطليه .

*Douane* (E). ٢٧٤٧١ \* مَكْس ، جَمْرُوك  
*Customs, Custom-house* (E).

*Péage* (F). *Toll* (E). ٢٧٤٧٢ \* مَكْس المُرُور  
رسم محدد تفرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر  
في مكان معين .

*Trigonocephalus piscivorus*, \* ٢٧٤٧٣ \* مَكْسَان ٥  
*Ancistrodon piscivorus* (S). *Trigonocephale*  
*piscivore, Moccasin* d'eau (F). *Motton-mouth* (E).  
حية سرلودة سامة من الانواع انبويات الاخايد . موطنها  
يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف غشاف مجاري  
الماء والمناقع والمرزات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم .  
رأسها حرسائي الشكل . عنقها دقيق وذنبها كذلك . قرية  
الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الحركي الصناعي  
الصوت || تعتبر من الانواع الشرسة الجيئة الشديدة  
الاذى .

*Ratissoire* (F). *Scraper* (E). ٢٧٤٧٤ \* مَكْسَحَة  
اداة يلوze تستعمل في تسوية التربة وتنظيفها من الاعشاب .

*Myxomatose* (F). ٢٧٤٧٥ \* مَكْسُومَة الارنب  
*Myxoma* (E).  
تزيد حجروي يصيب الارنب فيقطع النسيج التي  
يتتركز فيها .

*Thermoscope* ٢٧٤٧٦ \* مَكْسَف ٥  
محار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين  
او بيتين .

٢٧٤٧٧ \* مَكْسَف الجلكة ، مِكْشَلَاو ٥  
*Pagoscope*  
جهاز يدل على الصقيع وهو من ادوات المزارعين يستدل  
به على امكان حصول الصقيع ليل . راجع مجلد .

*Avant-soc, Rasette* (F). ٢٧٤٧٨ \* مِكْشَط  
*Tuning-wire* (E).  
قلعة من المحراث تتقدم السكة وظيفتها كشط التربة .

*Emousseir* (F). ٢٧٤٧٩ \* مِكْشَطَة ٥  
*Moss-scraper* (E).  
صفحة معدنية مسنة او قفاز من شريط يستعمل في كشط  
الطحلب عن الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج وقلما تقترب من المحاذ  
والشطوط || اجسامها شبه رعيحة الشكل ، مستدقة الاذيال  
المادة الزعافت . مخروطية الرؤوس الذلقة ، كبيرة  
البون المستديرة الجاحضة ، قصيرة الاشداق السفلى المنطفة .  
حراشيفها مثلثة الزوايا ، مستدقة الاطراف الشائكة .  
زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالناخس المتتامة القصيرة  
حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واشهرها المكروور .

٢٧٤٦٢ \* مَكْرُوسِيورِيوم ٥  
*Macrosporium* (S).  
جنس فطور مجهرية من عمار الزاسمايات وقصيلة اللطحيات .  
كانت انواعها فيما مضى عديدة وبخلفة الاشكال فأثر العلم  
الحديث ضرورة احاطها بالاجناس والمارات التي تشبهها  
فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروسيوريوم الشام .

٢٧٤٦٣ \* مَكْرُوسِيورِيوم الشَّام ٥  
*Macrosporium cucumerinum* (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق وثمار الشام والبطيخ .  
مظهره الخارجي يقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملأ  
الاوراق والثمار وتمتطها بهالات متتامة عابقة اللون تسبب  
يباس النسيج المتحارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح  
قشور الثمار || يكالنج يتظهر البذار قبل زهره وقد  
يخمن نضج المبطحة عند ظهور الوسم . بأحد املاح النحاس  
المركز او المخلول من ٥٠ الى ٧٠ ٪ .

٢٧٤٦٤ \* مَكْرُوسِيوتيل ٥  
*Macrostylis* (S).  
*Macrostyle* (F).

جنس شجيرات وجنبات برية وريبيية من فصيلة السلايبات .  
مشهورة بازهارها المستطيلة الالوان الزرقية السات .

٢٧٤٦٥ \* مَكْرُوسِيومَة ٥  
*Macrophoma* (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . يتميز بكتائله  
المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات سميكة الجول ، ضيقة المقل  
الصغير || انواعه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :

٢٧٤٦٦ \* مَكْرُوسِيومَة الشاي ٥  
*Macrophoma theicola* (S).

فطر مجهري يصيب الشاي في افاده واوراقه . مظهره  
الخارجي يثور قرصية مستطيلة تركب لواء الافناد خففي  
على نموها ، ويقع حنطية تصيب نصل الاوراق في زانها  
الاخير فتدولها || يكالنج يتقلع الافناد الموصية وينفض  
الجنبات بسائل بودود او بغيره من القواطير المخربة .

٢٧٤٦٧ \* مَكْرُوسِيومَة القاصِصِيَا ٥  
*Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M. sesami* (S).

فطر مجهري ناعم ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد  
الحارة . يركب جذور وسوق وثمار عدة نباتات مختلفة  
اخصها القاصصيا والقطن والبطاطا الخلسو والحمضيات  
والبن والكافور والبطاسط والنسب || يصيب القاصصيا  
مجنوهرها وجنبها وساقها فيعفن الجذور والجنت ويمنطق  
الساق بنشأه لبد امر اللون || وهو على القطن عفن اسمر  
يركب الجذور ويقع قرصية لونها الى الجوزة تملأ الساق  
فوق التربة || وعندما يصيب البطاطا الخلسو يحول لياها  
الى مادة اسفنجية سوداء اللون || وهو في الحمضيات  
عفن اسود يركب الجذور ووصم يحل بلحاء السوق فيصيب  
جفانها وانصداعها وريش عصارة صمغية تفقد الشجرة بعض  
حيويتها وتقودها نحو القمامة || يكالنج باستعمال اسود  
القواطير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مكروسيوريوم الشام



مكروفيوم الموز



مكسان



مكشطة

٢٧٤٩٣ - مَكُونَة الاسْتِرْدَاد ، خَبَار الاسْتِرْدَاد

Faculté de rachat

هو حق ارتجاع المبيع بموجب شرط الرّوَاء .

٢٧٤٩٤ - مَكْنَس ، كِنَاس

Retraite (F).

Retiring (E).

مولج الرّوح من الطّباء والبرّق تستكن فيه من الحرّ .

٢٧٤٩٥ - مَكْنَس

Sorgho à balais (F).

نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - مَكْنَسَة الْأَنْدَر

Molène blanche (F).

هي البوسير الأبيض ، اطليه .

٢٧٤٩٧ - مَكْنَسَة الْجَنَّة

Kochie (F).

هي الهيشم ، نبات تزييني جميل القالب والخفّار .

٢٧٤٩٨ - مَكْنَسَة السَّاحِرَة

Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).

تعريف وصفي يطلق على اثنان مشابهة مريضة تكون

في بعض الانجبار الشجرة والحرجية سبها فطور مجهرية

مختلفة .

٢٧٤٩٩ - مَكْنَسَة

Mécanisation (F).

Mechanization (E).

٢٧٥٠٠ - مَكُون

Potentiel (F). Potential (E).

صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - مَكُو

Terrier du lièvre (F).

Hole of the hare (E).

جحر القرواي اي الارنب الوحشي .

٢٧٥٠٢ - مَكُونَة \*

Manucodia (F). Manucodia (E).

جنس طير من الجوائم وفصيلة التّرزورويات . انواعه

المعروفة نحو ١٠ جميعها من طيور استرالية والجزر

المجاورة . ملجها الحيائي جماعي . جامعاتها متوسطة العدد .

تألف القبايات . قوتها الحشرات والثمار والبذور || اجسامها

ربعة تطول من ٢٠ الى ٢٦ سم . اذواها تراوح بين

الازرق والاخضر والاسود جميعها سفاه المواجه . رؤوسها

مكّلة بريش نام صغري لونه يختلف عن لون الرأس

والرّداء . اجنتها معتدلة الحجم . اذناها مستديرة الاطراف .

انثاها تتحلل بنفس الاثواب || تدفن اعشاشها في الانجبار

الرفيعة . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦

بيضات . التّرعيم يستمر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٥٠٣ - مَكُونَة \*

Limacoda (S).

Limacode (F). Limacode (E).

حشرة من فصيلة المكوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة .

اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف

الحراج التي تكثر فيها الانجبار الابيدة الاوراق || جسمها

صغير اللّد ، كثيف الحمل الناعم . بسطها نحو ٢١ سم .

اسها شبه مزواقي الشكل . عيناها صغيرتان . خطها

شديد القصر . ملمسها دقيقان ، مستطيلان . زباناها

خطيان . كوسلها متكاكف الحمل . بطنها متراكب

السفّ والحمل || سرقها قريبة الذّله بالخلازون وتنقل

بيطه مثله . وهي خاضعة تعيش على اوراق السّديان ويقره

من الانجبار الابيدة .

٢٧٤٨٠ - مَكْعَب

Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - مَكْعَبِيّ

Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - مَكْفَهَر

Cumulo-nimbus

هو الرّكام ، نوع من الغيوم ، اطليه .

٢٧٤٨٣ - مَكْلَاس

Calcmètre (F). Calcmeter (E).

هو مقياس الكّلس ، جهاز يمين مقدار كربونات الكّلس

في التّراب .

٢٧٤٨٤ - مَكْلَف ، مَعَهْد له

Grevé (F).

Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - مَكْلُورَة

Maclure (F).

هي القانة ، ثمرة فراء من القراصيات .

٢٧٤٨٦ - مَكْنَسَة

Truffière (F).

Truffe-ground (E).

ارض تثبت الكّم ومستنبث الكّم .

٢٧٤٨٧ - مَكْنَة ، مَخَنَاقَة

Butteuse, Buttoir (F).

Ridging-plough (E).

محراث خاص يستعمل لكيّ ابي تخفيض المزروعات التي

تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - مَكْن

Œufs d'insectes (F).

Eggs of the insects (E).

المكن هو بيض الحشرات . الواسدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - مَكْنَان

Ovisac

جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في البطن

او شرجي الانثا .

٢٧٤٩٠ - مَكْنَانَة ، مَدْرَة

Galega (S).

Galega, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute

(D). Galega, Lavanese (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات

الفراشية . انواعها عديدة جميعها علفية تنشط الدر . اوراقها

متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، ورتية . ازهارها عتقودية التّجمع ،

ابلية الارتكاز ، زرقاء اللون او بنفسجية || اشهر

انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - مَكْنَانَة شَرْقِيَّة

Galega orientalis (S).

Galega oriental (F).

نوع من المكناة وهي عشبة معمرة مبلولة تطول من ٦٠

الى ١٢٠ سم . ارضها ممدادة ، ساقها فراء خلية . اوراقها

تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضية مدببة تطول

من ٥ الى ٥ سم . تصلها خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها

بنفسجية اللون ، ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

يقال انهم تحلل نحواس المكناة المغزلية ولكنّها دونها منغمة .

٢٧٤٩٢ - مَكْنَانَة مَخَزْنِيَّة \*

Galega officinalis (S). Galega officinal, Rue des chèvres

(F).

نوع من المكناة وهي عشبة مبلولة معمرة تطول من ١٠٠

الى ١٥٠ سم . ساقها فراء . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣

وريقة ، وريقاتها سانية تطول من ٢ الى ٤ سم . تصلها

مالس الصفحة مهدب المقع . ازهارها زرقاء اللون .

ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر

من النباتات الطبية الممنوعة تدخل في عدة علاجات اخصها

علاج السلس .



مكناة مخزنية



مكود



مكودة

## ٢٧٥١٢ - ملاخ

بقلة طيبة رخصة تدعى كشعفة (السان). الواحدة ملاخة.

Resumuria (S).

Réaumur, Réaumurie (F).

جنس نباتات بحالية وجنبية من فصيلة الالديات. انواعها المعروفة سبعة منها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوفها منتسبة رقيقة فرعاء تعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، متقاربة الارزكاز، خطية النصال الصغيرة القذ البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابطة وطرفية الارزكاز، خاسية التركيب، تكثر فيها اللون الابيض. ثمارها خاسية الفلق. تنديرها صيفي || اعرف انواعه واشهرها الملاح البودي المعروف بحشيشة الحصف.

## ٢٧٥١٤ - ملاخ دودي

Réaumurie vermiculée (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلمها.

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المد لاصطناع الملح ومنجم الملح.

## ٢٧٥١٥ - ملاخة

## ٢٧٥١٦ - ملازة

مزدور اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

Malleus (S).

Marteau (F), Malleus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم، عادات المتأصب وفصيلة الاطريات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اصداقها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقياية المصاريع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادمة التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ٥ الى ١٥ م.

Crenatula (S).

Crenatula (F), Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم عادات المتأصب وفصيلة الاطريات. انواعها المعروفة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداقها شبه مروحية الشكل، رقيقة المتأصب، رقيقة المصاريع الامتساوية، تحلة التخديد لؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

## ٢٧٥١٩ - ملاسة، مملسة، مالح، مملقة

Rouleau (F), Roll, Roller (E).

معدلة اسطوانية تستعمل في تحليس او حذل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اعماها:

Rouleau plombé (F).

ملاسة واصة

Rouleau ondulé (F).

ملاسة مناجية

Rouleau à bates (F).

ملاسة خياطة

Rouleau marqueur (F).

ملاسة مخططة

Rouleau brise-mottes (F).

ملاسة مفتحة المدر

Limacodidae,

Cochlididae (S), Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصها المناطق الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة. بسطها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغيرة. اخطامها شديدة القص. ملاسها منتظمة، تحلة. قرونها الاستشعارية خطية. بطونها متراكبة السطح الدقيق والحمل الناعم. اجنسها مستعرضة، عادمة التهديد || تسرح في الليل. اساريمها شبه بيضبة الشوزن، قصيرة الجرامز الصدرية، ثلثة الجرامز البطنية. جميعها غاضلة || اشهر اجناسها المكودة.

## ٢٧٥٠٥ - مكيتال، قداك

Module, Mesure de capacité (F), Modul, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت او سمة.

## ٢٧٥٠٦ - مكير هو المقير، اطلمه.

## ٢٧٥٠٧ - ملاب ملاب : كل عطر مائع.

## ٢٧٥٠٨ - ملاب \*، متبغيا

Malpighia (S), Malpighie, Malpighier (F), Barbados cherry (E), Barbadoskirschen (D), Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة المليات، مهدها البلاد الاستوائية. انواعها نحو ٢٠، اوراقها متعاقبة متنة اهليلجية، نصلها خلى البشرة سنن الحافة الشائكة. ازهارها عنقودية او نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعها واشهرها:

ملاب حريف Malpighie brûlante, Bois capitaine (F).  
شجرة امريكية المنبت، قشورها حامزة كاوية طيبة وصناعية.

ملاب كروي Malpighie glabre,

Cerisier des Antilles, Moureiller, Xocat (F).

شجرة تكثر في المكسيك، ثمارها كروية مأكولة لا تحلو من الحامضة وقد تزوع للزرين.

Epinard de Malabar (F).

## ٢٧٥٠٩ - ملابار

بقلة زراعية تدعى باذلة بيضاء، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانخ.

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F), Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ مغلها من نباتات المناطق الاستوائية الاسريكية. جميعها اشجار وشجيرات وجنبات. اوراقها متعاقبة منتظمة بسيطة او مركبة. ازهارها خاسية القعالات والبلات، عنقودية التجميع، صفراء اللون او بيضاء او حمراء. ثمارها جراء مكبرة عديدة البزور.

## ٢٧٥١١ - ملاخ، صبر فيضي


Gelée, Givre (F).

Frost, Jelly, Rime (E).

هو جلد نطق الماء على سطح التربة والنبات من هبوط درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



ملا ب



ملاسة

Féculerie (F).

٢٧٥٣٢ - مَلَبَّة ٥

Manufacture of faecula (E).

الملبة او مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا في المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F).

٢٧٥٣٣ - مَلَبَّة ٥

Dairy-farm (E).

المعلم الذي يعالج فيه الحليب رتباً يباع.

٢٧٥٣٤ - مَلَبِّيَا ٥

في الملب ، الملب ، الملب .

Malt

٢٧٥٣٥ - مَلَت ٥

في الحبوب الناشئة صناعاً لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F), Malting (E).

٢٧٥٣٦ - مَلَتَا ٥

الملتاج اي صنع الملت، هو عمل استحالة الشعير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب ناشئة .

Maltase

٢٧٥٣٧ - مَلَتَا ٥

خيرة قابلة للبريان تحول الملتوز الى غلوكوز قابل الاختيار .

Manducable (F).

٢٧٥٣٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٣٩ - مَلَتَا ٥

Verdoyant (F), Verdant (E).

٢٧٥٤٠ - مَلَتَا ٥

ملتحة العين، غشاء يلصق صفحة المقلة الخارجية وصفحة الايجاف الداخلية .

٢٧٥٤١ - مَلَتَا ٥

هو المقابل ، الملب .

٢٧٥٤٢ - مَلَتَا ٥

Syndactyles (F), Syndactyls (E).

٢٧٥٤٣ - مَلَتَا ٥

Volubile (F).

٢٧٥٤٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٤٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٤٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٤٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٤٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٤٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥١ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٥٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦١ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٦٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧١ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٧٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨١ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٨٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩١ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٥٩٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٠٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦١٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٢٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٣٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٤٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٥٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٦٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٧٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٨٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩١ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٦٩٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٠٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧١٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٢٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٣٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٤٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٢ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٣ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٤ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٥ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٦ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٧ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٨ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٥٩ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٦٠ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٦١ - مَلَتَا ٥

٢٧٧٦٢ - مَلَتَا ٥

Régime (F).

هو مجموعة العوامل والانفعالات الطبيعية التي تسيطر عليها الحيوان. كقولك ملجن الاطيار وملجن الرياح الخ. ج ملجن .

٢٧٥٥٩ - ملح

الملح : ورم في عروق الفرس دون الجرد فاذا اشتد فهو الجرد .

Sel (F). Salt (E).

٢٧٥٦٠ - ملح

الاملاح ، كايوا ، مواد ناتجة عن احلال مدن محل الهيدروجين في حامض . فاذا اضيف مثلاً الحامض الكبريتي الخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المعدن ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - ملح البارود ، تطرون ، بوق ارمسي  
Nitre, Salpêtre (F). Nitre, Salpêtre (E).

هو كايوا نترات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على الصخور الكلسية وعلى جدران الاقباء الرطبة ويستعمل في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - ملح الطعام

Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen salt (E).

تعريفه الكيماوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثره من مياه البحر بعد ترقيدها وتغييرها في الملاحات ثم معالجة بلوراتها ضمن مجاف خاصة .

٢٧٥٦٣ - ملحان  
Janvier (F). January (E).

هو شهر كانون الثاني .

Halimodendron (S).

٢٧٥٦٤ - ملحان

Halimodendro (F).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفربيان . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسيوية المهد ، تنبت في رمال الشواطئ البحرية . معظمها جنبي وبعضها شجر . اوراقها مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مغلظمة || اشهر انواعه التزيينية الملحان القضي .

٢٧٥٦٥ - ملحان فضي

Halimodendron argenteum (S). Halimodendro argenté (F).

نوع من الملحان يعيش في الاربة الرملية الماخلة . جنينه شائكة فارسة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ، شغبية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ، مقطوعة النصل البحري اللون القضي المواج . ازهارها كبيرة القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليها مستطيلة متدلية . لونها الى الحرة البنفسجية المواج || تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - ملحواكات ، نصيفة  
Feuillus (F). Leavy (E).

هي الاشجار الحرجية والتزيينية التي يسقط ورقها في الشتاء . تفيضها العروات ولايبدى اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط ورقها . واحدها ملحاه .

٢٧٥٦٧ - ملح  
Annexe (F). Annexed, Appended (E).

هو كل تابع لحق بأصل .

٢٧٥٤٨ - مُلتَوِيَّاتُ الْأَجْنِيحة ، مُتَعَفِّفَات

الأجنحة  
Strepsiptères, Rhipiptères (F). Strepsiptera, Rhipiptera (E).

رتبة حشرات من طبقة غشائيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها فصيلة الحشيشيات .

٢٧٥٤٩ - مُلتَوِيَّة  
Latanier (F).

هي الخشخ ، اطلبه .

٢٧٥٥٠ - مُلتَيْن ، مالتين ، ميسين  
Maltine, Maisine (F).

الملتين اي كسب الذرة الصفراء هو التفل الناتج عن صناعة تقطير الذرة ، ويعتبر من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُلتَوْد ، لتيد  
Synanthérique (F). Synantheric (E).

المثلور والتيد من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآبر .

٢٧٥٥٢ - مُلْج  
Abri (F). Refuge, Shelter (E).

هو نوى المقل . ج املاج .

٢٧٥٥٣ - مُلْجَا

٢٧٥٥٤ - مُلْجَدَّة

Mulgedium (S). Mulgédie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة عديدة . اعطائها بعض مناطق الشرق الاوسط واروپة || سوقها فروع تعلو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كبيرة مفروسة لامتناهية التفرع . ازهارها عشكوي التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُلْجَدَّة تَرْتَرِيَّة

Mulgedium tataricum (S).

Mulgédie de Tartarie (F).

نوع من المجلدة التريينية . مهدا بلاد التتر . ساقها قليلة الفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق السابجونية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُلْجَدَّة جَلْبِيَّة

Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).

نوع من المجلدة التريينية البروتية تعيش في جميع الاودية ومختلف المواقع . مهدا جبال الشرق الادنى وبعض جبال اروب . ساقها فروع تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة كبيرة النصل المرطاء . ازهارها عشكوي التجميع ، معتدل الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهة || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُلْجَدَّة كَبِيرَة الْوَرَق

Mulgedium macrophyllum (S).

Mulgédie à grandes feuilles (F).

نوع من المجلدة التريينية . مهدا بعض المناطق التركية والقوقاز . ساقها فروع ، خلية الساه ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصل ، مائلة الصفحات العليا ، مزغبة السفلى . ازهارها عشكوي التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

استفني الرأس الأسود ، مستند المؤخر والسكة الشرجية ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في التربة  
ضمن جلاب من الطين والبراز ينقل عن غطاء الحشرة .

٢٧٥٧٥ - مَلَحِيَّةٌ حَمْرَاءُ \*  
Malachius rufus (S). Malachie rouge (F). Malachius rufus (E).

حشرة وأشعة قانصة من فصيلة الملخيات ورثبة معدنات  
الاجنحة . تألف البراري والمراعي والأحراج الغدلة .  
غناها ترثفت رقيق الأزهار وتفتس الحشرات الدنيا .  
تتميز بجهازها الحويصلي القاسح الاثري الرائحة التي تحذر  
الاعصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الأشجار وفي الاخشاب  
النخرة قوتها اساريع الحشرات الخائبة || جسمها صغير  
القذ يطول من ٦ الى ٧ سم . رأسها مستطيل الجرم اسمر  
اللون . زباناها مستطيلان مستقان . عيناها كبيرتان .  
فكهاا ضليخان . كوسلها صناعي اللون تتوسطه بقعة غضراء .  
ظهورها مستدير الطرف الاخف ، احر اللون . ارساغها  
خامسة المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة  
الجدلانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران .  
تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع .  
تتمتع المكان تحت لحاء الاشجار وتحت الانقاض || البرقة  
عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ الى ١٢ سم . جسمها  
شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستطيل الطرف ،  
سداسي الراجب القصيرة ، اسمر اللون ، اصفر المواج ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في آخر  
سرداب دخلته البرقة .

٢٧٥٧٦ - مِلْدَان \*  
Flectometre (F). Flectometer (E).

٢٧٥٧٧ - مِلْدَنْ \*  
Pellicule (F). Pellicle (E).

٢٧٥٧٨ - مِلْدُون \*  
Pelliculé (F).

٢٧٥٧٩ - مَلَز \*  
Mélèze (F).

٢٧٥٨٠ - مَلَز كَاذِب \*  
Faux-mélèze (F).

٢٧٥٨١ - مَلَزَان \*  
Gonocytisus (S). Gonocytise (F).

جنس نباتات نجمية ، متوسطة الارتفاع ، برية ، ممررة ،  
من فصيلة القرنيات الفرائشية . انواعها المعروفة قليلة العدد ،  
منتهيا بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها  
تهام لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها متصبية ،  
فرعاء ، عادة الشوك . اوراقها مركبة ، وثرية العدد .  
وريقاتها شبه بيضية النصال المستطيلة . ازهارها ابطية  
الانتشاب ، مستطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستحبة  
العرف ، يحرسها النحل .

٢٧٥٨٢ - مَلَحَقُ التَّائِمِينَ  
Avenant (F). Modification (E).

٢٧٥٨٩ - مَلَحَقُ الوَصِيَّة \*  
Codicile (F). Codicil (E).

هو الملحق الذي يحرمه الموصي بعد تحرير وصيته إما لانها  
او لتدليلها او لانهاثامها .

٢٧٥٩٠ - مَلَحُوظٌ ، مَلَحُظٌ \*  
Prévisible (F). Foreseeable (E).

٢٧٥٩١ - مَلَحُوبَاتُ الْفِكَ \*  
Plectognathes (F).

٢٧٥٩٢ - مَلَخ \*  
Drageon (F). Sucker (E).

٢٧٥٩٣ - مَلَحِيَّاتُ \*  
Malachiidae (S). Malachiids (F). Malachiidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقانصة من رتبة غمديات الجنج ||  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات  
البلاد الحارة وبعضها يألف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة .  
مرتها النباتات العشبية والادغال ترثفت رقيق الأزهار .  
وتفتس الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها  
يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جاذبية  
جرها اللون تطفح منها رائحة اثيرة تحذر الاعصاب ، قليلة  
الاذى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،  
مستعرضة الرؤوس . مستطيلة الزباني المستطيلة المركبة من  
١١ فصلة . ارساغها خامسة المقل || يرقاتها تعيش تحت  
الحاء وفي الاخشاب المنخورة ساعية وراء اساريع الحشرات  
الخائبة لارتساقها || اشهر اجناسها الملخية والملاشافة  
واللوسقة .

٢٧٥٩٤ - مَلَحِيَّةٌ ثَلَاثِيَّةُ الْبُؤُر \*  
Malachius bipustulatus (S). Malachie bipustulée (F). Malachius bipustulatus (E).

حشرة وائمة جاذبة قانصة من فصيلة الملخيات ورثبة  
معدنات الاجنحة . تألف الحول المزدرة والمراعي .  
غناها ترثفت رقيق الأزهار وتفتس الحشرات الدنيا .  
عند الحاجة ، فيلبر احر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة  
تحذر الاعصاب تكفي لشل مقاومة الغرم . يرقاتها تعيش  
على جذور النجيليات وعلى ما تفرسه من اساريع الحشرات  
الثرابة والذمنة || جسمها صغير القذ يطول نحو ٦ سم .  
رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخيط ، اخضر اللون .  
عيناها كبيرتان . زباناها ضليخان . فكهاا ضليخان .  
كوسلها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهورها الى  
الخضار الالامس أما الاطراف الخلفية فالاحمر . غداها  
خفيفتا التحيزيز الميم المخلوط . ارساغها خامسة المقل ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجدلانة في ايار  
وتعيش حتى آب . اناثها تهريق المكان قرب سوق النبات  
وتحت الارواق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك  
التام تطول نحو ٩ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ،  
سداسي الراجب القصيرة ، حنلي اللون ، اسمر المواج ،



ملخية ثنائية البؤر



ملخية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَلَسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasmia (S).

٢٧٥٩٣ - مَلَسَسِيَّة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات . انواعه قليلة  
عامة القيمة الاقتصادية . بكنهاته ديمية التركيب ،  
فحمية اللون ، ترتكز عل ونية قارضة فرجية الانفلاق .  
بويضاته مخروطية منقطة ، شفافة ، وحيدة الخلية .

Mylesinus (S), Mylésine (F).

٢٧٥٩٤ - مِلْسِين \*

الواحدة ملسينة . جنس اسماك نهريه من مفتوحات المائنة  
وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر  
البرازيل والغويان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطلة  
الجرم ، صغرة القد ، تقطوع الى ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها  
الظهرية والشرجية كبيرة متقابلة . اما الذيلية فهلالية  
الشكل . اثنائها الى الحصار المتفاوت المجابت || حولها  
مأكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْسِيَت السَلْجَم

هي وذعة السلجم ، اطلبها .

٢٧٥٩٦ - مِلْسِيَت المَلْفُوف

هي وذعة الملفوف ، اطلبها .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مِلَصَاف

جهاز يستعمل في تشعيع اللاصف اي الفلورور الموجود  
في المواد المدنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَلَصَة

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطلبه .

Compresseur à pistolet (F).

٢٧٥٩٩ - مِلَطَاس

جهاز آلي يستخدم في تقطيع المواد الصلبة كالصخور  
وغيرها .

Malthusianisme (F).

٢٧٦٠٠ - مَلَطُوسِيَّة

Malthusianism (E) .  
الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي  
الانكليزي «ملطوس» ملخصه ضرورة كبح الانجاب  
لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية القروية  
تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مِلَطَى

Subcutaneous tissue  
قشرة رقيقة بين العظم واللحم .

Cochléaire, Cochléiforme (F).

٢٧٦٠٢ - مِلَعَقِي

Cochleiform (E) .  
ما كان شكله شكل الملعقة .

Cochléaria officinal (F).

٢٧٦٠٣ - مِلَعَقِيَّة

هي حشيشة الملاحق ، من النباتات الطبية ، اطلبها .

Clematides (S).

٢٧٦٠٤ - مَلْعُونَات

Clematidées (F). Clematidées (E).  
مجموعة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطائها البلاد الحارة  
والمعتدلة . انواعها كثيرة المدد معظمها مداد عارض . سوقها  
لغية . اوراقها متقابلة طويلة الريجيات ، عصارتها سامة  
حرقه . ازهارها عادية البتلات كبيرة الفصل الملوثة .

Malesherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلَزْرَبَة

Malesherbie (F).

جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتربينية من فصيلة  
الملزربيات . انواعها المعروفة حسة . منبتها الطوي بعض  
مناطق الشيل والبريو || تزرع للزيت في المراكب وفي  
المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

Malesherbiaceae (S).

٢٧٥٨٣ - مَلَزْرَبِيَّات

Malesherbiacées (F). Malesherbiacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها الطوي بعض اصقاع  
امريكية الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عارشة ، قريبة الشبه  
بالالاميات . اوراقها متعاقبة . ازهارها خشوية ، كبيرة  
القد ، جملة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة  
انبوب الكرم وباسديتها المتدرجة في قاعدة الزرعم ||  
اشهر اجناسها الملزربة .

Synallagmatique (F).

٢٧٥٨٤ - مَلَزْم لِطَرَقَيْن

Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو العقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقبين نحو  
الفريق الآخر .

Coobligé (F).

٢٧٥٨٥ - مَلَزْم مع غَيْرِه

Coobligant (E).

هو الشريك في الالتزام .

Amygdalaire (F).

٢٧٥٨٦ - مَلَزْمِي

Amygdaloid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل صخر يحوى بعض الحجمات  
المشحورة او بعض الحصبيات .

Châtrer (F).

٢٧٥٨٧ - مَلَس

To castrate, To geld (E).

ملس الحصى : اسئلها بعروقها . ولس الكباش : سل  
خصيتيه بعروقها فهو ملس والكباش ملس .

Glossomètre (F).

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان

Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراطين التحصل  
لعرقه الانواع الاصالح من غيرها في جرس رحيق الازهار .

Anacanthiniens (F).

٢٧٥٨٩ - مَلَسَاوَات

رئة من الاسماك العظمية .

٢٧٥٩٠ - مَلَسُومَة \*

سَازَج هِنْدِي

Melastoma (S). Melastome (F). American goose-

berry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).

جنس ثجيرات وجنبات برية وزراعية من فصيلة الملتوسيات .  
مهداها المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوراقها منقطة ،  
متقابلة سنانية النصل . ازهارها محورية الارتكاز او هامية .  
ثمورها ثنوية مستحبة العرق والطعم ، عصيرها اسود اللون  
يدبغ اللسان والقم .

Melastomaceae (S).

٢٧٥٩١ - مَلَسُومِيَّات

Mélastomacées (F). Melastomacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلات القملات ،  
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جميعها  
من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متقابلة .  
ازهارها لحامية التركيب .



ملسومة



ملسين





ملئى ارجوانية



ملئى جبليّة



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

### ٢٧٦١٢ - ملئى شَرْبِيَّة

Clematis orientalis (S). Clématite d'Orient (F).  
جنية عارشة عديدة الغروب تطلو من ٣ الى ٦ امتار.  
اعطائها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا. اوراقها  
مركبة، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل، المسنة الحافة.  
نصلها بحري اللون. ازهارها رباعية الفصل، قطرها نحو  
٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

### ٢٧٦١٣ - ملئى صَفْرَاء \*

Clematis ochroleuca (S). Clématite jaune (F).  
بجلة فراء منتصبه تملونحو ٦٠ سم. مهدها البلاد الامريكية.  
اوراقها بسيطة لاطئة متقابلة، نصلها بيضى الشكل مالى  
الصفحة. ازهارها حامية الارتكاز، فردية، صفراء اللون،  
زيتية المواج، اجانية الشكل، متدلية || ازهارها يستمر  
من ايار الى حزيران.

### ٢٧٦١٤ - ملئى شَفِيَّة الْوَرَق، ظَبَّان

Clematis angustifolia (S). Clématite à feuilles étroites (F).  
جنية دخلقة مثندوة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتصبه.  
اوراقها مركبة. وريقاتها خضقة بسيطة او ثلاثية التفريض،  
عصائرها سامة. ازهارها كثيفة التجميع، خافتة الورد،  
يبيضه اللون. تكثر في بعض الاحراج الرطبة. تجلحها  
الماعز ولا تنضرم منها.

### ٢٧٦١٥ - ملئى عُنْكُولِيَّة

Clematis paniculata (S). Clématite à panicules (F).  
جنية سبروتية عارشة تطلو نحو ٤ امتار. مهدها اليابان  
وكوريا. اوراقها مركبة. وريقاتها خضاسة او سباعية  
الازواج، ريشية التركيب. نصلها بطول من ٥ الى ٨ سم.  
ويعرض من ٢ الى ٤. ازهارها عشكولية التجميع، رباعية  
الفصل الشفافة، قطرها نحو ٣ سم. || ازهارها يستمر  
ملول شهر ايلول.

### ٢٧٦١٦ - ملئى عَنَمِيّ، مَرْعَان، حَبَل مَسْكِيّ

Clematis cirrosa (S). Clématite à vrilles, C. tou-jours verte (F).  
جنية عارشة برية وريبيتية تملو من ٣ الى ٥ امتار.  
حوالفها مركبة ثلاثية. اوراقها ابيدة بسيطة لا قياسية  
الشكل. ازهارها قمية رباعية الفصل الحليّة البشرة  
لونها الى البياض الاغبر تملو مائة وريدي || عصارة  
اوراقها قليلة المادة القلوية السامة لكنها حريفة تحرق  
الجله || ازهارها يستمر من اذار الى كانون.

### ٢٧٦١٧ - ملئى قَلْبِيَّة الْوَرَق

Clematis cordata (S). Clématite à feuilles en coeur (F).  
جنية عارشة تطلو نحو ٦ امتار. اوراقها مركبة مشطية.  
وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ازواج، نصلها قلبي الشكل  
مسّن الحافة. ازهارها خلية الفصل البياض || ازهارها  
يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

### ٢٧٦١٨ - ملئى كَرْشِيَّة الْوَرَق

Clematis apifolia (S). Clématite à feuilles d'ache (F).  
جنية سبروتية عارشة تطلو نحو ٤ امتار. اعطائها الصين  
واليابان. اوراقها مركبة كرسية الشكل. نصلها اخضر  
اللون مسّن الحافة. ازهارها عشكولية التجميع، صفيرة  
القد، رباعية الفصل، يبيضه اللون، قطرها نحو ١٥ سم.  
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

### ٢٧٦١٥ - ملئى شَرْبِيَّة

Clematis (S). Clématite, Clématide (F). Clematis (E). Waldrebe (D). Clématide (I).  
جنس نباتات معمرة عارشة من المعلومات. انواعها عديدة.  
اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية.  
ازهارها عادمة البتلات تستعفى عنها بالفصل الملونة المختلفة  
الاحجام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

### ٢٧٦١٦ - ملئى اَرْجَوَانِيَّة \*

Clematis coccinea (S). Clématite écarlate (F).  
جنية فراء منتصبه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروصها  
جزوية اللون. اوراقها متقابلة، لاطئة، بسيطة. نصلها  
سناي الشكل، بارز العروق، خلي البشرة. ازهارها  
ارجوانية اللون، اجانية الشكل تطلو نحو ٤ سم.  
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

### ٢٧٦١٧ - ملئى بَحْرِيَّة

Clematis maritima (S). Clématite maritime (F).  
جنية فراء منتصبه تملو نحو ١٢٠ سم. منتهى الشطوط  
البحرية. اوراقها مركبة، وريقاتها قديمة التفريض  
بحرية اللون. ازهارها صفيرة القد تبينة البياض || ازهارها  
يستمر من ايار الى تموز.

### ٢٧٦١٨ - ملئى جَبَلِيَّة \*

Clematis montana (S). Clématite montagnarde (F).  
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار. ساقها  
وفروصها جزوية اللون. اوراقها مركبة مشطية. وريقاتها  
اهليجية الشكل، عابقة الخضار. ازهارها يبيضه اللون،  
ابطية الارتكاز، مستطيلة المالحق، كبيرة القد، قطرها  
١٠ سم. || ازهارها يستمر من ايار  
الى حزيران.

### ٢٧٦١٩ - ملئى جَرَسِيَّة

Clematis campaniflora (S). Clématite en cloche (F).  
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها  
مركبة ثلاثية. نصلها اخضر اللون عادم التنسين. ازهارها  
جرسية الشكل، رباعية الفصل الزرق، مستطيلة المالحق،  
متدلية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

### ٢٧٦١٠ - ملئى زَرْقَاء \*

Clematis viticella (S). Clématite bleue (F).  
جنية سبروتية عارشة تطلو من ٤ الى ٦ امتار. اوراقها  
مركبة ثلاثية التثلث، وريقاتها خضقة عادمة التنسين.  
ازهارها كبيرة القد زرقاء اللون، قمية الشكل، رباعية  
الفصل، قطرها براوح من ٥ الى ١٢ سم. || ازهارها  
يستمر من حزيران الى ايلول.

### ٢٧٦١١ - ملئى سَامَّة، شَرَاخ

Clematis vitalba (S). Clématite des haies, C. brûlante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche (F).  
جنية مبلولة عارشة تطلو من ١٠ الى ٢٠ م. اوراقها  
مركبة مشطية. وريقاتها تعد من ٥ الى ٧ ازواج، نصلها  
حبل الغفار الزاوي. ازهارها رباعية الفصل الحليّة  
البشرة اللون، قطرها نحو ٣ سم. اسديتها وندقاتها بيض.  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. وهي تكثر في المواقع  
الرطبة احصها السياجات. عصائرها غزيرة المادة السامة  
التشيلة.

٢٧١٢٨ - مَلْعُفُون \* Sicana odorifera (S).  
Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات . مهدد بعض مناطق امريكا الجنوبية . يستعمل كخضار انواع القرع في المطبخ ويستعمل ايضا في تطهير المنازل والقاعات العامة لانه فواح العرف المستحب || ساقه عارشة تطول نحو عشرة امتار . حولانها مجهره بحاجب تمكها من الالتصاق بأي سطح كان . اوراقه معتقة كثيفة ، سباعية الفصوص . ازهارها صفراء اللون ، كبيرة القد ، خاسية البتلات . ثماره قرعية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . لونها ، عند الادراك ، الى الحمرة البرتقالية || تؤكل الثمار مطبوخة قبل دغوها في طور الادراك لان لبابها يتصلب عند الادراك ويفوح منه اريج عطر ثابت يستقر بعض الوقت .

٢٧١٢٩ - مَلْعُورَة Embryon (F). Embryo (E).  
المادة الخية المكثفة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات . وهي في الانسان مضغة وفي الحيوان نكرة وفي النبات نثيط .

٢٧١٣٠ - مَلِك الْعُقْبَان Aigle impérial (F).  
هو العقاب القيصري ، اطلبها .

٢٧١٣١ - مَلِكَة النَحْل Reine des abeilles (F).  
Queen-bee (E).  
هي النحلة الانثى البيض و اميرة ثول النحل والحلية والقفير .

٢٧١٣٢ - مَلَكُورِيَة Malacologie (F).  
Malacology (E).  
فرع من الزولوجية يبحث في شعبة اللافقريات .

٢٧١٣٣ - مَلِكُوك \* Melicoccus (S).  
Mélisque (F). Melicoccus (E).  
جنس اشجار وشجيرات برية عرو من فصيلة السابنديات . انواعها المعروفة قليلة المدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية ، اعصها جبيكة || سيقانها منتصبه كثيرة الفروع تطول من ٣ الى ١٠ امتار اوراقها ابيده ، مركبة ، متعاقبة . وريقاتها شفعية العدد ، ثنائية او ثلاثية الازواج . نصلها جامدة الوثل ، يضيء الشكل . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الازواك . ازهارها صغيرة يضيء اللون او وردية ، عطرية العرف . ثمارها نوية مأكولة اللباب والمجعات .

٢٧١٣٤ - مَلِكِيَة Propriété (F).  
Property, Ownership (E).  
هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقا في نطاق القانون .

٢٧١٣٥ - مَلِكِيَة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).  
Joint property (E).  
هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين . وقد تكون الملكية المشتركة شائعة او غير شائعة .

٢٧١٣٦ - مَلِكِس ثُرْمِي Dracocéphale moldavique  
هو رأس الثنين الملداني ، اطلبه .

٢٧١٣٧ - مَلْعُوس \* Melampus (S).  
Mélampe (F). Melampus (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الأرجل وفصيلة الحفصيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

٢٧١٢٩ - مَلْعَى لَهَب ، مَلْعَى عَطِرَة ، قَمِيص يَنْثُ الْمَلِك ، عَنَصَرَة

Clematis flammula (S). Clématite odorante, C. flammette (F).  
جنية مذبولة عارشة تطول نحو ٤ امتار . اعطائها حوض البحر المتوسط . اوراقها مركبة شطية . وريقاتها ضيقة كثيرة العدد . نصلها لا يقاسي الشكل . عصارته سامة حريفة كارية تحرق الجلد . ازهارها صفيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧١٢٠ - مَلْعَى مُنْتَصِبَة Clematis recta (S).  
Clématite dressée, Téverin (F).  
جنية حصاصه دغلة مذبولة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه جوفاء . اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الازواج . وريقاتها يضيء النصل ، بحرية اللون . عصارته لا تكوي . ازهارها مكسبة ، عطرية ، يضيء اللون . ازهارها يستمر من ايار الى تموز

٢٧١٢١ - مَلْعَم Pêristome (F). Peristome (E).  
ما يكتنف القم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملائم .

٢٧١٢٢ - مَلْعَف ، خَنْزِيرَة Treuil (F).  
Windless, Hand-winch (E).  
آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الانقال .

٢٧١٢٣ - مَلْعُوف \* ، كَرْئِب ، لَخْنَة Brassica oleracea capitata (S). Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E).  
Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappuccio (I).  
بقلة زراعية من فصيلة الصليبيات . ضرورها واسرارها كثيرة العدد . جميعها ملغاة الاوراق المأكولة الفنية بعض الفيتامينات الصحية . تحليلها الوسطي يعطي :

٣٧.٠ ٪ من المواد الازوتية

٥.٠ ٪ من المواد العننية

٢٥.٠ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٧١٢٤ - مَلْعُوف بروكسل \* Brassica oleracea gemmifera (S). Chou de Bruxelles (F). Brussels sprout (E). Brüsselar kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brusselle (I).

نوع من الملفوف الزراعي المأكول . لشجايته ضنية الشكل ، صفيرة القد ، تمد من ٦ الى ٢٠ ، ادراكها تدريجي يبتدىء من الاسفل .

٢٧١٢٥ - مَلْعَاح Gravid (F).  
Gravid, Pregnant (E).  
الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طائتها تمكها من ذلك .

٢٧١٢٦ - مَلْعَاح Malachra (S).  
Malachre (F). Wild ochra (E). Malachra, Welchmalve (D). Gombo salvatico (I).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الجبازيات . انواعه المعروفة خمسة ، جميعها مرموية ، اعطائها البلاد الامريكية . اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص . ازهارها رويضة منها الابيض والليلكي والوردي والاحمر .

٢٧١٢٧ - مَلْعَط Pointe du bec (F).  
Point (of the beak) (E).  
هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر .



ملعى منتصبه



ملفوف



ملفوف بروكسل



ملقوطن



ملكوك

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصنافها شبه غروميلة الشكل، طرفية اللوية المنسوبة الخطوط. فوهاتا مستطيلة مسنة الخفاف .

٢٧٦٣٨ - ملتح \* Profil (F).  
مظهر الشئ الجانبي . Profile, Side face (E).

٢٧٦٣٩ - ملتس Palpe (F). Palp (E).

٢٧٦٤٠ - ملتس شفوي Palpe labial (F). Labial palp (E).

٢٧٦٤١ - ملتس فكي Palpe maxillaire (F). Maxillary palp (E).

٢٧٦٤٢ - ملتسي Palpifère, Palpigère (F). Palpifer (E).

نعت تعريفي يطلق على كل عضو حشري أو نباتي يحمل لمساً أو يقوم بوظيفة للمس أو يشبه للمس .

٢٧٦٤٣ - ملتح Aile (F). Wing (E).  
ملح الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر ملتحة .

٢٧٦٤٤ - ملتكة Trompe de l'éléphant (F). Trunk (E).

هي غرطوم القليل يتلصق به الطعام والماء ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الاقلام .

٢٧٦٤٥ - ملتسيوم Melanthium (S).  
Mélante (F). Melanthium, Bunch flower (E).  
Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من السورجانيات . انواعه المرفوعة ثلاثة ترعّب في المواقف الرطبة الظليلة . سوقها نخلة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . تنتهي بالعتاد الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها قدية ، غمية ، كثيرة العدد تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٨ م . انزاعها الى البياض الاخضر المواج || انزاعها يستمر من ايار الى تموز . وصغير صقلها مع معلق المواد السكرية ، يقتل الذباب .

٢٧٦٤٦ - ملتكنيس Melancontis (S).  
جنس فطور مجهرية من الرغيات ، راجع رفة .

٢٧٦٤٧ - ملتهب ، ألتهب Lance-flammes (F). Flame thrower (E).  
آلة تصدر اللهب وتنفذ وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - ملتب \* Pyrocephalus (S).  
Pyrocéphale (F).  
جنس طير من الجوارث سنيات المنقار وفصيلة القصبويات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ اعطائها تمتد من المكسيك الى البرازيل اجسامها صغيرة . رؤوسها متوتجة بطراز تشرف على القفز . اثنائها متراكبة الالوان الزاهية الجميلة يكثر فيها الاحمر الصانبي الشبيه بلهب النار || قوتها العشرات الصغيرة والذبابة والحمام .

٢٧٦٤٩ - ملوكان Colorimètre (F). Colorimeter (E).  
هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به الوان السوائل لا سياً الجمر اذ يجتازها نور النار .

٢٧٦٥٠ - ملوحة Salinité, Salure (F).

Salinity, Saltness (E).

٢٧٦٥١ - ملوحيّة \* Corchorus olitorius (S).

Corète potagère, Corette potagère, Guimauve potagère, Mauve des Juifs, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva dei giardini (I).  
ويسم من قال « ملوحي » . نبات عشبي ينقل حولي من فصيلة اليرفونيات . يزرع لأوراقه الطريضة الناعمة التي تفيد المدة والامعاء . متطلبات زراعتها تربة مروية غرارة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت العضوي والعلقي .

٢٧٦٥٢ - ملوّد Meloe (S). Méloé (F).

Oil beetles (E). Mäwürmer, Ölkäfer (D).  
جنس حشرات من الملوديات . انواعه المرفوعة ١٢ اصنافها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . اجسامها تطول من ١٠ الى ٤٠ م . ذكورها اصفر قداماً من اثنائها . اثنائها تراوح من الزرقة الى السواد الفضي . يكثر وجوده في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان الى حزيران .

٢٧٦٥٣ - ملوّد ملوّن \* Meloe variegatus (S).

Méloé variable (F).  
نوع من الملوّد ، ثوبه الى الزرقة الخضراء المواج ، حنار رأسه وكوسله وسك بطنه الى الجزء السفلي الذكر بطول نحو ١٢ م . والانثى نحو ٣ م . || يكثر وجوده في نيسان وايار . مسرعه الاعشاب والمراعي والازهار البرية .

٢٧٦٥٤ - ملوّد يات \* Meloidae (S). Méloïdés (F).

Meloidae, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflasterkäfer (D).  
فصيلة حشرات من مخديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها ملونة صغيرة اللدق او متوسطة ، بعضها طيب . مرتمها الاتجار والازهار والاعشاب . تفرز ، عند لمسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شواربها وبهاها السوي يحويان مادة ناعمة تنج الجمل وتثير الياء || قرونها الاستعمارية صونجانية ، مركبة من ٩ الى ١١ فاسلة . ارساخها خاسية التركيب باستثناء الخلفية فانها رباعية المقاسل .

٢٧٦٥٥ - ملوّر ، مريّن Malurus (S).

Malure, Mérion (F). Malurus (E).  
جنس طير من الجوارث سنيات المنقار . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطائها بلاد استرالية . ملجتها الحياتي جامي . جاعاتها قليلة المدد . جميعها من الارباب تألف الاجراج الميجرة الانجار والبراري البقلة . قوتها الحشرات اعصها الحنجة والتمل والديدان وبعض الثار العينية اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ م . تتميز باستقالة اذناها وبكثافة سبالها . اثنائها متباينة الالوان فيها الاسود والاضفر الالمن والاضفر الزرق والجوري والكتشي والاشهب والاعمل والاشع . اثنائها الاناث لا تختلف عن اثنائها الذكور لكنها اقل زهاء ولعة || تدشن اعشاشها في الادغال . اثنائها تحضن نحو ٦ بيضات في مرتين في الحول . الذكور تناوب الاناث في الحضانة .

٢٧٦٥٦ - ملوّن Chêne égllops (F).

هو السنديان الرومي ، اطلبه .



ملويس



ملهب



ملوحيّة



ملوّد ملوّن



ملوّر

اعطائها بحيرات وانهار الهنـد الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادور يوم نظراً لجالها وصغر قدما لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجذع بالاصفر والاخر. الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عاتمة يصنعها من النسالة واللعاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفـقـ والانسلاخ.

**٢٧٦٦٩ - مَلِكِيَّة** - Régulus (F). Regulus (E). الملكيك نجم نير من كوكبة الاسد الاصفر. يبعد عن الارض نحو ٩٠ سنة ضوئية.

**٢٧٦٧٠ - مَلِكِيَّة ، جَنَحَل** - Abeille mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E). الملكية او الجحل الانثى الكاملة الشوار الثقي من النحل. تتميز بحمها الاهيف المستطيل. وظيفتها منع المازن للمحافظة على استمرار النسل والتكاثر النوعي || تساند مرة واحدة في حياتها وتعيش نحو خمس سنوات تمتح بخلها ملايين المازن.

**٢٧٦٧١ - مِلْيَمِتْر** - Millimètre (F). Millimetre (E). جزء من ألف من المتر.

**٢٧٦٧٢ - مِلْيَمِيكْرُون** - Millimicron هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد.

**٢٧٦٧٣ - مَلَكِين** - Malléine (F). سائل يستخرج من تكثير قصبات الروام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل.

**٢٧٦٧٤ - مَلِكِين** - Laxatif (F). Laxative, Opening (E). مسهل خفيف.

**٢٧٦٧٥ - مَلِكِيَّة** - Mélinet (F). هي السرته، عشبة مغرية طيبة، اطلبها.

**٢٧٦٧٦ - مَلِكُولَا \*** - Meliola (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الوثغيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيحتها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشفونة اطراف يدب على بشرة الانفاد والافان والاورق ويشترك بمراشفت بنفها في النسيج. اصنائه الخارجية مكورة الشكل تلحفت ازقاقاً عديدة تحضن البوغيات. بوفغاته، عند الادراك، سمراء اللون اهليلجية الشكل لا قياسية الانقسام الجولي المتعرض.

**٢٧٦٧٧ - مَلَكِين** - Million الملين : ألف ألف.

**٢٧٦٧٨ - مَلَكِين مِفَر** - Mégamètre (F). Mégaméter (E).

**٢٧٦٧٩ - مُمَاتَنَة ، شَوْدَلَة** - Mimétisme (F). Mimesis, Mimicry (E). راجع شودلة.

**٢٧٦٨٠ - مُمَالِيل** - Identique (F). Identical (E). **٢٧٦٨١ - مُمَاد** - الماء : المرتوي من النبات.

**٢٧٦٥٧ - مِلْيَات** - Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان كثير الالياف من الثار واللصوم وغيرها.

**٢٧٦٥٨ - مَلْيِب** - Maelibea (S). Méléibe (F). Maelibea (E).

جنس دوبيات بحرية من الرعويات مديات الازبل وفصيلة التيتيتسيات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها عريضة مستطيلة مبططة، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة محزمة الشكل يعملوها في نغمها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليات الدقيقة || لونها الى الشبهة السمر. حلياتها شديدة السمر. ارجلها صغيرة، قليلة العرض، مستديرة الاطراف.

**٢٧٦٥٩ - مَلْيَت** - سنن شجر المرخ.

**٢٧٦٦٠ - مَلْيَت \*** - Meleeta (S). Meleeta (F). Melet (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوغيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة، شبه وشية الشكل، تطول نحو ١٠ سم الى ١٨ سم. رؤوسها معتدلة الجرم، صغيرة الاخطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخرسية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية فقاركة. انوثاها تراوح من الريدة الفضية المواج الى الشبهة الرصاصية. اشهر انواعها الثلاثة التالية :

**٢٧٦٦١ - مَلْيَت التوسط** - Meleeta phalerica (S). Melette de la méditerranée (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحمها جيد الصنف || تستعمل استمعال السردين.

**٢٧٦٦٢ - مَلْيَت مَبْدُولَة** - Meleeta sprattus (S). Melette commune (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استمعال السردين والبلح.

**٢٧٦٦٣ - مَلْيَت سَامَة** - Meleeta venenosa (S). Melette vénéneuse (F).

نوع من المليات. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحمها ذائع السم عيت.

**٢٧٦٦٤ - مَلْيَج** - الجدي الرضيع. ج. ملج.

**٢٧٦٦٥ - مَلْيَحَة** - Blongios nain (F).

هي الواق الصغير، اطلبه.

**٢٧٦٦٦ - مِلْيَغْرَام** - Milligramme (F). Milligram (E).

جزء من ألف من الغرام.

**٢٧٦٦٧ - مَلَكِيَّا** - Poisson-cheville (F).

المليفا سمكة بحرية تدعى سفرنه، اطلبها.

**٢٧٦٦٨ - مَلْيَغِيَّة \*** - Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradise fish (E).

سمكة نهريه وحيدة الجنس والنوع من كثرات الزعانف.



مَلْيَت



مَلْيَة



مَلْيُولَا

Retenue (F). Reserved (E). **مَمْسُك** ٢٧٧٠٠  
حاجز طبيعي أو اصطناعي قليل الارتفاع يعترض مجرى  
مسح الماء. ج. ماسك.



مسح

Cocher (F). Auriga (E). **مَمْسُك الأَعْيَنَة** ٢٧٧٠١  
مسك الاعنة كوكبة نجوم شالية الموضع تسمى أيضاً ذو  
الاعنة، اطلبا، وبهم من سماها النياز.

Râteau (F). Rake (E). **مِمَشَاط** ٢٧٧٠٢  
أداة يدوية تستعمل في تمشيط التربة قبل سفلها.

Teilleuse, Tilleuse (F). **مِمَشِكَة** ٢٧٧٠٣  
Scutcher, Scutching-machine (E).  
آلة تقشر سوق القنب والكتان تفصل عنها المشاقة.

Pholadidae (S). **مِمَصَّات ٥** ٢٧٧٠٤  
Pholadidés (F). Pholadidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم.  
اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة المدد مولها جمع بحار  
العالم. اصداها صغيرة لاقطاسية الشكل يكثر فيها اللون  
الابيض والاذفر والتبني. اجسامها مجهزة بمصمات  
اسطوانية الشكل. تعيش لاصقة بالاعشاب والصخور ||  
اعرف أنواعها وأشهرها المِصَّة.



مِصَّة

Pholas (S). **مِمَصَّة ٥\*** ٢٧٧٠٥  
Pholade (F). Pholas (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم،  
وفصيلة المصمات. انواعها المعروفة متوسطة المدد منتشرة  
في منظر بحار العالم. تعيش على الصخور والاعشاب  
المنعومة من ميزاتها انها مجهزة بيدة فسفورية تمكها من  
الاشعاع || لحوبها مأكولة جيدة الصنف وقد تكون شاذية.

Siphonae (S). **مِمَصَّيات** ٢٧٧٠٦  
Siphonées (F). Siphonae (E).  
هي المصمبات، فصيلة من الخفيات الخضر.

٢٧٧٠٧ **مِمَطَار** \*، **مِمَطَر**، **مِيزَان المطر**،  
Pluviomètre (F). **مِقْبَاس المطر**  
Pluviometer (E).

جهاز يستعمل لقياس ارتفاع المطر الساقط في مكان ما.

Ductilité (F). Ductility (E). **مَمَطُولِيَّة** ٢٧٧٠٨  
قابلية المثل.

Irrigué (F). Irrigate (E). **مَمْعُون** ٢٧٧٠٩  
يسقى بالماء الجاري. يقال شجر معون وزراعة معونة.

٢٧٧١٠ **مِمَعَار** النخلة الحمراء الثمر.

Bifère (F). Biferous (E). **مَمْعِل ٥** ٢٧٧١١  
نمت تمريني يطلق على كل نبات يزهر ويثمر في عام  
واحد مرتين.

Salaisons (F). **مَمْلَحَات** ٢٧٧١٢  
Salt provisions (E).  
المأكولات التي تحفظ بطريقة التليح.

Rouleau (F). **مَمْلَسَة**، **مَمْلَقَة** ٢٧٧١٣  
الملسة والمملقة هما الملاسة، اطلبا.

Croisement (F). Crossing (E). **مُعَادَّة** ٢٧٦٨٢  
هي التصالب والكونة، راجعها.

Tangente (F). Tangent (E). **مُمَاس** ٢٧٦٨٣

٢٧٦٨٤ **مُمَاس النِّمَام**، **نَظِير المُمَاس**  
Cotangente (F). Cotangent (E).

Tangential (F). Tangential (E). **مُمَاسِي** ٢٧٦٨٥

Gradient **مَمَال** ٢٧٦٨٦  
هو فرق الضغط الجري الحاصل بين نقطة ما معينة وبين  
محور الاصمار. ج. مالات || الممال الضعيف يسبب  
الزوايح.

Dédifférenciation (F). **مُمَايَرَة ٥** ٢٧٦٨٧  
هي المفاضلة، اطلبا.

٢٧٦٨٨ **مِمَخَاض**، **مِمَخَض**، **مِمَخِطَة**  
Déalteuse, Baratte (F). Churn (E).  
آلة نابذة تفصل الكثرة عن الحيفض. راجع ابريج.

Bâtard (F). Bastard (E). **مُمَدَكِر** ٢٧٦٨٩  
كل حيوان يتحلل يخلق أو صفات نوحية دون خلق أو  
صفات ابائه وأجداده.

Paracel (F). Paracel (E). **مَمَر** ٢٧٦٩٠  
فلج رحب بين الخفاف البحرية معتدل الفور أو بعيدة  
يسمح بمرور البواخر والسفن.

Hâtif (F). Forward (E). **مِمِزاج** ٢٧٦٩١  
هي صفة التربة التي تسوق النبات ليسرع في ادراكه.

Coulard (F). **مِمِرَاط** ٢٧٦٩٢  
المرايط والصفصاء والنتار هو كل نبات معرض لسقوط  
الزهر أو امتلاص الثمر بعد العقد.

٢٧٦٩٣ **مِمِرَاق** راجع غصيب.

Grande chélideine (F). **مِمِرَّان** ٢٧٦٩٤  
هو عروق الصباغين، اطلبا.

Macérateur (F). **مِمِرَّت**، **مِمِرْس** ٢٧٦٩٥  
Macerator (E).  
آلة للثمر تستعمل في معاليل النشا والسكر والتقطير.

Souille (F). **مَمْرَع ٥**، **مَمْرَحِل ٥** ٢٧٦٩٦  
Wallowing-place (E).  
كل مكان مستنقع تتمرغ فيه الايائل والظباء والحنازير.

٢٧٦٩٧ **مِمِرَّعَة**  
الممرعة هي الممي الاعور، اطلبا أعور.

Brasserie (F). Brew house (E). **مَمْرَزَة** ٢٧٦٩٨  
هي المعمل الذي تصنع فيه البيرا.

Graphomètre (F). **مِمِمَاح ٥\*** ٢٧٦٩٩  
Graphometer (E).  
مقياس المساحة، جهاز يمكن من قياس الزوايا والمساحة.



مطار

Manne (F). Manna (E). - مَنَّ - تَرْجَمِين. مادة سكرية او بالاحرى مزيج من السكر والمنسخت والسكرين تفرزه بعض النباتات اما طوعياً او بواسطة حُر اللحاء او بتأثير ونز بعض الحشرات كقرمزية المن وزر المران وغيرها || والمن يقع على اشكال عديدة تختلف باختلاف مصادر وطرق جمعها . اما النباتات التي تفرز المن فكثيرة العدد اشهرها الاثل النيلي والحوير والشيح والمائل والمران المنى .

Puceron (F). - مَنَّ - مَنَّ حُر الأرق ، اطليه .

2٧٧٢٦ - مَنَّ قُطْنِي \*  
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus mali, Schizoneura lanigera, S. americana, S. crataegi (S). Puceron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blutlaus (D).

حشرة صغيرة القد من الاقليات ، تركب التفاح من براعم الى جلوره . تعيش ضمن نطاق من النورس الشمسي المتراكب الذي يشبه ندف القطن || اغذاره ونخسة العاقية . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على الانجبار وجذوعها لتسكين وصول السائل الغدالى الى منشئ الجلود .

Spalacids (F). Spalacidae (E). - مَنَاجِد - هي فصيلة الخلديات من رتبة القوائم .

Climat (F). Climate (E). - مَنَاح - هو مجموعة العوامل الجوية المؤقية المميزة . راجع اقليم .

Climatérique (F). Climatic (E). - مَنَاحِي - كل ما له صلة بالمناخ .

Borne (F). Landmark, Milestone (E). - مَنَار - ما يوضع لاشهار حدود العقار او الملك . وما يوضع على الطرقات العامة للإرشاد واستدلال المسافة .

Pupidae (S). - مَنَارَات -  
Pupides (F). Pupidae (E).

فصيلة من الرخويات مديات الارجل روفية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة من السواحل الى الجبال والجرود ، ترغب في المواقع الرطبة ولا تتخفى الصقيع || اصداؤها شبه اسطوانية الشرن متفاوتة الاحجام تبدو كالابرار || المنارات || اعرف اجناسها واشهرها المنارة والتملوط .

Rorqual commun (F). - مَنَارَة -  
هي المحركل المعروف ، اطليه .

Pupa (S). - مَنَارَة -  
Pupe, Mallot (F). Pupa (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاف البلاد المعتدلة الحرارة ، ترغب في المواقع الرطبة ولا تخرج من مكانها الا بعد اول حماية مطر || اصداؤها شبه اسطوانية الشرن تقصير مع الاقتراب من المقب . جميعها محاذرة وبعضها او مسج او ماس . اجسامها شمة نحاس الحلا .

Règne (F). - مَمْلَكَة ، عَالَم  
Kingdom (E).  
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

Règne minéral (F). - مَمْلَكَة الجَمَاد  
Mineral kingdom (E).  
هي مملكة الكائنات الطبيعية الخارجة عن نطاق الحيوان والنبات ، التي لا تتناسل ولا تتحرك .

Règne animal (F). - مَمْلَكَة الحَيَوَان  
Animal kingdom (E).  
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات والحيوان وتتكاثر ونحس وتتحرك وتنتقل . اقسامها عديدة تبينئ بسيدات الحلية وتنتهي بالحيوان الناطق .

Règne végétal (F). - مَمْلَكَة النَبَات  
Vegetable kingdom (E).

المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تحلتيها العامة : تتناسل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال من مكان الى آخر . وفي تعد ملايين الانواع تجمعها اربعة اقسام رئيسية || اولها كرونباء ، اي اسفلها درجة ، المشريات وهي عادمة النمو والورق كالخفيات والفطريات || ثانياً الطحليات وهي تشمل الطحالب والكديبات || ثالثاً مستورات الزهر الوعائية وهي تشمل السراخس والاموسغيات والخديرات || رابعاً البرونيات وهي تشمل عريانات البذور ووعائيات البذور . من عريانات البذور المحرطيات والسيكاسيات . ومن وعائيات البذور رحيات الفلقة ونشائيات الفلقة || الرسم النباتي التابع « شجرة الانساب النباتية » يميز الاقسام وقروها ويبين درجات سلم الارتفاع النباتي من البدييات ذوات الحلية الواحدة الى الوعائيات ذوات ملايين الخلايا .

Eclat (F). - مَمْلُوحَة ، قَسْحَة  
Fragment (E).  
كل فصيلة نباتية برزت لها جذور تمكها من الحياة المستقلة فيها لو فصلت وزرعت وسعدا .

Terre noire fertile (F). - مَمْنَاة  
الممتنة : الارض السوداء الخصبة .

Nectrioidaceae (S). - مَمْنَايَات -  
Nectrioidacées (F). Nectrioidaceae (E).  
فصيلة تطور مجهرية من رتبة الزويعيات . اجناسها وانواعها عديدة لا مؤذية . تتميز بوظيفتها الجلدية التركيب المحصورة في الانسجة النضلية التي تجمعها عند انتشارها . لونها ينحرف من الاصفر الى الاحمر القرميدي . يكنيتها صغيرة . بويضاتها شفافة ومستطيلة .

Mammée (F). - مَمِيَة  
هي الجباس ، اطليه .

Mammée d'Amérique - مَمِيَة أَمْرِيكِيَة  
هي جباس امريكة ، اطليه .

Glauclère (F). - مَمِيَا  
هو ، لثاميا ، اطليه .



من قُطْنِي



منَارَة

27746 - مَنثَّة ٥ Nucléole (F), Nucleolus (E).

النواة اللّدية الرئيسية. وعضو التناسل في الخيئات.

27747 - مَنثَّة Monine, Guenon (F).

She-monkey (E).

الفة انثى القرد. ومن اسمائها القردة والدعية والالفة.

27748 - مَنثَّة ٥ Munna (S), Munna (F), Munna (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبيريات. انواعها المدروسة قليلة العدد منتشرة في البحار الشالية || اجسامها صغيرة مبططة، مستعرضة الرؤوس، كبيرة العين الجاحضة. قوائمها متساوية الشكل والطول باستثناء الزوج الامامي الاول المتحول الى ملاقط فكية.

27749 - مَنثَجَج Pâturage (F).

هو المنبع، اي المرعى الطبيعي.

27750 - مَنثَجَج Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج مناتج. والمناتج هي المناظ المظهرية الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحيوان.

27751 - مَنثَجَش Germoir (F), Hot-bed (E).

اداة زراعية توضع فيها البزور المطلوب انتاشها.

27752 - مَنثَجَج Usufuitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع.

27753 - مَنثَجَعَاتُ الْإِمَارَ Faisances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع على حصة صاحب الارض.

27754 - مَنثَجَعَة \* ، فِساء الكَثْب Chenopodium vulvaria (S), Vulvaire, Anserine fé-

tide, Arroche puante (F), Stinking goose-foot, Dog's orache (E), Stinkender Gäusefuss (D), Chenopodio fetido, Atriplice puzzolana (I).

نبات كزبه الرائحة من فصيلة السرمقيات. اوراقه متعاقبة منتفحة كاملة طحله اللون. ازهاره عنقودية التجميع تحوي مع اوراقها بعض المواد الصمغية والعناصر الفعالة ككربونات الامونيوك ونترات البوتاس التي تلتصق بها الرائحة الكريهة

27755 - مَنثَجُوشَة Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصعد او البروز قبل وضعها في التربة.

27756 - مَنثَكار Coulard (F).

هو المرطاب، راجعه.

27757 - مَنثُور ، خَيْرِي Cheiranthus (S).

Giroflée (F), Gilliflower (E).

الاسم العلمي من العربي. والحري جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات. انواعها ١٢ منها الحولية والحولة والمعمرة. سوقها عشبية خشبية. اوراقها متعاقبة بسيطة سنائية. ازهارها عنقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنثور اسم شامل يطلق ايضاً على المنيولا الشبيهة به.

27745 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ Etapes de la lune (F).

Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون. ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهلها الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر. ثم يكون الحاقق. فان كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين. والرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسعى اربعة عشر منها شامية واربعة عشر بمانية. فالشامية، بترتيب تواليا، تبثد بالشرطين ثم البطن والثرى واللدبران والمهقة والهمنة والذراع والثرثرة والظرف والجببة والزبرة والصرة والمواء والسالك || اما البانية فارها الغفر ثم الزبانا والاكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الاخبية والفرع الاول والفرع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء.

27735 - مَنَاسِلُ Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة.

27736 - مَنَاعَة Immunité (F), Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الدفاعية. والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية. راجع حصانة.

27737 - مَنَاعَة ، مَنَاقِوَة Résistance (F).

Resistance (E).

27738 - مَنَاقِصَة Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد المنقصة.

27739 - مَنَاقِصَة مُقَيَّدَة Restricted allocation (E).

نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راض بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين من تتجهيم الادارة بعد استبعاد الآخرين.

27740 - مَنَاقِيعِي ٥ Hélophyte (F), Helophyte (E).

نعت ترميى يطلق على كل نبات يعيش وينمو في ارسال المستنقعات غير المالحة.

27741 - مَنَاجِب Rémiges secondaires, Favillons (F), Wing secondaries (E).

من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوام ويتقدم الخواطي. الواحد منجب.

27742 - مَنَاقِيعِي ٥ Praticabilité (F),

Praticability (E).

هي التيسير في النهج والعمل تسهلاً لازمة.

27743 - مَنَاقِرَاتُ تَدْلِيسِيَّة Manœuvres dolosives (F), Swindling (E).

اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر. وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون.

27744 - مَنَتَب Habitat

الكورة او المكان الذي يلازم هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طيبياً.

27745 - مَنَتَب Source (F), Spring (E).

المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



مَنثَة

27768 - مَثُور أَصْفَر \* ، خَيْرِي أَصْفَر  
Fauille (F).  
Sickle, Reaping-hook (E). أداة يدوية تستعمل للحش .

27769 - مَثُور مَاتِي  
Faucard (F).  
Long-handled scythe (E). منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات المسائية .

27770 - مَثُورِي  
Falciforme (F).  
Falcate, Falciform (E). نمت وصفي يطلق على ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - مَثُورِي  
Gisement, Mine (F).  
Lie, Layer, Mine (E). موقع المدين في جوف الارض .

27772 - مَثُورِي  
Rucher (F).  
Stand or shed for bees (E). المنحلة والمعمرة والنحيتة هي مجموعة القفران أو الخلايا التي يتجمعها النحال .

27773 - مَثُورِي ، أَزُور  
Courbe (F).  
Graph, Graphic curve (E).

27774 - مَثُورِي الْأَضْلَاع  
Curviline (F).  
Curvilinear (E).

27775 - مَثُورِياتِ الْإِرْتِفَاع  
Courbes de niveau (F). Contour lines (E). هي خطوط الأرهأ ، راجعها .

27776 - مَثُورِي  
Calibreur (F). Jiggerer (E). آلة تَنْخَب التَّار أي تفرقها وتوزعها بحسب أبعادها .

27777 - مَثُورِي  
Naseau (F). Nostril (E).

27778 - مَثُورِيَات  
Foraminifères (F).  
Foraminifera (E). رتبة حيوانات دنيا من الجدریات .

27779 - مَثُورِي  
Aiguillon (F). Goad, Sting (E). عصا طويلة مسارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

27780 - مَثُورِيَات  
Porte-aiguillons (F). هي الحويئات ، راجعها .

27781 - مَثُورِيَة الْمَيْض  
Infériorité (F).  
Inferior (E). نمت تعريبي توصف به ازهار النبات المنخفضة المبيض من فئة المتحدات القملات .

27782 - مَثُورِي ، مَقْطُوع  
Blutoir (F).  
Bolter (E).

27783 - مَثُورِيَة  
Vaporisateur (F).  
Vaporizer, Sprayer (E). جهاز يستعمل لنفض السوائل وذرها كالنبي .

27784 - مَثُورِي  
Conocephalus mandibularis (S). Conocéphale (F). حشرة من الجنادب وفصيلة القبطويات . ثوبها ثنائي اللون ، اخضر الكوسل والبطن والظهوران ، اسمر الرأس والشرج والسيقان . جسمها صغير القذ يطول من ١٩ الى ٢٧ م . جناحهاا يلحفان الجسم والسررك والمرز . ساقهاا طولان من ١٦ الى ٢٠ م . مرزهاا وسرركهاا مستطيلان جالسان

27758 - مَثُور أَصْفَر \* ، خَيْرِي أَصْفَر  
Cheiranthus cheiri (S). Giroflée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gilliflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).

نوع من المَثُور التَّريبي . يجمته سر ودية ، معمرة ، فراء ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها كاملة منقطة ، نصلهاا بحري اللون ، ساني الشكل ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عبقودية التجميع ، ناجي الايتكاز . ازهارها عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

27759 - مَثُور بَرِّي \* ، شِمْتَم ، خَمِخَم  
Matthiola livida (S). Matthiöle livide, Giroflée livide (F). Gilliflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I). نوع من المَثُور البرية الملبلة يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهارها عبقودية ، طرفية ، متفرقة ، قليلة العدد ، لونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يملوها تزييح ضيق اسمر || ازهارها يستمر طوال الربيع .

27760 - مَثُور شَتَوِي \*  
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Giroflée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gilliflower, Queen's stock, Stock (E). Gemeine Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Fior barco, Fior bono (I).

نوع من المَثُور الحولي والغول وهو بالحقيقة نوع من المَثُور . صروبته واسرامه كثيرة العدد . نباتاته تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . سورهاا غشوية فراء . اوراقها منقطة احليجية الشكل . نصلهاا بحري اللون ، اطحل الملاج ، خلي البشرة على صفحتيه . ازهارها عبقودية التجميع يكثر فيها المكس وفي عطرية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبنيجي والوردي والابيض والاصفر والمزق والموشح . ازهارها يستمر من اذار الى تموز .

27761 - مَثُور لَيْلِي  
Giroflée des jardins (F). هو المَثُور المكسبة ، اطلهاا .

27762 - مَثُورِي  
منج : المنج : الماش الاخضر .

27763 - مَثُورِي ، مَثُورِي ، مَثُورِي  
Manglier (F). Mango tree (E). هي شجرة الانج ، اطلهاا .

27764 - مَثُورِي \* ، مَثُورِي ، مَثُورِي  
Mangue (F). Mango (E).

هي ثمرة الانج ، تعتبر من افيد ثمار البلاد الحارة ويقال انها تنشط الدم وتقيد الامعاء .

27765 - مَثُورِي  
Mangabey (F). هو الحودل ، من القردة الالبالة ، اطلهاا .

27766 - مَثُورِيَات  
Orycteropidae (S). Orycteropidae (F). هي فصيلة الحافرات من رتبة الدرد .

27767 - مَثُورِي  
Pâturage (F).  
Pasture, Grazing (E). هو المنتجع ، مرج طبيعي اقل عشبا من المرعى .



مَثُور أَصْفَر



مَثُور بَرِّي



مَثُور شَتَوِي



مَثُورِي



\* ۲۷۷۹۷ - منڈوسه اليڳيه \*

Bruchus brachialis (S). Bruche de la vèscé (F).  
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).



منڊال

Appontement (F).

\* ۲۷۷۹۵ - منڈنڅه \*

Flying-bridge (E).

صقاله بحريه تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن،  
بقلوسها، اليها تنه الشحن او التفريغ. ج. منادخ.

Menodora scabra (S).

Ménodore scabre (F).

جنبه عمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الزيتونيات.  
مهداه المكسيك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة  
الامريكية تزور للتزوين || ساقها قصيرة تملو من ۲۵  
الى ۴۰ سم. فرونها مزوانية اوراقها صفيرة خيطية النصل  
طولها نحو ۲۰ م. وعرضها ۳ م. لونها الال خضار الاصفر  
اغمارها بويّة صفراء اللون قطرها نحو ۲ سم. || تنويرها  
يستمر طوال فصل الصيف.



منڈوسه البازلا

Mandarinier (F).

Mandarin orange tree, Tangerine orange tree (E).

هي شجرة الليمون الانديي اي اليوسني، اطليها.

Mandarine (F).

Mandarin, Tangerine (E).

ثمرة المنترين اي اليوسني او الليمون الانديي.



منڈوسه البازلا

\* ۲۷۷۹۸ - منڈوسه العدس \*

Bruchus lentis, B. pallidicornis (S). Bruche des lentilles (F). Lentil weevil (E). Linsenkäfer (D).

حشرة من المنديويات. طولها نحو ۳ م. نوبها الى السمرة  
تملوا زغبية بنية ويقع غبار اللون قليلة الاتسام || جيلها  
الحولي واحد. تركيب العدس فتتخر الحبة وتقيم فيها.



منڈوسه العدس

Adné (F). Adnate (E).

\* ۲۷۷۹۹ - منڈنڅه \*

Zygomorphe (F).

Zygomorphous (E).

نمت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزهرية متشابهة  
متحدة.

Protractile (F). Protractor (E).

\* ۲۷۷۹۶ - منڈنڅه \*

Amarante tricolore (F).

هو القليقة الثلاثية الالوان، اطليها.

Mendélien (F). Mendelian (E).

نمت تعريفي يطلق على كل قاعدة او عملية بنشقة من  
مذهب مندل الوراثي.



منڈوسه الفول

Mendélisme (F). Mendelism (E).

هي مذهب مندل في الوراثة، ملخصه ان النبات يتوارث  
صفات معينة دون غيرها وذلك ينسب بحسب مذهب لا  
شود في نها.

Monodore (F).

\* ۲۷۷۹۵ - منڈوسه \*

شجرة تدعى حيدلان، اطليها.

\* ۲۷۷۹۶ - منڈوسه البازلا \*

Bruchus pisorum (S). Bruche du pois (F). Pea beetle (E). Erbsenkäfer (D).

حشرة من المنديويات. طولها يراوح من ۴ الى ۵ م.  
نوبها الى السمرة، ظهرها مبقع بالاعفر، زغبها حنطي.  
جيلها الحولي واحد. تركيب البازلا دون سولها فتتخر  
الحبة وتقيم فيها ولا يوبد في الحبة الواحدة سوى حشرة  
او يرقه.



منڈوسه اللوبيا

\* ۲۷۸۰۱ - منڈوسه النفل \*

Bruchidius trifolii (S). Bruche des trèfles (F).

حشرة من المنديويات طولها ۲ م. نوبها اسود اللون،  
ظهرها مخطط بالاعفر. قوائمها وزبانها سود || جيلها  
الحولي واحد، تركيب مع يرقاتها يلدو النفل على انواعه.

\* ۲۷۸۰۲ - منڈوسه صيڻه \*

Callosobruchus sinensis (S). Bruche chinoise (F).  
Cowpea weevil (E). Chinesischer Bohnenkäfer, Kunkedkäfer (D).

حشرة من المنديويات طولها يراوح من ۲ الى ۳ م. نوبها

بحرية اللون. ازهارها ضمني الشكل ، خاسي التجميع .  
ازهارها صغيرة المالحق بيضاء اللون ، صناعية المالحق ،  
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال  
شهر ايار .

٢٧٨١٣ - مَنَزِيلِيَّة \*  
Mentzelia (S).  
Mentzélle (F). Mentzelia (E).

جنس نباتات عشبية برية ويزنينية من فصيلة الورديات .  
منبتها بعض مناطق امريكا ، الشمالية . سوقها فروع تملو  
من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطنة ، متعاقبة . خاسية  
التفريص ، مدببة الفلق . ازهارها غشوية ، خاسية  
الفصل ، خاسية او عشارية البتلات ، عديدة الاسدية ،  
عطرية العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تنبلج في الليل  
ابتداء من الغروب الى اشراقها المتفرقة قليلة العدد اشهرها  
التالية :

٢٧٨١٤ - مَنَزِيلِيَّة عَشَارِيَّة البَتَلَات \*  
Mentzelia decapetala (S). Mentzélle à 10 pétales (F).

نوع من المَنَزِيلِيَّة . عشبة محولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠  
سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها  
تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ،  
قطرها من ١٠ الى ١٢ سم. وهي عشارية البتلات تضم  
نحو ٣٠٠ مداة الى تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - مَنَزِيلِيَّة ليندلي \*  
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzélle de Lindley (F).

نوع من المَنَزِيلِيَّة . عشبة حولية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم .  
ساقها فروع ماسلة اللحاء . اوراقها تطول نحو ٧ سم .  
نصالحها خلية على الصفحتين . ازهارها بجيلة الصفار  
الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم . وهي خاسية البتلات ، عديدة  
الاسدية نحو ١٥٠ الى تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٢٧٨١٦ - مَنَس \*  
Méristème (F). Meristème (E).

هو النسيج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - مَنَسَاب \*  
Compas de proportion (F).  
Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - مَنَسَاب \* ، بُولدُوَز \*  
Bulldozer

جراة آلية ينسج بها التراب والصخور فتدفع بها جرفاً  
من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - مَنَسَاب \*  
Pantographe (F).  
Pantograph (E).

جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتقليصها .

٢٧٨٢٠ - مَنَسَر \*  
Bec d'oiseau de proie (F).  
Bill of the prey (E).

هو منقار كواسر الطير ، يتميز بقوته وانغاف بهرته الذرية  
الحادة الطرف .

٢٧٨٢١ - مَنَسَكَة \*  
Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - مَنَسَف ، مَنَسَكَة \*  
Winnowing-basket, W.-machine (E).

جهاز يدوي او آلي يستعمل في نسف الحبوب لتنظيفها  
من الاجرام .

اسود اللون يعلو بقع بيض جليلة الانسام الى جيلها  
الحولي واحد . تركب مع رقاتها الهندس والمخمس والفاصوليا  
فتنخر الحب وتعلبه .

٢٧٨٢٣ - مَنَدُوسِيَّات \*  
Bruchidae (S).  
Bruchidés (F). Bruchidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زيا الجسم ، خطمية  
الملك . قرونها الاستشادية مركبة من ١١ فاصلة لكنها  
غثلفة الاشكال يكثر فيها الخيطي والمشاري والمشي  
والصولياني . انحدادها لا تلتحف كآمال الجسم . ارساغها  
خاسية التكون ، رباعية المظهر الخارجي . مكها ذري  
القد ، يضي الشكل ، اصفر اللون ، تمتصه الانثى على  
الازهار والثمار والحبوب فيتفت عن رقات دقيقة غبراء  
اللون تعيش على الثمار والحبوب فتنخرها وتنتسلخ فيها وتتحول  
الى حوريات فحشرات كاملة .

٢٧٨٢٤ - مَنَدُول \*  
Maena (S). Mendole (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنطويات . انواعها المعروفة  
اعطائها المتوسط . جميعها صغيرة القد تطلو من ١٨ الى ٢٢ سم  
تتميز زعانفها الظهرية الفردية المستطيلة وزعانفها الشربية  
الفاخرة الى اشهر انواعها المنطولة المبدولة ، اطليا .

٢٧٨٢٥ - مَنَدُولَة مَبْدُولَة \*  
Maena vulgaris (S). Mendole commune, Amendoula,  
Matasouldat (F).

نوع من المنطول وهي سمكة مبدولة في المتوسط . جسمها  
اهليبي الشكل يطلو نحو ٢٠ سم . ثوبها فضي اللون ،  
ظهورها عايق التفتيض تملو خطوط سم .

٢٧٨٢٦ - مَنَدُوسِيَّات \*  
Maenidae (S).  
Ménidés (F). Maenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكان الزعانف ، اجناسها  
وانواعها عديدة . اشهرها المنطول والشام .

٢٧٨٢٧ - مَنَدِي \*  
Sennopithèque (F).

نوع من القرد المقدسة يهدي هبار ، اطليه .

٢٧٨٢٨ - مَنَدِيلِيَّة \*  
مَنَدِيلِيَّة \* هي قوتحان المروج ، اطليه .

٢٧٨٢٩ - مَنَدِيَّة ، مَنَدِيَّة \*  
Drain (F).  
Drain-pipe (E).

مندية . ج منازح ، قناة تستعمل لتفويض التربة اي  
لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - مَنَدَر ، مَنَدَر \*  
Tendance (F).  
Tendency (E).

٢٧٨١١ - مَنَدَرُوكَة \*  
Exproprié (F).  
Expropriate (E).

هو المقار التي نزع ملكيته من يد صاحبه .

٢٧٨١٢ - مَنَدَرِيَّة \*  
Menziésia (S).  
Menziésie (F). Menziésia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي "ارشيليه  
منزي" جنس جنبات صغيرة معمرة من فصيلة الحنجلجات  
مهدها امريكا الشمالية . انواعها المعروفة قليلة العدد الى  
سوقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابلة  
متعاقبة . نصالحها اهليبية مستطيلة . صفحاتها السفلى



مندولة مبدولة



منديلة



منداس

## ٢٧٨٢٣ - منسل ، غُدَّة قَنَاسِيَّة

Gonade (F). Gonad (E).

هي الغدة التي تنتج البويضات وتفرز الهرمونات. لذلك فالخصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي ج منسل.

## ٢٧٨٢٤ - منسل

Narine de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناس. هو منخر الاسماك خاصة.

## ٢٧٨٢٥ - منسل

Aspidium lonchitis (S).

Aspidie (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capeivenere doppio (I).

نوع من السراخس البسيجايات المعمرة. ضروريه عديدة منها البرية والزرينية. يرغب في الارترية الرملية وفي المواقع الرطبة. ابروته مدادة. اوراقه منتصبه، مراجه مثله الزوايا، زركامه عادمة النشاء، لونه الى الخضار الاصفر. يزرع في المراكن فيجود.

## ٢٧٨٢٦ - منسيلة

Mancenillier (F).

هي الصابة، اطلبها.

## ٢٧٨٢٧ - منسوب

Homogène (F).

Homogenous (E).

## ٢٧٨٢٨ - منسوبية

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان.

## ٢٧٨٢٩ - منسوح

Lézardé (F). Cracked (F).

ما كان النسيج صلب.

## ٢٧٨٣٠ - منسوية

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة التكاثر الخليوي حيث النسيج الانشائي.

## ٢٧٨٣١ - منسية

Trucherau (F).

هي الميوافريون المعروف، اطلبه.

## ٢٧٨٣٢ - منشأ

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبعه.

## ٢٧٨٣٣ - منشاة

Amidonnerie (F).

Starch-works (E). هي الملل الذي يصنع فيه النشا.

## ٢٧٨٣٤ - منشاح

Plastotype

نعت تعريفي يطلق على كل جزء اثني يتأثر بالحيض فيتنور.

## ٢٧٨٣٥ - منشار

Scie (F).

سمكة بحرية من الاشلاق، مشهورة باسم ابو منشار.

## ٢٧٨٣٦ - منشار

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تستعمل في نشر الاشخاب والعمادن والحجارة الخ.

## ٢٧٨٣٧ - منشاري

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نعت تعريفي وصفي يطلق على كل ما كان تفريص حافته يشبه اسنان المنشار.

## ٢٧٨٣٨ - منشاريات

Pristidae (S).

Pristidés (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماءك من رتبة الاشلاق.

## ٢٧٨٣٩ - منشاريات

Tenthredinidae (S).

Tenthredinidés (F). Tenthredinidae, Sawflies (E). Blattwaspen, Sägewaspen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها صغيرة القفا طويلا براوح من ٣ الى ١٥ سم. ارجلها مختلفة الالوان. قربها الاستعمارية خيطية || رقباتها دودية عديدة الارجل تحمل عادة دون الثانية او اكثر من ١٦ وهي باكريتها خائبة ومنها الواشمة والشارمة.

## ٢٧٨٤٠ - منشارية ، ذباب منشاري

Tenthredo (S). Tenthredé, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات، انواعه نحو ٢٠٠ اكثرها من الحشرات الضارة، شذام مرزا من كائنات غرق اصلب اللحاء. رقباتها ناعمة لا تعف من شيء. اشهر انواعه المؤذية ما يتبع:

## ٢٧٨٤١ - منشارية السوسن

Rhadinoceraea micans (S). Tenthredé des iris (F). نوع من المنشارية، لها جيلان في الحول، طولها براوح من ٧ الى ٩ سم. ثوبها الى السواد اللامع. زياتها قصيرتان. تظهر في اوائل حزيران || رقبها اسطوانية الجسم المائل الاشهب التوب. رأسها مستدير الشكل جوزي اللون. تركب اوراق السوسن فتقذها اشد الاذى.

## ٢٧٨٤٢ - منشارية الكشميش

Pteronidea ribesii (S). Tenthredé du groseillier (F). Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).

نوع من المنشارية، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها براوح من ٦ الى ٨ سم. ذكورها سود الانواب اناتها صفر. رقباتها خضر الانواب المنمشة بنكت سود. تركب الكشميش قتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تعف من العروق.

## ٢٧٨٤٣ - منشارية الفت

Athalia colibri (S). Tenthredé de la rave (F). Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).

نوع من المنشارية، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها براوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصفرة. رأسها والقسم الخلفي من جوفها الى السمر. رقبها سمرء اللون غيرء المواج تحمل ١٦ زوجاً من الارجل. تركب مختلف اوراق الصليبيات اخضها الفت.

## ٢٧٨٤٤ - منشارية الورد

Arge rosae, Hylatoma rosae (S). Tenthredé du rosier (F). Arge rosae (E). Rosenbüschthornwespe (D).

نوع من المنشارية، لها جيلان في الحول. طولها براوح من ٧ الى ١٠ سم. رأسها وزياتها سود. جوفها اسود واصفر، بطها وارجلها صفر. اجنحتها شفافة وريدية المراج. رقبها الى الحفرة الزاهية. تركب اوراق الورد تقضي عليها.



منسل



منشارية السوسن



منشارية الكشميش



منشارية الفت



منشارية الورد

Clivé (F). Cleavat (E). ٢٧٨٥٥ - مُنْشَطِرٌ

Phénomène (F). ٢٧٨٥٦ - مُنْشَعٌ  
Phénoménon (E). هو الظاهرة . ج مناشع .

Phénoménisme (F). ٢٧٨٥٧ - مُنْشَعِيَّةٌ  
المنشعية مذهب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرية والحيلولة .  
أطلب ظاهرية .

Narine d'oiseau (F). ٢٧٨٥٨ - مُنْشَقٌ  
Nostril of the bird (E). هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما منشقان .

Bissectrice (F). Bisecting (E). ٢٧٨٥٩ - مُنْشَقٌّ

Germandrée sauvage (F). ٢٧٨٦٠ - مُنْشَارٌ  
هو الاسقروديون البري ، اعطيه .

٢٧٨٦١ - مُنْشَعَةٌ ، مُنْشَحَةٌ  
Pulvérisateur (F). Pulverisateur, Vaporizer (E).  
آلة تستعمل لضخ الأدوية السائلة على النبات . وللمناضج  
مختلفة الاشكال والاحجام والتصاصيم وقد تكون آلية أو  
يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ٢٧٨٦٢ - مُنْشَدٌّ  
هو حجر الشيست . راجع شيست .

Coercible ٢٧٨٦٣ - مُنْشَطُطٌ  
ما كان قابلاً لضغط كالخيار وغيره .

Megaderma (S). ٢٧٨٦٤ - مُنْشَاطٌ \*  
Mégaderme (F).  
جنس حيوان من فصيلة الحوريات . انواعه اربعة تتميز  
بفراطيسها الطويلة الذقنة ، بزوائد المنخرية الشارفة ،  
بامتطاطها ورحابة ساطها الفشائي ويغطيها من الذئب الظاهر .  
كما انها عادمة النشاي العلوية ، أما نواجلها فخمسة .  
اجسامها صغيرة القد طويلاً يراوح من ٨ الى ١١ سم .  
وبسطها من ٣٥ الى ٤٥ سم . أنثاها ريادة اللون يعلوها  
مراج اصفر يمتد مع اقترابه من ثيج الظهر || موطنها  
الافريقية الشرقية وسرنديب والهند . تألت الكهوف والمغاور  
واليبيوت الحرة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات  
والديدانيات والصفادون والاسماك الصغيرة .

Polyplodie (F). Polyplod (E). ٢٧٨٦٥ - مُنْشَاطٌ \*  
كل خلية تتألف بمجموعة نشبة المتشابهة من عدة مناشط .

Aérostatics (F). ٢٧٨٦٦ - مُنْشَطَّةٌ  
Aerostatics (E). هي علم توازن الهواء .

Gamme ٢٧٨٦٧ - مُنْشَطَسٌ \*  
هو سلم سياق الانغام المتتابعة المتناسقة ان صاعدة او  
هابطة . وهو مدرج تتابع الالوان والمذاقات الخ ...

Génome, Haplome (F). ٢٧٨٦٨ - مُنْشَطَسٌ \*  
مجموعة نشاط او نشب العامة الواحدة .

Zone ٢٧٨٦٩ - مُنْشَطَّةٌ  
مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وعوامل  
جوية واحدة .

٢٧٨٤٥ - مُنْشَارِيَّةٌ بِرَّاقَةٌ \*  
Caliroa limacina (S). Tenthredine limace (F).  
Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschblatt-  
wespe (D).

نوع من المنشارية ، طويلاً نحو ٥ سم . ثوبها الى السمرة  
السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزها مستطيل الشلام . اناتها  
اكثر عدداً من ذكورها تمتد بكها في بشرة الفصلي فينثف  
عن برقات تشبه البراق ، لوها الى الخضرة السمراء . تركيب  
اوراق معظم الانجسار المشرية فترى النصل وتنف عن  
البروق .

٢٧٨٤٦ - مُنْشَارِيَّةٌ دَمِيمَةٌ  
Tenthredo difformis (S). Tenthredine difforme (F).  
نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، غليظة الشكل . طويلاً  
يرأوح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السمرة . اجيالها الحولية  
ثلاثة . برقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصليبيات .

٢٧٨٤٧ - مُنْشَارِيَّةٌ سَوْدَاءُ \*  
Tenthredo aethiops (S). Tenthredine noire (F).  
نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طويلاً يراوح من ٥ الى  
٦ سم . ثوبها الى السمرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة .  
برقاتها مؤذية تقضم خضيب النصل على صفحتها العليا .  
والبرقة تبدو صفراء اللون خضراء المواج ثم تتعرف رويداً  
رويداً الى السمرة الخفيفة الفادكة .

٢٧٨٤٨ - مُنْشَارِيَّةٌ مُزْرَعَةٌ \*  
Emphytus cinctus (S). Tenthredine ceinture (F).  
نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، طويلاً نحو ٨ سم . ثوبها  
الى السمرة المزرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من  
٢ الى ٣ . برقاتها سمراء اللون خضراء في الانابيب الميكانيكية  
تندخلها من مواضع القطع على اثر الاشذيب والتقليم .

٢٧٨٤٩ - مُنْشَارِيَّةٌ مُنْشَطَّةٌ \*  
Tenthredo zonata (S). Tenthredine zonée (F).  
نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طويلاً نحو ٥ سم . ثوبها  
الى السمرة الفاتحة المخططة بالاسود . برقاتها مؤذية تقضم  
اوراق نباتات الفصيلة الوردية اخصها الورد .

٢٧٨٥٠ - مُنْشَاطٌ ، مِقْبَاسُ الْقُوَّةِ  
Dynamomètre (F). Dynamometer (E).  
جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

٢٧٨٥١ - مُنْشَاطٌ كَهْرَبَائِيٌّ \*  
Electrodynamomètre (F). Electrodynamometer (E).  
جهاز يرتكز على ما تمارسه المغنطة من تأثير في التيار  
الثابت والمتحرك .

٢٧٨٥٢ - مُنْشَاعٌ \*  
Doseur (F). Dosimeter (E).  
جهاز يستعمل في التثنيح او التركيز .

٢٧٨٥٣ - مُنْشَرٌ  
Séchoir (F). Drying-sun (E).  
المكان المثل للنشر وتجفيف اوراق التبغ في الشمس وهو  
يعني أيضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشايك التبغ  
الاخضر ربيعاً تجف الاوراق اخصها المناشر الطويلة  
والمجموعة والتقاله .

٢٧٨٥٤ - مُنْشَرَةٌ  
Scierie (F). Saw-mill (E).  
هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



منشارية برّاقة



منشارية سوداء




منشارية مزرة



منشارية منطقة



منشفة يدوية



منشفة آلية



منطاب

Manguier (F).

٢٧٨٨٤ - منفاخ

هي شجرة الانج ، اطلبها .

Manganate

٢٧٨٨٥ - منغانات ، منغانات

المنغانات هي املاح الحامض المنغنيسي .

٢٧٨٨٦ - منغنيوزا ، منغنيوس ، منغنيوز

Manganèse (F). Manganese (E).

معدن اشهب اللون شديد الصلابة واللوعة قابل للصلق.  
وزنه (Mn - م) وزنه الانوي ٤٤,٩٣ ءقله النوي ٧,٢يحلل الماء في ١٠٠م.غ. ينصهر في ١٢٢٥م.غ. ويغلي  
في ١٩٠٠م.غ. وهو يوجد في الطبيعة على هيئة مركبات  
كهاوية اخصها الاوكسيدات والكريونات ، ويوجد ايضاً  
في معظم النسخ النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوجد في  
جميع الارربة . بذات السبب الضئيلة || يستعمل ويستخدم  
صناعياً في عدة تراكيب اخصها الصلب .

منفاخ

٢٧٨٨٧ - منغفو هو الانج ، اطلبه .

Mangiferae (S).

٢٧٨٨٨ - منغيات

Mangiférées (F). Mangiferae (E).

سبط من البطميات ومنهم من جعلها فصيلة مستقلة .

Soufflet (F). Bellows (E).

٢٧٨٨٩ - منفاخ \*

اداة يدوية تستعمل في ذر المساحيق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - منفاخ كبريت \*

Sulphurator (E).

اداة تستعمل في ذر مساحيق الكبريت .

Caillette (F).

٢٧٨٩١ - منفحة ، فون

Rennet (E).

جزء من معدة المبررات .

Préure (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - منفحة

هي المسوة ، خيرة قابلة للذوبان ، تستخرج من منفة الجدي  
الرضيع ، تستعمل في تجبين الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - منفد

هو من قام بالتنفيذ .

٢٧٨٩٤ - منفد الوصية

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

هو الذي يعينه الموصي في الوصية لينفذ ما جاء فيها .

Déodactyles (F).

٢٧٨٩٥ - منفصلات الاصابع

احد قسمي الطيور الجواثم ، يشمل عدة رنقيات والعديد  
من الفصائل والجناس والانواع .

٢٧٨٩٦ - منفض

نمت تعريفي توصف به الدجاجة التي كفت عن البيض .

Egreneuse, Egre noir (F).

٢٧٨٩٧ - منفض

آلة تفصل حب الذرة وبزور مختلف نباتات الكلا عن  
مطرها ورائيسها وسابلهما وسفلهما .

Déhiscent (F). Dehiscent (E).

٢٧٨٩٨ - منفلق

نمت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية التي ينقل درزها  
عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - منفاخ ، منفاخ

الجزء القري الامامي البارز من رؤس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - منطقة الإختصاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشملها اختصاص احدى المحاكم وهي  
ايضاً تعيين درجة الاختصاص .

Baudrier d'Orion (F).

٢٧٨٩١ - منطقة الجوزاء

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار  
اي الجوزاء . وتدعى ايضاً النطاق ونطاق الجوزاء وفقار  
الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - منطقة حرّة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع للرسوم الجمركية .

Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٩٣ - منطقة عقارية

Cestodes (F). Cestoda (E).

٢٧٨٩٤ - منطقيات

صف من الديد الرنفيات .

Mniotiltidae (S).

٢٧٨٩٥ - منطيليات

Mniotiltidés (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقر . اجناسها وانواعها  
عديدة اعطائها نعت من الهند الى امريكة الجنوبية والشمالية ||  
اجسامها منيرة قريبة الشب بالقرنف . اذواها ملونة  
تكثر فيها الطحلة والياض || ملجها الحيائي زوجي في  
زمن التافد والحضن ثم جماعي || قوتها الحشرات وكبها  
ويرقاتها والثار البائعة والبلور || تدفن في تجايف الانجار  
من مرتين الى ثلاث مرات في الحول . حفنتها اربع  
بيضات .

Isotherme (F). Isotherm (E).

٢٧٨٩٦ - منطاة

منظام او ايزوترم . ج منظم : خطوط الحرارة الاقليمية  
او العالمية للمساوية التوزيع .

Détargent, Détersif (F).

٢٧٨٩٧ - منطف

Detergent, Detersive (E).

Organisation (F).

٢٧٨٩٨ - منطمة

Organization (E).

٢٧٨٩٩ - منططور خطي

Perspective linéale (F). Linear perspective (E).

Crabe (F). Crab (E).

٢٧٨٩٠ - منفع

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

Crabe à laine (F).

٢٧٨٩١ - منفع مصوف

هو الخيتل دويبة بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٨٩٢ - منفعطت الهر

منعطف النهر ثلاثة انجم نيرة متتالية من كوكبة النهر  
المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس . موقعها في المنعطف  
الثاني للنهر .

٢٧٨٩٣ - منفعطقات الاجنحة

راجع ملتويات الاجنحة .



منفاخ كبريت

مترابكة اللؤلؤ الساطعة. قوتها الثَّار والبذور وبعض الحشرات || اعرف انواعها واشهرها المنكان الطويل الذئب والمنكان الزاهب .

٢٧٩١٤ - مَنَكَّان رَاهِب \* Pipra monacus (S).  
Manakin moine (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّيَاب . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد الاسفغ المواج . ثوب السفلي الى البياض الاصفر . يتميز بقده عنقه التي تتنفع وتنتفش عند الطلب فتبدو كاللقن وهو ما دعي الى كنيته بالراهب . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . حذقة عينه عسيلة اللون . جناحه قصير وذنبه كذلك . رسناه دقيقان ، رفيهان ، احمران || اخلاقه رضية لكنه كثير الوجيل وشديده الحذر . قوته الثَّار البانمة وبعض الحشرات || يذئن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع . الاثني تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٥ - مَنَكَّان طَوِيل الذَّئْب \* Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الثَّيَاب الرطبة . فوجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه الى الزرقة البياوية . جبهة وقمة رأسه الى الحمرة الزاهرة . حمسراه وضعفه وجناحاه وذنبه الى السواد الاسفغ اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حذقة عينه الى الحمرة القرمزية . مقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . رسناه دقيقان رفيهان ، حطيا اللون . ثوب الاثني الى الخضار الزيتي السوي . ثوب الصغار حق التحسير الاثني لا يختلف عن ثوب الاثني || اخلاقه هنية لكنه كثير الوجيل والحذر . قوته الثَّار البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السفيف والتصعيد والتبييط || يذئن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع عند اطراف الاغصان . الاثني تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوما .

٢٧٩١٦ - مَنَكِب الجَوْزَاء Bételgeuse (F).  
Bételgeuse (E).

منكب الجوزاء نجم ثَّير يترقالي اللون من المرتبة الاولى . مركزه على منكب الجبار البني اي الشرقية . يبعد عن الارض نحو ٣٠٠ سنة ضوئية .

٢٧٩١٧ - مَنَكِبُ الْقَرَس Brunfelsia hopeana, Francisca uniflora (S).

منكب القرس نجم ثَّير من كوكبة نجوم القرس الاعظم .

٢٧٩١٨ - مَنَكِب ذي الْعَيْنَان Manaca (F). Manakakraut (D).

كوكب .

٢٧٩١٩ - مَنَكَّة

Brunfelsia hopeana, Francisca uniflora (S).  
Manaca (F). Manakakraut (D).

الاسم العربي كالفرنسي والانكليزي والاماني تعريب الاسم البرازيلي . شجيرة طيبة برية وتربينية من فصيلة الباذنجانيات . مهدها بعض مناطق امريكا الجنوبية اخصها البرازيل || ساقها فرعاه تدلو نحو اربعة امتار . اوراقها متناقبة ،

٢٧٩٠٠ - مَنَقَّار الدَّجَاجَةِ

منقار الدجاجة نجم ثَّير من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - مَنَقَّار الْغُرَاب

منقار الغراب نجم من كوكبة الغراب المعروفة ايضا بالغلاب الياني .



منقاعية

٢٧٩٠٢ - مَنَقَّاعِيَّات Limnanthaceae (S).

Limnanthaceae (F). Limnanthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها اعشاب منقعية ، معظمها حولي . اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خاسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها عتيبة صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - مَنَقَّاعِيَّة Limnanthes (S).

Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E).

Rosenrote Sumpfbiume (D). Limnanto (I).

جنس نباتات عشبية منقعية من فصيلة المنقاعيات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سوقها تطول من ٢٠ الى ٧٠ سم . معظمها ينبت على الارض . اوراقها مركبة ريشية مخبرية . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - مَنَقَب

المنقب نجم ثَّير من كوكبة قيطس مركزه في الرأس .

٢٧٩٠٥ - مَنَقَبَة Palmeria (F).

Palm-plantation (E).

هي الحائش اي بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - مَنَقَسِم، مَقْدُور الْقِسْمَة Divisible

Déperditeur (F).

٢٧٩٠٧ - مَنَقِص تمت تعريفه يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد اي الطاقة الكامنة في الجسم .

٢٧٩٠٨ - مَنَقِطِع Discontinuu (F).

هو المنقطع اي غير المستمر او المتواصل .



منكاش

٢٧٩٠٩ - مَنَقَع Marais, Marécage (F).

Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E).

ارض منخفضة يستنقع فيها الماء .

٢٧٩١٠ - مَنَقْعِيَّة Palustre (F). Paludal (E).

منقعي وغلدياني وغديري : تمت تعريفه يطلق على النباتات التي تعيش في المائتج .

٢٧٩١١ - مَنَقَل \* ، مَزُون Gonlometre (F).

آلة للمسح ، تقاس بها زوايا الارض . (E). Gonliometer

٢٧٩١٢ - مَنَكَّاش Binette (F). Hoe (E).

اداة الغرز الخفيف تستعمل باليد .



منكان راهب

٢٧٩١٣ - مَنَكَّان Pipra (S).

Manakin (F). Manakin (E).

جنس طير من فصيلة البيريات . انواعه المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى والجنوبية . تألف الرياض والغابات الرطبة . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٥ الى ٢٠ زوجاً || اجسامها صغيرة ، ربة ،



منورينة

Manorina (S). \***مُنُورِينَة** ٢٧٩٣٣  
Manorine (F). Manorina (E).  
جنس طير من فصيلة المغرريات . انواعه المعروفة خمسة  
موطنها أستراليا والجزر القريبة منها . لونها الحياتي  
جامعي قوتها رقيق الازهار والثمار البائنة والمولم || اجسامها  
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها  
خروطية . السنها خيطية منمطة . تجرس الزهر كالنحل .  
الاوليا متراكبة الاالوان الزاهية || تدفن في الادغال القليلة  
الارتفاع . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة  
الذكور نحو ١٢ يوما .

Mannose **مَنُوز** ٢٧٩٣٤  
سكر غلوكوزي ، بلورزي التركيب ، سريع الذوبان في  
الماء ، ينتج خميرة البيرة ، يوجد في بعض النباتات اخضها  
نحار الخروب وقشور البرتقال .

Monaul (F). **مَنُول** ٢٧٩٣٥  
هو الخنط الهبي ، اطلبه .

Narcotique (F). **مُنُوم ، مُخَدَّر** ٢٧٩٣٦  
Narcotic (E).  
نمت تعريفي يطلق على المواد شبه قلبية المخدرة الموجودة  
في بعض النباتات . وقد يطلق تعميماً على كل نبات  
يحوي هذه المادة او المواد .

Sperme (F). Sperm (E). **مَسِي** ٢٧٩٣٧  
مادة مركبة مائنة لزجة تؤمن حياة الحورن المنوي تقترنها  
خصيتا الذكر وتغذيها الحويصلات النوية عند وجودها  
ويدهنها القصب عند الاندلاق .

Aphididae (S). **مَسَيَات** ٢٧٩٣٨  
Aphididés (F). Aphididae (E).  
هي فصيلة الاقيات ، اطلبها .

Sarcelle marbrée (F). **مَسِيَة** ٢٧٩٣٩  
هي الخلف الجبل ، اطلبه .

Spermatisme (F). **مَسِيَة** ٢٧٩٤٠  
Spermatism (E).

المثية مذهب الذين يعتبرون ان مني الذكر يحوي جميع  
اجزاء الملقحة . وان ما تقدمه الانثى منوط بالنشو والنوثة  
فقط .

Mania maura (S). \***مُسِيَة مُورَا** ٢٧٩٤١  
Mania maure, la Maure (F). Mania maura (E).  
حشرة من فصيلة الفسقيات ورية حشرقيات الاجنحة .  
موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا وافريقية الشمالية .  
قراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سوتها تعيش على  
اوراق النباتات المرعوية والحولية والحولة || جسمها  
كبير القد يطول نحو ٢٢ مم . بسطها نحو ٦٢ مم . رأسها  
صغير الجسم حنطي اللون . عينها كبيرتان . ذنانها  
عظيخان . جوشها وبعطها الى الحنطي الكسني المولج ||  
رواشنها عند الشقن الى الحنطي الاسمر المولج تملو في  
الزوج الامامي زركمة كسنية وتمشج وتبضع براوح  
من الجؤوة الى السمرة الكسنية . وتعلو في الزوج الخلفي  
مشحان مفرضتان لونها الى السمرة الكسنية . حناورها

ممنقة ، مستطيلة الزناد ، خلبية النصل الاقياصي التفصيص  
خلية البشرة على صفحتها || ازهارها فردية ، محورية  
الارتكاز ، مستطيلة المالحق ، صغيرة الحجم ، ليلكية  
اللون || ثمارها عنبية ، جعالية المادة ، تبدو خضراء  
وتنتهي ، عند النضج ، بالبنفسجي العايق .

Hache fourrage (F). **مَسَكِلَة** ٢٧٩٤٠  
Fodder-cutter (E).  
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلأ وما اشبه .

Décalcifié (F). **مَسَكِلِس** ٢٧٩٤١  
Decalcified (E).  
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). **مَسَكِفَة** ٢٧٩٤٢  
أداة تستعمل في عرق تربة حدائق الزهور والمباتل .

Masticable (F). **مَسْخَع** ٢٧٩٤٣

Fourmillière (F). **مَسْمَلَة** ٢٧٩٤٤  
Ant-hill, Ant's nest (E).  
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). **مَسْمَدَة** ٢٧٩٤٥  
Butyrometer (E).  
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لمعرفة مقدار السن  
في الحليب .

Méthode (F). **مَسْمَج ، مَسْمَج** ٢٧٩٤٦  
Method (E).  
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). **مَسْمَدَف** ٢٧٩٤٧  
المسدد من كان جهازه العضوي عرضة للانهداف .

Ebauche (F). Rough Shape (E). **مَسْمَر** ٢٧٩٤٨  
الرسم الاجمازي للشيء وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). **مَسْمِيَة** ٢٧٩٤٩  
نمت تعريفي يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تنشط  
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). **مَسْمِيَر** ٢٧٩٥٠  
المسمر حجر ضخم مستطيل منتصب يعود الى عصور  
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبود  
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال الى المناهر  
كثيرة العدد ، متفاوتة الحجم والطول ، اطولها يبلغ  
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

**مَسْمَر ، مَسْمَرَة** ٢٧٩٥١  
Jour de souffrance, jour de tolérance  
مطل يبيحه القانون لدخول النور فقط . ويجب ان تغفل  
الكوة بالزجاج والحديد وتكون على ارتفاع قانوني لا يقل  
عن ٢٦٠ سم . من ارض الفرقة .

Sciaphyte (F). **مَسْمَرِي** ٢٧٩٥٢  
نمت تعريفي يطلق على كل نبات لا يستطيع النوثة في  
الضخ العادي بل ينمو في ظل غيره .



منية مورَا

بعد النقع والغلي في الماء ، لأنها غنية بالعناصر المرة السامة ، لبوب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبوكوا أو قساوا . ولبوبها هذا يحوي ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد التشوية

وهو كالمنهوتات الحلوى يرغب في الارربة الخفيفة البدائية الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

Tannerie (F).

٢٧٩٤٩ - مَنِيَتَة

هي المدينة ، أطلها .

٢٧٩٥٠ - مَهَاة \* ، مَهَا

Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجمع مهورات . والمهاة بقرة وحشية قوية جامدة رقيقة الحاروك وسيدة الجنس والنوع . ثوبها الى البياض الاغبر . رأسها عايق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لولبيين ، راوح طوله ٥٠ الى ٧٠ سم . صيانتها كيرتان مكملتان . عنقها اصغر من عنق الظباء . طول جثتها نحو ٢١٠ سم . وارتفاعها ٩٠ سم . اناثها رباعية الاعلاخ || تمشي ادرات متوسطة العدد ، موطنها الصحاري والغياشي توجد في الجزيرة وسورية والنوبة وليبيا وتونس والجزائر ومراكش .

Antelope saiga (F).

٢٧٩٥١ - مَهَاة سِيكَا

نوع من الظباء يدعى سِيكَا ، اطلها .

Atomiseur (F). ٢٧٩٥٢ - مِهْبَاب ، مِهْبَاط

Atomizer, Spray (E). آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرلها كالبخار .

Cathode (F).

٢٧٩٥٣ - مِهْطِط

Remise (F).

٢٧٩٥٤ - مِهْطِط الطير

Lighting-place (E). المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجفوم او الاستراحة .

Vagin (F). Vagina (E).

٢٧٩٥٥ - مِهْطِل

من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بعنق الرحم .

Vaginal

٢٧٩٥٦ - مِهْطِلِي

Potomètre (F) Potometer (E). ٢٧٩٥٧ - مِهْطَان

المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يتنفسه النبات من ماء .

Turbellariés (F).

٢٧٩٥٨ - مِهْطَرَات

Turbellaria (E). صف من الدم العريض .

Tératologie (F).

٢٧٩٥٩ - مِهْطَجَة

Teratology (E). علم غرائب الخلقة والتعابج .

Tératologique (F).

٢٧٩٦٠ - مِهْطَجِي

Teratologic (E).

Habitat (F).

٢٧٩٦١ - مِهْد

هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان الممين منذ الاعداء اليه .

الخارجي مذبذب الاطراف || لها جليل واحد في الحلوى . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتحت المكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار الالسن تعلو خطوط جانبية معتدلة بيضاء اللون وخط ثنجي اسود قاطب . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الربة حيث تنفخ السرعة لمتلصقة بجلباب من الطين .

Mannite (F).

٢٧٩٤٢ - مَنِيَت

مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات والفطور .

Magnésie (F).

٢٧٩٤٣ - مَنِيَرَا

هي المغنيزا اي اكسيد المغنيزيوم .

Résistant (F). Unyielding (E).

٢٧٩٤٤ - مَنِيَع

Spermine (F). Spermin (E).

٢٧٩٤٥ - مَنِين

شبه قلوي غير سام يكثر في المني ويوجد في البصاقي .

Manihot (S).

٢٧٩٤٦ - مَنِيَهَوْت

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bitter Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (I). جنس نباتات معمرة من فصيلة الفربيونيات . انواعه نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البرية والزراعية الغذائية . اعطائها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية ، كفية النصل ، خاسية او سباعية القوس . ازهارها فستقية اللون ، صغيرة القد ، عشوية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز . ثمارها جراح ثلاثية الاضحية تنقل عن ٦ صمرايح || تزرع من اجل جذورها العشوية الغليظة المستطيلة التي يستخرج منها لبوب نشوي غذائي يدعى تيبوكوا || اشهر انواعه الزراعية سايي .

٢٧٩٤٧ - مَنِيَهَوْت حَلْو

Manihot dulcis, M. aipi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagnoc, Cassave (F).

نوع من المنهوتات الزراعي . ضروبه كثيرة العدد . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه متعينة عادمة التضلع ، اوراقه مستطيلة الاذنيات والاعناق الخضراء ، مستعرضة القوس . جراوه عادمة الجناح . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد التشوية

يرغب في الارربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعليل .

Manihot utilisima (S).

٢٧٩٤٨ - مَنِيَهَوْت مَر

Manioc amer, Cassave amère (F). نوع من المنهوتات الزراعي ، ضروبه كثيرة العدد . جنباته كبيرة القد تملو من ٣ الى ٥ امتار . سوقها مصلصة . اوراقها مفصصة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذنياتها جدعة . فصوص نصلها مستطيلة ضيقة . جراوها مجنحة || عساقها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوتات حلو



منهوت مر



مهة



ازهارها قنولية مغلوسة الكأس تبدو كاثقاب المدببة الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة \*

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytre, Dicentre, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielltra (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخشخاشيات . انواعها المعروفة ١٢ معظمها بري وبعضها طبي يدخل في علاجات الفسلس وبعضها تزييني . اوراقها متعاقبة ، متعقة ، مفرصة . ازهارها جميلة الشكل مهازية || اشهر انواعها واعرفها سالي .



مهرس العنب

٢٧٩٧٧ - مَهْمَزِيَّة اُنَيْقَة Dicentra eximia (S). Diélytra d'élite, D. distingué (F).

مجلة تزيينية مثدونة معمرة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هرمية الشكل منتصبة . ازهارها حراء اللون قصيرة المهازين || ازهارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جَمِيلَة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracieux, D. à belles fleurs (F).

مجلة معمرة طبية مثدونة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصلها قدي التشرم . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهازين || جلورها غنية بمادة الكورديالين الشائعة الاستعمال الطبي || ازهارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .



مهليل

٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذَهَبِيَّة

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F). مجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . اوراقها كثيفة التجميع غيظية التشرم . عناقيدها الزهرية منتصبة . ازهارها صغيرة القذ والمهازين ، ذهبية اللون || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رَائِعَة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur du Marie, Cœur de Jeannette (F). مجلة تزيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء مورقة . عناقيدها الزهرية كبيرة القذ متدلية . ازهارها قلبية الشكل ، مستطيلة المهازين ، قرمزية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عَارِشَة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimpat (F). مجلة تزيينية عارشة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروعها نحيلة . حواملها بسيطة . اوراقها تدية التشرم . عناقيدها الزهرية كبيرة القذ متدلية . ازهارها قرنية الشكل ، صفراء اللون ، عطلة || ازهارها يستمر طوال فصل الخريف .



مهازية

٢٧٩٨٢ - مَهْمَتُون Aristoloché (F). هو الزراوند ، من النباتات الطبية ، اطلبه .

٢٧٩٨٣ - مَهْمِي \* Subdésertique (F).

Subdesertic (E). هو البلقعي ، نمت تعريفي وصفي للاقليم شبه صحراوي .

٢٧٩٦٢ - مَهْدَ Planir (F). To level, To smooth (E).

اصلع وبسط التفر من الارض او ما اتخضض منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقدن التربة .

٢٧٩٦٣ - مَهْدَاج Vent précurseur de pluie (F). الريح الخنون تستبق المطر .

٢٧٩٦٤ - مَهْدَب Ctenoide (F). Ctenoid (E). نعت تعريفي يطلق عل الحراشف الابرية او المسنة الحمار الطليق . راجع مبراش .

٢٧٩٦٥ - مَهْرُ، لَكُو، لِنُو Poulain (F). Foal, Yearling (E). ولد الفرس قبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاد ومهاد ومهارة وفلاء واغلاء .

٢٧٩٦٦ - مَهْرُ الْجَنَّة Iris orateur (F). حشرة من السرعوفيات تدعى قسطية ، اطلبها .

٢٧٩٦٧ - مَهْرَة ، فِلَوَة ، فِلَوَة Poulche (F). Filly (E). هي انثى الفللو والمهر .

٢٧٩٦٨ - مَهْرَسُ الْعِنَب \* Fouloir (F). Beater (E). مهرس العنب او العاصرة ، آلة يسحق فيها العنب لاستخراج عصارتة .

٢٧٩٦٩ - مَهْرَمَة Hachoir (F). هي الخفخة ، اطلبها .

٢٧٩٧٠ - مَهْرِي Méhari (F). Heiri (E). سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهن حيدان . يقال ابل مهريه .

٢٧٩٧١ - مَهْمَشَرَة Trayeuse mécanique (F). Milking machine (E). هي الهامرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الضرع .

٢٧٩٧٢ - مَهْنَلَص Arracheuse (F). Drawer, Spud (E).

٢٧٩٧٣ - مَهْمَلَمَل \* Todirampus (S). Todirampe. جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة المد . موطنه البلاد الاسيوية . يألف مجاري الماء والشلوط والغابات . اجسام هذه الطيور متوسطة القذ تغزل نحو ٢٧ سم . انواها متراكبة الالوان فيها اليبض والاخضر والازرق والحموي والاسمر والاسود || قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات . انها تبويض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

٢٧٩٧٤ - مَهْمَل Dauphinelle des jardins (F). نبات تزييني يعرف بمائق الحدائق ، اطلبه .

٢٧٩٧٥ - مَهْمَزِيَّات Dicanraceae (S). Dicanracées (F). Dicanraceae (E).

سبط من فصيلة الطحليبات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٠ منها النباتات القليلة . جلورها نحيلة قليلة العدد والامتداد . سوطها مستنقة . اوراقها غيظية كثيفة تكسو كامل الساق .

٢٧٩٩٩ - مَوَادٌ زَيْتِيَّةٌ  
Matières huileuses (F).  
Oily material (E). توجد في المادّن كالنُفُط مثلاً .

٢٨٠٠٠ - مَوَادٌ شَحْنِيَّةٌ  
Matières grasses (F).  
Greasy material (E). توجد في الحيوان .

٢٨٠٠١ - مَوَادٌ عَازِلَةٌ  
Matières enrobantes (F).  
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - مَوَادٌ عَضْوِيَّةٌ  
Matières organiques (F).  
Organic material (E). هي المواد البسيطة الممتزجة التي ترتكّب منها نسج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - مَوَادٌ غِذَايَةٌ  
Matières alimentaires (F).  
Alimentary material (E). هي جميع المواد الصالحة لغذاء الحيوان . وقد وضعنا في ذلك جدولاً أخذناه عن «كلتر» نذكر فيه تركيب الاعلاف الوسطي ويأخذونها من المواد الخام والمنهضسة مع قبضها الغذائية بالنسبة الى النشا . اطبل علف .

٢٨٠٠٤ - مَوَادٌ مَصَّاةٌ  
Substances hygroscopiques (F).  
Hygroscopic substances (E). هي المواد التي تمتص الرطوبة كالنيترات الذي يمتص رطوبة الهواء والدبال الذي يمتص رطوبة التربة .

٢٨٠٠٥ - مَوَادٌ مُدْخَرَةٌ ، مَوَادٌ إِحْصِيَاطِيَّةٌ  
Matières de réserve (F).  
Reservation material (E). مواد غذائية يُخْزِنُها النبات كاللادخان في البتاتات الزرّية ، والسكر في الشوندر والمصان ، والنشا في البطاطا .

٢٨٠٠٦ - مَوَادٌ مَعْدِنِيَّةٌ  
Matières minérales (F).  
Mineral material (E). هي الاجسام غير المتعضية كالآزوت والاكسجين والفوسفور والكلس والحديد والبوتاس والصوديوم الخ .

٢٨٠٠٧ - مَوَادٌ مُغْدِيَّةٌ  
Matières nutritives (F).  
Nutritive material (E). هي جميع المواد الصالحة لتغذية النبات .

٢٨٠٠٨ - مَوَادٌ تَشْوِيَّةٌ  
Matières amylacées (F).  
Amylaceous material (E). اصول مركبة ، اساسها النشا ، توجد في اعضاء بعض البتاتات .

٢٨٠٠٩ - مَوَادٌ هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّةٌ ، هَيْدُرَاتُ الْكَرْبُونِ  
Matières hydrocarbonées.  
Substances hydrocarbonées, Hydrates de carbone (F).  
Hydrocarbons material (E). مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين منها المخلّصات اللاآزوتية كالنشا والسكر والصمغ ... ومنها المواد الدهنية ومنها الخليوص اي السليلوز .

٢٨٠١٠ - مَوَازٍ  
Tropomètre (F).  
Tropometer (E).

الموار ميقت شديد الاتقان والدقة يستعمل في تحديد دائرة الطول في البحر .

٢٨٠١١ - مَوَازٍ ، مُتَوَازٍ  
Parallèle (F).  
Parallél (E).

٢٧٩٨٤ - مَهْوٌ ، تَارْهِنْدِي ، تَارْمَشَكْ  
Mesua (S). Méua, Bois de fer (F). Iron wood, Indian rose chestnut (E). Eisenbaum, Kastanien Rose (D). Albero della fero (I).

الواحدة مهوة . جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوزيات ، مهدا الهند . اوراقها كاملة متقابلة معنقة مستطيلة النصل . ازهارها نورية التجميع او فردية ، ابطية الارتكاز او تاجية وفي ذكّة العرف المستحب . ثمارها جراء تعلق بزرّة كبيرة القدة تشبه الكستناء طيبة الرائحة ، مأكولة اللباب . اغشائها شديدة الصلابة مرغوب فيها .

٢٧٩٨٥ - مَهْوِيّ  
Périgée (F).  
Perigee (E). اقرب محل لسيارة من الارض .

٢٧٩٨٦ - مَهْيَاتٌ  
Multiforme (F).  
Multiform (E). كثير الهياث والاشكال .

٢٧٩٨٧ - مَهْيَةٌ ، كَنْدِرِيُومْ  
Chondriome (F).

٢٧٩٨٨ - مَهْيِدٌ ، مَهْيَدَةٌ  
Plonnière (F).  
Pioneer (E).

هو النبات الطوعي الذي يكتسح التربة الحديثة الاستصلاح وهو ايضا كل نبات بزر او غرس لهيئة الظروف المناسبة لنبات لاسق .

٢٧٩٨٩ - مَهْيَصٌ  
هو مسلح الطير . ج مهايص .

٢٧٩٩٠ - مَهْيَلْ  
هو الفحل الذي اذا غرب لم يلقح .

٢٧٩٩١ - مَهْيُمٌ  
Assouffé (F).  
Thirsting (E). تمت تعريفي بوصفه به من كان شديد العطش .

٢٧٩٩٢ - مَوْ  
Aneth sauvage (F).

هو الثيث البري ، اطبله .

٢٧٩٩٣ - مَوْاءٌ  
Mialement (F).  
Mewing (E). صوت المهر .

٢٧٩٩٤ - مَوَادٌ اَحْيَاءٌ ، مَوَادٌ اَلْبُيُومِيْنِيَّةُ  
Albuminoïdes, Substances protéiques (F).  
Albuminoid, Proteinic substances (E). مواد تركيبها ونوعاها كتركيب ونوعاها بياض البيضة .

٢٧٩٩٥ - مَوَادٌ اِسْتِخْرَاجِيَّةٌ ، مَوَادٌ اِسْتِخْلَاصِيَّةٌ  
Matières extractives (F).  
Extractive material (E).

هي ما يمكن ان يبقى من مواد بعد تبخير سائلها .

٢٧٩٩٦ - مَوَادٌ ثَلَاثِيَّةٌ  
Substances ternaires (F).  
Ternary substances (E).

مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الاكسجين والهيدروجين والكربون .

٢٧٩٩٧ - مَوَادٌ دُهْنِيَّةٌ  
Matières sébacées (F).  
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - مَوَادٌ رُبَاعِيَّةٌ  
Matières quaternaires (F).  
Quaternary material (E). مواد عضوية مركبة من اربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين والازوت كالاتح مثلاً .

28020 - موافقة \* Congruité (F). Congruity (E).

28021 - موافقة \* Approbation, Entérinement (F). Approbation, Ratification (E).

28022 - مَوَاق \* Grallaria (S).

Grallaire (F). Grallaria (E).  
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الجبليثيات.  
انواع المعروفة نحو ٣٠ حينها من طيور امريكا الجنوبية. تألف الرياض والغابات الرطبة. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات وخصها النمل السيار الذي تكثر قوافله الجمرارة في معظم تلك الاصقاع || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ سم. اثنائها مختلفة الالوان تكثر فيها الشققة والشبهة. تحورها وصودرها وبطنها صفراء اللون او غبراء تملؤها ريشة سمراد او بيضاء وتصبح خثلي. رؤوسها ومناقيرها واجنحتها معتدلة الاحجام. اذناها قصيرة مخروطية الشكل. قوائمها رقيقة تحمكها من العدو بسرعة || تدثن اعشاشها في الادغال على ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة امتار. الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول.

28023 - مَوَاقير Métayer (F). Farmer (E).

28024 - مَوَاقيرة Métayer, Colonge (F).  
هي المزارعة، راجعها.

28025 - مَوَالِسة Connivence (F).  
Connivence (E).  
شيء من التواطؤ او الاشتراك في عمل ما.

28026 - مَوَالِيْدِي Naturaliste (F).  
الماليم يعلم المواليدي.

28027 - مَوَاتَن، وَبَاءَ حَوَاتِي Epizootie (F).  
Murrain, Epizooty (E).  
هو كل مرض بعد سريع الانتشار الشامل.

28028 - مَوَكْرَة Raidisseur (F). Wire-strainer (E).  
اداة تستعمل لتفتير الاسلاك.

28029 - مَوَكْمَر Congrès (F). Congress (E).

28030 - مَوَيْل \* Mutilla (S).

Mutille (F). Mutilla (E).  
جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنحسرة وفصيلة المويليات. انواعها المعروفة كثيرة العدد، نحو ١٦٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف اليرير والمناطق الجرداء. تتطفل في طورها اليرير على جمع انواع غشائيات الاجنحة الخشاشة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد. اثنائها مقلبة. اللونها زاهية، سقاءها الخوا || ذكورها مجنحة. اناثها عادمة الاجنح، مستطيلة الحيات الذرية.

28031 - مَوَيْلَات \* Mutillidae (S).

Mutillidés (F). Mutillidae (E).  
فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المنحسرة ورتبة الحمويات. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد، منتشرة في معظم اقطار العالم || جمع اجناسها مقلبية في

Musophaga (S). 28012 - مَوَاز \* Musophage (F). Musophage (E).

جنس طير من فصيلة المازيات. اعطاهن البلد الافريقيه اعصها افريقيه الشمالية || انواعها المنزوعة قليلة العدد تتميز باستطالة الجسم ويكثر الذنب الاطليجي الشكل. مناقيرها مخروطية، قوية، مسننة الطفاف، صفراء اللون. جهاها ملحوقه بصحيفة قرنية المادة، صفراء، تبدو كأنها امتداد المنقاد نحو الرأس || طيراتها خفيفة الحركة سريع. تدثن في تجاويف الاشجار القديمة العهد. اعرف انواعها واشهرها المواز البنفسجي.

28013 - مَوَازِ بَنَفْسَجِي \* Musophaga violacea (S). Musophage violet (F).

نوع من المواز. اعطاهن تمت من تونس والغرب الى اطراف غنية الجنوبية. يألف الحراج ويقرب من المزارع والبساتين اعصها بساتين الموز || جسمه يطول نحو ٥٥ سم. قوته الى السواد البنفسجي تملو ماجة ارجوانية || قوته الثار على اختلاف انواعها وخصها الموز الذي يفضل على كل شيء || الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٦ بيضات الترخيم يستمر نحو ١٥ يوما.

28014 - مَوَازَة Parallélisme (F). Parallelism (E).  
هي توازي الخطوط او السطوح.

28015 - مَوَازَة Balance (F).

28016 - مَوَازَة حِسَاب Balance d'un compte (F). Balance of an account (E).

28017 - مَوَازِيَات \* Musophagidae (S).

Musophagidés (F). Musophagidae (E).  
فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها افريقيه المهد || تتميز باستطالة الجسم، بقصر العنق، باعتدال الاجنحة وباستطالة الذنب. مناقيرها مخروطية الشكل، مستعرضة الاشدق. اثنائها جميلة الالوان المتراكبة القاعة || ملجئها الحياتي جماعي. سرها لا يقل عن ٥٠ زوساً. تألف مجاري الماء والمواقع الرطبة. قوتها جميع المواد النباتية من البراعم والتواقي الى الثمار والحبوب || اعرف اجناسها المواز والطورق.

28018 - مَوَاسِطَة \* Gymnapistis (S).

Gymnapiste (F). Gymnapistis (E).  
بعض صيادي سمك طرابلس يسمى بلشفيك وأبو شوكة. جنس اسماك بحرية بيروضة من شقائق الزعانف وفصيلة الخياخيا || انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها صغيرة الحجم، شائكة الزعانف الظهيرية السامة المؤذية || اثنائها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاحمر والوردي والاحمر العنابي الكؤود بالاسود || لحومها كاتمة الصفت قل من يرغب فيها.

28019 - مَوَاصِلَة \* Consanguinité (F).

Consanguinity (E).  
الموصول من الدواب الذي لم يتر على امه غير ابيه. والمواصلة هي اشتراك اواصر القرابة اي الصلة الدموية بين الالداد والاباء او الاجداد. الغاية منها استمرار تحسين النسل.



مَوَاز



مَوَاسِطَة



مَوَاق



مَوَيْل

مزقية. اوراقها مفصصة، نصلها رهل النسيج، خلي البشرة، مسن الحافة. ازهارها حمر الون متدلية مستطيلة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

### ٢٨٠٤٧ - مؤنثديّة متورّة ٥

*Maurandia semperflorens* (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية تريينية عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. غروبها واصرارها عديدة. اوراقها قليلة مزوانية، نصلها مالى البشرة متمصع الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطورها راوح من ٣ الى ٥ سم. لونها تختلف باختلاف غروبها، اشبعها الابيض والمرقظ والبفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين.

### ٢٨٠٤٨ - مؤنثديّة مكسيكية ٥، مؤنثديّة كبيرة الزهر ٥

*Maurandia grandiflora* (S). *Maurandie du Mexique* (F).

جنية تريينية عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار. جذورها وساقها ليفية. اوراقها شبه قليلة. نصلها مالى الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطورها نحو ٥ سم. لونها الى الازرقوانى يعلو موج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

### ٢٨٠٤٩ - مؤنثديّة \* Mauritia (S).

*Mauricie, Mauritie, Palmier bâche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس اشجار نخيلة، اعطائها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية، جذورها منتصبه مستقيمة تملو من سبعة الى ثمانية امتار. يستخرج من بعض انواعها لوبوب نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة سكرية قابلة التخثير تستعمل في صناعة الخمر والكحول.

### ٢٨٠٥٠ - مؤنثديّة موريكانديه Moricandie (F).

نبات يدعى الخمر، اطليه.

### ٢٨٠٥١ - مؤنثدين Morine (F).

اطلب مريته، نبات تريينى من الدباسيات.

### ٢٨٠٥٢ - مؤنثديّة، عقاب البحر Myliobatis (S).

*Myliobatis, Mourine, Aigle de mer* (F).

جنس اسماء مذنب بحرية من فصيلة الشفنيات. انواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القذ مبطلة مستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. اذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواعدها مناس مستنة حادة. قوتها الاسماك. تألف المياه الاقليمية الصيقة الغور || اشهر انواعها واعرفها ما يلي.

### ٢٨٠٥٣ - مؤنثديّة جودرية، عقاب البحر Myliobatis bovina (S).

*Myliobatis vachette, Mourine vachette* (F).

نوع من المورينه متوسطة القذ والتبطيط، ثوبها اغبر اللون اشهل الموج. اعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر.. وهي اقل سطوة من الجفاعة.

### Prostate

جسم غدي التركيب يغلف عند الذكور ثيج المثانة وجزء من الحالب.

### ٢٨٠٣٣ - مؤنثديّة Tissu lâche (F). Loose tissue (E).

### ٢٨٠٣٤ - مؤنثديّة Baillieur (F). Lessor (E).

### ٢٨٠٣٥ - مؤنثديّة Différé (F). Deferred (E).

### ٢٨٠٣٦ - مؤنثديّة Urnigère (F).

نعت تمريني يطلق، في علم النبات، على الطحالب المجزأة باجنيات اى اجرية لحفظ البويضات.

### ٢٨٠٣٧ - مؤنثديّة Cuniculé (F). Cuniculate (E).

الموجور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الغور.

### ٢٨٠٣٨ - مؤنثديّة الجوف Post-abdomen (F). Postabdomen (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الاخرة من بطن الحشرة اى جوفها || وهو زوولوجيا ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت.

### ٢٨٠٣٩ - مؤنثديّة ملوية صغيرة قصيرة العنق نحو القبرة (السان).

### ٢٨٠٤٠ - مؤنثديّة Mora (F).

سمكة بحرية تدعى جنة المتوسط، اطليها.

### ٢٨٠٤١ - مؤنثديّة De cujus

هو الذي مات عن مال يورث من بعده.

### ٢٨٠٤٢ - مؤنثديّة Roseraie (F).

*Rosery, Rose garden* (E).

حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

### ٢٨٠٤٣ - مؤنثديّة Frondifère (F). Frondiferous (E).

المورق ماكان يحمل ورقاً.

### ٢٨٠٤٤ - مؤنثديّة Lapinière (F). Hutch (E).

هي الخزة، اطليها.

### ٢٨٠٤٥ - مؤنثديّة \* Maurandia (S).

*Maurandie* (F).

جنس نباتات عارشة معدرة من فصيلة الخنازريات. انواعها المعروفة ١٢. سوقها متسلقة. اوراقها قليلة النصل. ازهارها كبيرة القذ محورية الارتكاز. توحيها انبوني الشكل، خاسي الفصوص الاستاوية || اشهر انواعها ما يلي.

### ٢٨٠٤٦ - مؤنثديّة حمرّة ٥ Maurandia erubescens (S). Maurandie rougeâtre (F).

جنية تريينية عارشة تطول نحو ٤ امتار. ساقها وروبها



مورانديّة



موريسية

كباشته مجنحة متدلية. ثمارها صغيرة ناشقة لا تؤكل، يزورها كروية كاملة صالحة للتكاثر || وهو يزرع من أجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال الدقيق. زراعته تدوم ٤ سنوات تنتهي بكسح الساق واستخراج لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الانزهار بنحو ٥ أسابيع.

٢٨٠٥٩ - مَوْز السَّعْد Musa religiosa (S).

Bananier fétiche (F). نوع من الموز البري الإفريقي، مهدد المناطق الاستوائية. أروسته مقع. ساقه تملو ١٠ أمتار. أوراقها كبيرة القذ متدلية الأطراف. نصلها جامد الصفحة المائلة، مجري الحصار. كباشته كبيرة القذ، نارية القنابات، أرجوانية الطرطب. ثماره دقيقة، مستطيلة، ناشقة لا تؤكل.

٢٨٠٦٠ - مَوْز الصِّين Musa sinensis (S).

Bananier de Chine (F). ويدعى موز الهند، ثماره مأكولة. ضرابه الزراعية مشهورة خمسة. أروسته مقع. ساقه تملو من ٤ إلى ٨ أمتار. أوراقه اهليلجية الشكل، متوسطة القذ، منفردة الانتساب. نصلها فارش الصفحة المنبسطة العادمة الالتواء، لونه إلى الحصار الباهت. كباشته متدلية عديدة الاشطاء. ثماره ضخمة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف.

٢٨٠٦١ - مَوْز اليابَان Musa japonica, M. Basjoo (S). Bananier japonais (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار. مهدد اليابان وقد انتشرت زراعته في معظم المناطق الحارة نظراً لقلة متطلباته المناخية وضآلة ما يلزمه من سرعات حرارية يستهلكها تنمو ويفتقها أدراك ثماره || أروسته مقع. ساقه حراء اللون تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقه تطلو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. وتعرض من ٦٠ إلى ٨٠، نصلها جامد الصفحة الناعمة، عابك الحصار. كباشته منتفخة متدلية عديدة الاشطاء. قناباته أرجوانية. طربه غروطي الشكل بنفسي اللون. ثماره مأكولة مستحبة الطعم متدلة الغلاظة والعلول.

٢٨٠٦٢ - مَوْز لِيْثِي Musa paradisica (S).

Bananier textile, B. d'Amboine هو الأبق، اطله.

٢٨٠٦٣ - مَوْز مَبْدُول \* مَوْز الرُّشْد Musa sapientum (S). Bananier commun, B. des sages (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار. ضرابه المعروفة زهاء ٨٠٠ منتشرة في جميع الاسواق الحارة. أروسته مقع. ساقه تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقه كبيرة القذ. نصلها جامد الصفحة الزاوية الحصار. كباشته مستطيلة متدلية كثيرة الاشطاء التي يراوح عددها من ٩ إلى ٢٥، ثماره مستطيلة، مفصلة، سكرية الطعم، مستحبة المذاق والبرف.

٢٨٠٦٤ - مَوْزَة Musa sapientum (S). Bananier commun, B. des sages (F).

ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية:

نحو ٧٢,٤٠٠ ٪	من الماء
١,٤٤ ٪	من المواد الاوتوية
٠,٠٩ ٪	من المواد البهنية
٢٣,٩٣ ٪	من المواد الهيدروكربونية

٢٨٠٥٤ - مَوْزِيْتَة مَبْدُولَة \* عَقَاب السَّحَر

الجَنَاحَة Myliobatis aquila (S).

Myliobate commune, Mourine commune, Mourine glorieuse (F).

نوع من المورينة كبيرة الجفة نوحها إلى البني الاسود المزاج. اعطائها جميع مجار البلاد الحارة والمعتدلة. وهي شرسة بطاشة شديدة السلطة.

٢٨٠٥٥ - مَوْزِيَّات Myliobatidae (S).

Myliobatidés (F). Myliobatidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السنفقيات ورثة الاشلاق اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. قربها الاسماك والمجار || اجناسها مفصلة، مبطقة، ملتحمه الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها. رؤوسها مخروطية شارفة. اشداقها متوسطة الانفراج اسنانها مسطحة، سباعية الصفوف. عيونها جانبية الارتكاز. اذنانها مستطيلة كالسياط تحبها، عند قواعدها مناسخ كبيرة مسنة حادة || اشهر اجناسها واعرفها المورينة.

٢٨٠٥٦ - مَوْز Musa (S). Bananier (F).

Banana-tree (E). Echte Banane (D). Banano (I).

جنس نباتات عشبية ليفة من فصيلة الموزيات. انواعها عديدة، اعطائها البلاد الحارة والاستوائية. جميعها عادمة البرق الخشبية. اروباتها معمرة مقع. جذورها ليفة افقية الانبساط. سوقها مجموعة من الاغصان الليفية الملتفة المتراكبة القرمزية الانتساب. تنتهي بنصال فارشة اهليلجية الشكل جامدة الصفحة المائلة الجيلة الحصار. انزهارها سنبل التجميع، هامي الارتكاز، كبير القذ. ثمارها لبية، مستطيلة، كثيرة العدد، تؤلف كباشة مركبة من عدة اشطاء متعاقبة || والموزة اي ساق الموزة ثمر مرة واحدة وموت، أما الأروبة التي تحفظ النسل فهي معمرة وتكثر بالفاسل على مر الاعوام || والموز يجود في جميع الارربة المتوسطة الانماذج الغنية بالمواد البدائية والناصر الغذائية وهو من النباتات المروية التي تلتزم الاسماء المنتظم || أما انواعها المشهورة فهي ما يتبع.

٢٨٠٥٧ - مَوْز الجَنَة \* Musa paradisica (S).

Bananier du Paradis, Figulier d'Adam, Bananier légume (F).

نوع من الموز الزراعي. ضرابه المشهورة نحو ٥٠، اعطائها البلاد الاستوائية. اروباتها مقع. سوقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها كبيرة القذ جامدة الصفحة. كباشتها متدلية عديدة الاشطاء. ثمارها مستطيلة، غليظة، عجبة الأطراف. لبها غزير المادة النشوية الغذائية يصنع منه بعد التجفيف والسحق دقيق شائع الاستعمال يدعى دقيق الموز.

٢٨٠٥٨ - مَوْز الحَبَسَة Musa ensete (S).

Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز، يتكاثر بالذر، مهدد الجيلة. أروسته لا تبق، ساقه تملو من ٣ إلى ٧ أمتار وهي ضخمة الجذع على حدود زانها الاول. أوراقه اهليلجية الشكل تطلو من ٤ إلى ٦ أمتار وتعرض من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. نصلها جامدة جيلة الحصار، ضلوعها غليظة جؤوية اللون. انزهاره سنبل التجميع. انزاعه بنفسجية كبيرة القذ،



مورينة مبدولة



موز الجنة



موز مبدول

Canthus ٢٨٠٨٠ - **مُوقٍ**  
هو ملتقى الجفنين وما اثنان: الموق الاكبر والمسق  
الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانف والاصغر من  
جهة الأذن.

Réchaud (F). Chafing-dish (E). ٢٨٠٨١ - **مُوقِد**

Apogée (F). Apogee (E). ٢٨٠٨٢ - **مُوقِل**  
البعد الأقصى لنجم عن الارض.

Mandant (F). Employer (E). ٢٨٠٨٣ - **مُوسِكِل**  
هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدعى وكيلًا.

Eleveuse (F). Raiser (E). ٢٨٠٨٤ - **مُوسِكِن \***  
دفينة اصطناعية تستعمل لحسن القوب.

Mull ٢٨٠٨٥ - **مُوَل**  
ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المعدنية، يتميز  
بعجيباته الرهلة وبكثرة ديدانه وحشرات وبخاصيته النفسية  
وبوفرة المواد الغذائية.

Financier (F). To finance (E). ٢٨٠٨٦ - **مُوَلّ**

Araignée (F). Spider (E). ٢٨٠٨٧ - **مُوَلّة**  
المول اسم للمكبوت. الواحدة مولة.

Zeus (S). ٢٨٠٨٨ - **مُوَلّك**  
Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).

سكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف  
وفصيلة المولكيات. اعطائها البحر الابيض المتوسط ويعطى  
مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضى الشوزن بغض  
من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم، كبير الفم  
الرب. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة،  
منخية القسم الامامي، سرعة الخلفي. ويدعولها في القسم  
الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غشروية التركيب.  
زعنفتها الخرجية ثلاثية المناخن الحادة. الذيلية شبه  
مربعة مقطوعة. ثوبها الى الصفار المذهب. يدعولها في  
اعلى خوشها: نقطة سوداء مستديرة || لحمها مأكول متوسط  
الصف.

Zeidae (S). ٢٨٠٨٩ - **مُوَلْكِيَّات**  
Zéids (F). Zeidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف. اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها بحار العالم ||  
اجسامها متباينة القد، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة.  
جميعها بيضيه الشوزن او اهليلجية. رؤوسها مستفخمة.  
زعانفها الظهرية كبيرة مزينة || لحمها مأكولة لكنها  
من الاصناف المبتذلة.

Molannidae (S). ٢٨٠٩٠ - **مُوَلَّنِيَّات**  
Molannidés (F). Molannidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد  
المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، مراء اللون.  
بسطة اجنحتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنحتها  
مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل،  
الخلفية شفاة || تألف البعيرات والمناسم والغدران.  
اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب رملية

١,٢٢ ٪ من السليلوز  
٠,٩٢ ٪ رماد

Mouzambi (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوزَمْبِي**  
هو التليكة من النباتات البقيلة، اطليها.

Equilibré (F). Balanced (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوزُون**  
نمت تعريفي يطلق على كل تبغ متدل العلم لا يتور  
نقص.

Musaceae (S). ٢٨٠٩٧ - **مُوزِيَّات**  
Musacées (F). Musaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. انواعها عديدة تجمعها  
ثلاثة اجناس: الموز والجل والوشيج. اعطائها السيلاد  
الاستوائية والحرارة. نباتاتها عشبية عادمة الجلولع الحشوية.  
سوقها اعماق ليفية، متراكبة، قرصية الانتشاب، ترتكز  
على ارومة.

Muscardine (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسِكِرْدِين**  
Silkworm disease (E).  
مرض يصيب دود القز يدعى الشلل الوردي، اطليها.

Thérrophyte (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوسِيّ**  
Therophyte (E).  
كل نبات يزري المنشأ دورته الحياتية تطول موسمًا واحدًا  
لا يتدلى الخول.

Prisme (F). Prism (E). ٢٨٠٩٠ - **مُوسُور**  
جسم متوازي الحروف الجانبية المتساوية العمودية على كل  
من قاعدتيه || والمشور قد يكون قائمًا ومزودجًا وثلاثيًا  
ورباعيًا وخماسيًا الخ... || يستخدم المشور الزجاجي  
الثلاثي السطوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف  
محصور بين سطحين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية  
الانكسار.

Prismatique (F). ٢٨٠٩١ - **مُوسُورِي**  
Prismatic (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالمشور.

Paille (F). Straw (E). ٢٨٠٩٢ - **مُوس، قش**

Commissure ٢٨٠٩٣ - **مُوسِل**  
موضع اتصال بعض اجزاء الجسم.

Efférent (F). Efferent (E). ٢٨٠٩٤ - **مُوسِل**

Inducteur (F). ٢٨٠٩٥ - **مُوسِل كَهْرَبَائِي**  
Inductor, Field-magnet (E).

Légataire (F). Legatee (E). ٢٨٠٩٦ - **مُوسِي له**  
هو الذي يستحق له المصى به.

Hétérozygote (F). ٢٨٠٩٧ - **مُوسُوت**  
Heterozygote (E).  
هو الاشيب، راجع.

Mahogon (F). ٢٨٠٩٨ - **مُوسُوت**  
هو الفتة، راجعها.

Fourmis allées (F). ٢٨٠٩٩ - **مُوق**  
Winged ants (E).  
هو النمل المجنح.



موسن

شبه مخروطية الشكل يطولها مجرى رقيق قلبي الشكل ، من التركيب ذاته يعينها على الانتقال . اشهر اجناسها :

Molanna (S).

المولنة

٢٨٠٩١ - **مُوَلَّيات** ٥ Laemobothronidae (S).

Laemobothronidae (E). Laemobothronidae (F). فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات وطبقة التعلبات . انواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القذ مفلطة الجسم المستطيل ، طولهاراوح من ١٠ الى ١٠٠ م . اناؤها الى الكهبة الغبراء يطولها تخطيط اسمر . وفي تميش على الطيور الكراسر فتضيقها . واحدها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - **مُوَلَّيت قرنائه** Molyte (F).

هي خنفساء الجزر ، راجعها .

٢٨٠٩٣ - **مُوَلَّيرة** ٥ Mulleria (S).

Mullerie (F). Mulleria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مصفحات الشياشيم وفصيلة الينادات . انواعها المعاصرة المدروسة قليلة العدد اعطائها ابنر ومنافع وغدران امريكة الاسرائيلية ٥ احدائها لانظمة الاشكال والاحجام ، لامتناهية المصارع ، ملحوظة بادمة سيكة باحة الخفسار ٥ تميش منمنعة في الاحمال ، لحوبها كاعنة الصنف .

٢٨٠٩٤ - **مُوَلَّيرة** ٥ Molinie (F).

هي الخوطاية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - **مُوَم** Meum (F).

هو الشبث البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - **مُوَمَزَة** ٥ Bananera (F).

Banana-plantation (E).

هي بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - **مُوَمَزَة ، اُسْتِين** Monarda (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعها سبعة . سوقها فروع قصيرة . اوراقها كاملة مسننة متعاقبة . ازهارها غنية التجميع ، ابطية الارتفاع او طرفية . اوراقها وزاعرها غنية بمادة التبول ٥ اشهر انواعها شاي بلسفانغ وتنعن الخيل والناسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - **مُوَمَزَة مَرْقطة** Monarda punctata (S).

Monarde punctuée (F).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيتية معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سنانية . نصلها خلى البشرة سنن الحافة . ازهارها الى الصفرة المرقطة بالحمرة . ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٨٠٩٩ - **مُوَمَزَة نَاسُورِيَّة ، بَرَعَمَت**

بَرَي ، نَعْتَع الفَرَس ، نَعْتَع الخَيْل

Monarda fistulosa (S). Monarde fistuleuse, Bergamote sauvage, Menche de cheval (F). Wild Bergamot, Horse Mint (E). Pferdeminze (D). Monarda

pelosa, Menta rossa (I).

نوع من الموزدة وهي بجلة تربيتية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . ساقها مسنة فروع . اوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى الصفرة سنن الحافة . لون ازهارها يختلف

باعتلاف القروب . منها الابيض والبنى والاصفر والوردي والاحمر ٥ ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها عطرية فواحة العرف تستعمل في صناعة العطور ويستخرج منها زين الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو منه ، طارد للرياح ، مضاد للتشنج ، مفو للاعصاب خافض الحرارة . اوراقها الحافة تستعمل استعمال الشاي .

٢٨١٠٠ - **مُوَمَت** Acuminé (F). Acuminate (E).

نعت وصفي يطلق على الورقة او الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - **مُوَمَلِيَّة** ٥ Monilia (S).

جنس فطور مجهرية من التوسيات وفصيلة الوطحيات . جربها الكنديية واضحة الهيئة . كئالدها لينوية الشكل ، سحبة التجميع ٥ انواعها عديدة معظمها مقبلي يشكل الطور الكنديي في اللبن ٥ اعرف انواعها وانتهورها الثلاثة التالية .

٢٨١٠٢ - **مُوَمَلِيَّة بَيْضَاء** ٥ Monilia candida (S).

فطر من المونيلية يركب القش والاخشاب المتحلة والسائرة الى الاعلال والثمار السكرية المخمزة والمصير والهدام... . كئالده سحبة التجميع . قياس الكئيدة ٥×٧ م .

٢٨١٠٣ - **مُوَمَلِيَّة ذَهَبِيَّة** ٥ Monilia aurea (S).

فطر من المونيلية يركب الخاء الجذوع والافصان اليابسة . يبدو كالكسادة . كئالده لينوية الشكل صفراء اللون مدببة الموج قياسها ١×٢٠ م .

٢٨١٠٤ - **مُوَمَلِيَّة مَهْمَاء** ٥ Monilia fimicola (S).

نوع من المونيلية فطرها يركب عرم الفطائر فيمنطها ويومحها بمشجبه الامق اللون ، اللبد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المرئية الناشئة ٥ يكافح بفسخ العرمة المصابة بالمخاض الخلي عيار ٣٣٪ المركز ١ على ٧ اي جزء واحد من المخاض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - **مُوَمِيلوبيسيس** ٥ Monillopsis (S).

جنس فطور مجهرية من السنيات . مشجبه قدي الشكل ، لبد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطوانتي الشكل ، دقيق الجول ، كثير الفروع ، متركب القوامس ٥ انواعه قليلة المدد والاذى اعرفها سالي .

٢٨١٠٦ - **مُوَمِيلوبيسيس اُورْدُهُولدي** ٥ Monillopsis aderholdi (S).

فطر من المونيلوبيسيس يركب سوق واوراق الارطسية والدغلية والكرزيم ويخمر مرمم والسرارخ... . اغمرها في الوراق عادية لا تستوجب المكافحة . اما اذا تمكّن من السوق فانه يقضي على اللحاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكافحة .

٢٨١٠٧ - **مُوَمِيلوبيسيس قَاصِي** ٥ Monillopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبيسيس فطره يركب اوراق الزان فيؤذيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - **مُوَمِيلوبيسيس فوليكولا** ٥ Monillopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبيسيس فطره يركب اوراق الاكينسيا . والبندق والاجاص فيشدها بمض الشئ دون أن يؤذيها .



موزدة ناسورية



مونيلية



مُونِيْمَة



مُونِيْمَة غَوُطِيَّة



مُوهُ



مَآبِرٌ مُخْتَلِفَةٌ



مِثْل



مِثْدَل

## ٢٨١١٩ - مُونِيْمَة \* (F). Monimie

جنس نباتات جنسية من فصيلة المونيمييات . انواعها عديدة اعطائها البلاد الحارة اخصها الهند والجزر . اوراقها متعقبة متقابلة بيضية . فصلها جامد الصفحة اللامعة ، بارز الروق . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها كالتين شكلاً وقد يهي مأكولة سكرية الطعم لا تخلو من الحموضة . لحاء سوقها حارمة طيبة كانت ولا تزال تستعمل ضد الحمايات .

## ٢٨١١٠ - مُونِيْمَة غَوُطِيَّة \* (F). Monimia gothica

حشرة من السقليات حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المتاخة . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة والمالة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ م . يسطها نحو ٣٦ م . رأسها حنطي اللون . عينها ناشرتان . زباناها خطيان . رشفها معتدل الجرم والظليل . جوشها وبعطها الى الحنطلي الاسمر الموج || روشنها الاماميان الى الحنطلي يملوه تقيس وتقيط وتبضع وزرقة خضابها اسمر . ويملوه ايضا بقعة مرمية واخرى مستطيلة لونها الى الكستني القاتم . روشنها الخلفيان الى الحنطلي الاصفر يملوه حنار تبني ينهي بالاهداب || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ، واضح الحيد . ثوبها الى الخضار الاطمل الموج يملوه خط لثجي اسود وثلاثة خطوط جانبية حراء سمر . رأسها اسود . مدنها الى الطحلة الرصاصية . رواجبها الى السرة القائمة || طول الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧ يوماً ينقص في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

## ٢٨١١١ - مُونِيْمَة مُنْتَبِسة \* (S). Monimia stabilis

حشرة من السقليات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واسعة قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق السنديان وغيره من الاشجار العروة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يسطها نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون . عينها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خطيان عند الانثى . جوشها وبعطها الى الحنطلي الاشعث الموج || روشنها الاماميان الى الحنطلي الاشعث تملوه دائرتان متساوتان وسط معرض وتقيط حناري . جميعها الى الحنطلي الشديد السرة . روشنها الخلفيان الى الركبة الغبراء تملوها ماجة فضية وخط اسمر يستيق الحنار الخارجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتدح الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى السرة الزرقية الموج يملوه غط لثجي جزوي وثلاثة خطوط جانبية منها خطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها اجر . مدنها الى الطحلة الغبراء . رواجبها الى السرة ||

طول الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقص في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

## ٢٨١١٢ - مُونِيْمِيَّات \* (S). Monimiaceae

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها اشجار وجنبات . اوراقها متقابلة بسيطة . ازهارها وحيدة الشق . اشهر اجناسها المونيمية .

## ٢٨١١٣ - مُوهُ \* (S). Moho (F). Moho (E)

جنس طير من الجوامث ريقات المناقير وفصيلة المغرريات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الصندويش . ملجتها الحياني جماعي . جامعاتها قليلة العدد . قوتها رحيق الازهار والموط || ... اجسامها صغيرة مستطيلة المناقير القليلة التفويش . اذنانها رتاجية مستطيلة . اثوابها لثائية الالوان فيها الاسود والاصفر والابيض . بطنها دائماً صفراء اللون او بيضاء ويميلوا الى اياطها زغب دقيق ناعم . تدثن في الادغال . اناثها تضع ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

## ٢٨١١٤ - مَرَّوِب له (F). Donataire (E). Donee, Receiver

## ٢٨١١٥ - مَوَلَّة (F). Provision

٢٨١١٦ - مِثْبَار \* ، مِثْبَر ، مَثَل (F). Anthère (F). Anther (E). العضو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة يرتكز على الحنطلي ، اليه تنتهي جذرات الطلع وفيه تنضج ومنه تلتدث .

## ٢٨١١٧ - مِثْل \* (F). Manomètre (E). Manometer

جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والبخرة .

## ٢٨١١٨ - مِثْقَب (F). Affluent (E). Falling into, Running into

الجدول الذي يصب في الهر . ج مآكب .

## ٢٨١١٩ - مِثْقَار ، لَقْيَس (F). Tardif (F). Tardy (E). لقيس

هو ما طال زمن نموه ان في الحيوان او في النبات .

## ٢٨١٢٠ - مِثْدَل \* ، مِصْرَب (F). Acidimètre (F). Acidimeter

مقياس الحموضة . يستعمل لمعرفة مقدار مسا في بعض السوائل كالحجر والحليب وما اشبه من حواض .

## ٢٨١٢١ - مِثْقَاق (F). Périscope (E). Periscope

## ٢٨١٢٢ - مِثَّاح (F). Afférent (E). Afferent

ناقل السائل الى العضو او الى المركز .

## ٢٨١٢٣ - مِثَّاط (F). Marée descendante (E). Falling-tide

هو ما يدعونه الجزر اي تباعد مياه البحر عن الشط ورجوعها الى ما كانت عليه قبل المياط .

## ٢٨١٢٤ - مِيعَاح (F). Vasculose (E). مادة النسيج الوعائية .





مير للك



ميشة الرخس



ميشة مقننسة



ميشة نقية



ميشة وردية



ميج

٢٨١٣٣ - مَيْحَان ، مَيْحَان Methane (F).  
غاز مئلب عديم اللون .  
٢٨١٣٤ - مَيْحُوكُولَرِي Mitochondrie  
راجع كوندريوزوم .

٢٨١٣٥ - مَيْحَنَة Mycena (S).  
Mycène (F). Mycena (E).  
جنس فطور من فصيلة الفاريقويات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاه غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بنكهاتها الصغيرة وباطراسها الحادة الاطراف الملونة . بعض انواعها جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية .

#### ٢٨١٣٦ - مَيْحَنَة السَّرْحَسْ \*

Mycena epipterygia (S). Mycène des fougères (F).  
توجد في المواقع الرطبة بين السرخس . ساقها دقيقة ، رفيعة ، لزجة . نكهتها قمية الشكل . صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم . لونها ال الصفار البيوتي || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

#### ٢٨١٣٧ - مَيْحَنَة مَقْنَنَسَة \*

Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).  
توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة . ساقها دقيقة ، متدلة الارتفاع ، تبنية اللون . نكهتها قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها ال الكهبة الصفراء . اطراسها وردية اللون || لحيتها مأكولة ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مَيْحَنَة نَقِيَة \* Mycena pura (S).  
Mycène pur (F).  
توجد في المواقع الرطبة . تعيش على الببال . رائحتها رائحة الفجل . ساقها متدلة الارتفاع والانلاظة . نكهتها صابجية الشكل ، صفراء اللون يطعمها موج ليكني عابق . اطراسها وردية اللون || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مَيْحَنَة وَرْدِيَة \* Mycena rosalia (S).  
Mycène rosé (F).  
توجد في المواقع الرطبة بين الصنوبر . ساقها رفيعة ، دقيقة ، وردية اللون . اوصرتها صابجية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم . لونها ال الوردي العايق || لحيتها كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مَيْحَج \* Dactylopterus volitans (S).  
Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).  
جنس اسماك بحرية طيارة زاهية الالوان من فصيلة الميجيات . وريثة شاكات الزعانف الاسعبية . انواعه قليلة العدد ، اشهرها ميج المتوسط الذي يبلغ طوله نحو ٥٥ سم . له زعنفتان يجتاحتان طول الواحدة نحو ٣٥ سم . تمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

#### ٢٨١٤١ - مَيْحَج مَبْدُول ، مَيْحَج المَوْسَط

Dactylopterus volitans communis (S).  
Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E).  
نوع من الميج . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الميجيات

٢٨١٤٥ - مَيْحَاع Fluidiste (F). Fluidiste (E).  
الميعان من شايح النظرية الفائلة بان الغناطيس الحيواني يعود ال جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مَيْحَاكَة ، كَيْلَاكِيَة Collectia (S).  
Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).  
مياكة هو الادم الشيلي . جنس نباتات برية معمرة ، طيبة من فصيلة البقييات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منهاها بعض مناطق امريكا الجنوبية اعصها الشيلي والبيرو || جميع انواعها شجيرات وجنيات فروع . معظمها شاكات الاقتاد والاقتان . اوراقها متعاقبة ، منققة ، اهليلجية النصال الصغيرة . ازهارها فردية ، ابيلة الارتكاز ، عطرية العرف ، يكثر فيها اللون الابيض . ثمارها عناية الشكل والقد ، مأكولة لكنها تسهل المدة .

#### ٢٨١٤٧ - مَيْحَا وَرَاكْدَة ، مَيْحَا آسَنَة

Eaux stagnantes (F). Stagnant water (E).  
٢٨١٤٨ - مَيْحَاكَة Hydrométrie (F).  
Hydrometry (E).  
علم كل ما هو يخص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٩ - مَيْبَة Jus de coing (F).  
Juice of the quince (E).  
عصير السفرجل .

٢٨١٣٠ - مَيْبَر المَيْسَك \* Bledius littoralis (S).  
Blédie armé, Blédie du littoral (F).  
Bledius littoralis (E).

حشرة جاسة رائجة من فصيلة الدنليات وريثة غحديات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع الرطبة واعصها البساتين . خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير القد ، نحيل ، يطول من ٦ الى ٧ سم . فوهها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جزوي الغمدين والجرامز . رأسه صغير الحجم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقرنين ذريين . زبانه مرفقيان عيتاه صغيرتان . ظهرانه ادم التبرزيز يلحف نحو خشي البطن || يدعى مير الميسك نسبة ال ما قد فتره سكته البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المسك || الذكر اميز قدام من الانثى وأغ ثوباً منها واطول زبناً وادق بطناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطينة النور لا تدرك الكمال الجسدي قبل اواسط شباط . جسمها يطول من ١٢ الى ١٥ سم . وهو مستغلظ المقدم والرأس ، مستدق الطرف اغبر اللون ، اسمر الرأس والشرج ، منقط الجانين الايمن والايسر بتمول سود تنوسط السكر || طور الاكمال يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مَيْبَة Guenon (F). She-monkey (E).  
المية القردة الغنية وتدعى قَيْشَة . اما التي بلغت الضبة فدعى زَنْمَة .

#### ٢٨١٤٢ - مَيْبَالِيَزِيك ، مَا وَرَاكِيَة

Métaphysique (F). Metaphysics (E).  
علم ما وراء المادة او الطبيعية من المعقولات .



مَيْجَة



مَيْجَل



مَيْجَة البَطَايَا



مَيْجَة الغَارِيْقُون



مَيْجَة خَيْبِيَّة



مَيْدَاس



مَيْدَع

شائكات الزعانف الاصبعية || اعطائها بحار البلاد الحارة وبها المتوسط . يكثر وجودها في المياه التونسية واليبية ويقل في المياه اللبنانية || جسمها شبه وشعي الشكل بطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، غروطي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . وريعتا الارتكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يملوه مواج اصفر وبمسجي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة الشاكفة . الصدرية كبيرة جناحية الشكل يملوها عند قاعدتها شعاع ومثل الطوف || زعنفتها الصدرية مجنحتان تمككها من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة وأكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٨١٤٢ - مَيْجَة \* (F). *Maja, Maia* (F). Spider crab (E). جنس منع من القشريات المعروفة ببنائك البحر . انواعه عديدة ، اعطائها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخث ومل الصخور || اشهر انواعه المأكولة الميجية المجلولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٤٣ - مَيْجَل \* (E). *Ameiva* (S). *Ameiva* (F). *Ameiva* (E). جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة التدييات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطها امريكية الوسطى والاكوادور . تألف البراري والقيافي الرملية . قوتها الحشرات واسارها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها الرزمة السراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات (S). *Dactylopteridae* (S). *Dactylopteridés* (F). *Dactylopteridae* (E). فصيلة اسماك بحرية بيروضة من رتبة الغطيات شائكات الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . مستطلة من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشعي الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم . رؤوسها كبيرة . تحملها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمككها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المجلول .

٢٨١٤٥ - مَيْج : مَيْج : مئي البطة . ماحت تيج .

٢٨١٤٦ - مَيْجَاد \* (E). *Isol* (F). *Isolate* (E). الشجرة او الاكّة المنفردة البائنة عن اخراتها . ج مواحيد .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة \* (S). *Hypomyces* (S). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنطفل على غيرها من الزقيات والذغاري وبعضها يعيش على النباتات العليا . اصناسها وتكاثرها دقيقة ، نكاهها اروسية الشكل متراكبة . بوغها متتابع الخلايا وردي اللون || انواعها المؤذية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة البَطَايَا \* (S). *Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani eumartii* (S). فطر مجهرية يصيب عدة نباتات اخضها البطاطا والحضيات والبن والكاكاو الخ ... || يركب جذور البطاطا ودرناتها . مظهره الخارجى يقع سمر لا قياسه تنشئ البشرة واللبن فتسبب عنها دون ان تؤذي البون || ويركب سوق

الاشجار من الحضيات وغيرها فيسب قروحاً لوها الى السرة تبدو كالحشوش المسجة ثم تنتشر فتسبب للماء والشكر والخشب وتقود الجذع الى الصرم || يكافح بالكريزول المحلول ١٠ ٪ او ياد التطهير مرة ثانية بعد الاول باربعة او خمسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة الغَارِيْقُون \* (S). *Hypomyces rosellus, Dactylopus dendroides* (S). فطر مجهرية يتطفل على الغاريقون فيؤذيه . مظهره الخارجى يقع خلية ، لوها الى البياض الاغبر ، قطرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم . تملو المفطرة هنا وهناك ثم يركب الغاريقون وقد تصيب نكمتة فتسببها وتشوهها بعد ان تمطعها بمشج خاص ، نواسه كندف القطن لوته الى الصلبة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورمول التجاري المحلول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْبِيَّة \* (S). *Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosus, Verticillium, Cephalosporium* (S). *Môle du champignon de couche* (F). فطر مجهرية يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الغاريقون المرئي || مظهره الخارجى يقع خلية لوها الى الرماد تملو سطح المفطرة ثم تمتد الى الفطور فتسببها وتشوهها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَدِي \* (F). *Univoltin* (F). نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسماً واحداً متتابعاً لاستقطاً في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْدَاء \* (F). *Style* (F). يقال بنوا يبيتهم على مياء واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس \* \* (S). *Midas* (S). *Tamarin* جنس قرود امريكية من فصيلة القرود الدبية . انواعه ٢١ . موطنها كستارياكا وباناما وكوليبيا والبيرو والبرازيل والغويان || اجسامها صغيرة القد ، حيلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم الوثير . رؤوسها مستندرة ، اذانها عادمة الور . اذانها مستطيلة حيلة . اثوابها سوية الالوان المتباينة المواج || تعيش بين الاذغال وفي المروج القرية من الغابات . قوتها الحشرات والغطاء والصفادع والمصافير وبعض الثار والحويب .

٢٨١٥٤ - مَيْدَاس ، مَيْدَاس (F). *Hippodrome, Champ de courses* (F). *Hippodrome, Race-course, Race-ground* (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَس \* (E). *Fluviographe, Fluviomètre* (F). *Fluviometer* (E). جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة اتحدارها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع \* (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعها المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمتندة . اجسامها اطيالية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شاكفة ، زعانفها الشرجية فارة . اثوابها فضية اللون يملوها تحيط مذهب قاطب .



ميدوس



ميديه



ميرة



ميرسين



ميرف



ميروس

## ٢٨١٦٣ - مِيرٌ ، مِسْطَرَّةُ الْإِرْتِفَاعِ

Mire (F). Slight (E).  
مسطرة مرقعة تستعمل لقرعة الارتفاعات في مسح الأرض .

## ٢٨١٦٤ - مِيرَا

Mira (F). Mira (E).  
ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصجوبة ، اطلبها .

## ٢٨١٦٥ - مِيرَاث

Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).  
هو التركة ، اطلبها .

## ٢٨١٦٦ - مِيرَّةٌ \*

Mira (S). Mira (F).  
جنس حشرات ناعمة من فصيلة الشراقيات ورتبة ششائيات الاجنحة المخفضة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة ، جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرشيات وذوات الجناحين || أجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ سم . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها الاستعمارية مرفقة ، صهييفة ، كبيرة . جواشئها مستطيلة . بطونها قصيرة يرمعية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنتها جلدع عند الشقين . أطولها تراوح من الوردي إلى الصنابي الاصفر المالح .

## ٢٨١٦٧ - مِيرْسِينٌ \* ، قَتْمٌ

Myrsine (S).  
Myrsine (F). Myrsine (E). Trugmyrte (D). Mirsine (I).  
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الميرسينيات . أنواعه عديدة ، أعطائها البلاد الحارة المتحيرة نحو الاستوائية . جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نووية صغيرة القد مأكولة .

## ٢٨١٦٨ - مِيرْسِينِيَّاتٌ ، قَتْمِيَّاتٌ ، جَنَاحِيَّاتٌ

Myrsinaceae (S). Myrsinacées (F). Myrsinaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها نحو ٥٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار والشجيرات والجنابات . اوراقها متعاقبة . ازهارها صغيرة القد ، منها الخشوية ومنها وحيدة السكن . ثمارها نووية مأكولة في بعض الانواع .

## ٢٨١٦٩ - مِيرَقٌ \*

Myagre perfolié (F).  
نبات عشبي بري حولي من فصيلة الميرسيات . منبتة البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروبة . ساقه فروع . اوراقها متعاقبة ، ريمية الفصل ، بحرية اللون . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزرع ، كثرته مؤذية .

## ٢٨١٧٠ - مِيرُوسٌ \*

Myrus (S).  
Myre (F). Myrus (E).  
جنس اسماك بحرية من مفتوحات المائدة وفصيلة الشقييات . منبتة البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروبة . ساقه فروع . اوراقها متعاقبة ، ريمية الفصل ، بحرية اللون . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزرع ، كثرته مؤذية .

## ٢٨١٧٠ - مِيدَاحٌ مُشْبَرٌ

Pentapus vittatus (S).  
Pentapode rayé (F). Sea rough (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورتبة شالكتات الزعانف . أعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الغنات المتوسطة الغرور || جسمها اهليجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الزرقاء الفضية المالحق يبق عند الرأس والظهر وبغير ويبس عند البطن ويعلموها في جانبها ستة خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية والحوضية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شفتها معدن الانفراج . اسنانيا صغيرة ذرية . عيناها كيرتان ، ناشزتان ، عسلتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

## ٢٨١٥٨ - مِيدَاحٌ \*

Parefeu (F). Firebreak (E).  
حاجز طبيعي او صناعي جردت منه جميع المواد القابلة للاشتعال منعاً لانتداد الحريق في الغابات والاحراج .

## ٢٨١٥٩ - مِيدُوسٌ \*

Mydaus (S).  
Mydaus (F). Mydaus (E).  
حيوان لبون مفترس من فصيلة السوريات . موطنه الهند الصينية ولبازيا || جسمه قريب الشبه بجسم الغرير . رأسه مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . قوائمها قصيرة . اظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة . حلبة خشن . ثوبه الى السمرة الكستانية يعلمو خط ابيض يمتد من القفن الى مغرز الذنب . ذنبه جذعة كستانية اللون يضاء الطرف || من ميزاته انه يربي عدوه بسائل كاس كرهه الرائحة تفرزه الغدد الشرجية ويسدده ببقصبيه على ايمد من متر .

## ٢٨١٦٠ - مِيدِيَّاتٌ

Mytilidae (S).  
Mytilidés (F). Mytilidae (E).  
فصيلة من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميدي .

## ٢٨١٦١ - مِيدِيَّةٌ \* ، بَلَحُ الْبَحْرِ

Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).  
جنس بحار من فصيلة الميديات . أنواعه المعروفة نحو ٧٠ معظمها مأكول منسحب الطعم . يعيش على الصخور التي يغمرها المادوقه يرب في احواس بحرية خاصة صار تجهيزها في هذا السبيل .

## ٢٨١٦٢ - مِيدَاحٌ \*

Hemientetes (S).  
Hémicentète, Hémitanrec (F).  
جنس حيوانات لبونة حارشة من فصيلة المائلات . أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها الساحل الشرقي من جزيرة مدغشكر . تأتف السباب والاماكن التي يكثر فيها الاعشاب البرية . مسرعا دجوي . قووسا الحشرات والديدان || أجسامها صغيرة مكرومة تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . أعطائها مستطيلة . عليها معدن الشخانة تتخلله سال متباينة الطول تكثر في فيج الظهر . أطولها الى السرة السوداء يعلموا تسنج قاطب اصفر . ومنها نوع اسود الرأس || انها ثورزة تقصع في كل رمص من ١٠ الى ١٢ جرأ || بيئاتها الشوي يستمر نحو اربعة اشهر .

٢٨١٨٣ - ميزان الغلوكونز  
Glucomètre (F).  
Glucometer (E). هو مقياس الغلوكونز ، اطلبه .

٢٨١٨٤ - ميزان القشدة  
Butyroscope (F).  
هو مقياس القشدة ، اطلبه .

٢٨١٨٥ - ميزان الكحول ، مقياس الكحول ،  
ميكحال  
Alcoomètre, Alcolomètre (F).  
Alcoholometer (E).

جهاز ينطس في السائل الكحولي فيبين نسبة الكحول فيه .

٢٨١٨٦ - ميزان المشروبات ، مقياس  
المشروبات ، مشرباب  
Liquomètre (F). Liquometer (E).

جهاز يستعمل في قياس درجة الكحول في المشروبات  
الروسية .

٢٨١٨٧ - ميزان المطر  
Pluviomètre (F).  
Pluviometer, Rain-gauge (E).

هو المطار ، جهاز يستعمل في قياس كمية المطر أو الأمطار  
الساقتة في مكان معين .

٢٨١٨٨ - ميزانية  
Budget  
وثيقة تدون فيها ، عن طريق التخمين الصحيح ، مقادير  
الدخل والخرج السنوية .

٢٨١٨٩ - ميزوفيت  
Mésophyte (F).  
Mesophyte (E).  
اسم يطلق عل الجزء الناتش من البزرة حيث تنشب الساق  
والجذور .

٢٨١٩٠ - ميزوفيل  
Mésophylle (F).  
Mesophylle (E).  
هو الجزء الداخلي من الور ، مركزه تحت البشرة الخارجية ،  
يشتمل بحضيه .

٢٨١٩١ - ميزوكرتب  
Mésocarpe (F).  
Mesocarp (E).  
هو السدق ، اطلبه .

٢٨١٩٢ - ميزول  
Mésol (F).  
هو الفيروليت ضرب من السيليكات ، اطلبه .

٢٨١٩٣ - ميزوليتي  
Mésolithique (F).  
Mesolithic (E).

اسم يطلق عل أحد المصور الثلاثة التي سبقت التاريخ  
ويؤدى أيضاً عصر الحجر . يتميز هذا العصر قبل التاريخ  
ببدء انتشار الحضارة البشرية اذ أنه يأتي مباشرة بعد  
عصر الظان المعروف أيضاً باسم « بليوثي » وقبل عصر  
الحجر المصقول المعروف باسم « نيوليتي » .

٢٨١٩٤ - ميزيس  
Mysis (S).  
Mysis (F). Mysis (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا مشقوقات  
الرجل . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها لا  
تقترب من الشاطئ . تعيش في أكثر بحار البلاد المعتدلة  
الحرارة || اجسامها صغيرة القد . اغشيتها تغلف معظم  
السكم الصدرية . قوائم انبساط الخلفية مزودة بمجبوب  
صفحية تستعمل لحسن السمع .

الخضار الاصفر عند الميريس المبذول يغير في البطن  
وتعلوه نقط يفض تحت من الرأس الى الذيل . رأسه الى  
الخضار العابق يطوه مواج بنفسجي . ميريس الصين  
واليابان جزوي اللون مجذاج بالابيض || لحم النورين جيد  
الصنف .

٢٨١٧١ - ميز ، حلول  
Dialyse (F). Dialysis (E).  
هو الانتشار التحليلي او الانتزاع التحليلي .

٢٨١٧٢ - ميزاب  
Sillon (anat.) (F). Groove (E).

٢٨١٧٣ - ميزانية  
Hindsiella (S).  
Hindsiella (F). Hindsiella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة الغلويات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض  
المتوسط || اجسامها صغيرة . اصداؤها شبه قلبية الشوزن  
يقطعها اخدود غائر شبيه بالميزاب .

٢٨١٧٤ - ميزان  
Balance (F). Balance, Scales (E).  
اداة تستعمل في وزن الاشياء . وهو يقع عل عدة اشكال  
وانواع منها العادي والدقيق والشديد الدقة والصغير والكبير .

٢٨١٧٥ - ميزان ، ناظم  
Régulateur, Palonnier (F). Swing-bar (E).

قطعة من خشب او من حديد مركزها في مقدمة العربة  
او الخرافات تعلق بها سيرور الجر .

٢٨١٧٦ - ميزان الارتفاع  
Altimètre (F).  
Altimeter (E).  
هو المسلس ، جهاز يبين ارتفاع المكان بالنسبة الى سطح  
البحر .

٢٨١٧٧ - ميزان الاستواء  
Niveau (F). Level (E).  
هو القادن ، اطلبه .

٢٨١٧٨ - ميزان الحرارة  
Thermomètre (F).  
Thermometer (E).  
اداة تقاس بها الحرارة . وين اسمائه الخراف والخر .

٢٨١٧٩ - ميزان الحليب ، مقياس السمن ،  
مشخاب  
Butyromètre, Lactomètre, Pèse-lait, Acido-butyromètre (F). Butyrometer, Lactometer (E).

اسم شامل يطلق عل مختلف مقاييس القشدة التي تبين  
نسبة المواد السنية الموجودة في الحليب .

٢٨١٨٠ - ميزان الحموضة ، مقياس الحموضة  
Acidimètre (F). Acidimeter (E).  
اداة تستعمل في معرفة مقدار حموضة السوائل كالحمر  
والحليب وضربها .

٢٨١٨١ - ميزان الحوامض ، مقياس الحوامض  
Pèse-acides (F). Acetometer (E).


٢٨١٨٢ - ميزان العصير ، مقياس العصير  
Mustimètre (F). Mustimeter (E).  
اداة يقاس بها مقدار السكر في العصير .



ميزانية



موازين مختلفة



موازين حرارة



ميزيس

٢٨١٩٥ - مَيْس Libration (F), Libration (E).

الميس الارتجاج الطاهر لكل كوكب حول قطبه وخاصة القمر .

٢٨١٩٦ - مَيْس \* ، نَتَم Celtis (S).

Micocoulier (F). Lote tree, Nettle tree (E). Zügelbaum (D). Melicocchio, Baciolo, Perlaro (I).  
جنس اشجار مرجية من فصيلة اليوقسيات . انواعه نحو ٩٠ منبتها الاصقاع الممتدة الحرارة . اوراقها متعاقبة معتقة . ازهارها ابطية خضراء اللون . ثمارها عنبية ، صغيرة القد ، حلوة الطعم ، عديمة البزرة . اشخاصها صلبة قوية صناعية . يستخرج من لحائها وجذورها مادة صباغية صفراء اللون || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٩٧ - مَيْس جبلي ، مَيْس جنوبي ، نَتَم ابيض Celtis australis (S).

Micocoulier austral, M. de Provence, Falabreguier, Fabreoulier, Bois de Perpignan (F). South European hackberry (E). Zügelbaum, Triesterholz (D). Bagolaro, Arcidiavolo, Spaccasassi (I).

شجرة سربوتية تنيش في جميع المواقع والاربية . تعلق من ٥ الى ٢٥ م . ساقها مائلة للحاء . اوراقها قصيرة الاعتان . نصلها بطول من ٥ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٦ م . وهو مائل الصفحة العليا لقائمة الخضار ، خلي السفل الطحلاء اللون . ثمارها بحجم الكرز الصغير وفي بنفسجية اللون سوداء المواج مستحبة الطعم .

٢٨١٩٨ - مَيْس داوودي ، نَتَم داوودي Celtis davidiana (S).

Micocoulier du Père David (F).  
شجرة متوسطة القد فناء . مهدا الصين . تعلق من ١٠ الى ١٥ م . نصل اوراقها مائل البشرة اللامعة تعلق ثمة شفافة . ثمارها حموية اللد سوداء اللون . وهي من الاشجار السربوتية السريعة النمو التي تصلح للتجريح والتزين .

٢٨١٩٩ - مَيْس شرقي ، نَتَم شرقي Celtis orientalis (S).

Micocoulier oriental (F).  
شجرة سربوتية صغيرة القد تعلق من ٥ الى ٧ امتار ، مهدا الشرق الاوسط . اوراقها ليلية الشكل نصلها بطول من ٣ الى ٨ م . ويعرض من ٢ الى ٥ م . صفحتها باعثة الخضار الاغبر المواج . ثمارها حموية القد ، حنطية اللون ، صفر المولج .

٢٨٢٠٠ - مَيْس صيني ، نَتَم صيني Celtis sinensis (S).

Micocoulier de Chine (F).  
شجرة متوسطة القد جميلة الشكل مهدا الصين تعلق من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها بحرية اللون زرقاء المواج ، نصلها بطول نحو ٧ سم . ويعرض نحو ٤ سم . ثمارها رتقالية اللون ، صعبها تحروية الشكل . وهي من الاشجار السريعة النمو لكنها جادة ترضب في بعض المواقع والاربية الخاصة .

٢٨٢٠١ - مَيْس فيرجينية ، نَتَم فيرجينية Celtis occidentalis (S).

Micocoulier de Virginie, M. occidental (F). Western hackberry (E). Abendländischer Zügelbaum (D). Bagolaro occidentale (I).  
شجرة كبيرة القد تعلق من ٢٠ الى ٣٠ م . ساقها مثالة للحاء . ثاليلها مستديرة ، كبيرة ، قروية النسخ . اغصانها منفردة قريبة من الانبساط . اوراقها قصيرة الاعتان ، نصلها مائل الصفحة العليا للامعة ، خلي السفل الباهة . وهي من الاشجار المتوسطة النمو التي ترضب في المواقع الرطبة والارربة الجيدة التوز .

٢٨٢٠٢ - مَيْسَان

الميسان نجم من برج الجوزاء يدعى أنور الهنة ، اطله .

٢٨٢٠٣ - مَيْسَانِي \* Miocene (F), Miocene (E).

احد عصور الحقبة الثالثة التي تمتد اربعة . يقال انه عصر ظهور القردة .

٢٨٢٠٤ - مَيْسَم Stigmatè (F), Stigma (E).

هو السمة ، اطلها .

٢٨٢٠٥ - مَيْسَم ، مَيْكَاة Cautère (F).

Cautery (E).

٢٨٢٠٦ - مَيْسُون

الميسون احد كوكبي الحقبة .

٢٨٢٠٧ - مَيْسِيَّات Celteidès (F), Celtidae (E).

سبط من فصيلة الانجريات .

٢٨٢٠٨ - ميسول الشوفان Cécidomyie de l'avoine

هو طيار الشوفان ، اطله .

٢٨٢٠٩ - مَيْشَار \* Egoïne, Egoïne (F).

Pilot hand-saw (E).

مشار مزدوج الانسان ، صغير القد ، يستعمل لنشر فروع واغصان الانجار .

٢٨٢١٠ - مَيْشَار \* Pristiophorus (S).

Pristiophore (F), Pristiophorus (E).

جنس اسماك بحرية سرلودة متفرعة من فصيلة الميثاريات . انواعها المعروفة ثلاثة ، جميعها من اسماك الهند والصين واليابان واستراليا || اجسامها كبيرة ، شبه وشية الشكل ، تعلق من ١٨٠ الى ٢٢٠ م . تتميز بعظم فكها العلوي الذي يتقدم الرأس كالميثار المنحني النصل ، المنسن الحدين . الذرب الانسان . ويجلها من الاغشية السادة . ويكثر الزعانف الذيلية المستطيلة || لحومها كاعنة الصنف قل من يرضب فيها .

٢٨٢١١ - مَيْشَارِيَّات Pristiophoridae (S).

Pristiophoridès (F), Pristiophoridae (E).

فصيلة اسماك بحرية سرلودة وحيدة الجنس من الصفقيات القرشيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها تمتد من الهند الى اليابان واستراليا || اجسامها وشية مستطيلة . رؤوسها مجوزة بمواشير كبيرة مسنة الحدين || جسها الوحيد يدعى الميثار .

٢٨٢١٢ - مَيْشَاق هو سن المفتاح . ج مواشير .

٢٨٢١٣ - مَيْشَالِيَّة Michelia (S), Michélie (F).

جنس اشجار ونجيرات برية من فصيلة المنفليات . انواعه عديدة منبتها الشرق الاقصى والهند والجزر . جميعها نباتات عطرية مقوية شايقة || اشهر انواعها الشيق ، اطله .

٢٨٢١٤ - مَيْطَان Mithan (F).

هو الجبل ، من بقر الوحش ، اطله .

٢٨٢١٥ - مَيْطَلَة Dame en fer (F), Iron dam (E).

معلقة من حديد تقرب بها الارض لتصلب .



ميس



ميشار



ميشار

Myochama (S). ٢٨٢٢٨ - مِيَّيْم \*  
 Myocame, Myochame (F). Myochama (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البندريات. انواعه المعروفة خمسة جميعها من عظم المحاذج الاسرائيلية || اجسامها صغيرة، مثاقيب قصيرة مهدبة الاطراف. اصدافها شبه بيضيه الشوزن لامتساوية المصارع والاضلع، وردية اللون، لؤلؤية || تعيش في اول عهدا على الاصداف المهجورة ثم على الصخور.

Mica (F). ٢٨٢٢٩ - مِيَّيكا  
 هي الطلق، اطلبه.

Micaschiste (F). ٢٨٢٣٠ - مِيَّيكا شيسْت  
 هي الطلق المنفذ، اطلبه.

Mikania (S). Mikanie (F). ٢٨٢٣١ - مِيَّيكانيا \*  
 جنس نباتات ليلية عارضة من المركبات. سورها اسطوانية فراء طويل من ٤ الى ٨ امتار. اوراقها معنقة متقابلة، نصلها قلبي الشكل مائل للبقرة. ازهارها رويسية، صغيرة، بيضاء اللون او وردية || ازهارها يستمر طوال الصيف. وهي من نباتات البلاد الاستوائية لا تعيش في الاقاليم المعتدلة الا داخل المنازل وفي المصاري.

Mécanique (F). Mechanical (E). ٢٨٢٣٢ - مِيَّيكانيك  
 ميكروبيولوجيا

Microbe ٢٨٢٣٣ - مِيَّيكرُوب  
 حي مجهرى وحيد الخلية ذرى اللد.

Micrococcus (F). Micrococcus (E). ٢٨٢٣٤ - مِيَّيكرُوب كروِي، مِيَّيكرُوكوك  
 جنس ميكروبات كروية الشكل.

Micropeplus (S). ٢٨٢٣٥ - مِيَّيكرُوبيلوس \*  
 Micropeplus (F). Micropeplus (E).

جنس حشرات من فصيلة الميكروبيولوجيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطائها المناطق الجبلية والباردة من العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية دبوسية. تأثيرها وفكوكها قياسية. كواهلها مستعرضة، نائقة الخمار الجانبي. اعماها مضلعة، تلحف نصف البطن. سطوح بطونها منتظمة النقر الناجمة عن تصالب الاخاديد التي تملؤها. قوائمها معتدلة النشط. اثوابها تراوح من العنان الى الاسود الاسع || جميعها، ان جلالة او بقة، عارضة ودائمة.

Micropeplidae (S). ٢٨٢٣٦ - مِيَّيكرُوبيلوسيات \*  
 Micropeplidés (F). Micropeplidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها واتواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها شبه مكورة. عيونها صغيرة، بارزة. تأثيرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية دبوسية الشكل، تساعية الفصيل. كواهلها واعماها مضلعة. اعماها تلحف نصف البطن. سطوح بطونها منتظمة النقر الناجمة عن تصالب الاخاديد التي تملو البطن || جميعها داسة تعيش على المواد النباتية المنحلة واحصها الفطور || اشهر اجناسها الميكروبيولوس.

Eoclimat (F). Eoclimata (E). ٢٨٢١٦ - مِيَّيظَن \*  
 هو المناخ الموقى باعتباره عاملاً بيئياً. وهو جماع العوامل المناخية في مكان معين مهما صغر واستندق او اتسع وتراعى.

Délai (F). Delay (E). ٢٨٢١٧ - مِيَّيعدا  
 المياد او الأجل هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما.

Alibouffier (F). ٢٨٢١٨ - مِيَّيعة  
 هي الاصطرط وهي صفته المشهور الذي يستعمل في تثبيت الطيور.

Fluidimètre (F). ٢٨٢١٩ - مِيَّيغن \*  
 Fluidiméter (E).  
 جهاز يستعمل في قياس ميوعة الاجسام السائلة.

Ebulliomètre (F). ٢٨٢٢٠ - مِيَّيغار \*  
 Ebullimeter (E).  
 مقياس الغليان.

Intertidal (F) Intertidal (E). ٢٨٢٢١ - مِيَّيغِي \*  
 نمت تعريفه يطلق على المحاذج والشطوط البحرية التي يكتشفها تقلص العجاجة عند الجزر.

Myophoneus (S). ٢٨٢٢٢ - مِيَّيْفُون \*  
 Myophone (F).

جنس طير من الجوائم سنيات المناخير وفصيلة الشحروريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطئها جميع المناطق الحارة من القارة الاسيوية والجزر المتاخمة. ملجئها الحياتي جماعي الا في زمن التساقط والحضانة. قوتها الحشرات والديدان والثرار. تألف الغابات والحراج. تفريدها مستحب الانعام || اجسامها شبيهة بالشحروور. اطوالها تراوح من ٢٦ الى ٣٢ سم. اذنانها مستديرة الاطراف. مناقيرها ضلعية صفراء اللون. اثوابها الى السوداء الاسع وبعضها الى المركبة السوداء المولج || تدنن في الانجار الرقبة. اناتها تقسم من ٤ الى ٥ بيضات متحضنة متباينة الاكوار نحو ١٤ يوما.

Terme ٢٨٢١٣ - مِيَّيقات

Productif (F). Productive (E). ٢٨٢٢٤ - مِيَّيقاتر  
 كثير الحمل. ثجرة ميقار: كثيرة الحمل. ج. مواخير.

Pyrula (S). Pyrule (F). Pyrula (E). ٢٨٢٢٥ - مِيَّيقب  
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات غمديات الاجنح، اماميات الخياشيم المشطية، وفصيلة الودعيات || انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الخارة || اصدافها صغيرة، شبه بيضيه الشكل، عارضة المصارع والخنزة، مضغوطة السطوح، مستطيلة الفوهات المتشعبة الخمار السنن.

Chronomètre (F). ٢٨٢٢٦ - مِيَّيقت  
 Chronometer (E).

نوع من الساعات او بالاحرى جهاز مرفق الدقة يستعمل في تحديد الوقت.

Colonie d'oiseaux (F). ٢٨٢٢٧ - مِيَّيقععة  
 Birds rookery (E).  
 مكان تألفه الطير وتعيش فيه اسراباً.



ميفون



ميفم



ميكروبيولوس

الى ٢٢ سم. بما فيه الاذنان. رؤوسها ضخمة. اعطائها مستطيلة. عيونها واذاها صغيرة. اثنائها تختلف مع الانواع جميعها سوية الالوان. اوبارها دقيقة ناعمة || اثنائها نشرة تضع في كل رصص من ٨ الى ١٠ جيرة || بيئاتها الشتوي يستمر نحو ١٤ اسبوعا.



ميكروسترومه الجوز

٢٨٢٤٧ - ميكروغراف (F). Micrographe  
من تامل الى الاعمال الميكروسكوبية اي المجهرية.

٢٨٢٤٨ - ميكروغرافية (F). Micrographie (E).  
علم يبحث في كيفية الاعمال المجهرية وطرق تنفيذها.

٢٨٢٤٩ - ميكروغرام (F). Microgramme (E).  
الميكروغرام جزء من مليون من الغرام.

٢٨٢٥٠ - ميكروفراد (F). Microfarad  
وحدة الطاقة أو السعة الكهربائية.

٢٨٢٥١ - ميكروفيت (F). Microphyte  
هو النبات الدنيا المجهرية وهو غالباً وحيد الخلية.

٢٨٢٥٢ - ميكرومتر (F). Micromètre (E).  
مقياس الاشياء أو المسافات الدقيقة.

٢٨٢٥٣ - ميكروميريا (F). Micromérie (F).  
هي الشقيقة، اطلبها.

٢٨٢٥٤ - ميكرون (F). Micron  
الجزء الواحد من ألف جزء يقسم عليها المليمتر.

٢٨٢٥٥ - ميكسبوريوم (S). Myxosporium  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفات. انواعه قليلة العدد تسمى بعض الاشجار اخصها الثين. تركيب السورق والاغصان تتفرع بها بعض الاذن || قضبانها مقعرة الشكل تنشأ محفونة في اللحاء ثم ترقى سطح البشرة فتصدها.

٢٨٢٥٦ - ميكسين (S). Myxine  
جنس اسماك بحرية غضروفية، دودية الشكل، عمية، لزجة، من فصيلة الحماطيات. انواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في جميع البحار باستثناء الاستوائية || تتميز بكون جهازها الشقي ثنائي التركيب. فهو ذكري الشق ويفرز الرول الى ان يبلغ طول السمكة نحو ٣٠ سم. وعندما يصبح طويلاً من ٢٢ سم. وما فوق، يتحول شقها الى اثري ولا يعود يفرز سوى السرة.

٢٨٢٥٧ - ميكنة (F). Vomer  
العظم البارز الذي يتألف منه الجزء الاخرى من وثيرة القواب المنخرية.

٢٨٢٥٨ - ميكنة (F). Mécanisme (F).  
Mechanism, Machinery (E).

الميكنة مجموعة اعضاء او قطع موقفة بالطريقة الفضل لتأدية الغاية المطلوبة. مثلاً ميكنة الجسم البشري وميكنة الساعة || والميكنة نظرية فلسفية تعيد الحياة الى مجموعة اعضاء متحركة تملك كالألة.

٢٨٢٥٩ - ميكروبيولوجية (F). Microbiologie (F).  
هي علم الميكروبات بجميع فروعها واتجاهات.

٢٨٢٦٨ - ميكرونوم (F). Microtome  
هو المقطاع، اطلبه.

٢٨٢٦٩ - ميكروستروم (S). Microstroma  
جنس فطور مجهرية من عارة الزيكيات وفصيلة الطحنيات، انواعه قليلة تتميز بمشيجها الذي يشأ ويتكاثر في النجس الورقية حيث ينشأ خيوطه الاسطوانية التي يستقر بها المطاف داخل الفقا السمية. شفراته شغمية التركيب تحمل بويغات فردية الارتكاز، بيضية الشكل، شفاقة. اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٨٢٧٠ - ميكروستروم الجوز (S). Microstroma juglandis (S).  
فطر مجهرية يركب اوراق الجوز. مظهره الخارجي يقع مقرة الزوايا تسمى الاوراق على صفحاتها السفلى فتضفيها وقد تسمى الى النور.

٢٨٢٧١ - ميكروستروم السنديان (S). Microstroma album (S).  
فطر مجهرية يركب اوراق السنديان. مظهره الخارجي تقطين ابيض يشبه الاكاذغ يركب اتصال على صفحاتها السفلى || اضارها زهيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٨٢٧٢ - ميكروستوم (F). Microstome  
نمت تعريفي توصف به الافواه المستصرفة المنقطة.

٢٨٢٧٣ - ميكروستوم (F). Microstome  
سمكة بحرية مشهورة باسم خنجر، اطلبها.

٢٨٢٧٤ - ميكروسكوب (F). Microscope  
هو المجهر، جهاز بصري يستخدم في تكبير المرئيات وتوضيحها.

٢٨٢٧٥ - ميكروسيب (S). Microcebus (S).  
حيوان لبون حاشر ثامر من الليموريات. ومن العلماء من يعتبره كنوع من الشغال رغم اختلاف المعادلات السنية.

٢٨٢٧٦ - ميكروسكوب (F). Microcèbe (F).  
موطنه ارجاج مدغشكر. ملجنه الحياتي جامعي، جماعاته قليلة العدد || جسمه صغير القد، يطول نحو ٢٧ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل، كثيف السبال. عيانه مطوقتان بالاسود. ثوبه الى الطحلة السوداء يعلوها موانج خطي. يطنه تني اللون || يعيش على الاشجار وينام عليها ملتصقاً كالكرة. مسرعه دجوي يسير من فحة الليل الى الفجر. قوته الحشرات والديدان والثمار اللينة. يياته الشتوي لا يتجاوز ١٠٠ يوم || يدين بسهولة ويصطاد الفار كالسنور.

٢٨٢٧٧ - ميكروغفال (F). Microgales (S).  
Microgale (F).

٢٨٢٧٨ - ميكروغفال (F). Microgale (F).  
جنس حيوانات لبونة حاشرة من فصيلة المذليات. انواعه المعروفة ستة. موطنها بعض المناطق الداخلية من جزيرة مدغشكر. تألف المروج والمرابي الطبيعية. مسرعا دجوي. قوتها الحشرات والديدان || اجسامها صغيرة القد قريبة الشبه باجسام الجرذان. اطوالها تراوح من ٢٤



ميكسين

٢٨٢٧٣ - **مينتات \*** ، **كراكولة** (S).  
Gracula (S).  
Meinate (F).

طائر من فصيلة الزروريات طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى السواد اللامع يعلوه موج اخضر. بحره اصفر اللون صفرة تمتد حتى الفم. بعض قوامه يبيض بما يحمله منقح الجناح. منقاره ورشاه ومخالبه صفر. عيناه الى السرة الخنثية || موطنه الهند وسريلنك. سره قليل المدد يتألف من ٣ الى ٤ أزواج. قوته الحشرات والباز. يدن في سدود الاشجار وفي الاطلال ، انشاء تحفن وسعدنا من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في السنة.

٢٨٢٧٤ - **مينتاج**

طائر من العصافير الافريقية.

٢٨٢٧٥ - **مينتج \*** ، **عوككل \*** (F).  
Microclimat (F).  
Microclimate (E).

هو المناخ الموضعي وقد يختلف عن المناخ الاقليمي. ويعتبر الميخ من العوامل الرئيسية في توجيه مكافحة الحشرات.

٢٨٢٧٦ - **مينتس \*** (S).  
Acridotheres tristis (S).  
Acridothère triste (F).

مينس هو الاسم الهندي. طائر من الجوام مشروبات المناظر وفصيلة الزروريات. موطنه الهند. قوته الحشرات على اختلاف انواعها واعصها الجراد || جسمه معتدل القد، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه العلوي الى السواد اللامع. ثوبه السفلي من الجوشن الى الافنيك اغير اللون ، اشفق الموج. رأسه متوج بقزعة صغيرة شديدة السواد القمي. منقاره مخرزي الشكل ، مشروم الطرف. اسود اللون. ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف. رساه الى السرة القائمة || سره وافر المدد. يدن عشه في سدود الاشجار ، انشاء تحفن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات مرتين في السنة.

٢٨٢٧٧ - **مينتسه \***

Mina lobata, Quamoclit mina, Ipomaea versicolor (S).  
Mina lobé (F).

نبات عايش من اللبلبيات. ساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراقه معتقة ، متعاقبة ، قلبية النصل ، مستطيلة الفص الوسطي. ازهاره محوري الارتكاز ، وري او شمي التجميع. ازهاره كبيرة القد تبدو برتقالية اللون ثم تتحول نحو البفرة الصفراء || تنوره يستمر طول فصل الصيف.

٢٨٢٧٨ - **مينوس \*** (S).  
Minos (F).  
Minous (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الجلائغيات. انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اليابان || اجسامها صغيرة شبه اهليلجية الشكل ، معتدلة التبسيط. رؤوسها مزبرة ، مدرفة ، شاذكة. عينها جاحظسة ، ناشرة الاقارب. زعانفها الظهرية فردية قاطبة ، عديدة المناسخ الحادة. الذيلية مقطعية. الخوضية تحمل مذبة جامدة مستطيلة || لونها كاعنة الصفن وقد تكون سامة في بعض فصول السنة.

٢٨٢٧٩ - **ميوزة \*** (F).  
Méiose (F).  
Meiosis (E).

شكل من الانقسام غير المباشر يتركز على تجزئة الجيلة

٢٨٢٥٩ - **ميكوديروم** (F).  
Mycoderma (E).

هي الفميرة الخنثية لها نوعان يمتريان الحمر والخل.

٢٨٢٦٠ - **ميكوز** (F).  
Mycose (F).  
Mycosis (E).

اسم شامل يطلق على كل علة يسببها احد الفطور.

٢٨٢٦١ - **ميكولوجية** (F).  
Mycologie, Mycétologie (F).  
Mycology (E).

هي علم الفطريات، يبحث في ماهيتها وتصنيفها واحوالها ومنافعها واضرارها.

٢٨٢٦٢ - **ميكومي** (S).  
Mycomyia (S).  
Mycomyie (F).  
Mycomyia (E).

جنس حشرات من فصيلة المرقصيات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة ٣٦ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مغطاة بطول من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها مخروطية صغيرة. عيونها متباعدة عند الشقين. قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة. ملابسها رباعية المقل. مرفاشها نشطة. كواسلها شبه اهليلجية الشكل. بطونها دقيقة القاعدة والمخسر. اثوابها ملونة يعلوها تجذيع قاطب ومعرض. رؤاشها قليلة الخصب. قوامها مستطيلة || تألف المراج والنايات اعصها التي تكثر فيها الراتنجيات من صنوبر وغيره || اساربعها دامتة ونجاجة.

٢٨٢٦٣ - **ميتل** (F).  
Déclinaison (F).  
Declination (E).

٢٨٢٦٤ - **ميلازية \*** (S).  
Melasia (S).

خسفا من فصيلة النيشيات. جسمها صغير القد مستطيل الشكل. طولها يراوح من ٩ الى ١٢ سم. الاثنى اكبر قدًا من الذكر. ثوبها الى الجفوة السفاه الموج. تعيش مع رقاتها في المراتج التي تحفرها بين قشور ولحاء الصنوبر. اضرارها زعيدة لا تستوجب المكافحة.

٢٨٢٦٥ - **ميلديو** (F).  
Mildiou (F).  
Mildew (E).

هو التسة ، الطلها.

٢٨٢٦٦ - **ميلديو الكرم** (F).  
Mildiou de la vigne (F).

هو تسة الكرم ، الطلها.

٢٨٢٦٧ - **ميلفوج القتم** (F).  
Mélophage du mouton (F).

هو قلية القتم ، الطلها.

٢٨٢٦٨ - **ميسوزا \*** (F).  
Mimosa commun (F).

هي السند العنبري ، اطله.

٢٨٢٦٩ - **ميمولس \*** (F).  
Mimule (F).

هو الدندل ، اطله.

٢٨٢٧٠ - **ميمون** (F).  
Papion mandrill (F).

هو القردوز الزواج ، اطله.

٢٨٢٧١ - **مينتا** (F).  
Email (F).  
Enamel (E).

٢٨٢٧٢ - **مينتاه** (F).  
Dentine (F).  
Dentine (E).

المادة الخاصة التي يتركب منها غضن الاسنان.



ميلازية



مينات



مينس



ميوس



- ٢٨٢٨١ - ميوزين Myosine (F), Myosin (E).  
هو الآحين العفيل ، اطلبه .  
الى اريمة ااطر في دفعتين متواليتين بيها تنقسم النطشة  
الى شطرين في دفعة واحدة .
- ٢٨٢٨٢ - ميوزج ، زييب الجبيل  
« نيات له ورق شبيه بورق الكرم البري مشرف وقصبان  
قائمة سود وعمره في غلف خضر مثل ما للحمص » (اللسان).
- ٢٨٢٨٠ - ميوزونيس Myosotis  
هي اذان الفأر ، جنس نباتات عشبية برية وتزيينية .



جبل الخفسار الزاهي . ازهارها فردية التجميع ، لا قياسية  
الارتكاز ، كبيرة القد ، مستديرة الشكل . بتلاتها مزوجية  
الصف ، زرقاء اللون . اسديتها متراسة نودية الانقسام  
مطلوقة بصفتين من اللسنتان الوردية اللون || تزرع  
للزينة ، ترغب في الارربة الخفيفة .

Perspirable (F).

٢٨٢٩٢ - نَابِيس

الناتج السامح بمرور التسع .

Putrivoire (F).

٢٨٢٩٣ - نَابِيس

الناتق الذي يعيش على المواد الحيوانية المنحلة .

Prognathe (F). Prognathous (E).

٢٨٢٩٤ - نَابِيس

نمت تعريفي توصف به الاعضاء الناشئة الشاذة عن  
المألوف .

Coprophage (bousier) (F).

٢٨٢٩٥ - نَابِيس

Coprophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تغذي من براز الحيوان .

٢٨٢٩٦ - نَابِيس

هو الفرس ، اطلبه .

Mois d'été (F).

٢٨٢٩٧ - نَابِيس

كل شهر من شهور الصيف .

Summer month (E).

٢٨٢٩٨ - نَابِيس

هو السيلج ، اطلبه .

Dame-jeanne (F).

٢٨٢٩٩ - نَابِيس

هو الدجاجة ، اطلها .

٢٨٢٨٣ - نَابِيس

Canine (F). Canine tooth (E).

السن خلف الرباعية .

Crochet (F). Fang (E).

سن الانمي وهي حادة متعقبة مخروقة . ولانمي نايان  
مجبوان يأتي السم اليهما من غدد في الجسم تنقله قناة دقيقة  
تخترق كلا منهما .

٢٨٢٨٥ - نَابِيس

Adonide automnale (F).

هو الادونيس الخريفي ، اطلبه .

٢٨٢٨٦ - نَابِيس

Centrifuge (F). Centrifugal (E).

Bellatrix (F).

٢٨٢٨٧ - نَابِيس

Bellatrix (E).

الناتبة والمرزم ومرزم الجبار ثلاثة اسماء لنجم ثير واحد  
من المرقية الاول على المنكب اليسرى من الجوزاء .

٢٨٢٨٨ - نَابِيس

Contractile

٢٨٢٨٩ - نَابِيس

Contractilité (F).

٢٨٢٩٠ - نَابِيس

Contractility (E).

٢٨٢٩١ - نَابِيس

Népenche (F).

هو السلوس ، اطلبه .

٢٨٢٩٢ - نَابِيس

Napoleona (S).

Napoléone (F).

نبات معقود التعريف على اسم الامبراطور نابوليون وهو  
جنية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الآسيات .  
ساقها فرعاء تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها كاملة  
معقبة متعاقبة ، نصلها اهليلجي الشكل . جامد الصلصة ،



نَابِيس



نَابِيس

## ٢٨٣٠٥ - نأرجيل شيلي

Jubée (F). هو الجوبة ، اطليا .



نأرجيل ميشل

## ٢٨٣٠٦ - نأرجيل معرّوف ، جؤز الهند ،

## رأنج ، شعفور ، حشرج

Cocos nudifera (S). Cocotier commun (F). Cocconut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noce d'India (I).

نوع من النأرجيل الزراعي . ساقه اسطوانية منتصبة تملو نحو ٣٥ م . اعطانه بعض المناطق الاستوائية . يعيش قرب الماء ويجود على الشواطئ البحرية . ثماره بيضية الشكل تطول من ١٦ الى ٢٢ سم . تشورها خشية تغلفها الالياف . لبها جامد الحمر ، عاجي اللون ، مستحب الطعم ، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي .



نأرجيل معروف

## ٢٨٣٠٧ - نأرجيلة ، جؤزة الهند ، جؤزة

## النأرجيل

Coco, Noix de coco (F). Coco-nut (E).

ثمرة النأرجيل ، لبها يتفع من البلمغ والسوداء وضعف الكبد والكلل والمثانة وقروح الباطن . ويزيل اوجاع الظهر والبدان والواسير ويهيج افقو الجلدية ويمنع تقطير البول . عصارتهم مع السكر تشط الدم وتقوي الفريرة . رماد قشوره يطول الانسان ويزيل الكلف والتمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء .



نأرجيلة

## ٢٨٣٠٨ - نأردين ، سنبيل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طبية برية وزراعية من فصيلة النأردينات . انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اشباح خولية او معمرة . اوراقها متقابلة مركبة ويضية . ازهارها نوري او مشكوية التجميع ، اعطي وتاجي الارتكاز . ازهارها خشوية جميلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر انواعه الطبية والزراعية والبرية ما يتبع .

## ٢٨٣٠٩ - نأردين أزرق ، سنبيل أزرق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من النأردين البري والزراعي . جذاميره ملفطة . ساقه غندة . اوراقه عاقبة الحنفر . ازهاره كثيفة مغلطة . زرقاء اللون ، مستحبة العرف . جذاميره طيبة || اذا استعمل مسحوقها مع الاقستين والسندل لم يشمر صاحبه بشيء من شدة تقويته المدة . ويظهر اللون ويزيل البرقان والكد والكبد والحصى . واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طبخ بالحمر حتى يتقزم وظل به الشعر سوده وطوله .



نأردين أزرق

## ٢٨٣١٠ - نأردين إقريطي ، سنبيل رؤمي ،

## عطارود

Valeriana celtica (S). Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Salicina, Spiga celtica (I).

نوع من النأردين البري الطبي الحمر . ينبت في الآرتبة الرملية الجبلية . جذاميره مستطبة مسطحة فواعة العرف . ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه اسفل كاملة العليلجية . اوراق الوسطى والعليا مركبة . ازهاره عقنودية التجميع بيضاء اللون . ثماره بيضية الشكل ، صغيرة القد ناعمة ومفذية .



نأردين إقريطي

## ٢٨٣١١ - نأخس ، نأخوس

Tragelaphus spekei (S). Tragelaphus de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل ، قدره قدر القنمار ، له قرنان جالسان ثوبه الى السرة يطولو تجذع ابيض . اعطانه اواسط افريقية . يألف الهضاب والقيافي ويرتاد المناقع وضفاف مجاري الماء . قوته الاشباب . اجله يعد من ٥ الى ٢٠ نفراً .

## ٢٨٣١٢ - نأر هندي

Mésua (F). هو المهر ، اطية .

## ٢٨٣١٣ - نأرايو

Naranio (S). Naranio (F). Naranio (E).

نأرايو هو الاسم الهندي . جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم وفصيلة التيقبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صغيرة . مثابها بارزة ، طليقة . اصداؤها مبيونية الشكل || تعيش في اتفاق تنقب في الصخور المغسورة بالماء قرب مصبات الانهر || ليفها غزير المادة ، جيد الصنف .

## ٢٨٣١٤ - نأرجيل

Cocos (S). Cocotier (F). Cocoa-nut palm (E).

جنس اشجار الجذع من فصيلة النخلات . انواعه المعروفة ٣٠ ، اعطائها المناطق الاستوائية والحارة . معظمها بري وتربني وبعضها زراعي صناعي . اشهر انواعه النأرجيل المعروف (المطبة) . اما الانواع التريينية التي تعيش في بعض المواقع الحارة من الاقاليم المعتدلة فهي :

- نأرجيل احمر الكافور Cocos erythrospatha
- نأرجيل اشعر الكافور Cocos eriospatha
- نأرجيل الجنوب Cocos australis
- نأرجيل الحرس Cocos lapidea
- نأرجيل املس الكافور Cocos leiospatha
- نأرجيل بلحي Cocos datil
- نأرجيل تاجي Cocos coronata
- نأرجيل حقلي Cocos campestris
- نأرجيل رشقي Cocos elegantissima
- نأرجيل وروموزوف Cocos romanzoffiana
- نأرجيل ريشي Cocos plumosa
- نأرجيل مارن Cocos flexuosa
- نأرجيل مستدير القمة Cocos capitata
- نأرجيل وديليانا Cocos weddelliana
- نأرجيل ياطاي Cocos yatay

## ٢٨٣١٥ - نأرجيل سيشيل ، نأرجيل بحري

Lodoicea (S). Lodoicée des Seychelles, Cocotier des Maldives (F). Double cocoa-nut palm (E). Maledivische Nuss (D). Coco di Moldiva (I).

نخلة وحيدة الجنس والنوع ، قرية الشبه من النأرجيل ، موطنها سيشل والهند وسرنديب وموريس . ساقها اسطوانية مستقيمة تملو نحو ٣٠ م . ثمارها كبيرة القد مستطيلة الشكل ثنائية التجميع ، واحداها وزن من ١٠ الى ١٢ كيلو يعي تنقسم على الشجرة ، من التأبير الى الادراك ، نحو الحول . عصية الثمرة قرب الادراك تحوى مادة لبنية آحية لليلة الطعم ناعمة ومفذية .

Valeriana saluina (S). **نَارْدِين عَطِر** ٢٨٣١٧  
Valériane odorante (F).

نوع من الناردين البري والزراعي المعمّر. ساقه مثنونة تملو من ٥ إلى ١٥ سم. تحمل ورقين صغرتين ثلاثية التركيب. ازهاره نوري التجميع. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جذوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصنف || تنوره يستمر من محو إلى آب.

٢٨٣١٨ - **نَارْدِين مَحْرُورِي \* ، حَشِيشَةُ الْقَطْ ، بَقْلَةُ الْمَرْ**  
Valeriana officinalis (S).

Valériane officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amantilla (I).

نوع من الناردين الطبي البري المعمّر المبلول. ساقه محددة منتصبة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، ويريقاتها سنائية التصل، منفعة الحافة، ورتبة التجميع تعد من ٥ إلى ٢٣. ازهاره نوري. ازهاره صغيرة القذ، وردية اللون. جذوره طيبة وعطرية يستخرج منها عطر الناردين وهي بحللة مقوية للاعصاب، مفيدة لقلب والكل والطحال، منبهة للقوة الجنسية، مفادة للتشنج، تنظم الحضم وتزيل الانتفاخ. جرعة المسحوق منه تراوح من غرام إلى خمسة.

٢٨٣١٩ - **نَارْدِينِيَّات**  
Valerianaceae (S). Valérianacées (F). Valerianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفعالات. ازهارها كثيرة تجتمع إلى عدة اجناس، نباتاتها عشبية وجنبية. اوراقها مركبة متقابلة. ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز. ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناردين والوشة والناوك والكورث.

٢٨٣٢٠ - **نَارَكِيد**  
Pavot blanc (F). هو رمان السمك أي الخشخاش الابيض.

٢٨٣٢١ - **نَارَمَسْكَ ، نَارَمَسْكَ**  
|| النارسك والنرمسك : رمان صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها إلى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار، لونه كذلك وطعمه عفص ورائحته طيبة (أ.م.) || هو الرمان البري يحبس الزئفر والانهال. شربه دهمان.

٢٨٣٢٢ - **نَارَنَج \* ، نَبَاش \* ، أَبُوصْفِير**

Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitter-orangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I). نوع من الحمضيات والفصيلة النارجية. منبه المقدر بلاد الصين أو الهند الصينية ثم ادخل إلى الهند فبلاد المعم والعرب كانوا اول من ادخلوه إلى افريقية الشالية وأروبه (المسودي) || ثمرته شاذكة نفاذ ورائحة تملو من ٣ إلى ٧ اثمار. أوراقه منفقة متقابلة. نصلها ينجم العنق، المبلجي الصفحة الجامدة الجميلة الخفسار. ازهاره خاسية البتلات البيض، نماره مستديرة الشكل برتقالية القذ واللون، المستحب. نماره مستديرة الشكل برتقالية القذ واللون، غليظة القشور المرة الحامزة. عصارة فصوصها شديدة الحموضة والمرارة المستنكرة. قشور ثماره تربب بالسكر بعد سحقها بالماء والكلس وهي صعبة، نافعة، غنية، يبيض الفيتامينات، خافضة الحرارة، مضادة للتشنج. يستنطر من زهره المرفوف بالقدح دهن يدهس البطر الثيرولي ويستقطر أيضاً من زهره وأوراقه ماء الزهر المشهور

حسيفة البشرة. || جلوره صناعية يستخرج منها عطر الناردين وتستعمل في الطب استعمال الناردين الحثري إلا أنها أقل فعالية منه.

٢٨٣١١ - **نَارْدِين الْجَبَلِي**  
Valeriana montana (S). Valériane de montagne (F).

نوع من الناردين البري المعمّر المبلول. ساقه تملو من ١٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه الجذعية اعليجية التصل المنسن الحافة. أوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولي التجميع، مستطيل الشكل. ازهاره صغيرة القذ خضر القبايات وردية البتلات || تنوره يستمر من نيسان إلى محو.

٢٨٣١٢ - **نَارْدِين الْحَدَائِق \* ، سُبُبل الْحَدَائِق ، فُو**

Valeriana phu, V. discordis (S). Valeriana phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agreste (I).

نوع من الناردين الزراعي المعمّر. جلوره مدادة، اسطوية، مشعشة. ساقه مائلة منتصبة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه السفلى اعليجية كاملة. أوراقه الوسطى والعليا مركبة مشطية. ازهاره عشكولية التجميع، كبيرة القذ، يبيضه اللون أو وردية، فواحة العرف العطري المستحب. جذوره طيبة لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهارها يستمر من ايار إلى محو.

٢٨٣١٣ - **نَارْدِين الصَّخُور**

Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F). نوع من الناردين البري المعمّر. يعيش بين الصخور ويرغب في الاثرية الكلسية. ساقه نحيلة تملو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه الجذعية سنائية التصل. أوراقه العليا مركبة ريشية. ازهاره عشكولية التجميع. ازهاره يبيضه اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى محو

٢٨٣١٤ - **نَارْدِين الطَّيْب \* ، نَارْدِين هِنْدِي**

Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spicanard (F). Indian valerian, Nardus, Spikenard (E). Indische Narde, Echte Nardenähre (D). Spignardi (I).

نوع من الناردين البري الطبي المعمّر. اعطاه بلاد الهند. جلوره غليظة مغلفة زافرة المادة العطرية. ساقه منتصبة محددة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه مركبة. وريقاتها شبيقة التصل المنسن الحافة. ازهاره عشكولية التجميع، صغيرة القذ، فواحة العرف. يستخرج من جلوره دهن عطري يعتبر من اجود انواع الطيب.

٢٨٣١٥ - **نَارْدِين الْمُرُوج \***

Nardus stricta (S). Nard des prés, Nard bâard (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Borstengrass (D). Nardo, Cervino, Fieno del monti, Spigo fitto (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. ساقه نحيلة منتصبة فواحة. أوراقه خفيفة مستطيلة. ازهاره سنيلية التجميع، صغيرة القذ، وردية اللون || وهو من النباتات المروعة التي يجود عليها الدر ويطيب.

٢٨٣١٦ - **نَارْدِين بَرِّي**

Nard sauvage (F). هو الاسارون، الحلبه.



ناردين الحدائق



ناردين الطيب



ناردين المروج



ناردين مخزني



نارنج

### ٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الحَمَار المُجَفَّفَة هي نداسة التنج ، أطلبها .



ناره

### ٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الحِنطَة \* ، ضَفَّ الشَّعِير

*Plodia interpunctella* (S). Teigne orientale des denrées (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). Dörrmotte (D).

حشرة من التاربات، صغيرة القد . رواشها ملوثة ساءة الابيض والخطي والاسمر الاسفع المواج . ريقها دقيقة نحيلة تركيب الجيوب المخزونة على اختلاف انواعها كالحنطة والشعير والذرة والشوفان والسلت ...



نارية البرتقال

### ٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الخُرُوب \*

*Melois ceratoniae* (S). Pyrale des caroubes, Teigne des caroubes et des figues (F). *Melois ceratoniae* (E).

حشرة صغيرة من فصيلة التاربات وربة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازمار . سرقها ثائرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار التين || جسمها نحيل اهيف يطول نحو ٨ م . بسطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . مشرقها معتدل الطول . جوشها وبطنها الى الشبهة || رواشها الاماميان الى الشبهة الحديدية يملوها بتقيج ابيض وصف من البقع البيض يستيق الحمار الخاريجي . وروشها الخلفيان الى الشبهة السمر . اهدابها الى الشبهة البيضاء || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في حزيران . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع قرقر المكن مباحداً في قرون الخروب || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . وأسها شديد السمر . ثوبها الى البياض التي تملوها ماجة وردية . وواجها الى السمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تحببها السرفة تحت القشور او بين شقوق السعاء .



نارية الحنطة



نارية الخروب

وهو يفيد الفص والمضغ || نصبو التارنج تستعمل كعلم تخلط انواع الحمضيات وذلك لانها قوية المناحة الجلدية ولا تخشى الارربة المتدججة التي تنفر منها انواع الليمون المرذدة .

### ٢٨٣٣٢ - تَارَنج مَرَسِينِي

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليمون المرسي ، اطلبه .

### ٢٨٣٣٤ - نَارَة \*

*Acanthosicyos horrida* (S).

Nara (F).

اسما الاثري ناره وهي جنه من فصيلة القرصيات منبتها صماري افريقية الشالية . ساقها ليفية فروعها تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها اقية الانتشاب ، متسلقة متدلية ، تطول نحو ٤ امار وهي عادية الورق كثيرة الشوك . جلودها تنور في الرمال من ٣٠ الى ٤٠ م . اثمارها كبيرة القد . ثمارها يرتقيا الحنج والمون ، تشورها مخفكرة ، هريفة التعل . لها مستحب الطعم مأكول وهو ادم وأصل وألذ من البليخ . يزورها مأكولة طازجة ومبطونة . لها مومان في العام الواحد . وهي من النباتات العزرة الكثيرة النفع .

### ٢٨٣٣٥ - نَارِيَّات

*Pyralidae*, *Pyralididae* (S). *Pyralidés* (F). *Pyralidae*, *Pyralin moths*, *Snout moths* (E). *Zünstler* (D).

فصيلة حشرات من ربة حشرقيات الاجنحة . اسباطها ١١١ ، اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ . جميعها فراشات ليلية صغيرة القد ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاعظام ، واضحة التأثير . رواشها ضيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الالوان . ابيالها الحولية لاقياسة . ريقاتها ملونة . غادراتها تلتحف بأغشية حريرية النواس .

### ٢٨٣٣٦ - نَارِيَّة البَاذَنجَان

هي ينظفرو الباذنجان ، أطلبها .

### ٢٨٣٣٧ - نَارِيَّة البُرْتُقَال \* *Prays citri* (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من التاربات ، صغيرة القد ، نحيلة الجسم ، قريبة اليه من قوقعة الزيتون . بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . رواشها الاماميان الى الكهبة النفضية المواج تملوها رشفة رعداء لا متسوية الثر . رواشها الخلفيان الى الربة الزاهية السوية يحرقها اطار من اهدب الكثيف المستعرض . ابيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاثني مكها على الازمار والثار القتيبة ينثف من ريقات دقيقة تراوح طرما عند اكمال نموها ، من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الكهبة الزاهية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكثف الظفر من الرأس الى الترج واثان جانبيان . رأسها الى السمره الباقية . مدبها الى السمره الحنطية يرتكز على خمسة ازواج من الجرامز السمر || اسطها اقليم البرتقال الذي يمتد من الهند الى كابل حوض البحر المتوسط || اغراضها قد تكون مؤذية فبا لو كثر عددها ذلك لانها تقضم بتلات الازمار واسديها واقلام مدقاتها وقد تمطب في ظروف خاصة تشور الثار التي تنقبها وتسردب لبابها || تكافح بالروقيين الذي يقضي عليها .

### ٢٨٣٣٨ - نَارِيَّة البُسْر \* *Pyrastis nubilalis* (S).

*Pyrastis nubilalis* (S). *Pyrale du maïs* (F). *Corn moth* (E). *Malszünstler*, *Hirsezünstler* (D).

حشرة من التاربات ، ريقها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملوه خطوط قرفل . مدبها الى السرة الحنطية || تحمل على جانبها نقط سمر داكنة يملوها حلب مستطيل || تركيب سوق الذرة فتخروسا وتسبب قصصها .



نارية الذرة

### ٢٨٣٣٩ - نَارِيَّة البُسْر ، نَارِيَّة البَلَح

هي نداسة البسر ، اطلبها .

Stalactite ٢٨٣٤٦ - نازلة ٥  
نازلة ج نوازل : رواسب كلسية متحجرة في سقف  
الماور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥  
Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).

حشرة ناعمة من فصيلة الطليطيات ورتبة غشائيات الاجنحة  
المقصورة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو  
المتدلة . تنطفل على ذوات الجناحين اخصها الذباب ||  
جسمها صغير القد بطول نحو ١ م . واربية خطوط .  
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران .  
جوشنها ضيق المؤخر بطنها شبه بيضي الشكل . مرتزها  
قصيرة مستقيمة . اجنحتها وردية اللون . ثوبها الى الخضار  
الالمن .

Fistule (F). Fistula (E). ٢٨٣٤٨ - ناسور

٢٨٣٤٩ - ناسير هو الفل المصري ، اطلبه .

Diffuseur (F). Diffuser, ٢٨٣٥٠ - ناسيرة  
Mixing cone (E).  
اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة  
السكر ، راجع انتشار .

Lymexylon (S). ٢٨٣٥١ - ناسيرة الخشب \*  
Lyméxylon, Lime-bois (F).

جنس حشرات خاشية من مقدمات الاجنحة . انواعها  
ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، برتقة الجسم .  
برقاتها تنفك باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة فتسرقها  
وتعطبها .

Exsert ٢٨٣٥٢ - ناسير  
نعت تعريبي يوصف به الشي المرتفع عن سطح محيطه .

Assez fort (F). ٢٨٣٥٣ - ناسيط  
نعت تعريبي يطلق على التبروغ التي تتحمل بسورة ناشطة  
مركزها التصنيفي دون المانعة وفوق المعتدلة .

Oryx de Nubie (F). ٢٨٣٥٤ - ناسيط  
هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناسفة  
هي مجرى السيل الى الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصعات ، قنبرويات ٥ ، ناصيات

Buprestidae (S). Buprestidés, البقّر  
«Richard» (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).  
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة رمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها  
كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة .  
اشكالها مألوفة ، الالوان عابقة زاهية ، ورؤوسها قصيرة ،  
قرونها الاستعارية مركبة من ١١ فاصلة ، اراسها  
خامسة ، امخادها مستطيلة . جميعها تسرح في النهار وهي  
سريعة الحركة والطيران . || برقاتها خاضعة تميم على  
جنود وسوق واوراق مختلف النباتات . كثرها على بعض  
اعشاب المراعي تسبب الحباط اي التلف في الايقار التي  
تبتلعها مع العشب .

٢٨٣٥٥ - نارية السيسيم \*  
Antigatra catalaunalis (S). Antigastre du  
Sésame (F).

حشرة من الناريات . رقتها صغيرة القد تطول نحو ١٢ م .  
لونها الى الخضرة الرمداء الموجات تعلوها رقعة سوداء || تركيب  
السسم من ساقه الى ازهاره ومماره .

٢٨٣٥٦ - نارية الشمع الصغيرة  
Alveicole, Teigne de la cire (F).

هي صمل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٥٧ - نارية الشمع الكبيرة  
Gallérie de la cire (F). اطلبه .

Pionea forficatis (S). ٢٨٣٥٨ - نارية الصليبيات  
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، رقتها صغيرة ، دقيقة ، سمراء اللون ،  
سريعة الحركة . تركيب اوراق الصليبيات على صفحاتها  
السلط .

Mecyna gilvata (S). ٢٨٣٥٩ - نارية المصان \*  
Pyrale des cannes à sucre (F).

حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة  
الرواشن . رقتها تطول نحو ٢٢ م . لونها الى الحمرة تحمل  
على ظهرها وجانبها خمسة خطوط ارجوانية || تركيب  
المصان فتتخرق الساق وتذهب فيه صمداً حتى القشة .  
وتركب الذره فتقتل فيها ذات الشيء وتركب الارض فتقتل  
السوق والسنابل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبياء \*  
Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale  
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، رقتها تطول نحو ٢٥ م . وهي  
ارجوانية الظهر غبراء المذب || تركيب ازهار وممار  
وجيوب اللوبياء فتعطبها .

Myelois cribrella (S). ٢٨٣٤١ - نارية الوزيم  
Myelois des fleurs (F).

حشرة من الناريات ، رقتها دقيقة نحيلة حنطية اللون  
تميش داخل وزم وسوق نباتات الفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الياسمين \*  
Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).

حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . رقتها  
صغيرة القد مستطيلة الجسم ، غبراء اللون ، سمراء الموج .  
تركيب براعم وازهار الياسمين وسنابل الزيتون .

٢٨٣٤٣ - نارية البخضور \*  
Pachyzancla licarescalis (S). Pyrale des gazons (F).

حشرة من الناريات ، رقتها مستطلة تطول نحو ٢٥ م .  
ثوبها الى السمرة يطولها تنقيض اسود منتظم التركيب وحيد  
الهيئة المستطيلة || تركيب مختلف اوراق الاعشاب الفتية  
اخصها النجيلية فتتلفها .

Pyrausta aurata (S). ٢٨٣٤٤ - نارية ذهبية  
Pyrale dorée (F).

حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . رقتها صغيرة  
القد غبراء اللون . تركيب براعم وازهار النباتات العطرية  
اخصها النعنع .

Pyrale grise (F). ٢٨٣٤٥ - نارية شهباء  
فراشة مؤذية تدعى طينية المصان ، اطلها .



نارية المصم



نارية المصان



نارية اللوبياء



نارية الياسمين



نارية البخضور



نازون قصير الزبان



ناشرة الخشب

Maille (F). Stitch (E). **ناطية** ، **ناطية** ٢٨٣٦٨ -  
ج. نواطيل. والنواطيل هي خروق المصفاة .

### ٢٨٣٦٩ - ناطيل

الناطيل نيم نير من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشبلي .



ناصية الخوخ

Eprouvette graduée (F). **ناطيل** ٢٨٣٧٠ -  
عشار مدرج تكال به السوائل .  
Test-tube (E).

Aiguardier (F). **ناطيل الماء** ٢٨٣٧١ -  
Freshwater guardian (E).  
هو الشاوي الذي يحافظ على مياه الري ويوزعها على مستحقها بالقد .



ناصية الدراق السوداء

Tarbophis **ناطيل** ، **ناطيل** ٢٨٣٧٢ -  
جنس حيات سامة من فصيلة الحفشيات . انواعه عديدة . اعطائها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . شكلها كالحفث ، مستطيلة الجسم ، دقيقة الفتق ، سريعة الحركة . انطواها الى السمرة الغبراء المروية .

### ٢٨٣٧٣ - ناطيل مكار ، رقيب خداع

Tarbophis fallax (S). **ناطيل مكار ، رقيب خداع** ٢٨٣٧٣ -  
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F).  
حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحفشيات خفليات الاغادي || جسمها متدل الخانة يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى السمرة الخنطية الموجع يطولها يتبعج ثلاثي الالوان لاقباس الزاويق ، يكثر فيه الرمادي والجويرو والاصفر ، يمتد من الرأس الى الذنب . رأسها بيضي الشوزن . عنقها متوسطة الطول . عينها كيرتان . عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عناق عذدة ، ثابتة ، خلفية الارنكاز تبح السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى مستواها الداخلي || تألف البراري والاطلال . قوتها كل ما دب وطار . تنقض على فريستها انقضاض السنور على الفارة || تسرح في النهار وفي اوائل الليل . بيئاتها الشوي يستمر نحو خمسة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبحتين تطيرهما في الرمل || تعتبر من التعابين المؤذية .



ناصية الورد

Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E). **ناطيل** ٢٨٣٧٤ -  
هو الميزان ، قطعة من خشب او من حديد مركبها مقدمة آلة الحرت او العربة ، تعلق بها السيور الجير .

Culcivore (F). Culcivorous (E). **ناطيل** ٢٨٣٧٥ -  
الناعر من الطير والحيوان من كان قوته النعر وما اشبه .

Aphrodisiaque (F). **ناطيل** ٢٨٣٧٦ -  
Aphrodisiac (E).

### ٢٨٣٧٧ - ناعقان

الناعقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل .

٢٨٣٧٨ - **ناصية** هي القوسية ، اطباء .

Bupreste (F). Buprestis (E). **ناصية** ٢٨٣٧٧ -  
هي الزقنيت ، اطباء .

Bupreste du chêne (F). **ناصية البست** ٢٨٣٥٨ -  
اطلب زقنيت السديان .

٢٨٣٥٩ - **ناصية الخوخ** ، **زقنيت الخوخ** ٥  
Ptosima undecimmaculata (S). Bupreste du prunier (F).  
حشرة من الناصعات . طولها نحو ١٠ مم . لوها الى السواد الاسفع ، نمداها رباعية الخطوط المنعرجة النارية اللون . رقتها شديدة الاذى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اعصها الخوخ والشمش .

٢٨٣٦٠ - **ناصية الدراقين السوداء** ، **زقنيت الدراقين** ٥  
Capnodis tenebrionis (S). Bupreste noir du pêcher (F). Pesch capnodis (E). Capnodis tenebrionis (D).  
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٨ مم . لوها الى السواد الفضي تعلو ماجة غبراء . رقتها تسردب سوق الموزيات اعصها الدراق قطعها وتوقع بها اشد الاذى .

Bupreste des pins (F). **ناصية الصنوبر** ٢٨٣٦١ -  
اطلب زقنيت الصنوبر .

٢٨٣٦٢ - **ناصية الورد** ، **زقنيت الورد** ٥  
Coraeus rubi (S). Bupreste du rosier (F).  
حشرة من الناصعات ، طولها نحو ١٠ مم . لوها الى السواد الازرق الموجع . نمداها مجعدتان بخطوط غبراء معترضة . رقتها تنخر سوق الورد واغصانه .

Bupreste vert (F). **ناصية خضراء** ٢٨٣٦٣ -  
اطلب زقنيت اخضر .

Spondylocladium (S). **ناصيرة** ٢٨٣٦٤ -  
جنس فطور مجهرية من الريديات وفصيلة الطحيات . جربه الكيندية خنطية ، ضمية التجميع . كئائده هلبية الشكل ، مستندقة الاطراف ، ومنها حلزونية . || انواعه قليلة اعرفها ناصورة البطاطا .

٢٨٣٦٥ - **ناصيرة البطاطا** ، **جرب فضي** ٥  
Spondylocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F).  
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الاخير ، قرب ادراك الدرن . || مظهره الخارجي بقع مستديرة ، غبراء اللون ، فضية الموجع ، تتخللها بنور ثولوية صغيرة مضبوغة الغلاف الاسود الشق ، تركيب الدرة فتعطب البشرة مع قليل من الياق || يكافح بتطهير البذار قبل الزرع وذلك بتقع الشعف مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٥ ٪ .

Toupet (F). Foretop (E). **ناصية** ٢٨٣٦٦ -  
غصلة الشمر المتدلية على جبهة الفرس .

Trop mûr (F). Overmature (E). **ناصج** ٢٨٣٦٧ -  
نعت تعريفي توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجتيازها دور الانعاج ودخولها في دور النضج .



ناطيل

Vertex

٢٨٣٩١ - نَاقُور

النَاقُور هو قِوَّة الرَأس في تَشرِيح الحِشرات .

Chamelle (F). She-camel (E).

٢٨٣٩٢ - نَاقَة

النَاقَة هي الأُنثى من الأيمل . ج . نوق . كُنْهَبا ام بِنِ وام حائِل وام حِوَار وام السَق وام مسمود || مَحْجَلا يَسْتَقِيم سَنَة واملاج حِوَارها يَسْتَمِر سَنَة .

Dugong (F).

٢٨٣٩٣ - نَاقَة البَحر

هي الأَطوم ، راجع .

Acidiphile (F).

٢٨٣٩٤ - نَاقِس

نعت تَعرِيفي تَوصَف به النَباتات الّتي تَربُغ في الأَرتَبَة الحَمَضِيَّة الّتي يَراوَح دالِها من ٦,٥ إلى ٥,٥ .

Afférent (F).

٢٨٣٩٥ - نَاقِل ، مُرْسِل

Afferent (E).

Contage (F).

٢٨٣٩٦ - نَاقِلَة العَدَوِي

مادَة تنقل مِيكْرُوب الوَسم المَعدِي .

Conductibilité (F).

٢٨٣٩٧ - نَاقِلِيَّة

هي الأَيصَالِيَّة ، اطلها .

Pic (F).

٢٨٣٩٨ - نَاقُوبَة

هي النَغار ، اطلها .

Regressif (F).

٢٨٣٩٩ - نَاكِص

النَاكِص من أَرَدَل إلى ما كانَ عَليه . راجع اشم .

٢٨٤٠٠ - نَاقِيس الكُتُب \* ، قُمَل الكُتُب

Atropis

حِشرَة من فَصِيلَة النَاسِيَّات ، طُولها نحو ٢ م . نَواها إلى النَيرة . اصْطَاحاها العالَم . قَوتُها المَواد السَيلُولُوزِيَّة ، تَقرُض أَوراق الكُتُب فَتَعضُها .

Atropidae (S).

٢٨٤٠١ - نَاقِسيَّات

Atropidés (F). Atropidae (E).

فَصيلَة حِشرات من رَتبة القَهْلِيَّات ، أنواعتُها عَديدة ، جَمِيعُها صَغيرة القَد ، طَول أجسامِها يَراوح من ١ إلى ٣ م . أنواعتُها إلى الصَغيرة النَبراء . قَوتُها المَواد العَضُويَّة والنَشُويَّة . نَوع مَها يَعض نَاس الكُتُب يَعضُ أَوراق الكُتُب والْقَاطِيعُ فيَخرُها وَيَعضُها .

Formicivore (F).

٢٨٤٠٢ - نَاقِل

Formicivorous (E).

نعت تَعرِيفي يَطلق على كُل حَيوان أو طائر قَوتُه النَمَل .

Myrmecophagidae (S).

٢٨٤٠٣ - نَاقِلات

Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E). فَصيلَة حَيوانات من رَتبة الدَرد الحِاشِرات . قَوتُها النَمَل . راجع أَكَلات النَمَل .

Culcinés (F).

٢٨٤٠٤ - نَاقِيس

هو البَومُض ، اطلها .

Formicide

٢٨٤٠٥ - نَاقِيس

نعت تَعرِيفي يَطلق على جَمِيع الأَدويَّة المَوضُوعَة للقَضاء على النَمَل .

Roue hydraulique (F). نَاعُورَة . نَاعُورَة . Water-wheel (E).

دولاب مائي مَركب من قَوادِيس تَحرُكَة سَرعَة جَري المَاء فيَخرُج ما غَرقَه القَوادِيس في جَدول يَأخُذ المَاء إلى حَيت الحَاجَة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُور هَوَائي ، نَاعُورَة هَوَائيَّة

Eolienne (F). Aeolian (E).

آلة لَرفَع المَاء تَحرُكُها الرِيح . وتَدعى أيضًا دُولاب هَوا .

Galliardie (F).

٢٨٣٨١ - نَاعُورَة

هي الفَيرَديا ، اطلها .

Noria (F).

٢٨٣٨٢ - نَاعُورَة ، سَانيَّة

Noria, Chain-pump (E).

آلة رَافِعة للمَاء تَدرُج بِوسِطَة الدُولاب أو المَحرَكات .

Nagana

٢٨٣٨٣ - نَاعَانيَّة

وَصم يَصيب الحَيوانات الدَاجِنة سَببُه مَشبِيَّة تَقلُّها الشَّاةُ اللَاسِمة .

Naja indien (F).

٢٨٣٨٤ - نَاعَيران

Indian cobra (E).

هو الصَلل المَهندي وَيَدعى أيضًا أَمَني هَندِيَّة ونَاشِر هَندِي .

Vessie du musc (F).

٢٨٣٨٥ - نَافِجَة

Musk-bladder (E).

جِراب المَسلِك في الحَيوانات الّتي تَفرُز هَذه المادَة .

٢٨٣٨٦ - نَافِجَة البَقر \* ، أَغرِيل الوَزَال

Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste vert (F).

حِشرَة من النَاصِعات ، طَولها نحو ٨ م . لَونها إلى الخَضرِ الاصْفر المَواج . تَعيش على رَعيق أَزهار الفَصيلَة القَرنِيَّة . تَمتَص مَكنَها على جَذوع الوَزَال فيَنقُص عن رِقات غَاضِلَة تَقتَضي على القَضيان والأَفنان . || أما تَسمِيتها بِنَافِجَة البَقر فَذلك لِأنَّها عَندما تَكثرُ في بَطن البَقر من جَراء ابتِلاعِها مع العُشب ، تَسيب الحِياط وَهو نَفقَة في الخَوش قد تَكون مُؤذِيَّة .

٢٨٣٨٧ - نَاقِل المَفعُول ، تَنتَفِيزِي

Exécutoire (F). Executory (E).

ما كانَ يَحْمِل الصَيفة التَنتَفِيزِيَّة من أَحكام أو أوامِر أو عَقد .

Caducue, Caducifolié (F).

٢٨٣٨٨ - نَاقِص

Deciduous (E).

اسم حال يَوصَف به النَبات الَّذي يَنفِض وَرَقه كُل سَنَة . راجع عابِل .

Vésicants (F). Vesicants (E).

٢٨٣٨٩ - نَاقِطات

فَئة حِشرات من مَعدَّات الأَجِنَّة تَشمَل النَواطِط والذَناوِيع والوَريقات .

Mylabris (S). Mylabre (F).

٢٨٣٩٠ - نَاقِطَة

جَنس حِشرات من النَافِطات المَفسَدة الأَجِنَّة . أنواعتُها زَهاء ٣٠٠ تَعيش في المَناطق الحَارة والمَعتدلة . جَمِيعُها من الحِشرات النَافِطة ، تَمتَص مَكنَها في مَغازِر الجِراد وأَشباهه فيَنقُص عن رِقات هَمة تَلَهم السَوء .



نَافِجَة البَقر



نَاس الكُتُب



٢٨١١٢ - نَبَاتٌ ، نَبَاتٌ (Végétal (F). Plant (E).  
كلمة شاملة تعني العشب والنباتية والشجرة . الواحدة نبتة  
والجمع نباتات وأنبث || والنبات هو إحدى المملكتين  
اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .  
ويقسم النبات الى وسيدات الحلية وهي كائنات دنيا  
ترتكز على خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .  
ولل ولى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من جذور  
وسوق وأوراق خضر وأزهار وثمار وبذور .

٢٨١١٣ - نَبَاتُ الْفَلْحِ (Plante salicole (F).  
Salt-producing plant (E).

كل نبات يعيش في الأرض المالحة .

٢٨١١٤ - نَبَاتُ النَّارِ (Plante agreste (F).  
Uncultivated plant (E).

هو القرامس الكاري ، اطلبه .

٢٨١١٥ - نَبَاتٌ بَرِّيٌّ (Plante agreste (F).  
Uncultivated plant (E).

كل نبات تنبته الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٢٨١١٦ - نَبَاتٌ جَبَلِيٌّ ، نَبَاتٌ جَبَلِيٌّ (Plante alpestre (F).  
Alpine plant (E).

كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٢٨١١٧ - نَبَاتٌ رُحَاقِيٌّ ، نَبَاتٌ رُحَاقِيٌّ (Plante mellifère,  
P. nectarifère (F). Melliferous plant (E).

النبات الرحاقي كل نبات يفرز الرحيق من ازهاره او  
ينضج المغفر من مسام اوراقه فيجبرسه النحل ويعمله الى  
عسل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدول التالي .

٢٨٤٠٦ - قَامِيَّة (Drageon, Jet (F).

Sucker, Shoot (E).  
شُطْ او قصب في ريان نشأ على جمع او جذر النبات .

٢٨٤٠٧ - نَاهٍ (Végéter (F). To vegetate (E).

ناه النبات نما وارتفع .

٢٨٤٠٨ - نَاهِر (Raisin blanc (F). White grapes (E).

نمت تمرني يطلق على كل عنب ابيض من اي ضرب  
كان .

٢٨٤٠٩ - نَاهِض (Sommet de l'omoplate (F).

Extremity of shoulder-blade (E).  
رأس المنكب في الحيوان وهما ناهضان . ج نواهض .

٢٨٤١٠ - نَاهِمٍ (Polyphage (F). Polyphagous (E).

نمت توصف به كل حشرة أكلة تقتني بمواد شديدة  
الاختلاف .

٢٨٤١١ - نَاهُورٍ (Ovibus nahoor (S).

Mouflon bharal (F). Bharal (E).  
نوع من الاراري موطنه جبال التبت وهضابها . يألف  
المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجنة ،  
كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .  
ثوبه الى الريدة الشهداء يميح عند ثيبح الظهر ويبيض عند  
البطن . اجله براوح من ٧ الى ١٠ انفار يقودها نيزب  
مانع .

### جدول النباتات الرحاقية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْبَرِس ، عُوْدُ الرَنْج	Barberry, Pipperidge	Berberis, Epine vinette
إِبْجَاص ، كُمْتَرِي	Pear tree	Poirier
أَخْذَرِيَّة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَحْيُون	Viper's bugloss	Vipérine
أَذْرِيُونُ الْعَاء ، مُرْعُوْس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرَلِيَّة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرَسِيْمُون	Burdock	Bardane
أَرَسِيْمُون	Erysimum	Erysimum, Vêlar
أَسْطَر ، نَجْمِيَّة	Starwort	Aster
أَقَاقِي ، دُنْدُرَان	Tufted vetch	Vesce craque
أَيْبَغْطَس	Epipactis	Epipactis, Héléborine
أَكُونِيْت ، يَشْر ، أَثَلَه	Aconite	Aconit
أَكُونِيْت ، مُسَمَّكَةٌ بَنَاقِيَّة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibaciar
أَكِيلَاجِيَا ، كُولْمَبِيْن	Columbine	Ancolie, Colombine
إِبْرُوس ، كُرُونَلَا	Coronilla	Coronille
أَنْشُورَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيَّة ، يَنْقَة	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بُؤْلَا ، سُنْدُر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْيَلَا ، بَرْيَلَة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بَسَلَة بَرْيَة	Wild pea	Pois sauvage
بَصَل	Onion	Oignon
بَقْلَاط ، جَنْجَر ، شَيْطَ العُول	Knot-grass	Renouée des oiseaux
بَطِيخ ، جَنْبَس	Water-melon	Pastèque
بَقْس ، شَمْشَاد	Box tree	Buis
بُنْدُق ، جَلُور	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُورْقِيصَا ، دُودَار ، عَرْمَاء	Elm-tree	Orme
بُرْمُس	Lupine	Lupin
بُرْنَجَان ، حَشِيشَة النَحْل	Bee-balm	Mélisse
بُرْنَسَاه ، بُرْنَسَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubifoin
بُقَاح	Apple-tree	Pommier
بُتُوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
جَرْجِير ، رُكَّة ، بُهَان	Rocket	Roquette
جَرْجِير بُرِّي ، بُهَان	Wild rocket	Roquette sauvage
جَلِيَان	Vetch	Gesse
جُنْجُل ، حَشِيشَة الدِيَنَار	Hop, Bine	Houblon
جُولِيَانَا	Gilliflower	Julienne
جِيرَانِيُوم ، عُرْفُوق	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Gêranier
حَرْفُ العَام	Buck's horn	Sénébière
حَشِيشَة الرِّقَّة	Lung-wort	Pulmonaire
حَشِيشَة السَّعَال ، دُوسَة الجِمَار ، قُرْقَارَة	Cough-wort	Tussilage
حَشِيشَة المَلَاك	Angelica	Angélique
حَصَا البَان ، اِكْلِيلُ الجَبَل ، نَدَى البَحْر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
حَضَض ، عُرْفُد ، اُطَل	Boxthorn	Lyciet
حَلَالَاب	Hare's-ear	Buplèvre
جَنْجَم	Borage	Bourrache
جَنْبَس	Chick-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
حَنْبَل ، قَاصُولِيَاء	Kidney-bean	Haricot
حَنْدُوق	Sweet-clover	Mélilot
حَوْد (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
حَمِي العَام ، حَيُون ، وَدَنَة	Orpine, Stonecrop.	Orpin, Sedum
حَبَّازِي ، حَبَّازَة	Mallow	Mauve
حَرْبِق	Hellebore	Hellébore, Ellébore
حَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sénévé
حَرَام	Reseda	Réséda
حَرَامِي ، لَافَنْدَة	Lavander	Lavande
حَلْتَج ، شَنْطَلَف	Heath, Heather	Bruyère
حَلُود ، عَمِير	Jupiter's beard	Joubarbe
حَنَّا زَيْرَة	Figwort	Scrofulaire
حَوْج	Prune tree, Plum tree	Prunier
حَبَّار ، قَد	Cucumber	Concombre
حَبَّيْرِي ، مَتُور	Stock, Gilliflower	Giroflée
دَبَاب ، نَعْنَع الحَقْل	Pudding grass	Pouliot
قَبِيع	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دُمُرَج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دُرَّاقِي، دُرَّاق، بُرْمِك	Peach tree	Pêcher
دَقَّة حُود الغار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné lauréele
دِيحْنَال، زَهْر الكَثَائِينَ، مُعَيْجَة	Finger flower	Digitale, Gautelet
رَاسٌ دَبْن، طَبَاق، طَبُون	Rock flea-bane	Inule conyze
رَبْدَان، رَجُل الضَّفُور	Bird's-foot	Ornithope
رَعْرَاع	Common flea-bane	Pulicaire
رَبْعِي الحَمَام	Vervain	Verveine
رُوبِيَّة شَيْبَة، سُنَط كَاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زَبَاد، زَبَاوِي، سَحَاء	Starwort	Pallénis, Petit mugue
زَفِيرِن	Alaternus	Alaterne
زَوْفًا، جِسْمِي، حَسَل	Common Hyssop	Husope officinale
زُرْفُون	Linden	Tilleul
بَيْت الحُسْن، بِلَادُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سَرْتَه . (لِسَان الضَّفُور)	Hony wort	Cêrinthe, Mélinet
سُرُو	Cypress tree	Cyprès
سَطَّاقِس، سَطَّاقِس	Stachys	Epiaire
سَمَرْجَل	Quince tree	Cognassier
سَمَقْدَر لَاصِع	Knee holly	Fragon piquant
سَلْسَقِيل	Salsify	Salsifis
سَمَارَة، تَوْدَرِيح، فِجُل الجَمَال	Hedge mustard	Sisymbre
سَمِيم	Common ling	Callune vulgaire
سِينْدِيَان	Oak tree	Chêne
سُنَط	Acacia	Acacia
سِنْسَارُون	Skirret	Chervis
سَمِيم	Snapdragon	Muffier
سَيْت، سَيْت	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
شَكَاغِي، أَفْسُون	Scotch thistle	Onoporde
شَمَار . شَمَرَة . شُونَار	Fennel	Fenouil
شَمَام	Melon	Melon
شِنْدَاب	Eryngo	Panicaut, Erynge
شُوك، شَهِيَاء	Thistle	Chardon
شُوك الجَمَال	Globe thistle	Cardère
شُونِير، شِينِير	Black cumin	Nigelle
ضَرِيْمَة الجَدِي	Caprifoly	Chèvrefeuille
صَفَر، صَفَر (جميع الانواع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
صَفَصَاف، سَوَحَر	Willow	Saule
صَفِيرَاء	Sophora	Sophora
صَفْلَاب	Silk cotton	Asclépiade
صَوْنِير	Pine-tree	Pin
صَمْعَة	Echinops	Echinopse
صَمِيرَان، نَعْنَع اللاء	Water mint	Menthe aquatique
طَرَبَقُون، هِنْدَب	Blow-ball	Pissenlit officinal
طَوَقَرِيُون	Germander	Germandrée
طَبْطَان، كَرْمَات البَر	Crow garlic	Porette

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَبَخْ ، بُوَيْشِيَّةُ الدِّينِ	Holly, Christmas	Houx commun
طَقْرَاءُ ، نَمْنَعُ بَرِّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَالِقُ	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوِقُ	Spiraea	Spirée
عَرْنُ ، سَفُونُ ، سَلَّةُ زُرَاعِيَّةِ	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّةُ ، زَعْفَرَةُ الْعَسَلِ	Honey flower	Mélianthe
عَشَقَّةُ	Ivy	Lierre
عَصَا الرَّاعِي ، قُرْدَبُ	Persicaria	Persicaire
عِثَازُ	Lily grass	Butome
عَوَسَجُ	Bramble	Ronce
غَبِيرَاءُ ، صَرَبَةٌ	Service tree	Sorbier
غَعَثُ	Eupatorium	Eupatoire
فَاشِرَا ، فَاشِيرُ ، فَسُ	Bryony	Bryone
فَرَاثِيُونُ ، بَادَاوَرْدُ	Horehound	Marrube
فَرُوبِيُونُ ، يَتَوَعُ ، عُنْجَدُ	Spurge	Euphorbe
فَيْصَةُ ، فَيْصِيصَةٌ ، قَضْبُ	Lucern	Luzerne
فَيْصِيَّةُ مَنِيْرِيَّةُ	Silver tree	Protée mellifère
فُودَسَجُ	Wild marjoram	Fausse marjolaine
فُولُ ، بَابِلْجِي ، جُمِي	Broad bean	Fève
فِينُومَةُ ، فُونُومَا	Rampion	Raiponce
فِيرُونِيكَا	Veronica	Veronique
قَتَا ، فَيْصَةُ بَرِّيَّةِ	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قَرَطْلَمُ ، إِخْرِيشُ ، بَهْرَمُ ، مَرِيْقُ	Safflower	Carthame
قَرَعُ	Gourd	Courge
قَرَاوُسُ ، قَرَانِيَا	Cornel-tree	Cornouiller
قَشْوَانُ	Horse-thistle	Cirse
قَضْبُ الدَّهَبِ ، عَصَا الدَّهَبِ	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَّاحُ	Self-heal	Brunelle
قَطِيطُ ، قَرْنِيطُ	Cauliflower	Chou-fleur
قَنْدَلُ	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قَطْرِيُونُ ، قَطَارِيُونُ	Centaury	Centaurée
قَنْفُولُ	Canavalia	Canavale
قُوَيْسَةُ ، قُوَيْصَةُ ، نَاعِيَّةُ	Sage	Sauge
قَيْبُ ، أَسْفَلْدَانُ	Maple-tree	Erable
كَأَوَشِيرُ ، جَرْدُ بَرِّي	Opopanax	Opopanax
كَرَاتُ مَعْرُوفُ	Leek	Poireau
كَرَرُ	Cherry tree	Cerisier
كَرْسِيَّةُ	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرَلِينُ	Carlina	Carlina
كَرْبُ	Kohl-rabi	Chou-rave
كَكْسِيَّةُ ، قَسَلَّةُ ، شَاةُ بَلُوطُ	Chestnut-tree	Châtaignier
كَشِيشُ	Currant-bush	Groseillier
كُشِّي	Bitter vetch	Orobe
كَلْبَةُ مَدَادَةِ ، لَبْلَابُ الْأَرْضِي	Ground ivy	Gléchoime hédéracé
كَنْسُ	Gypsophila	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كُوسَى	Vegetable marrow	Courgette
كُوسَى	Pibughman's spikenard	Conyze
لَارِيس ، مَرْ	Common larech	Larix
لُرَّان	Broom	Cytise
لِسَانُ الْكَلْبِ ، آذَانُ الْأَرَبِ	Gipsy flower	Cynoglosse
لِفَتْ	Rape	Rave, Navet
لَمَام ، نَعْنَعْ أَخْضَر	Spearmint	Menthe verte
لُوبِيَاء	Black eyed delichos	Dolique
لُوز	Almond tree	Amandier
لُوطُس ، لُوتُس	Lotus	Lotier
لَيْمُون (جميع الأنواع)	Citrus	Citrus
لِيْنَارِيَّة ، حَبَاب	Linaria	Linnaire
مَازَرُون ، أَثْم ، دَقَّة سَاة	Mezereon	Daphné mézérèon
مَحَلْب	Parfumed cherry	Mahaleb
مَرْن ، لِسَانُ الْعُشْفُور	Ash-tree	Frêne
مَرْغَابِيلَا ، رِجْمُ الْإِبِل	Echinops	Echinope
مُشَط الرَّاغِي ، شَوْك الدَّرَاج	Teazle	Cardère à foulon
مُشْمُوش	Apricot tree	Abricotier
مُشْمَلَّة	Medlar tree	Néflier, Merlier
مُشْرِقِيَّة	Melick	Métique
مُطْفُوف ، كُرْتَب ، لَحْتَة	Cabbage	Chou
نَارِيَيْن ، سُبُل	Valerian	Valériane
نَبِي	Alder	Nerprun
نَد ، حَبِيرَاء	Willow-herb	Epilobe
نَدَاف	Savory	Sarriette
نَعْنَع	Mint	Menthe
نَعْنَع الْبَر	Cat-mint	Calament
نَقْل	Clover	Trèfle
هَذَال	Common mistletoe	Gui
هَرَنْبِيَّة	Heracleum, Parsnip	Berce
هَلِيُون	Asparagus	Asperge
هِنْدِيَاء	Endive	Chicorée endive
وَبِيرَة	Phacelia	Phacélie
وَرْدَال ، جُنْدَح ، جُونُك	Furze	Ajone
وَسْمَة الصَّغَاغِيْن	Woad	Guède, Pastel
وَسْمَة حَمْرَاء	Red spur-valerian	Centranthe rouge
يَاسَم ، فُوف ، وَنَاقِيَة	Privet, Privy	Troène, Pruène
يَعْقِيْد ، يَنْصِيْفِص	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
يَعْقِيْقِيْن أَفْرَع ، قَاوُون الْبِير	Squash	Pâtisson

النافعة الصالحة لتطبيب . النباتات الطبية كثيرة العدد ،  
معظمها مشهور وبعضها لا يزال في دور التوصليل  
الاختباري || أشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالي.

Plante médicinale (F).  
Medicinal plant (E).

٢٨٤١٨ - نَبَاتَات طَبِي

النباتات الطبي كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة

## جدول النباتات الطبية

التحليل	النبات
عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها عطرية صفراء اللون	أبست، شبح رومي
عشبة معمرة مفضلة الساق. اوراقها مفصصة. ازهارها قليلة العرف باهنة الصفار	أبست بحري
عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية	أخيليا أم آلف ورقة
عشبة معمرة فرعاء. جذرها عسقلي. ازهارها وردية كبيرة صفراء اللون	أدونييس ربيعي، عين الثور
عشبة حولية فرعاء. اوراقها ريشية خملية النصال. ازهارها صغيرة	أديون عذري
جنية معمرة فرعاء. اوراقها كلية النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كالفلفل	إرث، سرساد
عشبة معمرة، اوراقها كبيرة مفرصة ومشرمة، ازهارها رئيسية طرفية	أرضي شوكي، خرشوف
جنية معمرة متسلقة. اوراقها عروبة سنانية. ازهارها بوقية عطرية صفراء	أرطاة، ياسمين اصفر
عشبة معمرة غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء	أرطاسية جليلة
بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانية. تتميز بجنتها الغليظ	أرقطيون
عشبة معمرة مستغلظة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي	أرنكا جليلة، زهرة العطاس
عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب سهمية كبيرة. ضبتها صفراء المواج	أروم، ترياق ابيض
عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات. ضبتها موشحة	أروم ثلاثي الورق
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها لحمية كلوية الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية	أسارون، ناردين بري
ضمة من الخيوط والحزم الفوقية سمراء اللون زيتية المواج	اشنة عمرية
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها صغيرة بيضاء	اطريفل نخل
جنية معمرة فرعاء غليظة الازمولة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت	أقنى عفوفية
عشبة حولية. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرمة. رؤسائها الزهرية صفراء	أقمون حنين
جنية معمرة فرعاء. اوراقها صغيرة لينة. ازهارها زرقاء اللون	إكليل الجبل، حصا البان
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية	أتاروف، انجار
عشبة معمرة او حولية. اوراقها لينة مستخشنة. ازهارها الى الزرقا البنفسجية	أنشوزة عذرية
عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور عطرية خضراء اللون	أنيسون
شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزية دهنية اللباب	أنيسون نجمي
شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانية جامدة، بحرية الخضار	أوكالبتوس عريض الورق
جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليجية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل ثلاثية البذور	إيبوغا
عشبة معمرة متسلقة فرعاء. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها رئيسية صفراء	بابونج عطر
عشبة حولية صغيرة. اوراقها ثنائية التظليل الريشي. ازهارها رئيسية صفراء	بابونج عطر
جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون	باروسه بولينا
شجرة عديمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعية التفصيص. ثمارها قرعية	بياط زراعي، دباء الهند
شجرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها غبراء. ثمارها جوزية	بتولا بيضاء
جنية معمرة فرعاء. اوراقها يفسية جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها عجمية	بربريس، عود الريح
شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها يفسية مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها خوخية	برقوق شائك
جنية معمرة فرعاء. اوراقها يفسية جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نووية جؤوية	برتن عصلبي
عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شمراخية. ثمارها يزور صغيرة	برقوقه، علة البراغث
عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها يزور صغيرة	بطاطا، شبط الفول
عشبة معمرة. اوراقها سنانية مسنة. ازهارها عطرية حمراء اللون	بطونيقا طيبة
عشبة حولية. اوراقها مركبة. وريقاتها ثلاثية التفصيص. ازهارها خضراء اللون	بقدونس
جنية معمرة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية	بقس، ششاد اخضر
عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنانية مزغبة ومسنة. ازهارها صغيرة ليلكية	بقلة الأوجاع
عشبة جذمورية شمراخية. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها بيضاء. بزورها دقيقة	بقلة الرئيس
جنية معمرة فرعاء. اوراقها كبيرة متموجة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية	بلاذون، ست الحسن
شجرة معجزة الساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحمية مأكولة	بلاذر شرقي

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار	مغلي الأوراق والأزهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحثيات
الأوراق والأزهار	يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبدان. وينشط الهضم
الأوراق والأزهار	مستحباً مقو، منبه، مضاد للتشنج، ويفيد المدة والامعاء
العشبة برتبها	تنظم النبض، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
العشبة برتبها	تقيحها يسكن آلام الحصى. مستحب الأزهار يفيد العنة عند الذكور
الأزهار والثمار	الثمار محمّدة للقوة الجنسية. الأزهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدر البول
الأوراق وصلوعها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء واليرقان واحتقان الكبد ويتر البول
الأرومة والجذور	مخففة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض العصبية. استعمالها خطر لأنها سامة
اليزور والعشبة برتبها	مقوية تقيد الصدر والمعدة. مدرة للحيض
الحش والأوراق الغضة	خارجياً تقيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً منعشة ومقوية للدم
الأزهار والجذر	مضادةً للالتهابات والربو. تشفي جروح الاوعية الدموية
الدرن والأوراق الغضة	عصيرها سهل، ممتد للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة
الدرن والأوراق الغضة	من الداخل تقيد الربو والزلات الزمنية والعلل العصبية. من الخارج مفضة
الجذامير والأوراق	تقيحها اوسحقوها سهل شديد الوقع. وتستعمل كمقيء
النبات برتبها	يستعمل كطارد للدرور خاصة عند الأطفال
الأوراق	مقوية. تقيد المعدة. تدفع الحمى. تدر الطمث
الأرومة	مقوية للمعدة. تقيد الرقص الزنجي والرومايزم المفصل والقرص
العشبة برتبها	مضادةً للتشنج. مطمئة. دافعة للحيمات. طاردة للدرور
الأوراق العليا والأزهار	تقيع الأزهار ناعوظ. تقيع الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تنشط الاعصاب
	والذاكرة
الأوراق والأزهار والجذامير	قايضة نشيطة لا تضر الجهاز الهضمي
العشبة برتبها	معرفة ومنقية للدم. تقيد الأمراض الصدرية والحلقية
اليزور	مغلي اليزور ينشط الهضم ويسكن المعص ويزيل الانتفاخ ويتر البول
الأوراق والثمار	تستعمل استعمال الانيسون
الأوراق	مغلياً منعش، مقو، مضاد للحمى ويفيد العلل الرئوية والمسالك البولية
الأوراق والأزهار والثمار	مقوية للقلب، منعطة، مشهية
العشبة برتبها	تقيد المعدة وتطرد الغازات وتقوي الاعصاب. مضادةً للتشنج
الأزهار	مضادةً للتشنج. تدفع الحمى والريح. تقوي الاعصاب
الأوراق	مقوية. ناهضة، هاضمة. مدرة للبول
الثمار	عصارة الثمار قبل الادراك تخفف من سرعة خفقان القلب وتقيد الهضم والمعدة
الأوراق	اوراقها من الخارج تقيد الرومايزم المعصلي والمفصلي والقرص. عصيرها يفيد الكل والكبد
الأوراق والثمار واللحاء	تقيد المعدة وامراض الرئة واليرقان
الأزهار والثمار	مستحب الأزهار يفيد التهاب المثانة وصعوبة التبول. عصير الثمار يفيد الرعاف وقروح الفم
الثمار	مستحب الثمار طاردة للدرور لاسيما الدودة الوحيدة
الأوراق والشجاريخ واليزور	مغليها يقضي على الامساك
العشبة برتبها	مغليها يقطع الاسهال ويفيد الهضم والجهاز البولي. التليخ باوراقها المهروسة يفيد القروح
الأوراق	دافعة للحمى وتقيد ضعف الاعصاب والطحال والكبد
اليزور والجذور والأوراق	تقيع اليزور يقي الدم ويتر البول. الجذور منبهة. والأوراق منهضة
الأوراق واللحاء والجذور	مقوة. دافعة للحمى. تقيد العلل العصبية
الجذامير والأوراق	مقوية للقلب والمعدة. مضادةً للتشنج. ضاد اوراقها يزيل الاوجاع
الجذامير	منبهة، منشطة، هاضمة وتقيد الربو
الأوراق والأزهار والجذور	مضادةً للتشنج والافرازات. تحمّد حدة العين - مسحوق او صبغة
الثمار القويّة	تستأصل العنول والقويّة استعمالاً خارجياً

النبات	التحليل
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فراء. اوراقها بيضيه ابيدة جامدة. ثمارها كالبزورسركية مأكولة
بلسم مكنه	جنية معمرة فراء. اوراقها مركبة وثريه. ورقانها صميكة. ازهارها غبراء اللون
بن	شجيرة فراء. اوراقها متقابلة ابيدة. ازهارها بيضاء عطرية. ثمارها نويته ثنائية الحب
بنج اسود	بجلة حولية. اوراقها مقرضة كريمة الرائحة. ازهارها كبيرة. يزورها مقلطحة
بندق هندي	جنية معمرة داسية. اوراقها مركبة شفعية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية
بنفسج عطر	عشبة رملية معمرة. اوراقها قرصية الانتشابه معتقة. ازهارها بنفسجية عطرية
بشيه الدبق ، عود الخير	شجرة فراء. اوراقها جامدة ابيدة مسننة شاذكة. ازهارها صغيرة. ثمارها عتيبة
بشيه الشاي	شجرة كبيرة فراء. اوراقها بيضيه. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بوسير ابيض	عشبة ليغية حولية. اوراقها بيضيه خملية البشرة. ازهارها عطرية صفراء اللون
بولوغالي مر ، حشيشة اللبن المرة	عشبة حزمية معمرة. اوراقها صغيرة رحيمة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون
بيش ، أكويت هرمي	عشبة معمرة. اوراقها ريشية شديدة الخضار. ازهارها الى الزرق العاقبة
بيلسان اسود	شجيرة معمرة فراء. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة صفراء اللون
تاغست ، ملكة الحشايش	عشبة جلمونية معمرة. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة كبيرة بيضاء اللون
ترنجان	بجلة معمرة. اوراقها بيضيه بارزة العروق. ازهارها بيضاء فواحة العبير
ترنشا	عشبة حولية. اوراقها ضيعة النصال لانظامية. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون
توت اسود ، توت شامي	شجرة دالحة. اوراقها قليية خشنة عابله. ثمارها حسله جؤوية للبيدة الطعم
ثلثان حلومر	جنية معمرة متسلقة. اوراقها معتقة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجية المواج
ثوملا أكلة	عشبة حولية فراء. اوراقها قليية بحرية اللون. رؤسائها وردية
جرجير حقلي	عشبة حولية فراء. اوراقها شديدة التفرغض. ازهارها وردية. ثمارها يزور بحيلة
جرومة ترسية	شجرة دماغه جولاه الساق. اوراقها ترسية مفصصة. ازهارها هامة صفراء
جزر الرعاة ، دوقس	عشبة معمرة جنيية الجذر. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها صغيرة غبراء اللون
جكرته بروسيرو	شجرة فراء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحمية مأكولة
جلاب	عشبة عسقلية متسلقة معمرة. اوراقها قليية. ازهارها كبيرة قرمزية.
جملج صني	عشبة حولية مزغية فراء. اوراقها سنائية مسننة. ازهارها بيضاء مستحبة العرف
جنجل شائع	عشبة معمرة عارشة. اوراقها مفصصة. ازهارها وحيدة للسكن
جنس	جنية فراء مستغلطة الجذور. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها وردية اللون
جوز عادي	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها مركبة وثريه. ازهارها قذية. ثمارها مأكولة اللباب
جينكو	شجرة ضخمة دالحة. اوراقها مروحية مشقوفة. ثمارها لوزية لحمية السوذي جحالية
حب المسك	عشبة حولية زياء. اوراقها خاسية اوسباعية الفصوص. ازهارها كبريتية اللون. يزورها بلسية
حب معروف	عشبة حولية فراء. اوراقها لسنة مندية. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية
حمرل	بجلة معمرة مدادة. اوراقها مقرضة ريشية التشرم. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة
حشيشة الحفر	عشبة معمرة فراء. اوراقها مستطيلة مقرضة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة سمراء
حشيشة الحطاف	عشبة معمرة درنية الجذور. اوراقها قرصية مزرقية. ازهارها صفراء
حشيشة الالة المخزنية	عشبة معمرة لحمية زياء. اوراقها رحيمة مزغية. ازهارها وردية لم بنفسجية
حشيشة الزواج	عشبة معمرة فراء. اوراقها لسنة زياء. ازهارها خضراء اللون
حشيشة السعال ، فرفارة	عشبة جلمونية معمرة. اوراقها قليية مزغية. ازهارها صفراء اللون
حشيشة القزاز	عشبة حولية فراء زياء. اوراقها بيضيه مزغية. ازهارها بيضاء اللون
حشيشة اللامق	عشبة حولية صغيرة. اوراقها ملحمية الشكل درما النصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشبة معمرة فراء. اوراقها مركبة وثريه. ازهارها بيضاء اللون. يزورها بمحمة
حشيشة مباركة	عشبة جلمونية معمرة. اوراقها القرصية ريشية اما العليا مفصصة. ازهارها برتقالية اللون
حبله روميه	عشبة حولية. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية
حلبوب حولي	عتبة حولية صغيرة. اوراقها سنائية. ازهارها خضراء اللون
حمحم عرني	عشبة حولية زياء. اوراقها سنائية خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حميض الحقل	عشبة معمرة فراء. اوراقها سنائية مستطيلة داكنة الخضار
حميض زراعي	عشبة معمرة فراء. اوراقها رحيمة قائمة الخضار. ازهارها خضراء اللون



الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق	تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة
صمغ يستخرج بالحز من الساق	يسكن السعال، يقوي المعدة
الحب	مسحوق الحب المحمص ومغليه ينضج الاعصاب
الأوراق والبيزور	مسحوقها او صيتها منومة، مضادة للتشنج، تنيد للمغص الكلوي، تمدد حدة العين
الأوراق والبيزور	مغليها مقو، مضاد لنوبات الحمى المتقطعة
الازهار والأوراق والرواكب	تقبح الازهار الجافة لعاني وينفع الصدر والسعال. الأوراق والرواكب مقوية
الأوراق	تقبح الأوراق او مغليها يفيد الرشح المستعصي
الأوراق	مغلي الأوراق الجافة منضج وعاضم
الازهار	مستحلب الازهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة. صيتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والأوراق والازهار	مغليها ينشط دَر اللبن عند المرضع. مضادة للسعال. تنيد المغص
الأوراق والازهار والجذور	الصبيغة والمستحلب المؤثر مسكن نشيط. يدر البول، مضاد للاحتقان
الأوراق واللحاء	مغليها يفيد التلات الصدرية والتهاب اللوزتين والصداع
الجذور	مسحوقها منضج، معرق، يساعد المغص، يدفع الريح ويدر البول
الأوراق	مغليها منبه، يفيد الآلام العصبية والصداع
الازهار	تقبحها يقوي العيون ويقضي على اليرقان
ثمار	عصيرها قابض. يفيد المعدة والأمعاء
الفروع المحولة	مسحوقها الجاف يفيد الامراض الرئوية والعصبية والقرص
الأوراق	عصيرها ينشط افراز اللعاب ويفيد اللثة وفساد الدم
الأوراق والبيزور	عصير الأوراق منضج ومضاد للحفر. مسحوق البذور نافع وينشط الباه
الأوراق والجذور	مغليها يفيد الربو والاستسقاء وامراض الكبد
الجذور والبيزور	مغليها منضج نشيط. يفيد السحريا، يدر البول
الأوراق واللحاء	اوراقها تنيد الأمراض الجلدية. اللحاء معرق ومدرة للبول
العسافل	مسحوق العسافل مسهل فعال
العشبة برستها	مغليها يفيد التشنج الربوي ويفيد الربو والتهاب الحنجرة
للمخاريط الاثوية	مغليها يسكن الاعصاب والاعماظ. مضاد للحفر والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منضج نشيط او شاي حسب الاستعمال. لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الأوراق وقرقة ثمار الخضراء	مغلي الأوراق يفيد الآفات الجلدية. صبة قرقة ثمار منهضة
البيزور	طاردة للدود
البيزور	مستحلبها مضاد للتشنج
الأوراق والازهار	مغليها مقو، منبه، هاضم، يزيل الصداع، مضاد للتشنج
البيزور	مسحوقها ومغليها يدر الطمث ويغضض. استعمالها عطر يوجب الحذر
الأوراق والازهار	مغليها دواء للحفر ومضاد للسعال. تقبحها يفيد البحة والتهاب الحنجرة
العشبة برستها مع الجذور	تستعمل في معالجة البواسير ممزوجة ببعض المساحق او المرهم
الساق والأوراق	مغليها يفيد الصدر والالتهابات الشعبية والرئوية
العشبة برستها	مغليها ملين ويدر البول
الأوراق والازهار	مستحلبها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة
العشبة العفصة برستها	مستحلبها يفيد ضعف القلب ويقضي على التلات الصدرية الخفيفة
العشبة برستها	شرايبها او صيتها منشطة، محرقة، مضادة للحفر، مقوية للدم، تدر البول
الجذور	مغليها يفيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع المغص
الجذور	مغلي المسحوق يفيد القلب والدماغ والذاكرة والاعضاء التناسلية
البيزور	مغليها يفيد الالتهابات الرئوية والاسماك والبواسير وينشط السنة
الأوراق	مغليها ملين وسهل
الأوراق والازهار	مغليها معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية وألمعصية
الجذور والأوراق	مغليها مقو، يقي الدم، يفيد الامراض الجلدية
الأوراق	عصاريتها منهضة، تنقي الدم، تقضي على الاسماك

النبات	التعليق
حنطوق حقل	عشبة حاملة فراء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشبة حاملة مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعية
خب الرمال	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها عصبية حشوة البشرة مهدبة الحار
خيارة برية	عشبة ليفية حاملة او محملة. اوراقها مفصصة. ازهارها بنفسجية كبيرة
خيزرة مخزنة	عشبة ليفية معمرة. اوراقها ثلاثية او خماسية القصوص. ازهارها وردية
خلدرة، رجل الذئب	عشبة معمرة. اوراقها خيطية متراكبة. ازهارها غبراء متبلة التجميع
خربق اسود	عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وثرة. ازهارها بوقية بيضاء اللون
خربوق ابيض	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية زباء. ازهارها بيضاء يعلمها موج اخضر
خردل اسود	عشبة حاملة فراء. اوراقها كبيرة زباء. ازهارها صغيرة صفراء. يزورها دقيقة
خرز الصخور	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد المعوية على الصخور الرطبة
خروب هندي	شجرة داحلة. اوراقها مركبة وثرة ايده. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خزامى غزية	عشبة معمرة فراء. اوراقها لسنة خفيفة خيطية. ازهارها زرقاء اللون
خشخاش ابيض	عشبة حاملة خشوشية الساق. اوراقها جذعية مقرضة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء
خشخاش اعلى	عشبة حاملة صغيرة حشفة. اوراقها مقرضة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراء
خلقة	عشبة حاملة فراء. اوراقها مركبة مشرقة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
خلود السطوح	عشبة لحمية معمرة عادية الفروع. اوراقها لحمية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية
خلولجان غزلي	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها بيضاء اللون
دازي رومي	عشبة معمرة. اوراقها الحليبية كثيرة الجيوب المدببة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
دكمون ابيض	عشبة معمرة فراء. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها بيضاء مقلعة بالارجواني
دند اللوك	جنية معمرة. اوراقها اصبغة مقرضة. ازهارها غبراء. يزورها شبيهة بزور الخروع
ديجنال ارجواني	عشبة حاملة ليفية سرحة. اوراقها يصبغة. ازهارها قلبية ارجوانية
ديش مشوك	شجرة صغيرة فراء. اوراقها مركبة وثرة عطرية. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشبة حاملة متصبية. اوراقها عصبية سنائية مستطيلة
ذقة، زين الوادي	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها جملجية بيضاء
راسن طهي	عشبة معمرة فراء. اوراقها قليلة كبيرة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
راوند غزلي	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريوق	جنية معمرة. ساقها شائكة فراء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بنفسجية او بيضاء
رجل القط الشائع	عشبة معمرة جنتية الجذر. اوراقها ملوقة. ازهارها رؤسية
رصاصية اريوية	بجلة فراء. اوراقها ملعقة مسنة. ازهارها بوقية بنفسجية
رعي الحمام المخزلي	عشبة معمرة فراء. اوراقها يصبغة مقرضة الحواشي. ازهارها عطرية وردية اللون
رمان	شجرة معمرة فراء. اوراقها رحيمة. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية
زداع شايين	جنية معمرة فراء. اوراقها جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها حبة. يزورها مستطيلة
زراوند لعباني	عشبة عارشة معمرة. اوراقها كبيرة رحيمة. ازهارها بوقية غبراء اللون
زراوند فطاني	عشبة معمرة فراء. اوراقها قليلة. ازهارها قلبية صفراء. ثمارها كمار
زرنيك فيرجينية	شجيرة داحلة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية
زعرور شائك	شجرة فراء شائكة. اوراقها مفصصة مسنة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
زعران غزلي	نبات دوفصي حولي. اوراقه خيطية ضمية. ازهاره عطرية
زعدة غزيرة	عشبة لحمية معمرة. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حبة
زنجبيل غزلي	عشبة جذمورية عقداة. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات
زوقا	عشبة معمرة فراء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزوفون	شجرة كبيرة. اوراقها معتقة قليلة. ازهارها عطرية تبينة اللون
سزيكوس اينايس	جنية عارشة معمرة. اوراقها يصبغة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية
سداب غزلي	عشبة معمرة فراء. اوراقها مركبة مقرضة. ازهارها فستقية اللون
سرخس ذكر	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجنتها حرشية
سرفل بقلي	عشبة حاملة فراء. اوراقها مركبة شديدة التفريغ. ازهارها بيضاء يزورها صغيرة

الاجزاء الصالحة	النافع والاستعمال
الأوراق العليا والأزهار	مغليا قابض، مضاد للسعال. مرهم العنبة الغضة يحل الورم الجامد
لب الخمار	سهل شديد الروع. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب
الجذمور	مغليه مرقق ويدز البول ويفيد الروماتيزم
الساق والأوراق والأزهار	مغليا مضاد للسعال ويفيد النزلات الصدرية والتهاب اللوزتين
الأزهار والجذمور	مغليا مسكن للسعال والأمراض الصدرية وحرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين
الطلع	مضاد لداء المفاصل والصرع والتفتة. يفيد الاكتزما الرطبة عند الاطفال
الجذور	مغليا سهل عنب، مطعش، طارد للذود
العنبة برنتها	مغليا يفيد التقرس ويسكن الآلام العصبية
البزور	مغليا حريف، نافط، مرقق، ينه الهضم والقلب
النبات برنته	مسحوقه ومغليه مضاد للتقيء، مقه، يفيد الصدر
لباب البزور	تقيحها ومستحلبا ملين يناسب الاطفال
الأوراق والأزهار	مغليا يسكن الأعصاب ويفيد اضطرابات المعدة
عصارة الساق والجراهم	مغليا يخدر الأعصاب او يسكنها
عصارة الساق	مسكنة، مرققة، تفيد السعال الديكي. مؤنة
البزور	مغليا مقو، مضاد لداء المفاصل، يفيد الهضم ويدز البول
عصير الأوراق	يفيد القروح واللسامير والتآليل والتهاب اللثدي
الجذمور	مسحوقه منقطع شاي اذا قمع في الحليب. مغليه يفيد المعدة والمغضم ويطرد الغازات
الأوراق والأزهار	تلم الجروح وتنفي الحروق وتوقف بصر الدم وتفيد الصرع العصبي
الجذور	مغليا مضاد للصرع، مرقق، طارد للذود
الساق والأوراق والبزور	القليل منها مغلي ملين عمود
الأوراق	مغليا يقوي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة
للحاء والأوراق	مسحوقها ومغليا منبه، منفض، يفيد داء المفاصل ووجع الاسنان
شوشة الغرنوس	مغليا يفيد التهابات الكلى والمبولة
الأزهار	مغليا ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويفيد العدة الدرقية
الجذور	مستحلبا مقو، منبه، مرقق. مغليا يشفي الجروح والقروح
الجذمور	الجرعة الصغيرة من التقيع تقوي المعدة وتفيد الهضم. الجرعة الكبيرة سهلة
الأوراق	مغليا مسكن وملين
الأزهار	مغليا مضاد للسعال وملين
الجذور	مسحوقها ومغليا انتيبيرتيك. يفيد وجع الاسنان والجرب والقروح
الأوراق والأزهار	مستحلبا يفيد الرنم والضمف واحتقان الكبد. مغليا يفيد التهاب اللوزتين
الأزهار ولحاء الجذور	مغليا طارد للذود. استعمالها حذر
الأوراق والأزهار	القليل مقو الكبير سهل. تستعمل مغلية
الجذور	مسحوقها ومستحلبا وتقيحها مقو، منفض، مرقق. وتفيد الربو
الجذور	مسحوقها مطعش. تقيحها ومغليا مقية ويفيد القروح والدمامل
لحاء الجذور والساق	مغليا يفيد المرارة ويدز الصفراء والبول
الأزهار والثمار ولحاء الساق	مستحلب الأزهار وصيتها مسكنة للقلب وبحقفة لضغط الدم
الأزهار والبصلة	مغليا يفيد المعدة، مطعش ومنبه نشيط
الأزهار والجذمور	مغليا مضاد للسعال والتشنج. يفيد الآلام العصبية
الجذمور	مسحوقها ومغليا محرص، منقطع، مقو، هاضم، طارد للغازات
الأوراق والأزهار	مغليا منش، يفيد الصدر، يقطع السعال
الأزهار	مستحلبا يفيد الزكام الحفص والنزلات الشبيهة والسعال
الثمار والبزور	القليل القليل من مسحوقها منشط ناهض. استعمالها خطر لأنها سامة
الأوراق	تقيحها ومغليا نافط، خافض للحرارة. مضاد للتشنج، يدز الطمث
العنبة برنتها	مغليا يفيد آلام الظهر والعلل العصبية والصداع وينفضي على الدودة الوحيدة
الأوراق	مغليا هاضم، ينقي الدم، يلين المعدة، يدز البول

النبات	التعليق
سرو شائع	شجرة منتصبة رفيعة. أوراقها فلسية عابقة الخضار. ثمارها اكواز كروية
سعر البُر	عشبة معمرة. أوراقها اهليلجية خملية النصال. ازهارها وردية
سفابل	عشبة دوفصية معمرة. أوراقها قرصية الانتشاب عصفية. ازهارها ارجوانية
سفرجل	شجرة عارشة الاغصان. أوراقها خملية النصال. ازهارها وردية. ثمارها كروية صفراء
سفندر لاسع	جنية معمرة فرعاء. أوراقها رداثن جلدية النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عنبية
سكب الغرب	عشبة جذمورية معمرة. أوراقها كلفتية مفصصة. ازهارها وردية
سكع	عشبة عسقلية حصصية معمرة. أوراقها قرصية الانتشاب قلبية. ازهارها زنادية عطرة
سحفرطان مخزني	بجلة معمرة فرعاء. أوراقها سنائية خشنة. ازهارها انبوبية ملونة
سمسم	جنية معمرة. أوراقها صغيرة ابيدة. ازهارها ليلكية اللون
ستا سوري	جنية معمرة. أوراقها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة
ستا مكجي	جنية معمرة. أوراقها مركبة شفعية ريشية. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبططة
ستادان مرتد، دور	شجرة كبيرة هرمية الشكل. أوراقها معتقة مفصصة. ثمراتها محبب الحراشف الصغيرة
سورنجان الخريف	عشبة دوفصية معمرة. أوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة. ازهارها ليلكية كبيرة
سوس مخزني	جنية جذمورية معمرة. أوراقها مركبة وثرية. ازهارها زرقاء. يزورها مستديرة مغلطحة
سوسن ابيض	عشبة ارمولية معمرة. أوراقها مستطيلة منجلبة. ازهارها كبيرة فيا الالبيض والازرق والاصفر
سولع مخزني، ألوة	عشبة ارمولية لحمية معمرة. أوراقها لحمية ليفية منتصبة سننة الحنار
شامرنج مخزني	عشبة حولية لحمية فرعاء. أوراقها مركبة مفرصة. ازهارها عقودية وردية
شاوا، كسو	شجرة كبيرة. أوراقها مركبة. ورقها سنائية. ازهارها صفراء اللون
شبت	عشبة حولية منتصبة. أوراقها مركبة خيطية. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة عذدة
شرعطع مقمي	عشبة معمرة. أوراقها مركبة منشرة النصال. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة خضراء
شقيق النعنان اليلدول	عشبة صغيرة معمرة. أوراقها مركبة خيطية. ازهارها كبيرة قرمزية. يزورها كروية
شار حلز	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها مركبة ريشية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
شعرة بحرية	عشبة صغيرة معمرة. أوراقها لحمية مركبة. ازهارها بيضاء ثمارها بيضبة عذدة
شعرناض عارض	عشبة عارشة معمرة. أوراقها معتقة اهليلجية. ازهارها ارجوانية اللون
شجنار مخزني	عشبة مخشوشة معمرة. أوراقها صغيرة ضيقة مزغبة. ازهارها بيضاء. يزورها كروية صلبة
شوكة مباركة	عشبة حولية فرعاء. أوراقها كبيرة مضلمة هليية الزغب. ازهارها صفراء
شوكران	عشبة حولية ليفية الساق. أوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها كروية صغيرة
شولاه	عشبة مخشوشة معمرة. أوراقها ثلاثية التفصيص. ازهارها عطرية صفراء
شيلك	عشبة رطلية معمرة. أوراقها مركبة ثلاثية خشنة. ثمارها شمولية مأكولة
صبار معروف	نبات لحمي معمر. الساق وقروعا الواح كبيرة بيضبة. ازهارها كبيرة نارية اللون
صعتر شائع	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها بيضبة خملية النصال. ازهارها وردية
صفصاف ابيض	شجرة منبسطة الفروع. أوراقها سنائية النصال. ازهارها شريفة صفراء
صنوبر بري، برز	شجرة كبيرة. أوراقها هدية شفعية. اكرازا مردية. يزورها دقيقة بمحثة
طوقيون مخزني	عشبة معمرة ليفية. أوراقها اهليلجية سننة. ازهارها حمراء
ظهرة بأوربة	عشبة لحمية حولية. أوراقها لحمية كبيرة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة سوداء
عافر قرحا	عشبة حولية فرعاء. أوراقها ريشية ثنائية التفليل. ازهارها صفراء. يزورها بمحثة
عائد الشمس السنوي	عشبة حولية. أوراقها معتقة قلبية خشنة. ازهارها كبيرة صفراء. يزورها وثنية
عراوة ملكة المروج	جينية معمرة فرعاء. أوراقها مركبة سنائية وثرية. ازهارها الى الخضار الباهت
عرعر شائع	جنية معمرة فرعاء. أوراقها ابيدة هدية. ثمارها عنبية حلوة المذاق عطرية
عرعر كادي	شجيرة فرعاء. أوراقها ابيدة هدية. ثمارها نووية حمصية اللق والشكل
عرف الذهب المخزني	جينية حولية معمرة. جذورها غليظة. أوراقها معتقة صغيرة. ازهارها فردية
عرف انجبار	عشبة مدادة معمرة. أوراقها مركبة خماسية. ازهارها كبريتية اللون
عرون مخزني	عشبة حولية فرعاء. أوراقها صغيرة منشارية الحافة. ازهارها وردية
عروق الصباغين	عشبة معمرة فرعاء. أوراقها مركبة مفرصة. ازهارها صفراء اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاكراز والخشب	صيفتها قابضة ، مضادة للتزيف وتفيد البواسير
الاوراق والازهار	مستحلبا يقوي القلب والمعدة . مغليا يفيد السعال الديكي والتزلة الوافدة
البزور	مسحوقها مسهل عتيق ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
ثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والاوراق	مسحوقها وتقيها هاضم ويدرّ البول
الاوراق	مستحلبا يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . ويشفي الجروح
الحصية	صيفتها تقيد طين الاذنين . مهروسها يقضي على الاورام والدمايل لصفاً
الارومة والاوراق	مهلوس الاوراق لبناً يفيد التهاب الاعصاب وعرق النساء والدوالي . مسحوق الارومة للتزيف المجهلي
الزهار والاوراق	مستحلبا يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الاوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الاوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
اللحاء	مغلي المسحوق او تقيها قابض
الدوقصة والبزور	مستحضراتها تقيد داء الثقبه وتقضي على التقرس
الجذور	تقيها مسهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى والثانة والحنجرة
الاروملة	مغليا منفث ويفيد العلل الصدرية
الاوراق	القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط
العشبة يرمتها	مغليا مقو ويقي الدم ويفيد البرقان والامراض الجلدية
الازهار	مغليا طارد للذود من اي نوع كان
الاوراق والبذور	تقيها يفيد المعدة والاعماء ويمنع الارق ويدرّ البول
البذور	مغليا يفيد الامراض الصدرية ويدفع الحمى ويدرّ البول ويخترّ الاعصاب
العشبة يرمتها	عصيرها او مسحوقها الجاف مضاد للتزلة . مسكّن ومطعم
الجذور والبذور والاوراق	مغلي الجذور والاوراق يدرّ البول . مغلي البزور مشه ، يدرّ الحليب والطمث
الاوراق وثمار	عصارة الاوراق وتقيع ثمار طارد للذود
اللحاء	مسحوقها يفيد العلل العصبية ويسكّن ويقيد المعدة
البذور	مغليا يفيد علل المسالك البولية وقد يذيب الحصى ويفيد في الزنطاري
الاوراق والازهار	مغليا مقو ، دافع للحصى ، رقيقها دامل للحرج
الاوراق وثمار	تقيها مضاد للتشنج ويفيد الربو والسعال الديكي . استعمالها خطر لانها سامّة
الاوراق والازهار والجذور	الاوراق والازهار مطبوخة ، الجذور مضادة للتشنج والصرع والرقص الزنجي
الارومة والجذور	تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد التقرس ويذيب الرمل
الالواح	عصارتها مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الاوراق والازهار	مغليا يسكّن التشنجات العصبية . مسحوقها ينشط الشهية ويدرّ البول
اللحاء	مغليا مضاد لالتهاب والحصى ، يعرق ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البنائق	مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبية
الاوراق والازهار	مغليا مقو ، محرّض ، هاضم ، يفيد علل الطحال
الاوراق	مغليا يفيد عسر البول والسعال التنسجي . مهلوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحوقها يدخل في عذّة تراكيب طيبة اخضها معجونات الانسان
بتلات الازهار	مغلي البتلات مضاد للحيمات والملازيا . ولعابجة نوسحات القصبه المجايفة
الجذور والازهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التزيف . تنقي الازهار يفيد الاستسقاء والالتهابات
ثمار	تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد العلل الكبدية والمسالك البولية والنشاف الشرياني
الاوراق	تقيها مسهل وطارد للذود
الجذور	مسحوقها مقو ، منفث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي
الجذور	التكيد بمغليها يقضي على الاكزما ، المضمضة تقيد تزيف اللثة
العشبة يرمتها	مستحلبا يفيد الرشح والتزلات الشعبية ، ويقوي العيون ، ويفيد الرمد
العشبة يرمتها	عصارتها تقضي على التاول . خلاصتها المائمة تقيد المعدة والاعماء والتهاب الماراة

التيات	التحلية
عسم سندي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضيّة ازهارها وردية. يزورها دعيت
عشبة القوق الوزيّة	عشبة مدّادة معمّرة. اوراقها مركّبة ثنائيّة الصفّ. ازهارها كبريتيّة اللون
عُشْر جَبَار	شجيرة متباعدة الفروع. اوراقها ابيدة سنائيّة بارزة العروق. ازهارها وردية
عققة مبدولة	جنية متسلّقة معمّرة. اوراقها ابيدة جلديّة النصال. ازهارها يضاء. ثمارها نوويّة
عَلْد زودج السابل	جنية معمّرة فرعاء. اوراقها كالخراشف. ثمارها عنية
عنب الدب، عيران	جنية معمّرة فرعاء. اوراقها ابيدة صغيرة. ازهارها جلجلية وردية. ثمارها عنية
عود الانبياء	شجرة متوسطة الحجم. اوراقها مركبة شفعيّة. ازهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون
عود الوج	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها عصفيّة قرصيّة الانتشاب. ازهارها صفراء اللون
عوسج شائع	جنية شائكة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة وثرية. ازهارها وردية. ثمارها شاميل كروية
عينون عطر	بجلة لفيّة معمّرة. اوراقها ابيدة ملمعيّة جامدة. ازهارها عطريّة زرقاء اللون
غافث غولاني	عشبة معمّرة شائكة الساق. اوراقها مركّبة وثرية. ازهارها عطريّة صفراء اللون
غالوين حقيقي	عشبة فرعاء مضلّعة الساق. اوراقها ضميّة صغيرة خصلية. ازهارها الى الصفرة الزاهية
غالوين صليبي	عشبة فرعاء مضلّعة الساق والفروع. اوراقها صغيرة ضفّية. ازهارها صفراء اللون
غيراه الحاملين	شجرة فرعاء. اوراقها مركّبة وثرية. ازهارها كبرية الرائحة. ثمارها صغيرة كروية
غراسيولة غزّرية	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها ضيّفة مسنّنة. ازهارها بويّة وردية
غرندلية ضليعة	جنية معمّرة فرعاء. اوراقها سنائية جامدة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
غرغوق عطر	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها مفضّصة مشرّمة. ازهارها الى البياض الليليكي المواج
غفت ابن سينا	عشبة ليفيّة معمّرة. اوراقها مركّبة سنائيّة النصال. ازهارها وردية. يزورها دقيقة
غلقة	جنية معمّرة مدّاعة. اوراقها اهليلجيّة شديدة الخضار. ازهارها يضاء. ثمارها كعابر
فلارشا يضاء	جنية متسلّقة معمّرة. اوراقها كلفيّة مفرّضة. ثمارها عنية. يزورها زيتيّة اللباب
قاعية الخنان	بجلة معمّرة فرعاء. اوراقها ضيّفة النصال. رؤسائها الزهرية بيض اللسيئات
فجل حارّ	عشبة حوليّة غليظة الجذور. اوراقها مستطيلة مفرّضة ومسنّنة. يزورها كروية
فراسيون ابيض	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها يضيّبة خشنة مسنّنة ازهارها يضاء
فراسيون ازغب	عشبة محولة زّاء. اوراقها خشنة مزغبة ومسنّنة. ازهارها حمراء مرقوشة بالابيض
فراسيون اسود	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها خصلية النصال للسنة. ازهارها حويّوة مغزّية
فراسواز، عوسج ابيده	جنية ارمولة معمّرة فرعاء. اوراقها مركّبة مزغبة مسنّنة. ثمارها شاميل مأكولة
فربيون لسيرس	عشبة ليفيّة محولة مدّاعة. اوراقها متصالية سنائيّة. ازهارها وردية
فربيون مخزني	جنية معمّرة فرعاء. اوراقها اهليلجيّة جامدة النصال. ازهارها يضاء اللون
فشاغ مخزني	جنية ليفيّة معمّرة. اوراقها قلبية جامدة النصال. ازهارها صغيرة صيوانيّة
فلقل كبابة	شجيرة سريعة الفروع. اوراقها اهليلجيّة جامدة. ازهارها مرجانيّة. ثمارها كروية
قوة	عشبة جذمورية معمّرة. اوراقها ضميّة متقابلة سنائيّة مزغبة. ازهارها صفراء
فوقس حويصلي	نبات بحري قلدي الجذور والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاغبس
فول	عشبة حويّلة جوفاء الساق. اوراقها شفعية. ازهارها يضاء مرقوشة
فول كلبار	جنية عارشة معمّرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها ارجوانيّة. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جنية معمّرة فرعاء. اوراقها ابيدة اهليلجيّة بارزة الضلع مسنّنة. ازهارها خضراء اللون
قبيليس نيت، خيط ذهبي	عشبة حوليّة صغيرة. اوراقها صغيرة مفرّضة. ازهارها وردية يضاء اللون
قتوايه	جنية معمّرة فرعاء فناء. اوراقها سنائيّة جامدة. ازهارها وردية مرقوشة
قّاء برّي	عشبة حوليّة مدّادة. اوراقها ممّقة كبيرة. ازهارها صفراء. ثمارها رفنيّة صفراء
قراض يمرق	عشبة حوليّة فرعاء زّاء. اوراقها ناشرة العروق مسنّنة كلفيّة الغلب. ازهارها خضراء
قرّة	عشبة مائية معمّرة. اوراقها مركّبة ثلاثيّة. ازهارها برتقالية اللون
قرطم الصبّاغن	عشبة حوليّة سرحة. اوراقها سنائيّة بارزة العروق. ازهارها برتقالية اللون
قرقة سرنديب	شجرة منتصبه فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها عقنودية غبراء. ثمارها عنية
قرنفل	شجرة فرعاء فناء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها عقنودية صغيرة حمراء. ثمارها نوويّة
قسوّرة راحية	جنية عارشة. ارموتها معمّرة. ساقها حوليّة. اوراقها كلفيّة خاسية التخصيص. ازهارها تينية
قطرم افر، خشيشة افر	عشبة معمّرة فرعاء. اوراقها سنائيّة مسنّنة. ازهارها عطريّة يضاء

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
اللحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العشب برتبنا	نقعها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف التزيف
الجذور واللحاء	اللحاء نفيد الاسهال والزطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قليها مقو، كثيرا مقيء
الاوراق والثمار واللحاء	الثمار مسهلة عتية، الاوراق واللحاء نفيد السلس والقوياء
الانفاد الزهرة	مغليا يفيد داء الفواصل
الاوراق	مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلي ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق
الخشب	صيته نفيد اضطرابات الحليس والقرص. مسحوقه يفيد السلس
الجذور	صيته او مغليه تقوي الجهاز العصبي وتساعد المضم ويفيد التزلات الصدرية
الثمار والاوراق والجذور	عصير الثمار منعش ومضاد للحميات. مغلي الاوراق يفيد العدة. مغلي الجذور لرمل الكل
الاوراق والازهار	مغليا يفيد الحميات المتقطعة والقيض المستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسها او نقعها يفيد الامراض الجلدية وغشاوة العين والتهاب الحنجرة
العشب برتبنا	مغليا قابض غثيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرق
العشب برتبنا	مغليا مقو ويفيد المعدة
الثمار	عصيرها او مستحلبها مقو، منفض، مضاد للحفر والزحار، يدر البول.
الجذور	مسحوقها مسهل غثيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر
الاوراق والازهار	مغليا منعش، يفيد الريو والعلل الرومية والسعال الديكي
العشب وازهارها	يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضد العقم. الوراق المهروسة تنفي القروح
الاوراق	مغليا يفيد الكبد والتهابات الميلة وقد يحلل الرمل
الجذور	نقعها منبه، مرق، موهج ويذر البول
الجذور	عصارتها مسهل غثيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر
الاوراق والازهار	مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول
الجذر	مستحلبه يدر الصفراء ويفيد احتقان الكبد والريو والسعال
الاوراق	مغليا منفض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث
الاوراق	مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويذر البول ويذيب الحامض البولي
الاوراق والازهار	مغليا يفيد المنص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
الثمار	عصيرها يدر البول، مرطب، ملين
الاوراق والجذور	عصير الاوراق يحرق الشعر. الجذور منفة ومقيئة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب
الجذور	مغليا يفيد الرشوحات والامراض الجلدية
الثمار	زيتها يفيد المالك البولية والسيلان والتهاب الحنجرة والتزلات الشمية
الجذور	مغليه يفيد الكساح، مقو، هاضم، يدر الحليس والصفراء. يفتت الحصاة الفوسفاتية
النبات كما هو	مغليه يزيل السمّة وتضخم الغدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليا يدر البول. يفيد الرشح والمساك البولية، يذيب الرمل
الحبوب	مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجذور	مغليا مقو
الاوراق واللحاء	خلاصتها السائلة ناعوظ مشهور. مضادة للسلس وخففة للفضط
الثمار	عصارتها او مغليا مسهل غثيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان الملح
العشب الزهرة برتبنا	مستحلبها ينقي الدم ويحذد الشيا. بدورها مثيرة للرغبة الجنسية
القروح والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للحفر، يفيد الملل العصبية وداء الخنازير. منقث ويذر اللعاب
البزور	مغليا مسهل ويفيد الملل العصبية
اللحاء	مسحوقها ينه الأعصاب وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج
الازهار	صيتها ومغليا منعشة، محرقة، منقطة، طاردة للغازات
الجذور	نقعها مقو نشيط ويفيد المعدة
الازهار	نقعها يفيد المعدة، طارد للريح، مطهئ

النبات	الحلية
قام آسي	جنية معمرة فرعاء فناء. اوراقها آسنة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عنبية مأكولة
قنب	عشبة حولية. اوراقها كلفية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية المسكن. يزورها مكورة
قنة مهجونة	عشبة معمرة. اوراقها مركبة قلبية الوريقات. ازهارها ثنائية
قتلي مبدول	شجرة كبيرة فارشة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها عشوية. ثمارها كستنية الشكل والقد
قنصور شائع	جنية معمرة. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها برتقالية اللون. ثمارها سفلية
قطريون صغير	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها رحيمة صغيرة. ازهارها وردية اللون
قوسه غزيرة	عشبة معمرة زياء فرعاء. اوراقها صغيرة خملية النصال كالقورية العرف. ازهارها عظرية بنفسجية
قيصوم، رمان الارض	جنية لينة فرعاء. اوراقها بسيطة خطية. ازهارها ذهنية اللون. ثمارها لينة كحب الآس
كافور	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها اهليلجية جامدة. ثمارها زيتونية نوية
كائن شائع	عشبة حولية صناعية. اوراقها سنائية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراه. يزورها زنبية
كراويا	عشبة عملة. اوراقها ريشية مغلوقة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية
كرفس	عشبة حولية ضخمة الجشت. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها بيضاء ممتحة بالاخضر
كرفس الماء	عشبة معمرة غليظة الجذر. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها كباير. يزورها دقيقة
كركم صباغي	عشبة صفولية معمرة. اوراقها سنائية مستطيلة. ازهارها سنائية صفراء اللون
كروتن الزيت	جنية فرعاء. اوراقها رحيمة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروج
كزبرة الير	عشبة جنمورية معمرة. زناد اوراقها ثنائي الانتشاب راعي القروع الموحية صغير الوريقات
كزبرة مزروعة	عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة مقرضة مشرقة. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة
كستة	شجرة ضخمة دالحة. اوراقها ناشرة العروق منشارية الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشمش احمر	جنية فرعاء فناء. اوراقها خلية مقلقة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشمش اسود	جنية فرعاء فناء. اوراقها خلية مفصصة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعز	نبات طفلي خيطي ملتف. اوراقه حرشفية دقيقة. ازهاره وردية
كايلة المروج	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها خلية مقرضة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون
كشون	عشبة حولية فرعاء. اوراقها مهدلة. ازهارها بيضاء. ثمارها كباير. يزورها صغيرة
كنكلييه، عسم ربيع	شجرة صلبة فرعاء. اوراقها مائلة النصال عابقة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور
كنكينيا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اوراقها كبيرة النصال. ازهارها خشوية. ثمارها جراه يزورها دقيقة
كهنة	شجيرة متسلقة فرعاء. اوراقها جامدة النصال. ازهارها وردية. ثمارها لحية عاقصة
كوشاد اصفر	جنية سرحة مستخلطة الجذور. اوراقها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء
كولا، كوله	شجرة فارشة. اوراقها ابيدة جامدة. ثمارها قروء. بسيطة تغلف من لوزتين الى عشر لوزات
كيس الراعي	عشبة حولية. اوراقها لاقباسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها خربيات. يزورها خردلية
لايمون ابيض	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية منشارية الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لئين شائك	جنية معمرة شائكة. اوراقها سنائية مسننة. ازهارها وردية
لسان الحمل الساني	عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية جامدة النصال. ازهارها ثنائية
لسان الحمل الكبير	عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية ملطية جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزي	بلعة معمرة فرعاء. اوراقها سنائية خملية النصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا ناعمة، حشيشة الجرح	عشبة مستطيلة الساق. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
مازريون، دفنة سامة	جنية صغيرة معمرة فرعاء. اوراقها جلدية النصال. ازهارها انبوية عطرية. ثمارها عنبية
مثنان، دفنة لاحقة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها عروء مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها عنبية
مرآن شامخ	شجرة باسقة فرعاء. اوراقها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية
مشتركة فيرجينية	جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضبة مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون
مضاض اسود	شجيرة فرعاء، اوراقها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها جوية. يزورها صغيرة
مئل	جنية فرعاء شائكة. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها وردية. ثمارها جراه
مكثانة غزيرة، سذاب الماعز	بلعة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثرية. ازهارها الى الزرقعة
منتنة، فساد الكلب	عشبة حولية فرعاء. اوراقها اهليلجية مزغبة. ازهارها بيضاء كرسية الرائحة



الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الامراض الجلدية الرطبة . مغليا يقطع الاسهال
البزور	مغليا يسكن تشنجات الاطفال ويغيد الربو والسعال
عصارة الساق	عمرضة ، مطهرة ، منبهة ، مضادة للتشنج ، منقعة وتدر الطمث
قشور الثمار	مغليا مضاد لتجلط الدم ، يفيد في معالجة الدولي والبواسير واحتقان الكبد
البزور	مغليا ملين او مسهل
العشبة باستثناء الجذور	نقيعها او مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم
الاوراق	مستحلبها يقوي الاعصاب ويكافح المقم عند النساء . يفيد السعال الناشف والتزيف الرحمي
الازهار والثمار	مغليا مقو، منبه ، مضاد للحميات ، يزيل الطلخ الحمر من الجلد
زيت الكافور	جافر ومضاد للتشنج
البزور	الليخة الساخنة تسكن آلام المعدة ويقيد التهاب الغدد التكفية وللعمادة
البزور	مسحوقها مقو، هاضم ، يفتح الشهية ، يدر اللعاب ، ينشط العصائر المعدية
الجذث والاوراق	تنفث الصدر وتحلل الورم وتدفع الحصى وتفتح الشهية
الجذر والاوراق والبزور	الجذر والاوراق مضادة للحرق وتدر البول . البزور مهيجة للقوة الجنسية
المساقل	نقيعها ومغليا منمنش ويدر البول
الحبوب	مسحوقها منقط ، مسهل شديد الوقع . تستعمل بحرفة الطبيب
العشبة برمتها	مغليا مضاد للسعال
البزور	مسحوقها ومغليا عمرض ، هاضم ، يفيد القلب والضغط الدموي
الاوراق	مغليا مضاد للسعال الديكي
الثمار	عصيرها يدر البول ويفيد من العلل العصبية والتقرس واليثرور
الثمار والاوراق	عصيرها مرطب ، هاضم ، يفتح الشهية . مغلي الاوراق يفيد في التهاب المفاصل
النبات برتمه	مغليه يقضي على القبض للسعصي ويدر الصفراء
الاوراق	مغليا شايق ويوتر اغشية الكارة . يفيد الافرازات المهبلية وينظم الحيض
البزور	مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والعسل . منبه للاعلاء ، طارد للغازات
الاوراق	نقيعها يذيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحيات
القشور	مسحوقها مقو، دافع للحميات
الاوراق والثمار	عصارتها مقوية
الجذور	عصيرها مثير للشهية ، منمنش ، مقو، مخفض للحميات
الاوراق	نقيعها ومغليا مقو، مضاد للاوجاع العصبية
اللوزة	ماكولة منبهة مقوية ، منشطة ، تدر البول
العشبة برمتها	مستحلب الاوراق والازهار يفيد الاساك المزمن ، مرقق ، مضاد للسعال ويدر البول
الازهار	مستحلبها ينظم الحيض ومنع اضطراره ومنع السيلان الابيض
النبية برمتها	نقيعها يفيد الامراض الكلوية والعلل العصبية ويدر البول
الاوراق والازهار	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والاسهال
العشبة قبل التذير	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والاسهال
الجذور	مغليا مخدر ، مسكن ، مضاد لبصق الدم والاسهال
الاوراق والازهار	مهروسها يطهر الجرح ويكلمه ويقضي على الالتهاب
للحاء	نقيعها او مغليا منقط ، مرقق ، مهيج ، يدر البول . الاستعمال خطر يوجب الحذر
للحاء	منقعة كآوية
الاوراق واللىحاء	للحاء دافعة للحميات . الاوراق ملينة ، مرققة ، مقوية ، تدر البول
الاوراق واللىحاء	مسحوقها ومغليا قابض ، مضاد للتزيف . يفيد العلل الشريانية والاحتقانات
للحاء	مسحوقها مسهل ، يفرز الصفراء . يفيد الكبد والمرارة
عصارة الساق	منعقة ، مقوية ، مضادة للتشنج
الازهار	نقيعها يدر الحليب ويقيد السفلس . خلاصتها او مغليا علاج للسكرى
الاوراق والازهار	نقيعها ومغليا مضاد للتشنج ويدر الطمث

النبات	التحلية
مشور اصفر، خيري اصفر	عشبة معمرة صغيرة. اوراقها سنائية خملية. ازهارها عطرية صفراء. بزورها مستديرة مبططة
منكة	شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها خيلية خملية. ازهارها ليلكية. ثمارها عنبية
نادرين مغزلي	عشبة معمرة. اوراقها مركبة وترية. ورقاتها سنائية مسننة. ازهارها وردية
نبق اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها بيضيه ناشرة العروق، ازهارها خضراء اللون
نبق مسهل	شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها بيضيه جامدة. ثمارها خوخية بنفسجية
نجير زاحف	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها عصبية صغيرة. ازهارها سنبلية التجميع
نسرين	جنية معمرة فرعاء شائكة. اوراقها مركبة وترية. ازهارها غبراء. ثمارها نووية
تعتع زراعي	عشبة معمرة مذادة. اوراقها سنائية ناشرة العروق مسننة الختار
نومان امرد	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور نشوتة المادة
نيدمان مستدير الورق	عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية الانتشاب معتقة. ثمارها جراء
هال صغير، قافلة صغيرة	نبات جذموري معمر. اوراقه سنائية كبيرة. ازهاره سنبلية. ثماره جراء
هدال	نبات طفيلي معمر. ساقه مذادة. اوراقه صغيرة جامدة. ثماره نووية داقية
هدرسة كندية	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها كفية مضفصة. زهرتها وحيدة بيضاء
هلع، بلع الصحراء	جنية معمرة فرعاء شائكة. اوراقها بيضيه جامدة. ثمارها نووية زيتونية
هلتاس اصفر	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
هندب، طرخشقون	عشبة معمرة مقرة. اوراقها قرصية مستطيلة مقرضة. ازهارها صفراء اللون
هندباء برية	عشبة حولية حترائية الجذر. اوراقها مقرضة. ازهارها زرقاء اللون
هيفسان، فجل الخيل	عشبة معمرة وتدية الجذر. اوراقها سنائية. ازهارها صغيرة بيضاء. بزورها زيتية
وثير مذاد	نبات معمر مذاد. اوراقه عروية بيضيه جلدية النصال. ازهاره جلجلية بيضاء
وژال	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائية صغيرة. ازهارها عطرية صفراء
يوهنيه	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها ابيدة بيضيه حامدة. ازهارها بيضاء اللون صفراء المواج

## ٢٨٤١٩ - نباتات مُتَحَجَّر

## ٢٨٤٢٠ - نباتات مُقَعَّد ، اَمْع

Phytolithe  
Plante épiphyte (F). Epiphyte plant (E).  
كل نبات يعيش على نبات آخر دون أن يستمد منه غذاءه .

٢٨٤٢١ - نباتات بِحَرِيَّة  
Plantes marines (F). Sea weeds (E).

هي النباتات المائية التي تعيش في البحار .

## ٢٨٤٢٢ - نباتات بِمَنِيَّة

Plantes d'appartement (F). Apartment plants (E).  
هي النباتات الزينية التي تُزَرَع في المراكن وتعيش في المساكن .

## ٢٨٤٢٣ - نباتات جُمَالِيَّة

Plantes vénéneuses (F). Poisonous plants (E).  
هي النباتات التي تحوي بعض العناصر الجُمَالِيَّة المؤذية او المميتة وهي عديدة ، اشهرها ما جاء في الجدول التالي :

نوع النبات	الاعضاء الجُمَالِيَّة
ارطاة	الجذور
اروم، ترياق ابيض	الارومة والاوراق
ازديخت	الجذور والثمار
الجنين، شوك الملك	الجذور
اشقيل بحري، عنصل بحري	جميع الاعضاء
اطرب، ست الحسن	جميع الاعضاء
افلوس	الاوراق بعد اكتمال نموها
اقي	جميع الاعضاء
اكوزيت، بيش	جميع الاعضاء
اكيلاجيا عقابية	جميع الاعضاء اخصها البزور
امارلس، شيك	جميع الاعضاء
ايلنطس	الاوراق
يقس، ششاد	جميع الاعضاء اخصها الورق
بنج	جميع الاعضاء
بنفسج	الزواكب والبزور
بوسير، مسكر الحوت	البزور
ترس	جميع الاعضاء اخصها الثمار
تمم	جميع الاعضاء
ثلثان	الثمار
ثليب	الجذور
جمفيل، حامول، سبج	جميع الاعضاء
نوع النبات	الاعضاء الجُمَالِيَّة
أبنوس كاذب	جميع الاعضاء
أهل، عرعر سبته	الاوراق
أدونيس، زغاليل	الجذور
أذريون الماء، صرغوس	جميع الاعضاء وتفقدها بعد التجفيف

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الاوراق والازهار الثمار والجذور	مغليا يسكن الآلام العصبية والصداع ، ويقوي القلب ، يدر البول . مضاد للتشنج مسحوقها طاسم ، مجفف ، يقضي على الروماتيزم مسحوقها او نقيعها او مغليا مضاد للتشنج والصرع العصبي ودافع للحصى ويسكن وطارد للديدان
اللحاء	مسحوقها ومغليا ملين ومسهل عصيرها مسهل
الثمار	مغليه مرطب ، يدر البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء التقرص والتهاب المثانة منهض نشيط يقوي مناعة الجسم . مسحوق الثبلات الجففة يفيد التسخحات مغليا منهض عام . يفيد المعدة . يسكن التشنجات ، يدر الصفراء
الجذور	مغليا يفيد التهاب الكلى ويذر البول
العشب برمتها	مغليا مسكن للسعال الديكي ، مفيد لالامراض الصدرية اخضعها للسل
العشب برمتها	يزوره مقوية ، هاضمة . ادهان الزور والجذور منهضة للقلب والقوة الجنسية
الجذور والزور	مغليه مخفض للضغط الشرياني ، مضاد للتشنج ، يفيد الصرع واضطرابات الحيض
النبات برتمه	مسحوقه ومغليه يفيد المسالك الشريانية واليوساير والتزريف
الجذور	الناضجة ملينة . الفجة مسهلة ، طاردة للودود
الثمار	مغليه مقوة ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدر البول . يفيد سيلان الرحمي والحيض والاحتلام
الاوراق والجذور	مستحلبها مقو ، ينقي الجسم ، يفيد الكبد ، يدر البول
الاوراق والجذور	عصيرها يفيد احتقان الكبد ويقضي على اليوساير وينقي الجلد من الدمايل
الجذر	عصيرها منهض فعال يفيد المعدة ويذر البول . مضاد لداء الحفر
الاوراق والازهار	مغليا قابض مضاد للاسهال
الازهار	نقع ازهارها الغضة يدر البول ، يلذب الحصى الكلوية . يفيد الزلال والوهن
اللحاء	مسحوقها منغظ . ويذر الحريض . ويكافح العثة

نوع النبات	الاعضاء الجحالية	نوع النبات	الاعضاء الجحالية
جلسان	الاوراق والازهار	دفة سامة ، مازريون	جميع الاعضاء
سربل	الاوراق والازهار	دليوث	الساق والاوراق والازهار
حشيشة الفقراء	جميع الاعضاء	دند	الزور والكعب
حشيشة القمل	جميع الاعضاء	دققة ، زوان مسكر	الحب
حلوب	الاوراق والازهار	دمجيتال ، زهر الكشتاتين	جميع الاعضاء
حويش النعم	الاوراق تؤذي الدواب	ذرة صفراء	الازهار الفكرية
حنظل	جميع الاعضاء اخضعها النار	رازايانه	الجذور والاوراق
حوذان	جميع الاعضاء وتقدمها بعد التجهيل	رشاح	الزور
حمى العالم ، حيون	جميع الاعضاء	رئس المنافع	الجذامير
خر بوق	جميع الاعضاء	زراوند غلياني	الاوراق والثمار
خر بوق	جميع الاعضاء	زئبق الوادي ، ذفة	جميع الاعضاء
غرول حقل ، ليسان	الاوراق بعد الازهار	سذاب	الاوراق والازهار
غرم الحنطة	الاوراق بعد الازهار	سريبره ، حمام	عصارة السوق
غروب	الزور	سقمونيا	عصارة السوق
غشخاش منوم	الزور والكعب	سكع ، بنجور مريم ، عرطليا	المساقط
غناز برية	جميع الاعضاء اخضعها الكمار	سماق جحالي	الاوراق
غوشان ، قرقد	جميع الاعضاء	سنبليل ، سم السمك	لباب عجمانه
داتوره	جميع الاعضاء	سورينجان	جميع الاعضاء
داذي ، هيوفاريقون	جميع الاعضاء	سون اصفر	جميع الاعضاء
دفل ، حبن	جميع الاعضاء	سون المنافع ، برييت	جميع الاعضاء
		شاي المروج ، قوس	الاوراق والازهار

٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية  
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).  
هي النباتات الممكن استمال ثمارها او بذورها لاستخراج  
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية  
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E).  
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب  
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية  
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).  
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية  
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).  
هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب  
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة  
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).  
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع  
وفي المياقل والحداثق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى  
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة العدد تقتصر ،  
في الجدول التالي ، على ذكر اشهرها واشهرها :


اسم النبات	اسم النبات
سراخس	اخيليا ام الف ورقة
سمادي	اروم ، لوف ميقع
سعد مستدير ، صباح الخير	اريفارون ، شيخ الربيع
سورجانا الخريف ، قاتل الكلب	اسل
شقار	اكونيت هربي ، بيش
شقيق ، عمى الدجاج	اسنوخ
شر الكلب	انجبار ، انارف
شوك	تفان
شوكران	ثوم بري
طحالب	ثيل
عراوة	جصفيل ، حامول ، سيع
عشبة القوي	حرميل
عوسج ، عليق	حشيشة القمل
غيطل	حليوب
فربيون ، عنجد ، يتوع	حيض
قرطب	حيض المناقع
قصوان	حودان
قطريون	خرطال فتوا
كرسة	خرم
كرنس نبطي	خان
كشوث	دققة
لسان ، خردل بري	دوسة الحمار ، فرفارة
لباب	دوسر
لبن	ديجتال ، زهر الكشاثين
لسان الحمل	ذيل الثعلب
نجيل	رازيانة ، مشفيل
هدال	ريخاخ
هيسان ، فجل الخيل	زوان مسكر

نوع النبات	الاعضاء الجحالية
شقار	جميع الاعضاء وتقددها بعد التجفيف
شقيق ، عمى الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صرمية الجدي	الازهار والثمار
مقلاب سوري	عصارة الساق
مقلوس ، ذنب	الاوراق
منطنينية	عصارة الساق ولباب البزور
عائق	جميع الاعضاء اخصها البزور
عبر	جميع الاعضاء
عزعر فريجيني	الاوراق
عروق الصباغين	جميع الاعضاء
عشقة	الثمار
عصل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب ، فناة	جميع الاعضاء
غفو	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنوامي والثمار
فاشرشين	الثمار
فربيون ، عنجد ، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قناه بري	جميع الاعضاء اخصها لباب الثمر
قرطب الزرع	البزور
قنة مبلولة ، كلخ	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كربدان ، مشان	جميع الاعضاء
كلابة	اللحاء والنجيب
لبين المروج ، زغيلة	جميع الاعضاء
لفاح ، يروح	جميع الاعضاء
لكية عشارية الاسدية	الاوراق تؤذي الدواب
لويليه	عصارة الساق
ليناريه ، حياحب	جميع الاعضاء
ماميا صفراء	الاوراق والازهار
مديد	عصارة الساق
مضاض	اللحاء والاوراق والثمار
معزرون	جميع الاعضاء
ملعى سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
لبق	الاوراق والثمار
هدال	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيشان	الاوراق بعد ازهار النبات
ينبوت نن	جميع الاعضاء


٢٨٤٢٤ - نباتات حولية  
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).  
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات عكلية  
Thallophytes  
صف نباتات فطرية الجرم خالية من الجذور والسوق  
والاوراق والازهار . اطلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنية  
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).  
هي النباتات الوحيدة الخلية .



مخطّط تسلسل أنساب المملكة النابتية



## ٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).  
Plantes spontanées, Végétation spontanée (F).  
Spontaneous plants (E).  
هي النباتات التي تعيش وتتكاثر من تلقاء ذاتها .

## ٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، ربحان

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).  
هي التي يستخرج منها العطر .

## ٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).  
هي التي تستعمل كعلف للحيوان .

## ٢٨٤٣٥ - نباتات علبة ، نباتات عليا

Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).  
هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب ، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

## ٢٨٤٣٦ - نباتات لحيمية

Plantes grasses (F). Thick-leaved plants, Succulent plants (E).  
هي نباتات تخزن الاوراق المكثفة بالماء للعضارة .

## ٢٨٤٣٧ - نباتات محولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).  
هي التي تعيش نحو عامين .

## ٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة

Plantes améliorantes (F). Ameliorating-plants (E).  
هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والبرسيم .

## ٢٨٤٣٩ - نباتات معروفة

Plantes sarclées (F). Weeding-plants (E).  
هي النباتات التي تستوجب الزق .

## ٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).  
هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

## ٢٨٤٤١ - نباتات مفترسة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).  
نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يجمعها قاسم مشترك واحد افتراس الحشرات || الافتراس يتم بواسطة الاوراق التي تشمر كل حشرة تقترب منها ، اغصانها للذباب والبعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Céhalote (F).	الاجنية
Sarracénie (F).	البوقية
Grassette (F).	حشيشة الدهن
Dionée (F).	خائق الذباب
Népente (F).	السوس
Drosophyllie (F).	النقاص
Drosère (F).	التيديمان

## ٢٨٤٤٢ - نباتات منهيكة

Plantes épuisantes (F). Tiring-plants (E).  
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

## ٢٨٤٤٣ - نباتات نسيجية

Plantes textiles (F). Textile-plants (E).  
هي النباتات الصناعية النسيجية ، اشهرها القطن والكتان .

## ٢٨٤٤٤ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).  
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسج .

## ٢٨٤٤٥ - نباتة

Plante (F). Plant (E).  
هي البنية واحدة النبات .

## ٢٨٤٤٦ - نباتي

Végétal (F). Vegetable (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنباتات .

## ٢٨٤٤٧ - نباتح

Abollement (F). Barking (E).  
هو صوت الكلب . وانبع الكلب واستنبح حمله على النبات .  
قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضياف كلهم  
قالوا لاهم بولي على النار  
نفسك البول بجلا او تجود به  
وما تبول لهم إلا بمقدار

## ٢٨٤٤٨ - نباتح

Guib  
هو البرع ، نوع من الجبل ، اطلبه .

## ٢٨٤٤٩ - نباتح \*

Scaire (F). Wentletrap (E).  
جنس حيوانات بحرية مفعورة من الرضويات الممدتة الاربجل . انواعه المفعورة نحو ١٥٠ صدفها بيض صفار ، هياكلها مخروطية الشكل ، حلزونية ، ناشرة التخديد المستطيل . يكثر وجودها في مجار البلاد الحارة .

## ٢٨٤٥٠ - نباتح \*

Albugo, Cystopus (S). Cystope (F).  
جنس فطور مجهرية من عارة النبتات وفصيلة الصنائيات .  
انواعه المؤذية قليلة اشهرها النباتح الابيض الذي يذوي البع والصليبيات .

## ٢٨٤٥١ - نباتح الدبب الأبيض \*

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S). Rouille blanche des scorsonères, Cystope blanc des scorsonères (F). White rust of salsify (E). Weiber rost der schwarzwurzel (D).  
وصم يصيب الدبب وغيره من نباتات فصيلة المركبات .

سببه فطر مجهرية من النبتات يركب نسج الاوراق في طورهما التشوي فيعزل عملها الغذائي والحياتي عما يسي الى نمو النبات وانتاجه || مظهره الخارجي بثور بيض لا قياسية الترتيب والحجم تملو نصل الاوراق فتشوهها وتمنعها عن القيام بعملها الجسودي على الوجه الاكمل .  
يكافح باستعمال احد مركبات النحاس .

## ٢٨٤٥٢ - نباتح الصليبيات الأبيض \*

فطر الصدء الأبيض

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weiber Rost der Kreuzblütler (D).  
وصم يعترى بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها

الكرنب واللثف والملفوف والفجل والرشاد || سببه فطر مجهرية من النبتات يركب السوق والازهار في طورهما التشوي . مظهره الخارجي بثور بيض تملو نسج السوق والاوراق والازهار والثمار فتشوهها وتعاظمها || يكافح كسائر الصنائيات باستعمال مركبات النحاس .

## ٢٨٤٥٣ - نباتة \*

Epimedium (S). Epimède (F).  
جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة البرباريسيات .



نباح



نباح الدبب الابيض



نباح الصليبيات الابيض



نباتة

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - نَبْتَة  
Mustiness, Musty smell (E).  
النبات : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في  
اماكن لا تصلح .

Plante (F). Plant (E). ٢٨٤٦٤ - نَبْتَة  
واحدة النبات تطلق على العشب والفرسة .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - نَبْتُورِيَّات  
Nemopteridae (F). Nemopteridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة  
مستطيلة الاعناق . رؤوسها محرصة . عيونها صغيرة ،  
ناشرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، قصيرة . ملاسها  
الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة  
معتلة التبييط . اجنحتها لانسواوية ، الزوج الامامي  
صغير القد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجذبي الشكل ،  
يسطه تراوح من ٣٢ الى ٥٢ سم . ثالث البراري والادغال .  
يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتفاخ في التربة ||  
اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - نَبْتُوسُ اَزْبَع  
حشرة تدعى هبون المساحف . اطلها .

Neptune (F). Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - نَبْتُون  
كوكب سيار يقع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ .  
قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحجمه يبلغ ١٦  
مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات أقل من وزن  
الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة  
٢٨٥٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨  
كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curement (F). ٢٨٤٦٨ - نَبْت  
Cleansing, Water-pepper (E).  
هو تنظيف المجاري والاقنية والانايب ...

Platycodon (S). Platycodone (F). ٢٨٤٦٩ - نَبْتَج  
جنس نباتات عشبية حولية برية و تربيئية من فصيلة  
الجريسيات . انواعه المعروفة خمسة ، بعضها جامدة مستقيمة  
تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متقابلية او عمية ،  
تصلها يضي الشكل ، جامد الصلصة ، سنن الحافة .  
ازهارها فردية التجميع ، ابوية وطرفية الارتكاز ، عديدة  
الالوان يكثر فيها الازرق والايض || ازهارها يستمر  
من تموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - نَبْتَجَة  
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نباج .

Clavelée, Variolée ovine (F). ٢٨٤٧١ - نَبْتَج  
Sheep-pox (E).  
النبتج او جذري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

Advection (F). Advection (E). ٢٨٤٧٢ - نَبْتَد  
النبتد حركة الريح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والتربيئية عديدة . جذاميرها  
مدادة معمرة . سورها منصبة حولية . اوراقها مركبة .  
وريقاتها مسننة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - نَبْتَاةُ الصَّيْن  
Epimède de Chine (F).  
نوع من النبات التربيي . ساقها موقرة تعلو من ٣٠ الى  
٤٠ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة  
القد يبيض اللون . تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - نَبْتَاةُ جَبَلِيَّة  
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).  
نوع من النبات التربيي . ساقها موقرة تعلو من ١٥ الى  
٣٠ سم . وريقاتها يضيية الشكل تطول من ٤ الى ٦ سم .  
وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ،  
هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، صفر البتلات ،  
حر الفصل . تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - نَبْتَاةُ رَيْشِيَّةُ الْوَرَق  
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pen-  
nées (F).  
نوع من النبات التربيي . ساقها عريضة تعلو من ٢٠  
الى ٦٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، ريشية الشكل ،  
مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، وعل التجميع .  
ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . تنويرها يستمر من  
نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - نَبْتَاةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق  
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes  
fleurs (F).  
نوع من النبات التربيي . ساقها موقرة تعلو من ٢٥ الى  
٥٠ سم . وريقاتها دوقية الشكل مستطيلة الزناد . نصلها  
جلولي الصلصة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة  
القد ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الضرب ، منها  
الابيض والاصفر والاحمر والبفسجي . تنويرها يستمر  
من نيسان الى حزيران .

٢٨٤٥٨ - نَبْتَاةُ  
Enation  
عارض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويشوه نصلها  
بتريدات وثنية تعلو الاضلاع والعروق .

٢٨٤٥٩ - نَبْتَاةُ  
Toxotes (S).  
Toxote, Archer (F). Archer, Dartier (E).  
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات .  
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر  
والخليج || يدعونها بنبالة لانها تنقذ الحشرات والحوام  
الحائمة فوق سطح الماء بنقطة ماء من فيها تجعل الطريدة  
تفقد توازنها وتسقط في الماء فتبتلعها النبالة .

٢٨٤٦٠ - نَبْت  
Végétal (F).  
هو النبات ، اطله .

٢٨٤٦١ - نَبْتُ الحِرَاك  
Sous-bois (F).  
Underwood (E).  
كل نبات عشبي او بجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار  
الحرجية .

٢٨٤٦٢ - نَبْت  
يقال نبت الشجر اذا غرسه ورياه . ونبت الحبوب اذا  
بذرنا للاستنبات .



## ٢٨٤٧٣ - نَبَدٌ

هو الإنباز، أظله.

## Centrifugation

## ٢٨٤٧٩ - نِيرَبَسَاوَرِي \*

*Gastrophilus haemorrhoidalis* (S). *Cestre hémorroidal* (F).

نوع من النير، ذبابته تطول نحو ١٠ سم. نوبها إلى السمرة السوداء، صدرها إلى الكهبة يعطوها غط مشعر أسود. بطنها أبيض المقدم، أسود الوسط، اعترض المؤخر. رواشها شفافة عادمة التشويج. رفاقها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ إلى ١٦ سم. تمر بالمدلة وتقيم فيها بعض الوقت وينتهي بها المطاف إلى السمرة حيث تعلق بعض الوقت تقسب الحكاك وزنت الدم || تركيب الدواب على اختلافها وأعصابها الخليل.



نير الأبل

## ٢٨٤٧٤ - نِير، شُعْرَانَة

(S).

*Cestre* (F), *Botfly*, *Gadfly* (E).

جنس حشرات من فصيلة البريات. أنواعه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل، هليية الجسم، صغيرة الخلف، دقيقة الذيل القصير، مزركشة الثوب، شفافة الجناح. أناتها تلتقي المكن دون أن تمتص لأنها عادمة المرزات النازعة || اغراسها تحصل من رفاقها التي تدعى نفثا والتي تعيش في مددة الحويان وتحت جلده. ج نبار وأنبار.

## ٢٨٤٨٥ - نِيرِ الْإِبِل \*، شُعْرَانَة البعير

*Cephalomyia maculata* (S). *Céphalomylie du chameau* (F). *Botfly of the camel* (E).

نوع من النير يركب الإبل والألواميس. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. نوبها إلى الخنطي يعطوها تجذيع أصفر. تهرق مكنها بين الثوب من ظهور وإياطل الإبل فينفث عن رفاقها خيطية هليية تغلقها الإبل بالنسب من جلودها إلى حلوقها فيطونها حيث تلتس || تزقي حتى التسع الجلدية تنفث الجلد مع أنهاء طورها البرقي وتنسقب على الأرض وتتحول إلى كزود ثم إلى حشرة تعيد سيرتها الأولى.

## ٢٨٤٧٦ - نِيرِ الْبَقَر

*Hypoderma bovis* (S).

هو لقاعة البقر، أظله.

## ٢٨٤٧٧ - نِيرِ الضَّان \*، شُعْرَانَة الضَّان

*Cestre ovivis* (S). *Cestre du mouton* (F). *Botfly of the sheep* (E).

نوع من النير يؤدي الغم ويهزها. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. نوبها إلى الكهبة الصفراء المواج. صدرها أسود النقيض، بطنها أسود التشويج. رواشها شفافة يعطوها عند قواعدا ثلاث عروق سود. تظهر من إيار إلى إيلول. أناتها تقصر المكن بين الحلب الذي يحف بالأنت فينفث على وضعه أو بعده بضع ساعات عن رفاق دقيقة تسمى إلى داخل الأنت فتتسلل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكتمال طورها البرقي الذي يدوم من ١٠ إلى ١١ شهرا. والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ إلى ٣ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. نوبها إلى البياض الأصفر يعطوها حيد أسمر. يكافح بطني جباه الضان بزيت السمك الذي يمنع اقتراب النير.

## ٢٨٤٧٨ - نِيرِ الْفَرَس \*، شُعْرَانَة الْفَرَس

*Cestre equi*, *Gastrophilus equi* (S). *Cestre du cheval* (F). *Botfly of the horse* (E).

نوع من النير، ذبابته تطول من ١٣ إلى ١٤ سم. الاثن أكبر قدماً من الذكر. نوبها إلى الصفراء الاغبر تملو زركشة سمراء. رواشها شفافة. يتوسطها تفتيش احمر. تظهر في اواخر الصيف ثم تلتق مكنها على اجسام الخيل والبعال والحير. مكنها اسطواني الشكل ابيض اللون دابق الطول يلسق بالشر إلى أن ينثف عن رفاق وشعية الشكل هليية الخد غراء اللون، هليية ينثف في الجلد فينبهه ما يدعو الدابة إلى لحسه فتعلق البرقة بالسان الذي ينقلها إلى الحلق ومنه تسير إلى المددة حيث تستقر بين طياتها الحاطية إلى أن تم انسلخاتها التي تدوم نحو عشرة اشهر فتخرج مع الروث وتتسول إلى كزود صليجية الغلاف يحجبها من ٣٠ إلى ٤٠ يوما ثم تنشق الصليجة عن الحشرة الكاملة فتظهر وتعيد سيرتها المذكورة.

## ٢٨٤٨٠ - نِيرِيَّات، شُعْرَانِيَّات

*Cestridae* (S). *Cestridae*, *Bot-flies* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم، هليية الجسم، أثوابها إلى الخنطي المزركش بالاسمر والاسود. خطمها قريب الشبه من خطم النحل. اشترها بكتلها خالية من جهاز الوخز والرز. رفاقها طفيلية. بعضها يتطفل على الدواجن وأعصابها الخترات.



نير الضان

## ٢٨٤٨١ - نِيرِيَّة \*

*Nebria* (S).*Nébrie* (F). *Nebria* (E).

جنس حشرات نافعة مقترنة من فصيلة النيريدات. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ إلى ٢٠ سم. ألوانها زاهية، اعتمادها حنطية المروج. تعيش على المخاض البحرية تحت الحجارة والانفاض والاختساب. اشهر أنواعها:

*Eurynebria complanata* (S).

نيرية الرمال

*Nébrie des sables* (F).

نيرية قصيرة العنق

*Nebria brevicollis* (S).*Nébrie à cou court* (F).

نير الفرس

## ٢٨٤٨٢ - نِيرِيَّة قَصِيرَة الْعُنُق \*

*Nebria brevicollis* (S). *Nébrie à cou court* (F).*Nebria brevicollis* (E).

حشرة قانصة من فصيلة النيريدات ورنية مغدات الاجنحة. تألف الاراضي المزروعة والبساتين والغابات. قوتها ما تيسر لها من الحشرات والديدان والمروج || جسمها متوسط القد بطول من ١٢ إلى ١٤ سم. نوبها إلى السوداء الحليدية اللامع. رأسها مشعر الجرم، قصير العنق، فكها ضليعان. زباناها خيطيان. عيناها صغيرتان. ثماني التحزيز العنقي النظامي المخطوط. ارساغها خابية المغل || الاثن اصفر قدماً من الذكر ورايت نوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف. تسرح في التبار. تسافه في آب. تمتع المكن تحت الجحالة والعليل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسمودي تطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، سداسي الرواجب، اسمر اللون، اسود الرأس والشرج والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٥٠ إلى ٦٠ يوما ينقضي في بيش عودي الفور تحفره البرقة على عمق ٥ أو ٦ سم.



نير باسوري



نيرية قصيرة العنق

## ٢٨٤٨٣ - نِيرِيدِيَّات

*Nebriidae* (S).*Nébridiés* (F). *Nebriidae* (E).

فصيلة حشرات نافعة مقترنة من ورنية عمدة الاجنحة.

Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzholtz (D). Frangula, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القند تعلمو من ٣ الى ٧ أمتار . فروعها سرحة لونها الى الاسود الازرق المواج تعلوه ريشة ريداء. براعمه عريانة. اوراقه متعاقبة عابطة، تفصلها سباعي او تساعي المروق البارزة. ازهاره خاسية الاجزاء، ابطية الاذنكاز، لا قياسية التجميع . ثماره طيبة . عشيق خفيف الوزن يستخرج منه بعد التفحيم نوع من البارود شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز.

٢٨٤٩٤ - نَبَق الصَّبَاغِين \* ، شَوْكَة الصَّبَاغِين Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno dei tintori (I).

نوع من النبق وهو جنبة شائكة تعلو نحو ثلاثة أمتار . فروعها زيتية اللون ، افنانها جزئية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٥ ، تفصلها الى الخصار الاصفر المواج . عرقها بارزة ملتقبة قليلة العدد. ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها عنابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٨٤٩٥ - نَبَق المَسِيح Nabka (F). هو الصدر ، اطليه .

٢٨٤٩٦ - نَبَق جَرْدِي Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من النبق وهو جنبة كبيرة تعلو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. ساقه عريانة ، فروعها سرحة منتصبة . براعم حرشفية الخمار. اوراقه عابطة ، تفصلها سنن الحافة عروقه بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهاره خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طيبة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٤٩٧ - نَبَق كَلِفُولُونِيَّة Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F).

نوع من النبق ، شجرته صغيرة القند تعلمو من مترين الى خمسة أمتار . ساقه كهباء . فروعها خلية شائكة . اوراقه ابيدة ؛ تفصلها جاند الصفحة ، سنن الحافة . فستى اللون، بارز المروق . ازهاره خلية الاجزاء الحاربية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢٨٤٩٨ - نَبَق لُبْنَانِي Nerprun du Liban (F).

هو الزفرين اللبناني ، اطليه .

٢٨٤٩٩ - نَبَق مَتَرَدَف Alaterne (F).

هو الزفرين الجردى ، اطليه .

٢٨٥٠٠ - نَبَق مَقْدُون Rhamnus pumila (S).

Nerprun nain (F).

نوع من النبق وهو بجلة صغيرة مثقوبة تعيش بين الصخور تعلو نحو ٢٠ سم. ساقها وفروعها متعوجة سرحة . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . تفصلها سنن الحافة بارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٨٥٠١ - نَبَق مُسْهِل \* ، شَجَرَة الدُمْن

Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgirdorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من النبق وهو شجرة شائكة ، ترغب في الارتر البالجسية،

اجناسها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القند او متوسطة. قرونها الاستعمارية ثمانية الفواصل . اناؤها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشطوط البحرية . اشهر اجناسها النبرية .

٢٨٤٩٤ - نَبَقِيس \* Nebris microps (S).

Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . يكثر وجودها قرب شواطئ اليونان || جسمها اهليجي الشكل متدل الحجم والتخطيط يطول نحو ٣٥ سم. ثوبا الى الشبهة الغسية يعقب في الرأس والظهر . تتميز برحابة شدتها وبعصر عيناها || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه.

٢٨٤٩٥ - نَبِش

« شجر ورقه كدروق السنور ارزن من الانبوس خشبه احر تمل منه خماسر الجناذب . وهو اصفر من شجر السنور واشد اجتماعاً » (اللسان) .

٢٨٤٩٦ - نَبِص Poulos (F). Pulse (E).

هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين.

٢٨٤٩٧ - نَبَطَة Extrapoler (F).

استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطالة السلسلة .

٢٨٤٩٨ - نَبَط Nبط البئر : استخرج مامها .

٢٨٤٩٩ - نَبَع

النبع : شجر تتخذ منه القسي ومن اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنابت منه في السفح الشريان وفي الخضيف الشوط . قال مرة : النبع شجر اصفر البود رزينة ثقله الى واذا تقادم احمر . الواحدة نبعة . وفي الحديث ذكر النبع ، قيل : « كان شجر يطول ويعلمو فدعا عليه النبي صل الله عليه وسلم فقال لا اطالك الله من عود فلم يطل بعد » (اللسان) .

٢٨٤٩٠ - نَبَع ، قَطْع Polliniser (F).

To pollinate (E).

نبح وقطع وأبر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٨٤٩١ - نَبَاتِيَّات Albugées, Cystopées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصناتيات ، تتميز بمشج خلويي بيتي مجهز بمراشف حوصلية . تكاثرها خيطي ، خارجي ، مستقيم الانشعاب ، سبجي الرصف البويضي . انواعها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى البناغ .

٢٨٤٩٢ - نَبَق Rhamnus (S). Nerprun (F).

جنس اشجار وجنيات حرجية من فصيلة النبقيات . انواعها نحو ٦٠ معظمها شائك الاغصان والافنان . اوراقها متعاقبة ، منتقبة ، بسيطة . ازهارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خوخية صغيرة القند || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٨٤٩٣ - نَبَقِ اسود \* ، جَلْثَم ، عَوْسَج اسود

Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de chien (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نبريس



نبق اسود



نبق الصباغين



نبق مسهل

## ٢٨٥١١ - نَبِيخة

صوت التيس في زمن السفاد . يقال نبّ التيس .

## ٢٨٥١٢ - نَبِيخة

Plantule (F). Small plant (E). هي البتة الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

## ٢٨٥١٣ - نَبِيخة

Curure (F). Dirt, Muck, Sewage (E). هي الاعشاب والارساح والامخا والاصواع التي تستخرج من البئر والحوض والقناة عند تنظيفها .

## ٢٨٥١٤ - نَبِيخة \*

Monodonta (S). Monodonta, Labio (F). Monodonta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل فصيلة المديبيات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداقها شبه قبة الشكل ، صغرة القد ، بحلة الالوان الزاغية المرقوشة او المنطقة بالاسود والابيض . فوطاتها نصف دائرية الانفراج ، حمزة الخمار الداخلي ، مجهزة بنتو صغير شبيه بالنس او بالنب || اجسامها محزنة . رؤوسها صغرة ثنائية اللوامس اغروموية المعينة . ارجلها مهدبة الحمار . اسفاطها قرنية المادة .

## ٢٨٥١٥ - نَبِيخة \*

Dothidella (S). جنس فطور مجهرية من البياضات وفصيلة المشويات . اجسامها ميمية لا قياسية ، تكاثرها مركزة على حافة الرنبية الجلية الجول ، وبؤها بيضي الشكل شفاف || اعرف انواعه الثلاثة التالية .

## ٢٨٥١٦ - نَبِيخة الكشمش \*

Dothidella ribesia, Plowrightia ribesia (S). فطر مجهرى يركب سوق الكشمش فيقطعها ويسبب بياها . مظهره الخارجي غضن مستطيلة حنطلة اللون تملو حلاء الفروع فتسبب تخفدها وتشقيها ثم بياها . || يكافح بقطع وحرر الفروع الموبدة وينفخ الاشجار بسائل يورده للحلول ١٪ .

## ٢٨٥١٧ - نَبِيخة المطاط \*

Dothidella uteli, Scoleotrichum heveae, Fusicidium macrosporum, Passalora heveae (S). فطر مجهرى يصيب المطاط فينتج انتاجه بعد ان يؤذي جميع اعضاءه الهوائية || مظهره الخارجي يقع زيتية تبتدئ صغرة ثم تكبر وتسبب يباس التسبب المطرب فيبدو التصل كالغرابال . وقد يركب الانزاع والثار فيؤذيها ويكتنف الاغصان فيلطمها يقع قرصية سود || اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق والاغصان لانها تزر في انتاج المطاط . يكثر في الاراضي الرطبة الواقعة في الاقاليم الحارة . يكافح بتعفيض التربة وباستعمال احد الفطائر الغفالة .

## ٢٨٥١٨ - نَبِيخة النفل \*

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinicum trifolii (S). فطر مجهرى يصيب اوراق النفل ، على اختلاف انواعه ، فيقطعها ويسبب بياها || مظهره الخارجي نكت سود مستترة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب التصل على صمغته السفل . تظهر وتتكاثر في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تعود الى نسبة عطب الاوراق .

تتلو من مترين الى سبعة امتار . فروعها وانفاتها شائكة الاطراف . اوراقها وانفاتها متقابلة . نصال اوراقها يضيضة الشكل مقطوعة طويلا من ٥ الى ٩ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ ، عروقها بارزة ملتفة . اضرارها خشوية ، خاصة الاجزاء ثامرها طيبة تستعمل في عدة علاجات بيطرية وفي سوداء اللين ، بنفسجية اللباب الحوضي || اضراره يستمر من ايار الى حزيران .

## ٢٨٥١٢ - نَبِيخة

Rhamnaceae (S). Rhamnaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلتين كثيرة . الفعالات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطائها جبال وعصاف البلاد الممتدة الحرارة والحارة . اشهر اجناسها البلق والغباب . نباتاتها مجهرات وسنبات . اوراقها لا قياسية التشكيل ، منسها البسيطة والمركبة . اضرارها ابطية خشوية او ثنائية المسكن . ثامرها لحية منها المأكولة وبعضها طيب وصناعي .

## ٢٨٥١٣ - نَبِيخة

Souche (F). Stump (E). النبكة هي الجرثومة كقولك نبكة الشجرة اي جرثومتها . ج نيك ونوك .

## ٢٨٥١٤ - نَبِيخة

Nebalia (S). Nébalie (F). Nebalia (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا رقبات الصدف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواع التي تكثر فيها الرحول البحرية والاسمال || اجسامها صغرة قرنية الشبه بالقريدس . عيونها منزدة . قوائمها الصدرية متساوية القد ، ثنائية الخادف .

## ٢٨٥١٥ - نَبِيخة \*

Sagitta (S). Flèche (F). Sagitta (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة الريانوات . انواعها المروفة قليلة العدد . جميعها ميمية . اعطائها بحار البلاد الحارة والممتدة الحرارة . اسرارها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشعية الشكل ، هلامية المادة ، شفافة . افواها غطسية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها مغلوقة .

## ٢٨٥١٦ - نَبِيخة

Népenthe (F). نبات يعرف بالوس ، اطلية .

## ٢٨٥١٧ - نَبِيخة

Flore (F). Flora (E). جراج النباتات في قطر او بلاد . يقال نبوت لبنان ونبوت الشرق الادنى ، الخ...

## ٢٨٥١٨ - نَبِيخة مائية \*

Flore aquatique (F). Aquatic flora (E). النباتات التي تعيش في الماء او في الخناق .

## ٢٨٥١٩ - نَبِيخة

Végétatif (F). Vegetative (E). نعت تربي يذل على المقدور الانباتي .

## ٢٨٥٢٠ - نَبِيخة

Forjet, Forjeture (F). Projection (E). النور ننو غير عمودي يحصل في البناء . او ننو غير مستقيم يحصل في التخيط .



نبلة



نبخة



نبخة الكشمش



نبخة النفل

Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نَبَاج

التاج مجموع ما تقصه اثنى الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع بحيل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نَبَاج

اسم يشمل وضع جميع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نَبَاج ، نُحُوح ، لَتَى

Exudate (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نَبَاق ، حَيَال

بني داره نَبَاق داري أي قبالتها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نَبَالَة ، نَعَل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدنيا من الكاثر في حالة فقدانها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نَبَاح

Transpiring (E).

رشح الافرازات المائية الزائدة عن حاجة النسيج الحيوانية والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نَبَرَجَة

تفاعل جرثومي كياوي يحول الازوت العضوي الى امونيا في فينيري فينيراني ولا يتم الا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النبرجة على ثلاثة أنواع لثلاث حالات .

Nettastoma (S).

٢٨٥٣٦ - نَبَسْتُوم

Nettastoma (F). Nettastoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشقيات مفتوحات المانة . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة كاجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . حناطها مستطيلة ، مقطوعة الاطراف الفظيضية الشكل . اشدافها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتلتحم عند طرف الذنب || اعرف انواعها واشهرها تنسوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَبَسْتُوم اُرْبَد رَصَاصِي \* ، نَبَسْتُوم

Nettastoma melanura (S). المَبَسُوط

Nettastoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nettastoma melanura (E).

سمكة بحرية بيوض من النستوم . اعطائها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك المجامع والتفاف . مسرحها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ مترًا || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والراس والخطم ، يطول نحو ٨٠ سم . مسكها عادم الحراشف وتشاء مادة مخاطية لزجة || ثوبها الى اليردة الرصاصية الفضية المواجه || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجود من لحم الانقليس .

Radicle (F). Radicle (E).

٢٨٥٣٨ - نَبَش ، نَبَش

جذر البزرة الجنيني .

Perspiration (F). Perspiration (E).

٢٨٥٣٩ - نَبَع

التنع صدور التنج من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينشأ منه الجلد كما في العرق .

٢٨٥١٩ - نَبِيدِيَّات ، نَبِيدِيَّات

Nabidae (S). Nabidés (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبيعة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البسيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة معتقة . اخطائها رباعية الاجزاء . عيونها جانبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حناطها صغيرة محرمة . حناجيبها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصر . رواشها لاحفة . قوائمها نشيطة || جمع انواعها خاضعة تعيش على اوراق النباتات البرية .

Vin (F). Wine (E).

٢٨٥٢٠ - نَبِيد ، خَمَر

شراب كحولي يحصل من اختار عصير الثمار اغصها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيد الإِجَاص ، نَبِيد الكَمْثَرِي

Polré (F). Perry (E).

شراب يتخلص من عصير الاجاص .

٢٨٥٢٢ - نَبِيد العَسَل

شراب يستحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

Fromage (F). Cheese (E).

٢٨٥٢٣ - نَبِير

هو الجبن ، تقول اكلت النبير .

٢٨٥٢٤ - نَبِيس الخَلَنَج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجرم ، بني اللون ، احمر المراج . خطمها معتدل الطول ، طليق . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان مستطيلان . كوسلها بني مزركش بالاسود . حنجرتها صغيرة سوداء . ظهوراتها لاحف ، وردي اللون . نبطها اسمر المذب . قوائمها مستطيلة || تألف المراج . قوتها اوراق الخلنج والقطلب ...

٢٨٥٢٥ - نَبِيس قَقْرِي

Nabis ferus (S).

Nabis sauvege (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبدييات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حنطي اللون ، اسمر المراج . خطمها طليق ، معتدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها الى الحنطي الاسمر . حنجرتها صغيرة سوداء . ظهوراتها لاحف ، حنطي اللون ، وردي المراج . اسود العروق والاعاصيب . نبطها اسمر . كثيف العمل والزغب . قوائمها مستطيلة ، حنطية || تألف البراري والمراعي . قوتها اوراق الاعشاب على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيفَة

النبيقة زعمة الكرمة اذا عظمت . ج نباتي .

٢٨٥٢٧ - نَبِيسَة

هي الورقة التي اعترتها النباكة .

Omboon, Protubérance (F). نُتُو ، نُتُو

Umbo, Protuberance (E).



تنسوم المتوسط

## ٢٨٥٥٣ - نَثْرة

النَثْرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها أيضاً أنف الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملوها تلطيخ غير كأنه قطع محاب || رقب النَثْرة يدعى سمد الذابح .



نوم اشبه

٢٨٥٥٤ - نَطَط Levée (F). Gathering (E).  
هو اول ظهور النبات بعدما يصدع التربة ويقل أن يجلها .

٢٨٥٥٥ - نَتُور Prolifique, Multipare (F). Multiparous (E).  
صفة الحيوان الكثير التاج || انثى الحيوان تلد عدة اولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَثِير Ebrouement (F). Snorting (E).  
النثير هو عطاس الدواب . تقول نثرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَقِيط Embryon (F). Embryo (E).  
هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا Naja (F).  
في الصل ، جنس حيات خبيثة من امميات الاخايد .



نجر

٢٨٥٥٩ - نَجَاب Corticicole (F). Bark miner (E).  
النجاية هي الحشرة التي تقضي الدورة البرقية من حياتها داخل لحاء الاشجار .

٢٨٥٦٠ - نَجَار Lactarius lactarius (S).  
Lactaire, Lactaire pêche-laie (F).  
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقمريات . موطنها البحر الاحمر والخليج وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مقنطوم ، زعنفتها الشرجية فارقة . ثوبها الى الخضار القضي المالح . لحمها لذيذ الطعم جيد الصنف .

٢٨٥٦١ - نَجَافَة \* Pelamis (S).  
Pélamis (F). Pelamis (E).  
جنس حيات خبيثة سامة من امميات الاخايد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزوانية الشكل . رؤوسها صغيرة مخروطية الشوذن . اذناها مبطنة عجايدية . اثوابا ثنائية اللون ، النصف العلوي عايد الخضار الاليس او الازرق الاسود والنصف السفلي الى الريدة . اذناها مرقوشة .



نَجَافَة

٢٨٥٦٢ - نَجَال Dactyloctenium (S).  
Dactylocténion (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المروفة سبعة . منها بعض اقالييم البلاد الحارة من الشرق الاذل واfrريقية الشرقية || جميع انواعها شطئية . عصفها ضيق مستطيل ، يكثر فيه التسنين الدقيق الحاد . ازهارها طري مكنل ، لبد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة Agrostology (F).  
Agrostology (E).  
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

## ٢٨٥٤٠ - نَتَل

النَتَل والنَتَلُ بيض النعام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَتَلَة Bourse (F). Purse (E).  
هي الابنة النورية استكملت جرمها المميز .

٢٨٥٤٢ - نَتُوج Pleine (F). Full part (E).  
التزوج : الحامل من الدواب وجميع الحافر .

٢٨٥٤٣ - نَتُوم Neotoma (S).  
Néotome (F). Neotoma (E).  
جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفأريات . انواعه المروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الامريكية . تألت الموامق القريبة من الماء . قوتها المواد النباتية والصنفاذ وبعض الثريات اعصها السرطان || اجسامها ربعة متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرذون وبالقناد في آن واحد . اثوابها تختلف مع الانواع || تحلل اجسامها في الهوم وفي مؤلفه من انفاق مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعرض الانفاق من البين والبسار عدة دهاليز تحزن فيها مؤنة الشتاء || الاثان قطع من ٤ الى ٨ ادراس ترضعها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعه واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَتُوم أَشْهَب \* Neotoma cinerea (S).  
Néotome (F).  
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الشبهة يسمر بعض النثر في الرأس والظهر ويغير في البطن . وبره متدل الطول . ذنبه جشيل يشبه ذنب السنجاب الا انه اقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَتُوم فلوريدا Neotoma floridana (S).  
Néotome de la Floride (F).  
طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الريدة السمر . بطنه الى الريدة البزراء ، وبره نام قصير . ذنبه حشفي القشار عادم الورب .

٢٨٥٤٦ - نَتِيجَة Conclusion

٢٨٥٤٧ - نِثَاف Onguent (F). Unguent (E).  
المرهم ينث به الجرح .

٢٨٥٤٨ - نِثَار ، نَثَر Fécondité (F). Fecondity (E).  
كثرة التاج في البائم .

٢٨٥٤٩ - نِثَالَة Déblai (F). Clearing, Cutting (E).  
تراب الزكية يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نِثَد Pointer (F). To point (E).  
نثد : نبت ، يقال نثد الفطر ونثدت الكماء : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَثَر Epandre (F).  
نثر الشيء : ذره بالسائي . . To scatter, To strew (E).

٢٨٥٥٢ - نَثَر الأسمدة Epandage des engrais (F).  
Scattering of fertilizer (E).  
هو ذر الاسمدة على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Etoile polaire (F). **نَجْمَةُ الْقُطْبِ** - ٢٨٥٨٠

Pole-Star (E).

نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين  
تنبى عليه القبلة .

Ostracionidae (S). **نَجْمِيَّات** - ٢٨٥٨١

Ostracionidés (F). Ostracionidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة ملحومات الفكوك اجناسها  
وانواعها عديدة ، اشهرها أبو صندوق .

Aster (F). **نَجْمِيَّة** - ٢٨٥٨٢

هي الأسطر ، اطلبه .

Nutrition (F). **نَجُوع** - ٢٨٥٨٣

راجع مادة اغتذاء .

Stelleridae (S). **نَجْمِيَّات** - ٢٨٥٨٤

Stelleridés (F). Stelleridae (E).

شعبة حيوانات من صف الثوكيات يشمل نجوم البحر .

**نَجِير \* سَقُون** - ٢٨٥٨٥

Agropyrum junceum (S). Agropyre, Froment des  
jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binen-  
weizen (D). Agropiro (I).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة النجيليات.  
يكثر بين الزروع وفي الاراضي المذمسة وعلى جوانب  
الطرقات الريفية .

**نَجِير زَاحِف \* سَقُون** - ٢٨٥٨٦

Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,  
Chlendent rampant (F). Couch grass, Qultch grass,  
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).  
Gramigna, Caprinella (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية  
مدادة نسيطة كثيرة الانعصاب والأذى لانها تثب التربة  
وتيقن الاعمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزدرة ان لم  
يقض عليها .

**نَجِيرَة** - ٢٨٥٨٧

سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **نَجِيل** - ٢٨٥٨٨

جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .  
بعضها يزرع في المروج . اكثرها ينبت عرضاً ويسوء  
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

**نَجِيل أَيْبُس \* أَرْوَا أَيْبُس** - ٢٨٥٨٩

Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Traine,  
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).  
Weisses Straussgras, Floringras (D). Agrostide  
blanca, Pennacchini (I).

نوع من النجيل ونحو نبات مرعوي بري معمر يملو من  
٢٠ الى ٥٠ سم. عصفه ضيق النصل جيل الخضار .  
سبيلاته صغيرة القد، متباعدة النجيل ، يضاء اللون .

**نَجِيل أَحْمَر \* أَرْوَا أَحْمَر** - ٢٨٥٩٠

Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin  
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-  
gras (D). Fieno rosso (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر يملو من ١٠ الى  
٦٠ سم. عصفه مستطيل النصل الجامد . اغداد غليظة  
جووية اللون . سبيله مستطيلة ، سبيلاته متفرقة .

Liber **نَجَب** - ٢٨٥٦٤

الطبقة السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في  
سوق وجذور النباتات الوعائية .

**نَجَبَة** - ٢٨٥٦٥

هي قرصة النمل اي حصن قريته المد لحسن المازن .

Péricarde (F). **نَجْب ، نَجْب** - ٢٨٥٦٦

Pericardium (E). هو الشف ، غلاف القلب .

Coteau, Plateau (F). Slope (E). **نَجْد** - ٢٨٥٦٧

النجد ما اشرف من الارض وارتفع . ج أجد وأجداد ونجد  
ونجد . والنجد المكان لا يجر فيه .

**نَجْد \* نَجْدَة ، زَهْرَة العُجْد** - ٢٨٥٦٨

Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe,  
Buntblättrigenessel (D). Coleus (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه  
المعروفة نحو ١٢ معظمها بري طبي وبعضها زينة .  
سوقها فراء ، تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متعاقبة  
معققة كاملة ، فصالحا قلبية الشكل ، خلية البشرة ،  
مسنة الحافة . ازهارها صغيرة القد ، ضمية التجميع ، عديدة  
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **نَجَر** - ٢٨٥٦٩

نحت الخشب وقصه وتركيبه .

Simulie (F). Simullum (E). **نَجْرَس \* نَجْرَس** - ٢٨٥٧٠

النجرس والنجرس والقنرس : بومض صغير اجزم الأنف  
يشبه السكيت ، لسعه مؤلم .

Transhumance (F). **نَجْمَة** - ٢٨٥٧١

طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral **نَجْمِيَّ** - ٢٨٥٧٢

Déboisement (F). **نَجْف** - ٢٨٥٧٣

Deforestation (E). النجف هو قطع الاشجار من اصوفا وبادتها .

**نَجْفَة** - ٢٨٥٧٤

القليل من الشيء .

Biloquer (F). **نَجَل** - ٢٨٥٧٥

نجل التربة : شققها للزراعة .

Etoile (F). Star (E). **نَجْم** - ٢٨٥٧٦

وبه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ،  
ما عدا الشمس والقمر . وبوجه خاص ، كل كوكب  
نير يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **نَجْم ، نَجْمَة ، مَقَر** - ٢٨٥٧٧

Acaulous, Stemless (E). اسم تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **نَجْم أَحْطَم** - ٢٨٥٧٨

سكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق احطم ، اطلها .

Alétris (F). **نَجْم لَامِع** - ٢٨٥٧٩

هو حشيشة الآخ ، اطلها



نجد



نجرس



نجير



نجير زاحف



نجيل ايبس



نجيل احمر



نَجِيلِ أَرْزَق



نَجِيلِ اسود



نَجِيلِ عَيْن



نَحَام



نَحْبُوبِ النَّاب

وهو لا يتأثر بألوانه الناشف التي إنما يتأثر بألوانه الرطب وبالعنايات الحامضية التي تتلفه ببطء من الإلحاح المختلفة الألوان والتركيب اشبهها الزغار الاخضر السام ، وهو ما يدعو الى « تبييض » اي طلاء الارابي النحاسية المطبخية بالقصدير .

٢٨٦٠٠ - **نَحَال** (F). Bee-keeper (E). Apiculteur (F). من تقاطى تربية النحل .

٢٨٦٠١ - **نَحَالَة** (F). Bee-keeping (E). Apiculture (F). هي فن تربية النحل . وهي تركز على اصول وقواعد لا بد من الامام بها للوصول الى اجود النتائج ولاجتناب اوخم المواقف لا نذكر شيئاً عما يجب معرفته عن النحلة ونظام حياتها وتغليتها او فقيرها إنما يرشد الذين يتباطون هذه التربية الى افضل السبل التي تؤمن استرداد النجاح . اخصها : درس المتلفة لمعرفة المواقف التي تكثر فيها التباينات الغفيرة و تركيز المناهل في الاماكن الصالحة ضمن المنطقة المنتخبة والحفاظ على الثوال قوية ، كثيرة العدد ، امراتها ملكات فتية ؛ منع الافواخ قدر المستطاع ؛ الإبقاء على ما يلزم من عمل في كل غلية او قفير كئذله لفصل الشاء ؛ اجتناب زيارة القفران وتدخينها في شتى المناسبات والظروف العادية .

٢٨٦٠٢ - **نَحَام** ، \* ، **نَحْرُوش** ، **سُرْحَاب** ، **مِرْزَم** ، **نَحَام** (F). Flamant (F). Phœnicopterus (S). واحدته نَحَامَة ، والنحام جنس طيور مائية من فصيلة النحاميات . انواعه ستة جميعها طويلة الاعناق والسيقان الى حد الغفابة ؛ ارتفاعها منتصبة يراوح من ١٥٠ الى ١٧٠ سم . مناقيرها غليظة منقعة صفر الاجسام سود اللامط . اثنائها الى الحرة الوردية الزاغية قوادم سواقطها سود . اثنائها يبيض الريش حر القوادم || اعطاه السواحل البحرية . يألف رقار الماء ومصبات الانهر . يمتص صائب يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ٥٠٠ اثنائها تحفن من ٢ الى ٣ بيضات في عش رفيع تركزه على الحفص تحتضيه طوال مدة الترخيم كما يحتمي الفارس القرس .

٢٨٦٠٣ - **نَحَامِيَّات** (S). Phœnicopteridae (S). Phénicoptéridés (F). فصيلة طير وسيدة الجنس من صفحيات المناقر ورتبة كفاتيا القدم .

٢٨٦٠٤ - **نَحْبُوبِ الْعَاب** ، \* ، **تَطَّاطُ الْعَاب** (F). Nemobius sylvestris (S). Grillon des bois, Némobie (F). حشرة من الجديديات صغيرة القدر رتبة الشكل سودا الرأس صفراء الدرز سمراء الجسم المهبذ والمتعطف بالاسود والاخير . ظنايبها مسلحة بالهلب الشائك الثلاثي التجميع . ظهران ذكورها اسمر اللون يلحف النصف الاول من البطن . ظهران اناثها صغير القدر يكاد لا يلحف نصف الزايم الاول من البطن || يظهر في اوائل الصيف . يألف النابات والارحاج . سرجه يستمر من الشروق الى فحة الليل . يعيش على المواد العضوية . يستكن تحت الجلالة والعليل .

٢٨٦٠٥ - **نَحْبُوسُ شَفَّاف** ، \* ، **تَطَّاطُ عِطَالِي** (F). Ecanthus pellucens (S). Grillon d'Italie, Ecanthe diaphane (F). حشرة من الجديديات متوسطة القدر ، نحيلة الجسم ، معطلة الرأس ، خفراء الثوب الاصفر المواج . طويلا يراوح من

٢٨٥٩١ - **نَجِيلِ أَرْزَق** ، \* ، **نَجِيلِ كَوَكَبِي** ، **سَنَبِلَة** (S). Agrostis verticillata (S).

Agrostide verticillée, Trainasse (F). Switch grass (F). Haargras (D). Granacino (I). نوع من النجيل المرجي المرعوي المعمر . يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . عصفه عريض النصل المستطيل . اعماه جادة ، مابقة الخضار . سنابله كبيرة القصد ، شديدة الاخضرار البنفسجي المواج .

٢٨٥٩٢ - **نَجِيلِ اسود** (F). Agrostis vulgaris (S). Agrostide commune (F). Bent grass, Black quitch grass (E). Rotes Straussgras (D). Agrostide volgare (I).

اشهر انواع النجيل وأضيها وهو من النباتات المعمرة الجذمورية المدادة المؤذية التي تميش وتتكاثر في جميع الاربة اخصها المروية . اضراره تشمل التربة وما عليها من نبات . || استئصاله من التربة واجب رغم صعوبة تحقيقه .

٢٨٥٩٣ - **نَجِيلِ عَائِق** (F). Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Agrostide nébuleuse, Foin capillaire (F). Cloud grass, Bird grass (E). Prachtvoll (D). Agrostide capillaire, Erba d'ucello (I).

نوع من النجيل المرجي المرعوي يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . عصفه عايق الخضار . اعماه جادة . سنابله كثيفة التجميع فسخة .

٢٨٥٩٤ - **نَجِيلِ عَطَر** (F). Flouve odorante (F). هو الانتروكسانت ، اطباء .

٢٨٥٩٥ - **نَجِيلِيَّات** (S). Graminées (F). Graminaceae (E).

فصيلة نباتية من وسيدات الفلقة . اجناسها ٣٠٠ وانواعها ٣٥٠٠ ، معظمها اشباب حولية وبعضها جذموري معمر . سقها قضيبية جوفاء السلايات . اوراقها شراشية عصفية مستقيمة المروق . ازهارها باكثرها سبيلة التجميع . ثمارها حبوب غنية بالمواد النشوية . واليها تنتمي اهم النباتات الغذائية والمغذية كالقمح والذرة والارز والشعير والخرطال الخ ...

٢٨٥٩٦ - **نَجِين** (F). Néogène (F). ما كان حديث العهد من طبقات الارض السطحية ، اطلب نيوسين .

٢٨٥٩٧ - **نَحَار** (F). Embryogénie (F). Embryogeny (E).

علم يبحث في تغتلت المراحل التي يمر بها الجسم الحيواني او النباتي من حين تكوينه الى تمام كماله .

٢٨٥٩٨ - **نَحَارَة** (F). Embryogenèse (F). Embryogenesis (E).

النحارة علم يبحث في اصل الملقوسة وفي الاجزاء التي تتكون منها .

٢٨٥٩٩ - **نَحَاس** (F). Cuivre (F). Copper (E).

معدن جزوي اللون اسفج المواج يتميز بقابليته للتحرق والسحب وبايصاله للحرارة والكهرباء || يدعى (نح - نح) (Cu) وزنه الانثوي ٦٣,٥٧ ، ثقله النوعي يراوح من ٨,٨٥ الى ٨,٩٥ ، صلابته من ٢,٥ الى ٤ ؛ ينصهر في ١٠٧٥°س .

- Apis fasciata (S). نحلة مصرية  
Abeille égyptienne (F).  
Apis indica, A. dorsata (S). نحلة هندية  
Abeille indienne (F).  
Apis cecropia (S). نحلة يونانية  
Abeille grecque (F).

٢٨٦١٠ - **نَحْلَة**  
النحلة كوكبية نجوم موهبا الجنوب مركزها تحت قديم  
قطبوس بين كوكبة الحراة وكوكبة الصليب . عدد  
نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .

- Apidae (S). ٢٨٦١١ - **نَحْلِيَّات**  
Apidae (F). Apidae (E).  
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - **نُحُور**  
Diverigation  
هو الانتداد الانقباضي عن الشكل الجسدي المعروف .  
اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخصها الاوصام وفعالية  
الادوية ومدى تأثيرها في التسبب المنسية .

٢٨٦١٣ - **نَحْوَص**  
Anesse pleine (F).  
النحوص هي الاقان الوحشية الحامل . ج نحص ونحاص .

٢٨٦١٤ - **نَحْي ، سَكْوَة ، سَقَاء**  
Baratte (F).  
Churn (E).  
وعاء تمخض فيه الكتانة لاستخراج الزبدة .

٢٨٦١٥ - **نَحْيِيَّة**  
Cadre (apic.) (F). Section (E).  
لوح من الشمع المصنوع يحمضه اطار من خشب يوضع  
في القفص فيشيد النحل عليه تخاريبه ويمر اقرابه .  
ج تحت .

٢٨٦١٦ - **نَحْيِيَّة**  
Substratum  
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

٢٨٦١٧ - **نَحْيِص**  
Amorphe (F).  
Amorphous (E).  
عديم التبلور ، غير محدد الشكل .

٢٨٦١٨ - **نَحْيِلَة**  
Abre petit (F).  
هي الاربوس العطر ، اطليه .

٢٨٦١٩ - **نَحْيَابَة**  
Sélectivité (F). Selectivity (E).

٢٨٦٢٠ - **نَحْطَاس ، جَنْبَل**  
Maquignon (F).  
Horse-dealer, Horse-coper (E).  
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نحطاسة وجنبرة .

٢٨٦٢١ - **نَحْطَاشِش**  
Oües (des poissons) (F). Gillis (of fish) (E).

هي في الاسماك الحفروق الفرجية التركيب القائمة عند مؤخر  
جانبي الرأس . وظيفتها صرف الماء الذي ترتشفه الاسماك  
بمقاطعتها عند التنفس . الواحد نخشوش .

٢٨٦٢٢ - **نَحْطَاع ، نَحْطَاع**  
Moelle (F). Marrow (E).  
يقسم النحاع الى ثلاثة اقسام : النحاع العظمي او رَم  
العظم والنحاع الشوكي او الحبل الشوكي والنحاع المستطيل .  
فالنحاع العظمي نسج دهني يحمضه السمحاق الباطن ،  
يوجد في تجاويف العظام وفي ثناياها الاسفنجية وهو على  
نوعين ، ابيض اغبر مركزه في تجاويف العظام الطويلة واسمر  
احمر المواج مركزه في فجوات الثنايا الاسفنجية || اما

الى ١٥ م . ظهرنا شفاف يطول عند الذكر من ١٠  
الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خطيئة  
الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى  
٩ م . مرز الانثى جالس الانتصاب يطول من ٦ الى ٨ م .  
يظهر النحوص الشفاف عند اوائل الصيف . يأنف الاغفال  
والاعشاب الرقيقة . اناته ترز السرة في سوق ونبوع  
النباتات المختلفة اخصها الاقسن والحشفت والشنداب  
والبرواق والحيويات على اختلاف انواعها والتنع وسروع  
الكركمة || دباهه ونعيقاته وحشرات الكاملة تعيش على  
اوراق النباتات والمواد العضوية || مسرعه دجوي يستمر  
من الغروب الى الفجر .

٢٨٦٢٦ - **نَحْص**  
Piedmont (F).  
اصل الجبل وصفحه .

٢٨٦٢٧ - **نَحْص**  
Asepsie (F).  
Aseptic methods, A. treatment (E).  
مجموعة الطرائق العلاجية التي تستعمل الميكروبات دون  
الاستمالة بالعوامل المضادة لها .

٢٨٦٢٨ - **نَحْطَلَة**  
هي اللهجة ، اطلبها .

٢٨٦٢٩ - **نَحْل**  
Apis (S). Abeilles (F). Bees (E).  
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النحلويات ورتبة غشائيات  
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة ، اعطائها العام . قوتها  
الكبير ورسوق الاضرار . اجسامها اسطوانية الشكل .  
عيونها مركبة ، اعطائها قارضة لاعقة . صدرها نشيطة  
تعمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة  
من عدة حلقات وبرجات تنتهي بشذام لامع عند الامعات .  
والنحل يعيش عيشة اشتراكية تعاونية في مستعمرات مستقلة  
مؤلفة من ثول قوامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥  
سنوات وظيفتها منح السرة . جسمها مستطيل الشكل عديم  
الحلم الاذن مما يمنحها عن تناول الغذاء تلقائيا وما يدعو  
وصيفاتها الى تزويجها المستمر . ثم البيخور وهو الذكر  
الذي يركم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت له اثرها .  
وبالخير لا يقل عددها في الثول الواحد عن بضع مئات ،  
وهي اكبر حجما واغظل جسما من الامعات وهي عادمة  
الشذام اللامع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش  
ما تحية الامعات . ثم العاملة وهي اثني ناقصة التركيب ،  
عادمة الشوار الجنسي ، وظيفتها جني الرقيق والطعم وصنع  
الدنج والشمع والعسل وحراسة الخلية وتدير شاتها وشان  
الحضنة والسمي . وهي مجوزة بشذام لامع تستعمل للدفاع  
عن النفس . والامعات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل  
اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وهي  
تعيش من ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث  
تعيش نحو عشرة اسابيع . || اما اشهر انواع النحل فهي  
ما يلي :

- نحلة ايطالية  
Apis ligustica (S).  
Abeille italienne, A. ligurienne (F).  
نحلة سوداء ، نحلة مدغسقر  
Apis unicolor (S).  
Abeille noire, A. de Madagascar (F).  
نحلة سيفانية ، نحلة عربية  
Apis arabica (S).  
Abeille arabe (F).  
نحلة شائعة  
Apis mellifica (S).  
Abeille commune (F).  
نحلة صينية  
Apis socialis (S).  
Abeille de Chine (F).



نحوص شفاف



نحور

نحل



نحية



وأوراقه حازمة مطهرة وباسطة عند الاكثار منها || تنوره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨١٣٣ - **نَحْرُط الصَّبَاغِين ، عَظْلِيم ، عَظْلِيم**  
Baptisia tinctoria (S). Baptisia tinctoriale (F).  
نوع من النخرط الزراعي الصباغي . جذوره غليظة مستطيلة . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه معتقة ، مركبة ، ثلاثية الورقيات . وريقاته فضية منتعكة مسوطة ؛ تصلها مالمس البشرة ، عابق الحصار . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، متوسعة القد ، صفراء اللون || جذوره صباغية ، غصنها أزرق اللون كثائيلة || تنوره يستمر من تموز الى آب .



نخرط

٢٨١٣٤ - **نَحْرُط مَثْقُوب** (S). Baptisia perfoliata (F).  
Baptisia perfoliata (F).  
نوع من النخرط الزبيني الممر . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، مثقوبة ، مستدرة الشكل ، مالمس البشرة . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنوره يستمر طوال شهر آب .

٢٨١٣٥ - **نُحْرُوب** (F). Alvéole, Cellule (F).  
Alveolus, Cell (E).  
هو عين الشهاد المسددة الاضلاع التي يصنعها النحل ويمتج فيها سره او يضع فيها عسله . ج نخراب .



نحرية الارز

٢٨١٣٦ - **نَحْرِيَّات ٥ ، رُهْبُونِيَّات ٥**  
Tilletiaceae (S). Tilletiellaceae (F). Tilletiaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بغطائها اللائسية التركيب والانتظام . دعائما بسيطة لا وثرية ، بونياتها عديدة فردية التجميع او مدفوعة || اشهر اجناسها : الانتوريز ، الالتيوليه ، التليقة ، الطاعول ، الميلاونوتيوم ، النخرية ، النيويوسيه .

٢٨١٣٧ - **نَحْرِيَّة ٥ ، رُهْبُون ٥** Tilletia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخرات يركب عدة نباتات اخصها نباتات الفصيلة التليقية . || جرمة وثلاثة يتميزان بدعيات قصيرة غليظة مدفوعة البويغات . بوطه اسمر اللون كرهية الرائحة يبدو مملكا لرجا ثم ينمد فيصبح كالهاب || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨١٣٨ - **نَحْرِيَّة الأَرَز ٥ ، رُهْبُون الأَرَز ٥**  
Tilletia horrida (S). Carle du riz (F).  
فطر مجهري يصيب الارز فيؤذيه . اعطاه فسيحة الارجاء تشمل البلاد الاسيوية والامريكية . || يركب بعض ازهار المتكول فيموتها الى بؤرة بولية تنفجر عن غبار لزج كثيف ثورته الى السرة الفحمية يتدل كالخيوط المسترقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويتطاير . اضراره زهيدة لا تتسبب المكافمة النباتية اما يحسن مداركة البذار باحد العلاجات الواقية كغفليس الشلب في بعض مركبات الزئبق او الفرمول .



نخرية الحنطة

٢٨١٣٩ - **نَحْرِيَّة الحِنَطَة ٥ ، رُهْبُون الحِنَطَة ٥**  
Tilletia tritici, T. caries, Uredo caries, Lycopodon tritici (S). Carle du blé, C. du froment (F). Stinking smut (E). Stinkbrand des weizens, Steinbrand (D).  
فطر مجهري يصيب الحنطة على اختلاف انواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيموت

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد الى القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الاولى . وهو ضفيرة من الالياف العصبية وظيفته نقل الاحساس بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها والها || واخيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو أحد أجزاء الدماغ الذي يمين على الجهاز العصبي ويسيطر على تنظيم حركات القلب والتنفس والضغط الخ . وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمر في القسم الباطن والمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨١٦٣ - **نُحَالَة** (F). Bran (E).  
هي الفضلات المتأينة عن نخل الحبوب بعد طحنها لا سباً الحنطسة .

٢٨١٦٤ - **نَحْمَاة** (F). Prune visqueuse (F).  
بادة عضوية طليسية التركيب لزجة تنشي بشره سوق ولوراق بعض النباتات .

٢٨١٦٥ - **نُحْبَة** (F). Select (E).  
Select (F). Select (E).

٢٨١٦٦ - **نَحْتَة** (F). Picoté (F). Peck at (E).  
نحت الطائر الثمرة : تفحرا .

٢٨١٦٧ - **نُحَّة** (F). Bœufs de travail (F). Oxen (E).  
الثقة هي البقر الموامل دون تمميز .

٢٨١٦٨ - **نَحْر ، دَهَب** (F). Nécrose (F). Canker (E).  
داء في نسج النبات سببه فطور طليسية مختلفة .

٢٨١٦٩ - **نَحْر الحَبُوب** (F). Carle (F).  
Brown rust (E).  
مرض فطري يعترى الحبوب لا سباً الحنطة . سبه بعض الفطور النخرية المعجربة . اطلب نخرية .

٢٨١٣٠ - **نَحْرُط \*** (F). Baptisia (S). Baptisia (F).  
False indigo (E). Farberhülse (D). Baptisia (D).  
جنس نباتات عشبية من البداريات وفصيلة القرنيات القرشاية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها صباغي او طبي . اربائها مدادة . سوقها منتصبة . اوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمعتقة والمخاضنة . ازهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حنابل اهليلجية قصيرة القد . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨١٣١ - **نَحْرُط أَبْيَض** (S). Baptisia alba (S).  
Baptisia blanche (F).  
نوع من النخرط الزبيني . ساقه منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطوعة الطرف . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز وابعية ، كبيرة القد ، لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨١٣٢ - **نَحْرُط البَر ، نَيْلَة بَرَّة**  
Baptisia australis (S). Baptisia australis (F).  
نوع من النخرط الطبي والزبيني . جذوره غليظة . ساقه منتصبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية الورقيات . وريقاته اهليلجية مقطوعة ، تصلها مالمس البشرة ، حبل الحصار الزاهي . أزهاره عنقودي التجميع هامي الارتكاز . أزهاره صغيرة القد زرقاء اللون || جذوره

سولية أيضاً وثلاثية التنسین كما في الذکرة، لكن توجيها ثلاثي البتلات المرصومة واسديتها شقية حشرقية بمدقاتها ثلاث وبهي بضيعة الشكل نجمة منفصلة وسماتها لامتلة وثمارها وسيدة البزرة. || اشهر انواعه على الاطلاق هو النخل المعروف اي النخيل .

### ٢٨٦٤٦ - نَخْلُ الدَّقِيقِ \*

Phoenix farinifera, Ph. pusilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم . بينما لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم . سعفه كسفت النخيل واثد اخضراراً . جريده يتحجم عند زامه الاخير . مهده منخفضة سهل الهند الشرقية . يرغب في الاثربة الدبالية المروية . ثماره صغيرة القذ صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جماره ساقه الضخم لبوب نشوي المادة مأكول يقال أنه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهده للترين فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْلُ الدُّهْنِ \* ، نَخْلَةُ الزَّيْتِ ، الْيُوسِ  
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avouira, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalme, Guineische Palme (D). Palma avouira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل ، مهده بلاد افريقية الاستوائية اخضها غليظاً ، ساقه حلقة اللحم مرطاه . سعفه ريشي التركيب . ثماره نوبية الشكل ، جوزية الحجم ، صفراء اللون ، تحضن ثلاث عجات يستخرج من لها دهن اصفر عطر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام عجلها سمن نباتي ابيض اللون يستعمل للأكل .

### ٢٨٦٤٨ - نَخْلُ الشَّعْنِ \* ، سِيرُوكْسِيلِ

Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جنس نخل امريكي . انواعه المروفة قليلة . سوقها ريفية تملو نحو ٤٠ الى ٥٠ سم . سعفها يشبه سعف النخيل لكنه يطول نحو ٦ امتار . يكثر وجودها في بلاد البربر عند جبال الاندل مع مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نوبية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

### ٢٨٦٤٩ - نَخْلُ الْقُطْبِ \* ، نَخْلُ نَاتَالِ

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير القد . جذعه جالس مستقيم يعملو نحو ٣ امتار . ساقه غروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرص السفلي . جريده سعفه يطول نحو ٣ امتار . خوصه بحري اللون تملو شجة غبراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح والنتال . يزرع للترين . يجود في جميع الاثربة ويميل على معطر شواطئ البحر المتوسط . ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْلُ التَّشَا  
Sagoutier (F).

هو السافوتية ، اطلبها .

٢٨٦٥١ - نَخْلُ بَرِّي  
Phoenix sylvestris (S).

Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I). نوع من النخل الكبير القد . جذعه يرتفع من ١٠ الى ١٢ م . سعفه كسفت النخيل ، يزم خوصه مستدق الطرف طويل الهدبة ، لونه الى الخضار الزاهي . || مهده بلاد

كامل البر او بعضه الى كلته من البورغ || وهو لا يعطب السوق لكنه يسبب قصر السلاحيات والشرانف ثم عقر القسم الاعلى من السنايل . || اضراره قد تكون فادحة اذا لامته العوالم الجوية واخصها اعتدال الحرارة او تدنيتها || يكافح باستعمال اجد الفواطير الغالة منها زرينغات النحاس او املاح الزئبق او مركبات الفرميل .

٢٨٦٤٥ - نَخْرِيَّةُ الشَّعِيرِ \* ، رُهْبُونُ الشَّعِيرِ  
Tilletia panicis (S). Carie de l'orge (F).

فطر مجهري يركب جميع انواع الشعير . يكثر وجوده في اربوة الوسطى . || طياسه مستدرة الشكل او يضيعة لوها الى السرة تعلوها مشعة بنفسجية عابقة . اضراره محدودة لا تتجاوز ، في اشد الاصابات ، ثلاث حبات في السلة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخريات .

٢٨٦٤٦ - نَخْرِيَّةُ الشَّيْمِ \* ، رُهْبُونُ الشَّيْمِ

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Carie du seigle (F).

فطر مجهري يسبب الشيلم فيؤذيه . يكثر وجوده في المناطق الباردة اخضها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنايل الملوقة مشعة من الزرقعة البحرية بينما يكون البر اصفر قدأ من المعتاد واغلظ قطراً . || طياسه كروية الشكل او يضيعة . يوفه لبد التصيب ، كرية الريح ، اسود اللون ، ازرق المواج ، دقيق الثبار . || اضراره فادحة تراوح بالنسبة الى المواقع والعوامل الجوية من ٢٠ الى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الخطة ومن الواجب اجتناب زراعة الشيلم في الاماكن الرطبة .

٢٨٦٤٢ - نَخْرِيَّةُ مُتَمَتِّعَةٍ \* ، رُهْبُونُ مُتَمَتِّعٍ

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetens (S). Carie fétide (F).

فطر مجهري يركب بر الخطة في جميع المناطق الحارة والمتندلة المناخ . || طياسه كروية الشكل او يضيعة ، بشرتها مائلة السطح موحجة بالاسود . يوفها كرية الراحه . || اضراره شبيهة باضرار نخرية الخطة تزداد مع ازدياد وطفه الحر . || يكافح مكافحة نخرية الخطة .

٢٨٦٤٣ - نَخْرَ - Térébrer (F). To terebrate (E).

٢٨٦٤٤ - نَخْشُوشُ - Oüies des poissons (F).

Gills of fish (E).

نخشوش ج غناشيش . هي اداة السمع عند الاسماك وهي تقوب قلبية متصلة بالغناشيش من عن يمين الرأس ويساره .

٢٨٦٤٥ - نَخْلُ - Phoenix (S).

Dattier (F). Palm tree (E).

جنس اشجار ليفة من فصيلة النخلات عديد الانواع والفروبي جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جذوعها منتصبه رفيعة او نجمية والجذع عند وجوده يكون اسطواني الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكرنازية وغير المتفرعة . اوراقها سفية طويلة الجريد غليظة الكرب ريشية الشكل . خوصها تجزل التركيب ، ثنائي البزيم اللبني التصل المستطيل المندب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتميز ازهارها بظلمة فناء وكافور بسيط . اما ازهارها غلاظية وقد يختلف تركيبها بالنسبة الى كونها ذكورية او انثوية . فالازهار الذكورية تتميز بكأس سولية الشكل ثلاثية التنسین مع تويج ثلاثي البتلات واسدية شقية وبآبر خيطية منتصبه . || اما الازهار الانثوية فكأسها



نخرية الشعير نخرية الشيلم



نخل الدقيق



نخل الدهن




نخل الشع



نخل القطب

فهرست



- 1 من - 2 لئاک، خلم مرقوش - 3 خلم منکش - 4 من بیچ - 5 لئاک - 6 غیل - 7 من شلال، پرتکوب - 8 لئوس، منک بجر - 9 لئاک - 10 کورکیت - 11 کورکیت - 12 کهد بجر - 13 زوزج - 14 کوس - 15 راکیت - 16 منقار، منقاریل - 17 بافور - 18 بافور لئاک - 19 موقوس - 20 کرکیت، جراد بجر - 21 دشاغ - 22 شیشل - 23 سرطان - 24 خشتاک - 25 خشتاک - 26 ام عود - 27 سرعوة البحر، شیشاک - 28 غرین غش - 29 عشاگر - 30 شیشاک - 31 خیرور - 32 عدنه - 33 عروس - 34 خشتاک - 35 قسوة الیقة - 36 قسوة عمودیه - 37 سالة - 38 سمرین - 39 لئیک - 40 صکة البحر



نباتات حورية وريشة : 1 ثعلبية حبيبية - 2 ثعلبية مرث الهيك - 3 بما ، عصليونية - 4 كريسيس - 5 غالة انابيه - 6 عتكار - 7 غلبيبة منتصبة - 8 غلبيبة جيلة - 9 قوتحات - 10 زينة - 11 شب القبار - 12 ليلاب لغتي - 13 مشور شعري - 14 مشور اصفر ، غيريري - 15 شرة مرث ، الغلبيبة مرث - 16 حبل اسباني - 17 غلر المسك - 18 غلبيبة وريشة - 19 عشتاش كلفورنية - 20 عشتاش - 21 فريجين - 22 زهر الكشكاشين - 23 لسان الزمار - 24 دائره مصريه - 25 بطيه - 26 سلوت - 27 بنديج القاتون - نباتات دولبيبة وعلدوروية : 28 اماريش ، فريجين - 29 تريش الشعراء ، نفو - 30 فريش فريد - 31 فريش طر - 32 فريش بزي ، سراس - 33 ينفوينا زليليه - 34 تا - 35 اعاليا ، دعليه - 36 اعاليا كرويه - 37 و 38 اعاليا ايربوانيه - 39 اعاليا زليليه - 40 اعاليا ايربوانيه - 41 دلوت ملطيع - 42 دلوت الحصاد - 43 دلوت نقي - 44 سون جرمان - 45 سون اسباني - 46 سون شوشان - 47 زعفران - 48 عين الطالوس - 49 عرار - 50 جوشن ، انجيل - 51 زنبق ابيض - 52 زنبق رشيق - 53 زنبق زعفراني - 54 زنبق ، زنب - 55 توليب الزكرين - 56 توليب مكسيكي - 57 توليب فريج - 58 توليب بيشي - 59 عشتار كوكبي - 60 عشتار ايق - 61 حيوان الزمكرين




نباتات معمرة: 1 أروم، 2 ثرياق، 3 جريسة هريسة، 4 جريسة كبيرة، 5 نفيس، 6 قزقل الشاعر، 7 قزقل الزخارين، 8 قزقل صيني، 9 اسطر صيني، 10 اسطر مبدول، 11 كرزانتيميات، 12 كرزانتيم لولبي، 13 كرزانتيم نخعشي، 14 كرزانتيم مزب، 15 كرزانتيم امفغ، 16 كرزانتيم مسطح الزهر، 17 كرزانتيم صيني، 18 كرزانتيم كدن، 19 عتير كشيري، ناعوره، 20 فزان، 21 غريديب ودي، 22 مزار الشمس، 23 رفسية، 24 اسفلويد جودي، 25 هوازيب، 26 ميون كبير الزهر، 27 كرزانتيم صيني، 28 ميون ناع، 29 ميون مشيق، 30 قويسة، 31 جليلان حريضي الورق، 32 فالتة صناعية، 33 ترميتيا، 34 بوكا، 35 عطي، 36 ايلسي اسفر، 37 تيلوفر، 38 عشخاش قنابي، 39 شوكاظة حنوكية، 40 شوكاظة درون، 41 زلفه ليجيمية، 42 زلفه اذان الدب، 43 زلفه يايانبة، 44 زلفه لافرة، 45 رصاصية، 46 ايلجيا مبدولة، 47 ايلجيا ذهيب، 48 شقار اليايان، 49 روح صغير الزهر، 50 روح صيني، 51 دندل، 52 سيم، 53 السمكة، 54 دالوره مشجرة، 55 حشفة، 56 كازا، 56 رعي الهام



البحار والجزيرات : 1 كنبية - 2 لكويه - 3 القوس للحي - 4 صريرة الجدي - 5 درويّة - 6 جلتسان عريان الزهر - 7 كريل - 8 معسل - 9 نزان - 10 بلبية - 11 دوبييه وردية - 12 مغنولية  
كبيرة الزهر - 13 مغنولية جبّة - 14 غلبي ملكي - 15 غلبي الفريدي - 16 ليلك ، نيلج - 17 ليلك معين - 18 سريجة - 19 ملي - 20 دوح بحري - 21 كرز الزهاري - 22 لوز -  
23 شمشول اليابان - 24 ورد قناري - 25 ورد خلي - 26 ورد جا كير - 27 ورد المارشال نبال - 28 ورد ديجون - 29 ورد فرسي - 30 ورد ليلبون - 31 ورد غسبي - 32 ورد كبير الزهر - 33 ورد  
سلوتي - 34 نلب - 35 قفل - 36 ستمية - 37 جلتسان حدي - 38 رمان - 39 ميون - 40 اريترينا - 41 جديكوس - 42 كاسيوم - 43 فوشيا جبّة - 44 فوشيا معين - 45 فوشيا غلقة -  
46 الليمية - 47 ارفلتسا بدولة - 48 ارفلتسا حثكوليك - 49 كاسياليا يابانية - 50 كاسياليا كبيرة الزهر - 51 فسة - 52 طرخون ، مود الهبة - 53 ملكوس - 54 صريرة المرجان




- نباتات تزيينية: 1. نعير الامازون - 2. زركانه جبكر - 3. الكروميوم شروز - 4. الكروميوم لوردي - 5. يابريجي بروليكا - 6. يابريجي كسبر - 7. تيلانديا مطلق - 8. تيلانديا ليند - 9. غريزيه جيب - 10. اخيون، شرويه - 11. تدييه - 12. اسكيتيه - 13. غلوكينييه، سلطان - 14. فرنسيه - 15. فرنسيه - 16. السند، جريانيه - 17. لاجيري - 18. اير تايون، نجره الكوك - 19. يونغلييه، جهتيه - 20. سكي، بخور سرج - 21. زنده الصين - 22. فرنسيه ستل - 23. مرموزه - 24. سنخايه - 25. براسافولا - 26. قطله دوشانا - 27. قطله شغريه - 28. كوريش مزول - 29. يابريه بكال - 30. يابريه بوربره - 31. يابريه ايسو - 32. يابريه سندر - 33. يابريه ريشيلد - 34. دندوب الفرديت - 35. دندوب الزعره - 36. دين كبره الزهر - 37. جويل اصفر - 38. لييه شغريه - 39. لييه ارجواني - 40. ليكاس - 41. فيكله ساعده - 42. مكيله سندر - 43. ميايويه ميمره - 44. ميايويه ميمره - 45. نمافه كبره الزهر - 46. نمافه شغريه - 47. صعد فراني - 48. صليبه كبره الزهر - 49. صليبه طاهره - 50. صليبه - 51. قنده، متجوليه - 52. قنده، صندر - 53. زافده عرقه - 54. بيريلا ملكيه



1 بيريت طيبي - 2 بيريت (كبريتيد الحديد) غشّس الزرّاديا - 3 بيريت (مكسّبات راحة) - 4 بيريت (مكسّبات طليق) - 5 أجد - 6 مرو حارر بعض الذهب - 7 تير ذهب طيبي - 8 تير بلاتين طيبي - 9 نفّات طيبي - 10 زرايخ البريت (بيديكل) - 11 حديد اوليبيتي - 12 سدرور او حديد فغشم - 13 زلك مكبرت - 14 زلك فغشم - 15 رصاص مكبرت - 16 قصدير مأكسد - 17 بيريت النحاس (كلكو بيريت) - 18 منغنيت - 19 نحاس طيبي - 20 دهنج - 21 زنجفر - 22 لازورد شبي - 23 غير او كهرمان اصفر - 24 اسرب ، غرائوت





1 مر صفائف - 2 تورمالين رودي - 3 تورمالين اسود - 4 من الحجر الاسترالي - 5 ماس اسفر - 6 ماس ابيض - 7 ماس ازرق - 8 سفير - 9 زبرجد - 10 فيروز - 11 باقوت احمر ، لعل - 12 من الحجر - 13 زبرجد - 14 جاست ار - جشت شرقي - 15 مرو جمني - 16 زبرجد طيني - 17 يمان - 18 ياق ، مطيق ، انط - 19 شيموليت 1 - 20 شيموليت 2 - 21 سيلان 1 - 22 سيلان 2 - 23 دية من الباغويت - 24 سيلان شرقي - 25 ايجيت - 26 كاسيت نقي - 27 كاسيت ممتلي - 28 جيس - 29 لاصف بنفسجي - 30 ملح ناي



1 بوق البحر - 2 عشب البحر - 3 مردن بحري - 4 عجيرة - 5 أم شوشة ، غلوم - 6 براني - 7 عرطوزة - 8 فيزولوس - 9 مغرقة - 10 سيقاء - 11 صنديرة - 12 خيوة البحر - 13 ترس البحر - 14 ابو جريون - 15 رساس - 16 بنفاق - 17 نوتة - 18 خميرة - 19 قربة - 20 فيشان - 21 انشان (في ابل عهده) - 22 علية - 23 زب البحر السوطي - 24 زب البحر الطائلي - 25 زب البحر التنجل - 26 دقلة - 27 دقة اليم - 28 بلاة البحر الحمراء - 29 بلاة البحر المشبكة - 30 كوكبة - 31 لجة القاع - 32 يفتكرين - 33 كرمات مسيل - 34 عنكوب - 35 رصيفة - 36 لصة - 37 نقاء البحر - 38 عرطون الريل ، شطاة - 39 كركاشة - 40 ام كلاليب - 41 اشارة - 42 فلدوس - 43 ابو مير - 44 بطريل



نخل بُوْتَان



نخل شائك



نخل كرتبي



نخل كناري



نخل معروف

جمارة قلبه المأكولة . ويزرع في المراكز وفي المواق التي لا تخشى الصقيع . ساقه قصيرة . كربة عادم الشوك . سفعه مستطيل الخوص جميل الخصار .

### ٢٨٥٨ - نخل كناري\* ، نخل الجوز الحامض

Phoenix canariensis, P. tennisi (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد، جذعه يعلو من ٨ إلى ٨ أمتار . ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . سفعه مستطيل القد ، كثيف الخوص ، متدلل التحجين الذي يتوسط الزمام الثالث || مهده جزر كناريه ومنها انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط . ضرره عديدة معظمها تزييف سريع النمو يعيش في جميع الأترية وبعضها زراعي يفرس لجي ثماره المأكولة الحمراء اللون .

### ٢٨٥٩ - نخل معروف\* ، نخيل

Phoenix dactylifera, P. excelsior (S). Dattier fruitier (F). Date palm (E). Dattelpalme, Palmbaum (D). Palma, Dattiero, Palmizio (I).

نوع من النخل ، كبير القد ، كثير السعف ، جذعه متسببة السوق المستقيمة تعلو من ١٢ إلى ٢٥ مترًا . جريد سفعه يطول من ٣ إلى ٥ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكراث . خوصه مستطيل اليزم المذهب الهدية ، لونه الى الخضر الازيد || ازهاره عشكولي التجميع عند الذكر والانثى ، عشكولي يدعى افرىضاً ، يبدو عند ظهوره محاملاً بقبابة كبيرة تدعى القنن . اما العشكولي الانثوي الذي يعمل الثمر يدعى عرجوياً . ثمره النخيل مستطيلة الشكل ، لينة السوخذ ، سكرية الطعم ، مأكولة . نواتها زرة خضية قاسية تقطعها شق طولي عميق يدعى التقير . وهذه الثمرة اسم زرقية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانواع . فهي بعد الارام سيابة ثم خلافة فيلحة فنبذلة فبيرة فطيلة واخيراً ثمرة . || اعطانه فحوض البحر الاحمر قصر فليبا فجزائر فراكش . يعيش ايتياً زرع غير انه يفضل الأترية الرملية البدالية بالمواد العضوية والناصر الغذائية كلما ازداد حل النخيل الحولي وانقطع عن المساهنة . || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من اوتال ايار الى اواخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع الساعات الحرارية ، خلال هذه المدة ، نحو ٥٠٠٠ ساعة وعلى ان يكون متوسط الرطوبة الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪ || اشهر ضرره واجودها ما يتبع .

— إريجي — ثمرته تطول نحو ٥ سم . حراء اللون تسهلك جافة .  
— أمهات — ثمرته تطول نحو ٣ سم . شديدة الخلوة تؤكل رطبة وجافة .  
— برنامودا — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تسهلك رطبة وجافة .  
— بنت عيشه — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تؤكل رطبة وجافة .  
— فوري — ثمرته تطول نحو ٦ سم . قليلة الالياف تؤكل جافة .

— جندلا — ثمرته تطول نحو ٤ سم . تسهلك جافة .  
— حلاو — ثمرته تطول نحو ٤ سم . حنطية اللون تصدر بكثرة .  
— حياي — ثمرته تطول نحو ٥ سم . تسهلك رطبة وجافة .

الهند الشرقية ومنها انتشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط . يزرع للزئين . ثماره صنية حامزة .

### ٢٨٥٩ - نخل بُوْتَان\* ، نخل سيكيم ، نخل المتق

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتميز بجلو جريده من الكرناف التاتم بين الساق والكرب، جذعه يرتفع من ٥ الى ٧ أمتار . سفعه رشيق الشكل يطول نحو ٤ أمتار . خوصه عريض اليزم المذهب الطوف || مهده مناطق بُوْتَان وسيكيم من اعمال الهند . وهو من اجل انواع النخل شكراً وإرفاقاً لذلك يزرع للزئين ويوجد منه على بعض شواطئ البحر المتوسط || ثماره حنطية اللون مأكولة لونها يجمعها قنن كبير القد لا يقل طوله عن ١٢٠ سم .

### ٢٨٥٩ - نخل زَنْزِبَار ، نخل مقوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيراً ما يتقوس عند زانه الثالث . سفعه مستطيل القد محجن الجريده . كربة حاد الشوك . خوصه جميل الخضر اللامع || مهده زيزار وما قاليها من القارة الافريقية . وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الأترية الحصية ولا يتأذى من غيرها . يزرع للزئين . ثماره صنية القد . صفراء اللون لا تؤكل .

### ٢٨٦٤ - نخل سَرْدَيْب ، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه يرتفع نحو ٥ أمتار . سفعه يطول نحو ٤ أمتار . كربة شائك . خوصه مستطيل اليزم المذهب ، لونه الى الخضر اللامع || مهده جزيرة سرديب يعيش في حصص وسفوح هضابها القاحلة . يزرع للزئين .

### ٢٨٦٥ - نخل سيام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق . جريد سفعه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه كثيف التجميع جميل الخضر الزاهي . يزعمه مذهب العنقة ، طويل الهدية || مهده سهل سيام الرملية . متطلباته الزراعية قليلة لانه من النباتات العادية وقد يرغب في الأترية الرملية التي لا تخلو من الدبال . ثماره ارجوانية اللون مأكولة .

### ٢٨٦٦ - نخل شائك\*

Phoenix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جذعه متسبب الساق يعلو من ٤ الى ٦ أمتار . جريد سفعه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه جميل الخضر المايق ، يزعمه مذهب شائك . مهده افريقية الاستوائية . يرغب في الأترية الطينية الكلسية ولا يخشى الريحاح البحرية . يعيش على شواطئ البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد ، تحملة الجرم . يسرها مرجاني اللون . رطبها اخر خروي . ثمارها كسني اللون . سكرى الطعم مأكول .

### ٢٨٦٧ - نخل كرتبي\*

Oreodoxa oleracea (S). Orédoxe oléracé, Palmiste franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohlpalm, Kohlrangende, Arekapalm (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. يزرع لجي

royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königs-palme (D). Palma regia (I).

نوع من النخل الزراعي التريبي. جذعه رفيع الساق المنتصب. همرته تاجية الشكل جميلة القالب. سقفه متوسط الطول قليل التحجين. خوصه جيل الحصار الزاهي. طلته كبيرة القد فاشرة. ثماره صغيرة الحجم. ارجوانية اللون، ناشفة السوق، لا تؤكل. جارة قليم مأكولة مستحبة الطعم.

Phoenix paludosa (S). **نخل متقيمي**  
Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القد. جذعه سقفه الساق المستقيمة يعلو من ٨ إلى ١٠ أمتار. جريد سقفه يعلو نحو ٣ أمتار وهو شائك الكرب مجن الزام الأخير. خوصه بجبل الحصار الفسقي. يزيمه مذيب الطرف || مهده منافع اخند القرية وقد يعيش في جميع الأترية الدبالية الرطبة. ثماره لا تخلو من الحلاوة لوها إلى الصفار القاتم.

Phoenix acaulis (S). **نخل تجصي**  
Dattier acule (F).

نوع من النخل العادم الساق. سقفه كبير القد ريشي الخوص. يزيمه صلب النصل، مذيب الطرف، جبل الحصار الزاهي || مهده مرتفعات سهل اخند شرقي. ثمر الكنج || ثماره خرية اللون حاضرة الطعم لا تؤكل. يزود للتزين وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويعود في الأترية الرملية القليلة الرطوبة.

Palmicole (F). **نخلاني ٥** ٢٨٦٦٤

نعت تعريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل أو ينمو عليه.

٢٨٦٦٥ - **نخللة الجوز** هي الكريوت، اطلبها.

٢٨٦٦٦ - **نخللة السكر \***، **أرنغا**

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S). Areng. Palmier areng. P. à sucre (F). Gomuti palm (E). Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت، تكثر زراعته في اخند والكوششين وجاوا وبلغه حيث يستخرجون السكر من ثماره. ساقه منتصبه رفيعة تعلو من ١٥ إلى ٢٠ م. سقفه كبير القد متعاهد الخوص. يزيمه مقطوم الطرف، فصله عابق الحصار || ثماره لبدة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها عصارة سكرية شائعة الاستعمال.

Palmaceae (S). **نخلانيات** ٢٨٦٦٧

Palmacées, Palmiers (F). Palmae, Palm-trees (E). فصيلة نباتية من وحيدات الخلق. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ اعطائها البلاد الحارة والاستوائية من المالمين القدم والبلد. جلدورها وحيدة السوق الرقيقة المنتصبه. اوراقها سغيفة التركيب حامية الارتكاز. ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن. ثمارها لا قياسية الشكل والحجم لينة السوق.

٢٨٦٦٨ - **نخلين** Palmatine (F). Palmitin (E). مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حافض النخل وقد تستحضر بتألف الحامض النخلي مع الفليسرين.

٢٨٦٦٩ - **نخوس** هو الناحس، اطلبه.

٢٨٦٧٠ - **نخيب** Sélectif (F). Selective (E).

— خدأوي — ثمرته تطول نحو ٤ سم. سمراء اللون. جيدة الصنف.

— خلاسي — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافخرها.

— داجانا — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تسهل جافة.

— دجلة النور — ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافخرها.

— زاهدي — ثمرته ذهبية اللب متوسطة القد جيدة الصنف.

— زغلولي — ثمرته كبيرة القد شديدة الحمره فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— سلطاني — ثمرته كبيرة القد حنطية اللون فاخرة الصنف تؤكل جافة.

— سمائي — ثمرته بيضيه الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة ورطب.

— سيدي — ثمرته صغيرة القد شديدة الحلاوة كثيرة الالياف.

— ترابي — ثمرته صغيرة القد تؤكل رطبة وجافة.

— طبرزي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— عجلاني — ثمرته متوسطة القد جيدة الصنف تسهل رطبة وجافة.

— حمري — ثمرته تطول نحو ٧ سم. جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر.

— قسطاوي — ثمرته متوسطة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— كسيه — ثمرته متوسطة القد مشارة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة.

— عجبول — ثمرته كبيرة القد فاخرة الصنف تؤكل رطبة.

— مقطوم — ثمرته متوسطة القد مشارة جيدة الصنف تؤكل رطبة.

— نرساني — ثمرته كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف ترب.

وتمر النخيل ان رطبة او جافة، اي ثمره، غنية بالاملاح المعدنية القلوية التي تعادل حموضة اللحوم والبيض والخبز وهي غنية بالفيتامين (١) ومتوسطة الفتي بالفيتامين (ب) و (د)، اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ. من لب الثمر فهو :

٣٠ ٪ من الماء

٩٥ ٪ من السكر

٣ ٪ من البروتين

١ ٪ من الهلام

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة في الثمر توازي ضعف قيمة السكر العادي.

٢٨٦٦٠ - **نخل مِثْلَاقِي** Phoenix pedunculata (S). Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القد. جذعه اسطواني الساق يعلو نحو ١٠٠ سم. جريد سقفه يعلو نحو اربعة أمتار. خوصه مستعرض كبير يعلو نحو ٣٠ سم. يزيمه جبل الحصار الزاهي ينبت عند زامه الأخير. || مهده جبال اخند الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط. يزود للتزين. ثماره صفراء اللون حنطية المواج غير مأكولة.

٢٨٦٦١ - **نخل ملكي** Oreodoxa regia, Roystonea regia (S). Oréodoxe



## ٢٨٦٧١ - نَخِيرَة

Branchiostome (F).

النخيرة فوعة شبيهة يمكن الخياشيم من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٢ - نَخِيرَة \* ، غُصْرِيَّة النِّع ، لَازِيْدَرْمَة  
Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

حشرة من غديات الإجنحة وفضيلة الغفريات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . لونها الى البني الكستنائي المالح يعلو خل المحل . رتبته قفزة الجسم ، غبراء اللون ، ثنائية الرأس ، مهدبة الظفر والجوابب والأطراف ، تطول نحو ٤ مم || اجبالها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يمر من ٤٤ الى ٧٢ يوماً . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تمتع مكثها افراديا على التئن يقيف خلال مدة ادناها ٥ ايام واقصاها ١٠ . اما البرقة فتعيش من ٣٠ الى ٥٠ يوماً ثم تتحول بعد انسلاخها الثاني الى عذراء ثم الى حشرة كاملة . وهي من حشرات البلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتأتلف الاماكن الآهلة . يرقاتها تتركب التئن ولقاف التئ فتوقع بها الاضرار الجسيمة لأنها تنخرها وتمتطها . تكاثرها بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

## ٢٨٦٧٣ - نَخِيرَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة كالزخف .

## ٢٨٦٧٤ - نَخِيرِل

هو النخل المعروف ، اطلبه .

## ٢٨٦٧٥ - نَد \* ، غُصْرَاء

Epilobium (S).

Epiloba (F). Willow-herb (E). Weidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية خشبية معمرة من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي وبعضها تزييني . منها الاصقاع المعتدلة في جميع البلاد . سوقها فروع ، اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة ، ازهارها رباعية النصل والبيلات ، ثمانية الاسدية ، سنبلية التجميع ، عذرية الارتكاز او هامية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢٨٦٧٦ - نَد \* رَبَاعِي الزَوَايَا ، أَذْتَاب القَطْعَة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulare (F).

نوع من الند البري الميزول . ساقه صلبة عسوية كثيرة الفروع مقلعة رباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رخية النصل ، منشارية الحافة ، نائضة العروق . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره اردوانية اللون وردية المالح . يوجد في الاماكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٧٧ - نَد \* سُنْبِلِي

Epilobium angustifolium, E. spicatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weide-riech, Antonskraut (D). Epilobia a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من الند الزراعي التزييني الميزول . اربوطة مفادة . ساقه فروعاً تملو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، متعاقبة ، نصلها سناني الشكل نائش العروق على صفحاته السفلى . ازهاره سنبلية التجميع هامية الارتكاز . ازهاره قمرية اللون قطرها نحو ٢ سم . ومنه ضروب يبيض ازهارها وموحيه || تنوره يستمر من تموز الى آب .

## ٢٨٦٧٨ - نَد \* صَغِير الزَهْر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زغبية متعاقبة ، نصلها رخي الصفحة مسن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره صغيرة القد وردية اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٧٩ - نَد \* عَفَالِي ، نَد \* قُفْذِي ، عَقِص ، فَرَلُور

Epilobium hirsutum (S).

Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottiges Weidenröschen (D). Epilobio amplicaulo, Peleso (I).

نوع من الند البري الطبي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاشية متعاقبة نصلها كبير القد منشاري الحافة خلي البشرة على صفحتيه . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره قمرية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

## ٢٨٦٨٠ - نَد \* قَسْوَسِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من الند الجلي الميزول . ساقه فروعاً تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسوس . نصلها ضيق الصفحة الجامدة العادمة العروق النائضة . ازهاره عقنودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهاره صغيرة القد حراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٨٦٨١ - نَد \* مَنَظَعِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garofanini di padule (I).

نوع من الند البري الطبي يكثر في المالح والمواع الرطبة . ساقه عسوية فروعاً تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة سنائية مستطيلة . نصلها جامد الصفحة مسن الحافة . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره وردية اللون صغيرة القد . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

## ٢٨٦٨٢ - نَد \* تَعْنَمِي

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoide (F).

نوع من الند البري الطبي الميزول يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه فروعاً تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه نعنعية الرائحة لقياسية الترتيب والشكل مسنة الحافة نائضة العروق . ازهاره سنبلية التجميع . ازهاره صغيرة القد وردية اللون يضاء المالح || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٨٦٨٣ - نَد \* دَاة

Couronne solaire (F).

Solar corona (E).

النداء هي دائرة الشمس .

## ٢٨٦٨٤ - نَد \* دَاخَة

Taxonomie, Taxinomie (F).

Taxonomy (E).

هي علم سنن وقواعد فن التصنيف او التسيق .

## ٢٨٦٨٥ - نَد \* دَاخَة ، صَدَاخَة الغَاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à moustaches (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الموازج وفضيلة الغابات . موطنه يشمل معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه اللبناني تيمتد من السواحل الى الجرد والبقاع || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطه نحو ١٥ سم .



نَخِيرَة (البرقة والملكة)



نَخِيرَة (الحشرة)



ند



نَدَاخَة

والكوبلت والزنك ... لان وجودها إلزامي ان من الوجهة الانشائية او من الوجهة الغذائية .

Bourrelet, Bourlet (F).

٢٨٦٩٢ - نَدَّيَّة

Pad, Cushion (E).

اثر الجرح بعد التآلم في النسيج الحيواني والنباتية .

٢٨٦٩٣ - نَدَّحَكَة ، نَدَّحَكَة

Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

Barème des prix (F). نَدَّحَكَة الأَسْعَار

Price table (E).

٢٨٦٩٥ - نَدَّحَكَة الجَمَاعَات

Barème des salaires (F). Wage table (E).

Apponter (F). To land (E). نَدَّخ

شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه .

Aborder un rivage (F). نَدَّخ

Phototropisme (F). نَدَّخ

Phototropism (E).

النقد وتدعى جاذبية النور ، خاصة تتميز بها بعض اعضاء النبات في توجيه اطرافها نحو النور .

Satureia (S). Sarriette (F). نَدَّغ

جنس نباتات برية مخشوشة تآلمة من فصيلة الشفويات . انواعه عديدة متفاوته الاشكال والاحجام منها العشية والبليلة والجنية . اوراقها عطرية لا تقياسية القد متعاقبة او ضمية . ازهارها ابطية الارتكاز او تاجية يكثر فيها اللون الالبيض والبنفسجي والاحمر . جميعها مغفرة يجرىها النحل . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨٧٠٠ - نَدَّغ اِكْرِيَتِي \* ، نَدَّغ صَعْتَرِي

Satureia thymbra (S). Sarriette de Crête (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي المعمر . عشته نجمة صغيرة الحجم . اوراقه ضمية التجميع صغيرة القد ، نصلها سناني الشكل خلى البصرة الرمداء اللون . ازهاره ثلاثية التجميع بنفسجية اللون وردية الموانج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠١ - نَدَّغ الجَبَل \* ، زُوْبَاع البر ، صَعْتَر الجبل

Satureia montana (S).

Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي المعمر . مجلته تملو من ٤ الى ٨٠ سم . ساقه مخشوشة فراء . اوراقه سنائية مستطيلة مدببة المنقصة . نصلها جامد الصفحة الالامعة مذهب المختار . ازهاره وردية اللون او بنفسجية || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٨٧٠٢ - نَدَّغ بُسْتَانِي \* ، زُوْبَاع ، صَعْتَر البر

Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunilla (I).

نوع من الندغ المحول المبدول يكثر من النباتات الطبية الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة الطعم والورف . اوراقه سنائية النصل ، رهلة

ثوبه الى النبي الاطحل . رأسه كسني اللون اسود الموانج . محسره الى الكسني يمتدعه خط ابيض يملو العين . رداءه وظهوره وجناحه وصغيره وذنبه الى النبي الاطحل يملو شمشج عايق . زروه اغبر ابيض . صدره الى الغيرة البنية . حلقه عينه بنية . سباله واقر الحلب وهو ما دعى الى تلقيبه « باني شوارب » || الاثنى اصفر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه || يالغ المقاسب والمآسل والآجام وصفات مجاري الماء . تفرده صمداح لطيف متبان الانعام القصيرة || يذفن عشه في الآجام لطيف على ارتفاع متر عن سطح المنقع او التربة || الاثنى تحضن ثلاث مرات في السنة . حشيتنا من ٣ الى ٥ يضايف ترزها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته الحشرات المجتحة اغصها الفراش والذباب والحوام ثم الديدان والبراغ || يعتبر من المصافير النافعة .

Photophile (F).

Photophilous (E).

نعت تعريفى يطلق على كل حيوان او نبات لا يعيش الا في النور .

٢٨٦٨٧ - نَدَّاسَة البُسْر \* ، نَارِيَّة البُسْر

Ephestia calidella (S). Pyrale des dattes (F).

فراشة من الناريات صغيرة القد غبراء اللون مجتحة بالاسود . رزقها دقيقة نخيلة جنوية الثوب تقرض البسر وتطبعه .

٢٨٦٨٨ - نَدَّاسَة التبغ \* ، نَارِيَّة التبغ

المَجَشَقَة

Ephestia elutella (S).

Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dürrobstzünsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات ، بسطها نحو ١٧ م . روشناها الاماميان الى الكهجة الزرقاء الموانج ، روشناها الخلفيان الى الريدة . رزقها صغيرة دقيقة رمداء اللون تميش على مختلف الباز المجففة والتبغ والبسكوت واوراق التبغ الجافة المخزونة || احيائها الحولية وهي مرقطة بموانج الممانج تراوح من ٣ الى ٥ .

٢٨٦٨٩ - نَدَّاسَة الدقيق \* ، نَارِيَّة الدقيق

الغَبْرَاء

Ephestia kuehniella (S).

Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehlmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة الناريات . بسطها نحو ١ م . روشناها الاماميان الى السرة الخطية يمتدعهها جذبج وتبيج . روشناها الخلفيان مهديا المختار ثوبها الى البياض الاغبر يملو شمع اشقر . احيائها الحولية عديدة ، تكثر في الاماكن الحارة وتقتل في الباردة . رزقها دقيقة الجسم ، حنطية اللون سوداء الرأس ، تميش على مختلف انواع الدقيق .

٢٨٦٩٠ - نَدَّاسَة \* ، نَدَّش \* ، كِيمِيَا حَيَّة

Biochimie (F). Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٨٦٩١ - نَدَّالِر

Oligo-éléments (F).

Trace elements (E).

تدريج دائر . اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود والتيتان والزنك والنيكل والحديد



نداسة البسر



الفراشة



البقرة

نداسة التبغ



نداسة الدقيق



ندغ اكريني



ندغ الجبل



ندغ بستانى



ندوة



نداية مبدولة



نرتين



نرجس أخضر



نرجس اسلي



نرجس الشعراء

تطول من ٤ الى ٧ م. ازهارها صغيرة القدر خضراء اللون تنور خلال شهر حزيران . ثمارها عنبية قنبرا قدر الحصة الصغيرة لوها الى الحرة البرتقالية المواج .

٢٨٧١٤ - نَرْجِسِيْن \*  
Neritina (S).  
Nérítine (F). Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مهدبات الارجل وفصيلة الزُرِّيَّات . انواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة . منظرها نيري ومتين وبعضها بحري . جميعها مغترسة || اصنافها ثنائية الاشكال ، يكثر فيها الشكل البرمي المنحرف القليل الحلزونة المحصورة في الاغقاب . جميعها ملونة ، قل فيها اللون السوي وكثر التصليح والتجذيع والرسوخة والزخرفة .

٢٨٧١٥ - نَرْجِسِيْن \*  
Nérítica (F).  
نعت تمريني يطلق على كل منطقة رسوبية تنعمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م .

٢٨٧١٦ - نَرْجِس ، قَهْد \*  
Narcissus (S).  
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سرطوية من فصيلة النرجسيات . انواعها وضروبه واصرامه كثيرة العدد . ازهارها فواحة العرف لاقياسية التجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والرابعة حتى العشارية . وفي تركبها على شراخ اجوف يعلو شراف قصير بسيط يحتمل توزيع لاقياسي الشكل منه القمعي والبوقي والجبري والولابي . اوراقه قرصية الانتشابه ، قذية التصل ، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الأتربة الزراعية ولا يخفى سوى فوط الاندماج وكثرة الرطوبة .

٢٨٧١٧ - نَرْجِس أَخْضَر \*  
Narcissus viridiflorus (S). Narcisse vert (F).

نوع من النرجس الجادح . اوراقه قرصية الانتشابه ، اسطوانية التصل الخدد . شراخه الزهري دقيق ونحيل . ازهاره عطرية الرائحة ، رحيمة البتلات اللببية الخضراء اللون . وفي لاقياسية التجميع يراوح عددها من ١ الى ٤ . توجعها دولابية الشكل || ينور في تشرين الثاني .

٢٨٧١٨ - نَرْجِس اسْكِي \* ، جنكبيل \*  
Narcissus jonquilla (S). Jonquille (F). Jonquil (E).  
Jonquillon (D). Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I).  
نوع من النرجس السبروتي . ضروبه واصرامه كثيرة العدد . اوراقه قرصية الانتشابه نصلها اسطوانتي الشكل ، خدد الصفحة ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري دقيق القصبه يطول نحو ٣٠ سم . ينتهي بقصبة من الازهار يراوح عددها من ٢ الى ٦ ، توجعها كوبي الشكل ، رائحتها فواحة العرف البرتقالي ، لوها الى الصفار الخادق . ينور في نيسان .

٢٨٧١٩ - نَرْجِس الْأَمَازُون \*  
نوع نضري الامازون ، اطليه .

٢٨٧٢٠ - نَرْجِس الشُّعْرَاء \* ، عَقُوقُ

Narcissus poeticus (S). Narcisse des poètes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E). Dichter Narcisse (D). Narciso dei poeti, Flor maggi (I).  
نوع من النرجس السبروتي . ضروبه كثيرة العدد . اوراقه

الصفحة ، قاعمة الخضراء . ازهارها صغيرة القدر يضاء اللون او وردية || تنوره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٨٧٠٣ - نَدِيَّة \*  
هي اليروقيل ، اطليه .

٢٨٧٠٤ - نَدْوَة \*  
Cressa (S). Cresse (F).

Rosin weed (E). Harzkraut (D). Cressa (I).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السقنويات . انواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من الملين القديم والجديد . ازهارها عديدة الالوان عادمة العرف .

٢٨٧٠٥ - نَدْوَة زَرَّاعِيَّة \*  
Comice agricole (F).  
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصحيحة .

٢٨٧٠٦ - نَدْوَة عَسْكَيَّة \*  
هي الارق ، اطليه .

٢٨٧٠٧ - نَدْوَة \*  
Phototropique (F).  
Phototropic (E).

ما هو منوط بالند .

٢٨٧٠٨ - نَدِّي \*  
Rosée (F). Dew (E).  
رذاذ يتكاثف بسبب الرضاء على النباتات والاشياء المجودة في الغلا || وفي التخصيص يطلق الندى على ما سقط من بلل آخر الليل وما الذي يسقط اوله فهو السدى .

٢٨٧٠٩ - نَدِّي الْبَحْر \*  
Romarin (F).  
هو حصا البان ، اطليه .

٢٨٧١٠ - نَدِيَّازَة مَبْدُولَة \* ، دُودَة السَّطَط \*  
Nadlasi obsoleta (S).

فاشة من فصيلة الجفنيات ، صغيرة القدر طولها نحو ١٢ م . لوها الى الخشنبي البني . اجنتها موشحة بثلاثة خطوط معرضة متعرجة لوها الى السمرة الداكنة . زياناها مشطية الشكل . الاثني اكبر حجماً من الذكر واكثر لوناً . تمتع مكثها الاخضر اللون على فروع واغصان السطط ينثفج برقات تلهم الازراق وتعمل الاشجار ثم تلسع شراخ ، اسطوانية الشكل ، مستديرة القطلين ، دقيقة الوسط ، خيطه سريري اسمر ، تبيت فيها وتتحول الى عذراء || اما الزرقه فسواء اللون ، حلبة القشار يقطبها غطان علويان لوها الى البرتقالي وتحمل في كل من حلقاها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة واحادية عشرة غدة جرابية محشوة بالحب الاسود اللدقيق تستعمل للدفاع عن النفس فيلهب جلد الجسم الذي يلقى به .

٢٨٧١١ - نَدِّيَّان \*  
هو النيدمان ، اطليه .

٢٨٧١٢ - نَدِّيَّة \*  
Cicatricule (F).  
Cicatricule, Tread (E).

الندبية علامة يضاء تشاهد على عقرب البيفة ، اي صفارها . يتكون منها الجزء البروتوبلاسمي حيث تنشأ الجرثومة الحية مزكومة كانت او غير مزكومة .

٢٨٧١٣ - نَرْجِيرَا \*  
Nertera (S). Nertère (F).

جنس نباتات عشبية معمرة وحولية من فصيلة اللويات . انواعها المعروفة قليلة . مهدا بلاد زيلندا الجديدة . سوقها مشوثة تملو من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها يفضية التصل

الصفار البرتقالي. شروبه وأصممه الزراعية عديدة أوراقها استطالة الشراخ ولون الزهر.

٢٨٧٢٧ - نرجس نسيبي \* هو الزفير، اطلبه.

٢٨٧٢٨ - نرجس يعقوب \* نرجس بري

Sprekelia formosissima (S). Sprékelle magnifique, Lis St. Jacques, Amarylilis à fleur en croix (F). Jacobean lily, St. Jame's-cross lily (E). Echte Jakobillie (D). Giglio di St. Giacomo, Croce di St. Giacomo (I). نبات يصل من فصيلة النرجسيات يزرع للزينة. أوراقه مزدوجة التصفيغ، قرصية الانتشاب، عصفية الشكل تظهر بعد الإزهار. أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة ترتكز على شراخ يعلو نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول نحو ١٠ سم. لوها إلى الحمرة القرمزية العاقبة. زراعه لا تتطلب عناية خاصة إنما يرغب في الأتربة القليلة الانساج.

٢٨٧٢٩ - نرجسيات \* Amaryllidaceae (S). Amaryllidacées (F). Amaryllidaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم. أشهر أجناسها النرجس والنرجوس والأماريلس والباهرة.

٢٨٧٣٠ - نرجس \* Hippeastrum (S). Hippeastré (F).

جنس نباتات بسلية عشبية من فصيلة النرجسيات. أنواعه وشروبه عديدة. أوراقها قرصية الانتشاب، قدية الشكل. بتلاتها الزهرية مجوفة. أزهارها عريضة وبحورية متدلية، قدية القالب، سداسية البتلات، عديدة الألوان المختلفة التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٨٧٣١ - نرجس أرجواني \* Hippeastrum rutilum (S). Hippeastré écarlate (F).

نوع من النرجوس السروتي. يصلته رتدية الجذور. أوراقه مستعرضة جميلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شراخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع، متقاربة الارتكاز، عادمة العرف، أرجوانية اللون. تنوره يستمر طول فصل الربيع.

٢٨٧٣٢ - نرجس أميري \* Hippeastrum aulicum (S). Hippeastré princier (F).

نوع من النرجوس السروتي. هذه البرازيل. أوراقه عديدة جميلة الخضار تطول نحو ٤٠ سم. شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين لوها إلى الأحمر المصغ بالجووي أما التويج فاخضر اللون، مذهب التهديد. تنوره يستمر طول شهر كانون.

٢٨٧٣٣ - نرجس الملكة كارولين \* Hippeastrum reginae (S). Hippeastré de la reine Caroline (F).

نوع من النرجوس الجادح. أوراقه عديدة مستطيلة النصل الفيق. شراخه الزهري يعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ودية التجميع كبيرة القذ أرجوانية اللون يتوسط تويجها نجوم خضر || تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٢٨٧٣٤ - نرجس بيغالي \* Hippeastrum psittacium (S). Hippeastré perroquet (F).

نوع من النرجوس السروتي الشائع الزراعة. أوراقه خضراء

قدية مستطيلة. شراخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بزهرة وسيدة، كبيرة القذ، عطرية الرائحة، بيضاء اللون، ترتكز على تويج أصفر القالب، أحر الإطراف. ينور في الربيع.

٢٨٧٣١ - نرجس بري \* نرجس جبلي،

سيتاس

Narcissus pseudonarcissus, N. sylvestris (S). Narcisse sauvage, N. trompette, N. des prés, Porlion, Clochette des bois, Coucou, Jeannette (F). Wild narcissus, Daffodil, Lent lily (E). Gemeine Narzisse (D). Narciso del boschi, N. falso, Tromboncino (I). نوع من النرجس السروتي المبلول. أوراقه قرصية الانتشاب، خماسية أو سداسية المدد. نصلها منتصب الصفحة المنسطة. شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين بوقية التويج لوها إلى الصفار الكبري || ينور في آذار. يعيش في جميع المواقع والأتربة.

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي \* مضغف

Narcissus orientalis, N. tazetta (S). Narcisse tazette, N. à bouquet, N. de Constantinople (F). French daffodil, Polyanthus narcissus (E). Tazetten-Narzisse (D). Narciso a mazzetto, Tazetta (I). نوع من النرجس السروتي المبلول. شروبه أوصاممه لا تقل عن ١٢٠ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط. أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار القليل التخديد. شراخه الزهري قوي القصبة يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر. أزهاره مستطيلة الا من متدلية، متوسطة الحجم، لوها إلى الأبيض الاصفر الملوّج، عرقها ذكي الرائحة الفواحة || ينور في الربيع.

٢٨٧٣٣ - نرجس عطر \* جرناء

Narcissus odoratus (S). Narcisse odorant, Camparnelle, Jonquille campernelle (F). Camparnelle Jonquil (E). Wohlriechende Narzisse (D). Giracapo, Giracoli (I). نوع من النرجس السروتي الشائع الاستعمال الزاهي. أوراقه ميزانية الشكل، جميلة الخضار الزاهي. أزهاره ثنائية أو رباعية التجميع، ذكية العرف، صفراء اللون، ترتكز على تويج قدي الشكل يكمل هامة الشراخ الذي يعلو نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان.

٢٨٧٣٤ - نرجس عنكبوتي \* Pancratier (F).

هي الحلة، من النرجسيات، اطلبها.

٢٨٧٣٥ - نرجس مبخار

Narcissus serotinus (S). Narcisse tardif (F). نوع من النرجس الجادح المشاخ. أوراقه خيطية الشكل رايوح عددها من ١ إلى ٢، شراخه الزهري دقيق ونحيل يعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وسيدة كبيرة القذ، عطرية الرائحة، بيضاء اللون، صفراء التويج. ينور في تشرين.

٢٨٧٣٦ - نرجس مدوسي \* Narcissus bulbocodium, Corbularia bulbocodium (S). Narcisse bulbocode, Trompette de méduse (F).

نوع من النرجس السروتي. أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل الفيق المستطيل. شراخه يعلو نحو ٣٠ سم. ينتهي بزهريتين كبيرتين. تويجها بوقي الشكل لوها إلى



نرجس بري



نرجس عطر



نرجس مدوسي



نرجس يعقوب



نرجس



## ٢٨٧٤١ - نُرَّاء

النَّراء : داء يأخذ الغم تنزرو منه حتى تموت .

٢٨٧٤٢ - نُرَّاء ، نَرَّاء (F). Conflit (F). Conflict (E).  
هو التعارض بين موقفين . وهو في القانون الإداري خلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر ببدعي واحدة .



نَرَّاء مبدل

٢٨٧٤٣ - نُرَّاء (F). Litige (F). Litigation (E).  
خاصية تقضي على رفع دعوى .

## ٢٨٧٤٤ - نُرَّاف

Vampyrus (S).  
Vampire (F). Vampire (E).  
جلس غفائش من فصيلة الوريقات . أنواعه عديدة ، موطنها البلاد المتدلة المشرفة نحو الحارة ، تكثر في أمريكا الجنوبية || أجسامها متوسطة القد . رؤوسها ضخمة ، مستطيلة . فرائسها بارزة . زوائد المخبرية سنانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة . أذنانها لا ر لها || تألف الأراج الكثيفة والأجارج الغضة . تعيش منفردة . ذكورها تقرب أنثاه عند الكوم فقط . مسرحها من الفسق إلى الفجر . قوتها الحشرات والبار والدم تستنزف من مختلف الحيوانات أنصمها الحيل والبقر || أرف أنواء وأشهرها النرَّاف المبدل .



نَرَّاق

## ٢٨٧٤٥ - نُرَّاف مبدل ، نُرَّاف شبيحي

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectre, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).  
نوع من النرَّاف ، طول نحو ١٤ سم . وبعسته ٣٥ سم . ثوبه خفي للممس كسني الرأس والظهر ، أشبه البطن والحواشي . موطنه فسيح الإيلاء يم أمريكا الجنوبية ، يكثر في الفريسان . يألف الأراج الكثيفة . قوته الحشرات والبار والدم .

## ٢٨٧٤٦ - نُرَّاق ، أبو صكتن

Antidorcas onchore (S).  
Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).  
نوع من الغزلان . حيوان لبون مجتر أجوف القرن ثنائي الاخلاف . موطنه افريقية الجنوبية . يألف السباب . ملجئه الحيائي جماعي . إجله يد بعض المئات || جسمه ربع القامة ريشق القوام كسائر الغزلان . ثوبه إلى السمرة الخفيفة . عنقه وصدره وبطنه وقفاء إلى الأبيض النبي الحواج . قرنه متتابع الحيد ، ذرب الطرف المنطش || يتميز بالحفة وبسرعة المدو ويتابع الغنم البيد الجبال .



نَرَّاقَة

## ٢٨٧٤٧ - نَرَّاقَة \*

Pilea (S).  
Piléa, Herbe au feu d'artifice (F).  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانجريات . أنواعها المعروفة عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . معظمها معمر وبعضها حولي || سوقها فراء . أوراقها متعاقبة ، سنانية الشكل ، مستطيلة التنديب . تصالها كثيرة العروق والاعصاب ، خلية البشرة ، سننة الحواشي . أزهارها وحيدة المسكن ، عنقودية التجميع ، أبطية الارتكاز . مآبر أزهارها الذكورية تفجر عند أدراك الطلع وتقتذف به ببدا || منها أنواع تزينة ترزع في المصاري أعصها الرزاق النخامية (Pilea mucosa) .

اللون تطول نحو ٤٥ سم . شراخه الزهري يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره محورية الارتكاز وغامية ، ثنائية التجميع ، لرأها إلى الخفسار المضلع والجذع بالآخر القرمزي . تنوره يستمر من الربيع إلى الخريف .

## ٢٨٧٤٥ - نُرَّاجوس جَرَل

Hippeastrum bifidum (S). Hippéastre bifide (F).  
نوع من النرجوس السبروي . أوراقه بحرية اللون تطول نحو ٣٠ سم . شراخه الزهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ضسته الزهرية تجمع من ٤ إلى ٦ أزهار . توجيها مهدب اختار ، أزهاره جزلة تطول نحو ٥ سم . بثلاثها قنزية اللون يتوسطها خط أخضر || تنوره يستمر من حزيران إلى ايلول .

## ٢٨٧٣٦ - نُرَّاجوس قهدي

Hippeastrum pardinum (S). Hippéastre léopard (F).  
نوع من النرجوس الجالنج . أوراقه شديدة الخفسار تطول نحو ٦٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . أزهاره كبيرة القند ، عاجية اللون ، ومطلة بالآخر الجوزي || تنوره يستمر طول شهر شباط .

## ٢٨٧٣٧ - نُرَّاجوس موشح

Hippeastrum vittatum (S). Hippéastre à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirte Amaryllis (D). Amarilli striscia (I).  
نوع من النرجوس السبروي الشائع الزراعة . أوراقه عاجية الخفسار تطول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزهري غليظ القصبية الثلثية يعلو من ٩٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره لا يقاسية التجميع تراوح ضمتها من ٤ إلى ٩ أزهار ، تكثر في اواسط الشراخ وتقل مع اقترابها من الهامة . والزهرة كبيرة القند مدبة البتلات المحببة وهي عطرية الرائحة عاجية يعلموها توجيع وردي كامل الخطوط . تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

## ٢٨٧٣٨ - نَرَّسين \*

Narcinus (S).  
Narcine (F). Narcinus (E).  
جنس اسماك بحرية من السفقيات وفصيلة الرمادات . أنواعها المعروفة خمسة ، أعطائها بحار المناطق الاستوائية والحارة || أجسامها متدلة الطولي ، يرمية الشكل ، مبططة القدام ، مستطيلة الاذنان || من ميزاتها الخاصة انطلاق ساسها الخيشومية من أربع فجوات مستطيلة مركزها في مقدم الرأس ، فموتان تحت كل عين || لحومها مأكولة ، متدلة الصفت .

## ٢٨٧٣٩ - نَرَّيسَة

Pollithyrus sinensis (S).  
Pollithyrse de Chine (F).  
شجيرة برية وتزيينية من فصيلة النصفيات . مهدها الصين . ساقها متصبية فراء تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . فرونها حر اللحاء . أوراقها عابطة منعقة متعاقبة . فصلها قلبي الشكل مالم الصفحة العليا خفي السفلي . أزهارها وحيدة المسكن ، عادمة التوجيع ، صفرة القند ، يبيض اللون . أزهارها مشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ثمارها حقة الشكل ، رباعية المصاريع || تنوره يستمر طول شهر تموز .

## ٢٨٧٤٠ - نَرَّاء ، نَرَّو

Saillie, Monte, Coit (F).  
Covering, Serving, Cotion (E).  
النراء والنزو هو جاع الحيوان الداجن كالخيل والبقر .

٢٨٧٦٣ - نَزُونِيَّة \*  
Nasonia brevicornis (S).

Nasonia brevicorne (F).  
حشرة نافعة من الصفريات النشائية الاجنحة. تتطفل على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي. طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الصغار الاسود الاسفح المواجه. زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل.

٢٨٧٦٤ - نَزُونِيَّة \*  
Bramée, Bramelement (F).  
صوت الايالي والغلياء.

٢٨٧٦٥ - نَزُونِيَّة \*  
هو الثَّوْب ، اطلبه .

٢٨٧٦٦ - نَزُونِيَّة \*  
Amphipore (F).  
جنس ديدان خموسية مبنولة في معظم بحار العالم .

٢٨٧٦٧ - نَزُونِيَّة \* ، كَاكُو  
Narvalis (S).  
Nasique Kakau (F). Nose-ape (E).  
قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات . موطنه جزر الزايج . يألف الغابات القائمة على ضفاف المنابع ويجاري الماء . طوله نحو ٧٦ سم. وذنبه ٧٠ سم. يتميز بانفه المستطيل الارنبية . ثوبه كيف الشعر الناعم للمسنن، لونه الى الكهبة الصفراء يبقع عند الظهر ويمر عند الصدر والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزُونِيَّة الشَّرُونِيَّة \*  
Nysius senecionis (S). Nysius des seneçons (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات ورتبة مختلفات الاجنحة. جسمها صغير القذ ، طولها نحو ٤ مم. رأسها شبه مزواني الشوزن ، مذهب اللون . غطلمها صغير . عينها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كوشلها والصفحة العليا من بطنها الى الصغار المذهب . الصفحة السفلى الى السرة السوداء . حجبها صغيرة بحمرمة . قشراتها شفافة || مسرحتها البراري . تركب نباتات فصيلة المركبات واصحها الشرونيات .

٢٨٧٦٩ - نَزُونِيَّة \*  
Nisonades (S).  
حشرة من المسيريات . فراشتها صغيرة القذ ، مردنية الجسم . حنطية الثوب ، طولها نحو ٢٦ مم. في الذكور والاناث . رواشها كستنية اللون سفع المواجه ، حنطية التصديق والزركمة في الاناث ، بيض التفريق في الذكور . يكتر وجودها من نيسان الى حزيران . رفاقها تركب معظم النباتات الترييبية دون ان تقتربها شديد الاناض .

٢٨٧٧٠ - نَزُونِيَّة تاج \*  
Nisonades tages (S).  
Nisonades tages, Thanaos tages (F).  
Nisonades tages (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاذني واروبة . فراشتها واشمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الشنداب والاروس واكثر نباتات القرنيات القرشاية || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٣ مم. بسطها نحو ٢٧ مم. رأسها كستنية اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الكستني الاسمر الاسفح المواجه || رواشن الذكر الى الكهبة البتراء تملوها في الزوج الاسامي اربع جدات متعقبة كستنية اللون ويملؤها في الزوج الخلفي تخفصيب كستني متفاوت السرة || رواشن

٢٨٧٦٨ - نَزُونِيَّة

النزور دم في ضرع البقرة . يقال بقرة مزورة اي وامة الضرع .

٢٨٧٦٩ - نَزُونِيَّة  
Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Dis budding (E).

هو التشديد اي انتزاع البراعم الزائدة او القفارة لتحويل ما تستهلكه من نضج الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات الهوائية .

٢٨٧٧٠ - نَزُونِيَّة المُلْكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation  
هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على ان يدفع مئته المقدم اليه .

٢٨٧٧١ - نَزُونِيَّة ، نَزُون

Atavisme (F).  
Atavism (E).  
هي البنج والبنوج اي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اصبحت عنه انسائها السابقة او السالفة .

٢٨٧٧٢ - نَزُونِيَّة

« بقلة كالخضرة تكون بالمرض وليس لها زهر ولا ثمر ، تأكلها الابل اذا لم تجد غيرها » (ابو حنيفة) .

٢٨٧٧٣ - نَزُونِيَّة ، نَزُونِيَّة  
Hémorragie (F).  
Haemorrhage (E).  
خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٧٤ - نَزُونِيَّة الرَّحْم  
Métrorragie (F).  
Metrorrhagia (E).

نزف رمي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الاجهاض .

٢٨٧٧٥ - نَزُونِيَّة  
Hemipenis (F). Hemipenis (E).  
النزك قضيب الذكر عند الزحافات كالحيات والسلاحف والعظاء . وهو يتميز بانزواجيته وباشكاله المختلفة وبنماليه اللدية الاطراف او المسنة التي تمكنه عند انتشارها من الالتحام وعدم الافلات .

٢٨٧٧٦ - نَزُونِيَّة  
Produit (F). Produce (E).  
النزل والذقة من محاصيل الارض الزراعية .

٢٨٧٧٧ - نَزُونِيَّة  
Catarrhe (F). Catarrh (E).  
التهاب الغشاء المخاطي وسيلانه .

٢٨٧٧٨ - نَزُونِيَّة والذقة  
Grippe (F). Influenza (E).  
هي الوالدة والانفلونزا والذقة الصدرية الوبائية، مرض معد يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٧٩ - نَزُونِيَّة وقوتية ، نَزُونِيَّة صُدُونِيَّة  
Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).  
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٨٠ - نَزُونِيَّة شُعْبِيَّة ، بَرُونَشِيَّة  
Bronchite (F). Bronchitis (E).

مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيما الخيل والضان .

٢٨٧٨١ - نَزُونِيَّة  
هو النَزَا ، اطلبه

٢٨٧٨٢ - نَزُونِيَّة  
Atavisme (F). Atavism (E).  
هي نزع الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اصبحت عنه انسائها السالفة . اطلب نزع .



نَزُونِيَّة



نَزُونِيَّة



نَزُونِيَّة



نَزُونِيَّة تاج

٢٨٧٨١ - نِسْبِيَّة  
Proportionnalité (F).  
Proportionality (E).  
حالة الأعداد أو الأشياء المتناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نَسَّة \* ، نَسَّة  
Nyssa (S).  
Nyssa, Tupélo (F). Tupelo tree (E). Tupelobaum (D). Niss (I).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة، جميعها أشجار ونجيرات عابلة . جذورها هشة تستعمل استعمال الفلين . سوقها رفيعة منتصبة الأغصان، اغشائها لينة للمادة البيضاء اللون . أوراقها متعاقبة جامدة للتصل للاعم . أزهارها لا نظامية التركيب منها الخشوية النحاسية الاسدية ومنها الذكورية المشارية الاسدية المنقودة التجميع ومنها الانثوية الثلاثية النورة . ثمارها عجيبة النواة ، لبية السودق || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نَسَّة

٢٨٧٨٣ - نَسَّة بَيْضَاء  
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupélo blanchâtre (F).  
نوع من النسة، شجرتها متصلة القد سريعة النمو تملو من ٦ الى ١٦ م. أوراقها قصيرة الاعناق تطول نحو ١٥ سم. نصلها اسفلي الشكل مائل الصفحة العليا نحو السفلي التي تبلو كأنها مغطاة بالرماد الأبيض || عناقيد أزهارها الذكورية صغيرة الحجم . أزهارها الانثوية فردية التجميع مزينة الاغصاء . ثمارها بيضيه الشكل حمراء اللون تطول من ٢ الى ٤ سم. سوقها حامض الطعم . صعبتها عميقة التخفيف الطولي .

٢٨٧٨٤ - نَسَّة جَبَّارَة  
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupélo (F).  
نوع من النسة، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو ترفع في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م. أوراقها كبيرة القد، أهليلجية الشكل، مدببة المقصه، مجعزة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستدقة الأطراف . نصلها مائل الصفحة العليا، حلي السفلي . خله فني التجميع اغبر اللون . أزهارها الانثوية فردية التجميع . ثمارها بيضيه الشكل تطول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقه العابقة .



نَسْر

٢٨٧٨٥ - نَسَّة جَبَلِيَّة  
Nyssa sylvatica (S).  
Tupélo de montagne (F).  
نوع من النسة، شجرتها كبيرة الحجم سريعة النمو تملو من ١٢ الى ٣٦ مترًا . أوراقها مستطيلة الاعناق تطول نحو ١٢ سم. نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على صفحتيه . عناقيد أزهارها الذكورية مستطيلة الانثوية شغمية التجميع براوح عددها من ٢ الى ٨ . ثمارها حصبية القد والشكل لونها الى الزرقه العابقة .

٢٨٧٨٦ - نَسْتَر \*  
Amorpha (S). Amorphe (F).  
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جنيات ونجيرات لاقياسية القالب والبهيمة . أوراقها ريشية ، وريّة التركيب، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، متبيلة التجميع ، بنفسجية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نَسْتَر أَيْضًا  
Amorpha canescens (S).  
Amorphe blanchâtre (F).  
نوع من النستر البروني التريبي . جنته صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها تطول نحو ١٠ سم. وريقاتها

الائى قريبة الشبه برواشن الذكر الا انها ابيضت ماجة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في التبار . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح الممكن مباحديًا على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستصفي الوسط، مائل القشار، اسمر اللون، تملو ماجة غضراء زرقاء . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى السرة القائمة || طور الكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يومًا ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعًا وينتهي ضمن صلجة تحجبها السرة بين الأوراق الابيدة .

٢٨٧٧١ - نُسَّاح \* ، نَسَح  
Lézarde (F).  
Crack (E).  
انصداع في جدار البناء سببه مرور الزمن او عيب في البليان او خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر .

٢٨٧٧٢ - نَسَّاس  
Déliquescent (F).  
Deliquescent (E).  
نمت تعريني يطلق على الاجسام التي تتأخ من تشربها رطوبة الهواء .

٢٨٧٧٣ - نَسَّاسَة  
Déliquescence (F).  
Deliquescence (E).  
صفة الاجسام التي تتأخ من الرطوبة التي تمتصها او تشربها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نُسَّاف  
طائر له مغار كبير (ابن سيده) ج. نسايف .

٢٨٧٧٥ - نَسَّاف ، نَسَّافَة  
Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).  
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المزارة .

٢٨٧٧٦ - نِسَافَة  
Taxologie (F). Taxology (E).  
النساق علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نَسَب ، نَسْل  
Lignage (F). Lineage (E).  
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نوصان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والابناء . ونسب عرضي وهو ما كان بين الاخوة وبني الاخوة وبني الاعام . ج انساب

٢٨٧٧٨ - نَسَب  
Généalogie (F). Genealogy (E).  
هو سلسلة تتابع الانسال في الاسرة الواحدة او العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نِسْبَة غِذَائِيَّة ، نِسْبَة غِذَائِيَّة  
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).  
هي نسبة المواد الأروئية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة للمضم في كل علف او مخنة .

٢٨٧٨٠ - نِسْبِي ، نَسْبِي ، نَسْبِي  
Proportional (F). Proportional (E).  
نمت تعريني توصف به مناسبات الاشياء المختلفة .

وهو من القواطع يحجب أجواء آسيا الوسطى وأفريقية الشرقية والشمالية وأروبة الجنوبية. سربه يتألف من ثلاثة إلى ستة أزواج || قوته الجيف على اختلاف أنواعها وإذا جاع تعدى على الغنم والماعز والقطا || الذكر لا يفارق أنثاه مدى الحياة. يذنّ وكه بين فروع شجرة داسية على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض || أثناء تبيض رقتين كبيرتين لونها إلى الرماد الطاحل تعلو ريشه حراء. الخشن يستمر نحو ستة أسابيع تتناوب عليه الأنثى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْرٌ أَمْرِيكِيٌّ Condor (F).  
هو الكندور، أطلبه.

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِرِ Altair (F). Altair (E).  
النسر الطائر ويدعى الطير، نجم نيز من كوكبة العقاب .  
راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَحْطَاح Condor (F).  
هو الكندور ويدعى النسر الأمريكسي، أطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قُبْرَانِيٌّ \* ، نُسْتُوس Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).  
نوع من النسر، كبير الهامة قدره قدر نسر الجواء . ثوبه إلى البياض الأغبر الزاهي المواج . قرص رأسه متوج بفتحة صغيرة زغبية الريش ناصعة البياض . عنقه أغفر الريش الأغبر، برائله أصفر باهت || موطنه أفريقية الوسطى . يألف الإحراج ويجاري الماء، أخلاقه وطباعه لا تختلف عن أخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِع VEGA (F). Vega, Wega (E).

النسر الواقع نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألم نجوم السماء . يبعد عن الأرض نحو ٢٦ سنة ضوئية . يبدو أن النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه أي أنه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات Vulturidae (S).  
Vulturidés (F). Vulturidae (E).

فصيلة من لمة النسور وفئة كواس النهار ورتبة الجوارح، تشمل النسر والرخة والأنوق والقشام والبيات والستل . جميعها كبيرة الجثة والسقط . رأسها أصلع أو أغفر . برائلها كبيرة . عنقها أغفر الريش الناعم . أرسافها عارية بخلاف أرساف العقاب الكاسية السرملة . غنابها ظفرية لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تفعل العقاب وهذا مما يجعلها تقع على الجيف ولقيا نصية .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين \* ، جُلْنِسْرِين ، وَرْدَبَرِّي ، وَرْدُ السِيَّاح

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauvage, Ros des chiens (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Hephrose (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).

نوع من الورد البري . ساقه تعلو من متر إلى ثلاثة أمتار . شوكه متنازع الدرز ، حاد الطوف المحجن . وريقاته وريّة الشجيع ، مستطيلة الاعناق ، ناشرة العروق والأعصاب ، مسننة الحافة . أزهاره غبراء اللون ، وردية المراج ، مسنحة العرف الذي الراححة ، بتلاتها وحيدة الصف . نواحه وردية

كثيرة العدد الوردي الذي يراوح من ٢١ إلى ٤٩ ، نصلها خلي البثرة على صفحتها السفلى . سنابله الزهرية مستطيلة . أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشْتَرِكٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbusif, Indigo bâtar, Faux indigo (F). Bastard indigo (E). Bastard-Indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).

نوع من النسر السرملي الشائع الزراعة . شجيرة كبيرة القدر تملو من ٣ إلى ٤ أمتار . أوراقه مستطيلة الأعناق طولها نحو ٢٥ سم . وريقاتها تعد من ١١ إلى ٢١ نصلها يبيض الشكل يعلو من ٢ إلى ٣ سم . سنابله الزهرية غنية لبدة تملو نحو ٢٠ سم . || أزهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات \* Agnostoma (S). Nestis (F).  
جنس أسماك نهربية من شالكاكات الزعانف وفصيلة البوريات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ أعطائها أنهر أفريقية الاستوائية || أجماعها أهليلجية الشكل ، معتدلة التطيط، تملو من ١٥ إلى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مفلطحة كروؤس البوري . زعانفها الظهرية ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشرجية . زعانفها الذيلية كبيرة مقطوعة الأطراف أو قابلة التقدير . أثوابها تراوح من الركبة متفاوتة السمرة إلى الشبهة . خضاب رؤوسها وظهورها أصبق من خضاب بطونها الذي يفر عند بعض الأنواع || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسْرٌ Epandre (F). To scatter (E).  
نفس السباد والرباق والقش ... أذراها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourchette (F). Frog (E).  
من أجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S).  
Vautour (F). Vulture (E).

جنس طير من الكواس ينتمي إلى فصيلة النسريرات . أنواعه قليلة العدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلع غفر . مناسره مستطيلة جالسة تنتهي بظهر منمنقة حادة . أعناقها زغبية الريش الأغفر . قواعد أعناقها مطوقة ببرائل مهدلة الزغب . سواقلها مستطيلة منفرجة . أذنانها قصيرة مستديرة . أرسافها قوية عارية || والنسر شره نهم زغب، إذا وقع على جيفة وأتلا منها لم يستعمل الطيران حتى يثب وثبات متتالية . يرتفع على أرها شيئاً فشيئاً || ويقال للنسر عريف الطير . كنيته أبو الورد وأبو الأصم وأبو مالك وأبو المبال وأبو يحيى . والآن يقال لها أم قنصر . ويحي نسرًا لأنه ينسر الشيء ويستهله . جمعه في القلة النسر وفي الكثرة نسور || أعرف أنواعه وأشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجَوَّاءُ \* Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vulture (E).

نوع من النسر، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة منقطة نحو ٢٥٠ سم . ثوبه إلى السمرة الخطية الغبراء . رأسه أصلع . عنقه أغفر الريش الطاحل . برائله خطي اللون ، منسره كبير القدر ، حاد البهرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نَسْرِيَّات



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرِين

جوزية اللد ، ارجوانية اللون ، ناشغة اللب ، غنية بالحامض الاستربري الذي يستعمل ضد الحفر .

### ٢٨٨٠١ - نِسْطُور

سكة تعرف بِلوت المتوسط ، اطلبها .

### ٢٨٨٠٢ - نِسْطُور \*

Nestors (S).

Nestor (F). Nestor (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة اربعة موطنها زيلنده الجديدة والجزر المجاورة . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . تألف العايات والمواقع التي تكثر فيها الصغور المتراكبة لانها تدفن اعشاشها في تخاليفها قوتها المواد النباتية واخصها الثار العنينة والعسائل والنواهي وبعض الحشرات واساربعها || اجسامها معتدلة القد تعول من ٤٥ الى ٥٠ سم . اذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف . اوتها قائمة الالوان تكثر فيها الشبه السمراء والحمرية الجؤوية || الانثى تقص اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوما بينا الذكر يؤين لها الغذاء .

### ٢٨٨٠٣ - نِسْطُوك

Nostoc (F).

ألف مأكول يكثر وجوده في بعض مناطق الصين . يدعى بقة القمر .

### ٢٨٨٠٤ - نِسْطُوم

Neostoma (S).

Néostome (F). Neostome (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوسحات المثانة ، عذبات السهف ، كيريات الشفق . انواعه المعروفة قليلة العدد تعيش في المناطق الحدية البعيدة الغور ولا تشاهد الا نادرا قرب الجاحج والشطوط || اجسامها مستعرضة القدم ، مستتقة المؤنصر ، تعول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اشدائها كبيرة غنية . جلودها عادمة السهف . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

### ٢٨٨٠٥ - نِسْغ

Vent du Nord (F). North wind (E).

النسج اسم ريع الشمال . ويقال ريع نسعية اي شمالية .

### ٢٨٨٠٦ - نِسْغ

Poignet (F). Wrist (E).

النسج : المفصل بين الكف والساعد .

### ٢٨٨٠٧ - نِسْغ

Sève (F). Sap (E).

سائل غذائي يؤين حاجة مختلف اعضاء ونسج النبات . وهو على نوعين : نسج باهل او ساعد او ناقص او وارد ونسج كامل او هابط وهو الصادر المنفذ .

### ٢٨٨٠٨ - نِسْغ بَاهِل ، نِسْغ نَاقِص ، نِسْغ صَاعِل

Sève brute (F). Inorganic sap (E).

هو ما يمتصه النبات من مواد قابلة للتفيل فيوردها الى الاوراق لتضفيها وتحوليلها الى غذاء .

### ٢٨٨٠٩ - نِسْغ كَامِل ، نِسْغ هَاطِط

Sève élaborée (F). Elaborate sap (E).

هو ما حضفته الاوراق من النسج الباهل فاصبح كاملا صالحا لتصدرة الى الجذور التي توزعه على مختلف اجزاء النبات .

### ٢٨٨١٠ - نِسْغ

Vannage (F). Winnowing (E).

نفض الحب وغربلته بالنسف .

### ٢٨٨١١ - نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة ، نِسْفَة

نِسْفَة ، بَنَزَلَت (F). Basalt (E).

وقد ترد بالثين بدلا من البين ، هي سجارة الحرة السوداء ذات التخاريب .

### ٢٨٨١٢ - نِسْفَة

Meulière (F). Millstone grit (E).

صخور صوانية تحرة تستعمل كآرامية .

### ٢٨٨١٣ - نِسْق شَامِي

النسق الشامي مجموعة كواكب مصطفة على رأس الحية في كوكبية حور وسية .

### ٢٨٨١٤ - نِسْق يَمَانِي

النسق الياني مجموعة كواكب مصطفة تحت عنق الحية في كوكبية حور وسية .

### ٢٨٨١٥ - نِسْكَ

Cinnryris alblventris (F).

هو الثبير الابيض البطن ، اطلبه .

### ٢٨٨١٦ - نِسْلَة

Neslia (S). Nestle (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها يتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || سوقها منتصبة فراء . اولاقها كاملة . ازهارها عنقودي او عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعها واشهرها النسلة العنكولية .

### ٢٨٨١٧ - نِسْلَة عُنْكَرِيْلَة

Neslia paniculata (S). Nestle paniculée (F).

نوع من النسلة . عشبة برية ، حولية . منها بعض الاصقاع اللبنانية ، اخصها الجبلية || ساقها فراء . اولاقها متعاقبة ، رقيقة النصال المستطيلة . ازهارها عنكولي التجميع . ازهارها صغيرة ، صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

### ٢٨٨١٨ - نِسْئاس

Nisnas (F).

هو هجرس الغاب ، اطلبه .

### ٢٨٨١٩ - نِسْئاسَة

هي الطيطوى الاخضر ، اطلبه .

### ٢٨٨٢٠ - نِسْئوس

هو الثسر القبراني ، اطلبه .

### ٢٨٨٢١ - نِسْوَحَة

Poliste (F).

هي الزنبور الصغير ، اطلبه .

### ٢٨٨٢٢ - نِسْئَات

Nyssacées (F). Nyssaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها النسة .

### ٢٨٨٢٣ - نِسْج

Tissu (F). Tissue, Web (E).

الانسجة هي الخامات التي تتكون منها اعضاء الاجسام الحية . وهي عديدة الانواع المختلفة التركيب والخصائص تتألف من خلايا ماثلة شكلا وحجا . || اشهر انواع النسج ما يتبع .

### ٢٨٨٢٤ - نِسْج دُعَامِي

Tissu palissadique (F).

Palissadic tissue (E).

اسم يطلق على النسج المنفسي القائم الخلايا المتأسكة المشدودة كما هي الحال في نصال الاوراق .



نسطور

Crédit (F). ٢٨٨٤٠ - **تَسْيِفَة ، إِشْمَان**

Credit (E).  
الزَّام يقطعه مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يميز له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشتر بها نحوه . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). ٢٨٨٤١ - **نُشَاء ، نُشَاء**

النشا مادة عضوية لا متبلورة ، يفسد اللون ، عامدة العلم والرائحة ، ناعمة الملمس ، تلدب في الماء الدافئ . وهو ينتمي ككبريتاً إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر وكثير في بعض الحبوب والعلساق كالحنطة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والانيام الخ ...

فحة الحنطة تحوي نحو ٧٠ ٪ من النشا  
وحبة الارز تحوي نحو ٨٠ ٪ من النشا  
ولبوبر البطاطا يحوي نحو ٢٥ ٪ من النشا

Météorite (F). Meteorite (E). ٢٨٨٤٢ - **نُشَاب**

شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من حطام النيازك التي تحترق الاجواء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). ٢٨٨٤٣ - **نُشَاب**

نوع من الثعابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - **نُشَادَر ، نُشَادِر**

هو الامونياك ، اطلبه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). ٢٨٨٤٥ - **نُشَارَة**

صحيح الخشب الذي يخرج من الثقوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشجار والاعشاب || وهي ايضا صحيح الخشب الناتج عن النشر .

Osyris blanc (F). ٢٨٨٤٦ - **نُشَاس**

نبات زيبى يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

Cirro-cumulus ٢٨٨٤٧ - **نُشَاص ، نُشَارَة**

نوع من الغيوم البعيدة العالية ، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المنذوف || يقال صحاب نشاس وغيوم نمره .

Dynamique (F). ٢٨٨٤٨ - **نُشَاطَة ، دِيْنَمِيْكَ**

Dynamics (E). هي علم القوى .

٢٨٨٤٩ - **نُشَان** هو كركدن سويترا ، اطلبه .

Chromosome ٢٨٨٥٠ - **نُشْبَة ٥ ، نُشْطَة ٥**

مواد جبرية شكلية نووية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النشَب فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - **نُشَج** النشج هو جبرى الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). ٢٨٨٥٢ - **نُشَج ٥**

Phototactism (E). النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon ٢٨٨٥٣ - **نُشْخَة ٥**

التراث الوراثي الخارج عن نطاق النشَب .

Tissu adipeux (F). ٢٨٨٢٥ - **نُشِج شَحْمِي**

Adipose tissue (E).  
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وحوث شجاً من جراء التسمين .

Tissu conjonctif (F). ٢٨٨٢٦ - **نُشِج ضَامّ**

Conjunctive tissue (E).  
هو في النبات نسيج الرّون الذي يتكون من خلايا عادية التمييز تصنف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النشج .

Tissu nerveux (F). ٢٨٨٢٧ - **نُشِج عَصَبِي**

Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). ٢٨٨٢٨ - **نُشِج عَضْدِي**

Support tissue (E).  
هو النشج الدعامي الذي يمد النبات بالصلاية النوعية اللازمة .

Tissu musculaire (F). ٢٨٨٢٩ - **نُشِج عَضَلِي**

Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). ٢٨٨٣٠ - **نُشِج عَظَامِي**

Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). ٢٨٨٣١ - **نُشِج غُضْرُوْئِي**

Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). ٢٨٨٣٢ - **نُشِج كِسَايِي**

Revetment tissue (E).  
هو النشج الذي يغلّف الاعضاء النباتية الهوائية فيحميها من الجلل والنشاث ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). ٢٨٨٣٣ - **نُشِج مَتَسِي**

Meristamic tissue (E).  
كل نبات وعائي يحوي مجموعة من الخلايا غير الممتعة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النشجي ، تدعى المناطق المنقسمة . وهي تقسم الى قسمين قسم النشج المنسبة الاولى او الهامة وقسم النشج المنسبة الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). ٢٨٨٣٤ - **نُشِج مُوَصِّل**

Conducting tissue (E).  
هو النشج الوعائي والانبوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile ٢٨٨٣٥ - **نُشِجِي**

نعت تعريبي توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). ٢٨٨٣٦ - **نُشِيس ٥**

Normal humidity (E).  
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يبرهن عنه بالرطوبة النوعية .

Nucelle (F). ٢٨٨٣٧ - **نُشَيْلَة**

هي السرية اطلها .

٢٨٨٣٨ - **نُشَيْلَة** هي الزوان المعمر ، اطلبه .

٢٨٨٣٩ - **نُشِيسْم ، رِيْدَة**

Brise, Vent très faible (F). Breeze, Weak wind (E).  
كل ريح ضعيفة لا تحرك مجراً ولا تعني أثراً . ج. نسام .

## \* ٢٨٨٧٢ - نشيع الزرع

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

فطر مجهري يصيب النجيليات اغصانها الشعير والخنطة والشيلم والدخن والذرة || مظهره الخارجي يقع مستطيلة قدية الشكل تملو العصف فتبدو عابقة اللون ثم شاحبة وتنتهي بالسرة || يركب الزرع بعد ادياسه باربدة او خمسة اسابيع وينتقل من صفة الى اخرى اعل منها حتى السلة فينتهي عن التطعيم او يسبب انماض معقدا . يكافح اما بامتعال بذار جديد خال من فطر المرض او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

## \* ٢٨٨٧٣ - نشيع الشعير

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).

فطر مجهري يركب القلت وجيع انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجي ، في اول عهده ، يقع مائمة لا قياسية الشكل والحجم تملو نصل العصف وتستقر بين الاعصاب ، لوها الى الحنطلي الزيتوني اللامع ، ثم تتنجم وتتأخذ شكل المستطيلات || اضراره في القالب محوودة وقد تبلغ في بعض المواقع الرطبة والظروف الخاصة نحو ٥٠ ٪ . يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

## \* ٢٨٨٧٤ - نشيع الشوفان

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوفان فيطيه . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة شاحبة اللون ثم حنطية زاهية قفاكية تركب اواسط نصل العصف ثم تمع قسبب ذبوله وبياسه . اضراره في غالب الاحيان زعيدة || يكافح بتطهير البذار كغيره من فطور النشيع .

## \* ٢٨٨٧٥ - نصب

Plantation (F). Plating (E). النصب هو زرع الغراس في التربة . وقد يتم على عدة اشكال اعماها الرزدة والتخميس .

## \* ٢٨٨٧٦ - نصبة

Plant (F). Young plant, Slip (E). النصبة والزرعة والغريسة هي كل نبات صغير في تمكته مقبوره من استمرار الحياة متفردا .

## \* ٢٨٨٧٧ - نصبع

Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخضيب يوجود في ودة الخلية النباتية . ج . تصايع .

## \* ٢٨٨٧٨ - نصبة

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النصبة هي المصفورة ، انثى المصفور .

## \* ٢٨٨٧٩ - نصفيات الجناح

Hemiptera, Hemipteroides (S). Hémiptères (F). Hemiptera (E). طبقة حشرات من شعبة العليات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتبتي : متجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

Slage (F). Sawing (E).

## \* ٢٨٨٥٤ - نشر

هو قطع الخشب بالمشار .

Bulletin (F).

## \* ٢٨٨٥٥ - نشرة

## \* ٢٨٨٥٦ - نشرة جوية

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). موزن الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة . وقد تبحت ايضا في الاحوال الجوية المرتقبة .

## \* ٢٨٨٥٧ - نسج

Doser (F). To proportion (E). نسج وركز وعابر : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

## \* ٢٨٨٥٨ - نسجة

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

## \* ٢٨٨٥٩ - نسجة ذاعيفة

Dose létale (F). Lethal dose (E). هي الكمية اللازمة من كل مادة جحالية او سامة لقتلها على كائن معين موسوف .

## \* ٢٨٨٦٠ - نضل

هو اخراج المخرات من التراب في آخر التلم .

## \* ٢٨٨٦١ - نضم

Micocoulier (F). هو الميس ، اطليه .

## \* ٢٨٨٦٢ - نضم ابيض

Fabreoulier (F). هو ميس الجبل ، اطليه .

## \* ٢٨٨٦٣ - نضم شرقي

Micocoulier oriental (F). هو ميس الشرق ، اطليه .

## \* ٢٨٨٦٤ - نضم صيني

Micocoulier de Chine (F). هو ميس الصين ، اطليه .

## \* ٢٨٨٦٥ - نسمة

Anabase (F). هي الاناباز ، اطليه .

## \* ٢٨٨٦٦ - نشور

Affleurement (F). ضرب من السمك (السان) .

## \* ٢٨٨٦٧ - نشوط

نبات الرثد من اودته اول ما يبدو حين يصعد الارض .

## \* ٢٨٨٦٨ - نشوط


نشول : قلة الحرارة .

## \* ٢٨٨٧٠ - نشية

Odeur naturelle (F). Natural odour (E). هي الرائحة الطبيعية تفوح من الشيء دون واسطة . ج نشايا .

## \* ٢٨٨٧١ - نشيع

Pyrenophora (S). جنس فطور مجهرية من السخايات وفصيلة المشويات . تتميز باصاها السوداء الهللية المسام . تكاثرها دويوسية الشكل مرموقة . بونها شمعي التجميع ، نمالي الاينكاز ، وبثري الخلية || انواعه الاقتصادية قليلة اشهرها :



نضج الزرع



نضج الشوفان

## ٢٨٨٩١ - نَصَار ، كَامَلِيَّة Camelina (S).

Cameline (F).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . أنواعه عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيؤذيها || أشهر أنواعه النصار المزروع .

## ٢٨٨٩٢ - نَصَار مَزْرُوع \* ، كَامَلِيَّة مَزْرُوعَة

Camelina sativa, Myagrum sativum (S). Cameline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Cameline, Gold of pleasure (E). Echter Dotter, Leindotter (D). Cameline, Sesamo di Germania, Dardella (I).  
نوع من النصار الاستاثري زرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || عشبته فراءه . أوراقه صغيرة القد ، سنانية النصل الأخضر . أزهاره عقودية التجميع . أزهاره صغيرة ، صفراء اللون ، تنور في أوائل الصيف . ثماره غردلية ، بزورها دقيقة يضيء الشكل يرتقالية اللون تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

## ٢٨٨٩٣ - نَصَار Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، اطبله .

## ٢٨٨٩٤ - نَصَارِيَّات Chrysomelidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة غدديات الاجنحة . اجناسها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة القد . اجسامها مائلة البشرة ، زاوية الاطراف . قرونها الاستنشاقية عديدة الاشكال فيها الخيطي والحلبي والصولجاني والمشاري . اسرارها خاسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها اوراق واليابس واظهار النبات . مكثا تبني اللون ، تختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتص الاثني على النبات العائل او تلقيه في التربة قرب العرائل || يرقاتها خاضعة ، سداسية الارباع ، عديدة الالوان ، تركب النبات فتقضم الاوراق وتغرس السورق عند جفاف التربة وبعضها يركب الجلود || حورياتها صغيرة القد تلتحف بشرقتها تصنعها من الطين والمواد العضوية .

## ٢٨٨٩٥ - نَصَارِيَّةُ الْحَمَاض \* Gastrophysa raphani (S).

Chrysomèle de l'oseille (F).  
حشرة من النصاريات . طولها نحو ٥ م . ثوبها الى الخضار البرجدي الزاهي المواج . تظهر في أواخر الربيع وتنتج لطبخ مكثا على الصفحات السفلى من اوراق الحماض ينفتق خلال شهر ايار عن رقات سمراء اللون نمة تقضم الاوراق وتؤذيها .

## ٢٨٨٩٦ - نَصَارِيَّةُ الْحَوْر \* ، لِينَا الْحَوْر

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).  
حشرة من النصاريات طولها نحو ١١ م . رأسها ودوقتها الى الخضار الازرق المواج . غمدتها الى الحجرة يعملونها عند طرفها تبقيج اسود . اجيالها الحولية ثلاثة . رقاتها صغيرة القد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب اوراق الحور فتقضم الخشب ولا تترك سوى الاعصاب والشرابين . وقد تصدى على النوامي وعلى البرام الفتية فتقضي عليها .

## ٢٨٨٩٧ - نَصَارِيَّةُ الزُّوْفَا

تعرف بأديما مرجيناتا ، اطبلها .

## ٢٨٨٩٠ - نَصْفِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ Hémiptère (F).

نعت تعريبي يطلق على جميع الحشرات التي تلتصق الى طبقة نصفيات الجناح .

## ٢٨٨٩١ - نَصْل ، حَاشِيَّة ، شَقْرَة ، صَفِيحَة

Limbe (F). Limb (E).  
هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

## ٢٨٨٩٢ - نَصْلِي Limbale (F). Limbate (E).

نعت تعريبي توصف به الاعضاء التي تولد النصل كقولك خلایا نصلية .

## ٢٨٨٩٣ - نَصْلُ الْحَافِر Avalure (F).

Sloughing of the horny part of the (E).  
عارض يصيب الحافر فيسبب هبوطه في الخيل .

## ٢٨٨٩٤ - نَصِي \* Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E).  
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عمادة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في المواقع الرطبة والأتربة القليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر انواعه ما يتبع .

## ٢٨٨٩٥ - نَصِي أَلْبَق Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F).  
نوع من النصي يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه مزدوجة التصنيف ، نصلها مائل الصفحة العليا الخضراء اللون ، خلى السفلى الملققة بالابيض || يرغب في الأتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

## ٢٨٨٩٦ - نَصِي مَذْهَب Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F).  
نوع من النصي يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . سلامياتها بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم . نصلها خلى البشرة على صفحتيه ، يعلو توشيح ذهبي || يرغب في الأتربة الرملية الدبالية الرطبة .

## ٢٨٨٩٧ - نَصِي مَزْدُوجُ التَّصْفِيف

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).  
نوع من النصي يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ضيقة مستطيلة مزدوجة التصنيف تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها اخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبا أدجواني يميح عند الازرباب . يرغب في الأتربة العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

## ٢٨٨٩٨ - نَصِي يَابَانِي Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F).  
نوع من النصي يعلو من المترين الى الخمسة امتار . سلامياته الى الخضار الاسفر . اوراقه تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل الصفحة العليا المائلة الخضار ، خلى السفلى الزرقاء اللون . يرغب في الأتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

## ٢٨٨٩٩ - نَصِيب Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E).  
هو جزء من ذمة مالية يختص بها أحد المتقاسمين . وهو حصه المهر في شيء او مال شاع .

## ٢٨٨٩٠ - نَصْ ، وَشَل Suint (F).

Grease of wool, Yolk (E).  
هو نفضيس الصوف اخضره صوف الغنم .





ثلاثة خطوط سمر تعلوها كشاش من الحلب الدقيق ||  
طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي ضمن  
جرباب في التربة .



نضارية الصفصاف الخضراء

### ٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّة مُتَبَرِّجَةٌ

*Chrysomela fastuosa* (S). *Chrysomèle guindée* (F).  
*Chrysomela fastuosa* (E).

حشرة غاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات  
الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة  
الشفوية واخصها الصمتر . خنافسها تعيش على الاغذاء  
والتواصي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد  
يطول من ٦ الى ٧ مم . ثوبها الى الخضار الاسفع المواج  
يعلو في الظهران تحشيش طولي ارجواني وازرق . رأسها  
كبير الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان ،  
دقيقان . ظهراتها مستدير الزوايا والظرف اللاحف .  
غمداهما متباعدتان التفرقت الخفيف . ارساغها رباعية المقل  
الظاهرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه  
واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة  
الجلجلة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تخرج  
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول  
نحو ١٢ مم . جسمها وشي الشكل ، قليل التقويس .  
مستطال المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الروابج . ثوبها  
الى الطحلة الخطية المواج . رأسها وشريها ودراجها الى  
السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع  
ينتهي في التربة تحت الجلجلة او تحت الحماجرة .



نضارية الصفصاف الزرقاء



نضارية القرة



نضارية القريعات

### ٢٨٩٠٨ - نُضَارِيَّة الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءُ \*

*Phyllodecta vitellinae* (S). *Chrysomèle verte de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ مم . ثوبها  
الى الخضار الزبرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبراعم  
الصفصاف فتؤذيها اشد الاذى .

### ٢٨٩٠٩ - نُضَارِيَّة الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءُ \*

*Phyllodecta vulgarissima* (S). *Chrysomèle bleue de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٥ مم . ثوبها الى الزرق  
القائمة . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتخربها  
وتقتسم الدوامي وبراعمها فتؤذيها اشد الاذى .

### ٢٨٩١٠ - نُضَارِيَّة الصَّلِيصِيَّاتِ

هي الخلدوش ، اطليه .

### ٢٨٩١١ - نُضَارِيَّة القُرَّة \*

*Phaedon cochleariae* (S). *Chrysomèle du cresson* (F).

حشرة من النضاريات بيضبة الشكل عمودية ، طولها نحو  
٤ مم . ثوبها الى الزبرجدي يعلو مواج ازرق . زباناها  
الى السوداء النحسي . تركب مع يرقاتها اوراق القرة فتجعلها  
كالسدر وتتدلى على اوراق الفجل واللفت والملفوف فتفعل  
فيها فعلها بالقرّة .

### ٢٨٩١٢ - نُضَارِيَّة القَرَعِيَّاتِ \* ، رَقِيسْد ،

*Raphidopalpa foveicollis* (S). *Raphide, Galéruque du melon* (F).

حشرة من النضاريات ، طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى الحمرة  
البرتقالية . تعيش على اشباب المراعي الطبيعية والنقصة  
والبرسيم . اناتها تلقي بمكها على التربة قرب عوائلها ، اخصها  
القرعيات ، فينقب المكان عن رفات صغيرة تبينة اللون  
تركب وتخرس سوق الشمام والبطيخ والخيار والكوسى وسائر  
نباتات الفصيلة القرعية .

### ٢٨٩١٣ - نُضَارِيَّة الكَرْمَةِ

هي رموس الجفنة ، اطليه .

### ٢٨٩١٤ - نُضَارِيَّة اُنْبَقَة \*

*Chrysomela polita* (S). *Chrysomèle élégante* (F). *Chrysomela polita* (E).

حشرة غاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مفدمات  
الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وفضاف مجاري الماء .  
خنافسها وبقراتها تعيش على جميع انواع التمع البري  
والزراعي فتتغصم الاوراق وتؤذيها || جسمها صغير القد  
يطول من ٦ الى ٨ مم . ثوبها متراكب الالوان كوسلها  
الى الشقعة النحاسية الخضراء المواج ، ظهراتها الى الشقعة  
الصنايية المذهبة المواج . رأسها معتدل الجرم . عينها  
صغيرتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهراتها معتدل  
الاحدياد مستدير المؤخر الخفيف . ارساغها رباعية  
المقل الظاهرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً  
منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة زبانا || اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر  
الصيف . تخرج في النهار || والبرقة عند ادراكها الكمال  
الجمودي تطول نحو ١٥ مم . جسمها وشي الشكل ،  
قليل التقويس ، احمل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر  
اللون . دراجها الى السمرة . تحمل في ظهرها ويانبيها

### ٢٨٩٠٦ - نَضْبُ

*Tarir* (F).  
*To drain, To exhaust* (E).

نضب التبع : انقطع ماؤه . ونضب الماء : غار في الارض .

### ٢٨٩٠٧ - نَضُج

*Pleine maturité* (F).  
*Full maturity* (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجمسوري ويصورها آخر دور  
من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والابناج .

### ٢٨٩٠٨ - نَضُج

*Bassinage* (F). *Sprinkling* (E).

هو الاسقاء بالرداذ اي الاسقاء الخفيف .

### ٢٨٩٠٩ - نَضُج

*Pulvérisation* (F).  
*Pulverization* (E).

هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص  
يدفعه بمف .

### ٢٨٩١٠ - نَضُد

*Stratifier* (F). *To stratify* (E).

نضد البذور ، جعل بمضها فوق بعض صفيقاً مَرَصَافَةً  
متتابعة .

### ٢٨٩١١ - نَضَف

هو الصمتر البري ، اطليه .

### ٢٨٩١٢ - نَضَفَة

*Naucles* (S).  
*Naucière, Milan-hirondelle, Epervier à serpent* (F).  
جنس طير من حمارة الحداة وفصيلة السقرات . انواعه  
المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الجاهة . رؤوسها  
صغيرة . اعناقها قصيرة . سواقطها مستطيلة ذائقة الاطراف .  
اذنابها شديدة الطول فارقة . مناسرها قوية ، منقطة البهرة  
الحادة . ارساغها قصيرة ، مخالبها قوية ذرية . || تألف  
الحياة الجاهية سربها يراوح من ١٠ الى ١٠٠ زوج .  
قوتها الحشرات والوزع والفضا والحيات ، تدن اركانها  
في فن الاشجار اخصها السنديان والصنوبر . اناتها تنصع



نضارية انيقة

وهو سريع النمو ولادراك يجود في الاثرية الكلسية التي لا تصلح للزراعات الاخرى .

### ٢٨٩١٨ - نَحْشَاش \* ، قُنْشُد التَّمَل

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاس من وحدات المسلك .  
انواعه المعروفة قليلة ، اعطانها جبار استراليا وفيها الجديدة .  
اجسامها مكورة تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . يغلفها شوك دقيق كثيف ذوب الاطراف كشوك القنفذ . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل تنتهي بخلم مستطيل كالنفاخ . جرابها مسلمة باظافر قوية سادة تحمكها من الحفر . السنتها مستطيلة دقيقة احادة اندفاعية تحمكها من ارتشاش الحشرات والذمل . تألف المواقع القليلة الادغال . تسرح في الليل . محاجرها دهاليز متعادية المتناوب وحيدة المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَحْشَوَة Fer à cheval (F), Horseshoe (E).  
حديقة تمتل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَحْشِي Verge des équidés (F).  
Penis of the equidae (E).  
النحشي قضيب ذكر الخيل وحر الوحش .

٢٨٩٢١ - نَحْشِي Couche (F), Layer, Stratum (E).  
كل ساف مرصوف من الشي المنصود .

٢٨٩٢٢ - نَحْشِير Eucharis  
جنس نباتات بصلية من فصيلة الترجيبات منها المقدر بلاد امريكا الجنوبية . انواعه المعروفة قليلة ، بعضها بري وبعضها تربيني . اوراقه قدية الشكل مخددة التصل . شمارجه مجوفة تنتهي بفسمة من الازهار عطرية العرف الفرج ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان . || اشهر انواعه التريينية نصير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَحْشِير الْأَمَازُون \* ، نَحْشِير الْأَمَازُون Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F), Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).  
نوع من النصير الترييني السبروني . اوراقه قرصية الانتشاب مستطيلة التصل القدي الشكل المخددة الصفحة . شراخه الزهري يحمل فسمه من الازهار الماجية العطرية العرف . يجود في جميع المواقع والاثرية ولا يخشى سوى الرطوبة المستحكة .

٢٨٩٢٤ - نَحْطَاة Cupule  
هي قمع الزهرة والشرة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَحْطَاح \* ، أَبُو حَرَبَة Monacanthus (S).  
Monacanthé (F), Monacanthus (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاسيات الجلد ، تقتني الى مجموعة الففري اي عنز الماء . انواعه المعروفة خمسة اعطانها جبار البلاد الحارة || اجسامها ربة تطول نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القد ، مخروطية الشكل ، متوجة بقرن كالخربة ينشرب في القعة . زعانفها الصدرية والبطنية والظهرية شائكة . اثوابها الى الطحلة السوداء المبقعة والمزخمة بالابيض والاصفر والافضر . زعانفها صفراء اللون || لحويها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٨٩٢٦ - نَطَّار Epouvantail (F), Scarecrow (E).  
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمباقل مزجرة الطير والوحش .

من ريفتين الى اربع رفات تحضنها بمنابرة الذكور . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

### ٢٨٩١٣ - نَصْفَةُ افْرِيقِيَّة \*

Naclerus rlocouri (S), Naclère d'Afrique (F).

نوع من النصفه ، موطنها معظم اقطار افريقية الجنوبية والشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها وصنقا وصدرها وبطنها الى البياض العاجي . سقاطها وظهورها وذهنها الى السواد اللامع تملو ماجة خضراء . منسرها اسود اللون . حذقة فيها كاليقوت . ارساها كاسية . || تألف الاحراج ويجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق . سرها يعد من ١٠ الى ٥٠ زوجا .

### ٢٨٩١٤ - نَصْفَةُ امْرِيْكِيَّة \*

Naclerus furcatus (S), Naclère-martinet, Naclère d'Amérique (F).

نوع من النصفه ، موطنها فسيح الاربا . يشمل امريكا الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها وصنقا وجوشها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسود اللون ازرق المراج تملو خضرة صفراء . منسرها عايق السرعة . حذقة فيها جثوية . ارساها الى الصفار الاخضر المراج . تألف الاحراج . تجوب البلاد الامريكية في طلب الرزق والصيف والمشي . سرها يعد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَقْم ، سَرَّازَان Fagopyrum (S), Sarrasin  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطيانيات . سورها منتصب قليلة الصلابة . اوراقها متعاقبة معتقة . نصالها قليلة الشكل او سهية ، خماسية اللوح ، عايقة الخضار . ازهارها عقدوي التجميع . ازهارها خنثوية ، صغيرة القد ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها حقائق لا قياسية الشكل والحجم يكثر فيها المخروطي . بذورها حبة المادة ، دقيقتها غذائي شائع الاستعمال في صناعة الماعين و علف الدواجن || . اعرف انواعه واشهرها مايتبع .

### ٢٨٩١٦ - نَقْم شَائِع \* ، سَرَّازَان شَائِع ، حَنْطَة سَوْدَاة ، قَمَح البَقَر

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).  
Sarrasin commun, S. ménager, Blé noir, Bucal, Carabin (F), Buck wheat, Sarrasin corn (E), Buckenweide, Echter Buchweizen (D), Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النقم الزراعي ، ساقه منتصبه فراء . اوراقه سهية التصل ، مستطيلة الملق ، لاحقة الهند . ازهاره بيضاء اللون . حقائقه مخروطية الشكل حادة الزوايا . بذوره سود . وهو سريع النمو ولادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠ الى ١٩٠٠ مرة تنوعها ينحو ١٠٠ يوم . وهو يجود في جميع الاثرية باستثناء القوية الاندماج الرطبة .

### ٢٨٩١٧ - نَقْم هِنْدِي \* ، سَرَّازَان تَقَرِي ، حَنْطَة تَقَرِيَّة ، قَمَح البَقَر الهِنْدِي

Fagopyrum tataricum (S), Sarrasin de Tartarie, S. de Sibérie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E), Grüner Buchweizen (D), Saraceno di Siberia (I).

نوع من النقم الزراعي العلفي . ساقه منتصبه فراء . اوراقه لنبية التصل ، امحاده مجنحة لا حاضنة . ازهاره الى الخضار الاصفر . حقائقه رباعية الحروف مستطيلة الشكل . بذوره صغيرة حرسه سمره اللون علفية غزيرة المادة الغذائية .



## ٢٨٩٣٧ - نَظَاشُ مِصْرِيّ

*Crotalaria segyptica* (S). *Crotalaire d'Egypte* (F). *Rattle-box* (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).  
نوع من النطاش المعمّر. جنبته مثنونة القذ، فراء الساق، صغيرة الارواق السنانية الزدية. اعطانه فسيحة الارباء تمتد من مصرأ سينا الى الحصارى المصرية.

Chromosome ٢٨٩٣٨ - نَظَاشَة

هي النشبة والكرموزوم.

## ٢٨٩٣٩ - نَظَل، طَعَمُ المَزْدَرَع

*Goût de terroir* (F). *Native tang*, *Raciness* (E).

طعم خاص يعطو طعم بعض المحاصيل الزراعية كالعنب والتينغ فيشيبها بعض الشيء وهو يعود الى بعض عناصر التربة اللامتجانسة الدائمة.

Vin de presse (F). ٢٨٩٤٠ - نَظَل

ما يسيل من عصر العنب وقد تكون غرة اذا حسن صنعها فاشرة الصف.

Nothura (S). ٢٨٩٤١ - نُظُورَة \*، نُوَظَر

Nothure (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الزرقنات. انواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد امريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من الفرغر. اجسامها متوسطة القد. اذنانها جذعة. اثوابها الى الصبهة المشقة والحذمة بالاسود. اعناقها وصدرها وبطنها الى الصبهة السنانية الزاهرة || قوتها الحشرات والبلذور البرية. تألف حواشي الغابات. صيدعا مرغوب فيه لانها من الطرائد السنية المستحبة الطعم.

Natica (S). ٢٨٩٤٢ - نَظِيشَة \*

Natic (F). *Natica* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وفصيلة النطيشيات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرخويات والديدان || اصدافها مائسة، شبه كروية الشكل، صغيرة القعب المحزن المذهب. اجسامها فضية الشكل، مستعرضة الاربدة، عريضة الرؤوس المبطة، ثنائية اللواس المعبونة، كبيرة الاربيل || تعيش في الاسمال وعلى رمال الشطوط المغمورة بالماء.

Naticidae (S). ٢٨٩٤٣ - نَظِيشِيَّات

Naticidae (F). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل وحيئات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والجبورية، وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصدافها شبه كروية الشكل، صغيرة اقنعة، قصيرة القلوب، فسيحة الفوعة. اسفاطها كبيرة، قرنية المادة او كلسية، توصد الفوعة عند الحاجة || جميع انواعها مفترسة تقتضي عل الديدان والرخويات الصغيرة. اعرف اجناسها واشهرها النطيشية.

Alnitam ٢٨٩٤٤ - نِظَام

النظام نجم نير من كوكبة قيطس مركزة على اصل الذئب.

Statut (F). *Status* (E). ٢٨٩٤٥ - نِظَام، قَانُون

هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل.

## ٢٨٩٢٧ - نَظَاشُ الكُورِيل \*

*Lestoteuthis Kamschatka* (S).

*Lestoteuthis de Kamschat* (F).

حيوان بحري مفترس رشيد الجنس والنوع من الرخويات رأسيات الاربيل، مزدوجات الخياشيم، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردوسيات. اعطانه جزر الكوريل || جسمه مخروطي الشكل، كبير القد، يطول نحو خمسة امتار، زعنفته طرفتيان، كبيرتان، مزوانيتان. جرامزه عجمية، طليقة، لامتناهية الطول ونها زوج لقيف شديد الطول ينتهي برسى سنانية الشكل تملؤها حناجر وكلايب.

## ٢٨٩٢٨ - نَظَاشُ اخْضَر

هو القبوط الاخضر، اطليه.

## ٢٨٩٢٩ - نَظَاشَات

فصيلة حشرات من نمديات الاجنحة تعرف بالسالوليات، راجعها.

## ٢٨٩٣٠ - نِظَاق، نِظَاقُ الجَزَءِ

*Baudrier d'Orion* (F). *Alnitak* (E).

النطاق او نطاق الجوزاء ثلاثة انجم مستعرضة وباصة في وسط الجوزاء تسبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والانتظام.

## ٢٨٩٣١ - نَظَح

الطلع نجم نير من كوكبة برج الحمل.

Notornis (S). ٢٨٩٣٢ - نَظَرْنُوس \*

*Notornis* (F). *Notornis* (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة النطليقيات. انواعه المعروفة ستة انقرض خسة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاقه. موطنه غابات نيوزيلندا وارجعها || جسمه يضاهي اجسام الحبشيات لكنه صغير الجناح، عادم الذنب، ضليع المنقاد القصير المخروطي الشكل || قوته الاعتشاب والبلذور والحبوب البرية. مسرحه عند الصباح ويقل الغروب. يعدو بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه.

Nitre (F). ٢٨٩٣٣ - نَظَرُون

هو ملح البارود، اطليه.

Nitreux (F). *Nitrous* (E). ٢٨٩٣٤ - نَظَرُونِيّ

نمت تعريفي يدل على وجود النطرون، ككوك حامض نطروني وزراب نطروني.

*Crotalaria* (S). *Crotalsire* (F). ٢٨٩٣٥ - نَظَاش \*

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراسية. انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها جنبات واعشاب برية. منهاها البلاد الحارة من المابين القدم والجديد. اوراقها واغصانها مرعوية تتلفها الماشية. ازهارها مغترية تجرهرها النحل.

*Crotalaria juncea* (S). ٢٨٩٣٦ - نَظَاشُ البَنَغال

*Crotalaire du Bengale*, *Chanvriar du Bengale* (F). *Bengal hemp plant*, *Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).

نوع من النطاش يكثر في بعض مناطق الهند اخصها البنغال. ساقه اسلية الشكل يستعملون لافانها استعمال القنب.



نطروش



نطش



نظورة



نطيشة

Paranucléines (F). **نَظِيرَةُ النَّوَاتِين** ٢٨٩٦٢

Zygomycètes (F). **نَظِيرَات** ٢٨٩٦٣  
مرتبة من رتبة الفطور البيضاء، أجناسها وأنواعها كثيرة  
العدد تنقسم إلى فصليتين: المجففات والمغليات.

Corbillat, Corbillot (F). **نَعَاب** ٢٨٩٦٤  
فرخ الغراب.

Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian  
canary (E). **نَعَار \* ، نَعَر سُوْرِي** ٢٨٩٦٥

نوع من النعر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد اللبنانية  
السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه ترنجبي اللون يعلوه في  
ظهره وجناحيه شمشيح اسمر. زوره وبشوشه وبلطه إلى  
الصغار البرتقالي المواجه تملوه بقشة مستطيلة سمراء. منقاره  
وهذقه عينه وسفاهه سمراء. || يألف الحداثق والجناش  
والنابات القريبة من الممران. يذفن عشه في الاشجار الغناء.  
اثناء تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها وسدها نحو ١٣  
يوماً.

Embryologie (F). **نَعَارَةٌ** ٢٨٩٦٦  
Embryologie (E).

Embryologie végétale (F). **نَعَارَةٌ نَبَاتِيَّةٌ** ٢٨٩٦٧  
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل  
المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

\* **نَعَاسَةُ التَّبَعِ** ٢٨٩٦٨  
Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du  
tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كرمية الرائحة صغيرة القد مستطيلة الشكل  
من فصيلة خاسيات الفواصل. طولهاراوح من ٨ إلى  
١٠ سم. رأسها اسود اللون. زياناها خيطية مستطيلة  
منمنقة إلى الوراء. ظهرها ملون وموشح بالخطي والوردي  
والاسمر والاغير والاسود. بطنها إلى السمرة العابقة.  
اناثها تمتع الممكن افرادياً في وثن التصل فينقش بعد متحه  
بنحو ٧ أيام عن يرقات دقيقة مرقلة تركيب التصل وتمتص  
خلايا نسجها || الحشرة الكاملة تمتص عصارة قة الساق  
وفصول الأوراق الخالية فتسبب لها الذبول والالتواء نحو  
الأرض فتبدو كأنها عادمة الحيل لا تقوى على متابعة  
شباغها ودورتها الحياتية || اضرارها قد تكون جسيمة اذا  
اعترت الشول في زمن الشاوخ. تكافح عند الحاجة باستعمال  
احد الحواشير النافذة الذي يؤثر في اعصاب الحفم.

٢٨٩٦٩ - **نَعَاعَةٌ** بقلة ناعمة كالناعمة. ج نعام.

٢٨٩٧٠ - **نَعَام ، نَعَالَم**  
النعام او النعام منزل من منازل القمر البائية. وهي ثمان  
كواكب على اثر الشولة. اربعة منها في الهجرة وهي النعام  
الواردة لانها شرعت في الهجرة كأنها تشرب. واربعة خارجة  
عن الهجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت ||  
رقيب النعام يدعى الهنعة.

٢٨٩٧١ - **نَعَامَات**  
النعامات خمسة نجوم من كوكبية يقطس مركزها في اواسط  
البذن.

Régime (F). **نِظَام ، أُسْلُوب** ٢٨٩٤٦  
Rules, Regulation (E).  
مجموعة القواعد المفروضة او المتبعة.

Système (F). System (E). **نِظَام** ٢٨٩٤٧  
مجموعة عقائد أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اعتقاد  
خاص.

٢٨٩٤٨ - **نِظَامُ الاسْتِغْلَال ، طَرِيقَةُ الاسْتِغْلَال**  
Système de culture (F). Cultivation system (E).  
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه.

٢٨٩٤٩ - **نِظَامُ الاسْتِزْنَاك**  
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).  
هي المضاربة التي ترمي الى خفض اجور العمال حتى الحد  
الادنى.

٢٨٩٥٠ - **نِظَامُ الْأَمْثَالِ الْعَامَّةِ**  
Domainialité publique (F). Public property (E).  
نظام قضائي خاص سنّ للاعمال العامة.

٢٨٩٥١ - **نِظَامُ الْحَصْرِ**  
Régie (F). Stewardship (E).  
ادارة الاعمال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً صحيحاً.

٢٨٩٥٢ - **نِظَامُ الْمَطَر ، مَنَاجِنُ الْأَمْطَار**  
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).  
كيفية الاطوار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور  
السنة.

٢٨٩٥٣ - **نِظَامُ التَّعَابُكَات**  
Syndicalisme (F).  
Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - **نِظَامُ دَوْرِي**  
Système circulaire (F).  
Circulation systemic (E).

نظام دورة الدم في المجموعة الوعائية الجسدية.  
٢٨٩٥٥ - **نِظَامُ عَيْشِي**  
Statut réel (F).  
Real status (E).

صفة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال  
المنقولة منفرده.  
٢٨٩٥٦ - **نِظَامُ وَرَقِي**  
Foliation  
النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخذ الورق  
على الفصن. ويدعى الارياق.

٢٨٩٥٧ - **نَظَرِيَّة**  
Théorie (F). Theory (E).  
مذهب علمي او علم نظري لا عملي.

٢٨٩٥٨ - **نَظَرِيَّة**  
Théorème (F). Theorem (E).  
قضية يطلب برهانها.

٢٨٩٥٩ - **نَظَرِيَّةُ الطَّوَرِئ**  
Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - **نَظْم**  
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء تدعى النطاق ، راجع نطاق.  
٢٨٩٦١ - **نَظِير ، نَظِيرُ السَّمْت ، سَمْتُ الْقَدَم**  
Nadir  
نقطة السماء التي تحت قدمي الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نعار



ناعسة التبغ



نعام



نمبول باشا



نمرة البقر



نمرة المائي



نمرة المزن



نمرة سوداء



نمرة مزعجة

## ٢٨٩٧٩ - نمرجة

Brebis (F). Ewe (E).

أنثى القسان منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها أي من وقت صلاحها للسفاد .

## ٢٨٩٨٠ - نمر

Tabanus (S).

Taons (F). Gadflies (E).

جنس حشرات من النمرات. أنواعه عديدة ، ذكورها تعيش على ريق الازهار ، أنثاها تعيش على ما تحته من دم وهي تلص الحيوان ولا تنف عن الانسان . وبعضها ينقل مرض الدباب في الابل الى الخيل فيبعضها . الواحدة منها تدعى نمر . اعرفها واسمرها ما يلي .

## ٢٨٩٨١ - نمرعة

Embryon d'animal (F).

Animal embryo (E).

## ٢٨٩٨٢ - نمرعة البقر

Tabanus bovinus (S).

Taon des bœufs (F). Ox-fly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١٨ الى ٢٥ سم . ثوبها الى السرة . صدرها وساقها صفر . ارسافها سود . يكثر وجودها في فصلي الصيف والخريف . أنثاها تنمى على البقر والخيول والحير .

## ٢٨٩٨٣ - نمرعة المائي

Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٦ الى ١٠ سم . خطها قصير القد . عويناتها خضر يعلوها موج ذهبي لامع . أنثاها تنمى على الخيل والحير والبقير ولا ترتد عن مائها .

## ٢٨٩٨٤ - نمرعة المزن

Chrysosona pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).

ذباب صغيرة من النمرات ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . عويناتها خضر النصف الاعلى ، زرق النصف الاسفل . يكثر وجودها من حزيران الى اواخر ايلول . أنثاها تنمى على جميع الدواب وتقتحم الانسان .

## ٢٨٩٨٥ - نمرعة سوداء

Tabanus morio, Pangonius micanus (S). Taon noir (F).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبها اسود اللون ، زباناها الى الصفة ، خطها مستطيل المنك . يكثر وجودها من حزيران الى تموز .

## ٢٨٩٨٦ - نمرعة مزعجة ، نمرعة الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bryant (F). Gadfly (E).

ذباب من النمرات ، طولها يراوح من ١١ الى ١٥ سم . ثوبها اسمر اللون مبقع بالاسود . مقدمها اغبر . عويناتها الى الخضر المشع بالاحمر . يكثر وجودها من ايار الى حزيران . ذكورها لا تفارق ازهار الخيميات . أنثاها تقتحم جميع الحيوانات ولا تنف عن الانسان .

## ٢٨٩٨٧ - نمرات

Tabanidae (S).

Tabanidae, Gadflies (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من الذباب الكبير . اعطائها مستطيلة ، احاطها ثالثة ماصة ولاعة . قروها الاستعمارية لذاتة الفواصل . عويناتها كبيرة القد ، متصلة في الذكور ، مفترقة متباعدة في الاناث . اجنحتها غشائية التركيب شفافة . ذكورها تعيش على مثر الازهار وداعة الانجاز

## ٢٨٩٧٩ - نمرجة ، نمرعة

Struthio camelus (S). Austruche (F). Ostrich (E).

طائر من العوادي وحيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات . اسم الجنس نعام والذكر ظلم والاني ربداء وقلوص والصغير ربال والجماعة بنات الحق وعود . وكنتها ام البيض . صياح الظلم يدعى عرادا وصياح القلوص زبارا . || تعتبر النعام اكبر واضخم الطيور المعاصرة . تملحو نحو ٢٦٠ سم . والذكر ارفع من الانثى . ريشها ناعم مبدل متباين . لونه يراوح من الاسود القاتم الى الرمادي فالابيض ثم البني . عنقها منتصب مستطيل ، عادم الريش ، كثيف الزغب الاغفر ، ينهي برأس صغري القد وسنقار مفلطح . ساقها قويان رفيضان تساعدها على العدو السريع . يبعضها كبير القد ، عاجي اللون ، اصفر المراج ، زن الواحدة منه ١٤٥٠ غ . قوتها الاشباب والبقول والصبان والبلور والحبوب والبار والخرشا والعفاه البع ... || تدن في اخصوس من الرمل قنره ١٠٠ سم . وعقه ٣٠ تضع فيه من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر من ٤٢ الى ٤٨ يوما .

## ٢٨٩٧٣ - نعام امريكية

Nandou (F).

هي الرواح ، اطها .

## ٢٨٩٧٤ - نعامي

Vent du sud (F).

South wind (E).

النعامي ريح الجنوب لانها ابل الرياح واربطها .

## ٢٨٩٧٥ - نعاميات

Struthionidae (S).

Struthionides (F). Struthionidae (E).

فصيلة طير من رتبة العوادي ، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام والرواح والامو . جميعها سريعة العدو ، كبيرة القد ، مستطيلة العنق الدقيق الازغب الريش . ارسافها رفيعة قوية تقني باصبعين او بثلاثة اصابع . اجنحتها صغيرة ضيقة لا تمكنها من الطيران . ارسافها رهلة متهلة لا مباسكة . تعيش من ٢٥ الى ٣٥ سنة . موطنها المناطق الحارة من افريقية وامريكية واستراليا .

## ٢٨٩٧٦ - نمبول

Spilornis (S). Buse huppée (F).

جنس طير من السقاوت وفصيلة الصقريات . انواعه عديدة جميعها من اوابد المناطق الحارة . اجسامها ريمة ، انواها مختلفة الالوان التركية . تتميز برومها المنحوتة بكشفة قنينة الارتكاز . || تعيش في الجبال الجرداء وفي القيات الفاحشة . قوتها القروام والزحافات والافاعي والحشرات . اشهر انواعها نمبول باشا .

## ٢٨٩٧٧ - نمبول باشا

Spilornis bacha (S).

Buse huppée bacha, Bacha (F).

طائر من النمبول ، طولها نحو ٦٥ سم . وريسلته ١٥٠ سم . ثوبه اطمل اللون ، عاق الظهر والسقط ، اغبر البطن ، يعلو توشم ابيض مستدير . كشته بياض الانتشاب سوداء الطوف . حدقة عينه جزوية اللون . مخالبه صفر ، منسر ازرق اللون اغبر المواج || موطنه قسم الارباء بين من افريقية الجنوبية الى الشرقية فاهند فالصين . يدن وكته في شخايف : الصغور الناتئة ، اثناء تضع من رفة الى ثلاث رفات تحضنها وسدها نحو خمسة اسابيع .

## ٢٨٩٧٨ - نمبول

النمبول هو الذئب : الذكر من الصباغ .

٢٨٩٩٥ - **نُملُول** \*  
Otiorynchus (S).  
Otiorynchus (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E).  
Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssel (D).

جنس حشرات رابطة من فصيلة البوسيات. أنواعه عديدة، أعطانها العالم أجسامها صغيرة القد. رؤوسها وأنتاكها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكبرة منفردة الزوايا تنشب في مقدمة المتناك. أعناقها صلبة. سيقانها مسنة. أرسافها رباعية. ألوانها تراوح من الخشن إلى الأسود. قشائرها دقيق السهف والحلب تملؤا أعايد وراويق مختلفة. جميعها تسرح في الليل وترقد في النهار. رقاتها تعيش في التربة على المواد العضوية ومنها تقضم الجذور كما هو الحال في نملول السكك. || أعراف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٦ - **نُملُول أَحْمَر الساق** \*  
Otiorynchus lugdunensis (S). Otiorynchus à pattes rouges (F).  
نوع من النملول، مرتمه الاشجار المشرفة ومشاكلها. يكثر في المناطق الجبلية. طوله يراوح من ١٠ إلى ١٤ سم. ثوبه إلى السواد اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشائرها عديم السهف، عشاري الاخايد. || يسرح في الليل. قوته النملول الأوراق والبراعم.

٢٨٩٩٧ - **نُملُول الزَيْتُون** \*  
Otiorynchus cribricollis (S). Otiorynchus de l'olivier (F).  
نوع من النملول، مرتمه الاول شجرة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم. جسمه يضيي الشكل. ثوبه إلى السمرة السوداء. متكه مخروطي قصير. زباناؤه مستطيلان منفردا الزاوية. سكبته رافعة الطرف. مقدم جوشه بالغ التحصين. قشائرها عشاري شديد. اخايد مبهدة الحروف، منتظمة التغطيط. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية بلتهمها بشراة.

٢٨٩٩٨ - **نُملُول السكك** \*  
Otiorynchus rugosostriatus (S). Otiorynchus des cyclamens (F).  
نوع من النملول. مرتمه الورد وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم. ثوبه إلى السمرة السوداء. زباناؤه إلى الجؤوة. متكه يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التحديد الطولي، كثيف الركيات السهفية، مبهر الهل || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية. اذاه الاكر يأتي برفاته التي تعيش في التربة وتلتهم جذور السكك تنفضي عليه.

٢٨٩٩٩ - **نُملُول الكاشن** \*  
Otiorynchus ligustici (S). Otiorynchus de la livèche (F). Lovage weevil (E). Liebstöckelrübler (D).  
نوع من النملول، مرتمه الكاشن والتفل ومعظم القرنيات وبعض الاشجار المشرفة. طوله يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبه إلى السمرة الريداء. متكه استطواني الشكل. مقدم جوشه منتظم التحصين. ظهرانه سهي القشار، متين المخطوط || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ - **نُملُول الكرّمة** \*  
Otiorynchus sulcatus (S). Otiorynchus de la vigne (F). Vine weevil (E). Gefurchter Lappenrübler (D).  
نوع من النملول، مرتمه الكرّمة ولا ينف من الاشجار الشجرة والخرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. جسمه

الخردشة والثار الناضجة المطبوقة. اما انثاها فقوتها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تنصه من الحيوان لانها لا تستغني عنه في تكوين المكن. مكنتها وشي الشكل تنصه الاثا صقفا متتابعة متراسة فينقف بعد متحه بمدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || رقاتها دودية الشكل، غبراء اللون او صفراء. يملؤها تجذيع اسود وهي تعيش في الماء والثريل والوسل والرمال الرطبة والاعبال الكيفية المنحلة.

٢٨٩٩٨ - **نُصَّة** \*  
Fagne (F). Upland moss-hug (E).  
هي الارض الرطبة كثرت اعشائها الطوية التي ترقادها بهم.

٢٨٩٩٩ - **نُصَّة** \*  
Flacourtia (S). Flacourtie (F).  
الواحدة نصفة. جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة النصفيات. انواعه المعروفة ١٢ مهدا الهند وسائر بلاد الشرق. جلدها معتدلة السوق. اغصانها فارشة. اوراقها متعاقبة. انزعارها ثنائية المسكن. انزعارها سنبل التجميع، تاجي الاذنكاز. ثمارها مأكولة، كرزية الشكل صغيرة القد، كثيرة العدد، تتوال نحو ثلاثة اشهر. اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٠ - **نُصَّة سَرَحَة** \*  
Flacourtia inermis (S). Flacourtie inermis (F). Lovilovi (E).  
نوع من النص، شجرته تملو من ٤ إلى ٥ اثمار. ساقها اغصانها سرسة. ثمارها كرزية الشكل والقند تتوال من ٨ إلى ٩ اشهر، لونها إلى الحمرة الزاهية، ساقها قليل الحموصة، غزير العصارة، يؤكل ويربب.

٢٨٩٩١ - **نُصَّة مَدْعَسَكْر** \*  
Flacourtia ramontsi (S). Prunier de Madagascar, Ramontchi, Marronne (F). Governor's plum, Madagascar plum (E). Achte Flacourtie (D). Pruno del Madagascar (I).  
نوع من النص، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرسة. اغصانها فناء قليلة الشوك. ثمارها كروية الشكل قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الجؤوة اللامعة، ساقها مستحب الحموصة يكثر استعمالها في المربيات. لحاء ساقها حولي القلافة. قلفه دباغي المادة شائع الاستعمال.

٢٨٩٩٢ - **نُصَّة هِنْدِيَّة** \*  
Flacourtia cataphracta (S). Flacourtie de l'inde, Prunier malgache, P. de l'inde (F). Indian plum, Rumeala plum (E). Flacourtie (D). Pruno d'india (I).  
نوع من النص شجرته تملو من ٥ إلى ٦ اثمار. ساقها اغصانها شائكة. انزعارها صغيرة القد تستقية اللون. ثمارها غوخية الشكل، كشمشية القد، كرزية اللون، جامدة السقود، ظاهرها الحموصة، تستعمل قربيبي، قلافة لحاء ساقها اغصانها دباغية المادة.

٢٨٩٩٣ - **نُصَّيَات** \*  
Flacourtiaceae (S). Flacourtiacées (F). Flacourtiaceae (E).  
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القعالات. اجناسها وانواعها عديدة، منها الاشجار والشجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثار. || اشهر اجناسها النص والايبريه والعطر والمرجانية والريسة.

٢٨٩٩٤ - **نُصَّة** \*  
هي المقدة الفاسدة في اللحم.



نملول احمر الساق



نملول الزيتون



نملول السكك



نملول الكاشن



نملول الكرّمة



مَهَا يَبْضِيَة وَالْوَسْطَى قَلْبِيَة وَالْعَالِيَا رَحْمِيَة مَدْبِيَة أَوْ مَقْطُونَة الطَّرَف . نَصْلُهَا نَاشِرُ الْأَعْصَاب ، قَلِيلُ الْخَمْل ، أَزْهَارُهُ سَبْلِي التَّجْمِيع ، طَرَفِي الْأَرْتَاكَا . أَزْهَارُهُ مَرْتَاكِه ، لَبْدَة ، حَرَاءُ الْوَلْنِ || أَوْرَاقُهُ وَأَزْهَارُهُ لِيْمُونِيَة الْعَرَف . نَقِيشُهَا يَطْهَرُ الْمَعْدَة وَيَذْهَبُ بِالْمَفْسِ || تَنْوِيرُهُ يَسْتَمِرُّ طَوَالَ فَصْلِ الصَّيْف .

### ٢٩٠١٩ - نَعْتَع مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ

*Mentha rotundifolia* (S). *Menthe à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه زبده متقاربة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه شبه مستديرة . نصلها ناشر الأعصاب ، رافخ السنج المنمع ، خلي الصفحة السفلى || أزهاره سبلي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهاره كثيرة العدد غبراء اللون صفراء المواج || تنويره يستمر من تموز إلى أيلول .

### ٢٩٠٢٠ - نُعْنَعَة

*Jabot* (F). النعنة هي الحوصلة ، اطلبها .

### ٢٩٠٢١ - نَعُور

النعور هي الريح التي تفاجئك ببرد ورائت في حر أو بحر ورائت في برد .

*Croasement* (F). *Croaking, Cawing* (E). هو صوت الغراب ويدعى أيضاً زعيب .

### ٢٩٠٢٣ - نُعَيْم

نعم وصليب الجنوب اسمان لكوكبة نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

### ٢٩٠٢٤ - نُعَيْم

هو الأغبرانتوس ، اطلبه .

### ٢٩٠٢٥ - نُعَيْمَة

هي السج ، اطلبه .

*Pedionomus* (S). *Pédionome* (F). **نُعَاش**

طائر وسيد الجلس والنوع من فصيلة النعشويات . وأحد نوعاته . وهي سفيرة الجفنة طويلاً نحو ١٧ سم . ثوبها إلى الصهبة يعلوها تأذير وتوشيم اصفر واجر وأسد . رأسها مخطط بالاحمر || قوتها الحبوب والحشرات . تألف الإساكن القليلة الأشجار ، الكثيرة الشب العالي || تنثر في الخوص تدبر بين الأعشاب . تعيش من ٨ إلى ١٠ في بيضات تحضنها سعدوا نحو ثلاثة أسابيع .

### ٢٩٠٢٧ - نُعَاش \*

*Meconopsis* (S). *Méconopsis*, *Meconopsis* (F). *Flaming poppy*, *Wind poppy* (E). *Mohling, Mohn-gescht* (D). *Papavero cimbrico*, *Meconopsis* (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة النعشيات . أنواعه عديدة ، أعطاهن العالم ، معظمها بري وبعضها تربي . سوقها منتصب . أوراقها كاملة أو مفرصة . أزهارها مستحبة . مَهَا الْأَصْفَر وَالْأَزْرَق وَالبَيْضَجِي . عَصَارَتُهَا لَبْنِيَة دَقِيقَة صفراء اللون جعالية المادة || أعرف أنواعه وأزهرها ما يتبع .

*Meconopsis grandis* (S). *Méconopsis élevée* (F).

نوع من النعاش المعمر . ساقه مزينة بالحاء منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه ضمية التجميع طرفية الارتكاز

### ٢٩٠١٣ - نَعْتَع بَرِّي \* ، ظَفِيرَة ، ظَفَرَاء

*Mentha sylvestris* (S). *Menthe sauvage*, *M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro*, *Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فروع تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوراقه أهليلجية ذرية نصلها ناشر الأعصاب غايق الخصار يطول من ٢ إلى ٣ سم . أزهاره ضمية التجميع أبليّة الارتكاز فواحة العرف الإخاذا .

*Mentha crispata* (S). *نَعْتَع جَعْدِي* *Menthe crépue* (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta crispata*, *Mentone* (I).

نوع من النعنع البري المبدول . ساقه منتصبه متباعدة الفروع الزبده تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . أوراقه أهليلجية الشكل ، نصلها ناشر الأعصاب متممع الصفحة المشارة الحافة || أزهاره سبلي التجميع طرفي الارتكاز . أزهاره صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون يعلوها مواج ليكي || تنويره يستمر من تموز إلى أيلول .

### ٢٩٠١٥ - نَعْتَع زَرَاغِي \* ، نَعْتَع بُسْتَانِي

*Mentha piperita* (S). *Menthe poivrée* (F). *Peppermint*, *White mint* (E). *Pfefferminze*, *Pfeffer-Wassermünze* (D). *Menta prima*, *M. peperina*, *M. pepe*, *M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي البقي الشائع الاستعمال . ضرابه المشهورة ثلاثة : الحزني والأبيض والأسود . سوقها متوسطة الانتصاب فروع تملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها معتقة . أذنيّة ، لاطلة الأذنيّات . نصلها سنانية الشكل ، مديبة العقصة ، ناشرة الأعصاب ، مبعرة الزغب ، عايقة الخصار ، خشنة الملس . أزهارها سبلي التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها وردية اللون أو بيضاء || مادته الفعالة تنبه المعدة وتقدر الأعصاب وتفتح الانتفاخ وتقيد الصدر وتقضي على البلغم .

### ٢٩٠١٦ - نَعْتَع صَعْتَرِي ، نَعْتَع يَابَانِي

*Mentha arvensis* (S). *Mentha des champs*, *M. du Japon*, *Pouliot thym* (F). *Corn mint*, *Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris*, *M. coltivata* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور مهد اليابان . ساقه منتصبه فروع تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . فروعها مَرْتَاكِه جَفَلَة . أوراقه أهليلجية الشكل تطول من ٤ إلى ٩ سم . نصلها خلي الصفحة ، ناشر الأعصاب ، سنن الحافة . أزهارها وردية اللون ، أبليّة الارتكاز ، ضمية التركيب ، صيوانية الشكل || يزرع لاستقطار المتول .

*Mentha canadensis* (S). *نَعْتَع كَنَدِي* *Menthe du Canada* (F).

نوع من النعنع الصناعي يزرع لاستقطار عطره . مهد كندا وهو يزرع في جميع الأقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة . ساقه فروع تملو من ٢٥ إلى ٧٥ سم . أوراقه معتقة سنانية الشكل . نصلها زغب البشره ، ناشر الأعصاب ، سنن الحافة ، يطول من ٥ إلى ٨ سم . ويعرض من ١٢ إلى ٢٥ سم . || أزهارها وردية اللون ، ضمية التجميع ، أبليّة الارتكاز || يزرع ويحوي في جميع الأربطة الفنية الرطبة المتوسطة الاندماج . يستقطر عطره من الأوراق والأزهار .

*Mentha citrata* (S). *نَعْتَع لَيْمُونِي* *Menthe citronnée* (F).

نوع من النعنع التريبي . ساقه فروع مستطيلة تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفلى



نعنع بري



نعنع زراعي



نَعَاض



**٢٩٠٣٥ - نُغَاصُ وَلِيْش (S). Meconopsis wallichii**  
**Méconopsidé de Wallich (F).**  
 نوع من النغاص المحول . ساقه فروعاً منتشرة تعلو من ٨٠  
 الى ١٨٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية مخزومة . ازهاره زرقاء  
 اللون منتدلة ، قطرها براوح من ٣ الى ٥ سم . ثماره جراء  
 مستطيلة رباعية الحروف النافرة المحددة الجانب || ساقه  
 وفروعها مزينة البهاء ، زغبها هليبي الشكل اسمر اللون ،  
 عادم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .



نغاف

**٢٩٠٣٦ - نَغَاصَات (F). Amiboides (E). Amiboides**  
 رتبة كائنات حيوانية دينا من الجليات .

**٢٩٠٣٧ - نَغَاصَة (F). Amibe**  
 هي الاسباب ، اطلبه .

**٢٩٠٣٨ - نَغَاف (F). Hypodermose**  
 مرض يحدث نفث النبر في الخيل والبقر والضان .

**٢٩٠٣٩ - نَغَاف ، أَم شِقُونَة (F). Buphaga (S). Buphage, Pique-bœuf (F). Beefeater, Ox-pecker (E).**

جنس طير من فصيلة الزروريات ، انواحه قليلة . طوله  
 براوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعنقه وصدره وبطنه  
 وظهوره الى الجؤرة . سقاطه وذنبه الى السرعة المايقة .  
 زكاهه الى الصهبة . منقاره غليظ الشكل والقذ ، اصفر  
 القاعده والجسم ، احمر الملتقط . عنابه الى الحمرة الجؤرية ،  
 رساه ومخالبه سمر || يعيش برقة الحمر والمخبرات من  
 ابقار وابل وغنمها يلتقط ما عليها من قراد وذباب  
 ويستأسل من جلودها النبر والتلف وما اشبه .

**٢٩٠٤٠ - نَغَب (F). Turnix (S).**

نغب الطائر : حسا من الماء ما يكفيه .

**٢٩٠٤١ - نَغُبُقُوق \* (F). Turnix (S).**

**Turnix (F). Hemipode (E).**  
 جنس طير من فصيلة النقبقيات ، انواعه قليلة العدد ، جميعها  
 صغيرة القذ طويلا براوح من ١٦ الى ١٨ سم . اثلوها الى  
 الصهبة المايقة الموشمة والمؤذرة بالاصفر والاسود . رؤوسها  
 موشحة بثلاثة خطوط صفر || اناته تدن بين الاشباح  
 والادغال ترصع افاحيصها بالخليش . ينقص من ١٠ الى  
 ١٠ يضاث مخضها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || قوته  
 الحبوب والحشرات عل اختلاف انواعها وانخصها التسل .  
 يألف اللياني والاراضي المساحة || اعرف انواعه واشهرها  
 النقبوق الافريقي والنقبوق القتال .

**٢٩٠٤٢ - نَغُبُقِيَّات (F). Turnicidae (S).**

**Turnicidae (F). Turnicidae (E).**  
 فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها  
 بين الحجل والحبارى . تتميز بقدرة الانتشار والبقاء . باستطاعة  
 قوادم السقط وبقصر الانثى || اجناسها خمسة :  
 النقبوق والتنبوق والحقم والشونس والتناش .

**٢٩٠٤٣ - نَغُبُول (F). Trachycarpus (S).**

**Palmer de Chine (F).**  
 جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة النخلات . انواعه  
 المعروفة قليلة العدد ، جذوعها اسطوانية مستقيمة تعلو من  
 ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد ذرية  
 الشكل او مرسية قطرها براوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم .  
 لونها الى الخضار الالامس الازرق الموجع بتحميص قضي.

يعلوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جؤوية اللون سباعية  
 او تساعية البتلات قطرها براوح من ٨ الى ١٠ سم .  
 تنوره يستمر من تموز الى آب .

**٢٩٠٢٩ - نَغَاصُ شَائِك (S). Meconopsis aculeata**  
**Méconopsidé épineuse (F).**

نوع من النغاص الممر . ساقه شائكة منتصبة تعلو نحو  
 ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذرب الحمة . اوراقه قليلة  
 الشكل ، كبيرة القذ ، خاسية التفصيص . ازهاره  
 ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة القذ ، قطرها نحو  
 ٥ سم . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

**٢٩٠٣٠ - نَغَاصُ عُنُقُوْدِيَّ (F). Meconopsis racemosa (S). Méconopsidé à grappes (F).**

نوع من النغاص الممر . ساقه شائكة منتصبة تعلو من  
 ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة التشرم . نصلها  
 الى الخضار الاسفر الموجع . ازهاره عنقودية التجميع .  
 ازهاره بنفسجية اللون قطرها براوح من ٣ الى ٤ سم . بتلاتها  
 لا نظامية التركيب والبد الذي براوح من ٥ الى ٨ ||  
 تنوره يستمر من تموز الى آب .

**٢٩٠٣١ - نَغَاصُ كَامِلِ الْوَرَق (F). Meconopsis integrifolia (S). Méconopsidé à feuilles entières (F).**

نوع من النغاص المحول . ساقه منتصبة تعلو من ٥٠ الى  
 ٩٠ سم . فروعها متباعدة لا منتصبة . زغبها هليبي الشكل ،  
 اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانية النصل مستطيلة .  
 ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة القذ ،  
 قطرها براوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز  
 الى آب .

**٢٩٠٣٢ - نَغَاصُ كَمْبَرِي (F). Meconopsis cambrica (S). Méconopsidé de Cambrie (F).**

نوع من النغاص الممر . ساقه فروعاً منتصبة تعلو من ٢٠  
 الى ٥٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية مخزومة . ازهاره متوسطة  
 القذ تعرض من ٣ الى ٤ سم . تيلو كبريتي الصفراء ثم  
 تنحرف نحو البرتقالي . ثماره حفية الشكل . حقايقه صقية ،  
 مستطيلة . رباعية الحروف الحادة ونها سداسية .  
 تنوره يستمر من حزيران الى آب .

**٢٩٠٣٣ - نَغَاصُ مُشْتَرَم (F). Meconopsis sinuata (S). Méconopsidé sinuée (F).**

نوع من النغاص الحولي . ساقه شائكة منتصبة تعلو من  
 ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها متباعدة لا منتصبة . اوراقه  
 لا قياسية التفصيص والتشرم . نصلها كبير القذ عابق  
 الخضار . ازهاره عنقودية التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية  
 البتلات ، قطرها براوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر  
 من تموز الى آب .

**٢٩٠٣٤ - نَغَاصُ هَاتِك (F). Meconopsis heterophylla (S). Méconopsidé à feuilles variables (F).**

نوع من النغاص الحولي . ساقه فروعاً منتصبة تعلو من ٣٠  
 الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التفريغ والتشرم . ازهاره  
 جراء اللون ، قطرها براوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء  
 مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال  
 فصل الصيف .



نقبوق

قليلة العدد . جميعها وسيدة الجبل الحولي . تظهر في أوائل الربيع ثم تمتع مكانها الذري على نصال ومدايق بعض النباتات المرصودة فينتف عن رقات تقضي على الأوراق . أشهرها نغريل الفصّة .

### ٢٩٠٥٣ - نَغْرِيلُ الْفَصَّة ٥

هو سويد الفصّة ، الحليّة . (F). Négril de la luzerne

٢٩٠٥٤ - نَغْضِيَّات  
Gymnosacaceae (S).  
Gymnosacacées (F). Gymnosacaceae (E).  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزئيات تتميز بأزواجها المرماطة . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمعها ثلاث فصائل : الخثرات والمجيدات والوقسيات .

### ٢٩٠٥٥ - نَغْفَة

Varon (F). Bot, Bott (E).  
برقة الثبر أي دموعه . ج نف . تنف على ظهور الخيل والأبال واليقر التي تلحسها وتنقلها بالسنبا الى افواهها فحلقها فامساها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترق مع التسج الى الجلد او تمكث بين طيات المدة الى ان تخرج مع الروث .

### ٢٩٠٥٦ - نَغْل

Hybride (F). Hybrid (E).  
هو في الحيوان من كان ابوه من غير جنس امه كالبل الذي يتولد من الحمار والفرس .

### ٢٩٠٥٧ - نَغْغ

Crétillon (F). Comb (E).  
سن عرف الديك .

### ٢٩٠٥٨ - نَغِيْظَةُ ٥ ، سَبْثَوِيَّة ٥

Septoria (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة السبثيات . يكتسبها كروية او بيضية تنشأ محصورة في الطبقة الادمية . منها شارب الاذنكاز . جولا مثل التسج دقيقة . بويغاتها مستطيلة او عيطية . مستقيمة او منقطة ، شفافة ، شفعية الانقسام المرضي . تحمله البؤرة ٥ ٥ انواع عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها حيوية لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الاذى . اشهرها ما يلي .

### ٢٩٠٥٩ - نَغِيْظَةُ الْأَزْلِيَّة ٥ ، نَغِيْظَةُ الْجُلْسَان ٥

Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).  
فطر مجهرى يركب الاوراق الفتية عند قاعدة عروقها الاولى فيسبب احمرار التسج واسمرار ثم ييبس ، فتسقط الاوراق ويشتو النبات . وقد يكون اذاه شديداً فيؤثر على النمو ويمنع الانزراع ٥ ٥ يكافح عند ظهوره بمركبات النحاس او الزنك ويحرق الاوراق الساقطة لانها تحافظ على بوع الفطر .

### ٢٩٠٦٠ - نَغِيْظَةُ الْأَقْحُون ٥

Septoria callistophi (S).  
فطر مجهرى يصيب اوراق معظم انواع الاقحوان الزراعي فيعطب النبات ويؤثر في نموه وانزاعه ٥ ٥ مظهره الخارجى يقع لاقياسة الشكل والحجم تركيب نصل الاوراق بين الاعصاب والورق . تبدو حنطية ، غبراء اللون ثم تحيل نحو البصرة التي يعقبها اليباس والانحطاط . يكافح بقتلاع النباتات الموصية وبطعمها التربة بالكلس او بسلقات النحاس .

### ٢٩٠٦١ - نَغِيْظَةُ الْبُرْتَقَال ٥ \* Septoria tibia (S).

فطر مجهرى عادم الاذى يركب البرتقال والخامض واليوسني

كرها شالك الحافة ، شوكه صلب التسج ، حاد الحمة . ثماره عذقية التجميع ، عنبة الشكل والقذ ، ليفة اللباب الناشف اللاماكل ٥ ٥ والتنبول يعيش ابناً زرع وفي اي تربة كانت شرط ان لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . ٥ ٥ اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

### ٢٩٠٤٤ - نَغْبُولُ أَزْعَب Trachycarpus nana (S).

Palmier à tige rudimentaire (F).  
نوع من التنبول الزيبى السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية قصيرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه دقيقة الشكل لامعة النصل الاخضر اللامس . ثماره جزوية اللون ، عنبة الشكل والقذ ٥ ٥ وهو يعطي النمو ، جميل الشكل ، يزرع في المزاكن والحدائق .

### ٢٩٠٤٥ - نَغْبُولُ الْفَيْب Trachycarpus excelsa (S).

Palmier à fibre, Palmier-chavre (F). Fibre palm (E). Faserpalme (D). Palma de fibra (I).  
نوع من التنبول السبروتي الصناعي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار تطوقها شياك من اليف متركة الحياك حنطية اللون . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . وزنادها يطول نحو ٥٠ سم . ٥ ٥ ثماره عنبة الشكل والقذ لونها الى الزرقه العايق ٥ ٥ اليف مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال .

### ٢٩٠٤٦ - نَغْبُولُ خَرْبَازَا Trachycarpus khasiana, T. martiana (S).

Palmier de Martins (F).  
نوع من التنبول السبروتي الزيبى . ساقه ناشرة الخيد ، مبصرة الالياف الرطبة ، تملو من ٣ الى ٥ أمتار . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وزنادها يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . نصلها عايق الخضار الى اللامس يطلو بتمشيع فهي . ثماره عنبة الشكل والقذ لونها الى الصفار البرتقالي .

### ٢٩٠٤٧ - نَغْث Aune (F).

هو المثلث ، الحليّة .

### ٢٩٠٤٨ - نَغْر Pycnonote (F).

هو اللبلل ، الحليّة .

### ٢٩٠٤٩ - نَغْر Serinus (S). Serin (F). Canary (E).

فجر . نغران . جنس عصافير غريسة من فصيلة الشرشوريات . انواعه عديدة جميعها صفرة القد . اثوابها الى الصفرة والصفرة الترفيعة والموشة . جميعها تألف النقص وتفتيس ادب التفريد ٥ ٥ اشهر انواعه النغر الكناري المعروف بالكناز .

### ٢٩٠٥٠ - نَغْر سُوْرِي Serin de Syrie (F).

هو النمار ونوع من النغر رنحي اللون حسن التفريد يألّف البلاد اللبنانية السورية .

### ٢٩٠٥١ - نَغْرَة Serine (F). She canary (E).

انثى النغر . جسمها اصفر قدأ من جسم الذكر ورأسها اقل استدارة وثوبها اقل لمة وبغضيباً .

### ٢٩٠٥٢ - نَغْرِيل ٥ Colaspidae (S).

Colaspidème, Négril (F).  
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . انواعه



نغريل



نغيطه البرتقال



نظيفة البقدونس



نظيفة البندورة



نظيفة الخس



نظيفة الزرع (١) نظيفة الزرع (٢)



نظيفة الزيتون



نظيفة القرعيات

بياسها || مظهره الخارجي يقع حر لاقياسية الشكل والحجم تملو نصل المرحلة الأولى أو الثانية ثم تنتشر نتم معظم المرحلة وقد تنقل الى غيرها اثنى منها || يكافح بقطع وسرق المرحلة المصابة وينفض الحراج السليمة بأحد مركبات الزنك .

#### \* ٢٩٠٦٩ - نَيْظَةُ الزَّرْع \*

*Septoria nodorum*, *S. glumarum* (S). *Septoriosis du blé* (F).

فطر مجهري يصيب قنايع وصيفات الحنطة . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة قطرها من ٣ الى ٤ م. تبدو حنطية أو برتقالية اللون ثم تنسع قليلا فيغير لونها ويقتطع اطرافها بعد ان ينحرف الى الجؤرة العاقبة . || اضراره قد تكون باهظة اذا لامته العوامل الجوية لانه يعطب الحب بعد ان يجده ويؤدي انتاجه ووزنه ومطويته النشوية . يكافح بتطهير البذار وباجتناب الزراعة في المواقع الرطبة .

#### \* ٢٩٠٧٠ - نَيْظَةُ الزُّعُرُورِ \*

*Septoria crataegi* (S). فطر مجهري يركب الزعور فيؤذيها ويبقع مسقط اوراقه قبل زين الاعمال || مظهره الخارجي يقع مستديرة ممتعة جوية اللون صفراء اختار قطرها يراوح من ١ الى ٣ م. تركب الاوراق والثمار تقسب بياسها وسقطها . بويغاته خيطية كثيفة تتجمع تملو من ٥٦ الى ٧٠ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ .

#### \* ٢٩٠٧١ - نَيْظَةُ الزَيْتُونِ \*

*Septoria oleae*, *S. olivae* (S). فطر مجهري يمتري اوراق الزيتون فينبها دون ان يؤذيها شديد الأذى || مظهره الخارجي يقع بيضيه الشكل صغيرة القد يراوح عددها من ٢ الى ٥ تركب النصل في زامة الاول والثاني بين الاعصاب والفعل . تبدو شهادا اللون ثم تسمر || اضراره لا تستسب العناية لانها لا تمتدئ الملة ورة في الشجرة الواحدة .

#### \* ٢٩٠٧٢ - نَيْظَةُ السَّيْتَمِ \*

*Septoria secalis* (S). فطر مجهري يصيب عصف السيلم فيوقع به بعض الاذى . مظهره الخارجي يطلع لاقياسية الشكل والحجم تبدو صغيرة، حنطية اللون ، ثم تنسع وقد تم كامل نصل المصفة . اضراره زعيدة لانها لا تمتدئ اذى العصف .

#### \* ٢٩٠٧٣ - نَيْظَةُ الْفُسْتُونِ \*

*Septoria pistaciae* (S). فطر مجهري يمتري اوراق الفستق والفورس فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة قطرها نحو ١ م. تركب النصل ضمن حنار اطرافها، تبدو حنطية اللون ثم تسمر وتنتهي بالاحمرار || بويغاته خيطية تملو نحو ٢٠ ميكرون || اضراره زعيدة لا تستوجب العناية .

#### \* ٢٩٠٧٤ - نَيْظَةُ الْقَرَعِيَّاتِ \*

*Septoria cucurbitacearum* (S). فطر مجهري يصيب اوراق وسوق القرعيات اغصنها البليخ والشام والكموس والخيار || مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها من ٦ الى ١٠ م. لونها اخضر زيتوني، محورها حنطي، اطرافها اصفر باهت . تركب نصل الاوراق فتفشي على النسيج المنحارة وتسبب بياسها واتحائها . وعندما يركب السوق يذبل الاوراق برمتها || يكافح باستعمال سائل بورديو أو الكبروسيد أو غيرهما من الفواطير الفعالة .

والماهي || مظهره الخارجي نقط سمر تملو اعناق الثمار وقشورها . وهو على الاوراق يقع بيضيه الشكل لونها الى الكهبة || ينشط في المواقع الظليلة البعيدة عن الشطوط البيرية . لا يستوجب المحافظة .

#### \* ٢٩٠٦٢ - نَيْظَةُ الْبُقْدُونِسِ \*

*Septoria petroselinii* (S). فطر مجهري يركب اوراق البقدونس فتصغر وتيبس . مظهره الخارجي نقط تملو عروق النصل تقسب بظوله . بويغاته خيطية مستقيمة ثنائية او ثلاثية التحويل تملو من ٣٠ الى ٤٠ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ . يكافح عند ظهوره باستعمال مركبات النحاس أو سائل بورديو .

#### \* ٢٩٠٦٣ - نَيْظَةُ الْبَنَدُورَةِ \*

*Septoria lycopersici* (S). فطر مجهري يصيب اوراق البنندورة وسوقها فيعطها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مقترنة الزوايا لونها الى الجؤرة تركب الاوراق تنفضي على النسيج المنحارة وتركب السوق فتفترج الالمة والبشرة || يتكاثر وينشط في المواقع الرطبة الظليلة وفي الاتربة الغنية بالنصر الازوتي || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بورديو وغيره من الفواطير الفعالة .

#### \* ٢٩٠٦٤ - نَيْظَةُ الثُّومِ \*

*Septoria allii* (S). فطر مجهري يركب الثوم في اوراقه فيوشها || مظهره الخارجي يقع حنطية مستديرة غير اختار تركب النصل في زامة الأخير || لا يستوجب المحافظة لانه عادم الاذى .

#### \* ٢٩٠٦٥ - نَيْظَةُ الْجَنْجُلِ \*

*Septoria humili* (S). فطر مجهري يركب اوراق الجنبجل فيذبلها ويذوبها . مظهره الخارجي يقع كثيرة متتابعة لاقياسية الشكل والحجم تركب النصل تبدو زيتية اللون ثم تسمر وتيبس وقد تقضي على النصل بكامله . بويغاته خيطية الشكل تملو من ٢٥ الى ٣٥ ميكرون وتعرض من ١ الى ٢ || يكافح بتطهير البذار وباجتناب الاراضي الرطبة وبالتخلل عن الزراعة على موسم أو موسمين متتاليين في المواقع التي حصل فيها الومص .

#### \* ٢٩٠٦٦ - نَيْظَةُ الْخَسِّ \*

*Septoria lactucae* (S). فطر مجهري يركب اوراق الخس فيوشها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة ريداء اللون مملوطة بالأمصر تملو النصل فتنبه وتقرحه || بويغاته يكتيداته خيطية الشكل ممتعة شفافة ، تملو نحو ٢٧ ميكرون وتعرض نحو ٥ || اضراره لا تمتدئ بعض الاوراق الخارجية . يحسن اجتناب اخذ البذار من نباتات موصومة .

#### \* ٢٩٠٦٧ - نَيْظَةُ الدَلْبُوثِ \*

*Septoria gladioli* (S). فطر مجهري يصيب الدلبوث في اوراقه واسفاط يصله . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع تبدو حراء اللون ثم حنطية عاقبة تقضي على النسيج المنحارة تقسب ذبوا وبياها || يكافح بتطهير البصل والثرية وذلك قبل الزرع .

#### \* ٢٩٠٦٨ - نَيْظَةُ الدِّيشَارِ \*

*Septoria aquilina* (S). فطر مجهري يركب الديشار فيؤذيها بمراحه وقد يسبب

تركب الثآليل قرب اكبال نموها عند انحراف لوها من الأخضر الى الاصفر || يكافح فور ظهوره باستعمال سائل بورديو المحلول ١,٢ ٪.

#### ٢٩٠٨٢ - نَيْظِلَةُ تَسْمَرِ الزَيْتُون \* Septoria oleagine (S).

فطر مجهرى يعترى ثمار الزيتون فيها. مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ١ سم. تركب بشرة الثمرة قرب نفسها. تبدو حنطية اللون ثم تسمر فتقرح البشرة وتثوى الثمرة ونسب تأكد القباب || اضرارها محدودة لا تستوجب المكافحة المكلفة .

٢٩٠٨٣ - نَفْثَ Ensemencer (F).  
نفث الارض : يذرها . To sow with seed (E).

٢٩٠٨٤ - نَفْثَانَةٌ ، بَحَارَةٌ Vaporisateur (F).  
Vaporizer, Sprayer (E).  
جهاز قوي الضغط ينضخ السوائل كالبخار .

٢٩٠٨٥ - نَفْثَاق \* ، نَفْثَحة Intumescence  
عارض شوزي يصيب بعض النباتات في نضال اوراقها وفي لحاء فروعها الفتية فيسبب انمطاط وانتفاخ خلايا النسيج الوثنية دون ان يمرض خلايا الحائك الاذمي \* مظهره الخارجي يتورص صغرة اللون لاقياسية الشكل تكثر فيها الانتفاخات الاحليلية. سببها العوامل الجوية ، تنشطها كثرة الازوت وقلة الحامض السفغوري || يكافح بعدم تقنين السورفسفات .

٢٩٠٨٦ - نَفْثَاقَةٌ ، شَبَابَةٌ Geyser  
٢٩٠٨٧ - نَفْثَاش هو التارنج ، اطلبه .

٢٩٠٨٨ - نَفْثَاص  
داء في الشاء يجعلها تنفص بايولها حتى تموت .

٢٩٠٨٩ - نَفْثَالَةٌ \* Everes arglades (S).  
قراشة من فصيلة القنيات . جسمها يطول نحو ٢٩ مم. نوبها الى الحنطلي الاسمر . صدرها ازرق الماج . رواشن ذكورها بنفسجية اللون معلقة بخنجر اسمر . رواشن انثاها طحلاء اللون زرق الانتساب يطولون تنطيق اسود ويطوقها خنجر اسمر || تألفت المروج والمراعي الاصطناعية . تسرح من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . يرقتها تركب اوراق النفل . يكثر وجودها في تموز وفي تشرين .

٢٩٠٩٠ - نَفْثَاقَةٌ ، نَفْثَالَةٌ Déchet (F).  
Loss, Waste, Offal (E).  
هو ما لا يصلح للاستعمال من المادة المطلوبة او هو ما يذهب هدرا من المادة عند استعمالها او تفتيتها وتجرعها .

٢٩٠٩١ - نَفْثَالِين Naphtalène, Naphthaline (F).  
Naphthalene, Naphthalin (E).  
كربور يستخرج من تقطان الفحم الحجري يتصل رائحته اخاذة خاصة تنفر منها الحشرات . وهو جامد ، ابيض اللون ، وزنه النسبي ١,١٦ يتفرق في الهواء ويذوب في ٨٠ سع . يستعمل في صناعات عديدة اخصها التفتول . ويستعمل في وقاية الثياب والجلود من عيب الحشرات .

#### ٢٩٠٧٥ - نَيْظِلَةُ الْقُرُونَس \* Septoria cornicola (S).

فطر مجهرى يعترى اوراق القرونوس فيشوهها . مظهره الخارجي يقع شبه مستديرة يراوح قطرها من ٣ الى ٤ مم. تركب التصل قرب ضلعه . تبدو حنطية اللون قمرزية الخمار ثم يتقلص اللون مع الياس ويتآكل النسيج فيسبب نخر الاوراق وتشويهها || يكافح باستعمال مركبات النحاس عند ظهور الوم .



نَيْظِلَةُ الكُرْمَةِ

٢٩٠٧٦ - نَيْظِلَةُ الْقَنْب \* Septoria cannab (S).  
فطر مجهرى يعترى اوراق القنب فيقطعها ويلويها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم منها المستديرة الصغيرة القد ومنها المسطيلة المسننة الاطراف التي تركب التصل بين اعصابه . تبدو غراء اللون ثم تسمر وتيبس . بويغاته كثيرة لبدة خنطية الشكل تطول من ٤٠ الى ٦٠ ميكرون وتعرض من ٢ الى ٣ || ينتشر في المواعظ الرملية . اذا استحك المغنبة وقضى على بعض اوراقها يراوح من ٣ الى ٧ ٪ .



نَيْظِلَةُ الكُرْمَانِ

#### ٢٩٠٧٧ - نَيْظِلَةُ الْكَرْفَس \* Septoria apiti (S). Septoriose du céleri, Rouille du céleri (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق الكرفس فيلويها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم قطرها يراوح من ٣ الى ٦ مم. وفي حنطية او صفراء اللون تركب فصل الاوراق قنصب اسفراها وذويها || يكافح باستعمال الكبروسيد تعديرا على النبات منذ ظهور عوارض الوم .

#### ٢٩٠٧٨ - نَيْظِلَةُ الْكَرْمَةِ \* Septoria ampelina (S). Mélanose de la vigne (F).

فطر مجهرى يصيب الكرمة فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع صغرة مقرفة الزوايا قطرها نحو ١ مم. تبدو حنطية اللون ثم صهبا وتنتهي بالاسمر || يكتبداته بيضبة قياسها نحو ٧٠ ميكرون . بويغاته مستطيلة قياسها نحو ٥٠ ميكرون || يكافح كسائر انواع النيفطة .



نَيْظِلَةُ الليمون

#### ٢٩٠٧٩ - نَيْظِلَةُ الْكَرْمَانِ \* Septoria chrysanthemella, S. chrysanthemi (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الكرمان فيذبلها ويقضي عليها || مظهره الخارجي يقع شبه مستديرة لاقياسية الحجم تبدو خرية اللون ثم تسرح الى السمرة . تظهر في اوائل الربيع وتدمر حتى الخريف حيث تذلبل الاوراق به ان سمجها || يكثر وجوده في المواعظ الرملية الخنطية . يكافح باستعمال احده الفواظير النحاسية المحلول ٥,٥ او ١٠,٥ ٪ . رشا على التربة وذلك بعد انتزاع وحرق الاوراق الموصية .



نَفْثَاقُ البطاطا

#### ٢٩٠٨٠ - نَيْظِلَةُ الزَّان \* Septoria cytisi (S).

فطر مجهرى تركب اوراق الزان فيقطعها . مظهره الخارجي يقع مزاوية الشكل متناهية الصغر كثيفة التجميع تركب التصل في زامة الاخير او قبل الاخير ، تبدو صناعية ثم حنطية وتنتهي باليباس || يكافح باستعمال مركبات النحاس ويحرق الاوراق المصابة .

#### ٢٩٠٨١ - نَيْظِلَةُ الليمون \* Septoria citri (S).

فطر مجهرى يصيب ثمار الليمون الحامض والبرتقال فيشوه الثشور دون ان يؤذيها شديد الاذى || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم لوها الى الصهبة الحنطية تملوها بقشة خفيفة من النقط السود قطرها نحو ١ الى ٢ مم.



نَفْثَالَةٌ



نفل ابيض

ويعتبر النفط في الوقت الحاضر من اهم وسائل الوقود التي تستخدم في تحريك الالات المختلفة من الطائرات والسفن الى السيارات واجهزة المصانع. || اهم البلاد المنتجة للنفط هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - **نُفْطُور** <sup>٥</sup>  
Micro-organisme (F).  
Microorganism (E).

اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني. ج. فطائير. ومنهم من قال عضمكري. ج. عضمكريات.

٢٩١٠٤ - **نُفْطِيَّة**  
Utilitarisme (F).  
Utilitarianism (E).

النفعية مذهب فلسفي يقول بان المنفعة ان خاصة او عامة هي سة العمل البشري.

٢٩١٠٥ - **نُفْطَات**  
Impenses (F). Expenses (E).  
هو ما ينفقه المرء على عين ثابتة قابلة للاسترداد والنفقات قد تكون :

نفقات ترفيه  
Impenses voluptuaires (F).  
Voluntary expenses (E).  
نفقات ضرورية  
Impenses nécessaires (F).  
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة  
Impenses utiles (F).  
Useful expenses (E).

٢٩١٠٦ - **نُفْطَكة ، مَعَاش**  
Pension (F).  
Pension, Allowance (E).  
النفقة او المعاش دين يوفى بدفعات دورية وقد تكون عصرية لقولم المعيشة او التقاعد او بسبب زمانة.

٢٩١٠٧ - **نُفْطَل ، شِبْدَر**  
Trifolium (S).  
Trèfle (F). Clover (E).

جنس نباتات عشبية من القرنيات القرأشية. انواعه المعروفة زهاء ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي علي ونسها الحولي والحوول والممر. جذورها جنية تنور في التربة. سوقها فراء. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات مستطيلة الزناد. ازهارها روبيي التجميع او سنبل. ازهارها مثرية مختلفة الالوان. ثمارها سفية. زورها كلوية الشكل، صغيرة القد، سمراء اللون. || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩١٠٨ - **نُفْطَل اَبْيَض \***  
Trifolium repens (S).  
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).  
نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الاربة. ازراره ساقه مادة فراء. وريقاته بيضية مستطيلة. ازهاره روبيي التجميع. ازهاره ابيض. بذوره كلوية الشكل حنطية. || يجدد في جميع الاربة اخضها المتدبة ولا يخشى الكلسية. علفه جيد الصنف مرغوب فيه يكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١٠٩ - **نُفْطَل اِسْكَنْدَرَانِي** هو البرسيم، اطلبه.

٢٩١١٠ - **نُفْطَل البَرِّ \* ، رَجُلُ الرُّبِّ**  
Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötschenklee (D). Mosci-no maggiore, Erba lepre, Piè di lepre (I).  
نوع من النفل البري المرعوي المعمر. ساقه وقروره زباء



نفل البرِّ

٢٩٠٩٢ - **نَفْث الدَّم**  
Hemoptysie (F).  
هو يسق الدم، اطلبه.

٢٩٠٩٣ - **نَفْج**  
Ecllosion (F). Hatching (E).  
هو النفث والتفقيص. تقول نفج القلوب او الصمص او الكتكتوت اي خرج من البيضة.

٢٩٠٩٤ - **نَفْجِيَّة** <sup>٥</sup>  
Pneumatologie (F).  
Pneumatology (E).

النفعية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص او منوط بالكنائس الوسيطة بين البشر والاله او الآلة.

٢٩٠٩٥ - **نَفْثَرُوب**  
Néphrops (F).  
دوية من القشريات تدعى برغوث البحر، اطلبه.

٢٩٠٩٦ - **نَفْثَرُود** <sup>٥</sup>  
Nephrodium (S).  
Néphrodie (F). Nephrodium (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من السراخس وفصيلة السباجيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اوراقها مستطيلة، مركبة، وترية التجميع، حيلة الخضار الالسي. مزاجها ريشية او مفرصة. سدائها كلوية الشكل. زكاتها شبه ملحوة || بعض انواع الثفرد يزرع في المراكن للترزين.

٢٩٠٩٧ - **نَفْثَرِيد** <sup>٥</sup>  
Néphridies (F).

تفريدج تفاريد اعضاء الافراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوارات وعضديات الارجل والديدان. وهي عبارة عن انابيب مسككة، مهدبة الجدران الداخلية تحترق الجسم وتنتهي الى الخارج.

٢٩٠٩٨ - **نَفْطَس**  
النفس : ما تساقط من الورق والثر.

٢٩٠٩٩ - **نَفْطَس**  
Gaulage (F). Beating (E).  
هو القوط او الخبط اي جني الثار بواسطة الضرب بالمصا.

٢٩١٠٠ - **نَفْطَس**  
Egrenage (F). Picking (E).  
فصل الحبوب او البور عن السنابل والمطر وما اشبه.

٢٩١٠١ - **نُفْطَصَة**  
المطرطة تصيب بقعة من الارض وتغطي بقعة.

٢٩١٠٢ - **نُفْط ، نَفْطُول**  
Pétrole, Naphte (F).  
Petroleum, Naphtha (E).

زيت معدني يوجد في جوف الارض مركب من عصري الكربون والهيدروجين الاصليين. انواعه عديدة ومختلفة الاعراض من لون ورائحة وصفاء ولزوجة. ومنه ما يكون مصفراً قليل العناصر الثانوية وهو اجدوده ومنه ما يكون مخضراً كذاً ومنه ما ينفرب الى الحمرة او السوداء ويكون بعضه شفافاً وبعضه الآخر كدراً كثيفاً. ثقله النوعي يراوح من ٧٨٠ الى ٨٣٠، || يستخلص منه بالتقطير المواد التالية :

س٧٠  
ايثر البترول  
من ٧٠ الى ١٢٠  
من ١٢٠ الى ١٥٠  
من ١٥٠ الى ٢٨٠  
من ٢٨٠ الى ٤٠٠  
من ٤٠٠ وما فوق  
الغازولين  
البزين  
زيت الانارة المعروف بالبترول  
الزيت الثقيلة والشم المديني  
البرافين والغازولين  
واثير المازوت الذي يعتبر راسب التقطير

## ٢٩١١٦ - نفل بلقاني ، نفل دلماسي

*Trifolium pannonicum* (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرعوي المعمر . ساقه زياء منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره رويسى التجميع غرطوي الشكل . ازهاره كبرية القذ عاجية اللون يعلوها مواج اصفر . وريقاته كبرية تملو من ٤ الى ٥ سم. تصلها ازغب البشرية باثت الخفصاء || وهو من النباتات السبروتية التي تعيش حتى ارتفاع ١٨٠٠ م. وتوجد في جميع الارربة العميقة الغور.

٢٩١١٧ - نفل ثرؤسي  
*Trifolium lupinaster* (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).

نوع من النفل الزبني المعمر . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه خماسية او سباعية الورقات، نصلها سنانية ذرية تملو نحو ٤ سم. ازهاره مستطيلة الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تملو نحو ٢ سم. تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٢٩١١٨ - نفل قرمزي  
*Trifolium incarnatum* (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).

نوع من النفل المرعوي الزراعي العلي المعمر : ساقه فراءه زياء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره قزمية اللون . يزور الى الصفار المنهب المواج || يحود في جميع الارربة الصالحة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهده . ضروره المشورة خسة فوارقها التلاوت بسرعة الادراك وصلاحتها الى اربة معينة .

٢٩١١٩ - نفل قشوح  
صفة الضرع الذي لا يحبس لبنه . فتقول ضرع نفوح . والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب .

٢٩١٢٠ - نقييد ٥  
Usable (F).  
Liable to wear out (E).  
صفة ما يمكن استنفاده او ما يمكن ان يفتى .

٢٩١٢١ - نقييد ٥  
*Terebratula* (S).  
*Térébratule* (F). *Terebratula* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفضيلة النفيديات . انواعه المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الديفونية والبعض الآخر ، اي المعاصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غرطوية الشوزن ، لامتساوية المضارب المائلة || تعيش لاصقة بالصخور المنفورة .

٢٩١٢٢ - نقييد يات ٥  
*Terebratulidae* (S).  
*Térébratulidés* (F). *Terebratulidae* (E).

فصيلة من الرخويات المفصليّة عضديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من اجافير الاباح القدم والحقية الديفونية . اما اجناسها المعاصرة فتنتشر في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبيبة الاشكال والاوران || اعرف اجناسها واشهرها النفيدة والتقيشة والمغاس والفسيث والداليم .

٢٩١٢٣ - نقيير  
*Stramoine* (F).  
هو الداتوره الشائكة ، اطبلها .

تملو من ١٠ الى ٢٥ سم. وريقاته ثلاثية التركيب قلبية الشكل . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره وردية اللون.

## ٢٩١١١ - نفل الماء \*

*Menyanthes trifoliata* (S). Ménéanthe, Ménéyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buck-bean, Marsh trefoil (D). Bocksbohne Fiebersklee, Sumpffiebersklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).

نبات عشبي جذموري منقعي معمري فصيلة الجنطيانات. اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، معنقة ، حاشية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صفيرة القذ يضاء اللون موشية بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجع اطريفل .

## ٢٩١١٢ - نفل المُرُوج \* ، نفل بتفسجي ، برسيم احمر ، رطبة

*Trifolium pratense* (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, RoterKlee, WiesenKlee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moselno (I).

نوع من النفل المرعوي العلي السبروتي المعمر الشائع الزراعة . ساقه منتصبه فراءه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات البيضية الشكل . نصلها مالم الصفيحة يملو عند قاعدته تجذيع ابيض على شكل ٨ . ازهاره رويسى التجميع . ازهاره بنفسجية اللون تعلوها ماجة ارجوانية . يزوره بنفسجية القلب الغليظ ، صفر القلب الدقيق || يحود في جميع الارربة الوافرة المواد العضوية اخضها المتدخية ، العميقة الغور ، الرغاب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

٢٩١١٣ - نفل اثنى  
*Trifolium elegans* (S).

*Tréfle élégant* (F).  
نوع من النفل المرعوي المعمر . ساقه كثيرة الفروع ، متوسطة النمو ، زياء . وريقاته ملوكة النصل ، عاقبة الخفصاء . رؤيسات الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الخمرة الوردية السوية || يحود في جميع الارربة ولا ينحس الفقيرة والحليفة والرميلة .

## ٢٩١١٤ - نفل اهنجن \*

*Trifolium hybridum* (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Aisne, T. bâtard (F).

نوع من النفل المرعوي الشائع الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة فراءه تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. وريقاته بيضية مستطيلة . رؤيساته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره وردية اللون مختلطة المواج الذي يراو من الالبيض الشاحب الى الاحمر الزاهي || علفه جيد الصنف مرغوب فيه .

## ٢٩١١٥ - نفل برتقالي

*Trifolium aurantiacum* (S). Tréfle orangé (F).

نوع من النفل الزبني الحولي . ساقه فراءه مشمية تملو من ١٥ الى ٢٥ سم. وريقاته سنانية النصل المسنن . ازهاره رويسى التجميع ، يضي الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم. ازهاره صغيرة القذ برتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل المُرُوج



نفل اهنجن



نفل قزمية



نقييد

## ٢٩١٢٩ - نقيطة الأرز \*

Mycosphaerella oryzae (S).

فطر مجهري يركب عصف الارز في مهري تموز وأب  
نؤذيه ويسمي الى اسبالة || مظهره الخارجي يقع بمبشرة  
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال العصف تسبب  
ذوبها ويباسها الباكر ما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني  
الانتاج || اعسانه نودلية الشكل. بويغاته ثنائية الخلية  
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وتعرض نحو ٤ م. || اضراره  
الحققة حتى الآن لا تستوجب المكافئة لانها لم تتجاوز  
٢٪.



نقطة الاجاص



نقطة الاراشيد



نقطة الاراز



نقطة البزيلة



نقطة البطيخ



نقطة التفاح

٢٩١٢٤ - نقيض Labile, Caduc (F). Deciduous (E). قابل الابعال أي السقوط .

## ٢٩١٢٥ - نقيطة \*

Mycosphaerella (S).  
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات .  
اوصافها بسيطة ، كائناتها مدمجة النكدة ، بويغها شفاف  
او زيتوني اللون يحمل وثيرية معترضة تقصصه الى خليتين  
متقابلتين القدر . منها هامي الاركانز في انتفاخ شبه  
ثعلولي ، || انواعه الفارة عديدة اعرفها ما يتبع .

## ٢٩١٢٦ - نقيطة الاجاص \*

Mycosphaerella sentina, Sphaerella sentina, Sphaerella pyri, Septoria pyri, Septoria piricola, Septoria nigerrima (S). Septoriose du poirier (F). Leaf spot of pears (E). Weibfleckenkrankheit der birne (D).

فطر مجهري يمتري اوراق الاجاص وقد يصيب الثآر .  
مظهره الخارجي يقع بصغرة مبشرة ، قطرها من ١ الى  
٤ م. لونها الى الخطي يحويها اطوار احمر اللون يتنسجي  
المواج ، تركب نصل الاوراق فتؤذيها وتمتعه عن القيام  
بوظيفتها على الوجه الاكل || بكتيداته نائنة نودلية تطول  
من ١٥ الى ١٨ م. بويغاته اسطوانية مقوسة شفاقة  
مستتقة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من  
٣٣ الى ٤٣ م. وتعرض نحو ٣ م. || تكاثره مشروط  
بالموئل الجوية الموافقة || يكافح كسائر فطور جنسه.

## ٢٩١٢٧ - نقيطة الاراشيد \*

Mycosphaerella arachidicola, Cercospora arachidicola, C. arachidis (S).

فطر مجهري يركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الخارجي  
يقع زيتية تم حطليته لجووية فطرها براوح من ١ الى ١٠ م  
تعمل نصال الاوراق على صفحاتها السفلى ثم تنتشر على  
السوق والمعالق فتؤذيها وتمتعه عن القيام بوظيفتها على الوجه  
الاكل || كوانبه ربادية اللون ملتوية الاطراف . كئانده  
صغرة الشكل مستقيمة الجسم او مقوسة ، طولها براوح  
من ٢٧ الى ١٠٨ م. وعرضها من ٣ الى ٥ م. انقسامها  
شديد التباين براوح من ضعف الى ٣ اضعاف || يكافح  
باستعمال الادوية الفاطورية التي لا يخشى من تراكم  
عناصرها الفعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل  
استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة  
من الزمن .

## ٢٩١٢٨ - نقيطة الاراشيد المستديرة \*

Mycosphaerella berkeleyi, Cercospora personata, Cylindrosporium personatum, Septogloeum arachidis (S).

فطر مجهري يركب سوق الاراشيد واوراده فتؤذيها وقد  
يسبب ذوبها ويباسها || مظهره الخارجي يقع مستديرة  
تبدو نودلية اللون ثم تسمر وتقتني باليباس والانفتات .  
كوانبه نودلية الشكل جووية اللون . كئانده اسطوانية  
الجسم ، مستتقة الاطراف ، حنطية ، تطول من ١٨  
الى ٦٠ م. وتعرض من ٥ الى ١١ م. انقسامها بشرطها  
بنفسه ضممين الى ٩ اضعاف . اوصافها وزاقتها ريمية  
شكلية . بويغاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والحجم .  
يكافح مكانة نقيطة الاراشيد .

## ٢٩١٣٠ - نقيطة البزيلة \*

Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi (S). Anthracnose des pois (F). Blight of peas, Leaf spot of peas (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).

فطر مجهري يمتري اوراق وسف البزيلة والبقية والجلبان  
والخلر والترمس || مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل  
والترتيب لونها الى الملمحة يحويها حنط اسمر ، تركب الاوراق  
والسفت والسوق فتشوهها وقد تسبب ذبول القرون ويباسها  
قبل اكثال الحب || وهو من الفطور الورقية التي لا تتكاثر  
الا في ظروف بيئية محدودة تساندها عوامل مناخية خاصة  
قوامها تدني الحرارة وقلة الضع وكثرة الرطوبة الجوية  
النسيية .

## ٢٩١٣١ - نقيطة البطيخ \*

Mycosphaerella citrullina, Dipodina citrullina, Ascochyta cucumis (S).

فطر مجهري يركب البطيخ والنبات والخيار والكوسى وغيرها  
من القرعيات فتؤذيها اشد الاذى || مظهره الخارجي يقع  
سحر لاقياسية الحجم والتجيب تعيب نصل الاوراق فتسبب  
يباس النسيج ثم تصيب السوق فتسقطها بيثور قرعية  
تحول دون وصول كامل التسفع الى الفروع والاوراق  
تتسبب اسودادها ويباسها || بكتيداته نودلية الشكل ،  
حنطية اللون ، مبسة المقي ، تطول نحو ١٦٥ م. بويغاته  
شفاقة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من  
١٠ الى ١٨ م. وتعرض من ٣ الى ٥ م. يكافح عند  
ظهوره باستعمال احد الادوية الفاطورية الفعالة تعقبها على  
النبات والرتبة .

## ٢٩١٣٢ - نقيطة التفاح \*

Mycosphaerella pomi, Cylindrosporium pomi, Phoma pomi (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).

فطر مجهري يركب ثمار التفاح . مظهره الخارجي يقع  
دقيقة فطرها نحو ٥ م. تصيب بشرة الثمرة تبتو حنطية  
اللون او خضراء عابقة او اسمر . يركب التفاح في آب  
ويستمر في نشاطه حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن  
الى ثبات البياض || اعسانه التي تعيش على الاوراق الساقطة  
والتي براوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. تحضن بعض  
الأتراك التي لا يقل عددها عن ٣ . بويغاته شبه اسطوانية  
طولها ١٩ م. وعرضها ٣ م. || اما بكتيداته التي  
تركب الثآر فهي تلتفت العديد من الكئانده الخيطية  
المستقيمة او المموجة التي تطول من ٥ الى ٨ م. وتعرض  
من ١ الى ٢ م. || اضراره محدودة تنحصر بعدم نفاذة  
البشرة لانها قلما تملأ السقوق اذ لا تدخل فيه اكثر من  
مليمتين || يكافح مكانة التفاح .

يقع حنطية تركب العصف قسب ذوبله ثم تصيب عصفيات الحب فتوشها بنقط سود. وقد ركب البرة في نطيلها فينبو كنقطة سودا داكنة || كوابنه بسيطة التركيب لاقياسية الحجم والاستطالة لونها الى السمرة. كئاده طرية الارتكاز بوفياته بيضية الشكل، حنطية اللون، فردية او ثنائية الخلية تطول من ١٨ الى ٢٤ مي. وتعرض من ٧ الى ١٠ مي. || اضراره قليلة لا تستوجب المكافحة المكلفة.

#### ٢٩١٣٩ - نَيْطَةُ الزَّرْبَقِينِ

*Mycosphaerella millegrana*, *M. microscora* (S). فطر مجهري يصيب الزربون في اوراقه فيؤذيها وفي قضبانته الفتية فيقرحها ويعطها. || مظهره الخارجي يقع بكثرة سمراء اللون، مستديرة الشكل، قطرها براوح من ٣ الى ٤ مم. تركب فصل الاوراق قسب يباس السنج وانتقابه. وهو على القضبان يقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشرة اللحاء قرب ابط الورقة فتقرحها وتحرقها باطار رافع جوي اللون. || كوابنه ضمية التجميع متصبة. كئاده سوطية صفراء اللون تطول من ٣٠ الى ٤٦ مي. وتعرض من ٣ الى ٥ مي. اسنانه كروية الشكل لقلرها براوح من ٥٥ الى ١٠٠ مي. ابقاها وشية تحضن اربعة ازرار من البونيات الشفافة التي براوح طولها من ١٦ الى ٢٠ مي. وعرضها من ٣ الى ٤ مي.

#### ٢٩١٤٠ - نَيْطَةُ السُّوسَنِ

*Mycosphaerella macrospora*, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioideum* (S). فطر مجهري يصيب اوراق السون والدلوث فيؤذيها ويثنيها الى نحوها وازهارها. || مظهره الخارجي يقع مستطيلة حنطية اللون جويية الخار غيراء الاطار الخارجي تطول من ٤ الى ١٠ مم. وتعرض من ٢ الى ٥ مم. تركب الاتصال على صفحتها العليا فتقرحها وتقرحها وسموها اصفرارها وذوبها. || كوابنه اسطوانية الشكل ملثوية الاطراف تطول نحو ٢٠٠ مي. وتعرض من ١٢ مي. كئاده طرية الانتشاب طولها براوح من ٤٠ الى ٨٠ مي. وعرضها من ١٥ الى ٢٠ مي. وهي لا نظامية الاقسام الذي لا يقل عن ضعفين ولا يفوق الخمسة. || يكافح قبل الانزعاج باستعمال سائل بوردو المركز ١ %.

#### ٢٩١٤١ - نَيْطَةُ الشَّوْتَرِ

*Mycosphaerella tabifica*, *Sphaerella tabifica* (S). *Pourriture du cœur de la betterave*, *Pied noir de la betterave* (F). *Dry heart rot of beets* (E). *Herz-fäule der Runkelrübe* (D). فطر مجهري يصيب اوراق الشوتر وجذوره فيعطها. مظهره الخارجي يقع مستديرة تبدو مطحاة اللون ثم سمراء تركب الاوراق، في اواسط الصيف، على صفحات نصاها العليا قسب اصفرارها وذوبها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية الى داخل الجذور فتعطها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال مخلول بوردو مع مرين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز.

#### ٢٩١٤٢ - نَيْطَةُ الشَّيْثَانِ

*Mycosphaerella fragariae*, *Sphaerella fragariae*, *Stigmatae fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium grevilleanum*, *Ramularia tulasnei* (S). *Maladie des taches rouges du fraisier*, *Taches brunes des feuilles du fraisier* (F). *Leaf spot of strawberry* (E). *Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter* (D). فطر مجهري يصيب الشيك باراقره فيؤذيها. مظهره

#### ٢٩١٣٨ - نَيْطَةُ الثَّوْتِ

*Mycosphaerella morifolia*, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septogloeum mori*, *Chellaria mori*, *Phleospora mori* (S). *Fausse-rouille du mûrier* (F). فطر مجهري يركب اوراق الثوت. مظهره الخارجي يقع مزاوية سفاه اللون، سمراء الاطار، تعترى نصل الاوراق وتيب جفاف السنج || اضراره محصورة بمعنى العطب الذي يحل بالسنج وقد يصل في بعض المواقع انتطيلة والظروف المناخية الملائمة الى نحو ٥ % من مساحة النصل. هذا مع العلم ان دود القز يقرض اكل السنج الشاذة. يكافح بنضج الاشجار قبل اراقها باحد المركبات النحاسية.

#### ٢٩١٣٤ - نَيْطَةُ التَّيْنِ

*Mycosphaerella bolleana* (S). فطر مجهري يركب التين في اوراقه فيؤذيها. مظهره الخارجي يقع مزاوية تملو النصل على صفحته السفلى ضمن حدود العروق والاعصاب، تبدو عابقة اللون الى ان يكتمنها الخمل الاطمل فتقايها اذ ذلك على الصفحة العليا يقع سنج رافضة مقرقنة || كئاده وشية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي. وتعرض من ٧ الى ٨ مي. انتقامها براوح من ضعفين الى ٦ اضعاف. اضراره تأنه لا تستوجب المكافحة.

#### ٢٩١٣٥ - نَيْطَةُ الثُّومِ

*Mycosphaerella allieana* (D). فطر مجهري يركب اوراق الثوم والكراث فيوشها وقد يؤذيها وييب يباسها || مظهره الخارجي بدور صغيرة كثيرة مبعثرة تبدو يباسه اللون ثم يدهاء وتنتهي بالسمرة واليباس || اسنانه تتكاثر على صفحتي النصل. ابقاها تطول من ٥٥ الى ٦٠ مي. وتعرض نحو ١٤ مي. بونياته ثنائية الخلية تطول من ١٦ الى ٢٠ مي. وتعرض نحو ٥ مي. اضراره لا تتبدى الاوراق.

#### ٢٩١٣٦ - نَيْطَةُ الْحَمِصِ

*Mycosphaerella rabiei*, *Ascochyta rabiei*, *Phylloticta rabiei* (S). *Anthraxose du pois chiche* (F). فطر مجهري يصيب الحمص في جميع اعضاءه الهوائية. مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل او مستديرة تركب السوق والاوراق والسنت. تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى البقرة البيضاء يحرقها اطار اخر. وعند اشتداد اذاها تفرح السون وتذبل الاوراق وقسب انحلاس السنت. بونياته اسطوانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٤ مي. وتعرض نحو ٤ مي. || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بدو ذلك بتمتعه نحو خمس دقائق في مخلول سلفات النحاس المركز ٥ % او بنضج زراعته توأ بعد ازهارها بمخلول بوردو المركز ١ %.

#### ٢٩١٣٧ - نَيْطَةُ الْحَوَزِ

*Mycosphaerella populicola*, *M. populi* (S). فطر مجهري يركب الحور في اوراقه فيوشها. مظهره الخارجي يقع مزاوية صغيرة القند حنطية اللون تملو النصل فتقرحها || تشوبه لا يستوجب المكافحة.

#### ٢٩١٣٨ - نَيْطَةُ الزَّرْعِ

*Mycosphaerella tulasnei*, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). *Noir des céréales*, *Mouchetage*, *Moucheture* (F). *Black point*, *Dark*, *Brow-tip* (E). *Schwärze des Getreides* (D). فطر مجهري يمتري عصف الزرع وعصفيات السنايل في الخنطة والشعير والشوفان والتيلم || مظهره الخارجي



نَيْطَةُ الثَّوْتِ



نَيْطَةُ الزَّرْعِ



نَيْطَةُ السُّوسَنِ



نَيْطَةُ الشَّوْتَرِ



نَيْطَةُ الشَّيْثَانِ





نقطة القرتل



نقطة القطن



نقطة الكرز



نقطة الكتنة



نقطة الملفوف

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .  
بويغاته ثنائية الخلية . || اضراره زعيدة لا تستوجب  
المكافحة .

#### ٢٩١٤٧ - نَقِيطَةُ الْكُتْنَةِ \*

*Mycosphaerella maculiformis*, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري يركب أوراق الكتنة والبنلق وبعض الانجار  
الخارجية كالاسفندان والمث و البتولا والشم والسديان .  
مظهره الخارجي يقع صغرة مزوانية تصيب نصل اللوز  
على صفحاتها السفلى فتبدو بيضاء اللون ثم سراد .  
بكثيداته مبعثرة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السمرة .  
بوغه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خاسيه . بويغاته  
تطول نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي . || اضراره تنحصر  
بما يلحقه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء  
يعود الى الاجبال الباكر .

#### ٢٩١٤٨ - نَقِيطَةُ الْكُشْمَش \*

*Mycosphaerella ribis*, *M. grossularia*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularia* (S), *Septoriosis of the grossellier* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري يركب أوراق الكشمش . مظهره الخارجي  
يقع نسبية مزوانية الشكل تظهر في نموز وآب لونها الى  
الصبغة الحمراء المالح ثم تيمل الى البنية وتستقر على اللون  
الاسطح يعلوه توشج اسود . || بويغاته خيطية مستطيلة  
شفافة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .  
اضراره زعيدة . يكافح كسائر فطوره جنسه .

#### ٢٩١٤٩ - نَقِيطَةُ الْمُرَّان \*

*Mycosphaerella fraxini* (S).

فطر مجهري يركب المران في اوراقه فيسبب بياضا .  
مشجبه يتكاثر بمستوى الخلايا بين النسيج الحليكي والفجوي  
مظهره الخارجي يقع مستديرة حطية اللون ارموازية اختار .  
كتائده خيطية الشكل ، مستقيمة او مقومة الاطراف  
تطول من ٣٠ الى ٤٠ مي . وتعرض من ١ الى ٢ مي .  
اضراره لا تستوجب المكافحة .

#### ٢٩١٥٠ - نَقِيطَةُ الْمَنِيهُوت \*

*Mycosphaerella brassicicola*, *Sphaeria brassicicola*, *Dothidea brassicae*, *Phyllosticta brassicae*, *Asteroma brassicae*, *Phoma oleracea* (S). Ring-spot (E).

فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيقطعها  
ويسبب الى النمو فيؤخره وقد يؤذيه . مظهره الخارجي  
يقع مستديرة رمداء اللون سود المحور تطرها يراوح من ٥  
الى ١٠ سم . تركب النصل تقسب اصفرار وذبوله .  
اعنائه وبكثيداته تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة  
فتحطم الى بقرة سوداء تتلاري من مقامها اللون البوريفات  
الدقيقة الشفافة التي تلو نحو ٥ مي . وتعرض نحو ١ مي .  
اضراره الى تهيج عليها عوامل الرطوبة تراوح من ١ الى  
٢٥ % يكافح بتطهير البذار وتطهير تربة الماشاتل او  
باستعمال مائل جديدة .

#### ٢٩١٥١ - نَقِيطَةُ الْمَنِيهُوت \*

*Mycosphaerella manihotis*, *Cercospora cassavae*, *C. manihotis*, *C. henningii*, *Septogloeum manihotis* (S).

فطر مجهري يصيب المنيهوت في اوراقه فيشوهها ويؤذيها .  
مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، رمداء اللون ،  
تركب نصل اللوز تقسب بياض النسيج وانفثاته .  
كتائده تطول من ٢٠ الى ٧٥ مي . وتعرض من ٥

الخارجي يقع صغرة لا قياسية الترتيب والشكل والحلم  
تركب نصل اللوز على صفحاتها العليا ولا تمتع عن  
المعالق . تبدو صغرة اللون بنفسجية المالح ثم تنحرف  
الى السمرة وتستقر على البنية يحرقها اطار اخر داكن .  
كوائده فارشة ، كتائده مستقيمة او مقومة وهي شفافة  
اسطوانية مستعدة الاطراف . بويغاته لا قياسية الانقسام  
تطول من ٢٥ الى ٥٥ مي . وتعرض من ٢ الى ٣ مي .  
اضراره محصورة بمطبع النسيج وحرمانه من القيام بعمله  
الجسموري على الوجه الاكل . || يكافح قبل الانزهار  
وبعد التعلل . وقد يحسن تملطس جذول الشيك قبل زرعها  
بحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على  
هذا الفطر وغيره من الفطوره الضارة .

#### ٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلِيق \*

*Mycosphaerella rubi*, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري يركب اوراق العليق والموج البري والوجلي .  
مظهره الخارجي يقع مزوانية صغرة القد ضلها يعلو من  
٢ الى ٣ مي . لونها الى الحلحة تملوها شحة سراد تركب  
نصل اللوز عند انتشاب المروق تسبب بياض النسيج  
ثم انفثاته وسقطه . || ككثرة يحصل عادة بعد جني البذر  
وهو اذا لامت العوامل الجوية يحشش اللوز الفينة  
فيحجبها ويؤنها . || يكافح كسائر فطوره جنسه .

#### ٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْقَرْتَل \*

*Mycosphaerella dianthi*, *Didymella dianthi*, *Heterosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب القرتل بجميع اعضائه الهوائية .  
مظهره الخارجي يقع مستديرة الشكل او بيضية ، حطية  
اللون ، مهدبة بطار اخر او بنفسجي تركب اللوز الى  
السوق وتعد الى تويج الزهرة وبتلاتها . || كوائده نسبية  
التجميع ، معوجة الغرام ملتوية . كتائده اسطوانية الشكل  
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة  
اعضاف . بويغاته تطول من ٣٥ الى ٤٥ مي . وتعرض  
من ١٢ الى ١٦ مي . || يكافح باستعمال سائل بوردو  
المركز ١ % قبل الانزهار .

#### ٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْقُطْن \*

*Mycosphaerella gossypina*, *Cercospora gossypina* (S). *Cercosporiose du cotonnier* (F).

فطر مجهري يركب اوراق القطن فيؤذيها دون ان يسي  
الى النمو والانتاج . || مظهره الخارجي يقع صغرة سراد  
اللون مهدبة بالاحمر تملو اوراق القطن القريبة من التربة  
الي لا تحللها اشعة الشمس . || كوائده هريبة الشكل  
تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ مي . كتائده شفافة تطول من  
٧٠ الى ١٠٠ مي . وتعرض نحو ٣ مي . وهي سداسية او  
سباعية الاجزاء . اعنائه حطية الشكل تطرها يراوح من  
٦٠ الى ٩٠ مي . انتاقها اسطوانية تطول من ٤٠ الى  
٥٠ مي . وتعرض من ٨ الى ١٠ مي . بويغاتها وشية ،  
ثنائية الخلية تطول من ١٥ الى ١٨ مي . وتعرض من ٣  
الى ٤ مي . || اذاه لا يستوجب المكافحة .

#### ٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَة \*

*Mycosphaerella cerasella*, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري يركب اوراق الكرز والحلب . مظهره الخارجي  
يقع صغرة مستديرة حطية اللون مهدبة بالاحمر تنص  
نصل اللوز ثم تبيض . وقد بنفسها الريح فيبدو النصل  
كالغربال المبعثر الثروب . || كتائده صغرة الشكل

والانثى تمتنع المكن محبداً في بطون الاثراش || البرقة عنه بلوفها الادراكه التام تطول نحو ٦ سم. ثوبها في اول عيدها الى الجلوة ثم ينحرف الى البنفسجي الفاتح تملوه خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

## ٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم العنق .

Purété (F). Purity (E).

## ٢٩١٥٧ - نَقَّاء ، طَهْر

هو غلو الشيء من العناصر الغريبة عنه .

Picoide tridactylus (S).

Picoide tridactyle (F).

## ٢٩١٥٨ - نَقَّاب \*

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتسلقات . موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادنى واروبه || جسمه معتدل القدر يطول نحو ٢٠ سم . بسطته نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السواد الفحشي الملبق بالابيض في العنق والايثار . صدره وبطنه الى البياض المشرب بالبنسي . جبهة وقفنه وصخره الى السواد البلاع . قنة رأسه ذهبية اللون يعلوها تشيز نفضي . حدة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقاه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى لا يختلف عن ثوب الذكر الا بخضاب القنة الفضي المشرب بالاصفر || ويتميز النَقَّاب بكونه ثلاثي الاصابع غسلاً لسانه اجناس النقايات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها وبعض البذور البرية || يفتن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

## ٢٩١٥٩ - نَقَّابَة

هي جمعية أشخاص يقتنون الى مهنة واحدة او مهن متشابهة للدفاع المشروع عن مصالحهم المهنية .

## ٢٩١٦٠ - نَقَّابَة

Charrue défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E). سكة ضخمة مقنطرة تستعمل لفلج التربة او حفرها واتزاع حجانها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

## ٢٩١٦١ - نَقَّاذ ، نَقَّاد

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عصافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهم العالم القديم والجديد . تتميز بمناقيدها الضلعية التي تمتلئها من كسر عجمة اللوز واللوح والكرز . قوتها الثمار والحبوب والخحرات . تكثر في الاجنار الفناء اناتها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متباعدة الذكر نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النَقَّاذ المبدول .

Coccothraustes vulgaris (S).

Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

## ٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْدُول \*

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المتسلقات . موطنه القدر يطول نحو ٢٠ سم . بسطته نحو ٣٠ سم . رأسه كسني اللون وقفنه الى الصبغة الرمضاء . زقاده وزروره سود . ظهره وصدره الى الصبغة الحمرة . بطنه ابيض . جناحه سود القاعدة ومنظم الاطراف . بيض الريسط وبعض الاطراف . ذنبه اسود اللون ينهي بقمة بيضاء . يغترق الى الزرق العائقة . حلقه عينه وردية . ساقاه الى الحمرة الطلاء . || يألث

الى ٦ م . انقسامها لا نظامي الترتيب يراوح من ٢ الى ٩ . اصنافها سطحية الاركانكاز . كروية الشكل قعرها يراوح من ٩٠ الى ١١٠ م . انزاقها ريمية تحفن اربعة ازواج من البويغات الشفافة الثنائية الخلية .

## ٢٩١٥٢ - نَفِيطَةُ الْمَوْزِ \*

Mycosphaerella musicola, Cercospora musae (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigatoka disease (E). فطر مجهرى يركب الموز في اوراقه فيعطبها ويسبب ذبولها ويسمى الى الكياسات ان لم يندبها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تنقع وتستقر نهائياً على شكل مستطيلات يراوح طولها من ٣ الى ١٠ م . وقد تتصل ببعضها فتصبح بقعاً فسيمة مستطيلة لا قياسا الحجم . اما لونها فيستب على الصبغة الخلفية يحقها اطار اسمر اللون . اطحل البتديد . كوابنه ضمية التجميع . ككائه وسطية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها يراوح من ٣ الى ١٨ م . واصفات . بويغاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اغزاره منطلة بمدى انتشاره لانه يسبب يساس الارواق وتثني الكيسة او اخذاجها وعدم تكوينها . يكافح يستمال سائل يورده المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفشا .

Canalicule (F). Canaliculus (E).

## ٢٩١٥٣ - نَفِيق

Nephila (S).

Néphile (F). Nephila (E).

جنس رقيلات من العناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من المالحين القديم والجديد || ذكورها اصفر قدماً من اناتها . اوثها متراكبة الالوان يلبق فيها الاصفر والاحمر والاسود . جرامها سمر الاطراف || يربونها في بعض البلاد الاسيوية والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للترية :

N. chrysogaster (S).

نفيلة ذهبية اللون

N. clavipes (S).

نفيلة لوزيانه

N. madagascariensis (S).

نفيلة مدغسكير

## ٢٩١٥٥ - نَفِيقُوس كَرْدِيَّيَالِي \*

نَفِيقُوس كَرْدِيَّيَالِي \*

Novius (Macronovius) cardinalis, Vedula cardinalis (S).

Novius cardinal (F). Vedula cardinalis (E).

حشرة خاتلة من فصيلة الدصيقيات ورتبة منعدات الاجنحة تألف بساتين الحفصيات والمباقل والحادق . خنافتها ويرقاتها تعيش على الاثراش الذي يفتك بالحفصيات والورد والليموزا ... || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يعلو تقيج اسود . رأسها صغير الحجم . اسود . عينها صغيرتان . زباناها صقيان . صغيران . فكاهها نضبان . ظهرها شديد الاحدياد . مستدير المؤخر اللائح . غداها كليفنا الحمل . ارساغها رباعية العقل || ايجالها الحولية سنة . تخرج الحشرة الجمالنة من بياتها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في النهار . جبلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس . اي الشتوي ، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تساف بعد ظهورها باسبوع



نفيلة الموز (١) نفيلة الموز (٢)



نفيلة



نفيس كربياني



نَقَّاب



نَقَّاذ مَبْدُول



نقار احمر الرأس

## ٢٩١٦٩ - نقار كبير \* ناقوبة الصنوبر

Picus major (S). Pic épéche (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه فسيح الارباع يمتد من اواسط الشرق الى اطراف اوروبا الغربية. || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاهية. ظهر واعالي جسمه الى السواد اللامع. عنقه ومخراجه ورجلاه مبقعة بالابيض. رأسه اسود. قفنه ومؤخر بطه الى الحمرة. صدره وبطنه الى البياض الاخير. حذقة عينه جزئية اللون. منقاده ورجلاه الى الكهبة الرصاصية. انشاء سمراء القفن. يألف احرار الصنوبريات ولا يقرب من الحادق والجائش الا عند سبب الحاجة الى الطعام.



نقار اسود

## ٢٩١٧٠ - نقاريات

Picidae (S). Picidés (F). Picidae (E).

فصيلة طير من رتبة المتسلقات اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات. اشهر طيورها النقار والواو.



نقار صغير

## ٢٩١٧١ - نقار \* Penelope (S). Pénélpe (F).

جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعه قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرشيق. قوة المنقار الاجنح. رؤسها قزمية الريش المستطيل الناعم، عماره ملط. اجنحتها مستديرة، اذيالها طويلة. اوتواها الى السمرة الداكنة يعلوها وتوشم وتوشح || تألف الاحرار. تعيش اسراب كبيرة قوتها الثمار والحبوب والحشرات. || تدن اشغالها في الاجبار. انماها يبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع.



نقار كبير

## ٢٩١٧٢ - نقاص \* Drosophyllum (S).

Drosophylla (F).

نبات معمر مقترن وسيد الجنس والوع من فصيلة اليزيمانيات. ساقه مقرية. اوراقه عصفية مستطيلة منتصبية تحنئة التصل للمدروز بازغب الدقيق الشكل الذي يشمر كل حشرة تقترن منه فيضي علبا ويمتصها. ازهاره صفراء اللون، غلظية التجميع. هابة الازتكار، تقوم على شراخ موزق قوسي الانتشاب.

## ٢٩١٧٣ - نقاطة، سحاحة. Burette (F). Curet (E).

Bombina, Bombinator (S).

Bombinateur, Sonneur (F). Bombinator (E).

جنس صفادع من فصيلة الصفاجيات. انواعه المروقة قليلة المدد، مهدا البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. اطولها تراوح من ٥ الى ٧ سم. جلودها مثالة تفرز عند المس رغو بضاء تثير المعاس والتدعيم. اوتواها العلوية الى السمرة تلوها سرجة قائمة. اوتواها السفلية تراوح من الصفرة الباهتة الى الحمرة تلوها رشفة طحلاء زرقاء الموالج || تعيش في المنطق ويجاري الماء تركها في الليل وتعود اليها عند الفجر || اجرية دعبها وشية الشكل تحوي من ٢٠ الى ٤٠ دعبلة مبطنة تنقف بد الترتبة بنحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه النقاق الاسفر البطن والنقاق الناري البطن.



نقاز



نقاص

## ٢٩١٧٥ - نقاق أصغر البطن Bombina salsa (S).

Bombinateur à ventre jaune, Sonneur à ventre jaune (F). Bombinator (E).

نوع من الصفادع النفاقة ينتمي الى فصيلة الصفاجيات. موطنه يمتد من الشرق الاذلى الى اطراف اوروبا. يألف

الاحراج والغابات انحصا احرار الصنوبر والتنوب ولا يقرب من الحادق والجائش الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت.

## ٢٩١٦٣ - نقار، قراع، ناقوبة Picus (S).

Pic (F). Woodpecker (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليا. جميعها متسلقة تركب جذوع الاشجار فتقرعها وتقرع قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريع وديدان. اجسامها مستوية القد، اوتواها ملونة. مناقيرها قوية، مستطيلة، مخددة. اجنحتها منفرجة الاطراف. اذيالها متوسطة الطول. ارباغها قصيرة. جزئية التسرول. قوتها الحشرات وريقاتها واساريها وديدانها من النمل الى العناكب والجنادب ولا تمتع عن الثمار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. || تدن في تجاويف الاجبار انماها تقع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها من ١٤ الى ١٧ يوما. تعتبر من الطيور النافعة التي تستحق الحماية. || اشهر انواعها واعرفها ما يتبع.

## ٢٩١٦٤ - نقار أحمر الرأس \* Picus medius (S).

Pic mar, Pic à tête rouge (F). Middle spotted woodpecker (E). Mittlerer Buntspecht (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واروبه. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه ثوب النقار الكبير الا انه احر الرأس. || يألف احرار الصنوبريات دون سواها. اثناء تحضن بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ بيضات.

## ٢٩١٦٥ - نقار أخضر Pivert (F).

هو الشنسة الخضراء، اطليه.

## ٢٩١٦٦ - نقار أسود \* ناقوبة سوداء، دركوب Dryocopus martius (S). Dryocope noir, Dryopie noir, Pic noir (F). Black woodpecker (E). Schwarzspecht (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واروبه. جسمه يطول نحو ٤٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القاتم الداكن يستثنى منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذاق الطرف. حذقة عينه صفراء اللون. يألف الغابات والاحراج. قوته الحشرات والذناير والثمار العنية ويضف الحبوب والصنوبر. || الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ بيضات نحو ١٥ يوما.

## ٢٩١٦٧ - نقار الشوك هو الحسون، اطليه.

## ٢٩١٦٨ - نقار صغير \* ناقوبة السنديان Picus minor (S). Pic épéchette (F). Lesser spotted woodpecker (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واروبه باستثناء المناطق الشمالية. || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد المايق اللامع يعلوه تجميع ابيض مقترن ومستطيل. جبهته ومخراجه الى البياض الاخير. قة رأسه قزمية اللون. يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوش. حذقة عينه حمراء اللون. مناقره ورجلاه الى السمرة الرصاصية. اثناء لا حرة في رأسها. يألف الاحراج على اختلاف انواع اشجارها انما يفضل احرار الصنوبر والزان. || قوته الحشرات واساريها وريقاتها وبكها. اثناء تقع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه يبيضات لونها الى البياض الناصع تملوه رقشة جزوية .  
أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

نقشاة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fits (F).  
نقشاة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).  
نقشاة زرقاة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).  
نقشاة صناعية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).  
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - نقص  
Déficiency (F).  
Deficiency (E).  
خلو بعض العناصر. الغذائية او عجز في عيها الادنى  
يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - نقص القيمة  
Moins-value (F).  
Decrease in value (E).  
نقص القيمة او النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - نقطة  
Point  
٢٩١٨٨ - نقطة الإرتكاز  
Point d'appui (F).  
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - نقطة الإستصراد ، نقطة الجليد  
Point de congélation (F). Congélation-Point (E).  
٢٩١٩٠ - نقطة الإنصهار  
Point de fusion (F).  
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - نقطة الإنطلاق  
Point de départ (F).  
Starting-Point (E).  
٢٩١٩٢ - نقطة الإنقلاب  
Point d'inflexion (F).  
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - نقطة البُخار  
Point d'ébullition (F).  
Boiling-Point (E).  
٢٩١٩٤ - نقطة البروز  
Point d'émergence (F).  
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - نقطة الجذم ، نقطة التقاطع  
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - نَقَطُور  
Necturus (S). Necture (F).  
جنس حيوانات قازبة من السرفويات وفصيلة القطر وسيات.  
أتألف المعروفة قليلة المدد موطنها أمريكا الشمالية .  
تألف المتاع وضفان بجاري الماء || أجسامها شبه اسطوانية  
الشكل ، طول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها شبه  
مخروطية الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ،  
رباعية الاصابع || أتواها الى السرة المرقوشة بالاسود ||  
قوتها الديدان والدوبيات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - نَقَطُول  
Noctule (F).  
نوع من الخفافيش المفيدة يدعى غُشَّافُ الحَقِّ ، اطلبه .

٢٩١٩٨ - نَقْف ، نَقْفِيص  
Ecllosion (F).  
Hatching (E).  
هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو  
في السمك زمن انبجاج السرة اما في الحشرات فهو زمن  
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - نَقْلُ الْحَقِّ  
Transfert (F).  
Transfer, Conveyance (E).  
هو ان ينقل المرم سقاً له الى غيره . وفي القانون التجاري

المتاع وتجاري الماء . مسرعه دجوي . يعيش نحو عشر  
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه  
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .  
عند الانثى . رأسه صغير الحجم : عيناه جاحظتان . حنكه  
مستعرضة الشق ، مسن الفك العلوي . قائمتا الايمانين  
قصيرتان ، رباعيتا الاصابع الطويلة ، اما الخلفيتين  
فمتطيلتان ، خاصيتا الاصابع المفيدة بحطاب كامل .  
جلده مغطى القشار يفتر عنه لمسه رغبة بيشاء نافطة  
تثير العكاس والدسوس . ثوبه العلوي الى السرة الخطية  
السماح الموج تملوها نمشة قائمة ورسنجة خضراء . بطنه  
وسائر صفحته السفلى الى السرة الناعمة تملوها مشحة  
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بيائها الشدي يستمر نحو  
اربعة اشهر . يتميز ببلغته الصوتية الرائعة الجزوية  
الشكل والقدر . نقيقه قصير النغمة ، متتابع الايقاع ،  
شديد الازعاج .

٢٩١٧٦ - نَقَّالَة  
Brouette (F). Wheelbarrow (E).  
عجلة يدوية بمجزة واحد بدولاب يستعملها الانسان لنقل  
الاعياء الخفيفة .

٢٩١٧٧ - نَقَب  
Défonçage, Défoncement (F).  
Subsoil ploughing (E).  
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها  
واعدادها للزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - نَقَح  
Silice pure (F). Pure flint (E).  
الخالص من الريل .

٢٩١٧٩ - نَقَدًا ، عَدًا  
Comptant (F).  
Spot cash, Ready (E).  
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - نَقْدَة  
هي النعسة ، اطلبها .

٢٩١٨١ - نَقْدَة  
هي الكروياً (الانزوي) والكزيرة (ابن الاعرابي) .

٢٩١٨٢ - نَقْرَة مَرَّة  
Taches amères (F).  
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، اسبابه المروقة  
حتى الآن تعود الى الشفوذ في التغذية والري والى مناخ بعض  
المناطق || عظهوه الخارجي يقع مسندة منخفضة السطح  
قطرها من ٣ الى ٦ م . وبعها الداخلي يغور من ٢ الى  
١٠ م . فيسبب تغير لون اللباب المطوب ويكسبه مرارة  
المذاق .

٢٩١٨٣ - نَقْرَس  
Simulle (F).  
هو التجرس والقرس ، اطلبها .

٢٩١٨٤ - نَقَشَارَة  
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-  
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدخليات . انواعه المعروفة عديدة ،  
اعطاهها العالم القديم ، منها الارابيد والقواطع التي تجوب الشرق  
والغرب . جميعها صغيرة القد ، مزركبة الالوان بكث  
فيها الاسفر والاشقر . قوتها الحشرات والمهورم . تألف  
الحادق والجنتان القريبة من العمران . تدن في الشجيرات  
والانجار المتفرقة . اعشاشها مخروطية الشكل جانبيه المداخل  
تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حصفنتها نحو



نقشاة



نقون

ياروح من ٨ الى ١٢ م. ثوبها رصاصي اللون لامع المواجه. يكثر وجودها في الصيف. تمتص مكها على دود القطن فينتفخ عن رقات ذرية دقيقة تدسل وتنتقل في جسم العائل ونمته.

#### ٢٩٢١٠ - نُقْرِئُكَ فَضِي \* *Gonia capitata* (S).

ذبابة نافعة من التقرينات طويلة راسها من ١١ الى ١٣ م. رأسها فضي اللون. جسمها رصاصي اللون تملوه خلة فضية وشعوط سم. تمتص مكها على الدودة القارضة فينتفخ عن رقات نهمة تنتقل في جسم العائل ونمته.



نقير اصفر الجناح



نقير اهل

#### ٢٩٢١١ - نُقْرِئُكَ مَبْدُول \* *Phryxe vulgaris* (S). *Phryxe vulgaire* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التقرينات. جسمها بطول من ٦ الى ٩ م. قشاعها متكاثف الحمل والهلل. ثوبها الى الطحلة الموشجة بالابود. رأسها كبير، احمل اللون. غطها مستدل الطول. زباناها صغيران، نحيلان. عينهاا ناضرتان، ارجوانيتان. روشاها كيرتان، اصفر القاعده. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجملانة من نيسان الى تشرين الثاني. وهي مبدولة في كل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها تتطفل على اساريع الحشرات من مختلف الفصائل.

#### ٢٩٢١٢ - نُقْرِئُكَ مَدْمَلَك \* *Gymnosoma rotundatum* (S). *Gymnosoma arrondi* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التقرينات. جسمها صغير القد، متكاثف الحمل، بطول من ٥ الى ٧ م. رأسها كبير الجرم، اصفر اللون، مذهب المواجه. غطها مستدل الطول. زباناها دقيقان، صغيران. عينها كيرتان، ارجوانيتان، صدرها الى الصفار المذهب. بطنها شبه مكور الشكل، اصفر اللون، صناعي المواجه. تملوه، في نفعه، ثلاث نقط سود. روشاها موشجان بالاصفر. قوائمها الى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب. سرسوها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الازهار. يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة.



نقير رصاصي



نقير نصفي

#### ٢٩٢١٣ - نُقْرِئُكَ رِقَات \* *Tachinidae* (S). *Tachinidae* (F).

فصيلة حشرات ذبابة نافعة من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الالوان والاحجام. تحمل على بطونها مستوى حيلتها الطويلة بعض الهلل الشاك القاسي. قوتها مفر الازهار وافرانها. يرقاتها طفيلية تركب اكثر الحشرات انحصا مستقيبات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحشويات واللمعدات. وهي لا تفرق بين الحشرة والاسروع والخادسة.



نقير مبدول

#### ٢٩٢١٤ - نُقْرِئُكَ رِقَات \* *Bothrioccephalidae* (F). *Bothrioccephala* (S). *Bothrioccephala* (F).

فصيلة دود من المنطقيات الرعشات تتميز بملقاتها المسرقة العادمة الحجيرات التناسلية.

#### ٢٩٢١٥ - نُقْرِئُكَ رِقَات \* *Bothrioccephalus* (S). *Bothrioccephalus* (F). *Bothrioccephalus* (E).

جنس ديدان قدية مستطيلة من نصفيات التقرينات. انواعها عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.



نقير مدملك

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري.

#### ٢٩٢٠٠ - نُقْلُ الْمَلِكِيَّةِ \* *Mutation* (F). *Transfer* (E). *Carnaubapalm* (D). *Copernicia* (S).

٢٩٢٠١ - نُقْم \* *Point de pivot* النقمة هو وسط الشيء او النقطة المحورية التي تركز عليها قياسات المدار.

#### ٢٩٢٠٢ - نُقُوس \* *Copernicia* (S). *Copernicia* (F). *Wax palm* (E). *Carnaubapalm* (D). *Copernicia* (I).

شجرة من فصيلة النخلات، اعطائها الاقاليم الحارة الرطبة. جذعها مالم السماء بطول نحو ٨ امتار. اوراقها مامية الاركتاز مريحة الشكل مستطيلة الزناد المدام الشكل. نصلها جامد الصفعة، مالم البشرة، جبل الشفار الزاهي. نسيجه مرغوب فيه يستعمل في صناعة القيمات. ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس الشائع الاستعمال.

#### ٢٩٢٠٣ - نُقُوسِي \* *Huméral* (F). *Humeral* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

#### ٢٩٢٠٤ - نُقْبِيَّة \* *Lacunelle* (F). *Lacunula* (E).

٢٩٢٠٥ - نُقْرِئ \* *Hile* (F). هو الاقتود، اطلبه.

#### ٢٩٢٠٦ - نُقْرِئ \* *Auge* (F). *Trough* (E).

جرن مستطيل يستعمل لاحلام الماشية او لاسقاتها.

#### ٢٩٢٠٧ - نُقْرِئُكَ اصْفَقُ الْجَنَاح \* *Phasia crassipennis* (S). *Phasie crassipenne* (F).

حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة التقرينات. جسمها متوسط القد، متكاثف الحمل والهلل القصير، بطول من ٨ الى ١١ م. رأسها كبير، افس، اصفر اللون. غطها مستدل الطول. زباناها نحيلان، صغيران. عينها كيرتان، ارجوانيتان. صدرها قديمي الشكل، اصفر اللون، بنفسي الحمار والقاعدة والتدليع. بطنها بنفسي الشكل. اصفر اللون، تملوه بقعة بنفسجية. روشاها كيرتان، متساكان، ابيضان، اصفر الحمار الاسامي. قوائمها الى الخنطي الصناعي. ارساها سود. تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول. سرسوها البراري وكل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها تتطفل على مستقيبات الجناح ولا تفرق عند الحاجة عن نصفيات الاجنحة.

#### ٢٩٢٠٨ - نُقْرِئُكَ اَهْلَب \* *Mintho* (S). *Mintho* (F).

ذبابة نافعة من التقرينات. طولها نحو ١٠ م. رأسها وصدرها الى الزرقعة الالامعة. بطنها اجر اللون يعلوه حلب كفيف اسمر. يرقاتها تعيش على مكن غديات الاجنحة. ج. انقرة.

#### ٢٩٢٠٩ - نُقْرِئُكَ رَصَاصِي \* *Eutichinus larvarum* (S).

ويدعى تاكينتا كبيرة. ذبابة نافعة من التقرينات. طولها

انها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٨ يوماً || اعرف انواعه واشهرها النكات الاسود الذليل .

### ٢٩٢٢٥ - نَكَاتٌ اَسْوَدُ الذَّيْلِ \*

*Recurvirostra avocetta* (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocette* (F). *Avocette* (E).

طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. ثوبه الى البياض الناصع باستثناء منقاره ورأسه وظهوره وذنبه وكل جناحيه واباهرهما السود || يحوب العالم القديم في طلب المصيف والمشق. يرتاد الشطوط والايوار والمناقع ويجاري الماء. يعيش اسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠٠ الى ٥٠٠٠ .

### ٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتٌ

*Récurvirostridae* (F). *Recurvirostridae* (E).

عمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز باسطالة ودقة منقايدها المدبية الملائق المنعكفة الى العلاء. اجنتها مستطلة ذلقة تلحف الذنب. ارساغها رفيعة، مستدقة، سرديّة البشرة. اصابعها كفية، حطايها كامل موصل .

### ٢٩٢٢٧ - نَكَاسٌ

النكاس والانكاس نوع من السلك عظيم جداً (التاج) .

### ٢٩٢٢٨ - نَكَافٌ

*Parotidite* (F). *Parotitis* (E). النكاف ويُدعى التهاب الكفة هو التهاب الغدة الكفية .

### ٢٩٢٢٩ - نَكْبَاءٌ

هي الريح التي تدر دون ان يتبين لها مهب .

### ٢٩٢٣٠ - نِكْتِيبٌ جَبَّارٌ \*

*Nyctibius grandis* (S). *Ibijau géant* (F).

طائر راس من فصيلة السبديات. موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يألف الاجراع الكثيفة البعيدة عن كل عرآن. يسرح في الليل ويبعث طوال النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. بسطته نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد التمعبة متوسط اللون. ثوبه الى الطلحة الصفراء المراج يعلوها تجنيم اسمر وتشيزن اشجع ورقة ريداء. رأسه مستعرض الجرم. عيناه كبيرتان كسنتين. رموش عينيه طويلة. سباله كثيف مستطيل. منقاده قليل الاستداد الخارجي. عتقه محجن البهرة، غريض القاعدة، عظيم الشدق. عتقه بالغ القصر. جناحه رحب مستطيل. ذنبه مستدير الطرف. رشفاه قصيران. اصابعه مستطيلة قوية || طيرانه خفيف الحركة، سريعه. سميح على الارض احرق. قوته الحشرات من جميع الفصائل والترتب ومن جميع الاحجام || يلدن عشه في تجاويف الاجمار. الاثنى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

### ٢٩٢٣١ - نِكْتِيلٌ \*

*Noctilio* (S). *Noctillon* (F). جنس غفاقيش من عمارة الرماصات يتميز باسطالة رأسه وفوطيته، بانشارم شفته العليا المتجمعة وبطول جناحه. له نوعان موطنها جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد. يسرح من الفسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة. يألف المداور وواقاب الصخور البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تنطفل على بعض الاسماك وتنقل معها الى معدة الانسان || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٢٩٢١٦ - نُقَيْرِيَّةٌ عَرِيضَةٌ

*Bothriocephalus latus* (S).

اكبر انواع الديدان النقرية القدية التي تنطفل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار. رأسها ثنائي الوافض، عادم الكلايب، مغروطي الشكل، مقطوم المقدم. جسمها عديد السكم المستعرضة الضيقة. يعتقد ان ملقوحاتها المهدية التي تميش في الماء وتنطفل على بعض الاسماك منها السلمون والثرثرة، تنطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المذبة .

### ٢٩٢١٧ - نُقَيْشَةٌ \* ، قُبْعَةُ الْأَمْبَرَاطُورِ

*Spirifer* (S). *Spirifère*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).

جنس حيوانات من الرخويات عضديات الارجل وفضيلة النقيشيات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الطبقة الدفونية. انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصدافها صغيرة القد، شوزنها قريب الشبه بالقيمة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون. جيمها نظامية التركيب، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها اقل احديداً من اليمينية || تعيش لاصقة بالصخور المنورة .

### ٢٩٢١٨ - نُقَيْصٌ \*

*Imperfecti* تمت ترميبي توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الخرومة من بعض مراحل التطور .

### ٢٩٢١٩ - نُقَيْشِيَّاتٌ ، نُقَيْشَاتٌ

*Infusorios* (F). *Infusoria* (E).

صف حيوانات دنيا من الاولى تشمل السوطيات والمهديات وعدة رتب وفضائل .

### ٢٩٢٢٠ - نُقَيْشَةٌ \*

*Neonate* (F). *Neonate* (E). تمت ترميبي يطلق على الحشرة المستجدة النقف .

### ٢٩٢٢١ - نُقَيْقٌ

*Coassement* (F). صوت الصفدع. نق الصفدع : صات .

### ٢٩٢٢٢ - نُقَمٌ

*Ligne médiane de la route* (F). خط وسط الطريق .

### ٢٩٢٢٣ - نُكَاةٌ \*

*Paraphyse* (F). اخلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

### ٢٩٢٢٤ - نَكَاتٌ

*Recurvirostra* (S). *Récurvirostre* (F).

جنس طير من النكاتيات. انواعه اربعة جميعها كبيرة القد طويلاً براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. منقايدها مستطيلة، منعكفة الى العلاء، تشبه السيف. ألوانها بلقاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب السبلاد الاسيوية والاروية والافريقية. يرتاد غشاف الانهار وشطوط البحار والمناقع والايوار. قوتها القشريات والرخويات والديدان والدعاميص والحشرات. تنكت الحما والخز والرمال في طلبها || تدن اعشائها في التراب، افاحيصها مستطيلة الشكل قليلة المعق.



نقيرية



نقشة



نكات اسود الذيل



نكيب جبار



نكروبة

أوراقه كبيرة فارشة قطر تصلها براوح من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهارها صفراء اللون قطرها براوح من ١٠ إلى ٢٥ سم. معاليفها تطول من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. || جذاميره نشوية المادة، سكرية الطعم، مأكولة. تنوره يستمر من تموز إلى آب.

٢٩٢٤٦ - **نَلُصِيْبُو الشَّرْقِي \* ، نَلُيَوْفَر قُبْطِي**  
**بَقْلِي قُبْطِي ، جَامِسَة**

Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S). Nélumbo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egyptiens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E). Nelumbo, Nussmummel (D). Nelumbo (I).

نوع من النلبو البروتي المبدول. مهد مياه الهند وافريقية الشرقية. يكثر في مياه النيل. أوراقه كبيرة القذ مستديرة النصل قطرها براوح من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. اعتاقها شائكة. أزهاره وردية اللون أو عاجية، مستديرة العرف القلح، كبيرة القذ، قطرها براوح من ٢٠ إلى ٣٥ سم. معاليفها تطول من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية المادة، مأكولة. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٩٢٤٧ - **نَم**  
Philoptère (F).  
هو القردو جئس حشرات جلدية ذرية القذ من التمنيات. انواعه عديدة منها نم\* البط والجوام والحمام والزنج والتسور.

٢٩٢٤٨ - **نَمَآة**  
Trichodectes (F).  
هي النمة، من الحشرات الجلدية التي تركب الحيوانات اللادجة.



نلبو اصفر

٢٩٢٤٩ - **نَمَاسَة ٥**  
Platystoma (S).  
Platystome (F). Platystoma (E).

جئس حشرات من فصيلة الناسيات وربة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اقطار العالم اخصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول م ٥ إلى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستعارية قصيرة، ثلاثية النصل، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطائها معتدلة الطول. ملاسها صغيرة. كواسلها شبه بيضية الشكل. بطونها يرمية تنتهي بمزات ذرية. رواشها مبقجة. قوائمها نشطية يعلوها في اقتخاذها هلب دقيق || جميعها واسعة تألف الحراج والغابات وكل مكان تكثر فيه الازهار. يرقاتها خاضلة او دامت.

٢٩٢٥٠ - **نَمَاسِيَّات ٥**  
Platystomidae (S).  
Platystomidés (F). Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها متفارقة القذ، تطول من ٤ إلى ١٢ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستعارية قصيرة، ثلاثية النصل. كواسلها شبه بيضية الشكل. بطونها يرمية. رواشها مبقجة. قوائمها قياسية || الحشرة الجملانة واسعة اما البرقة خاضلة وبعضها دامن ومنها التي تمش على البصل وفي دوفص الزنايق || اشهر اجناسها النامشة.



نلبو الشرق

٢٩٢٥١ - **نَمَاشَة**  
Odontoglossum (S).  
Odontoglosse (F). Odontoglossum (E).

جئس نباتات اممية برية وتريتين من فصيلة السحليات. انواعها المعروفة تقارب السنين جميعها من نبوت جبال

٢٩٢٣٢ - **نَكْشَة** قلة عشب المرعى أو البرية .

٢٩٢٣٣ - **نَكْرُوبَة ٥**  
Necrobia (S).  
Nécrobie (F). Necrobia (E).

جئس حشرات خنفسية من فصيلة الزوجنيات. وربة غديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها صغيرة القذ. اطوالها تراوح من ٤ إلى ٧ سم. اقواسها وحيدة اللون او ثنائية. الوجبة اللون زرقاء. اما الثنائية فزرقاء وحمراء || مسرجها بجوي. تعيش على المواد العضوية والجلود الجافة والفراء.

٢٩٢٣٤ - **نَكْرُور الشَّط**

حشرة تدعى ذقة الشامل\*، اطلبها.

٢٩٢٣٥ - **نَكْش ، نِكاش**  
Plochage (F).  
Digging (E).

اصلاح التربة للزراعة واقتلاع الدغل منها أو اصلاح التربة المخرسة وتفتيت مدرها وتنظيفها من الاشاب.

٢٩٢٣٦ - **نَكَمَة**  
Hyménium, Chapeau (F).  
Hymenium, Pileus (E).

هي غلفة الفطر اي بجنبته التي تحوي جهاز الاخصاب والذكائر.

٢٩٢٣٧ - **نَكَمِي**  
Hyménial (F).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة.

٢٩٢٣٨ - **نَكَمَة**  
Parotide (F). Parotid gland (E).  
هي الغدة النكفية اي بنت الاذن.

٢٩٢٣٩ - **نُكْلُون ٥**  
Nucléon (F). Nucleon (E).

النكلون هامة تؤلف نواة اللديرة (يوجد نكلونات ايجابية تدعى بروتون ونكلونات حيودة تدعى نرون).

٢٩٢٤٠ - **نُكْلُونِي ٥**  
Nucléonique (F).  
Nucleonic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالنكلون.

٢٩٢٤١ - **نَكْمِي ٥**  
Nécomien (F).  
ساف حصيلي يعتبر قاعدة سافات الطبقة العليايرية السفلى.

٢٩٢٤٢ - **نَكِيب** النكيب : دائرة الحافر والخف.

٢٩٢٤٣ - **نَلْكَ**  
Aubépine azérolier (F).  
هو الزعرور العادي، اطلبه. الواحدة نلكة.

٢٩٢٤٤ - **نَلْمِبُو**  
Nelumbo (S).  
Nélombo (F). Nelumbo (E).

جئس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفريرات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها مياه البلاد الحارة. جذاميرها معادة. اوراقها مستطيلة الاعناق مستديرة النصل. أزهارها كبيرة القذ. ثمارها كروية الشكل مغسمة في طست مستعرض الاطار. بزورها نشوية المادة المأكولة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٩٢٤٥ - **نَلْمِبُو اصْفَر \* ، لُؤْش اصْفَر**  
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune (F). Yellow nelumbo (E).

نوع من النلبو البروتي. مهد البلاد الامريكية.



نماشة كبيرة الزهر



نمت الغنم



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الضأن



نمة العنز



نمة الكلب

أمركة الاستوائية. بعضها جميل الازهار كبيرها شائع الزراعة التريبيية المركبة في المصاري والمنازل || اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة، قليلة العدد. ازهارها عقدية التجميع، تتركز على شاربغ ليلية مصمتة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

### ٢٩٢٥٢ - نَمَاشَةُ كَثِيرَةِ الزَّهَر \*

Odontoglossum grande (S).  
Odontoglosse à grandes fleurs (F).

نوع من الناشة. اوراقها سنانية النصل، مستطيلة، قليلة العدد، تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. شراخها يحمل من ٤ إلى ٩ ازهار. قطر الزهرة يراوح من ١٠ إلى ١٨ سم. لونها الى الصفرة البرتقالية يعلوها تمشيش جوزي. شيفيات الازهار تبتية اللون صفر الحواج || تنويرها يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء.

### ٢٩٢٥٣ - نَمَاشَةُ مُشْتَجَّة

Odontoglossum crispum (S).  
Odontoglosse crispé (F).

نوع من الناشة. اوراقها عصفية الشكل تطول نحو ٤٠ سم. شراخها يحمل من ١٥ إلى ٢٠ زهرة. قطر الزهرة يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. بتلاتها وفصلها متواجبة النصال لونها الى البياض العاجي تعلو نمشة كستنية سفعا لانظامية الترتيب. شيفيات الازهار صفراء اللون، اهليجية الشكل، مدبية الاطراف || تنويرها يستمر من اوائل شباط الى اواخر نيسان.

٢٩٢٥٤ - نَمَاص  
Fil fin (F). Fine thread (E).  
غيط الامة من اي مادة كان.

٢٩٢٥٥ - نَمَاشَةُ  
Vertex  
الناقة : اعل الرأس وتعرف بالنافوخ.

٢٩٢٥٦ - نَمَال  
Myrmécophile (F).  
نمت تعريبي يطلق على النبات الذي يواي النمل ويعوله.

٢٩٢٥٧ - نَمَام، نَمَام المَلَك (F).  
Thym glabre (F).  
هو الستر الامرط، اطلبه.

٢٩٢٥٨ - نَمَامَة  
Pigamon (F).  
هي التليب، اطلبه.

٢٩٢٥٩ - نَمَامِيَّة (E). Anabolisme (F).  
Anabolisme (F).  
علم يبحث في دور شموخ الكائنات الحية.

٢٩٢٦٠ - نَمَت (F). Hippocrépe (S).  
Hippocrépe (S).  
جنس نباتات برية من فصيلة القرنيات الفرائشية. انواعه المبرقة ١٢ منها الجنيات والجنيات والاعشاب. اوراقها مركبة مشطية مستطيلة الاعناق. ازهارها صفراء اللون، صبوانية التجميع طويلة المالحق. ثمارها قرن مفلطحة رقيقة غمرمة الاطراف || اشهر انواعه واكثرها انتشارا نمت الغنم.

### ٢٩٢٦١ - نَمَت الغنم \*

Hippocrepis cornosa (S). Hippocrépe à toupet,  
Hippocrépe à toupet, Fer à cheval (F). Tufted horse-shoe vetch (E). Schopfhufeisenklee (D). Ferro di cavallo, Mandorlo dei boschi (I).

نوع من النمت الطبي البري المرعوي. تمتلغ الغنم بشهوة

ويجود عليه درها. عشبته معمرة فروع. اوراقه مركبة ريشية وريية التجميع. وريقاته بيضيه النصل، داكنة الخضار. ازهاره طرفي، صيواني، رباعي التركيب او خاسية. ثمار قرن مفلطحة، مقوسة، غمرمة الخار. اوراقها وازهاره وبودره طيبة، مرة المذاق، قابضة، تغيد المعدة وتقويها، تدمل الجراح وتغني اثرها.

٢٩٢٦٢ - نِمَّة البَقَر \*  
Trichodectes scalaris (S).  
Trichodecte du bœuf, Petit pou du bœuf (F).

حشرة من النيمات. تركب الانبشار وتعيش على فوف واوساخ جلودها. طولها يراوح من ١ الى ٢ م. لونها الى الصفرة واسودها متساويا الغرض. تحمل في وسط كل سكة من سكم بطنها نقطة سمراء بيضاء. تكثر على الظاهر والباطل والفخذ. تسبب تمقيصاً يقود الى الحكاك.

### ٢٩٢٦٣ - نِمَّة الخَيْل \*

Trichodectes vestitus (S). Trichodecte du cheval,  
Petit pou du cheval (F).

حشرة من النيمات تركب الخيل وسائر الدواب. طولها نحو ٢ م. ثوبها الى الصفرة اسودها قصير مستعرض. تحمل في اواسط السبع سكم الاول من بطنها تجذيع متعرض اسمر. تعيش على فوف الاكئاب والمعاير فضائيق الدواب وتحملها على الحكاك.

### ٢٩٢٦٤ - نِمَّة الضَّأْن \*

Trichodectes sphærocephalus (S). Trichodecte du mouton, Pou du mouton (F).

حشرة من النيمات تركب الأغنام فتؤذيها. طولها نحو ١ م. وخمسة عخطوط. لونها الى البياض الاغبر يعلو موج اسفع. تعيش على فوف الجلد وتقرض الصوف وتقلق راحة الغنم وترعيبها.

### ٢٩٢٦٥ - نِمَّة العَنَز \*

Trichodectes climax (S). Trichodecte de la chèvre,  
Pou de la chèvre (F).

حشرة من النيمات تركب الماعز. طولها نحو ١ م واربعة عخطوط. لونها الى الصفار الخشن يعلو تجذيع اسود. تعيش على فوف الجلد وتقرض الشعر فتؤذي وتسبب حكاكا مزعجاً يهيج الجلد وقد يدميه.

### ٢٩٢٦٦ - نِمَّة الكَلْب \*

Trichodectes latus, T. canis (S). Trichodecte du chien, Gros pou du chien (F).

حشرة من النيمات تركب الكلاب الفتية والحرة. طولها يراوح من ١ الى ٢ م. لونها الى الصفار الفاتح الباهت يعلو توشيح اسمر. تعيش على الفوف وتقرض الورب وتسبب الحكاك الدامي.

٢٩٢٦٧ - نَمِر، نَمِر  
Felis pardus (S).  
Panther, Léopard (F). Panther, Léopard (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات وريية اللباس. يقال انه وحيد النوع عديد الضروب فوارق ضروبه تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ورطنته || جسمه منسوب التقاطع، اهيف القد، مستدير الرأس، جميل الشكل، مرقط الثوب، مائج اللعة. يطول من ١٥٠ الى ٢٤٥ سم. بما في ذلك الذنب الذي يراوح طوله من ٦٥ الى ٩٠ سم. مزاجه كراجل الأسد الا انه اقهر واخيب واعنف، لا تروعه سلقه احد. رغم ضعف حزمه وشديد حرصه || كنيته ابو الابرء وابو الاسود وابو جمدة وابو جهل وابو غطاف





نمر اسود



نمر الأطلس



نمر الحبشة



نمر الشرق



نمر الهند



نمر ملطخ



نمرود صومرا

٢٩٢٧٨ - نَمْرُود  
هي النشاص ، نوع من النمر العالية .

٢٩٢٧٩ - نَمْرُود  
Nemorrhæus (S). Némorrhède (F). Némorrhède (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بمجرة من فصيلة الإيليات . أنواعه المعروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا واليابان . تألفت غابات الغضاب والجبال ، ملجأها الجاني جامعي . جاعاتها إجمال قليلة العدد || أجسامها متوسطة القد . قرنوها صغيرة ، مخروطية الشكل ، متتامة الحد ، منعطفة الى الوراء . ضرووع أنثاها ثنائية الإخلاف . يحمل الأنثى يولم نحو ستة أشهر تنضع في تمامه يعفورا واحداً || أشهر أنواعه التالية :

٢٩٢٨٠ - نَمْرُود حَمَلَانِي  
Nemorrhæus bubalinus (S).

Némorrhède bubalin, Chamois de l'Himalaya (F). نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا وشان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ الى ٣٦٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه ربعة يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر ونحو ١٧ سم . عند الأنثى . رأسه معتدل الجرم . عيناه واذناه كبيرتان . قوائمه شديدة اللشظ ، ثوبه الى الكهبة السوداء رأسه وشيخ ظهره الى السمره المتأففة . عنقه وصدره الى الشققة . ذنقه ويطع الى البياض الاغبر || أجله يد سبعة انفار ، ذكر مانع وثلاث اثبات وثلاثة شواند .

٢٩٢٨١ - نَمْرُود صُومَرَا  
Nemorrhæus sumatrensis (S). Némorrhède de Sumatra (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرقي حلايا إلى برمانيا والسيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ الى ٣٠٠٠ م . عن سطح البحر || جسمه يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . وزنه نحو ٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو ١٥ سم . عند الأنثى . رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان مكحلتان . اذناه مستطيلتان . ثوبه الى الشققة السوداء يقيق في الرأس والظهر ويغير في البطن || أجله يد سبعة انفار .

٢٩٢٨٢ - نَمْس  
Rancissement (F). Rancidity (E).

فساد في المواد الدغنية يمي إلى ملاقتها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - نَمْس  
Herpestes (S). Mangouste (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . أنواعه المعروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة القوائم ، حادة الأطراف . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل . اذناها صغيرة مستديرة . عيونها حر . اقرباها الى الكدرة . موطنها يشمل العالم القديم . تألف المناطق الحارة . تعيش قرب مجاري الماء في المقاصب والناسل والقياس . قوتها الافاعي والجربذان والعفاء وكل ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والمير . تدجن بسهولة تربى للقضاء على الفار والجربذان والحيات || أنثاها تنضع من جربون الى اربعة جراء . حاجرها أنفاق منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ، فردية الدعايز || اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

وايو الصمب وابو رقاس وابو سهل وابو عمرو وابو المزال والاني نمره والجمع انمار ونمو ونمار || موطنه فسيح الارباء ، يشمل معظم البلاد الاسيوية والافريقية || يعيش منفردا الا في زين الكرم وقد يستمر على الفة الانثى ما بعد وضعها بثلاثة اسابيع . يقال ان يحمل الانثى لايغوق ٩٠ يوما تنضع عند تمامه ثلاثة جراء او اربعة تبصر بعد وضعها وبسبوعين وتميز برقعة امها نحو ٦ أشهر . اعرف ضروبه واشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - نَمْرُ أَيْبَيْس  
Irbis (F). هو البريبس ، اطلبه .

٢٩٢٦٩ - نَمْرُ أَسْوَد  
Felis pardus melas (S). Panthère noire (F). Black leopard (E). ضرب من النمر ، متوسط الجفة اسود الثوب كسني الرقطة الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزابج .

٢٩٢٧٠ - نَمْرُ الْإِصْبَاص  
Tigre du poirier (F). حشرة مؤذية تدعى ببر الاجصاص ، اطلبه .

٢٩٢٧١ - نَمْرُ الْأَطْلَاس  
Felis panthera (S). Panthère de l'Algérie, Grande panthère (F). ضرب من النمر ، يقال انه اكبر النمر جفة ، صغير الرقطة ، كامل الحلقة التي تنسع مع ابتعادها عن ثيج الظهر واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل افريقية الشمالية اخصها جبال الأطلس .

٢٩٢٧٢ - نَمْرُ الْحَبَشَة  
Felis pardus nimr (S). Panthère de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجفة اسود الرقطة امغر الحلقة الناقصة . موطنه الحبشة والصومال .

٢٩٢٧٣ - نَمْرُ الشَّرْق  
Felis pardus orientalis (S). Panthère de l'Amour (F). ضرب من النمر ، كبير الجفة جزوي الرقطة الصنائية اختار . موطنه حوض نهر الامور وجباله .

٢٩٢٧٤ - نَمْرُ الصَّيْن  
Felis pardus chinensis (S). Panthère de la Chine (F). ضرب من النمر . متوسط الجفة اسود الرقطة الكبيرة والمتقطعة . موطنه الصين والمنديل .

٢٩٢٧٥ - نَمْرُ الْهِنْد  
Felis pardus antiquorum (S). Panthère de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجفة امغر الرقطة الصغيرة اللاتقاسية الشكل . موطنه الهند .

٢٩٢٧٦ - نَمْرُ سُورِي ، نَمْرُ الْفُرْس ، بَلَسَكْ ، قَبْلَان  
Felis pardus taliana (S).

Panthère de Syrie, P. de la Perse (F). ضرب من النمر متوسط الجفة ، اسود الرقطة ، اصعب المختار ، منتظم الحلقات المفتوحة . موطنه يشمل الفرس وسوريا وتركيا .

٢٩٢٧٧ - نَمْرُ مَلَطُخ  
Felis nebulosa (S). Panthère longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقطة وصلقاته اللاتقاسية الحجم . موطنه جبال الهند وبرمانيا وبلق وجزر الزابج .

## ٢٩٢٩١ - نمّشة الزيتون \* Aonidiella malei (S). Cochenille vermillon de l'olivier (F).

حشرة دسوسية من القرميزات تعمرّي الزيتون في أوراقه قسّية إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراکش والجزائر || جلبها الرّسّي عند الاثنى مستدير الشكل، قزمي اللون، نولي السرة المركزية النّعم، ظهره براوح من ٢ م. إلى ٢ م. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر بيضي الشكل، قطبي السرة، قزمي اللون، يطول نحو ١ م. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. انثاهي تضع من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة يظرف ثلاثة أسابيع. اضرارها لاقاسية لانها منطوة بكثرة وجودها على الأوراق. وهي تركب التصل على صفحتيه تنقص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة بياض الأوراق || تكافح باستعمال احد الحواشِر الفعالة مزوّجا بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

## ٢٩٢٩٢ - نمّشة اللّيمون الحمرء Chrysomphalus dictyospermi (S). Pou rouge des oranges (F).

حشرة ناهمة من القرميزات، تركب الكثير من النباتات الشريّة والأزبينية اغصانها الحشيشات || يقال ان موطنها الاصل كان الشرق الاقصى وقد انتشرت في معظم اقطار العالم واصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بعد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجاباكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبها الرّسّي بيضي الشكل ثلاثي التحديد نولي الطرف القطبي الاوسط لونه الى الحمرة المفرّاة القائمة يحفظها اطار اطحل الاثنى طول نحو ٢ م. والذكر ١ م. وثلاثة خطوط. والحشرة عند تجريدتها عن رتسها ذكرًا كانت او انثى تبدو ريمية الشكل صفراء اللون خضراء المواج اللازم || اجيالها الحولية براوح من ٢ إلى ٤ م. وهي تتحمل الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ م.غ. والحرارة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || اضرارها في الحشيشات حادة الاثنى لانها تركب الاوراق والافانثا فتتقص العصارة وتسبب الذبول وتركب الثّار فتعيق نموها وقد توقفه وتسبب جفاف الالباب وتعمس الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيوت البيضاء مع احد الحواشِر الفعالة غير ان نتائج التبضخ لا توازي التبخير || وهناك عدة حشرات خائلة تقضي على هذه النمّشة اغصانها من الصفريات اي بنات النقا ومن الدسوقيات اي بنات العيد.

## ٢٩٢٩٣ - نمّشة فلوريدا Chrysomphalus aonidum, C. ficus, Aspidiotus ficus (S). Pou de Floride (F). Black scale (E).

حشرة ناهمة من القرميزات تركب الكثير من النبات اغصانها الحشيشات والنخل والاهوكاتيه والنّوفا والخروع والغار والدفل واللباب والمضاض || يقال ان موطنها الاصل كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق اللّيمون من اليابان الى الصين وفرموزا والهند وسرنديب والى الانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد افريقيه. وهي شديدة الاذى في مراکش والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا || جلبها رّسّي وهو عند الاناث مستدير الشكل قطره براوح من ٢ م. إلى ٢ م. لونه الى السرة الصفبسية المواج تنوصه سرة مركزية جوقية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور بيضي الشكل يطول من ١ م. وضطليان ١ م. وأربعة خطوط. والحشرة عند

## ٢٩٢٩٤ - نمّشة أشعل \* Herpestes albicaudus (S). Mangousté à queue blanche (F).

نوع من النمّس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ وهو ارفع قائمة من المصري وأعل منه. ثوبه الى الغبرة يعلوها تآذير حطلي. ذنبه ابيض اللون الاشمل، جتل الور. موطنه الحبشة والتاتال وغينيا والسنغال.

## ٢٩٢٩٥ - نمّشة بنيّ Herpestes fuscus (S). Mangousté brune (F). Brown mongoose (E).

نوع من النمّس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥. ثوبه الى البني يعلوه تجلجج معترض اسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سود.

## ٢٩٢٩٦ - نمّشة فارسي \* Herpestes auripunctatus, H. persicus (S). Mangousté à points dorés, M. de Perse (F). Persian mongoose (E).

نوع من النمّس صغير القد جيل الثوب المرقط بالايض والاصفر الذهبي. موطنه العراق وبلاد فارس وجوارها يكثر وجوده في احواش النخل وقرب ضفاف الأنهر.

## ٢٩٢٩٧ - نمّشة مصري \* Herpestes ichneumon (S). Mangousté ichneumon, Ichneumon, Rat des Pharaons (F). Egyptian mongoose, Ichneumon (E).

نوع من النمّس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يجلونه في زمن الفراعة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوائم، طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٠. ثوبه الى الصفار الاشهب يعلوه توشم اطحل. رأسه وظهره اميع لونًا من سائر جسمه. قوامه سود.

## ٢٩٢٩٨ - نمّشة هندي \* Herpestes griseus, H. mongo (S). Mangousté mongo (F). Indian mongoose (E).

نوع من النمّس متوسط القد والعلو طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ ثوبه الى الصفار الخطي المواج يعلوه توشم اطحل ونمّشة بيضاء. رأسه عايق اللون. قوامه الى السرة. موطنه الهند والافغان.

## ٢٩٢٩٩ - نمشيات Ichneumonidae (S). Ichneumonidae (F). Ichneumonidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستنقة الاجسام. اطولها تراوح من ٥ الى ٢٠ م. ألوانها عابقة يكثر فيها الاسود وبعضها عرز اليلن بالاسود والاصفر || رققاتها طفيلية تمشش باكثر يها على عوائلها من حرششيات الاجنحة والندليات.

## ٢٩٣٠٠ - نمشيسية \* Ichneumon (S). Mouche vibrante (F).

جنس حشرات صغيرة من النمشيات انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستنقة الاجسام المستطيلة. اطولها تراوح من ١٠ الى ١٦ م. ألوانها مختلفة الالوان يكثر فيها التحرز بالاصفر والاسود. وراثتها ثنائية الزوج شفافة تعزل مشعة خفيفة من الالوان الزاهية || رققاتها تطفل على الكثير من الحشرات اغصانها الثابتة الى حرششيات الاجنحة ومنها المذفوف والكزبي والانتونوم والصلمل الخ ...



نمّس اشعل



نمّس فارسي



نمّس مصري



نمّس هندي



نمّشة



نمّشة الزيتون

٢٩٢٩٩ - نَمَص ، نِمَص (F). *Jonc des nattiers* (F).  
هو الاسل المري لين العود تصنع منه الاطباق والعلف .

٢٩٣٠٠ - نَمَشَة  
Apex, Sommet (F).

Apex, Summit (E).

النمفة هي ذروة كل عضو من الاعضاء في الحيوان او في النبات . والدورة من كل شيء اعاده .

٢٩٣٠١ - نِمْفُولَة البَشِين \*  
Nymphula nymphaeata (S).

Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).

Nymphula nymphaeata (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . فراشها واسمة قوتها رحيق الازهار وظلمها . رفقها خاضعة تمش على اوراق البشينة وعراسن الماء وكلها ماء . جسمها يطول نحو ١٢ مم . بسطها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ مم . رأسها معتدل الجرم ، قصير الحظ . عينها صغيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها قصيرة . مرشفتها معتدل الطول . جوشها يطولها في الزوج الامامي زراكلن بنية وصنابتها ويلعوا في الزوج الخلفي تجذيع معترض وتقيع بني صنابي . اهدابها قصبية . لها جيل واحد في الجيل . تظهر القراشة

من ٢ الى ٣ ملين . وهو عند الذكر يضيء الشكل يطول نحو ١ مم . ولثلاثة خطوط . والحشرة عند تجهدها من نمرها ذكرًا كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون . اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ هـ . انثاها نبيض من ٥٠ مئة مئة منها يمتد تراوح من شهر الى شهرين . اضرارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات المواتية اخصها الاثنان التي تجمعتها والاوراق التي تذهبها والبار التي تعطها وتصلب لهاها . تكافح اكثمة النمشة الحمراء .

Fourmis (F). Ants (E).

٢٩٣٠٢ - نَمَلْ  
جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعه عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القد . تألف الحياة الجماعية ، مجموعتها تدعى جالية ودية تقم في زرية او قرية مؤلفة من عدة سراديب وانفاق ومغائر وسرير ورداء . والنمل كالنحل يقسم الى ثلاثة اقسام ، الذكور والاناث والخنات . الذكور لاملح لاسوى كرم الاناث وهي تاكل ما تجنيه العاملات . والاناث بعد كويها ورجوعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتخلصها من اجنحتها ثم تغذيها وتقودها الى الخاضن لبنع المازن . اما العاملات اي الخنات فهي التي تقوم بجميع الاعمال : تغيد القرية وتحي الطعام وربي الدنيا والدار وتبشر على سلامة القرية تقودها غزيرة البقاء والحياة الجماعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تتصرف الى غيرها . ذكروها واناثها مجتمعة باصرة . علامتها عادة الجناح والصبر تتعرف على نظراتها وعلى الاشياء بواسطة قوتها الاستشعارية المرفوعة الاحساس . رؤسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوامها دقيقة رقيقة مستطيلة تمكها من السير السريع . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٠٣ - نَمَلْ أَحْمَر \* ، سُمْسَمَة ، جَمِينِي

Myrmica rubra (S). Fourmi rouge (F). Red ant (E).



نَمْشَة الحَمْصِيَاة



نَمْشَة البَشِين



نَمَلْ أَحْمَر

تجهدها من ترسها ذكرًا كانت او انثى تبدو صفراء اللون زاهية المالح . اما ذكرها المجنحة فبرتقالية اللون ، ثنائية الجناح الابيض . اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ هـ . انثاها نبيض نحو ٥٠ مئة مئة منها يستمر نحو اسبوع . اضرارها في الحمصيات شديدة الوقع والاذى لانها تركب الاوراق فتتمصص عصارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذيوبا وتركب البار فتضعها من النمو وقد تسبب جفاف لهاها ونعسج خصوصها . تكافح بيشي الحواشير الغدالة للمزوجة بالزيت البياض وقد يحسن استعمال التبخير السيانيدريكي لانه افضل من النفض اذ يدخل في جميع غبايا الانجار .

٢٩٢٩٩ - نَمَشَة نَارِيَّة ، نَمَشَة نَضْوِيَّة

Chrysophalus aurantif, Aspidiotus aurantif, Aonidiella aurantif, A. taxus (S). Pou fer à cheval (F). Citrus yellow scale (E).

حشرة ناعمة مارقة من القرميزات تركب الكثير من النباتات اخصها الحمصيات وقد تفضل الليمون الحامض على البرتقال وتركب السلق والخروب والياسمين والتوت والموز والزيتون والنخل والورد والصفصاف والالاث والخروع . موطنها فصح الاجزاء يشمل جميع اقاليم الليمون الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية . جلبهاها الترسى عند الانثى مستدر الشكل قليل الاحديداد مركزي السرة لونه الى السمرة النارية الباهية يحوقها اطار سبق اختار اكبه اللون قطره براوح من ٢ مم . وعطرين . وهو عند الذكر يضيء الشكل يطول نحو ١ مم . ولثلاثة خطوط . والحشرة عند تجهدها من نمرها ذكرًا كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون . اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ هـ . انثاها نبيض من ٥٠ مئة مئة منها يمتد تراوح من شهر الى شهرين . اضرارها شديدة الاذى لانها تركب كامل اعضاء النبات المواتية اخصها الاثنان التي تجمعتها والاوراق التي تذهبها والبار التي تعطها وتصلب لهاها . تكافح اكثمة النمشة الحمراء .

٢٩٢٩٥ - نَمَشِيَّة

Sporotrichum (S).  
جنس فطور مجهرية من الطليسات وفضيلة المولحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . هيغه مداد زهف على سطح العائل . جواربه الكندي يسهل التركيب قصير القد . كنفاده يضيء الشكل تركب على اطراف الشغيرات وهي شفافة او ملونة ونها الفردية التجميع والقصية . اعرف انواعه الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - نَمَشِيَّة الفُتَّاح

Sporotrichum malorum (S).  
نطر مجهرية ركب البار المحفوظة الملوثة او المخرصة ، فيغفن البشرة دون ان يتبدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - نَمَشِيَّة الحَمْصِيَاة \*

Sporotrichum citri (S).  
نطر مجهرية عادم الاذى يركب اوراق الحمصيات على اختلاف اجناسها وانواعها فيزدها ببعق حلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - نَمَشِيَّة الصُوفَان

Sporotrichum mycophilum (S).  
نطر مجهرية يركب الصوفان ينسلقه بوشاح من الخمل اللبد البرتقالي اللون يقضي على نموه .

ومصباتها || كلاليتها قوية ، سوقها وأوراقها شبه مستديرة  
هلاسية المادة حمراء اللون .

#### ٢٩٣١٨ - نَمْتَامُ البَطِّ \*

*Dacophorus icterodes* (S). *Dacophore bilieux* (F).  
حشرة جلدية من النمناميات طولها نحو ١ م. ثوبها الى  
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يبيضي الشكل  
مبهر المقلب الدقيق القصير || تركيب البط . تكافح  
بمستحضرات الفريدب .

#### ٢٩٣١٩ - نَمْتَامُ التَدْرُجِ \*

*Goniodes dissimilis* (S). *Goniode dissemblable* (F).  
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٢  
م. الى ٢ م. وخمسة خطوط . جسمها يرمي الشكل .  
عرض رأسها يفوق طولها . هلبا ضمي التجميع . ثوبها الى  
البياض الاخير يعلو بتقيج اصفر . || تركيب التدرج  
والحجل والدجاج . تكافح بالفريدب .

#### ٢٩٣٢٠ - نَمْتَامُ الحَمَامِ \*

*Gonicotetes compar* (S). *Gonicotete compaignon* (F).  
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من مليمتير واحد  
الى مليمتير وخمسة خطوط . ثوبها خطفي اللون اصفر المواج .  
بطنها يبيضي الشكل مبهر المقلب الدقيق المستطيل .  
تركيب الحمام فضضيه . تكافح بمستحضرات الفريدب .

#### ٢٩٣٢١ - نَمْتَامُ الدَّجَاجِ \*

*Gonicotetes gigas* (S). *Gonicotete géant* (F).  
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.  
ثوبها الى الصفار الخنفي المواج . بطنها يبيضي الشكل  
قصير المقلب الضمي التجميع || تركيب الدجاج تقؤذيه .  
تكافح بالفريدب .

#### ٢٩٣٢٢ - نَمْتَامُ الغِرْغِرِ \*

*Goniodes stylifer* (S). *Goniode stylifère* (F).  
حشرة جلدية من النمناميات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م.  
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .  
هلبها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السفاه || تركيب  
الغرغر والحلش . تكافح بالفريدب .

#### ٢٩٣٢٣ - نَمْتَامِيَّاتِ \*

*Phloopteridae* (S). *Phloopteridés* (F). *Phloopteridae* (E).  
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات . اجناسها وانواعها  
عديدة جيمسها صغيرة القد ، مفلطحة الجسم ، كثيرة  
المقلب ، واخصه القرون الاستعمارية الحماشية العقل . ارساها  
خادشة ثنائية المقاطع . تميش على اوساخ جلود الطير  
وريشه . اشهر اجناسها النمنام والقرود والقرودع .

#### ٢٩٣٢٤ - نَمِشٌ ، نِيمٌ \*

*Ride* (F). *Ripple* (E).  
هو الاثر الذي تخلفه الريح على التراب والماء .

#### ٢٩٣٢٥ - نَمْنُومَةٌ \*

هو العلوك ، اطليه .

#### ٢٩٣٢٦ - نَمُورٌ ، شَبَاحٌ \*

*Accroissement, Végetation* (F). *Increase, Vegetation* (E).  
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الحجم في النبات .

#### ٢٩٣٢٧ - نَمُورَةٌ \*

*Nemura* (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).  
جنس طير من الجوامئ سنيات المناخير وفصيلة الدخليات .

#### ٢٩٣٢٨ - نَمْلٌ أَسْمَرٌ \*

*Lasius niger* (S). *Fourmi brune* (F). *Dun ant* (E).

#### ٢٩٣٢٥ - نَمْلٌ أَكْثَفٌ \*

*Formica rufa* (S). *Fourmi fauve* (F). *Drab ant* (E).

#### ٢٩٣٢٦ - نَمْلٌ أَفْطَرٌ ، سَمَامٌ \*

*Lasius flavus* (S). *Fourmi rousse, F. jaune* (F). *Yellow ant* (E).

#### ٢٩٣٢٧ - نَمْلٌ جَسُورٌ \* ، قَعَصٌ \*

*Formica animosa* (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

#### ٢٩٣٢٨ - نَمْلٌ حَبَبِيٌّ ، جَقْلٌ ، دُعَايَةٌ ، دُعُوبٌ \*

*Formica nigra* (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

#### ٢٩٣٢٩ - نَمْلٌ حَصَادٌ \* ، جَقْلَةٌ \*

*Atta structor* (S). *Fourmi molissonneuse* (F).

#### ٢٩٣٣٠ - نَمْلٌ سُلَيْبَانٌ \*

*Fourmis de Salomon* (F).  
هو الحق ، نمل احمر صغير ، اطليه .

#### ٢٩٣٣١ - نَمْلٌ قَارِصِيٌّ \*

*Formica flava* (S). *Fourmi blonde* (F). *Golden ant* (E).

#### ٢٩٣٣٢ - نَمْلٌ مُدَمِّسٌ \* ، جَقْلَةٌ \*

*Formica sanguinea* (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

#### ٢٩٣٣٣ - نَمْلَةٌ ، نَمْلَةٌ \*

*Formica* (S). *Fourmi* (F). *Ant* (E).  
النملة واحدة النمل الذكر والانثى ج . نمل ونمل ونمل .  
وارض نملة ذات نمل وطعام منبولى اذا اصابها النمل . ويبيض  
النمل يدعى مازنا ويبيضا وصغيره يدعى ذرا وكثيته ايشوشول  
وكثية النملة ام مازن وام نوية . وميت النملة نملة لتنتحل  
وهو كثره حركها وقلة قوايتها || ومن شعر الامام تاج الدين  
اليمني في منزل فيه نمل قوله :

مالي ادرى منزل المولى الاديب به  
نمل تجميع في ارجائه زمر  
فقال لا تمجن من نمل منزلنا  
فالنمل من شأنها ان تتبع الشرا

#### ٢٩٣٣٤ - نَمْلَةُ الْأَرَجَسْتِينِ \*

*Fourmi de l'Argentine* (F).

هي الزرقق ، نملة مهذبا بلاد الارجنتين وقد انتشرت في  
جميع اقطار العالم .

#### ٢٩٣٣٥ - نَمْلَةُ فِرْعَوْنَ \*

*Fourmi de Pharaon* (F).  
نوع من النمل يدعى حَذَالٌ ، اطليه .

#### ٢٩٣٣٦ - نَمْلِيَّاتِ \*

*Formicidae* (S). *Formicidés* (F). *Formicidae* (E).

فصيلة حشرات . من رتبة خثايات الاجنحة . انواعها  
المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم .  
اعتادوا وكبرها قدا الانواع التي تميش في المناطق الاستوائية

#### ٢٩٣٣٧ - نَمْلِيَّوْنٌ \*

*Nemalion* (S). *Némale, Némalion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخثيات الحمر . انواعها المعروفة  
عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد



نمل جَسُور



نمل حصاد



نمل مدس



نملون



نمنام البط



نمنام الحام



نمنام الدجاج

منها في اواسط العصر البلياسي ، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف ، على ما يبدو ، الاجناس المعاصرة .

٢٩٣٢٤ - **نُمُولِيَّات** (S). Nummullitidae (F). Nummullitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها الساحق من متحجرات الحقبة الجوروية . اما المعاصر منها تعيش في بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها النُمولة .



نَمُوزَة

٢٩٣٢٥ - **نَمِيَّات** (S). Trichodectidae (F). Trichodectidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القملليات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، بيضيه الشكل ، مفلطحة البطن ، كثيرة الهلب . قربها الاستشارية ثلاثية العقل . ارساها عاشرة ، تركيب المقاط || تركيب الحيوانات البوزية كالتليل والبقر والعُزْر والنَّم والكلاب والسرابيب والثاليد والابايل ...



نَمُوزَة

٢٩٣٣٦ - **نَمِيْمَة** (S). Oogone

خلية نباتية تخضع وتربي الاجرام الانثوية ، ج نَحَايا .

٢٩٣٣٧ - **نُمِيْرَة مَلَطَّحَة** (S). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (S). Vénille maculée, Pseudopantèrre maculée, Panthère (F). Venilia macularia, Pseudopanthera macularia (E).

حشرة من الاريايات حشرقيات الاجنحة . موطنها الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اربوة . فراشها واحة قوتها مغر الازهار . سرفها تميش على اوراق الشفويات وازهارها || جسمها قصيف ابيض بطول نحو ٩ م . بسطها نحو ٣٠ م . رأسها اسمر . عينها صغيرتان . زناها مشطيان عند الذكر ، عظيماني عند الانثى . مرشها معتدل الحجم والطول . جوشها وبعثها الى السمرة . يعلوها ولج اكثف || رشناها الاماميان الى الصفار الباهت تملو رقة كستنية . رشناها الخلفيان الى الصفار الاكثف المالح تملو نمرة كستنية تمتد حتى المختار اهداها الى الشقعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بظهورها بنحوسة اسابع وتتمتع المكن لطحاً على لء الحاء السوق وتصلح الارواق || السرعة عند بلوغها اكثال تطول نحو ٢١ م . جسمها اسطواني الشكل ، ملس القشار ، يعلو ثلاثة ازرار من النمول الصغيرة المتقابلة . قوتها يمان البيئة وتلوا وشرجها الى الكسني . شرجها ينتهي بزلزنتين صغيرتين || طول الاكثال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي ضمن صلجة تحببها السرعة بين الارواق التي تلاس التربة .



نَمُوش الصمغ

٢٩٣٣٨ - **نَمِيْزَة** (S). Nemesia (S). Némésie (F). Nemesia (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات . مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمعتدلة الحارة . سقها هزيلة . اوراقها متقابلة . ازهارها لينة ، مزدوجة . مجهزة بمهاميز قصيرة || تزرع القترين في المراكب والحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .



نَمِيْزَة مَلَطَّحَة

انواعها المعروفة سبعة ، ستة منها اسيوية وواحد افريقي || جميعها مصافير صغيرة القد ، رشيقة الحركة ، ثنائية اللون . يكثر فيها الرداء والاطحل والبطن الابيض التي المواج || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم || تدفن في الاذغال البلية . حصفها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوما .

٢٩٣٢٨ - **نَمُوزَة** (S). Némose (F).

جنس طير من الجوامخ مغرويات المناظر وفصيلة التسنريات . انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية . تألف الغابات وضفاف مجاري الماء . ملجها الحيائي جامعي . جامعاتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجاً . قوتها الحشرات والبيور والتار العنقية البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٥ سم . متناقروها مغروية الشكل . اوقاها متباينة الالوان جميعها زاهية انخضب عند الذكور باعثة عند الاناث || تدفن اعشاشها في الاذغال . اناها تحضن بنجوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما .

٢٩٣٢٩ - **نَمُوس** (S). Nomeus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شاكسكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . زعانفها الظهرية فارقة . زعانفها الصدرية تنتشر وتنتهي ، عند الانقباض ، في مجايف خاصة . اوقاها الى الريدة القفصية يعلوها تنجب اسمر لاقياي التوزيع انما يكثر ويقيم عند الرأس والظهر || لحوها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٩٣٣٠ - **نَمُوش الصمغ** (S). Turanana baton (S).

حشرة فراشية من فصيلة القلتيات . جسمها يطول نحو ٢٢ م . رواشن ذكورها الى الزقة الرمادية المواج يعلوها حنار اسود اطار ابيض الهذب تقطعه الاعصاب السود . رواشن اناها حنطية اللون سمر المواج يعلوها تنميش بنفسجي ويعلوها اطار ابيض الهذب تترشع الاعصاب السود . يرقاها تركيب اوراق الصمغ فثقبها .

٢٩٣٣١ - **نَمُول** (S). نبات يدعى لقمة الحمل ، اطلبها .

٢٩٣٣٢ - **نُمُولَة** (S). Nummullite (F). Nummullites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنخربات الجذريات وفصيلة النموليات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاحساب الجوروية والطباشيرية . اما المعاصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة ، مستديرة ، قوسية الشكل ، عديدة الحجيرات الثنائية او الثلاثية التجويل الانقي .

٢٩٣٣٣ - **نُمُولِي** (S). Nummullitique (F). Nummullite (E).

نمت تعريفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثالثي المعروف ايضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر البليوساني والعصر البلياسي والمصر الاوليغوساني || تتميز هذه الحقبة بوجود الكثير من احافير النُمولة في جمراتها الرئيسية . ويظهر بعض الثدييات التي افترض تم

## ٢٩٣٤٦ - نَمِيَّة عَصْفِيَّة الْوَرَق

Moltkia graminifolia (S).

Moltkie à feuilles de graminées (F).

نوع من النَمِيَّة. ساقها زياء فروع تملو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقها متعاقبة عصفية اتصال المسنة الحافة. ازهارها عنقودي مبدل. ازهارها الى الزرقا البنفسجية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٢٩٣٤٧ - نَسْدُو

Nandou (F).

هي الروساء ، اطليا .

## ٢٩٣٤٨ - نَسْدُوس

Nandus (S).

Nandus (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة والاستوائية || اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب الشبه بالفرخ . ظهورها محدودة . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة . زعانفها الشرجية مقطوعة || اذواها الى السمره السفاه المواج يعلوها بتقيج اسود متباين الرخابة || لحومها متوسطة الصنت ، مأكولة .

## ٢٩٣٤٩ - نَسْدُونَسَا

Nandina (S). Nandine (F).

جنية مشرة معمرة ابيدة الالواق من فصيلة البرابريسيات . مهدها الشرق الاقصى . تعيش وتتكاثر في الاقاليم المعتدلة المنخفضة نحو الحارة . جنبها قليلة الفروع تملو من متر الى مترين . اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها اهليلجية النصل وريدة التجميع . ازهارها عنقودي التجميع طرقي الارتفاع . ازهارها عاجية اللون فواحة العرف المطري . ثمارها عنبية حراء اللون مأكولة .

## ٢٩٣٥٠ - نَهَاء

Paraffine (F). Paraffin (E).

هو البرافين، نوع من الشمع الابيض الجامد المكرستخرج من النفط . راجع نفط .

## ٢٩٣٥١ - نَهَاة

نوع من الودع

## ٢٩٣٥٢ - نَهَاجَة

Méthodologie (F).

Methodology (E).

النَهَاجة قسم من علم المنطق يبحث في مقضييات وتنتاج المناهج المختلفة .

## ٢٩٣٥٣ - نَهَكَار

Outardeau (F). Young bustard (E).

فرخ الحبارى . قالت العرب احمق من نهار . وقد اختلف اللغويون في النهار فقال قوم هو فرخ القفاه وقال قوم انه ذكر البوم والاثنى صيف . وقيل انه ذكر الحبارى والاثنى ليل . ج اهرة ونهر .

## ٢٩٣٥٤ - نَهَكَارِي ، نَهَوْنِي ، نَهَيَايِي

Diurne (F). Diurnal (E).

نعت تعريبي يستعمل للدلالة على الشيء الخاص بالنهار او الذي لا يحصل الا في الفياض اي النهار .

## ٢٩٣٥٥ - نَهَارِيَّة ، نَهَرِيَّة

Rapaces diurnes,

Diurnes (F). Diurnal birds of prey (E).

اسد قنسي جوارح الطير المعروفة بجوارح او كواسر النهار يقابلها جوارح او كواسر الليل .

## ٢٩٣٤٩ - نَمِيَّرة حَدِيدِيَّة

Nemesia strumosa (S).

Némésie gibbeuse (F).

نوع من النَمِيَّرة . عشية تزيينية حولية . ساقها خلية السحاء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها اهليلجية مسوطاة ، الجذعية منها لاطة ، منشارية الخار . ازهارها حراء اللون ، منها سرروب بيضاء اللون وزرقا ووردية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٢٩٣٤٠ - نَمِيَّرة كَثِيرَة الزَّهْر

Nemesia floribunda (S). Némésie floribonde (F).

نوع من النَمِيَّرة . عشية تزيينية حولية . ساقها تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقها الدليا لاطة ، سنانية . اوراقها السفلى منقطة ، بيضيه . ازهارها عاجية اللون يعلوها مواج بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

## ٢٩٣٤١ - نَمِيَّة قَانَمَة \*

Nemesia suffisa (S).

Némésie fumigée (F). Nemesia (E).

دوبية من النماكب القانصة الساعية رباعية الروايا والمشاتن تنتمي الى فصيلة الخدقيات || جسمها متوسط القد يطلو نحو ١٤ سم. عند النماكب ونحو ١٨ سم. عند النماكة . عيناها كهب اللون يملو تسنج وتزويق سود . عيناها زنجيتان . شيفهاها ضليمان . فكها منصفان . جراسها شطية ، مستطيلة الزوج الخلفي . يطنها اهليلجي الشكل ينتهي برألتين نخيلتين ، ثوبه الى الكهية الخطية يعلوها خط قارلتين اسود وسبه خطوط متعرجة || تألف البراري والمزارع . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات واساربعها ويرقاتها || عكديتها ييش في التربة انبوي الشكل ، عمودي الفور ، متوسط العمق ، روقي القعر ، تحفره تحت حجر كبير || ملجئها الحياتي كلجن سائر النماكب . تعيش نحو ثلاث سنوات . لسنتها مؤيدة وقد تكون ميتة في بعض الظروف الخاصة || تعتبر من الدوبيات المؤذية الضارة .

## ٢٩٣٤٢ - نَمِيَّص

اول ما يبدو من النبات .

## ٢٩٣٤٣ - نَمِيَّة

Moltkia (S). Moltkie (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الجسحيات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها الشرق الاوسط || سوقها زياء فروعها تملو من ١٥ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة عصفية الشكل او ابرية . ازهارها عنقودي التجميع ابطي الارتفاع || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

## ٢٩٣٤٤ - نَمِيَّة الصُّخُور \*

Moltkia petraea (S). Moltkie des rochers (F).

نوع من النَمِيَّة . ساقها زياء تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها ابرية الشكل تطلو نحو ٤٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها ارجوانية اللون في اول عهدا ثم تنحرف الى الزرقا البنفسجية فالزرقا الباهتة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٩٣٤٥ - نَمِيَّة زَرْقَاء

Moltkia coerulea (S).

Moltkie bleue (F).

نوع من النَمِيَّة . ساقها زياء قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها متعاقبة سنانية اتصال الدقيقة التسنين . ازهارها عنقودي . ازهارها زرقاء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .



نَمِيَّة قَانَمَة



نَمِيَّة الصُّخُور

## ٢٩٣٥٦ - نَهَّاس

Lion (F).

هو الاسد ، اطيه .

## ٢٩٣٥٧ - نَهَام \*

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البويات وجماعة الغداديات . جسمه صغير القد يطول نحو ٢٦ سم . رأسه معتدل الحجم . منبره نازح القوس . منبره شديد الانحناء اسود اللون تعلوه مشحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تعرضه خسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبداء || موطنه فسيح الارباح يشمل البلاد الاسيوية والاروروبية والامريكية . يالاف الاحراج والصور والتنبو والمزولا يقتر بابداء من الاماكن والآلة . يلتصق قوته في الليل ، يصيد الجرذ والقنار والزباب والحشرات . يذئ عشه في صديق الانجار وبين فروعه . انشاء نضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ٢٥ يوماً .

## ٢٩٣٦٢ - نَهَر ، أريدانوس

Eridan (F).

Eridanus (E).

النهر أو اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية الموضع . مجريها اربعة وثلاثون . شكلها كالنهر ، تبتدئ عنه قدم الجزاء فتر في المغرب على تربع الى قرب صدر قيطس ثم تمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تنطف الى الشرق فتمر على ثلاثة انجم ايضاً ثم تنطف الى الجنوب فالجنوب فتمر على كوكبا عديدة وتنتهي بنجم نير يدعى آخر النهر || أشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتدعى «منطف النهر» ، ثم «نير الشرق» في المنطف الرابع وتدعى «ادسي النعام» . والكواكب التي حولها تدعى «البقيس» . ثم «نير الزروق» . ثم «الترية» ثم «الظلم» ، وهو أشهرها ، ويدعى ايضاً «آخر النهر» . وبين هذا الظلم والظلم الذي في لم الحوت كوكب كثيرة تدعى «الزئال» .



نهام

## ٢٩٣٦٣ - نَهْرَة إقتصاديّة

Conjonction économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهزة اتفاق الظروف في وقت ما .

## ٢٩٣٦٤ - نَهْس

Pie-grièche écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E). ج. نهسان .



نيجع ناخس

## ٢٩٣٦٥ - نَهْسُور \*

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من الصرْب ينتمي الى فصيلة الصرديات . يالاف الغابات والبروح والمرابي . قوته الحشرات والبيوتات والظاء والمقارب والمناكب ... جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستفخم الجرم . منقاده غليظ وضيح . ثوبه الملوي الى الشقة السمرار بعلها شمشيح اسود . جبته ومصره الى البيرة . عيناه مكملتان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره ومصره وبطنه الى الشبة الغبراء . جناحا معتدلا الطول . ذنبه مستطيل الشكل مقطوم الطرف || يذئ عشه في الانجار الرقبة . الاثي تحضن وسعدها من ٤ الى ٥ بيضات بينها الذكر يئثن لها الغذاء .



نهر

## ٢٩٣٦٦ - نَهْن \*

Cathetus (S).

Cathète, Talégalie, Dindon des bulsons (F).

جنس طير من فصيلة النشقيات . انواعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولا يراوح من ٧٥ الى ٩٥ سم . تتميز برووسها الصلواء القليلة الزغب . مناقيدها قوية حادة . اعناقها سرحة . عادمة الريش . جوار الجلود الجمدة المسترخية . اجنحتها مستديرة ضميعة . اذيالها مستوية القد . ارساغها قوية . غنابها كبيرة . اثارها الى السرة يعولها مواج حشطي وتأثير نفسي . || تألف الاحراج . تعيش ذكراً وأثي كالحمام . سرها بعد من ١٥ الى ٢٥ زوجاً . قوتها الحبوب والحشرات . انثاها لا تحضن البيض بل تقضم في حاشن خاصة تشيدها بالتراب والقشبيسان والافخاف والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستديرة القاعدة قلها يراوح من ٣٨ الى ٤٢٠ سم . وارتفاعها من ١٢ الى ٢٠٠ سم . || ولاثي تنضع في موسم الحولي من ١٨ الى ١٥ بيضة بين الواحدة والاخرى ١٢ او ١٤ يوماً . اما البيضة فتتفك بعد وضعها ياسويين عن فرخ نشيط اذيق الريش يذير امر نفسه بدون عناء .



نهن

## ٢٩٣٥٨ - نُهْبُوع ، زَقْرَاق مُسَلَّح

Hoplopterus (S). Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طول الساق وفصيلة الزقراقيات . انواعه المعروفة ١٠ واحد .ها امريكي موطنه يمتد من الارجنتين الى البرازيل ونسمة اسبوية وافريقية || جميعها قريبة الشبه من الزقراق الملحق . اجسامها صغيرة . اذيانها قصيرة . اجنحتها مسلحة بمناخس قرنية المادة ، مدبة ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثية || قوتها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تذبث في افاحيص فتحفرها في رمال شفاف الانهر والبيوتات . وفي تحضن وسعدها من ٣ الى ٤ بيضات || اعرف انواعه واشهرها النُهْبُوع الناعس .

## ٢٩٣٥٩ - نُهْبُوع ناخس \* ، زَقْرَاق ناخس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vanneau à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التبويع الضارب القواطع . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وبصر والجزيرة العربية والعراق وسائر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا واليونان يحوب بعض اصقاعها كل عام في طلب الرزق والمصيف والمشق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وجناحاه الى الصهبة السمرار . رأسه وجوشته الى السواد الفحشي . منبره وعنقه وكفاه وبلطه والجزيرة العربية وجناحاه الى البياض الناصع . اطراف قوادمه سود || يالاف الاغوار وصفات الانهر والبيوتات ، سره متوسط العدد . قوته الحشرات والديدان والحمار .

## ٢٩٣٦٠ - نَهْدَة ، نَهْدَة ، نَهْدَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة . وقد تستعمل للدلالة على مقدار غني الابان بالزبد فتقول نهدة هذه الابان ... نهدية هذا اللبن .

## ٢٩٣٦١ - نَهْر

Fleuve (F). River (E).

مجري من المياه العذبة ينساب على الارض ويصب مياهه في بحر او بحيرة . يعتمد البحر على التنايب والامطار والثلوج الذائبة وهو يتألف من مياه عاده من مجري رئيسي تغذيه السواعد والفرور . وان صغر وكثرت مياهه فهو الطبع (Rivière) ج اطباع وساعده يدعي جداول . جداول . وان كبير فهو النهر وساعده يدعي راج . روافد .

## ٢٩٣٦٧ - نَهْمَةٌ

Roquette sauvage (F).

عشبة برية حولية مشهورة باسم إيقان وجرجير بري .  
ج نبق .

## ٢٩٣٦٨ - نَهْمَةٌ

النَهْمَةُ « طائر طويل المنقار والرجلين والرقبة ، اغبر  
اللون » (اللسان) .

## ٢٩٣٦٩ - نَهْمَةٌ

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عنتيل ،  
اطليه .

## ٢٩٣٧٠ - نَهْمِيَّاتٌ

Troche (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تدعى أيضاً  
عتيليات ، اطلبها .

## ٢٩٣٧١ - نَهْمِيَّيْنِ

Bralmont (F). Bray of an ass (E).  
صوت الحمار . والنهاق كذلك .

## ٢٩٣٧٢ - نَهْمِيَّيْنِ ، قَائِبِ الْأَذُنْ ، أَبُو مَقَصَّ

Forficula (S). Forficule, Perce-oreille, Pince-oreille  
(F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).

جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة النهميكيات . أنواعه  
عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم . أجسامها مفلطحة  
مستطيلة سداسية القوائم . قرونها الاستشعارية خطيطة  
الشكل لا قياسية الطول والتركيب براوح عدد عقلا من  
١٠ إلى ٣٤ . كرواسلها مثلفة الزوايا مهمة الحمار الخارجي .  
اعمالها قصيرة مقبولة . رواشها متباينة الأشكال والأحجام ،  
جالسة الاوتكاز . تحمل في مؤخر بطونها ملاقط لا نظامية  
الشكل ، مقوسة كلاية في الذكور ، مستقيمة في الاناث .  
يزعم أهل الغرب أن القرب الاذن وزعم غريم انها تمض  
أطر الرقيق وقوف الجواوي . || أعرف أنواعه وأشهرها  
ما يتبع .

## ٢٩٣٧٣ - نَهْمِيَّيْنِ أَزْعَبْ \*

Forficula pubescens (S). Forficule pubescente (F).  
نوع من النهميك ، حشرته دقيقة الجسم الازغب تطول من ٦  
إلى ١٢ م . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٢ عقلة .  
ثوبها إلى الخنطي الاسف الملاج . ملاقط ذكورها كلاية  
الشكل دائرية التفويس . ملاقط اناتها مستقيمة .  
تميش على الاشباب والجنبات الصغيرة . قوتها مكن الحشرات  
ورقاتها وسيقان الازهار وتبلاها .

## ٢٩٣٧٤ - نَهْمِيَّيْنِ الْأَشْجَارِ \*

Forficula decipiens (S). Forficule des arbres (F).  
نوع من النهميك ، حشرته تطول من ٧ إلى ١٣ م . قرونها  
الاستشعارية مركبة من ١٣ عقلة . كوسلها ومعداها إلى  
الصغار الخنطي . ثوبها إلى السمرة الخنطية الملاج . رأسها  
اصهب . ملاقط ذكورها كلاية الشكل تطول نحو ٥ م .  
ملاقط اناتها مستقيمة تطول نحو ٣ م . تميش على الاشجار .  
قوتها مكن الحشرات وريقاتها والافرازات النباتية السكرية .

## ٢٩٣٧٥ - نَهْمِيَّيْنِ الْحَقْلِ الصَّغِيرِ \*

Labia minor (S). Lable (F).  
نوع من النهميك ، حشرته تطول من ٦ إلى ٦ م . قرونها  
الاستشعارية دقيقة مركبة من ١٠ أو ١٢ عقلة . معداها  
ورواشها مستطيلة . ملاقط ذكورها كلاية الشكل قليلة  
التفويس ، تطول نحو ٢ م . ملاقط اناتها مستقيمة تطول



نهميك أذنب



نهميك الاشجار



نهميك الحقول الصغير



نهميك الحقول الكبير



نهميك مبدول



نؤ

## ٢٩٣٧٦ - نَهْمِيَّيْنِ الْحَقْلِ الْكَبِيرِ \*

Labidura riparia (S). Labidure (F).  
نوع من النهميك الكبير القند ، حشرته تطول نحو ٢٥ م .  
زبانها مستطيلة محجنة كثيرة العقل التي براوح عددها  
من ٢٧ إلى ٣٠ اتحادها ذلقة . اجنحتها بارزة . ملاقط  
ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢  
م . ملاقط اناتها مستقيمة تطول نحو ١٠ م . || ثوبها  
إلى الخنطي الاصهب الملاج . تميش تحت الحجارة في  
الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء . قوتها رقات الحشرات  
وبعض المواد النباتية || جمرها نفق بعيد الغور طوله  
براوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعقد نحو ١٢ سم .

## ٢٩٣٧٧ - نَهْمِيَّيْنِ مَبْدُولْ ، قَائِبِ الْأَذُنْ الْمَبْدُولْ

Forficula auricularia (S). Forficule commune (F).  
Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D).  
نوع من النهميك المبدول الشائع في معظم أقطار العالم .  
حشرته مستطيلة الجسم المبطط . طوله براوح من ١٠ إلى  
١٥ م . زبانها مركبة من ١٥ عقلة . ظهرها قصيرة  
مقبولة صفدية التركيب . رواشها بارزة . ملاقط ذكورها  
كلاية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ إلى ٥ م .  
ملاقط اناتها شبه مستقيمة تطول من ٤ إلى ٧ م . ثوبها  
كسني اللون اسف الملاج اصهب الطرف والجوانب .  
وهو يأنف الاماكن الآكلة . يعيش تحت الحجارة  
والاشخاب . يسرح في الليل ويبيت في النهار . انشاء  
تضع نحو ٦٠ مكنة تحتها عند اوائل الربيع في قروموس  
مستطيل تدبر في التراب تحت الحجارة . مكبات يضي الشكل  
ايض اللون يطول نحو ١ م . ويتفك بعد مئته بنحو ١٠  
ايام عن رقات نهمه تلهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات  
العشبية . اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية  
والنباتية اخصها بوادر البذور الناتشة والآثار السكرية .  
افرازها زعيدة الا في بعض الظروف . تكافح كثيرها  
من الحشرات الترية الدجوية المرسح .

## ٢٩٣٧٨ - نَهْمِيَّيْنِ ، قَائِبَاتِ الْأَذُنْ

Forficulidae (S). Forficulides (F). Forficulidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة جلدليات الاجنحة الرواكض .  
اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم أقطار  
العالم اخصها الاقطار الاستوائية . جميعها من حاملات  
الملاقط الشرجية المتباينة الأشكال والأحجام || أشهر  
اجناسها النهميك .

## ٢٩٣٧٩ - نَهْمِيَّيْنِ ، قَائِبَاتِ الْأَذُنْ

Barrissement (F). Trumpeting (E). نَهْمِيَّيْنِ

هو صوت القليل في جميع ظروفه .

## ٢٩٣٨٠ - نُؤْ \*

Connochaetes (S).

Gnou (F). Gnu, Wildebeest (E).

جنس حيوانات لبونة من بقر الوحش ذوات الظلف .  
أنواعه ثلاثة . اشكالها مزيج من خلفة الماهة والثور  
والحصان . اجسامها كبيرة القند شديدة النشط . حواركها  
رفعية . رؤوسها غليظة مستعرجة . معارفها مستقيمة السيب  
اللب . بلادها رحية . اذنانها كاسية مستطيلة السيب  
كا في الخيل . قرونها غليظة ، مستعرجة القواعد ، قوية  
التحجين ، مننقة إلى العلاء || انائها تقصع ارباً واحداً



ترضعه نحو ٦ أشهر || موطنها فسح الارباع يشمل كامل إفريقيا الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

### ٢٩٣٨١ - تَوَاشِعُ الذَّبَب

٢٩٣٩١ - تَوَارُ أُبَيْصُ هو الياسم ، اطبله .  
٢٩٣٩٢ - تَوَارُ اللَّيْلُ هو شب الليل ، اطبله .

٢٩٣٩٣ - تَوَارُ حَيْبِي ، كَرِيْرَه Carriera (S).  
Gnou à queue blanche, Antilope gnou (F).

نوع من التَوَ كير الجفلة طوله نحو ٢٥٠ سم . وارتفاعه ١٣٥ ثوبه الى السرة الكتستية . ذنبه ابيض اللون .

الاثنى اصغر قدماً وقرباً من الذكر . اجله يعد من ١٠ الى ٥٠ نفراً || موطنه يشمل ضفاف الاورنج وسهوله .

### ٢٩٣٨٢ - تَوَاشِعُ الحَبِيَّة

٢٩٣٩٤ - تَوَارَكَة Eutoca (S).  
Eutoque (F). Eutoca (E).

Connochaetes albojubatus (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع التَوَ جثة واقفها غلاظة واطولها عفرة ولحية . جسمه بطول نحو ٢٨٠ سم . ويرتفع نحو ١٤٠ . قرنه اقنى الانتشاب مدبب الطرف الاحجج . ثوبه الى السرة الخطئية الصهباء المواج . عفرته شديدة السرة يتخللها سيب ابيض . لحيتة يضاء اللون ومنه غرب اسود الحبية . اجله يعد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افريقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا نيازا .

### ٢٩٣٨٣ - تَوَ مُسَلَّح

٢٩٣٩٥ - تَوَارَكَة \* Anthophora (S).  
Anthophore (F). Anthophora (E).

Connochaetes taurinus, C. gorgon (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من التَوَ كير الجفلة غليظها ، طوله نحو ٢٢٠ سم . وارتفاعه ١٢٠ . ثوبه الى السرة الخطئية يعلمها تسليج اشهب . اجله يعد من ١٥ الى ٦٠ نفراً . يعيش برفقة النعام وجير الزرد || موطنه يشمل معظم اقطار افريقية الجنوبية .

٢٩٣٨٤ - تَوَارَكَة Noyau (F). Nucleus (E).

هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة من القشب السامة في السائل النووي .

٢٩٣٨٥ - تَوَارَكَة Noyau (F). Stone (E).

هي العجسة ، اطبلها .

٢٩٣٩٦ - تَوَارَكَة Anthophoridae (S).  
Anthophoridæ (F). Anthophoridæ (E).

٢٩٣٨٦ - تَوَارَكَة القِشَل Barysphere (F).  
Barysphere (E).

نواة القِشَل اسم يطلق على كتلة الارض المركزية ذلك لان جميع مركباتها من المعادن الثقيلة الماثمة .

فصيلة حشرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة الحمويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملاجئها الحياتية تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامعي والبعض الآخر انزالي . والجامع منها قليل العديد . الذكور والاناث تعمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يوجد علامات كا في النحل || اشهر اجناسها التواركة والغثارة .

٢٩٣٨٧ - تَوَالِيْن Nucléine (F). Nuclein (E).

هي عناصر نواة الخلية وقد تكون ايزوتية ودهنية وفسفورية وكبريتية .... ومنهم من دعاهم نكليين .

### ٢٩٣٨٨ - تَوَاجِد

٢٩٣٩٨ - تَوَاس Fil d'araignée (F).

انقص الاضرار وفي اربعة في اقصى الانسان بعد الارباح . وتسمى فرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل .

٢٩٣٩٩ - تَوَالِج جَوِيَّة Perturbations atmosphériques (F).

وقيل التواجد التي تلي الاثباب . وقيل هي الاضرار كلها نواجد . قال الجوهري : وقد تكون التواجد للفرس . وفي الاثباب من الخف والسوالف من الظلف .

هي التقلبات الجوية العارضة غير المألوفة . والنوعية هي الزوبعة من الرياح . ج نوج .

٢٩٣٨٩ - تَوَاجِيس Eperons (F). Spurs (E).

حلب مؤلفة تملو سوَق بعض الحشرات .

٢٩٤٠٠ - تَوَير مُسَلَّح \* Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

٢٩٣٩٠ - تَوَارَكَة Anthophore (F).

نمت وصلي يطلق على كل عضو نباتي يعمل زهرة او علة زهور .

سمكة نهريه ييوس من مفتوحات المانة . موطنها بحيرات ومنطقات نهر الكنفو . تعيش بين الاعشاب المائية



تَوَارَكَة



نَوَيرُ مُسَلَّح

## ٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيَات ٥ Noteridae (S).

Noteridés (F). Noteridae (E).

فصيلة حشرات مائية من غدييات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٦ الى ١٢ م. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، عيونها صغيرة ، تأشيرها وتكونها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه وشعية الشكل ، مركبة ١١ فصلة. كواسلها محدبة ، مستعرضة ، اغدادها لاحقة ، عديمة التخديد. قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم || جميعها مفرسة. تعيش في المياه الراكدة او الجارية البطيئة الانسياب || اشهر اجناسها النوتيرة .

## ٢٩٤٠٧ - نُوتِدْ Calodon (S). Calodon (F).

جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميع انواعها كاعنة الصنف لاماكلة . تتميز ببوطها الشهي التسجيع الملون ، وبسوطها القصيرة الضفحة ، وبشكلها الحدودية المجددة شبه ليفية المادة || اعرف انواعها واشهرها الاربية التالية .

## ٢٩٤٠٨ - نُوتِدْ بُرْتَقَالِيّ اللون \* Calodon aurantiacum (S). Calodon orangé (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، برتقالية الموانج . نكتته خضروفية الشكل ، كثيرة الحداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ م. سطحها خلي برتقالي اللون . لحمتها كالفلين ، صفراء اللون ، كاعنة الصنف ، غير مرغوب فيها .

## ٢٩٤٠٩ - نُوتِدْ حَدِيدِيّ اللون \* Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه مخروطية الشكل ، لامتدادية السطح الخشن ، لونها الي الكستني الاسمر . نكتته ريمية الشكل قطرها نحو ٨ م. سطحها خلي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه الي الشقمة السمراء يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحمتها قاسية كالجلد ، كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

## ٢٩٤١٠ - نُوتِدْ رَمَلِيّ \* Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من التوتد . يسيد في الغابات . يعيش في المواقع الرملية المشاة بالطحالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكتة شكلًا شبيهًا بالقصع الثلاثي الاحاديد . قطر النكتة نحو ٢ م. لونها كالكساق الي الصفار الكبريتي || لحمتها كاعنة الصنف ، لا تؤكل .

## ٢٩٤١١ - نُوتِدْ عَدَبْ \* Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من التوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، مخروطية الشكل ، رباحية الحداب المستطيلة ، لونها الي الزرقعة السمراء . نكتته قمية الشكل ، كبيرة الحداب الجانبية والبطيحية ، قطرها نحو ٤ م. لونها الي الصهبه يعلوها تشبيح ازرق وموانج اسف || لحمتها جلدية المادة ، كاعنة الصنف ، خرازية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاسماك والدوبيات والدمايعس والديدان || جسمها مسطط الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ م. رأسها مخروطي . غطتها مستطيل كالجلد . فكها مسلحان بآسنان قوية ذرية . عيناها سامحتان . زعنفتها الظفيرة الاولى كبيرة القد شرعية الشكل . الثانية جذعة . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية معتدلة القد . الذيلية كبيرة ، فاخرة . ثوبا الي الشبهة البنفسجية الموانج . جانبها الي الخضر الزيتي الموشح بالفضي . يلبها الي العبرة العاجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

## ٢٩٤٠١ - نُوتوسيرَة Notoceras (S). Notocère (F).

جنس نباتات خشبية برية ، حولية ومحولة وبعمرة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة عديدة اعطائها فسيحة الاربعاء تمتد من البلاد الحارة الي الباردة || سرقها زهاب متصببة او مستلقية ، فراءه او قليلة الفروع . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، ستانية النصال . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او تينية او صفراء .

## ٢٩٤٠٢ - نُوتِيلِيَات ٥ Nautilidae (S).

Nautilidés (F). Nautilidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وآسيات الاربل رباحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المنقرضة الغابرة كثيرة العدد ، أما المعاصر منها فجنس واحد موطنه المحيط الهندي والبحار المحيطة . يدعى نوتية .

## ٢٩٤٠٣ - نُوتِيلِيَة ٥ Nautilus (S).

Nautilé (F). Nautilus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات وآسيات الاربل ، رباحيات الخياشيم وفصيلة النوتيات || انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اعطائها المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصداها كبيرة ، شبه قرصية الشكل ، متتلة التبطيط . اجسامها مخروطية ، صغيرة الرءاء . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة جاحظة . لؤسها عديدة ، فسيحة ، وشها اثنتان مجهزتان بما يشبه الهاجم . اعطائها نشيطة وقوية || اشهر انواعها وأكثرها انتشارًا النوتية الماعة .

## ٢٩٤٠٤ - نُوتِيلِيَة لَمَاعَة \* Nautilus pompilius (S). Nautilé flamé (F).

نوع من النوتية يكثر وجودها في بحار الهند . اصداها لمامة ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، لونها الي البياض المهدج بالصناني || لحومها مأكولة . اصداها مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

## ٢٩٤٠٥ - نُوتِيرَة ٥ Noterus (S).

Notère (F). Noterus (S).

جنس حشرات مائية مفرسة من فصيلة النوتيريات وربة غدييات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الي اربوة . تألف المناطق والمياه الراكدة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٧ الى ١٠ م. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور . عيونها صغيرة ، بارزة . تأشيرها وتكونها وملاصها قياسية . قرونها الاستشعارية وشعية الشكل . كواسلها مستعرضة . اغدادها لاحقة ، عديمة التخديد . قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم . ألوانها سوية الخضر الكستني او الجلوي || الجملة قانصة والبرقة ايضا .



نوتِيَة لَمَاعَة



نوتِيرَة



نوتِدْ بُرْتَقَالِيّ اللون



نوتِدْ حَدِيدِيّ اللون



نوتِدْ رَمَلِيّ




نوتِدْ عَدَبْ



نوري



نوسة الاجاص



نوسة الاجاص



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره الخارجي يقع رادية اللون او بيفاض لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الارواق وسافات الحاء الادبية تغطيتها بعد ان تقضي على النجس والحلايا . وقد يركب الباز الناجية فيشوي البشرة ببقعه السمر دون ان يؤذي لياح السوفد . يكالغ كثيره من الفطور التي تصطب الكبريت والنحاس .

### ٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحُمْصِيَّات \* Oospora citri-aurantii (S).

فطر مجهرى عيم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة والمحفظة على اختلاف انواعها || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يطب النجس والحلايا التي تنمل وتنفذ خاصة الراكس || يكافح بتطهير الباز المدة للحفظ او للتصدير وباجتناب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

### ٢٩٤٢٤ - نَوْسَة \* Nasiterna (S). Nasiterna (F).

جنس طير من التسلفات وفصيلة الببغاوات . انواعها المروفة ١٢ موطنها غينية الجديدة وجزر سليمان . تألفت الغابات الكثيفة الاجار والمواقع القريبة من الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الباز واساربع الحشرات . تسلك الاشجار كالتقار وتطير بشفة الهوري || اجسامها صغيرة ، ربة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنتها لاسفة . اذناها قصيرة مستترة الاطراف . الثوباها تختلف مع الانواع ، جميعها زامرة الالوان || اشهرها النوسة القزمية .

### ٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قَرْمَة Nasiterna pygmaea (S).

Nasiterna pygmaea (F).  
طائر من النوسة . جسمها صغير القد يطول نحو ٨ سم . ثوباها الى الحفصيات المتفاوتات الماجات . راسها ومقننها صفر . رقال ذنبها الجانيية الى السواد اللامع باستثناء الزام الاخير فانه اصفر ، اما الرقال ابيض فزرقاء اللون .

### ٢٩٤٢٦ - نَوْسَل \* Métamère (F). Metamere (E).

### ٢٩٤٢٧ - نَوْسَلَة \* Métamérie (F). Metamerism (E).

Oosporées (F). Oosporae (E).  
غارة فطور مجهرية من فصيلة الطحيات . اجناسها ستة : الابداد والخنج والسداد والسيلندريوم والموتيليه والنوسة .

### ٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِر \* هو الامونيك ، اطله .

### ٢٩٤٣٠ - نَوْشَان \* Rhinoceiros de Sumatra (F).

هو كركدن سومترا ، اطله .

### ٢٩٤٣١ - نَوْص \* النوص هو الحمار الوحشي .

### ٢٩٤٣٢ - نَوْص ، بَكَل \* Imbibet (F).

To Imbibe (E).  
ربط الشيء بالماء او باي سائل آخر .

### ٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة \* Diopsis (S).

### ٢٩٤٣٣ - نَوْصَرَة \* Diopsis (F). Diopsis (E).

جنس حشرات من فصيلة النوصريات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة ستة اعطائها البلاد الحارة || اجسامها مخصورة ، هيفاء ، تطول من ٨ الى ٨ سم . رؤوسها مكورة والميون . عيونها بارزة صغيرة . قوتها الاستعمارية صغيرة ، تحيلة ، تشيق الميون . اخطاها وملاسها صغيرة . كولها

### ٢٩٤١٢ - نَوْجَل \* Heteropogon (S).

### ٢٩٤١٢ - نَوْجَل \* Hétéropogon (F). Heteropogon (E).

جنس نباتات عشبية حولية ركوبية من فصيلة النجيليات انواعها المروفة نحو ٢٠ اعطائها البلاد الحارة والمتعددة الحرارة . سوقها جامدة تحيلة عاصمة الفروع . اوراقها عصفية . ازهارها سنبلية التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طويلاً في بعض مواقع الساحل اللبناني والوسط .

### ٢٩٤١٣ - نَوْخَة \* Ecade

نتيجة البيئة الرطوبية في التكيف او التبدل . كقولك نوخة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

### ٢٩٤١٤ - نَوْر \* هو الفص ، اطله .

### ٢٩٤١٥ - نَوْرَة \* Corymb (F). Corymb (E).

النورة والمذق شكل من اشكال الازهار سيولي الترتيب عديد الازهار المتساوية البعد عن المحور الرئيسي . يكثر في الفصيلة الوردية || والنورة هي الزهرة .

### ٢٩٤١٦ - نَوْرَج \* هو الجرجس والحال ، اطلها .

### ٢٩٤١٧ - نَوْرَس \* Mouette (F).

هو نزع الماء ، اطله .

### ٢٩٤١٨ - نَوْرَسِيَّات \* Laridae (S).

### ٢٩٤١٨ - نَوْرَسِيَّات \* Laridés (F). Laridae (E).

فصيلة طير من كليات القدم ، طويولات الريش . اجناسها وانواعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجنتها مستطيلة ذقنة الاطراف . متاقدها عادمة الزقد . اصابعها ناصية الخطاب . قصاصها مجهزة بزويين من الفراض لاجية الامر . زوج ابن وزوج ايسر || اشهر اجناسها النورس ونزع الماء والمجهوم .

### ٢٩٤١٩ - نَوْرِي \* Nuria (S).

### ٢٩٤١٩ - نَوْرِي \* Nurie (F). Nuria (E).

سمكة نهرية ربيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبوطيات . موطنها انهر الهند . جسمها وشعي الشكل يطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . راسها معتدل الجرم ، مقطوم الخلف . شذقها معتدل الانفراج ، رباعي الذبابت المستطيلة . عيناها ماحتان . زعنفتها الظهرية خلفية الانزكار تقابل الشرجية . الذليية مقعرة الطرف . ثوباها الى الحفصيات البحري يغير وتعلو ماجة وردية في البطن ويسمر ويبقى في الظهور || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَّة \* Pétale (F). Petal (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تخصيصاً للدلالة على البتلة المستقلة .

### ٢٩٤٢١ - نَوْسَة \* Oospora (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الطحيات تتميز بمشجيتها النجيل النراس المتشابك التراكب الذي يضمن النجس المتحارة ويتكاثر خارجياً . جراثيم الكندي مثذاتي الشكل . كثالده سببية التجميع || انواعها عديدة ، معظمها دمي يعيش على المواد الغذائية المحفظة وعلى الاخشاب اليابسة وفي التربة || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

### ٢٩٤٢٢ - نَوْسَة الاجاص \* Oospora piricola (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجاص واقلاده وثماره .

**٢٩٤٤٢ - نُؤْفَر أَزْعَب** (S). *Nuphar pumilum* (S).  
**Nufar nain** (F).  
 نوع من النوفر المبلول . اعطاه مياه البلاد المحتلة الحارة .  
 أوراقها بطول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١ سم .  
 ازهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها يراوح  
 من ٢ الى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

**٢٩٤٤٣ - نُؤْفَر أَصْفَر**  
*Nuphar luteum* (S). *Nufar jaune*, *Lis jaune des étangs*, *Plateau* (F). *Yellow water-lily*, *Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel*, *G. wasserrose* (D). *Ninfea gialla*, *Erculeas gialla* (I).  
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . أوراقه كبيرة  
 النصل الاخضر الباهت ، بطول من ١٥ الى ٣٠ سم .  
 وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره صفراء اللون متراكبة  
 البتلات العديدة الصفوف قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .  
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويهدأ به مأكولة || ينور  
 من حزيران الى ايلول .

**٢٩٤٤٤ - نُؤْفَر سَهْمِي**  
*Nuphar sagittaeifolium* (S). *Nufar sagittal* (F).  
 نوع من النوفر الامريكي ، أوراقه سهمية الشكل بطول  
 من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . ازهاره صفراء  
 اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنوره  
 يستمر من حزيران الى آب .

**٢٩٤٤٥ - نُؤْفَر يَابَانِي** (S). *Nuphar japonicum* (S).  
**Nufar japonais** (F).  
 نوع من النوفر البروتي الوافر النشط والنبو . مهدد  
 اليابان ، أوراقه أهليجية الشكل ، نصلها اخضر الصفحة  
 العليا ، احر السفلى بطول نحو ٣٠ سم . ازهاره متراكبة  
 القد صفراء اللون تعلوها نجمة حمراء . اسديها وبأبرها  
 ابرجوانية || تنوره يستمر طويلا فصل الصيف .

**٢٩٤٤٦ - نُؤْقَس**  
**Bronze**  
 سبيكة ، متفاوتة اللون ، من النحاس والقصدير والزنك .

**٢٩٤٤٧ - نُؤْقَصِيَّات \***  
**Dibamidae** (S). **Dibamidae** (F). **Dibamidae** (E).  
 فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات قصيرات الالسن .  
 انواعها المعروفة ثلاثة يجمعها جنس واحد . اعطائها بعض  
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل  
 وببيت في النهار || اجسامها دودية الشكل بطول من ٢٠  
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، مائعة الخلفية .  
 عيونها طامسة تلحفها اغشية غمضية .

**٢٩٤٤٨ - نُؤْكَلَة \***  
**Nucula** (S). **Nucule** (F). **Nucula** (E).  
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الحياشيم  
 وفصيلة التوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
 منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها  
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لاستساوية  
 الاصلح . الوانها عديدة ينفذ فيها الاغبر في النبي الفاتح .  
 اصفاها للؤلؤة المادة من الداخل || تعيش منعزلة في  
 الرمال المتوسطة الغور .

**٢٩٤٤٩ - نُؤْكِيَّات \***  
**Nuculidae** (S). **Nuculidae** (F). **Nuculidae** (E).  
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الحياشيم .

شبه أهليجية ، مجهزة باربعة مناخل ذرية . بطونها شبه  
 مدقية الشكل . رواشتها شافهة يعلوها بعض البقع السمر .  
 قوائمها مستطيلة || الجمالنة واسعة اما البرقة فخاضعة  
 ترغب في عصف التجليات .

**٢٩٤٣٤ - نُؤْضَرِيَّات \***  
**Diopsidae** (S). **Diopsidae** (F). **Diopsidae** (E).  
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||  
 اجسامها صغيرة بطول من ٨ الى ٨ سم . رؤوسها معتدلة  
 الجرم مجهزة بزوائد سنمية الارتكاز ، متفرجة ، مستطيلة ،  
 تحمل الميون في اطرافها . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية  
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كراسلها شبه  
 بيضيه . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنتها شافهة يعلوها  
 بعض البقع السمر . قوائمها مستطيلة || يرقاتها خاضعة  
 تتركب عصف التجليات || اشهر اجناسها النوفرة .

**٢٩٤٣٥ - نُؤْطَة** (F). **Ventricule succenturié** (F).  
 احد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اوها الحوصلة ثم  
 النوبة ثم القاصة ثم الامعاء || فالحوصلة هي الجراب الاول  
 الذي يلي المريء يجتمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل  
 الى النوبة (البطن المصغري) وفي جراب مستطيل يفرز  
 العصارة الخاصة على الاطعمة من حب وغيره التي صار  
 تليينها بالحوصلة ثم ينتقل الطعام من النوبة الى القاصة  
 حيث يسحق مع الحصى والزمل ويدخل في الامعاء حيث  
 يتم الهضم والغذاء .

**٢٩٤٣٦ - نُؤْطَر**  
**Nothure** (F).  
 طائر يدعى تطوره . اطلبه .

**٢٩٤٣٧ - نُؤْع**  
**Espèce** (F). **Species** (E).  
 النوع هو جماع الفروبو اي جملة الافراد المتشابهة التي  
 تحدت من اصل واحد او جود مشتركة .

**٢٩٤٣٨ - نُؤْعَم \***  
**Cystoseira** (S). **Cystoseira** (F). **Cystoseira** (E).  
 جنس نباتات بحرية من الحيات السمر . انواعها المعروفة  
 نحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .  
 سوقها فراء . أوراقها خطيئة ، صغيرة . كثيرة العدد ،  
 متراكبة . تتميز بمحورياتها الشبه بيضيه الشكل ،  
 السبيعية التجميع .

**٢٩٤٣٩ - نُؤْعِي**  
**Spécifique** (F). **Specific** (E).

**٢٩٤٤٠ - نُؤْكَ**  
**Cardiosperme** (F).  
 هي اليكث ، اطلبه .

**٢٩٤٤١ - نُؤْفَر \***  
**Nuphar** (S). **Nufar**, **Nuphar** (F).  
 جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النبلوريات .  
 انواعها المعروفة ١٥ اعطائها مياه اناهار واهوار وبعض  
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جذمورها مدادة . أوراقها  
 مستطيلة الاعناق طافية . ازهاره عديدة البتلات المتشابهة  
 الصفوف . ثماره جواء ريمعية الشكل ، بزورها نشوية  
 المادة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



نوعم



نوفر



نوكلة

اما انواعها فكثيرة . اعطائها بلاد امريكا الجنوبية . نباتاتها عشبية وجنية ، معظمها بري وبعضها ترابي . اشهر اجناسها النولان .

#### ٢٩٤٥٦ - نُولِيْنَا ٥

*Nolina (S). Noline (F).*  
جنس نباتات من فصيلة الزنبقيات معقودة التعريف على اسم البوتاني الفرنسي "نولان". انواعها المعروفة قليلة ، مهددا بلاد المكسيك . سوقها ليفية التركيب ، لغنية الجثث والقاعدة ، دقيقة الجذع . اوراقها عريضة النصل ، مستطيلة متعقبة . ازهارها جرسية الشكل ، صفراء ، هامة الاركاناز || رطب في الازربة الفنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلوية . تخشى المواقف الباردة والرطوبة المستحكة . اشهر انواعها الزنبقية ما يتبع .



نولان

#### ٢٩٤٥٧ - نُولِيْنَا مُعْتَبَةٌ ٥

*Nolina recurvata (S). Noline arquée (F).*  
نوع من النولينا الزنبقية ، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها جميلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم . وتعرض ٢ سم . ازهارها هامة يكتل الساق بعقوده المتشعب الكبير الحجم . ازهارها بيضاء اللون . تنورها يستمر طوال الصيف .

#### ٢٩٤٥٨ - نُولِيْنَا مُسْتَطِيلَةُ الرَّقِّ ٥

*Nolina longifolia (S). Noline à longues feuilles (F).*  
نوع من النولينا الزنبقية ، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها شديدة الخضار القابض تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها هامة الاركاناز يتفرع الساق بعقوده المتشعب الكبير القد . ازهارها بيضاء اللون ، غبراء المواج . تنورها يستمر طوال الصيف .

#### ٢٩٤٥٩ - نُولْمَان ، حَشِيشَةُ الْفَتَقِ

*Herniaria (S). Herniaire (F).*  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النوليات . انواعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة . سوقها فراء اوراقها متعاقبة لاطئة صغيرة القد . ازهارها ابطية الاركاناز او تاجية . ثمارها بذور نشوية المادة || اشهر انواعها النولان الامرد .

#### ٢٩٤٦٠ - نُولْمَان اَمْرَد\* ، حَشِيشَةُ الْفَتَقِ

**المُرْدَاة ، ثَبَات الْفَتَقِ**  
*Herniaria glabra (S). Herniaire glabre, Herniole, Herbe au cancer, Turquette (F). Rupture-wort, Turk's herb (E). Glattes bruchkraut (D). Erniaria, Erba turchetta, Erniola (I).*  
نوع من النولان العشبي البري الطبي المعمر . ساقه فراء مرط ، اوراقه صغيرة القد ، متعاقبة ، لاطئة ، بيضية النصل ، مائلة البشرة . ازهارها ابطية وتاجية الاركاناز ، نورية التجميع ، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الفتق .



نولان امرد

#### ٢٩٤٦١ - نُولْمَانِيَات

*Illecebrae (S). Illecebrées, Paronychiées (F). Illecebrae (E).*  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديمة القملات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . نباتاتها اعشاب حولية وعمره تعيش في المراض الحارة وفي الازربة القليلة الرطوبة . اوراقها كاملة . ازهارها ضمية التجميع لا تقاسية الاركاناز . ثمارها بذور نشوية المادة . || اشهر اجناسها النولان والحربط والشعير وحشيشة القنابيل .

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . انواعها الغابرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية . اما المعاصرة فتنتشر في معقل بحار المال || اصداها شبه غروبية الشكل ، متساوية المصاريح ، لامتناهية الاصلح . اصفاها خشفة ملوثة من الخارج ، مائلة للؤلؤة من الداخل . حيواناتها ماحصة اللصاع ، كبيرة الاجل الاهلالية المستطيلة || اعرف اجناسها المعاصرة واشهرها النوكلة .

#### ٢٩٤٥٠ - نُولَان\*

*Nolana (S). Nolane (F).*  
*Nolana, Chilean bell-flower (E). Glockenwinde (D). Nolana (I).*  
جنس نباتات برية وزراعية زنبقية من فصيلة النوليات . انواعها عديدة منها العشبي والجنتي والحولي والجوهر والمعمر . سوقها لا نظامية الجلوس منها المتضخمة والمستطيلة والمداقة . اوراقها كاملة معقبة متعاقبة او توتابية . ازهارها فردية مجعنة ، محورية الاركاناز ، جرسية الشكل ، فارشة الاطراف كالبرق . ثمارها نووية لا تقاسية الشكل والحجم . بلورها خشبية المادة . شديدة الصلابة || اعرف انواعها الزنبقية واشهرها ما يتبع .

#### ٢٩٤٥١ - نُولَان سِرْمِيَّةِي الرَّقِّ

*Nolana atriplicifolia (S). Nolane à feuilles d'arroche (F).*  
نوع من النولان الزنبقية الحولي . موطنه الاصل بلاد كولومبيا . ساقه مستطيلة مدادة زياء اللحاء . اوراقه الجذعية كبيرة القد سمرية الشكل . اوراقه العليا مسوطة جميعها خلية النصل . ازهاره زرق الابواق ، صفر الانابيب والفجاج || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ٢٩٤٥٢ - نُولَان سِنَاتِي الرَّقِّ

*Nolana lanceolata (S). Nolane lancéolée (F).*  
نوع من النولان الزنبقية الحولي . موطنه بلاد الشيلي . جذعه جنتي الجذر . ساقه مسطحة زياء . اوراقه لاطئة ، ساعدة ، سنانية النصل ، خلية البشرة || الجذعية منها ضمية التجميع والاخرى توتابية . ازهاره كبيرة القد سمانجونية الابواق ، صفر الفجاج والانابيب المسجلة بالنفسي . تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

#### ٢٩٤٥٣ - نُولَان مُتَنَاقِص

*Nolana paradoxa (S). Nolane paradoxale (F).*  
نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرازيل . ساقه متضخمة فراء ، زياء اللحاء ، تعلو نحو ٣٥ سم . اوراقه توتابية ساعدة ، نصلها مسوطة الشكل ، خلي البشرة . ازهاره بنفسجية الابواق ، صفر الانابيب ، حر الفجاج || تنوره صيفي يستمر نحو ٤٥ يوما .

#### ٢٩٤٥٤ - نُولَان مُسْطَح

*Nolana prostrata (S). Nolane couchée (F).*  
نوع من النولان الزنبقية الحولي السبروتي . موطنه الاصل بلاد البرو . ساقه مستطيلة مدادة . اوراقه معقبة متعاقبة ، نصلها اهليجي الشكل ، مائل الصفحة ، جبل الخضار الزاهي . ازهاره زرقاء اللون ، مسنجة بالنفسي كورسها هروية الشكل ، خاسية الفصوص المتساوية الرعية الاطراف . تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ٢٩٤٥٥ - نُولَانِيَات

*Nolanaceae (S). Nolanacées (F). Nolanaceae (E).*  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها قلية العدد .



٢٩٤٩١ - نَيْتْرُون شبر متن .

٢٩٤٩٢ - نَيْتْرَة  
Curure (F), Dirt, Muck (E).  
وحل مستخرج من فتاة او خندق .٢٩٤٩٣ - نَيْتْرِيَّات \*  
Phrynomeridae (S). Phrynomeridae (E).

فصيلة حيوانات درداء قارضة شائعة من لمة الخديجيات ومرتبة السوفيات ورتبة البترات اي عديمات الذنب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجنوبية . جميعها من الصفاعد الصغيرة القذ . تتميز بمساوات سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز تلاقيها وتتبدد التنوات العظمية الجانبية في فقرة العنبر . رؤوسها صغيرة . فكوكها العليا مستنة . اصابع قوائمها الامامية والخلفية طويلة من كل صلبان تحمل في اطرافها طباب محمية تمكئها من تسلق السطح الملساء ، جلودها ملساء ، عادمة الشعر ولكنها تفرز ، عند القبض عليها ، مادة كاوية تعمل في اليد ما يفعله نبات القراص المحرق || اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القاطبة || معظم اوتها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الماء .



نيل

٢٩٤٩٤ - نَيْتْر \*  
Propagule (F).

النثر جهاز التناسل عند العلحالب . وهو مركب من عدة حبيرات زئبدية ، وشية الشكل او عسبة . يسقط عند الادراك التام فينتش في التربة ويميد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نَيْدِيَّة \*  
Melanargia galathea (S).  
Mélargie galatée, Demi-deuil (F).

Melanargia galathea (E).  
حشرة من فصيلة الهانيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروبية . فراشها واسعة قوتها مشفر الازهار . سرتها تعيش على عصف الذكيتل والرغول والعصوية والتف و جسمها متوسط القد يعطو نحو ١٨ م . مسطها نحو ٢٨ م . رأسها الى الربعة . حينها كبيرتان . زباناها صولجانيان اسودان . جوشها الى الربعة السراء . يعطها الى الربعة و رواشها ، عند الشقين ، الى البياض الاغبر يملو تبيج وتزويق وتتميق اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح من اللغوش الى فحة الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع وتنتع المكان لطحاً على الصفحات السفلى من نصلان الصف و السقرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قشورها ناعم الخمل القصير . ثوبها الى الربعة الصفراء يملوها غطان جانبيين اصفران وسط بجبي اسود . رأسها اسود . شرجها ينتهي بزايدة مفلوكة . منها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .



نيدبة

٢٩٤٩٦ - نَيْدَة \*  
Neda (S), Neda (F), Neda (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عديمات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من السواطي || اصدها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسادها نحيلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اعطائها

اجصها السوروفوسفات ونترات الصودا وسلفات الامونيك والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٣ - نَيْتْرَاتُ الشَّيْلِي ، نَيْتْرَاتُ الصُّودَا الطَّبِيْعِي  
Nitrate de soude de Chili, Nitrate de soude naturel (F).

سماد ازوتي يستخرج من كلش مناجم الشيلي بعد تدويبه وترسيبه ويخبر مائه . مظهره الخارجي ملح ابيض اللون يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض التي ازيد من عناصر اليود والبروم واليورك والمناز يضاف اليها بعض تواله الاكدار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التشثيل من النبات غير انه ينشط تماسك ذرات التربة الذي يجد من رفايتها . لذلك ينصح باستماله في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج ويعد استعماله في الارربة المنديجة او الحامضية الدالاف لانه يجمد تفاعليها نتيجة لتجمد تماسك ذراتها .

٢٩٤٨٤ - نَيْتْرَاتُ الصُّودَا التَّرْكِيْبِي  
Nitrate de soude synthétique (F).

سماد كبري ازوتي سريع الانحلال والتشليل ، يستحضر من ازوت ملح ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنترات الشيلي من حيث نتائجها الحكيمة والكياوية على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٨٥ - نَيْتْرَاجِين  
Nitragine (F).  
مستحضر ازوتي سائل المادة ينتج من تكثير جرثائم التربة صناعياً . || يستعمل حقناً بالترية لمدها بجرثائم النيترومين .٢٩٤٨٦ - نَيْتْرُوبَتَاس  
Nitropotasse (F).  
سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦,٥ ٪ ازوت نصفه تماماً نيتريكي والنصف الآخر امونياكي . يعتبر من الاسمدة الجليظة النفع والفايدة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة وزنه التي تبلغ ٣٤ ٪ .٢٩٤٨٧ - نَيْتْرُوجِين ، نَيْتْرُوجِين  
Nitrogène (F). Nitrogen (E).

هو الازوت ، اطلبه .

٢٩٤٨٨ - نَيْتْرُوسُفَات  
Nitrophosphate  
سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع السلفات المهدق . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض السلفوري الذي يلوب في الماء و ٧,٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يعتبر من الاسمدة النشطة التي تحسن النبات على الازهار .٢٩٤٨٩ - نَيْتْرُوفِيل \*  
Nitrophile (F).  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يرغب في الارربة الغنية بالنترات وقد يطلق على التربة ايضاً فتقول تربة نيتروفيلية .٢٩٤٩٠ - نَيْتِيل \*  
Nitel (S), Nitèle (F).

جنس حشرات نافعة من الصغريات الفاشية الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٥ م . اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والاصفر الصنابي . قوتها الاستشعارية غيطة منفرجة الاطراف . مرآتها شديدة الحمة الحادة . || قوتها الزبديات من اي نوع كانت تعطيها بشداهما فتخدر اعصابها وتثقلها الى حيث تلتقيها .

غروطة متوسطة الطول. لوانسا ثنائية، انبوية مفلوحة السطوح الخارجية.

#### ٢٩٤٩٧ - نَيْدَس قَمَصِي ٥

*Nelides tipularius* (S). *Nélide tipulaire* (F).

حشرة خاملة من فصيلة البرتوسيات ورتبة غخلفات الاجنحة. جسمها صغير القد ي طول نحو ١٠ سم. شكلها وسرعاتها في انتقالها شبيهة بشكل القمص وحركاتها || ثوبها الى الخطي الاسمر. رأسها مكور، مستطيل الحظ. عيناها جانبيتان، صغيرتان. زباناها دقيقان، مستطيلان كوسلهما شبه مخروطي الشكل. حجبها ضيقة، صغيرة. ظهورها ضيق لاحق. قوائمها مستطيلة. الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الاعشاب اخصها الجراب. قوتها الاوراق.

٢٩٤٩٨ - نَيْدَمَان \* ، نَيْدَمَان ، وَرْد الشَّمْس *Drosera* (S). *Drosère, Rosée du soleil, Rossolis* (F). *Sundew, Lustwort* (E). *Runder Sonnentau, Roséil-kraut* (D). *Drosera, Rosolida, Erba da gottasi* (I).

جس نباتات عشبية مفترسة معمرة من فصيلة النيدمانيات. انواعها المعروفة زهاء ١٠٠ جميعها مغيافة تعيش في المناطق والمطارب والمواقع الرطبة. سوقها مقررة. اوراقها قرمية الانتساب مستطيلة الاعتناق. ازهارها خاسية الاجزاء تقوم على شاربين دقيقة منتصبة تتوسط الاوراق. || اقتباسها الحشرات يتم بواسطة اوراقها المستترة، المقررة التصل المدروز بالولاس الدايقة التي تشع كل حشرة تقرب منها ثم تقضي عليها وتمتصها بعد ان تفرز لوانسا المعارة الحامضية الهامضة اللازقة. وعند نهاية عملية الامتصاص يعود التصل الى ما كان عليه وتعود اللوانس الى الانتصاب وفرز المواد الدايقة بانتظار فريسة جديدة.



نيدمان

#### ٢٩٤٩٩ - نَيْدَمَانِيَات

*Droseraceae* (S).

*Droséracées* (F). *Droseraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض. انواعها المعروفة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها النيدمان والتفاض والديونه. جميعها اعشاب مقررة معمرة ترطب في المناطق وفي الارربة الطرية الرطبة. اوراقها قرمية الانتساب. ازهارها خاسية الاجزاء. ثمارها جراء بيضية الشكل. بزورها آحية الصلام. مغلف انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منهضة تمتصها بلوانسها.

#### ٢٩٥٠٠ - نَيْر

*Joug* (F). *Yoke* (E).

عشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في علق الثور او على رأسه يستعمل بواسطتها من جر الاثقال والحراث وما اشبه.

#### ٢٩٥٠١ - نَيْر ٥

*Lucicole* (F).

نمت ترميزي يلقب على الحشرات التي تبس في الظلام.

#### ٢٩٥٠٢ - نَيْر التَوَامِين

نجم نير من برج التوأمين. مركزه قبالة رأس التوأم المؤخر. يبعد عن الارض نحو ٢٨ سنة ضوئية.

#### ٢٩٥٠٣ - نَيْر الحَمَامَة

نجم نير مزدوج من كوكبة الحمامة، يدعى الفاختة، اطالها.

#### ٢٩٥٠٤ - نَيْر الرَأْس

نير الرأس نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

#### ٢٩٥٠٥ - نَيْر الزُّورَق

نير الزورق نجم نير من كوكبة النهر.

#### ٢٩٥٠٦ - نَيْر السُّرَّة

نير السرة نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

#### ٢٩٥٠٧ - نَيْر السَّرَطَان

نير السرطان نجم نير من كوكبة السرطان.

#### ٢٩٥٠٨ - نَيْر الفَكَّة

نير الفككة نجم من كوكبة الاكليل الثمالي، يوجد خلف الهالك الرابع ويدعونه قطعة المساكين.

#### ٢٩٥٠٩ - نَيْر القَدَم

نير القدم نجم نير من كوكبة المرأة المسلسلة.

#### ٢٩٥١٠ - نَيْر قَنْطُورُوس

نير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدعى حضار، اطله.

#### ٢٩٥١١ - نَيْر نُعِيم

*Alpha de la Croix du Sud* (F). *Crux* (E).

نير نعم نجم نير من كوكبة صليب الجنوب المعروفة ايضاً بنعيم. يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية.

#### ٢٩٥١٢ - نَيْرَة

*Nerea* (S). *Nérée* (F). *Nerea* (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غلفيات انجاشهم وفصيلة السلييات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها عرياطة حلالية مستطيلة محبة الظهور الثنائية الاغاديذ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل. رؤوسها صغيرة مكورة، ثنائية اللوامس الدبوسية. غشائيمها انبوية الشكل تطلق الزوائد.

#### Sui generis

#### ٢٩٥١٣ - نَيْرَج ٥

لكل زهرة او ثمرة او مادة عضوية او جسم حيواني راحقة خاصة فارقة مميزة. فالنرج هو تلك الرائحة الخاصة المميزة

#### ٢٩٥١٤ - نَيْرَمْبِيرَجِيَة

*Nierembergia* (S).

*Nierembergie* (F).

جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الباذنجانيات. معقوفة التعريف على اسم العلامة «نيرميرج». سوقها تطول من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام. ازهارها بيضاء اللون او ليلية. انايبها مستطيلة. بتلاتها فارقة. منهايا بعض مناطق امريكا الجنوبية || انواعها المعروفة، متوسطة المدد اشهرها التالية.

#### ٢٩٥١٥ - نَيْرَمْبِيرَجِيَة كَدَنَة

*Nierembergia frutescens* (S).

*Nierembergie frutescens* (E).

منهايا الشيل. ساقها كدنة خلية اللحاء تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم. اوراقها صغيرة معتدلة العرض. نصلها خلية



Avril (F), April (E).

٢٩٥٢٤ - نيسان

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفع فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

تقومه الأراضي : الاعمال الزراعية الواجب تبنيها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة وعديدة اخصها .

في الزراعات العامة الموصية

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المشككة التي تستنزف خواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية .

— متابعة تحضير التربة ونثر الاسمدة الكيماوية المعدة لزراعة التبغ قبل انقضاء الوتيرة الاولى من هذا الشهر .

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وراقبتها من الحشرات والأمراض الفطرية .

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية النيرانية على زروع القمح المتأخرة .

— الاسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول الوتيرة الثانية من الشهر .

— مباشرة زرع الشولدر السكري بعد تحضير التربة ومدها بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشولدر يرغب في التربة الغنية بالمواد العضوية .

في الاشجار المثمرة

— متابعة التلقيم في المناطق المتأخرة .

— السهر على حياة الاشجار المثمرة من صقع بعض الليالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستعمال غيوم اصطناعية من الدخان الكثيف .

— متابعة جمع اعمال مكافحة الحشرات والاصنام النباتية .

— مباشرة مكافحة ديدان الثمر في التفاح والاجاص والخوخ .. على اثر سقوط ثمرات الزهرية .

— الابتداء بحرق التربة أو ركاشها مع طمر الاشباب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الحمص .

في الحفصيات

— حرق تربة البساتين واقتطاع جميع الاعشاب وطمرها .

— تشذيب الاشجار واقتطاع الفروع الزائدة أو الانتجانسة .

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة .

— حضن المطابخ الجديدة حرقاً عليها من لفحة الشمس .

— عدم تأخير قطف الاشجار التي بشرت بالانحرام .

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر المنطوش .

في الموز

— اقتلاع جميع الشتل الغتية الضعيفة أو الزائدة عن الحاجة .

— توعين النشوب القريبة من الكباس بقليل من الاسمدة السريعة التمثيل .

في الزيتون والكرمية

— متابعة حراثة الزاوين وانجازها قبل ابتداء الثل .

— حرث الكرمة حفظاً على رطوبة تربتها ولقضاء على الاعشاب الضارة .

— تغدير اوراق الكرمة بالكبريت الميكروني ، على سبيل الحيلة ، في المواقع المعرضة للارصاد .

في الخضار

— بلر وزرع جميع الخضار الصيفية التي تملأ زرعها في الشهر الماضي نظراً لموقع التربة ونوعيتها .

البشرة لونها الى الخضار الباهت . ازهارها ليلكية اللون قطرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .

٢٩٥١٦ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia rivularis (S).

Nierembergia des ruisseaux (F).

منبتها ضفاف نهر البلاتا . ساقها مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقها مسطحة الشكل . نصالها عادة املح ، حيلة الخضار المايق ، تطول نحو ٣ سم. ازهارها عاجية اللون ، فواحة العرف . قطرها نحو ٤ سم. طولها ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طول شهر تموز .

٢٩٥١٧ - نيرمبرجيه هزيلة

Nierembergia gracilis (S).

Nierembergia grêle (F).

منبتها الاربعين . ساقها هزيلة مسطحة تطول نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة ، شبه خطية الشكل . ساقها واوراقها كثيفة املح والزيغ . ازهارها ليلكية اللون يعلوها موالج بنفسجي . تزيجها الى البياض الازرق الموالج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٥١٨ - نيرولي

Nérôli (F). Neroli (E).

هو عطر القنداق أو دهن القنداق المستقطر من زهر النارج المروف بالقنداق .

٢٩٥١٩ - نيرول الزيتون \* Phloecitribus oleae (S).

Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). Phloecitribus oleae (E). Ölbaumborkenkäfer (D).

حشرة من الكرشيات الغدييات الاجنحة . طولها نحو ٢ م. توجهها الى السواد اللامع يعلو جميع خلي اغبر . زيانها دقيقة صغرة الاطراف . || تركب الزيتون والبيك والمراش . انها تخرج الممكن في اللحاء وقد تخلع الاثنان عند انتساب السنايل الزهرية . يتغذى الممكن عن ريقات غاشية تخلع الشكير تضعله . || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء المصابة في غضون شهر نيسان .

٢٩٥٢٠ - نيرينة \*

Nerinea (S).

Nérinée (F). Nerinea (E).

جنس حيوانات من الرخويات معدييات الارجل وفضيلة النيرينيات . انواعها المروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاقحباب الثانوية || اصداها مردينة مستعيلة قريبة الشبه بالسرينيات .

٢٩٥٢١ - نيرينيات \*

Neriniidae (S).

Neriniéides (F). Neriniidae (E).

فضيلة من الرخويات معدييات الارجل . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاقحباب الثانوية || اعرف اجناسها النيرينة .

٢٩٥٢٢ - نيريزب

النيريزب هو قصب ذكور الاغنام والظباء .

٢٩٥٢٣ - نيرولك

Bolide

جسم صلب اللد شاردي في الغشاء يعبر الاجزاء الارضية وقد يستقر على الارض .



نيرولك



نيرينة

Désinsectisation (F).

٢٩٥٣٣ - نَيْسَبَة °

في الزهور

Arête d'une montagne

٢٩٥٣٤ - نَيْسَب

Ridge, Crest (E).

أعلى نقطة أو موقع في قمة جبل . ج نَيْسَبَات وأَيْسَبَات وَيُسُوق .

Petricola (S).

٢٩٥٣٥ - نَيْسَب °

Pétricole (F). Petricola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة القد . متعاشبة بارزة طليقة . أصدافها شبه مظلمة الشكل . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء . ليفنها غزير المادة .

Petricolidae (S).

٢٩٥٣٦ - نَيْسَبِيَّات °

Pétricolidae (F). Petricolidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ، تنتمي إلى مرتبة النوتيات . أجسامها وأنواعها الغالبة عديدة إما الماصرة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الإعضاء كالحياشيم والمتعاشب والاذنبت . أعطانها معظم بحار العالم . تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغمورة بالماء || أعرف أجسامها وأشهرها النيقب والتارانيو .

Nika (S). Nika (F).

٢٩٥٣٧ - نَيْسَبَة °

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || ملجبات الحياتي جماعي . تسرح قرب الشواطئ والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كالغبار .

Nickel

٢٩٥٣٨ - نَيْكَل

معدن كذهب ألون الفاتح اللامع ، شديد الصلابة ولثامته ، ريزه (في - Ni) وزنه الذري ٥٨,٩٩ ثقله الذري ٩ ينصهر في ١٤٥٠ °س . || وهو قليل التأثير بالهواء الجوي ، قابل للتفتت والطرز والسحب . يدخل في تركيب أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابة ومتانة ويزيدها من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية طلاء المادون .

Nicotine (F).

٢٩٥٣٩ - نَيْكُوتِين

وبهم من قائل تبين . مادة قلوية جسمية شديدة النقط والفتية تستخرج من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F).

٢٩٥٤٠ - نَيْكُوتِيَّات

Nicotianae (E).

هي النيكيات ، راجعها .

Nikidae (S).

٢٩٥٤١ - نَيْكِيَّات °

Nikidés (F). Nikidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ، طويولات الذيل . أجسامها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشبه بالغبار . متعاشبة قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بملاقط صغيرة . الزوج الثاني مجهز بمقاط ذرية || ألوهاها جملة الألوان القسطنطينية الزاهية || أشهر أجسامها النيكية .

— بذلر الأنواع المتخارة ونقل الشتول الصالحة إلى مستقراتها  
— المحافظة على النباتات والورود من عبث الحشرات  
— التخلص من الآورام الفطرية .  
— الاعتناء بالتسميد والتنقيل .

في الدجاج والنحل

— متابعة حفرن وترعيم البيض والعناية بالصيصان .  
— تحميص القفران أو الخللاص اللازمة لانتاج الاثوال الجديدة .  
— البدء بنقل الناحل إلى الاماكن الموصوفة بمجودة مرتعها المفترى .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان

طريق النمل إلى زيتيه .

Event (F). Blow-hole (E).

٢٩٥٢٦ - نَيْسَب °

مخرج بخار الماء عند الحيتان وبعض الاسماك . ج نَيْسَب .

Nysson (S).

٢٩٥٢٧ - نَيْسُون °

Nysson (F). Nysson (E).

جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . وفصيلة النيسونيات . أنواعها المعروفة نحو ٩٠ منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة محصورة . رؤوسها مستعرجة . تأثيرها نشيطة ، حادة . عيونها كبيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . اجنحتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . أثوابها إلى السرة المتفاوتة السواد يعلوها في بطونها تجذيع طوي يراوح من البني إلى الاصفر الذهبي .

Nyssonidae (S).

٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات °

Nyssonidés (F). Nyssonidae (E).

فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة الحمويات . أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم || جميعها جابهة تقم عشاواتها في التربة . أجسامها صغيرة ، محصورة ، ملونة . اجنحتها وقوائمها نشيطة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ، مدققة الاطراف . تسلس طرائدها فتخدها وتنقلها إلى عشاواتها || أشهر أجسامها النيسون والفوريت .

Epi (F). Tuft (E).

٢٩٥٢٩ - نَيْسَان

هو الدائرة من الشعر .

Porc-épic commun (F).

٢٩٥٣٠ - نَيْسَب

هو الشيم المبدول ، اطلبه .

Chilostomates.

٢٩٥٣١ - نَيْسَبِيَّات °

Chilostomés (F).

رئيسية من الحيوانات الطليعية الفسكليات . فصائلها وأجسامها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر . جميعها منزلة ضمن حجيرات قرنية المادة أو كسكية تعلوها اسفاط ناشرة كالشفاة تنضم وتنفصل حسب الحاجة .

Relation nutritive (F).

٢٩٥٣٢ - نَيْسَبَة غذائيَّة

Nutritive relation (E).

هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الازوتية إلى غيرها من المواد الغذائية القابلة الانهزام في كل علف .



نيقب



نيكة

## ٢٩٥٤٢ - نِيل\* ، نِيلْتَج ، حِلَّة

*Indigofera* (S). *Indigotier*, Anil (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, Anilpflanze (D). *Indaco*, *Endaco* (I).  
جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنيات الفراضية. أنواعه زهاء ٢٠٠ منها الحلوي والفلو والمعر. سوقها فراء غشوشة. اوراثها/ محتافية مركبة رية الترتيب. ازهارها قياسي التجميع والارنكاز. ازهارها صغيرة القد تكثر فيها الالوان الوردية والحمراء. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صناعي يستخرج من اوراثه وسوقه صباغ نيلي اللون. || اشهر انواعه الزراعية والتربيتية ما يلي.

## ٢٩٥٤٣ - نِيل الصَّاعِغِينَ ، نِيلُورُ أَزْرَق

*Indigofera tinctoria* (S). *Indigotier des teinturiers* (F).  
نوع من النيل الزراعي المشهور. جنبته تملو نحو ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فراء. اوراثه سباعية او تساعية الوريقات الريشية. ازهاره عقودي التجميع محوري الارنكاز. ازهاره وديدة اللون يملوسا موالج اسف. انتاجه الخضابي واقر المادة جيد الصنف.

## ٢٩٥٤٤ - نِيل انِيثِي

*Indigofera decora* (S). *Indigotier élégant* (F).  
نوع من النيل التربي. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. اوراثه لا قياسية التركيب منها الخامية الوريقات والسباعية والتساعية. وريقاته اهليجية النصل الامر للمالس. طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وعرضها نحو ٣. ازهاره عقودي التجميع، محوري الارنكاز. ازهاره وديدة اللون المايق. || تنوره يستمر من ايار الى آب.

## ٢٩٥٤٥ - نِيل بَحْرِي

*Indigofera glauca* (S). *Indigotier glauque* (F).  
نوع من النيل الزراعي. جنبته متوسطة القد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فراء. اوراثه مستطيلة، عديدة الوريقات البحرية اللون، الخلية البشرة. ازهاره عثكولي التجميع محوري الارنكاز. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

## ٢٩٥٤٦ - نِيل عَرَبِي

*Indigofera arabica*, I. anil (S). *Indigotier anil* (F).  
نوع من النيل الزراعي. جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. ساقه فناء. اوراثه عديدة الوريقات البيضية النصل الصغيرة القد. ازهاره عثكولي التجميع. ازهاره الى الحمرة الزاوية. || انتاجه الخضابي متوسط المادة والصنف.

## ٢٩٥٤٧ - نِيل فِضِي

*Indigofera argentea* (S). *Indigotier argenté* (F).  
نوع من النيل الصناعي والتربي. جنبته صغيرة القد تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراثه ثلاثية او خاسية الوريقات. وريقاته خلية النصل الغضي، بيضية الشكل، مغشوبة الطرف. ازهاره عقودي التجميع. ازهاره وديدة اللون بنفسجية الموالج. انتاجه الخضابي قليل المادة فاخر الصنف. تنوره يستمر من تموز الى آب.

## ٢٩٥٤٨ - نِيل قَرْمِزِي

*Indigofera atropurpurea* (S). *Indigotier cramolsi* (F).  
نوع من النيل التربي. جنبته تملو نحو ١٢٠ سم. اوراثه مركبة من ١١ وديدة. وريقاته اهليجية الشكل، خلية النصل المتجم اختار. ازهاره عقودي التجميع. ازهاره قمرزية اللون المايق. || تنوره يستمر من تموز الى آب.

## ٢٩٥٤٩ - نِيل هِنْدِي

*Indigofera indica* (S). *Indigotier hirsute* (F).  
نوع من النيل الزراعي. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. اوراثها كثيرة عديدة الوريقات الانطانية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ الى ٣٣، نصلها ساني الشكل، خلي البشرة، اصعب الموالج. ازهارها عقودي التجميع كبير القد محوري الارنكاز. ازهارها الى الحمرة الزاوية البنفسجية الموالج. || انتاجه الخضابي واقر المادة متوسط الصنف.

## ٢٩٥٥٠ - نِيلَة

*Indigo*  
خضاب ازرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

## ٢٩٥٥١ - نِيلَة صِينِيَة

هي البطاط النيل، اطبله.

## ٢٩٥٥٢ - نِيلْتَج

هو البيلك، اطبله.

## ٢٩٥٥٣ - نِيلْتَك\*

*Dryobalanops aromatica* (S). *Dryobalanops aromatique* (F).  
شجرة حرجية وصناعية وسيدة الجنس والنوع من فصيلة التيفليات، اعطائها تمتد من الهند الى الهند الصينية وجزر الزايب || هيكلها جبل القالب. ساقها لمساء. اوراثها متعاقبة منعقة. نصلها جامدة، سانية الشكل، شديدة الخفسار الزاوي. ازهارها عقودي التجميع. ثمارها قنطرة وقينة بطولها تفروق خاسي الفصل المستطيلة، المينة || وعندما يبلغ عمر الشجرة نحو ١٥ سنة تنشق ساقها طولاً ويرشح منها دهن كالنوري فاخر الصنف يمدى كافور بوزنيو او بوزنيول.

## ٢٩٥٥٤ - نِيلْتَن

*Nylon*  
مصد نسيجي تركيبى شائع الاستعمال.

## ٢٩٥٥٥ - نِيلْتَج

هو النيل، اطبله.

## ٢٩٥٥٦ - نِيلُورُ ، نِيلُورُ أَزْرَق ، بَشْتِين

*Nymphaea* (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seerose* (D). *Ninfea* (I).  
جنس نباتات عشبية جلمودرية مائية من فصيلة النيلوريات. انواعه المعروفة ٢٥ اعطائها مياه البلاد الحارة والمعتدلة. جلموديرها مدادة. اوراثها وازهارها مستطيلة الماعليق طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. بزورها نشوية المادة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

## ٢٩٥٥٧ - نِيلُورُ اَبْنِصْ\* ، بَشْتِين اَبْنِصْ ، عَرَايس النيل ، حَفِيفَة السَمَك

*Nymphaea alba* (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Blanc d'eau*, *Lune d'eau*, *Volet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Weisse Seerose* (D). *Ninfea bianca*, *Nénufaro*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).  
اشهر انواع النيلور واشيها. جلموديرها طليقة متباددة. وريقاته اوراثه كثيرة القد تعرض من ١٠ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر البشرة حل صفحتيه. ازهاره يبيض اللون، عادية اللف، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. ثماره وجلموديرها مأكولة. || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.

## ٢٩٥٥٨ - نِيلُورُ أَزْرَق\* ، بَشْتِين أَزْرَق ، كَرْنَب الماء

*Nymphaea coerulea* (S). *Nénufar bleu*, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seerose* (D). *Ninfea celeste* d'Egitto (I).  
نوع من النيلور البرقي الشائع في مياه بحيرات وانهار



نيل



نيلك



نيلور ابيض



نيلور ازرق



نيلوفر أصفر



نيلوفر العروس



نيلوفر عطر

افريقية الشرقية. أوراقها مستطيلة القد تعرض من ١٠ الى ٢٥ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا احر السفلى. ازهارها الى الزرقه يعلوها مواج وردي. ثماره وجذاميره مأكولة. || تنوره يستمر من حزيران الى اواخر آب.

#### ٢٩٥٩٦ - تِلُوفَر أَصْفَر \* Nymphaea flava (S).

Nénufar jaune (F). نوع من النيلوفر التريبي. مهد اهورا فلوريدا وبجرباتها. جذاميره نخيلة مستدقة. أوراقها مستطيلة القد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٩ الى ١٢ سم. نصلها عجز الحار، اخضر الصفحة العليا، اسفع السفلى. ازهاره متوسطة القد لونها الى الصفار الكبريتي. || تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٩٥٩٧ - تِلُوفَر العروس \* Nymphaea lotus (S).

Lotus, Nénufar blanc d'Egypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume, Weissler Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I). نوع من النيلوفر السبروتي المبدول في مياه البلاد الحارة. مهد حوض النيل. أوراقها متوسطة القد تعرض نحو ٢٠ سم نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى. ازهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون. ثماره وجذاميره واعناق أوراقه مأكولة. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٩٥٩٨ - تِلُوفَر عَظَر \* Nymphaea odorata (S).

Nénufar odorant (F). نوع من النيلوفر التريبي. أوراقها مستدقة كبيرة القد قطرها يراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، احر السفلى. ازهاره عطرية العرف، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. لونها الى اليبان العاجي. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٩٥٩٩ - تِلُوفَر مَعْدُود Nymphaea tuberosa (S).

Nénufar tubéreux (F). نوع من النيلوفر التريبي. مهد البلاد الامريكية. ضروبه عديدة. جذاميره متقاربة المقد الغدية الدرية الشكل. أوراقها كبيرة مستدقة قطرها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم. نصلها يبدو احر اللون ثم يتصرف شيئاً فشيئاً الى ان يستقر على الاخضر المايق. ازهاره كبيرة القد، عادمة العرف، متباينة الالوان، منها الابيض والوردي والاجر والقرمزي. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٩٥٩٩ - تِلُوفَر هِنْدِيّ، أَوْسِيد Nymphaea indica (S).

Nénufar des Indes (F). Water-lily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seeros (D). Ninfea Indica (I). نوع من النيلوفر السبروتي المبدول في معظم مياه انهار الهند. أوراقها كبيرة القد قلبية الشكل، نصلها اخضر الصفحة العليا حطلي السفلى. ازهاره كبيرة الحجم، خافتة العرف، تبينة اللون. ثماره وجذاميره مأكولة. || تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

#### ٢٩٥٩٩ - تِلُوفَرَات ، بَشَنِيَّات Nymphaea (S).

Nymphaeaceae (F). Nymphaeaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات. اجناسها خمسة، انواعها عديدة. جميع نباتاتها جذمورية

مائية. أوراقها مستطيلة الاعناق، كبيرة النصل الفارض. ازهارها كثيرة البتلات مستطيلة الممايلق تنطق على سطح الماء || اما اجناسها الخمسة فهي التيلوفر والتوفر والتلمبو والقدامة والكبيبه.

#### ٢٩٥٦٥ - نِيلِين ، نِيلْتَجِين Indigotine (F).

Indigotin (E). هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون تتأكسد في الهواء وتزرق. الصناعة الحديثة تستخرجها من النفتلين.

#### ٢٩٥٦٦ - نِيْمَكُسْتِيل Nematostylis (S).

Nématostyle (F). Nematostylis (E). جنس نباتات عشبية دوفصية سبروتية من فصيلة السويديات. منبتها بعض مناطق امريكية الشمالية. شاربها منتصبة، معتدلة الارتفاع. أوراقها صغيرة، ضيقة النصال. ازهارها مستطيلة الاذن تتركز في اباط الشرايف || تزرع للتزيين في الحدائق. ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج المنسوبة التركيب العنصري الزاخرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة متوسطة العدد، اشهرها التالية.

#### ٢٩٥٦٧ - نِيْمَكُسْتِيل أَرْجَوَانِيَّة Nematostylis purpurea (S).

Nématostyle pourpre (F). عشبة تزيينية دوفصية جادحة. منبتها التماسكاس ولوبيزبانانا. شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم. أوراقها صغيرة القد، ضيقة النصال، زيتية الخضار. ازهاره معتدلة الحجم، ارجوانية اللون. اسديتها ملتحة القواعد. متاكها منتصبة الخيوط الجالسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

#### ٢٩٥٦٨ - نِيْمَكُسْتِيل سَمَآوِيَّة Nematostylis caelestina (S).

Nématostyle céleste (F). عشبة تزيينية دوفصية جادحة. شراخها يرتفع من ٥٠ الى ٦٠ سم. أوراقها صغيرة، ضيقة النصال، زاهية الخضار. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. اسديتها ملتحة القواعد. متاكها حلزونية الخيوط || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

#### ٢٩٥٦٩ - نِيْمَكُسْتِيل سَمَرَاه Nematostylis brunnea (S).

Nématostyle brun (F). عشبة تزيينية دوفصية سبروتية. منبتها المكسيك. شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم. أوراقها صغيرة الحجم، ضيقة النصل، جميلة الخضار الزاهي. ازهارها سمره اللون بتفسجيه المواج. بتلاتها الداخلية موحجة بالاصفر. متاكها جالسة الخيوط || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ٢٩٥٧٠ - نِيْمَسْبُورَة Nemospora (S).

جنس تطور مجهرية من فصيلة الرفيفيات. انواعه قليلة العدد والاذى تتميز بسرافلها الزرقبة الملوثة الشجج. كنانها اسطوانية، منقطة، هليبة الاطراف.

#### ٢٩٥٧١ - نِيْمُوزُومَا مُسْتَطِيلَة Nemosome elongé (F).

حشرة تدعى اسطوية اللحم، اطلها.



ثيُوت مبدول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - ثِيُولِيثِي

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالثي المعروف أيضاً بالاباج الحديث. وهو يشمل العصر الميساني والعصر البيساني || تتميز هذه الحقبة بتطور الثبوت وبارتقاء العظم، بوجه عام، الى الحالة الحاضرة. كما وانها تشهد، في الزمن الاخير منها، ظهور اول انسان على الارض او اول شبيه بالانسان.

Neovossia (S).

٢٩٥٧٤ - ثِيُولِيثِي

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات. بوفه يحمل في اطرافه خيوط مشجية شفافة. انتاش بوفه يتميز بدعيات مخروطية الشكل تحمل العديد من البويضات اهلوية الضمية التجميع || انواعه المؤذية قليلة الضرر لا تستوجب العناية

Néolithique(F). Neolithic(E).

٢٩٥٧٥ - ثِيُولِيثِي

ثيُولِيثِي او العصر الثيُولِيثِي هو زمن الحجر المصقول.

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول\*، مَبْدُول المَاء المَبْدُول، سَمْبَدُول مَبْدُول، سَمْبَدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaire, Triton punctué (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قاذب بيوض من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوقيات. موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ الى ١٦ سم. الذكر اصفر من الانثى. رأسه مخروطي الشكل. عيناه صغيرتان. حنكه كامل التسنين في الفكين. قاتمته الاماميتان رباعيتا الاصابع اما الخلفيتان فخاسيتها. جلده مائل القشار. ثوبه اللوي، مدبج وزرکش وصنّيج بالاسمر والاخضر والاصفر والاسود. مدبه الى الكلبة العلواء تتوسطها جفدة حراء تمتد من الزور الى المزرق || يتميز بفقل الهمة. يألف الناييح والمناقع. قوته الحشرات والتغشريات والرخويات || يعتبر من القواذب المفيدة النافعة.



#### ٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

*Ampelopsis cordata* (S). Vigne vierge à feuilles en cœur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته مدادة عارشة تطول من ١٥ إلى ١٠ م. أوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. نصلها رقيق الصفحة، أخضر اللون، عادم الخمل || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ٢٩٥٨٤ - هاذة كبيرة الورق \*

*Ampelopsis megalophylla* (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته دغلية الشكل تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها ريشية التركيب. وريقاتها كبيرة القذ يقضي الشكل تطول من ٦ إلى ١٠ سم. نصلها مائل الصفحة العليا، خلي السفل، أحر المروق والأعصاب. أزهارها صيدانية التجميع. يزورها سود. أزهارها يستمر طول شهر تموز.

*Ampelopsis arborea* (S). هاذة شجيرة Vigne vierge arborescente (F).

نوع من الهاذ التريبي. شجيرة متصبة تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها ريشية التفصيص، نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفل. أزهارها خماسية الأجزاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ٢٩٥٨٦ - هاذة هانكة

*Ampelopsis heterophylla* (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنبته عارشة تطول من ٥ إلى ٦ أمتار. ساقها وفروعها جوفية الهواء. أوراقها هانكة لا قياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ إلى ٥، نصلها مائل الصفحة العليا، خلي السفل. بذورها إلى الزرقعة الزاهية. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ٢٩٥٧٦ - هابط، وأبط

*Descendant* (F). *Descending* (E).

هو نفيس الصاعد.

*Hétérophylle* (F).

#### ٢٩٥٧٧ - هانك

*Heterophyllous* (E).

نعت تعريفي يوصف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيباً وشكلاً وارتكازاً.

*Grenouille femelle* (F).

#### ٢٩٥٧٨ - هاجكة

*She-frog* (E).

الصفدة الانثى. ج هاجات. تصيرها هوية وهيبية.

*Méridien* (F). *Meridian* (E).

#### ٢٩٥٧٩ - هاجكة

الخط الرئيسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

٢٩٥٨٠ - هاجكة الهاجكة هي النخلة تحمل صنفرة.

*Ampelopsis* (S).

#### ٢٩٥٨١ - هاذ

عتر من الجلفة المزارع. هذه المعروفة ١٢ تتميز بمحولاتها البسيطة الحالية من الاطبايح المحمية وبمحاضن منيفس ازهارها القدسية الشكل. وأحدته هاذة. || أشهر انواعه التريبية ما يتبع.

*Ampelopsis orientalis* (S). هاذة شرقية

*Vigne vierge du Proche-Orient* (F).

نوع من الهاذ التريبي. هذه الشرق الاوسط. جنبته دغلية الشكل تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها ريشية. وريقاتها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. نصلها مائل البشرة على صفحته. أزهارها رباعية الأجزاء. أزهارها يستمر طول شهر آب.



هاذة كبيرة الورق

## ٢٩٥٨٧ - هَادَّةُ هَلَاهِيَّةِ الْوَرَقِ

*Ampelopsis aconitifolia* (S). *Vigne vierge à feuilles d'aconit* (F).

نوع من الهاذ الزينبي . جنبته عارشة تطول نحو ٥ الى ١٠ امتار. فروعهما دقيقة ، جذوية اللحاء في اول معدها . اوراقها اصبعية الشكل لاقباسية التفريغ الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكيم الذي يطول من ٥ الى ٨ سم. نصالحا ماله الصلصة ، عابقة الخضار ، مسننة الحافة . يزورها برتقالية اللون || انزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٢٩٥٩٥ - هَارِجَةُ الْمَاءِ \*

*Acrocephalus paludicola* (S). *Phragmite aquatique* (F). *Aquatic warbler* (E).

طائر من المرازج ، صغير القد طوله نحو ١٣ سم. ظهوره اغير اللون مجلج بالاسمر . بطنه الى البياض الخشن يعلو تسليج اكهب || يألف ضفاف الانهر والبحيرات ويحوي البلاد في طلب المصيف والمشي .



هازجة البطاح

*Ceil de l'éléphant* (E).

## ٢٩٥٩٦ - هَاصَّة

هي عين الفيل .

## ٢٩٥٩٧ - هَاضُوم ، هَضَام

*Digestif* (F).

*Digestive* (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحوّل الاطعمة وتجعلها قابلة للتشيل كالنصارات الهضامة ...

## ٢٩٥٩٨ - هَاف

هاف ورق الشجر : سقط .



هازجة القصب

## ٢٩٥٩٩ - هَاقِل \* ٥

*Alactaga* (S). *Alactaga* (F).

جنس حيوانات لكونة قانصة من فصيلة البربوعيات . انواعه عديدة موطنها الشرق العربي ومصر وايران والتركستان والبيت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم. وذنبه ٢٧ . رأسه صغير القد . عيناه كيرتان . اذناه مستطيلتان . طول جزمزاه الخلفية يبلغ اربعة اضعاف الامامية || قويه الى الصفرة الرملية يعلوها مواج اسهب . بطنه الى البياض . ذنبه صناعي اللون اما الحصلة لبقاع || يألف الاراضي الطينية . جحره فسحة رحية يجفها من عمق ٦٠ او ٧٠ سم. يخفي فيها بياته الشوي؛ مدخلها على طول مرجع اما جحرها نفق مستقيم معتدل الانحدار || قوته المواد النباتية على اختلاف أشكالها وانواعها || انثاء تحمل ثمانية اطباء وتضع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة .



هازجة الماء

## ٢٩٦٠٠ - هَال ، هَيْل ، هَيْلُورَا ، قَالْتَه ، شَوْشَمَة ، شَوْشَمِير

*Amomum* (S). *Cardamoms* (E).

جنس نباتات جذودية طيبة عطرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة الزنجبيليات . انواعه عديدة جميعا من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لوبية التركيب . سوقها منتصبة عادمة الفروع . اوراقها عذوية الانتساب متناقبة . انزهارها شتوية التجميع او عكوكلية . ثمارها جراء لثائية الاخضبة . بذورها تدعى بحال يستخرج منها ادهان عطرية طيارة كانت فيما مضى اشهر الطيوب المستعملة في التحنيط || لوب جداميرها وبذورها وادهانها هاضمة ومنبهة للقلب ولقوة الجنسية ، مفادة للشجنج ، طاردة للرياح ، سكنة للنفس ومدرّة للطمث .



هاقل

## ٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، قَالْتَه مُجَبَّحَة

*Amomum maximum* (S). *Cardamome allé de java* (F). *Java cardamoms* (E). *Java Cardamomen* (D). *Cardamomo di Giava* (I).

نوع من الهال التابل الشائع الاستعمال تكثر زراعته في بلاد جاوا . ساقه رفيعة ، اوراقه كبيرة القد ، بذوره جيدة الصنف وافرة الادهان العطرية الطيارة .

## ٢٩٥٨٨ - هَادَّةُ يَابَالِيَّة

*Ampelopsis japonica* (S). *Vigne vierge du Japon* (F).

نوع من الهاذ الزينبي . جنبته عارشة تطول نحو ٧ امتار . جلدها رافع السنن والاروم . اوراقها كبيرة القد ، لاقباسية التفريغ السكبي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ ، نصالحا عابق الخضار اللامع || انزهارها يستمر من ايار الى تموز .

## ٢٩٥٨٩ - هَارِب

*Déversoir* (F). *Overflow* (E).

النفرة المدة لتصريف الفائض من المياه .

## ٢٩٥٩٠ - هَارَبَا ، هَارَبِي

*Athérine* (F).

هو الحساس ، سمكة صغيرة القد مأكولة ، اطلبه .

## ٢٩٥٩١ - هَارِجَة

*Acrocephalus, Calamoherpe* (S). *Rousserolle* (F). *Sedge warbler* (E).

جنس طير من فصيلة اللعليات . انواعه المعروفة كثيرة احدى جميعها صغيرة القد تتميز بانجنحتها المستطيلة الذرية الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غرومية الشكل . مناقرها مستعرضة القاعدة ، مدببة للملاقط || تألف المنافع والضفاف والمقاصب والرياح . قوتها الحشرات والحوام اعصابها الياسيب والنعر والبومض || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢٩٥٩٢ - هَارِجَة الْبَطَاح \*

*Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris* (S). *Rousserolle verderolle, Verderolle* (F). *Marsh warbler* (E).

نوع من المرازج ، صغيرة القد تطول نحو ١٤ سم. ظهورها الى الطحلة اللونية المراج . بطنها الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألف الاماكن الرطبة والمخنة وضفاف الماء . تدن في الدغل وفي الشجيرات المثقولة . قوتها تراوح من ٤ الى ٥ بيضات ترخها بمناوبة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوما .

## ٢٩٥٩٣ - هَارِجَة السُّد

طائر من المرازج يدعى ام نوع ، اطلبها .

## ٢٩٥٩٤ - هَارِجَة الْقَصْب \* ، خَشَف

*Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdois* (S). *Rousserolle turdoise, Grive de rivière* (F). *Great reed warbler* (E).

طائر من المرازج . طوله يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم. ظهرها الى الصبغة الصفراء المراج . بطنها الى البياض الاشعث . زورها ابيض اغير . جرشها الى الكهبة المسنجة بالاسمر . تحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف المقاصب والالاجام . تدن عنها على القصب . تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .

الفصيلة الباذنجانية، ساق غليظة جؤوية اللون. ازهاره كبيرة القذ متراكبة اللون فيها الالوان الاصفر والبرتقالي والاحمر والازرق. بؤره ذبذبة القذ مستديرة الشكل سنطلية اللون تحفظ بقوى انباتها نحو عشر سنوات.

٢٩٦١١ - **هَالِيَات ، قَالِيَات** (E). Amomées  
سبط من فصيلة الزنجبيليات، اشهر اجناسه الهال .

٢٩٦١٢ - **هَالِيْزَة \* ، هَالِيْزِيَة ، تَحَل**  
Halesia (S). Halésie, Halésier (F). Silver bell-tree, Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Alesia (I).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الاسطركيات . انواعها ستة جميعها اشجار وشجيرات متوسطة القذ . ساقها منتصبه متقاربة الفروع . اوراقها عابله ، معتقة ، متعاقبة . نصلها بيضي الشكل مستن الحافة . ازهارها محورية الارتكاز ، غصية التجميع ، عديدة الاسدية ، مستطيلة الزناد . ثمارها جراء مجتمعة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٦١٣ - **هَالِيْزَة ثَنَالِيَّة الْجَنَاح**  
Halesia diptera (S). Halésie à 2 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية . ثمرتها تملو نحو ١٥ سم . اوراقها بيضيه الشكل تملو نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ١٠ سم . نصلها جامد اللون ، اخضر الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهارها بيضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٢ الى ٥ سم . ثمارها جراء ثنائية الجناح وشبهه الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم . || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٩٦١٤ - **هَالِيْزَة رَبَاعِيَّة الْجَنَاح**  
Halesia tetraptera (S). Halésie à 4 ailes (F).

نوع من الهاليزة التريبية ، ثمرتها تملو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها ايليبسية الشكل سنانية الزايم الاخير . نصلها جامد اللون الدقيق ، اخضر الصفحة العليا خلى السفلى . ازهارها متندلة ، ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون ، صغرة القذ . ثمارها جراء رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو من ٤ الى ٥ سم . || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

٢٩٦١٥ - **هَامَة** (F). Effraie commune  
هي البومة ، اطلها ج . هام وهامات . قال ذو الرمة :

قد أصفت النازح المجهول مصفه  
في ظل اخضر يدعو هامة هامة اليوم

٢٩٦١٦ - **هَامِرَة ، مِهْمَرَة** (F). Trayeuse mécanique  
عدة مجهزة باربع شفاطات تستخرج الحليب من ضرع البقرة وتقله الى رماء الحفظ احكم السد .

٢٩٦١٧ - **هَامِن** (F). Marcescent, Withering (E).

نمت تعريفي يطلق عل كل نبات او جزء من النبات يكون في حالة الهمن .

٢٩٦١٨ - **هَامِي** (F). Apical  
نمت تعريفي يوصف به كل عضو مركزة الذروة .

٢٩٦١٩ - **هَامِيلِيَا \*** (F). Hamelia (S). Hamélie (F).  
جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة ١٠ ، اصطناعها المناطق الاستوائية الامريكية . ساقها فروع . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصل . ازهارها

٢٩٦٢٠ - **هَال حَبَشِي \*** ، **قَالِيَة حَبَشِيَة**  
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar (F). Madagascar cardamoms (E). Madagascaren Cardamomen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).  
نوع من الهال الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشكر . اوراقه عصصية النصل الضيق . لبوب جذابه تابل مشهور . بطوره وافرة المواد الدهنية العطرية المتوسطة الصنف .

٢٩٦٢٣ - **هَال حَمَامَة \* ، حَمَامَة ، قَالِيَة عُنُقُوْدِيَّة ، اُمُون**

Amomum cardamomum (S). Amome cardamome (F). Cardamon (E). Cardamomen (D). Cardamone, Cardamomo, Amomo (I).  
ويعرف ايضا بالمال المنقودي . نوع من الهال الجيد الصنف . تكثر زراعته في الهند الصينية . ازهاره عنقودي التجميع . بطوره جيدة الصنف شائعة الاستعمال وافرة المواد الدهنية العطرية .

٢٩٦٢٤ - **هَال ذَكْر \* ، قَالِيَة ذَكْرِيَّة ، خَبِرُوا**  
Amomum melegueta (S). Méleguette, Méléguette, Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain of paradise (E). Malaguettapeffer (D). Grana paradisi, Semi di paradiso (I).

نوع من الهال ، تكثر زراعته في بعض مناطق افريقية الشرقية والوسطى . اوراقه مستطيلة النصل الضيق . بطوره متوسطة الصنف والمواد العطرية .

٢٩٦٢٥ - **هَال صَغِير ، قَالِيَة صَغِيرَة ، حَبْهَان**  
Eleteria cardamomum (S). Cardamome petit (F). Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).

نوع من الهال الجيد الصنف ، تكثر زراعته في سردينيا وبلبار . ساقه واوراقه صغرة القذ . ازهاره سنبل التجميع . بطوره وافرة المواد الدهنية العطرية الفاعلة الصنف .

٢٩٦٢٦ - **هَالَة** (F). Halo  
دائرة مضبة تحيط بالقمر سبها انكسار النور الذي يخترق بلورات الجليد المتصلة في اليوم العالية البعيدة . اما الدائرة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة .

٢٩٦٢٧ - **هَالُوْجَة ، قُرْنِيَة** (S). Halogeton (S). Halogète, Halogeton (F). Saltwort (E). Salzkraut (D). Alogeton (I).

جنس نباتات برية وزراعية من السرايات وفصيلة السرمقيات . انواعه ستة منها الاشباح والجنبايات . ساقها وفروعها زباه السحاء . اوراقها خلية متعاقبة . ازهارها فردية التجميع ، محورية الارتكاز جميلة الشكل || اشهر انواعها الهالوجية الزراعية المأكولة .

٢٩٦٢٨ - **هَالُوْك وَيْجِي** (F). Phélpée d'Egypte (F).  
هو الطرثوث المصري ، اطلبه .

٢٩٦٢٩ - **هَالُوْك شَرْقِي** (F). Cladestine du Levant  
هو الطرثوث الاحمر ، اطلبه .

٢٩٦٣٠ - **هَالُوْك لُصْبِي**

Orobancha caryophyllacea (S). Orobancha du gaillet (F). Clove scented broom-rape (E). Nelkenschmerz (D). Erba scalogna, Succiamelle garofanato (I).

نوع من الجعفل يتغفل على الفايون وعلى معظم نباتات



هال حَبَشِي



هال حَمَامَة



هال ذَكْر



هالِيْزَة



هَامِيلِيَا



- هبار القم  
S. obscurus (S).  
S. obscur (F).  
هبار بودن \*  
S. Budeng (S). S. maure, Budeng (F).  
هبار جرمان  
S. Germani (S). S. de Germain (F).  
هبار جوني  
S. Johni (S). S. des Nilagiris (F).  
هبار دني  
S. ursinus (S). S. ourson (F).  
هبار شاب  
S. senex (S). S. blanchâtre (F).  
هبار متوج  
S. mitratus (S). S. mitré (F).  
هبار ملافلوف  
S. melalophus (S). S. mélaploph (F).



هبار انتلوس

- ٢٩٦٢٥ - هَبَارَة \*  
Scolecotrichum (S).  
جنس فطور مجهرية من حمارة الزناخيات وفصيلة الطحنيات.  
جربه الكنديسة أسطوانية قصيرة تعلوها كتلتان صويغانية  
صفيفة اللباسك ثنائية الخلية || أنواع قليلة المسد  
والأذى اعرفها هبارة النجيليات .

- ٢٩٦٢٦ - هَبَارَة النجيليات \*  
Scolecotrichum graminis (S).  
فطر مجهرية يركب بعض النجيليات البرية والكلالية  
فيشوا الاوراق دون ان يذها || مظهره الخاضعي بقع  
صغيرة تركب نصل المصف ثم تنبع وتنتد فيبلغ طوله  
نحو ٣٠ سم. تبدو شقراء اللون او سمره ثم يمتد بياض يبيض  
ستاره .



هبار بودن

- ٢٩٦٢٧ - هَبَارِيَّات ، رَحِيصَات  
Semnophthecidae (S). Semnophthécidés (F).  
Semnophthecidae (E).  
فصيلة قرد من سفليات المنخرين تشمل أربعة اجناس :

- ٢٩٦٢٨ - هَبَاش \*  
Homola (S).  
Homola (F). Homola (E).  
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل  
قصيرات الذيل وفصيلة الهَبَاشيات . انواع المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها شبه مجنبة الشكل ،  
تطول من ٤ الى ٨ سم. قوائمها مستطيلة ، قليلة الغلاظ  
باستثناء الزوج الاول للمقطي الاطراف ، الكبير التسنين  
الشائك والزوج الاخير الذي يتمركز في كفتي الظهر  
والذي يتميز بالصغر واللقه والبراء الاطراف . اولها دائما  
حمراء اللون يعلوها موج يراوح من العنابي الى الجولي ||  
لحمها ما كولة .



هَبَاش

- ٢٩٦٢٩ - هَبَاشِيَّات  
Homolidae (S).  
Homolidés (F). Homolidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل  
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القد  
الذي يراوح من ٤ الى ٨ سم. تتميز بصغر وقعر الزوج  
الاخير من القوائم الذي يتمركز في كفتي الظهر || اشهر  
اجناسها واعما انتشارا الهَبَاش .



هبال

- ٢٩٦٣٠ - هَبَال \* ، وسنعي ، مَرْمُوزَة \*  
Hapale (S). Oulisti, Marmoset (F). Marmoset, Oulisti (E).  
جنس قرد امريكية من فصيلة القرد الدبية . انواع ٧  
موطنها حوض الامازون والبلاد المجاورة || اجسامها  
صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم

كبيرة القد ، جميلة الشكل ، سفلية التجميع ، تاجية  
الارتكاز . ثمارها نووية غير ما كولة || اشهر انواعها  
المغالبية الزياء الورق ويسمونها قاتلة الجردان . ازهارها  
حمراء اللون ، ثمارها جميلة المادة تقضي على الجردان .

- ٢٩٦٢٠ - هَبَار ، رَحِيص ، قَرْد مَقْدَس  
Semnophthecus (S). Semnophthèque (F). Solemn  
apes, Simpai (E).  
جنس قرد من فصيلة الهباريات تدعى القرد المقدسة  
لان الهند لا يسمونها وقد يجلونها || انواع كثيرة العدد .  
اجسامها رفيقة ، نحلة ، متوسطة القد . اذنانها مستطيلة .  
اولاها ناعمة الشعر . جباهها مكلفة يختار من الهلب الاسود .  
موطنها الهند وجوارها . اقلها يمتد من الشط الى ارتفاع  
٤٠٠٠ م. || تعيش على الاشجار . قوتها المواد النباتية  
من الثار والبرور والجولور الى البراعم والنواهي || اناتها  
تقع من جرور الى جرورين || اشهر انواعها ما يتبع .

- ٢٩٦٢١ - هَبَار اَنْتِلُوس \* ، قَرْد الهند المقدس  
Semnophthecus entellus (S). Semnophthèque en-  
telle, Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman,  
Houneman, Mandi, Mabus (F). Hanuman, Hoonu-  
man, Entellus (E).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٦٥ سم. وذنبه ٩٦ سم.  
ثوبه اغيس اللون ، مستطيل الشعر . وجهه اسود البشرة .  
خثار جهته اسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند  
حتى حدود الهند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .  
يفضل النباتات والاشجار الظليلة على مجاري الماء .  
يقترب من المساكن والبيوت الآهلة || قوته الثار والحبوب  
ياخذها اينما كانت .

- ٢٩٦٢٢ - هَبَار حَمَلَا  
Semnophthecus schistaceus (S). Semnophthèque de  
l'Himalaya, S. ardoisé (F).

نوع من الهبار . جسمه بطول نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الرديدة .  
شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو موج جولي .  
وجهه اسود البشرة . خثار جهته اسود الهلب المنتصب .  
اذناه صغيرتان . ذنبه بطول نحو ١٠٠ سم. ويتهني بتغلة  
جلطة . موطنه حلايا وبلاد الكشمير . اقليمه يمتد من  
ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٣٦٠٠ م.

- ٢٩٦٢٣ - هَبَار دُولُ ، هَبَار نِينَس ، دُولُ  
Semnophthecus nemaeus (S). Semnophthèque douc,  
Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٠ سم ، ثوبه متباين  
الالوان . رأسه واظراف يديه ورجليه سود . وجهه اصفر .  
عنقه وساعده وفخذه الى الجؤرة . ذقنه وصدره وذنبه يبيض .  
بلته اغبر . ظهره الى الرديدة || موطنه غابات الكوشنشين  
جماعات كثيرة العدد ، مؤذية ، تلت كل زراعة  
تصل اليها .

- ٢٩٦٢٤ - هَبَار قَيْرِي  
Semnophthecus phayrei (S). Semnophthèque de  
Phayre (F).

نوع من الهبار ، جسمه بطول نحو ٥٨ سم . ثوبه رمادي  
اللون ، عايق الظهر . رأسه عربي الشعر الاسمر . بقله  
ويوطن يديه ورجليه الى البياض الاخير . كفاء الى  
القضة . ذنبه ابيض اللون ، اسمر الطرف . بطول نحو ٧٦  
سم || يألف النباتات الكثيفة الاشجار واجام الخيزران .  
قوته الثار والحبوب والبرور والجولور .  
ين انواع الهبار المعروفة نفس بالذكر :

يلوهو تبيعج تبنى وزركشة كستنية ورقشة حلاهل. روشنها الخلفيات الى الخطي الاطحل. حناها اكلت. اهداها الى الشقة ا لها جبل واحد في الحول. تظهر القرفشة الى ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتبع المكان لطحا لا تاتاله الحجر على الصفحات السفلى من نصال الارواق الى السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٧ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطال المقدم، مستدق المؤخر. ثوبها الى الطحلة السمره يعلوها تجنيز معترض اخضر اللون يمتد على الجانبين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديد السمرة وبديها ورجلها الى طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ ايوما ينقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجنالة او تحت الارواق الساقطة.

Hopliopteron (S). **هَبْرَس** - ٢٩٦٤١

Hopliopteron (F). Hopliopteron (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات بمديات الارجل وفصيلة الاوليبات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار الصين ا اصداها صغيرة لناعمة، مردنية الشكل، مخزنة، مجنعة القلوب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). **هَبَس** - ٢٩٦٤٢  
Matthiola maritime (F).

نوع من المنتور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منته تها حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان ا ساقه مستقيمة قزواء تملو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متعاقبة، سنائية النصال الضيقة الزياء. ازهاره عقودية التجميع، طرفي الارتكاز. ازهاره ذكية العرف عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر ا تنويره يستمر من اذار الى تموز

Hypsipetes (S). **هَبْسِيَت** - ٢٩٦٤٣  
Hypsipète (F). Hypsipetes (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكتيبات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندفسكر. ملجئها الحيائي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. تألف الغابات وشفاف بجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والهوام ا اجسامها صغيرة قربية الشبه بالبالبل. اطولها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الحجم. مناقيرها مخزنية ذرية. اجنتها ذلقة. اذناها مستطيلة، فارقة الاطراف. اولها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم الاصع والكسني الاشعث والرمادي الازرق المواج ... تدن اشعاشا في الاشجار الرقيقة القريبة من مجاري الماء. اناتها تحفن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول. الذكر متناب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). **هَبَج** - ٢٩٦٤٤  
هو الحار الاسود.

Strelitzia (S). Stréltzie (F). **هَبَل** - ٢٩٦٤٥  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعه المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سوقها ليغية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة القد، ثنائية التصفيف، متعاقبة النصال. ازهارها خشوية. زرر للزئين ا اشهر انواعه ماي.

الثير. رؤوسها مستديرة. اذناها مرودية الور. اذناها مستطيلة جللة ا جميعها شاجرة تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها الثار والحشرات. اخلاها هنية، رضية. تألف حياة الدين وتتملق باصحابها.

٢٩٦٣١ - **هَبَال**  
شجر تملل نة السهام. الواحدة هالة.

٢٩٦٣٢ - **هَبَايَة** (E). Dry peels (F). Ecorces sèches (F).  
هباية الشجر: قشرها الناشف.

٢٩٦٣٣ - **هَبِيَة** (E). Legacy, Bequest (F). Legs (F).  
هو كل موهوب في وصية مكتوبة.

٢٩٦٣٤ - **هَبَج** (F). Broussin (F).  
ورم يمتري لحاء سوق واغصان وافناد الشجر، سببه الصعيق او بعض الجراثيم.

٢٩٦٣٥ - **هَبْدَة، هَبِيدَة** (F). Graines de coloquinte (F). Seeds of the colocynth (E).  
هو حب الحنظل الواحدة هبيدة.

٢٩٦٣٦ - **هَبُر** (F). Filasse (F).  
هو المشاقه، اطلياها.

٢٩٦٣٧ - **هَبَر** (S). Diacope rivulata (S).  
سمكة من الشطف وفصيلة الفرشيات. جسمها كبير القد مبطل الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرقه البنفسجية الموالج. لحمها مستحب الطعم مرغوب فيه. اعطائها فسيحة الاجزاء تمتد من البحر الاخر الى بحار استراليه.

٢٩٦٣٨ - **هَبَرِيَة** (S). Haberlea (S). Haberlée (F). Haberlea (E).

عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجسنريات. منتهيا يمتد من الشرق الادنى الى البلقان. ترشب في المواقع الصخرية. ساقها جذعة. فمرعها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اهلالية مقنطرة. نصالها جلدية مسننة الختار. ازهارها ليلية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية ا تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٩٦٣٩ - **هَبَرُوِيَة** (F). Habrosia (S). Habrosie (F).  
جنس نباتات عشبية حولية برة من فصيلة النونيات. اولها المعروفة قليلة العدد منتهيا بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط ا سوقها تحلة قزواء. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه مخروطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها رديي.

٢٩٦٤٠ - **هَبَرُوِيَن أُسْبَد** - ٢٩٦٤٠

Habrosyne derasa (S). Habrosyne rasé (F). Habrosyne derasa (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات وربة حشرغيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروب. فراشها جارة قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على اوراق الموصج ا جسمها وشي الشكل يطول نحو ١٢ سم. بسطتها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كيرتان. زباناها مرشفها مستطيل ملتف. جوشها وبعطها الى الحنطي الاسمر ا روشنها الامانيان الى الحنطي الاسمر



هبرية



ميوزين أسبد



هيب



هبل



هبلر



هبتق



هينس

وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات وناح  
وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || أجسامها صفراء ، شبه  
بيضية الشكل ، مدبة المؤخر ، تطول من ٢ الى ٥ سم .  
رؤوسها صفراء ، مستعرضة . عيونها ناشرة . قرونها  
الاستثمارية غليظة مركبة من عشر فصل . كواسلها  
محدبة ، مستعرضة . اغدادها لافحة ، نحيلة التخديد .  
قوائمها نشطة || جميعها مفترسة وعضائية . تعيش بين  
النباتات المائية قرب الشطوط وعلى الصفات في فصل  
الصيف || أشهر اجناسها الهبلر .

٢٩٦٥٣ - هَيْبَنَارِيَّة (F). Habenaria (S).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحليات . انواعه  
نحو ٤٠٠ معظما أمريكي المنبت . اقاليمها المناطق الحارة  
والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . اشهرها الهبنارية الثنائية  
النصل .

٢٩٦٥٤ - هَيْبَنَارِيَّة ثَنَائِيَّة النصل ، وَكَوَأُوْدِي  
أَيْبَنَس  
Habenaria bifolia (S).  
Habenaria bifolia, Orchis blanc (F). Butterfly  
orchis, Fringed orchis (E). Kleine Stendelwurz  
(D). Orchide bianca (I).  
نبات عشبي زينة ممر . جذوره درنية سترابية الشكل .  
اوراقه قرصية مقلية ثنائية النصل . ازهاره جميلة الشكل ،  
بيضاء اللون ، سنطيلة التجميع ، ترتكز على ستراخ قرصي  
الانتشاب .

٢٩٦٥٥ - هَيْبَنَس \*  
Hypnum (S).  
Hypne (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).  
جنس نباتات طحلبية من الصرخيات . انواعه المعروفة  
نحو ٢٠٠ ، سوفها نحيلة مدادة متفرعة . اوراقها دقيقة  
متراسة متناوبة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش  
وتتمتع في التراب وعلى الصخور وولوج الانحجار .  
تتمتع للترتين وتتمتع خاصة في صر الآلية الخزفية  
والبلورية لوقايتها من الكسر .

٢٩٦٥٦ - هَيْبَنَس \*  
Hipponyx (S).  
Hipponyx (F). Hipponyx (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدليات الارجل  
اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة الهينيسيات .  
انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق المحيط  
الحادي . بعضها يعيش على الاصافد المجهرية والبعض  
الآخر على الصخور || اصداها مخروطية وحيدة المصاريع  
قرنية الشبه بالقرن القصير المدب الطرف . اجسامها  
بيضية الشكل . رؤوسها مكورة . لواسها مخروطية .  
عيونها كبيرة ترتكز على قواعد اللواس . غياشيمها نظامية .  
ارجلها وحيدة كبيرة محمية .

٢٩٦٥٧ - هَيْبَنَسِيَّات \*  
Hipponycidae (S).  
Hipponycidae (F). Hipponycidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدليات الارجل  
اماميات الخياشيم وحيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها  
الماصرة المعروفة قليلة المدد . اعطائها بعض بحار البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشطوط || اصداها  
قرنية الشبه بالخافر وبالقرن القصير . سقاط الصدقة  
يتطور مع العمر فيصبح كالنفوسه || اعرف اجناسها  
واشهرها الهينيس والمرولة .

٢٩٦٦٦ - هَيْبَلِ الْمَلَكَةِ  
Strelitzia reginae (S).  
Strelitzia de la reine (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم .  
اوراقه سنطيلة الاعتناق . نصلها جامد الصلصة التسمية  
الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . ازهاره كبيرة  
القد ، ذمية الفصل ، سنطيرية النبات .

٢٩٦٦٧ - هَيْبَلِ صَغِيرِ الْوَرَق  
Strelitzia parvifolia (S).  
Strelitzia aux petites  
feuilles (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول نحو ١٢٠ سم . اوراقه اسلية  
الشكل ، عادمة النق ، عاقبة الخضار . ازهاره متوسطة  
القد ، ارجوانية الفصل ، بنسجية النبات .

٢٩٦٦٨ - هَيْبَلِ قَبْصَرِيَّ  
Strelitzia augusta (S).  
Strelitzia augusta (F).

نوع من الهبلل الزينة ، يطول من ٣ الى ٦ امتار اوراقه  
كبيرة القد معتقة . اعتناقها تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .  
ونصلها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وهي اهليلجية الشكل ،  
قلبية القاعدة ، شديدة الخضار العابق . ازهاره كبيرة  
القد ، بيضاء اللون .

٢٩٦٦٩ - هَيْبَلِ  
Lévrier (F). Greyhound (E).  
هو الكلب السلوي او السلاقي ، مستطيل الجسم الدقيق  
الاهيف . يتميز بخفته وبسرعة عوده . يستعمل في صيد  
الزئال .

٢٩٦٥٠ - هَيْبَلِد \*  
Hapaloderma (S).  
Hapaloderma (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من المستطقات وفصيلة الطرغويات  
موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يألف الغابات الرطبة .  
ملجته الحياتي زويي . قوته الحشرات على اختلاف انواعها  
وبعض الثار العنينة || جسمه متوسط القد ، يطول نحو  
٣٢ سم . ثوبه الى الخضار الذهبي المواج . زوره وردي  
اللون . بطه الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكبر ذنبه  
الذي يشبه المروحة . جناحاه معتدلا الطول ، ذلقا  
الاطراف || يدئن عشه في صدور الانجار الهربة . الاثنى  
تحفن نحو اربع بيضات على ثلاث مرات في الحول .  
الذكر ينح لها الغذاء .

٢٩٦٥١ - هَيْبَلِيد  
Halilpus (S).  
Halilpus (F). Halilpus (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة الهليلديات ورتبة  
غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في  
معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || اجسامها  
صفراء ، شبه اهليلجية الشكل ، مدبة المؤخر ، تطول  
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صفراء ، مستعرضة . عيونها  
ناشرة . قرونها الاستثمارية غليظة . تأشيرها وكوكها  
لافحة ، شبه مجنبة الشكل ، نحيلة التخديد . قوائمها  
نشطة . اثارها مبقجة || تألف المناطق والبحيرات التي  
تكثر فيها الاغشاب المائية . قوتها كل ما تستطع قصه  
من دويبات .

٢٩٦٥٢ - هَيْبَلِيد \*  
Haliplidae (S).  
Haliplidae (F). Haliplidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . اجناسها

الى الخنطى تملوه زغبة صفراء اللون ذهبية المواج . تعيش في البيوت والمكاتب بين المصاحف والكتب القديمة .

٢٩٦٦٨ - **هَبُونٌ مُخْتَلِسٌ** \*  
Ptnus fur (S).  
Ptnine voleur (F). Spider beetle (E). Gemeiner Diebskäfer, Kräuterdieb (D).

حشرة من الهبونات . طولها نحو ٣ م . ثوبها الى الخنطى . يملوها في اواسط غدها تجذع اسمر قائم || تعيش على افناد وافنان الانجار اليابسة .

٢٩٦٦٩ - **هَبُونٌ مُلَطِّخٌ** \*  
Ptnus rufipes (S).  
Ptnine maculé (F). Ptnus rufipes (E).

حشرة قاذفة ناهمة من فصيلة الهبونات ورتبة مفندات الاجنحة . تألف الحراج والاذغال والحدائق . خنافسها تعيش على ما تقضمه من لحاء افنان النبات السائر نحو الياس . يرقاتها تسردب الحماه والشكير || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ م . ثوبها الى الخنطى الاشعث الاسمر المواج يملوه في الظهوران بقبختان صغيرتان معترستان . رأسها صغير الجرم يفور بمغمله تحت الكوسل . عيناها صغيرتان بارتقان . زباناها خيطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف الاصح . غدها كثيفتا الخمل ، متباعتا التحزير القاطب . ارساغها خاسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في النهار . تستافد بعد ظهورها بشهر واحد . تمتع الممكن على لحاء الافناد والافنان || البرقة عند بلوغها الكمال الجسوري تطول نحو ٧ م . جسمها مقوس الشكل متتابع الحيد والتجعيد ، سداسي الراجب ، بحطلي اللون ، اسود الرأس . مستدير المؤخر كثيف الملب والزغب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في آخر سرداب احفرته البرقة .

٢٩٦٧٠ - **هَبُونِيَّاتٌ** \*  
Ptnidae (S).  
Ptnidés (F). Ptnidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد زبا الجسم . اطوالها تراوح من ٢ الى ٥ م . قرونها الاستشعارية خيطية الشكل ، عشارية العقل . ارساغها خاسية || يرقاتها نحيلة دقيقة تركيب الخشب الاخضر واليابس وتعيش تحت الحماه وبين الاوراق وعلى المواد العضوية وفي المساكن .

٢٩٦٧١ - **هَبُونِيَّاتٌ** \*  
Aspergillaceae (S).  
Aspergillacées (F). Aspergillaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الوسيات . جراثيم التي مستدير التركيب ، إنفلاقي النظام . انقائها كروية او اجاسمية الشكل تحوي من التكتين الى الثان تكات منها فردية الخلية ومنها ثنائيتها || اجناسها وانواعها عديدة بعضها حاد ضار وبعضها صناعي كهوية الاراز (Aspergillus oryzae) وبعضها صحي ويطي يعود الى جنس البنيسيلوم .

٢٩٦٧٢ - **هَيَّالُ الْجَنْجُلِ** \*  
Hephalus humuli (S). Hépiale du houblon (F).  
Ghost moth, Otter moth (E). Hopfenspinner (D).

وتدعى ليلية الجنبيل . حشرة من الهبياليات ، كبيرة القد ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ م . رواشن ذكورها الى البياض الفضي يحرقها اطار من الهدب جوي اللون . رواشن اناتها الى الصفرة يملوها مواج احمر وزرقة سمراء . تسرح

٢٩٦٥٨ - **هَيَّوَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ** \*

Aspergillus flavus, A. sulfureus (S).  
فطر مجهرى من عمارة الهبويات يركب حب الذهب وبزور القنب عند انشائها في الاراضي الرطبة فيعطها وقد يسيء الى نموها وانتاجها .

٢٩٦٥٩ - **هَيَّوَّةٌ سَوْدَاءٌ** \*

Sterigmatocystis nigra (S). Smut (E).  
فطر مجهرى من عمارة الهبويات يسبب الدفن الاسود الزخو في بعض البهار ومنها الثين والبرتقال والليمون . يسمنوه في الولايات المتحدة (كليفورنيه) مرض السموت (Smut).

٢٩٦٦٠ - **هَيَّوَّةٌ طَحْلَاءٌ** \*

Aspergillus glaucus, A. ochraceus (S).  
فطر من الهبويات يصيب ثمار البرتقال والفراسكين والليمون.

٢٩٦٦١ - **هَيَّوَرٌ** \*

المهور هو اصفر اللذر . وهو عصابة الزرع الذي يؤكل .

٢٩٦٦٢ - **هَيَّوَرٌ** \*  
Zodarius (S).  
Zodariion (F). Zodarius (E).

نوع من العناكب القانصة الساعية رباعيات الروايا والشافق ينتمي الى فصيلة الهبوريات || جسمه صغير القد يطول نحو ٧ م . عند التكب ونحو ١٢ م . عند التكنية . صدراسه صغير الجرم ، فصي اللون . عيناها زخمتان . شيفاه صغيران ذربان . فكاه مستطيلان مستعقلان . جرامزه مستدة الاطراف ، كثيرة الملب . بطنها كبير الجرم اسود اللون تملوه اربع لعلج بيض وتقط سود || سرعه دجوي . يبيت في النهار تحت منة قنوسية الشكل ينسجها بين الحجازة || يسمى وراه قصه ركفا . قوته الحشرات الصغيرة والذباب والموام || يعتبر من الدويبات النافعة اللاؤمية .

٢٩٦٦٣ - **هَيَّوَرِيَّاتٌ** \*  
Zodariidae (S).  
Zodariidés (F). Zodariidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الزيلولات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمتحدة الحرارة من العالم القديم || جميعها مفترسة قانصة صغيرة القد او متوسطة ، مستدة الجرامز المستعدة الاطراف . اشواها قائمة تراوح من السمرة الى السواد الفضي . شمها متينة الحلب تنسجها في كل مكان تألفه || اشهر انواعها المهور .

٢٩٦٦٤ - **هَيَّوَرٌ** \*  
Dévaluation (F). Devaluation (E).  
الهيوط اسقاط قيمة النقد .

٢٩٦٦٥ - **هَيَّوَرٌ** \*  
Décrue (F). Fall of water (E).  
انخفاض مستوى المياه الجارية وقد هذا الانخفاض .

٢٩٦٦٦ - **هَيَّوَنٌ أَحَدَبٌ** \*  
Gibbium psylloides (S).

حشرة من الهبونات . طولها نحو ٣ م . جسمها محدوب الشكل . ثوبها اسمر اللون ، عسل المواج . قواجمها بقرونها الاستشعارية مستطيلة . تعيش في البيوت والمخازن . قوتها المواد العضوية الجافة من اي نوع كانت .

٢٩٦٦٧ - **هَبُونٌ الْمَصْحَافِ** \*  
Niptus hololeucus (S).

حشرة من الهبونات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . ثوبها



هَبُون



هَبُون احذب



هَبُون المصاحف



هَبُون مختلس



هَبُون ملطخ



هَيَّالُ الْجَنْجُلِ

## Hétérophyllie (F).

٢٩٦٨٠ - هَتَاكَه

حالة النبات الهاتك .



هَيْالُ الْحَذَائِقِ

## Particule (F). Particle (E).

٢٩٦٨١ - هُتَامَة

الجزء الأصغر من الشيء ويُدعى جزيئاً . وهي في علم الفيزياء كل جزء من الأجزاء الثلاثة (الكثرون ، بروتون ، نوترون) التي يتألف منها الذرة .



هَيْالُ الْغَابِ

## Hetrodes (S).

٢٩٦٨٢ - هِتْرُودَة

## Hétrode (F). Hetrodes (E).

جنس حشرات قفازة خاضعة من فصيلة الجراديات . أنواعها المعروفة عديدة أعطائها معظم مناطق أفريقية الحارة والاستوائية . جميعها عديمة الأجنحة عند الشقين || أجسامها مستوية القد تطول من ٣ إلى ٥ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها مركبة ناشرة . قرونها الاستشعارية دقيقة مستطيلة . كواسلها مطوقة بثغوريات قفصية ويعلموها حلب شائك يلحف كامل القصبة العليا . بطونها شبه بيضية الشكل مقطوعة القاعدة يعلموها من ٥ إلى ٧ خطوط متعرجة من الحلب الشائك . أوتارها تراوح من الأخضر إلى الأصفر والأزرق وبعضها منقطة بالجلوي أو بالأحمر قوائمها الخلفية مستطيلة ، مجنونة للقفز || أجيالها الحولية ثلاثة . انتشارها محصور لأن النمل يقضي على مكها ودبابها .



هَيْالُ التَّجِيلِيَّاتِ

## Hetaerius (S).

٢٩٦٨٣ - هِتْرُوسُ

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الهستيرييات . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد بيضية الشكل طولها نحو ٢ سم . أوتارها إلى الصلبة السفلى المواجه . تعيش تحت الحجارة ويحتم لها الانجرار اليابسة || رقاتها قانصة تلتهم النمل وسائر الحشرات الصغيرة .



هَيْبَة

## Heteroceridae (S).

٢٩٦٨٤ - هِتْرُوسِيَّات

## Hétérocérider (F). Heteroceridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الأجنحة . أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم || أجسامها صغيرة تطول من ٤ إلى ٧ سم . رؤوسها كبيرة . عيونها بارزة . ملابسةا الفككية ضليمة . قرونها الاستشعارية لاقينية الشكل وعدد الفصائل الذي يراوح من ٨ إلى ١١ . كواسلها مستعرضة ، محببة . أعقادها لاحقة . قوائمها جاسة ، شائكة الظنايب . أرسافها رباعية النقل . أوتارها ملونة || ملجها الحياتي جماعي . تعيش في اتفاق تحلدها على صفات مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المنحلة وبعض الديدان || أشهر أجناسها الهتروسير .



هِتْرُوسُ

## Hétéroside (F).

٢٩٦٨٥ - هِتْرُوسِيد

واحد من قسي الفلوكوزيد والثاني يدعى هلوبسي .

## Heterocerus (S).

٢٩٦٨٦ - هِتْرُوسِير

## Hétérocère (F). Heterocerus (E).

جنس حشرات من فصيلة الهتروسيريات ورتبة غديات الأجنحة . أنواعها المعروفة نحو ٧٥ منتشرة في جميع مناطق أصقاع العالم || أجسامها صغيرة ، معتدلة الأحدياب ، تطول من ٤ إلى ٧ سم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة القفن . عيونها صغيرة ، بارزة . ملابسةا الفككية ضليمة . قرونها الاستشعارية لاقينية الشكل وعدد الفصائل . كواسلها شبه مكورة . أعقادها لاحقة . قوائمها نشطة ، شائكة الظنايب . أوتارها ملونة ومزخرفة || جميعها جاسة تعيش في اتفاق



هِتْرُوسِير

من حزيران إلى أواخر تموز || رقاتها غبراء اللون منقطعة بالأصفر . تركيب جلود الجنبيل وتعيش عليها وتركب المصنف فتؤذيها .

٢٩٦٧٣ - هَيْيَالُ الْحَدَائِقِ \*

## Hepialus hecta (S).

حشرة من الهيباليات ، صغيرة القد ، ثوبها إلى الصفرة المخيطية . رواشها الأمامية مزركشة ومنقطعة بالأبيض والأصفر . بطونها عادية التسنين . ظنوب ذكورها شبه الشكل يحمل على صفحته الداخلية غدة عطرية المادة . تسرح من أيار إلى تموز || رقاتها ناهمة تركيب جلود مختلف النباتات الحذائقة من الجنبات إلى الأشجار .

٢٩٦٧٤ - هَيْيَالُ الْغَابِ \*

## Hepialus sylvinus (S).

حشرة من الهيباليات ، صغيرة القد ، ثوبها إلى الصفرة الموشمة بالكهبة . زباناها ظاهرة التسنين . تسرح من آب إلى أيلول . رقاتها ناهمة تركيب جلود مختلف النباتات الحرجية .

٢٩٦٧٥ - هَيْيَالُ التَّجِيلِيَّاتِ \*

## Hepialus lupulinus (S). Hépiale des graminées (F).

حشرة من الهيباليات ، صغيرة القد ، ثوبها إلى الأخضر المصفر المواجه . رواشها الأمامية مزركشة بالأبيض . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، بسطة التركيب ، عادية التسنين . سرسحها يستمر من أيار إلى حزيران || رقاتها ناهمة تركيب اسنخ التبع وجنود التجيليات الزراعية والبرية تنقصها وتؤذيها .

## Hepialidae (S).

٢٩٦٧٦ - هَيْيَالِيَّات \*

## Hépalidés (F). Swifts, Swit moths (E). Wurzelbohner (D).

فصيلة حشرات من حشرغيات الأجنحة . أنواعها المعروفة زهاء ٣٠٠ تنتمي إلى عدة أجناس . أجسامها لاقينية القد ، كثيفة الخرافش التي يتخللها بعض الحلب . رواشها كبيرة . تأشبرها وقرونها الاستشعارية قصيرة . سرسحها دجوي . ذكورها وأنثاهما مختلفتان الألوان || رقاتها ناعية تحلل الجلود وتعيش في داخلها . أجيالها ثنائية الحول . أعطائها العالم أعصها المناطق الحارة .

## ٢٩٦٧٧ - هَيْيِد

حب الخنظل يستخرج من حذجه .

## Micropogon (S).

٢٩٦٧٨ - هَيْيَصَة \*

## Micropogon (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة البهاريات . سرسحها البحر الأبيض المتوسط . لا تقترب من الشواطئ والسطوط إلا في زمن الترسة || جسمها اهليلجي الشكل ، كبير القد ، رفيع المقدم . رأسها شبه مخروطي ، منفرج الشدق . عينها صغيرتان جاحظتان . زعانفها الظهرية اثنتان ، الأولى شبه هريبة الشكل والثانية مشطية . الذيلية مقطوعة الطرف . حراشفا مبراشية . ثوبها إلى الرعدة الفضية يعقب في الظهر ويعلمو تجلج معترض اسمر || لحمها جيد الصنت مرغوب فيه .

## Feuillée, Ebroutage (F).

٢٩٦٧٩ - هَتَّ ، وَرَقِي

## Bower (E).

قطف ورق الشجر وهو أيضاً المشق أي فصل الورق عن السالج وهذا يكون في ورق التوت قبل تقدمه إلى دود القز .

Hétéroplode (F).  
Heteroploid (E).

Anthrozoïdes (F).  
Antherozoïdes (E).

Rainette (F).

Cercopithecus (S).

Cercopithèque (F). Tailed apes, Lasiohyga (E).

جنس قرود ذيلية من فصيلة الهجربيات . أنواعه المعروفة ٤٤ ، موطنها اسراج وغابات القارة الأفريقية . جميعها صغيرة القد ، رشيقة القوام ، مستطيلة الأذنان ، قصيرة الأيدي ، وسية الأضواء . اثناها زاهية الألوان يكثر فيها التوشيح . تعيش على الأشجار ، قوتها الثمار والحبوب والجنود . جماعاتها متوسطة العدد . أثنائها تقنع جرواً واحداً تضع نحو ٦ شهر || أعراف أنواعه وأشهرها :

٢٩٦٩٦ - هِجْرَسُ أَحْمَرُ \*  
Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithèque patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات أفريقية الشمالية . ظهره وإبطاه وبخذه وساعده وذنبه إلى الصبغة الجوزية . بطنه وبواطن قوائمها إلى البياض الأملح . وبجبهه وأذناه سود .

٢٩٦٩٧ - هِجْرَسُ أَخْضَرُ \*  
Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithèque callitriche, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه إلى الخضار الزيتوني . بطنه إلى البياض الاصفر . وبجبهه أسود اللون ، حمار جبته أبيض . ذنبه أصفر الملب .

٢٩٦٩٨ - هِجْرَسُ أَخْضَرُ  
Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithèque vert, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه أفريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه إلى الخضار الأصفر يطولو موج اصفر . بطنه وحمار وجهه إلى البياض الاصفر .

٢٩٦٩٩ - هِجْرَسُ أَسْبَلُ ، أَبُو شَتَب  
Cercopithecus cephus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الغابون والكنغو . ثوبه إلى الصبغة ، رأسه زيتوني اللون ، وبجبهه إلى الزرقعة السوداء ، حماره أبيض . كفه أسود . ذنبه أربد اللون ، اسمر الملب والطرف || أخلاقه رضية هتية . وهو سريع الالتباس والتمسك .

٢٩٧٠٠ - هِجْرَسُ الْبَحِيرَات  
Cercopithecus brazzae (S). Cercopithèque de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو . جسمه رشيق القوام يطول نحو ٧٠ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه إلى الصبغة . حمار وجهه تاجي الشكل سناني المقدم ، أسنخ المتوسر . يداه وبرجلاه سود . طرف فخذها الخارجي أبيض اللون . يياضه يمتد من حدود الساق إلى الجاعرة . ذنبه أسود لامع .

تخلدها على ضفاف مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المنحلة والديدان وكل ما تستطيع قصه .

٢٩٦٩٧ - هَتَلَى \*  
Abolboda (F).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية تزيينية . أنواعها المعروفة قليلة ، منها مناطق البلاد الحارة . أوراقها أسلية الشكل ، جذعية الانتصاب . أزهارها شراخي ينتهي بزهرة خشوية ، ثلاثية التويجات وثلاث . مبيضا ثلاثي المسكن . عديد البويضات . بتلات أزهارها بياض اللون أو وردية .

٢٩٦٩٨ - هُتُولِيَّة  
Hottonia (S). Hottonie (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة الربيقيات . أنواعها قليلة . أوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعتناق تومع على صبغة الماء . أزهارها عنقودي التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها خاسية التركيب || أشهر أنواعها وأعمها زراعة المختوية المتعمية .

٢٩٦٩٩ - هُتُولِيَّةُ مَتَقِيَّةُ \*  
Hottonia palustris (S). Hottonie des marais, Mille-feuilles aquatique, Plumeau, Girofée d'eau (F). Featherfol, Water gillflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من المختوية . يكثر ويوجد في المنابع والمياه الراكدة . تزور في أحواض الماء لثزين . أزهارها حيلة الشكل . بتلاتها حر الصبغة صفر القاعدة .

٢٩٦٩٠ - هُتُولِيَّةُ  
Houttuynia (S). Houttuynie (F).

جنس نباتات طبية جذمورية زخافة من فصيلة السرويات . معقدة التعريف على اسم العلامة الدائمكي هوتون . أنواعها المعروفة قليلة ، منها بعض أصناف آسية الشرقية ، تعيش على ضفاف مجاري الماء . سوقها تحيلة حولية تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها معتقة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل . مذيب المقصعة ، بارز المروق ، حارشي الصبغة السفل . أزهارها سنيلي التجميع . أزهارها صغيرة القد غبراء اللون ، عصاره جنودها حريفة الطعم . أوراقها مطعنة .

٢٩٦٩١ - هُتِيرِيَّةُ \* ، سَكَنْدُونُ \*  
Sphenodon punctatus (S).

Sphenodon, Hatteria (F).  
حيوان بيوض وحيد النوع والجنس والفصيلة من رتبة مغطويات الرؤوس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظواء ، أما البازيز الثوروني واليسموري يكتمان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مبعثر الثعلب ويملو في قد رأسه وفي ثبج ظهره وذنبه عرف غفروني التركيب مسن كالنشار . رأسه مكل . المنطقة الصدغية من الرأس عظمية التركيب . بطنه محفو بالاضلع . مذبه ملمو بزعف جلدي . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصام . قوائمها نشيطة ، خاسية الاصابع المتقدمة يحظاظ قاعدي . مخالب حادة الأطراف المحجنة . أسنانه شارقة ، مرزقة في الحافة الخارجية من الفك الأمامي الاثنى اسن قدماً من الذكر وأصغر بطناً منه . تلقى من ١٠ إلى ١٢ شلقة في حفرة بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر . ينفق الشلق بعد وضعه بنحو ٤ اسبوعاً || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء . قوته العظام والصفاد والديدان والقواقع الصغيرة .



هتل



هتولية متقية



هتيرة



هجرس احمر



هجرس اخضر

## ٢٩٧٠١ - هجريس الغاب \*، تستنس

*Cercopithecus pyrrhonotus* (S). *Cercopithèque nisanis, Nisanas* (F).

موطنه افريقية الشرقية اصحابها الصوالب وكردفان ودفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصنالي. حنار وجهه الى البياض الاخير || وهو من القردة الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تنسى .

## ٢٩٧٠٢ - هجريس ديانا \*

*Cercopithecus diana* (S). *Cercopithèque Diane* (F). *Diana monkey* (E).

موطنه ليبريه والكنغو . ثوبه جميل الالوان . ظهره ارجواني. بطنه الى البياض الاخير . ساعده وفخذاه سود الفاهر ، صفر الباطن . اما الذكر فيتميز بختار جبهته الاسود وبلمحيته وسباله البياض .

## ٢٩٧٠٣ - هجريس سبا \*، شادي، عبتنج، طوت

*Cercopithecus sabaues* (S). *Cercopithèque de Saba, Grivet, Tota* (F). *Grivet* (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القدرع التقاطيع . ثوبه الى الخضار العايق . قوامه يذنيه موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

## ٢٩٧٠٤ - هجريس سكمسار ، سكمسار

*Cercopithecus talapoin* (S). *Talapoin, Mitopithèque* (F).

موطنه الفايون . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاسفر . بطنه الى البياض الاخير . حنار وجهه تقري الشكل ، ابيض اللون || اخلاقه هنية رضية . يقتبس العلم بدون نفور وازعاج .

## ٢٩٧٠٥ - هجريسيات ، قروء ذبالة، قروء

*Cercopithecidae*, *Laslopygidae* (S). *Cercopithécidés* (F). *Cercopithecidae, Laslopygidae* (E).

الهجريسيات والهجرايس فصيلة قرد من صفليات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجريس والحدود والمكاك والشمم والقشدة والقرودح .

## ٢٩٧٠٦ - هجين

*Métis* (F). *Cross-bred* (E). هو في الحيوان نتاج التجين اي الاسفاد بين حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين .

## ٢٩٧٠٧ - هجين

*Hybride* (F). *Hybrid* (E). هو في النبات نتيجة تنبغ زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير ضربها أو صرهما . وهو يدعى هملجا

## ٢٩٧٠٨ - هذاب \*

*Parnassius* (S). جنس حشرات فراشية من عمارة اللذانبايات . اكلواه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . اجسامها اسطوانية مهذبة . رواشتها مستعرضة مستديرة، لونها الى البياض الاخير يملوها تمشيح ليليكي وتتمتع الحبل بتبقيج اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع مكثها على نباتات فصيلة الهذلات تفتت عن رقات مفلمطة ضمة جوزية اللون حلبة الجسم مهذبة بالهلب التفسير ومنقطعة بالاحمر .

## ٢٩٧٠٩ - هذاب الجرود \*

*Parnassius montivagus* (S). *Parnassien des montagnes* (F). *Mountain Butterfly* (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة حرشيات الاجنحة . موطنها بئس جبال الشرق الادنى . فراشتها واثمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق التفطريون والحللات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ سم . بسطها نحو ٥٤ سم . رأسها اكهب اللون . عينهاا ناثرتان . زياتانها صولطانيان . جوشنها الى الشبهة السمره المراج . بطنها الى الشبهة الرصاصية الغصبة البياض || رواشتها عند الشقين الى البياض الاخير يملوها تمشيح اريد ويليكي وتتمتع اسمر وتبقيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح في النهار . تماثل يمد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتج المكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ سم . جسمها مقلع الشكل . ثوبها الى السمره الجوزية تملوها ثلاثة غطوط سود قاطبة وتقطيع جانبي احمر واصفر . قشارها كيف الحبل والمهلب القصير . رأسها اسود . فكهاا نشيطان . رواشتها وبديها الى الزبدة السمره || طوار الاكامل التي يستمر من ٣٢ الى ٣٤ اسبوعاً يتقضي ضمن صليحة متينة التسج .

## ٢٩٧١٠ - هذاب

*Filaridés* (F). *Filaridae* (E). ردف من الديدان السليكية الوردية . تتميز باجسامها الدقيقة التحيلة الحيطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية فتؤذيها وقد تميتها . اطلب هذابة .

## ٢٩٧١١ - هذابة \*، فيلارية، عركة

*Filaria* (S). *Filairé* (F). جنس ديدان سليكية من الهذاب . انواعها كثيرة العدد تصيب الانسان والحيوان . جميعها دقيقة الجسم التحيل ، عيطية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجهاز الدوري وفي التسج الضام تسبب اضطرابات عتيلة واختلالات داخلية قد تكون سبب الوفاة || اعرف انواعها ما يتبع .

## ٢٩٧١٢ - هذابة الخيل

*Filaria equina* (S). *Filaire du cheval* (F). نوع من الهذاب تطول من ٤ الى ١٢ سم . تصيب الخيل والبالا والخيبر . تتمركز في اغشية المعدة . تسبب بعض الاضطرابات الداخلية فلما تكون وشية العاقبة .

## ٢٩٧١٣ - هذابة الدمع

*Filaria lacrymalis* (S). *Filaire lacrymale* (F). نوع من الهذاب تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . تركب البقر وتعيش في مجاري غدد الدمع تسبب التهاب المتحممة . يقضي عليها باستئصالها .

## ٢٩٧١٤ - هذابة الظبياء

*Filaria cervina* (S). *Filaire des cervidés* (F). نوع من الهذاب تركب الظبياء والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ سم .

## ٢٩٧١٥ - هذابة الكلب

*Filaria immitis* (S). *Filaire cruelle* (F). نوع من الهذاب تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تركب الكلب فقير في الجهاز الدوري وتسفر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا واليونان .



هجريس الغاب



هجريس ديانا



هجريس سبا



هذاب



هذاب الجرود



هذابة

Clopeotte commun (F).

٢٩٧٢٥ - هَدَبَة

راجع حمار قبان .

Fulcre

٢٩٧٢٦ - هَدَبَة

هي غيوط جهاز التناسل في فطور الارماديات .

٢٩٧٢٧ - هَدَبَة طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E).

٢٩٧٢٨ - هَدَسَس

الهَدَسَس البر الذكور عند بلوغه كامل النشاط .

Ciliés (F). Cilia (E).

٢٩٧٢٩ - هَدَبِيَّات

شعبة من التقيحيات من الحيوانات الدنيا الالوي .

Thysanoptéroïdes

٢٩٧٣٠ - هَدَبِيَّات الجناح

طبقة حشرات من شعبة العليات تشمل رتبة واحدة تدعى هدية الأجنبية، اجناسها وأنواعها زهاء ١٠٠٠ تجمعها عدة فصائل .

Thysanoptères (F).

٢٩٧٣١ - هَدَبِيَّة الأجنحة

Thysanoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة هديات الجناح . فصائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اضطلامها مخروطية الشكل . اناكها ثاقبة ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة العقل التي تراوح ال ٦ الى ٩ . اجنتها عند وجودها هدية التركيب مستطيلة . اناها سوية الالوان منها الاسفر والاسمر والكستني والاسود || حشراتها الكاملة ويرقاتها تركيب العديد من النبات . قوسها الخفيف والنفس وعصارة الخلايا || اشهر حشراتها الترييس .

Thysanoures (F).

٢٩٧٣٢ - هَدَبِيَّة الأذئاب

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D).

طائفة من الحشرات المذبة المدعمة الجناح . فصائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجمع الى ربتين رتبة لاطات الملك ورتبة ظاهرات الملك .

Hydraires (F).

٢٩٧٣٣ - هَدَرَات

هي العذار، رتبة حيوانات مائية من المحرفات .

Hydre (F). Hydra (E).

٢٩٧٣٤ - هَدَرَة

الهدرة هي العذار، جنس حيوانات مائية من العذاريات .

Hydrogénation (F).

٢٩٧٣٥ - هَدَرَجَة

المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F).

٢٩٧٣٦ - هَدَرَسَة

Hydrostatics (E).

علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S).

٢٩٧٣٧ - هَدَرُوب

Hydrobie (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل وفصيلة الهدروبيا . انواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصداها صغيرة، ماصة، مذبذبة الاعقاب، قزينة الاسقاط .

٢٩٧١٦ - هَدَابَة الماعز

Filaria caprae (S).

Filaire des caprins (F).

نوع من الهداب طوطا يراوح ال ٢ الى ٥ سم . تركيب الماعز في نسبها الفاسدة فتفرح جلودها وتقصيها .

٢٩٧١٧ - هَدَابَة المدينته، عريق مَدَنِي

Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de Médine (F). Guinée-worm (E).

نوع من الهداب تكثر في البلاد الحارة . تعيش تحت الجلد في لسج الجسم الفاسدة عند البشر والخيول واليقر وسائر الهم . اناثها طولها من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طولها في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في اي مركز كان انما تفضل اسفل الساق فتصيب دملة تنتهي بخراج مقروح . يقال ان كيشها يدخل المعدة مع الماء . فاجتباها يكون اما بطل الماء او بتقطيره .

٢٩٧١٨ - هَدَابَة بأسورَة

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الهداب طولها من ٣ الى ٧ سم . تركيب الخيل والبال والخيبر . تتركز في العرق والكنتف والخالرك . تسب دملات تزل القمح والدم .

٢٩٧١٩ - هَدَابِيَّة الأرجل

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من الفشريات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند تعيش مقلبية على الاسماك والحيوان وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها الاستشعارية بمجهره يحاجم تمكها من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - هَدَاكَة

Frigidité (F). Frigidity (E). حالة مقاومة سلبية او فتور في وظائف الاعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من النكاح او لا تفتيط بممارسته لانها قلما تتحسس الحبور الجنسي .

٢٩٧٢١ - هَدَاك \*

Viscum album (S). Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Pania (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة التمنيات . يعيش على اغصان الأشجار الشجرة والحرجية اخصها التفاح . فيقام على السنج ويؤذي . بزره تنشق في السنج الذي يلصقه بالنعص . جلوره تشب في لحاء المائل . فروعه ثنائية التركيب . أزواره وحيدة الشق، ضمية التجميع، ابليّة الارتكاز . ثماره نوبية الشكل ، بيضاء اللون ، دايقة المادة . بزورها دقيقة مفلطحة || ثماره مأكولة من بعض انواع الطير اخصها السنان التي تنقل البزور مع سلها الى اي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشقاق ويستخرج منه نوع من الدقيق جيد الصنف . الواحدة هدالة .

٢٩٧٢٢ - هَدَاهِد

هو المهدد، الخلب .

٢٩٧٢٣ - هَدَبَة

Cueillir (F). To gather (E).

هدب الشرة : اجتثاثا وهدب واعتذب ايضاً .

٢٩٧٢٤ - هَدَبَة، هَدَبِيَّة

Aiguille (F). Needle (E).

الهدية والهدية . ج هذب وهذب (أهذب) . كل ورقة ابرية الشكل لا غير لها ولا عرض كورق الصنوبر واللائل ...



هدال



الملمس، سواء اللون، فنية المواج، تعتبر من افخر وأنجح الفراء.

Hydraena (S). \* ٢٩٤٦ - هيدريئة \*  
Hydrène (F). Hydraena (E).

جنس حشرات من فصيلة الهيدرينيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، اهليجية، هيفاء، تطول نحو ٣ م. رؤوسها مستعرضة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية غيطية. تأثيرها قصيرة. ملاسها مستطيلة. منمنقة. كواسلها شبه مكورة الشكل. اغمارها لاحفة. قواطمها مستطيلة. اثوابها سوية اللونان تكثر فيها الصرة السداة والحلوة ثم النبي والكسني || تألف مجاري الماء. تعيش تحت الحجارة المغمورة.

Hydraenidae (S). \* ٢٩٤٧ - هيدريئيات \*  
Hydrénidés (F). Hydraenidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة، اهليجية الشكل، متعلة الاحديداد، تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها متعلة الجرم. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية غيطية، سباعية الفصل. تتميز باستطالة ملاسها الفكية المنمنقة. كواسلها نظامية. اغمارها لاحفة. قواطمها مستطيلة || تعيش في المناطق والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المغمورة او بين اوراق النبات. ومنها انواع تعيش تحت طحالب الصفقات. يرقاتها مغترسة || اشهر اجناسها الهيدرية.

Myrte (F). \* ٢٩٤٨ - هدس \*  
هو الاس، اطلية.

Frigide (F). Frigid (E). \* ٢٩٤٩ - هدك، مهدك \*  
الهك والمهدك من تميز بالهداك.

Leptostroma (S). \* ٢٩٥٠ - هدككة \*، ليسترومة \*  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات. انواعه عديدة جميعها روية لا مؤذية. بكينداتها فارشة، طبائية الشكل، سوداء اللون، فريحة الانفلاق. يوبقها غشاء اللون مخلفة الاشكال، منها البيضاء والخرطوية والمنمنقة.

Leptostromataceae (S). \* ٢٩٥١ - هدكيات \*  
Leptostromatacés (F). Leptostromataceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزويات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد، بكينداتها مجنحة، فحبة اللون، شاربة الارتكاز او محصورة. يوبقها مخلفة الاشكال، متباينة التركيب. || اعرف اجناسها الهائية التالية: اتوسويديوم (غشاء)، يوفويه، ديسكوزيه غلوس ليتيويوم، لبريلا، ملسيه، هدكة.

Fertilité (F). Fertilité (E). \* ٢٩٥٣ - هدن \*  
الهدن هو الحصب في الانتاج.

Upupa (S). \* ٢٩٥٤ - هُدُ، هُدُ \*  
Huppe (F). Hoopoe (E).

جنس طير من الهدديات. انواعه المعروفة ستة، جميعها

Hydrobiidae (S). \* ٢٩٢٨ - هيدروبيات \*  
Hydrobiidés (F). Hydrobiidae (E).

فصيلة حيوانات مجهرية من الرخويات مديات الارجل اعميات الخياشيم المشطية. اجناسها المعروفة ٢٢ وانواعها بعض المئات منتشرة في معظم بحار العالم وخاصة عند مصبات الانهر لانها ترطب في الماء الاجاج || اعرف اجناسها واشهرها الهديروب.

Hydroscaaphidae (S). \* ٢٩٢٩ - هيدروسيات \*  
Hydroscaaphidés (F). Hydroscaaphidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها منافع ومجبرات البلاد المتتلة الحرارة || اجسامها شبه بيضية الشون، معتلة التبيطط، تطول من ٨ الى ١٤ م. رؤوسها مستعرضة، مخروطية. عيونها بارزة. تأثيرها وتكونها نظامية. - قرونها الاستشعارية سباعية الفصل. كواسلها شبه مربعة الشكل. اغمارها لاحفة || تعيش على النباتات المائية في البحيرات والمنافع || اشهر اجناسها الهديروس.

Hydroïdes \* ٢٩٤٠ - هيدريات \*  
هي العناريات من الهيفيات تشمل ثلاث رتب. العنارات والعدرات المرجانية والجليديات.

Hydroméduses (F). \* ٢٩٤١ - هيدريات مدوسية \*  
صنف حيوانات من الهيفيات يشمل العناريات والمدوسيات والمصصيات.

Hydrocorallaires \* ٢٩٤٢ - هيدريات مرجانية \*  
رتبة حيوانات مائية من الهديات.

Heldreichia (S). Heldreiche (F). \* ٢٩٤٣ - هيدريخ \*  
جنس نباتات عشبية، معمرة، برية، من فصيلة الصليبيات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتبها جبال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها زحافة فراء. اوراقها متعاقبة، متقاربة لحية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات وحيدة البزرة || اشهر انواعه الهديرخ الحلبلاي الورق.

\* ٢٩٤٤ - هيدريخ حبلبلاي الورق \*

Heldreichia buplevifolia (S).  
Heldreiche à feuilles de buplèvre (F).

عشبة معمرة برية من فصيلة الصليبيات. منتبها جرد لبنان. ساقها زحافة فراء. فروعه منتصبه. اوراقها لحية ملقية النصال. ازهارها طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها غريقات تنويرها في اواخر الصيف.

Enhydria marina (S). \* ٢٩٤٥ - هيدريس \*  
Enhydre marine, Grande loutre de mer (F).  
Kalan, Sea otter (E). Kalan, Grosser Seeotter (D).

حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرعويات. قوته الاسماك والقشريات. اعطائه مجاح مفيق بحرين. طولها نحو ١٦٠ سم. يتميز باستدارة راسه ومخبط قائمته الخلفيتين الذي يكتشف كامل البراش دون الاظافر. فروته قصيرة الورب الناعم الكثيف، خلية



هيدريس



هدريئة

٢٩٧٦٠ - هَدِيَّاتٌ (F). Flagellés (F). Flagellates (E).  
قفة من الاولاي ، غالباً مجهرية ، مجهزة بأهداب دقيقة قابلة الانحزاز تدعى هدبيات تحمكها من العوم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما اكثريتها تستمتع بالغضيب . ومنها انواع عطليية تعيش على الحيوان .

٢٩٧٦١ - هَدِيف ٥ (F). Allergène (F).  
نعت تعريفي يطلق على كل مادة قد تسبب الانهداف .

٢٩٧٦٢ - هَدِيل (F). Pigeon mâle (F). Dove male (E).  
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جبران العود .

كان الهديل الطالع الرجل وسطها  
من البهي شرب يغرد مسنرف  
والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في الديميري  
« فرخ كان له عهد نوح فصاده جارج من الطير فليس  
من حامة الا وتبكي عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :  
فقلت اتيكي ذات طوق تذكرك  
هديلاً وقد اوى اوى ونسا كان تبع »

٢٩٧٦٣ - هَدِيم (F). الهديم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هَدِيَّةُ الْفَيْلَمِ \* ، عَسْفِيَّةُ السَّلَتِ

Hadena scalis, Hadena didyma (S).  
Hadenè du seigle, Noctuelle du seigle (F).  
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة العسفيات حرشفات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا وبقية الشالية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضلة تركيب النجيليات البرية والزراعية || جسمها مستقيم الجرم يطول نحو ١٣ م . بسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٥ م . زباناها مستعرض الشكل . عيناها صفيرتان . غريطين . ملاسها صفيرة . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخنطي || راشتها الى الخنطي الاسمر تعلو في الزوج الامامي زراکش معترضة وزخارف تراوح بين الكسني والجزوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سماء لا تتجاوز حدود الزام الاول || لها جيل واحد في الخول . تغلف الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو سبع اسابيع وتتمتع المكان في عطوط مستقيمة على عصف النبات العائل || الطور الاسروي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعاً ينشقي على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغول من ٢٥ الى ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، باعت الحفصار يعلو غطان ثيجيان اميران يمتدان من الكول الى الشرج . رأسها اسمر اللون ، مبهر الخلب الثقيل . مذها ورواجها الى الخنطي || طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينشقي في التربة حيث تنمدن السرقة وتنتقل بجلباب من العن .

٢٩٧٦٥ - هَدِيَّةٌ مُشَبَّهَةٌ \*

Hadena reticulata (S). Hadenè reticulée (F).  
Hadena reticulata (E).

حشرة من العسفيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق العلوك والقرنفل البري والزراعي وتقتب الكماير وتلتهم البذور

من طور العالم القديم . اجسامها رشيقة ، رؤوسها متوجة بقنازع مروحية الشكل . اثوابها جميلة الالوان المترامية الزاهية يعلوها تجديع وتنسج . || حكي القزويني ان الهدد قال لسليان اريد ان تكون في سفاتي قال انا وسدي قال بل انت واهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا فنصر سليان بمجنوده فطار الهدد فاصطاد جرادة فضنقها ورمى بها في البحر وقال كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق فضحك سليان ورجنوده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليان يوم العرض هدهدة  
اهدت له من جراد كان في فيها  
وانشدت بلسان الحال قائلته  
ان الهدايا على مقدار مهديها  
لو كان يهدي الى الانسان قيمته  
لكان يهدي لك الدنيا وما فيها »  
اعرف انواعه واشهرها الهدد الشائع .

٢٩٧٥٥ - هَدُودُ شَائِع \* ، دُودُكُ الْجَبَلِ

Upupa epops (S). Huppe commune, H. vulgaire (F). Common hoopoe (E).

نوع من الهدد الميزول في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كنيته ابو الاخبار وابو ثمامة وابو قامة وابو الربيع وابو درج وابو مجاهد وابو عباد . ج هدهد وهدهيد . الواحدة هدهدة . || وهو طائر اسرج الثوب متوسط الجسم طوله تراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . منقاره دقيق مستطيل . قزخته كبيرة القد سوداء الاطراف . ثوبه الى الصلبة الطحلاء . جناحاه وظهوره الى الصلبة القائمة يعلوها تسليج اسود وابيض يتخلله الاصفر . ذنبه مقطوع الطرف اسود اللون ابيض الجانبين والوسط . || يأنف الاماكن المليمة الاجبار . قوته الحشرات والديدان . يئن عشه في تجاويف الاجبار . الاثنى تحضن وحدها من ٤ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يئن لما الاكل . || يعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها .

٢٩٧٥٦ - هَدُودُ يَمَاتُ

Upupidae (S). Hupupides, Upupides (F). Upupidae (E).

فصيلة طير من الجوامث الرقيقات المناقير . انواعها عديدة تتجمع الى جنسين الهدد والهدير . اجسامها رشيقة . اجنحتها ذلقة . السنبا قصيرة . اسراعها قوية . اثوابها جميلة الالوان الزاهية .

٢٩٧٥٧ - هَدُودِيَّةٌ ٥ (F). Hédoobie (F).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة الغفريات . انواعها المرفقة ١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، اثوابها مزركشة مختلفة الالوان . يرقاها تركب الاشخاب الميتة فتسخرها وتعلها . اشهرها الهدوبية الامباطورية .

٢٩٧٥٨ - هَدُودِيَّةٌ امِبَاطُورِيَّةٌ \*

Hedobia imperialis (S). Hédoobie impériale (F).

نوع من الهدوبية طولا من ٤ الى ٥ م . ثوبها حنطي اللون اسمر المزاج تعلو زراکش مختلفة جليلة التركيب طملاء زاهية . || يرقاها تركب اغصان الاجبار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هَدِيَّةٌ ٥ (F). Flagelle (F). Flagellum (E).



هدد شائع



هدوبية امباطورية



هدية الفيل



هدية مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنا  
عسى يوماً يكون لها انفراج  
ندمي هرقى وأنيس نفسي  
دفاثر لي ومعشوق السراج

٢٩٧٧٢ - هَرَاكْس Acacia blanc (F).  
هو السط الابيض . الواحدة هراسه .

٢٩٧٧٣ - هَرَامِسَة Astrologues (F). Astrologers (E).  
المراسمة علماء النجوم . النجميون والمتنجنون .

٢٩٧٧٤ - هَرْب هَرْب الحرب . ثوب البطن .



هذاب

٢٩٧٧٥ - هَرْبُودِيْس Harpagodius (S).  
Harpagode (F). Harpagodius (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرعويات مميزات الارجل  
وفصيلة الكبشيات . انواعه المرفوعة قليلة العدد اعطاهها  
بعض مناطق المحيط الاطلسي المراجعة لاربيكة الثانية ||  
اصداؤها متوسطة القد وشبيهة عذازة جزوية اللون . فواها  
معتدلة الانفراج ثلاثية الفلق التي تبدو كرجل البش شكلاً  
وحظاً .

٢٩٧٧٦ - هَرْبَقِيْس Harpactes (S). Harpacte,  
Courouc flamboyant (F). Harpactes (E).  
جنس طير من فصيلة الطرغونيات . انواعه المرفوعة نحو  
١٠ موطنها يشمل معظم مناطق آسيا الشرقية والجنوبية .  
جميعها متوسطة القد . مناقبها قوية بحدة الاطراف ،  
مقمرة الحاطم العليا . اجنتها متوسطة الطول ، ذلقة  
الاطراف ، رتاجية الريش . اذانها مستطيلة ، رتاجية  
التركيب . اقواها جميلة الالوان المتناسقة || فواها الحشرات  
على اختلاف انواعها وبعض الدويبات || اعرف انواعه  
واشهرها الهريق المطوق .

٢٩٧٧٧ - هَرْبَقِيْس مَطُوق \*  
Harpactes fasciatus (S).  
Harpacte à bande, H. kondea (F).

نوع من الهريق . اصطانه بلاد الهند وصوتراً . يألف  
الغابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .  
ثوبه جبل الالوان الصافية . رأسه وضعه الى السواد الفصحي  
اللامع . صدره وبطنه الى الحمرة القرمزية الشديدة البهتان  
وكذلك عصبه تطوق رأسه من العين الى العين . سواد عنقه  
واحجار صدره مفصولان بطق ابيض كاللج . ظوره  
وافتيحه وعزالان ذنبه الى الجفوة تطوقها حاشية سوداء  
يغلغها حنار مستعرض ابيض . جناناه الى السواد المسج  
بالابيض . مناقده ورصاه الى الزرقه || طيرانه المعادي  
قصير الشوط يكثر فيه التصعيد والتبيط . قوته الحشرات  
والدويبات اعصها المتناكب || يذئن عنه في صدوع  
الاشجار الهربة . الاثني تبين من ٤ الى ٥ بيضات  
تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .



هرب مطوق

٢٩٧٧٨ - هَرْبُلُوس Harpalus (S).  
جنس حشرات من فصيلة الهربلسيات . انواعه كثيرة  
العدد جميعها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت  
الحجارة والاعشاب والارواح اليابسة . قوتها البزور  
والحيوب وبعض الثآير . رقاتها خاضعة تعيش على اوراق  
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفنية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ سم . بسطها  
نحو ٤١ سم . رأسها الى الخفي الاسمر المواج . عينها  
كبرتان . زباناها خضيان . جوشها وبطنها الى الخفي  
الاسمر || روشها الاماميان الى الخفي الاشقر المواج  
تعلمو شبكة من الخطوط الكستنية . روشها الخلفيان  
الى الخفي التبي المواج يسر عنه الاطراف الخارجية .  
اهدابها الى الشقمة الصنابية || لها جيل واحد في الحول .  
تظهر الفرائشة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح  
في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع  
المكن لطعاً مرببة على الصفحات السفلى من نصال  
الارواح || السرعة عند بلونها الكمال تطول نحو ٤٠ سم .  
جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . ثوبها الى  
الريكة تبعث في الظهر وتبعث في الجانبين ويعلوها غطان  
جانبيا احمران وتسعة خطوط ممتدة صفراء اللون . رأسها  
الى الجفوة . مدبها الى الطلعة الفراء . رواجها الى السرة ||  
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في  
التربة ضمن جلباب من العين لتتلفه السرعة .

٢٩٧٧٦ - هَدْيُوتِيْس Hedyotis (S).  
Hédýotis, Hédýote, Hédýote, Hédýoteide (F). Dog-  
wood (E). Süsohr (D). Edolideide (I).  
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الفويات .  
انواعه قليلة احمران وتسعة خطوط ممتدة صفراء اللون .  
ازهارها بحورية الاكازار او تاجية . ثمارها جراء ثنائية  
اللفة . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٧٧ - هَدْيُوتِيْس سَرَكْدِيْب Hedyotis auricularia (F).  
نوع من الهديوتيس . اصطانه سرنديب . جنته معمرة .  
اوراقها حاضنة ذكية العرف الطري . ازهارها تاجية  
الاكازار شاذة العرف . يستخرج من اوراقها بالتقطير  
عطر الهديوتيس .

٢٩٧٧٨ - هَدْيُوتِيْس هِنْدِي Hedyotis à ombrelle (F).  
نوع من الهديوتيس . اصطانه الهند . عشته عملة . جلورها  
صباغية يسمنها "شي" غصنها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٧٩ - هَدَاب Mesites (S). Mésite (F).  
واحدته هدابة . جنس طير من فصيلة الهذابيات . انواعه  
قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد ، طولها براوح من ٢٧  
الى ٣٥ سم . جوارحها وارسافها وغالبها مستطيلة . ازفادها  
عريانة . جوارحها لامعة ذلقة . اذانها قصيرة مخروطية .  
اقواها الى الصهبة المايقة يعلوها توشم خفيف . جواشها  
وبطنها الى الصفرة الموشة بالاسود . اعناقها بقية اللون .  
قوتها البزور والحيوب والحشرات على اختلاف انواعها .  
تنش عشها في انصوص بين الادغال والاعشاب الرفيعة .  
حضانها من ٨ الى ١٢ بيضة .

٢٩٧٨٠ - هَدَابِيَات Mesitidae (S). Mésitidae (F). Mesitidae (E).  
فصيلة طير وحيدة الجنس من رتبة الدجاجيات . انواعها  
المرفوعة قليلة ، جميعها من طيور مدغسكر . قوتها البزور  
والحيوب والحشرات .

٢٩٧٨١ - هَر Chat (F).  
هو السنور ، اطلبه . ج هرة والاثنى هرة . قال احد بن  
فارس صاحب المجلد في اللغة :

٢٩٧٨٧ - هَرَبُلُوسْ رَقِيع \* Scutellaria altissima (S).

Toque élevée (F).  
نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه متعصبه تعلو من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه الى الصهبة الخنطية الفاتحة. يألف الاثربة الرملية. قوة البزور والحبوب والآبار الجافة الساقطة. رقاته خاضلة قليلة الاذى.

٢٩٧٨٨ - هَرَبُلُوسْ كَثِيرُ الزُهْرِ Scutellaria macrantha (S). Toque à grandes fleurs (F).

نوع من الهربولوس التريبي الممر. ساقه تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة، بيضبة الشكل، نصلها قليل التحمل، مسنن الحافة. ازهاره سنبلية التجميع، متقابلة الاركان، تعلو نحو ٢ سم. شفيراتها العليا بنفسجية اللون، شفيراتها السفلى عاجية. تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٧٨٩ - هَرَبِيلَةُ نَهِيكَةً \* قَوْبِيَّةُ اخْصَبْ Harpella forficella (S). Harpelle perce-bois, Teigne du bois mort (F). Harpella forficella (E).

حشرة من فصيلة القربويات حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشها جاربة قوتها رقيق الازهار. سرقها خاشبة تعيش على جنود الاشجار اليابسة والاعصان والافناد || جسمها قصيف يطول نحو ٧ سم. بطنها تراوح من ٢٢ الى ٢٤ سم. رأسها مكور الشكل. عينها صغيرتان. زيانها خيطيان. ملاسكور دقيقة. مرشفا معتدل الطول. جوشها وبطنها الى البني الصنابي المواج || روشنها الاناميان الى الصفار القاتم يعلو تشجيج بني. روشنها الخلفيان الى اوردية. فراشها جاربة قوتها المواج. اهدائها شقراء اللون || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن محادياً في شقوق الخشب وتحت القشور اليابسة || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المقدم والمؤخر، ميمر الحلب القصير. ثوبها الى الخنطى الاسمر. رأسها شديد السمرة. مدبها ورواجها الصدرية والبيضية الى الخنطى الباهت || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي بخارج الفلق الخشبي ضمن صلجة تنسجها السرعة تحت القشور او بين الشقوق.

٢٩٧٩٠ - هَرْتَمَّةَ الرَّمْجَةِ: السواد بين منخري الكلب وساثر الحيوانات من ذوات الغنطسية.

٢٩٧٩١ - هَرَجْ Clitorie de Ternate (F).

هو المازريون الهندي، اطلبه.

٢٩٧٩٢ - هَرَجَّةَ، كَنْجْ Exotype

احدى سلالات جبل النيب الهابط. يعبر عنها علمياً بحرف ٤ يتيم رقم السلالة. فاذا اودت التبرير عن السلالة الاولى كتبت ١ ٤ وللاله على السلالة الثالثة كتبت ٣ ٤ وعلى السلالة السادسة ٦ ٤ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هَرُجُجْ Talin (F).

هو التالينوم، اطلبه.

٢٩٧٩٩ - هَرَبُلُوسْ أَصْهَبْ \* Harpalus rufus (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١١ الى ١٣ سم. ثوبه الى الصهبة الخنطية الفاتحة. يألف الاثربة الرملية. قوة البزور والحبوب والآبار الجافة الساقطة. رقاته خاضلة قليلة الاذى.

٢٩٧٨٠ - هَرَبُلُوسْ أَطْحَلُ الظَهْرِ \* Harpalus distinguendus (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ١٤ الى ١٦ سم. ثوبه الى السمرة السفعاء المراج. ظهره اطحل اللون، اسمر التخطيط المستطيل. يركب تخاميل الشبلك لالتهم بزورها الدقيقة فيسطب التخاميل ويشوبها.

٢٩٧٨١ - هَرَبُلُوسْ مَلُونْ \* Harpalus aeneus (S).

نوع من الهربولوس. حشرته تطول من ٧ الى ١٠ سم. ثوبه الى الأخضر الاسفع تملو مشعة جقوية. زيانها وجرارمز الى الحمرة. يعيش تحت الحجارة والاشخاب. قوة البزور والحبوب. رقاته خاضلة قليلة الاذى.

٢٩٧٨٢ - هَرَبُلُوسِيَّاتْ \* Harpalidae

فصيلة حشرات من عُمْدِيَّاتِ الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اعطائها العالم. معظمها رابل وبعضها مفترس. رقاتها خاضلة ناهمة ومنها المفترسة التي تمتص البيدان القارضة || اشهر اجناسها الهربولوس والمروس والياح والديتوس.

٢٩٧٨٣ - هَرَبُلُونْ \* Pseudope

جنس عظام من فصيلة الحنجويات العاديات القوام. انواعه قليلة، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اسطوانية تطول من ٤٠ الى ١٠٠ سم. رؤوسها مقلطحة. اذنانها دقيقة. حراشفا مربعة متتامة. قوتها الحشرات تعتبر من الزحافات المفيدة.

٢٩٧٨٤ - هَرَبُلُونْ \* دَرَكَّةَ Scutellaria (S).

Scutellaire, Toque (F).  
الدرقة عن الايمير مصطفى الشهابي الماعا الى مصدر الاسم العلمي. جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة، ينبتا الشرق الادنى وافريقية الشمالية. سوقها خشبية تحمله. اوراقها صغيرة القد لاطئة او معتقة. ازهارها سنبلية التجميع، مختلفة الالوان. بزورها دقيقة خنطية اللون || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٧٨٥ - هَرَبُلُونْ أَبْيَضْ Scutellaria albidia (S).

Toque blanche (F).  
نوع من الهربولون التريبي الممر. ساقه زيا اللحاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. أوراقه معتقة اهليلجية الشكل، نصلها جامد الصلصة، خلى البشرة، مسنن الحافة، دبق المسام. ازهاره سنبلية التجميع تطول نحو ٢ سم. لونها الى البياض العاجي || تنوره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٧٨٦ - هَرَبُلُونْ أَبْيِي Scutellaria alpan (S).

Toque des Alpes (F).  
نوع من الهربولون الجبلي البري الممر. ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. أوراقه لاطئة بيضبة النصل تطول من ١ الى ٢ سم. ازهاره بيض الانابيب، زرق الاطراف، سنبلية التجميع. تنوره يستمر من حزيران الى آب.



هربولوس اصهب



هربولوس اطحل الظهر



هربولوس ملون



هربول



هربولون



هريلة نيككة

٢١٧٩٤ - هَرْجُود ٥\*

Heterogynis (S).

Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطائها بعض مناطق البلاد المتعددة الحرارة . تألف البراري واطراح المبعثرة الاشجار || جسمها صغير ، نحيل ، كثيف الخمل الناعم . يسلطها نحو ٢٠ م . رأسها صغير . عيناها صغيرتان ، بارزتان . خطمها وولمها شديدة القصير . زباناها مشطيان ، مستطيلان . اجنتها كبيرة || الاثنى مرقطة وعادة الانحاج . السرة شبه اهليلجية الشكل ، مبططة ، خاضعة ، تعيش على اوراق فصيلة القرنيات الفراشية ونسبا الزوال ، مرتها المفصل .

٢١٧٩٥ - هَرْجُودِيَّات ٥

Heterogynidae.

Epincopterygidae (S). Hétérogynidés, Epincoptérygides (F). Heterogynidae, Epincopterygidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها شلالية الاعطان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، يلفها خل ناعم . يسلطها تراوح من ١٨ الى ٢٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . انطماها وولمها شديدة القصير . قرونبا الاستمارة مشطية . اجنتها خضيفة الانتشاب . مستعرضة الطرف . اولها السرة الخنطية المتفاوتة الماحاج || اناتها معار مرقالة . اساريها شبه اهليلجية الشكل ، مبططة || أشهر اجناسها الهرجود .

٢١٧٩٦ - هَرْجُوم

Damalsque du Sénégal (F).

Korrigum (E).

هو حذلول السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والجنبة .

٢١٧٩٧ - هَرْد

Curcuma (F).

هو الكركم الصباغي . اطله .

٢١٧٩٨ - هَرْدَاء ، هَرْدَان

Thamnocalamus (S).

Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصيبة برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد ترغب في الاربة الخفيفة العميقة الغور الوافرة المواد المضوية .

٢١٧٩٩ - هَرْدَاء هَنْدُسِيَّة

Thamnocalamus hindi (S). Bambou de Hinds (F).

نوع من الهرداء يطول من القرن الى الخمسة امتار . سلاجاته شديدة الخضار . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ١٠ م . نصلها جلدي التسنج ، صفحة العليا خضراء اللون طلعها الموج ، صفحة السفلى بيضاء اللون زياه . يرغب في الاربة البدالية الرطبة .

٢١٨٠٠ - هَرْدِيَّات ٥

Phalagides, Opilions.

Faucheurs (F). Phalagides, Opilions (E).

رتبة من صف النيكوبيات . اجناسها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، ملحونة الصدراس بالطن ، خيشومية التنفس ، عادمة المشاق ، مستطيلة الجرامز الدقيقة . أشهر فصائلها الكهوليات .

٢١٨٠١ - هَرْدِي

Hourdia (F).

الهردي او الهودي ، كلمة عربية اصيلة تستعمل الآن للدلالة على المجارة الموقفة من الباتون (اطلب حردي) .

٢١٨٠٢ - هَرْدِيْب مُبْتَج ٥\*

Chlorophorus varius (S). Chlorophore tacheté (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة وائمة خاضعة عاشبة من فصيلة القرنيات ورتبة نمذات الاجنحة . تألف البراري القريبة من الممران . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تمتع عن الازراق . يرقاتها تركب الجذوع والاصنان والقصبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب ساميك الكرمه وازواح الانجار المثمرة وسامناها || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٤ م . ثوبها الى الصفار الكبريتي تعلو يبقع وتذروق سود . رأسها مستدل الجرم . عيناها كبيرتان ناشرتان . زباناها خيطيان دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، ضيق المؤخر المستدير الفارق . غذاءها نمذات الصلابة ، متتابعات التحيزيز النجيل القاطب . اسرارها خاسية العقل || الاثنى ابرز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقتصر زبانا || جيلها ثنائي الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار وتبيض في الليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ م . جسمها محذوب الظهر ، مبطط المدب ، قصير الرواجب الشكل . ثوبها الى الصفرة الزيتية يملوها تنقيط اسمر . رأسها احمر .

٢١٨٠٣ - هَرْدِيْب مُعَصَّب ٥\*

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore

trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة وائمة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة نمذات الاجنحة . تألف الموامع التي تكثر فيها نباتات الفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها تركب اوسام النباتات الحولية والهولة وتسردب لحاء جذوع الانجار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ م . ثوبها متمدد الالوان فيه الاسود والاحمر والاسمر الخنطي والنبتي الاصفر المواج . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان ، ناشرتان . مستدير خيطيان ، دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق ، اسود اللون كاليلطن . غذاءها متتابعات التحيزيز الخفيف القاطب . اسرارها خاسية العقل || الاثنى ابرز قدماً من الذكر واقتصر زبانا منه واطول مرزاً || لها جيل واحد في الخول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في التبار وتبيض في الليل || البرقة ، عند الادراك التام ، تطول من ١٦ الى ٢٠ م . جسمها محذوب الظهر ، مبطط المدب ، نودلي الرواجب . ثوبها الى الصفرة الصنابية المواج يملوها تنقيط احمر . رأسها جؤوي اللون .

٢١٨٠٤ - هَرْدِيل ٥

Haridelle (F). Steed, Nag (E).

الهرديل الصفائح الضيقة من السبور . الواحدة هرديلة .

٢١٨٠٥ - هَرْزَان ، هَرْزُون

Autruche mâle (F).

هو الظلم ، اطله .

٢١٨٠٦ - هَرْشَان ٥\*

Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التركي . جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . مهدا بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيرييه . انواعه عديدة . جميعها معمرة . معظمها جنبي وبعضها بجلي . اوراقها عابلة مركبة ،



هرجود



هرديب مَبَج



هرديب مُعَصَّب



هرشان

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَن ٥  
Caragana frutex (S).  
Caragana frutescent (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها  
رباعية التركيب. وريقاتها لاقبائية الشكل والحجم تطول  
من ١ إلى ٣ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٢ م. نصلها بيضي  
الشكل، أذنياتها حادة شائكة. أزهارها كبيرة القد،  
فردية التجميع، لوها إلى الصفار الزاهي || تنوره يستمر  
طول شهر أيار.

٢٩٨١٤ - هَرَضِ  
Clous (F).  
بشور صنديرة جامدة تملو التسج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَصَّة  
Ver (F). Worm (E).  
هي الدودة. ج. هَرَضِ.

٢٩٨١٦ - هَرَضِ  
Polymnatus (S).  
جنس حشرات فراشية من فصيلة الحمرشيات. أنواعه عديدة،  
أعطاها معظم اصقاع العالم. أجسامها صغيرة القد كييفة  
الحراشفت المستقلة الحليمة الاطراف. اثوابها ملونة.  
قربوها الاستعمارية مستطيلة دبوسية الشكل || تسرح في  
النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || ريقاتها غاصلة  
وقامة تركب أوراق النبات وتمارها || أعرف أنواعه وأشهرها  
ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَضِ الباقية \*  
Polymnatus amandus (S).  
فراشة من الحرض، جسمها احمر اللون رصاصي المواجه.  
طولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها إلى الزرقعة البنفسجية  
الزاهية يطوقها حنار اسود وأطار أبيض المذهب. رواشن  
اناثها حنطية اللون يعلوها رقعة سمراء وأطار أبيض التهديد.  
ريقاتها صغيرة القد، خضراء اللون، تركب الباقية في أوراقها  
وقربوها.

٢٩٨١٨ - هَرَضِ البُقُول \*، أبُو دَقِيقِ الأَزْرَقِ  
أَبُو دَقِيقِ البُقُولِ

Polymnatus baeticus (S).  
فراشة من الحرض، جسمها حنطي اللون احمر المواجه يطول  
نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها إلى الزرقعة الجميلة الزاهية  
يطوقها اطار أبيض التهديد. رواشن اناثها غبراء اللون  
يعلوها تنميش اسود. ريقاتها خضراء اللون تشوبها كدرة  
غبراء || تركب البُقُولِ وتعرض الحبوب قبل ادراكها  
أخصها الفول واللوبيا والترمس.

٢٩٨١٩ - هَرَضِ التُّرْمُسِ \*  
Polymnatus damon (S).  
فراشة من الحرض. جسمها يطول نحو ٣٥ سم. رواشن  
ذكورها إلى الزرقعة الخضراء المواجه يطوقها اطار اسمر  
وتهديد. أبيض. رواشن اناثها حنطية يعلوها تنقيط اسود  
ونقط اوسط أبيض وحنار اسمر وأطار مهدب أبيض.  
ريقاتها تركب معظم النباتات القرنية انحصها الترمس.

٢٩٨٢٠ - هَرَضِ الرُّمَانْ قَرْمُكُولَة، دَوْدَة  
الرُّمَانْ

Virachola livia (S).  
فراشة من الحرض. جسمها حنطي اللون اخضر المواجه يطول  
نحو ٣٠ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا،  
رءادية السفلى، كستنية الطوق المذهب. رواشن اناثها  
بنفسجية الصفحة العليا سمراء السفلى، حنطية الطوق

ريشية، شفعية، متقابلة، تنتهي بأذنبة شائكة مكونة  
من امتداد الضلع. أزهارها خمسية التجميع أو فردية يكثر  
فيها اللون الاصفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل.  
أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ أَزْعَب ٥  
Caragana pygmaea (S). Caragana pygmée (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم. فروصها  
متدلية. أوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة  
السناينة الشكل يطول نحو ٢ سم. ويعرض نحو ٣ سم.  
أزهارها فردية، لوها إلى الصفار الزاهي || تنوره يستمر  
من نيسان إلى أيار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْنِ ٥  
Caragana chinensis (S). Caragana de la Chine (F).  
نوع من الهرشان جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها رباعية  
التركيب. وريقاتها بيضية الشكل تطول من ١ إلى ٣ سم.  
وتعرض من ٦ إلى ١٥ م. نصلها مائل البشرة على صفحتيها  
أذنياتها شائكة. أزهارها فردية التجميع، كبيرة القد،  
متدلية لوها إلى الصفرة يعلوها تسليج أرجواني أزرق المواجه.  
تنوره يستمر طول شهر حزيران.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَغِيرِ الرُّوْقِ ٥  
Caragana altaiana, C. microphylla (S). Caragana à  
petites feuilles, Acacia de Sibérie (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ٢٠٠ سم. وريقاتها تعد  
من ١٢ إلى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها  
يطول نحو ١٠ سم. وهو خالي البشرة على صفحتيها. أزهارها  
فردية أو ثنائية التجميع، لوها إلى الصفرة الجميلة. تنوره  
يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بُرْتَقَالِي ٥  
Caragana aurantiaca (S). Caragana orangé (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء.  
فروصها متدلية. أوراقها رباعية التركيب ضيقة النصل  
الذي يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣. أزهارها فردية،  
برتقالية اللون || تنوره يستمر طول شهر حزيران.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِك ٥  
Caragana spinosa (S). Caragana épineux (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فراء،  
أوراقها لاقبائية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل  
ومنها السداسية والثمانية الوريقات. نصلها يطول نحو ٢٥  
سم. ويعرض نحو ٥ سم. صفحتيها العليا خضراء اللون،  
صفحتيها السفلى خالية البشرة حملاء. راشات أوراقها شائكة  
تطول من ٣ إلى ٤ سم. أزهارها إلى الصفار الكبيرتي.  
تنوره يستمر من نيسان إلى أيار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥، شَجَرَة الحَمْصِ

Caragana arborescens (S). Caragana arborescent,  
Arbre aux pois (F).  
نوع من الهرشان. جنبته تملو من مترين إلى خمسة أمتار.  
وريقاتها لاقبائية العدد الذي يراوح من ٦ إلى ١٢  
نصلها تطول من ١٥ إلى ٢٠ م. وتعرض من ٢ إلى ٥ م.  
أزهارها خمسية اللون، ثلاثية التجميع أو فردية. بزورها  
ماكولة وهي كالحصص شكلاً وقداً وطعماً || تنوره يستمر  
من أيار إلى حزيران.



هرض الباقية



هرض البقول



هرض الترمس

## هَرَضُ الشَّيْلَك - هَرِثَّة



هرض الشيلك



هرض الصعر



هرض العرن



هرض القصة



هرض القطنيات



هرضة الكوباي



هرغ

من نصال الازراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ م. جسمها محبب الشكل، مستنق المقدم والمؤخر. ثوبها الى الخضار الانس تملوه ثلاثة خطوط صفر وخطان اسودان ويجتمع سكي غير. رأسها اسود. مذهبها ورواجها الى السفرة الداكنة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقضيها الحادرة متدلية برجلها متعذبة الحصىفة.

## ٢٩٨٢٦ - هَرِثِيَّات

فصيلة حشرات قرائية تعرف بالقنيتان، اطلها.

## ٢٩٨٢٧ - هَرِط، هَرِطَة

علم الحيوان المهزول اخصها علم النجعة الكبيرة المهزولة.

## ٢٩٨٢٨ - هَرُطَام، غُودِيَا

Gaudinia (S). Gaudinie (F). Gaudinia (E).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الملائكة «غودين». وفي نباتات عشبية، برية، حولية، من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شطبية، سوقها مائلة او خلية. عصفها مسطح النصال الباهة الخضار. انهارها سنبل. سنبلاتها منتصبة.

## ٢٩٨٢٩ - هَرُطَمَان

هو الخراط البري، اطله.

## ٢٩٨٣٠ - هَرِثَة الكُوبَاي \*

Gyropus ovalis (S). شجرة جلدية دقيقة من فصيلة الحمريات. طولها نحو ١ م. جسمها مبسط الشكل. زياتها واثيرها رباعية التركيب. مقاطها عديدة الاطراف الحادة || تركب الكوباي وتؤديه.

## ٢٩٨٣١ - هَرِثِيَّات ٥

Gyropidae. فصيلة حشرات جلدية من رتبة القطنيات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد مغلطة الجسم مقعطة الارصاد تنطقل على الحيوانات اللبونة من ذوات الوبر الجمل النائم.

## ٢٩٨٣٢ - هَرِفِس، مَهْرِفَس

Improlifque (F). المعقم من النبات.

## ٢٩٨٣٣ - هَرِفِغ \*

Nyctea nivea (S). Harfang des neiges (F). طائر من البويات وعامرة القديات. موطنه جيم الاصقاع الشمالية الباردة. طولها نحو ٧٠ سم. ويسطه لا تقل عن ١٥٤ سم. ثوبه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو منش وموشم بالسرعة في الطائر الفرخ. رأسه صغير القد. محصره نافر القرس. منسره اسود الجسم والبهرة. عنباه الى الحمرة الصنائية. ذنبه مستطيل الريش. ارساه وغالبه قصيرة القد كاسية. || يدن عشه في تخاليف الصخور. انشاء نفع من ٥ الى ١٠ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر. قوته الجرد والغار والدين والمروم والسلك.

## ٢٩٨٣٤ - هَرِثِيَّة

Heracleum (S). Berce (F). جنس نباتات عشبية كبيرة القد من فصيلة الخيميات. انواعها المعروفة قليلة لا تتعدى الثمانية. مذهبها جبال الخيشة والهند والشرق الاوسط واروبة وامريكية الشمالية. منها النباتات المعمرة والمحولة. اوراقها ريشية مغلقة. كفية النصل. يستخرج من سوقها واوراقها وازهارها

المهدب || ريقها صغيرة القد سوداء الرأس تبدو في اول مذهبها خضراء الجسم كيفية الحلب الاسود ثم ينفخ عليها ويحول لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ م. تركب ثمار الزمان والدولة وقد تنمرى اليسر.

## ٢٩٨٢١ - هَرَضُ الشَّيْلَك \*

Polyommatus icarus (S). فراشة من الهرض. جسمها اسطواني الشكل محصور الوسط اطحل الثوب يطول نحو ٢٢ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة البنفسجية يطوقها حثار اسود واطار من المذهب الابيض. رواشن اناثها حطوية اللون صفراء المواج يطولها تنميش اسود وايض واجر، اطارها ابيض الهديب || ريقها تركب اوراق مختلف النباتات اخصها الشيلك.

## ٢٩٨٢٢ - هَرَضُ الصَّعْتَر \*

Polyommatus mealeger (S). فراشة من الهرض، تطول نحو ٣٦ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية الالامعة يطوقها حثار اسود وتهديب ابيض. رواشن اناثها الى الطحلة الصفراء المواج يطولها تنقيط اسود وتنقيج اسمر. قواعدا زرق الانتشاب اطرافها غير الهديب || ريقها ناهمة تركب الصعتر وسائر النباتات البرية.

## ٢٩٨٢٣ - هَرَضُ العَرْن \*

Polyommatus dolus (S). فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٢٥ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية المواج يطوقها حثار اسود واطار من المذهب الابيض. رواشن اناثها الى الحطلي الاصعب المواج يطولها تنقيط دقيق اسود ويطوقها حثار مهدب اغير. || ريقها تركب اوراق وسنت العرن والقصة.

## ٢٩٨٢٤ - هَرَضُ القَصَّة \*

Polyommatus eros (S). فراشة من الهرض. جسمها يطول نحو ٣٠ م. رواشن ذكورها الى الزرقعة النارية المواج يطوقها حثار اسمر يتخلله بنض النقط اسود واطار مهدب ابيض. رواشن اناثها حطوية اللون زرقاء المواج يطولها تنميش وتنقيط وتنقيج واطار من المذهب الابيض. || ريقها تركب معظم نباتات المراعي اخصها القصة.

## ٢٩٨٢٥ - هَرَضُ القَطَانِيَّات ٥

Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon, P. des légumineuses (F). Polyommatus coridon (E). حشرة من فصيلة القنيتان ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. فراشها جارية قوتها رقيق الانهار. سرتها تعيش على اوراق القطنيات وجوبها قبل ان تبلغ الادراك التام || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م. بسطها نحو ٣٤ م. رأسها معتدل الحجم. عينها كيرتان. زياتها صرطانياني. جوشها ازرق اللون عند الذكر، كستنيته عند الانثى. بطنها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقعة يطولها مواج فضي وبنق كستنيته وخطوط سود. رواشن الانثى الى السرة الكستنيته يطولها في الزوج الالامي تهديب ابيض تبرزه خطوط حطوية، ويكتنفها في الزوج الخلفي حزام نصفي اللون من النقط احمر يتوسطها الاسود || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في النهار: تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان ميحاديها على الصفحات السفلى

ثوبه الى الزرقاء السمراء المواج، يلقه اقل مرة واكثر يياضاً . يتميز بفكيه المستطيلين وزعانفه الصدرية المستعرضة . قوته الاسماك والقشريات . || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقية .

#### ٢٩٨٤١ - هرْكُولُ القُطْبُ

*Balaenoptera borealis* (S). Rorqual boréal (F).  
نوع من الهراكلة . طوله نحو ١٥ م . يتميز بصغر زعانفه الظهرية والصدرية . يعيش اسراباً كبيرة العدد . قوته السمك والقشريات والرخويات والحث . || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب ، في بعض فصول السنة ، من شطوط ايسلندا والرويج .

#### ٢٩٨٤٢ - هرْكُولُ حَبْرَوَسِي

*Balaenoptera rostrata* (S). Rorqual à rostre (F).  
اصغر انواع الهراكلة . طوله يراوح من ٧ الى ١٠ امتار . ظهره الى الكهية السمراء المواج . يلقه الى البياض الكدر . زعانفه الصدرية سمير القواعد والاطراف يبيض القسم الاوسط . قوته الاسماك دون سواها . || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار الروج وقد شوهد في المتوسط .

#### ٢٩٨٤٣ - هرْكُولُ مَعْرُوفٌ \* ، مَتَارَةٌ

*Balaenoptera musculus* (S). Rorqual commun (F). Finback, Finner (E).  
نوع من الهراكلة . طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م . ظهره احمر اللون ، رصاصي المواج . يلقه الى البياض الكدر . موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط . يعيش جماعات . سره يبعد من ١٥ الى ٢٠ نفراً . قوته السمك والقشريات يرافق اسراب الزنكة حيث تتجه .

#### ٢٩٨٤٤ - هرْكُولِيَّاتٌ °

*Balaenopteridae* (S). *Balaenopteridés* (F). *Balaenopteridae* (E).  
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة فصليحات الاخنك ورتبة الحويطات || انواعها المعروفة عشرة ، جميعها كبيرة الجرم ضخمة . اشهرها الهرْكُولُ الازرق والهرْكُولُ الحزوي وهرْكُولُ القطب والهرْكُولُ المعروف الذي يدعى منارة وكعبة الجنوب وكعبة الخليج وكعبة القطب المعروفة بجمل البحر .

#### ٢٩٨٤٥ - هَرَمٌ

الهرم : ضرب من الحفص فيه ملحوة وهو اذله واشره انبساطاً على الارض واستطاحاً . ا . م .

#### ٢٩٨٤٦ - هِرْمِلَةٌ

*Trite* (F).  
هي التروعة ، من اسماك المياه العذبة . اطلها .

#### ٢٩٨٤٧ - هِرْفُوسٌ °

*Hemipter* (S). *Hémiptère* (F).  
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القديات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيبة الشكل ، مستحججة ، تقو من ٤٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة طولها زخارف واطراف متباعدة الاشكال عديدة . اشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية والصدرية والشرجية كبيرة ، كثير الناحس الحادة . زعانفها الحوضية صغيرة ، والذيلية مقطوعة . اذواها الى الرتبة الرصاصية الملاج يملوها في ظهورها تبتجج اسمر . رؤوسها حفراء اللون فضلة باخضلي الاسمر || لحوها كاعنة الصفن .

نوع من الكحول جيد الصنف . وقد تستعمل اوراقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشهر انواعها ما يلي .

#### ٢٩٨٣٥ - هِرْقَلِيَّةٌ اِيْرَانِيَّةٌ \*

*Heracleum persicum* (S). Berce de Perse (F).  
نوع من الهرقولة المعمرة القواعد العرف المستحب . مهدا بلاد ايران . يجلبها تملو من مرتين الى ٣ امتار . اوراقها مركبة . فصوصها ذرية . نصلها عابق الخضار الالسن . ازهارها كبيرة القد ، يضاء اللون . اوراقها وتمازها صناعية يستفطر منها عطر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال . || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

#### ٢٩٨٣٦ - هِرْقَلِيَّةٌ زُغْبِيَّةٌ ، هِرْقَلِيَّةٌ صَمْغِيَّةٌ

*Heracleum pubescens*, *H. gummiferum*, *H. speciosum* (S). Berce douvete, B. pubescente (F). Downy cow-parsnip (E). *Flaumiges Herkuleskraut* (D). *Panace* (I).  
نوع من الهرقولة المعمرة القواعد العرف . مهدا بلاد القفقاز . يجلبها تملو من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم . ساقها زغبية اللحاء . اوراقها مركبة . وربانها كبيرة القد . نصلها شائك الحافة ، اخضر الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهارها الى البياض الكدر . || سويها تنضج عند حرها او قلها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزيلة النفع . ويستخرج منها ومن اوراقها مادة كحولية شائعة الاستعمال . تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

#### ٢٩٨٣٧ - هِرْقَلِيَّةٌ صُرْبِيَّةٌ

*Heracleum lanatum* (S). Berce laineuse (F).  
نوع من الهرقولة المعمرة . مهدا امريكة الشمالية . يجلبها تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . ساقها وفروعها زغبية اللحاء . اوراقها قلبية الفصوص المسننة الحافة . نصلها اخضر الصفحة العليا ، ازغب السفلى . ثمارها صغيرة القد . تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

#### ٢٩٨٣٨ - هِرْقَلِيَّةٌ نَافَعَةٌ \* ، سَقَنْدَلِيُونٌ ، غُطْلٌ

*Heracleum sphondylium* (S). Berce branche-ursine, Patte d'ole (F). Meadow parsnip, Cow-parsnip, Hogweed (E). *Heilkrout*, *Weisenherkuleskraut* (D). *Spondilio*, *Panace erculeo*, *Zampa d'oca* (I).  
اشهر انواع الهرقولة واكثرها انتشاراً . تعتبر من النباتات الضارة لان عناصرها الطبيعية جحالية تؤذي المواشي التي تاكل اوراقها . ومع ذلك فزراعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اوراقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة .

#### ٢٩٨٣٩ - هرْكُولٌ

*Balaenoptera* (S). *Balénoptère*, Rorqual (F). Rorqual, Fin whale (E).  
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويطات . انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢ . جميعها كبيرة القد ، وشعيبة الشكل ، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزام الاول من الجسم . اعناقها مستطيلة التضخيد . زعانفها الظهرية محببة الى الورد . زعانفها الصدرية ذرية الاطراف . موطنها جميع البحار تجوبها في طلب المصيف والمشي .

#### ٢٩٨٤٠ - هرْكُولٌ اَزْرَقٌ

*Balaenoptera sibbaldi* (S). Baleine bleue, Rorqual de Sibbald (F).  
اكبر انواع الهراكلة واخصها جنة . طوله نحو ٢٦ م .



هرقولة إيرانية



هرقولة ناعمة



هرْكُولُ معروف



هرموس





هرنة الشروشور



هرندي



هرنوع اسفغ



هرنوع برتقالي



هرنوع جامد



هرنوع خيبنت

٢٩٨٦٠ - هَرْنُودِيَّات (S).  
Hernandiaceae (F). Hernandiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة العائلات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اعطائها بعض المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، فروعها اوراقها معنقة، متعاقبة، جامدة النصال القلبية الشكل او البيضية. ازهارها عثكولي التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او نيتية. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هَرْنُوع، هَرْنُوع، هَرْنُوع، بُولِيْطُس  
Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).

جنس فطور من فصيلة السميات الفشالية. انواعه كثيرة العدد تألف الغابات والاحراج الظليلة اغصها حراج السنديان. بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جحالي ضار او كثير الاذى. اشكالها واجناسها والوانها مختلفة، جميعها قلنسوية المسائل الجامدة اللادة || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هَرْنُوع اسفغ \*  
Boletus aereus (S). Bolet bronzé (F).

نوع من الهرنوع المأكول. يعيش ويتكاثر في التربة. ساقه غليظة القد، وردية اللون. عسقلانه كبير القد، فارش القلنسوة، كسني اللون، اسفغ المراج. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٣ - هَرْنُوع البقر  
Boletus bovinus (S). Bolet des bœufs, Albarelle (F). Boletus bovinus (E).

نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السميات الفشالية. يعتبر من الفطور المأكولة. يعيش على اشجار الحور والكستناء || جذعه اسطوانية الساق المنصبة. عسقلانه كبير، فارش، جامد اللحمية، حنطي اللون، اصفر المراج. مكسره الى البياض التي ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٤ - هَرْنُوع بُرْتَقَالِي \*  
Boletus aurantiacus (S). Bolet orangé (F).

نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم. يعيش على جذور السنديان. ساقه غليظة. عسقلانه كبير القد، برتقالي اللون، وزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٥ - هَرْنُوع جَامِد \*  
Boletus scaber (S). Bolet rude, Roussille (F).

نوع من الهرنوع المأكول المستحب الطعم. يعيش على جذور السنديان. جذعه ييشي الشكل. عسقلانه كبير القد، جامد اللحمية، حنطي اللون، اطبل المراج. مكسره ابيض اللون يبقى على حاله او ينحرف قليلاً الى الوردي عند تأكده من الهواء.

٢٩٨٦٦ - هَرْنُوع خَيْبَت \*  
Boletus luridus (S). Bolet pernicieux, B. bième (F).

نوع من الهرنوع الجحالي اللادة، حريف الطعم، مر المذاق. ساقه غليظة حراء البشرة. عسقلانه كبير القلنسوة القارشة، حنطي اللون، اسمر المراج. مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرقه عند تأكده من الهواء.

Pyramidal (F).

٢٩٨٤٨ - هَرَمِي  
نمت وصني يطلق على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هَرَمِيْس  
هو الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هَرَمِيْسَكَة  
انثى الحيقطان.

٢٩٨٥١ - هَرَمِيْسِيُوم \*  
Hormiscium (S).

جنس فطور مجهرية من الدغيات وفصيلة الطحيسيات. سميجها موقور التركيب. جبرها الكنديية سميجية الانظام، منعقفة الاطراف، ملونة اللادة. || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد العضوية والتبائية السائرة الى الانحلال.

٢٩٨٥٢ - هَرَمِيْلَة \*  
Hermella (S). Hermelle (F). Hermella (E).

جنس ديدان حلقيه قصاية من فصيلة الهرمليات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنقطع عنها المياه، ضمن انايب عرودية الارتكاز تصم فروعها بملاحسا الرأسية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هَرَمِيْلِيَّات \*  
Hermellidae (S). Hermellidés (F). Hermellidae (E).

فصيلة من الديدان الحلقيات القصابة. اجناسها المعروفة قليلة العدد موطنها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الباردة والمعتدلة الحرارة || اشهر اجناسها الهرميلة.

٢٩٨٥٤ - هَرَمِين  
هو القاقم، حيوان من السراعيب.

٢٩٨٥٥ - هَرَمِيْسَة  
مشي الدودة.

٢٩٨٥٦ - هَرْنُوع  
Ricin (S).

الواحدة هرمنة. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرمليات. انواعها عديدة تركيب الطيور الجوامع. جميعها ذرية القد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الارياغ، متباعدة الهلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرمنة الشروشور.

٢٩٨٥٧ - هَرَمِيْسَة الشروشور \*  
Ricin (S).

حشرة جلدية من الهرم. طولها نحو ٣ م. رأسها مبط المقدم. تأثيرها قوية، زيانهاا جدعة. بطها ييشي الشكل. || تركب الشراشير والعصافير الفريدة فتؤذيها وقد تضيها.

٢٩٨٥٨ - هَرَمِيْعِيَّات \*  
Ricinidae

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مفلطحة، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. تعثر الطيور الجوامع اغصها الشروشور والعصافير الفريدة || اشهر اجناسها الهرم.

٢٩٨٥٩ - هَرَمِيْسِي \*  
Hernandia (S). Hernandie (F).

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهرندديات. انواعه المعروفة سبعة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، منعقفة، قليلة النصل الجامد المحذب الصفحة. ازهارها عثكولية التجميع، طريقة الارتكاز. ثمارها مسهلة. اغشائها صناعية. تقع اوراقها منشط شايق يستعمل حقناً بالسرم.

٢٩٨٧٤ - هَرِيَّات ، قِدِيَّات (F). Amentacées (F). Amentaceous plants (E).

هي النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل حريرة أو قِدَّة لذلك فالجوزيات والبقيصيات والسندانيات إلى آخره جميعها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هَرِيَّاع (F). Feuilles mortes (F). Dead leaves (E).

الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هَرِيْرَة ، قِدَّة (F). Chaton (F). Setting of a gem (E). نظام هجرة قوامه سنبلة مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيْصَة (F). Mare d'eau stagnante (F). Pool (E). مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيْعَة (F). Peltaria (S). Peltaire (F). جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة السيلبيات . أنواعها المعروفة أربعة أعطانها الشرق الاوسط واروبة الشرقية . أوراقها متعاقبة . أزهارها عنقودية التجميع ، طرية الارزكاز . ثمارها خريدلية مبطلة || أشهر أنواعها هريعة الثوم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيْعَة الثوم \* (F). Peltaria alliacea (S). Peltaire alliaire (F). Sheldwort (E). Knoblauchschelbenkraut (D). Peltaria (I). نوع من الهريعة المبدولة للمعمر . أوراقها متعاقبة بيضية الشكل حاضنة ، فصلها عايق الخضار البحري ، ناشر الاصباح . أزهارها بيضاء اللون || أوراقها ذوبية الرائحة عند المس . يقال أنها طرية تغيد المعدة وتطهر الامعاء .

٢٩٨٨٠ - هَرَاو (F). Luscinia, Philomela (S). Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الغدليات . انواعه ثلاثة الهزار الاشرق والغدليل والمزقة . اجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاحظ . اجنحتها واذناتها متوسطة الحجم . ارساغها طويلة . اصابعها نحلة . اطافرها ضميعة . ألوانها جميلة الالوان المتخالفة المتراكبة || جميعها فريدة تألت المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحضيف والمشي . تدن في الادغال وقد تركر عشها على الحضيف بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَرَاو أَشْرُق \* (F). Philomela major, Luscinia luscina (S). Rossignol progné (F). Sprosser, Thrush nightingale (E).

نوع من الهزار . نقرته قريبة الشبه من نقرعة الغدليل الا أنها لا تضاهيها بالركة وبجس الالان وتعداها || طوله نحو ١٨ سم . ثوبه الى الخطي الاصهب الموج . صدره وبطنه الى البياض الاكدر . اجنحته منقطة بالاسمر . مناقره حنثلي للملقت الاعل . اصفر الاسفل . ساقه واصابعه الى الصفرة الخطية || قوته الحشرات . يدن في الادغال . انثاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٢٩٨٨٢ - هَرَاو غَرِيْد (F). Grenier (F).

٢٩٨٨٣ - هَرَاوَجَشَاَن هو نبات الفاشرين ، اطليه .

٢٩٨٦٧ - هَرْتُوَيْ لَئِيْد \* ، بوليْطس كماة

Boletus edulis (S). Bolet comestible, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelhöhrling (D). Boletus comestibile (I).

اشهر انواع الهرنوع المأكول . لذيق الطعم ، مستحب المذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الاشجار الحرجية اخصها السديان . عقلانه قلنوسى الشكل ، كبير القد ، جامد اللحمية ، لونه الى البياض الاكدر الاصفر الموج . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكده من الهواء .

٢٩٨٦٨ - هَرْتُوَيْ نِيلِي \* (F). Boletus cyanescens (S). Bolet indigotier, B. bleuisant (F).

نوع من الهرنوع الجمالي المؤذي المر المذاق . ساقه غليظة حراء اللون . عقلانه كبير القد قريب الشب من عقلان الهرنوع الاسفع . مكسره ابيض اللون ينحرف الى الزرق النيلية عند تأكده من الهواء .

٢٩٨٦٩ - هَرْتُوَيْ \* ، هَرْتُوَة (F). Apera spica-venti (S). Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass, Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I).

نبات عشبي بري مرعوي معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البرية الملساة .

٢٩٨٧٠ - هَرِيْس \* (F). Heliornis fulica (S). Héliorne (F). Heliornis (E).

طائر وحيد الجنس والتوقع من فصيلة التفلقيات . قريب الشبه بالقطاس وبالفرقة . يألف المستنقعات والبحيرات وصفات الانهر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه ويقصر ذنبه المستدير . رأسه معتدل الجرم . منقاده ضليع مدب الطرف . جناحا فارشان ، لائحان . ساقه قصيرتان . اصابعه مستطيلة محظية تمكته من السير على الاعشاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الاسود والاسمر . ثوبه السفلي الى البياض الاصفر . رأسه وعنقه بلون الصفرة تملوها جذة سواد اول تمتد من قاعدة المنقاد الى الرءاء . وجدته ثانية تمتد من طرف العين الى الظهر || يدن عشه على ضفاف الماء بين القصب والاسل . الانثى تحضن وحدها نحو ١٢ بيضة بينا الذكر يؤين لها الغذاء . الترخم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٨٧١ - هَرَهَرَة (F). Bèlement (F). Bëatement (E). صوت الفسان .

٢٩٨٧٢ - هَرِهِيْر (F). Pemphéride (F). جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد ، أعطانها بمجاو البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد مفلطحة . عيرتها مستديرة كبيرة ، أثوابها الى السمرة . ظهورها بنفسجية الموج . بطونها فضية . حومها مأكولة تعتبر من الاصناف العادية .

٢٩٨٧٣ - هَرِي (F). Granary, Corn-loft (E).

هو الابنار ، مستودع رحب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج . أهراء .



هَرْنوع لَئِيْد



هَرْنوع نِيلِي



هَرْنُوِي



هَرِيْس



هَرِيْعَة الثوم



هَرَاو أَشْرُق



هَرَّان



هَسَّاس جِلِي



هِسِير الْحَبَاوِيَات



هِسِير الشَّيْلَك



هِسِير الْعَوْسَج



هِسِير الْقَرَاوِين



هِسِير الْقَرْطُوم

## ٢٩٨٩٠ - هِسِير ٥

*Hesperia (S).*  
جنس حشرات من فصيلة الهسيريّات. أنواعه المعروفة كثيرة العدد أما الصّارة فقليلة. فراشاته صغيرة القُد طولها براوح من ٢٣ إلى ٣٣ سم. أجسامها مزرقة الشكل. أوتابها إلى السّرة. رواشها مزرقة وبقيّة. مكّنها كروي الشكل يتمتع على صفحات الأوراق السفلى. أشهر أنواعها وأضرها ما يتبع.

## ٢٩٨٩١ - هِسِير انْخَبَازِيَّات ٥

*Hesperia malvae (S). Plain-chant (F).*  
حشرة من الهسير. فراشها صغيرة القُد طول نحو ٢٣ سم. نوها إلى السّرة السوداء تعلوها ماجة غفيرة. رواشها ذكورها وأناثها قريبة للشبه لا يفرقها سوى اتساع التّبيّج الأبيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وأيار وفي تموز وآب. يرقاها مؤذية تركب الحباويات والنباتات والشجيرات والمروج.

## ٢٩٨٩٢ - هِسِير الشَّيْلَك ٥

*Hesperia serrataulæ (S).*  
حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٢٦ سم. نوها إلى السّرة الخنطية. رواشها ذكورها إلى الخنطية يطولها تبيّج وتبيّج أخضر. رواشها أنثاها كستنية اللون يتخللها تبيّج وتبيّج أبيض. يكثر وجودها في نيسان وآب. يرقاها مؤذية تركب أوراق الشجيرات.

## ٢٩٨٩٣ - هِسِير الْعَوْسَج ٥

*Hesperie des ronces (F). Hesperia sao (E).*  
حشرة من فصيلة الهسيريّات ورّبة حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشها واسعة نوها رقيق الانزعاج. سرقها تعيش على أوراق المروج والبلان. جسمها صغير القُد يطول نحو ١٠ سم. بسطها نحو ٢٣ سم. رأسها كستني اللون. عيناها كيرتان. زباناها صولجانيان. جوشها وبطنها إلى الكستني القاتم. رواشها الذكر إلى السّرة الكستنية تعلوها رشفة بيضاء. رواشها الانثى أقل لمّة وتزويّقاً. لها جيلان في الخول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في النهار. تماطل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتّع المكان مباحداً على اهان الأوراق ونصالحا. السّرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٠ سم. جسمها أسطواني الشكل. مائل للشار، أحمل اللون، أصفر المواجه، جوي الرأس، اسمر اللدب والرواجب. في طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينتضي ضمن صلبة تحميها السّرة بين الأوراق.

## ٢٩٨٩٤ - هِسِير الْقَرَاوِين ٥

*Hesperia proto (S).*  
حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٣٠ سم. ذكورها وأناثها متساويان في القُد. نوها اسمر اللون كستني المواجه. رواشها مزرقة وبقيّة وهي في الذكور زاهية الالوان المركزة على الخنطية الاخرى. يكثر وجودها من حزيران إلى تموز. يرقاها تركب القراوين وسائر النباتات الحبازية.

## ٢٩٨٩٥ - هِسِير الْقَرْطُوم ٥

*Hesperia carthami (S).*  
حشرة من الهسير. فراشها تطول نحو ٣٠ سم. نوها إلى

٢٩٨٩٤ - هَرَّان \* *Opisthocomys (S). Hoazin (F).*

جنس طير من فصيلة الغرائسيات. أنواعه قليلة تتميز بألوانها المستحقة التي تشبه رائحة التيس. جميعها مستطيلة القُد الرقيق، قوية المخار، قزعية الرأس، نخلة العنق، مستدرة الاجنحة، مستطيلة الذليل، أوتابها إلى السّرة السوداء يعلوها نأزير أبيض وتوشج وتوشج. عنقها وجوشها إلى البياض البتي. تألف الاحراج. تمشج اسراب كبيرة. قوتها النار. تدرّش عشا، في الاغسال والاشجار المنقبة، فرق الماء. أناثها تبيض نحو ٤ بويضات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

## ٢٩٨٩٥ - هَرَّان

من اسماء الاسد المشهورة.

## ٢٩٨٩٦ - هَرَّوُوج

*Pied du champignon (F).*  
هو ساق الفطر.

## ٢٩٨٩٧ - هَسَّاس

*Pelidna (S). Pélidne (F). Pelidna (E).*

جنس طير من دجاجيات الارض. أنواعه المعروفة قليلة العدد. جميعها من القوط. أجسامها صغيرة القُد، قريبة الشبه من الجهلول. أوتابها إلى الرّبة الخنطية، تبيّج وتقرّش بالاسمر في الظهر والجناح، وتزهر وتبيّض في العنق والجوشن والايّط والبطن. متألّها مستطيلة، دقيقة. اذنانها قصيرة. اجنحتها لاسفة. قوتها الحشرات والديدان والحلزون والرخويات. اعراف أنواعه وأشهرها المحاس الجيلي.

٢٩٨٩٨ - هَسَّاس جَبَبِي \* *Jehhoul el-sharqi*

*Pelidna alpina, Tringa subarcuata (S).*

*Pélidne alpine, Bécasseau corcori (F).*

*Curlew-Sandpiper (E).*

طائر من المحاس. اعطاهه فسيحة الارياض تمتد من اليابان إلى اوروبية. مصيفه جبال البلاد المعتدلة الحرارة. مشتتاً ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر ويصر والسودان والجنّة. جسمه صغير القُد. طول نحو ١٦ سم. ثوبه إلى الرّبة الخنطية. ظهره عايق اللون يعلوه تميم اسمر وأخضر. عنقه وجوشته وبطنه إلى البياض الاخر يعيق بعض التي في الصدر. متقاده اسمر اللون، رصاصي المواجه. عيناها إلى السّرة الكستنية. يبدن في اقحوص قليل العنق، صاحي الشكل، يبطنه بانهم الحائش. حشسته من ٣ إلى ٤ بويضات ترخلها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوماً.

## ٢٩٨٩٩ - هِسْبَة ٥

*Hispa (S). Hispe (F). Hispa (E).*

جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وفصيلة النصاريات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. أجسامها صغيرة القُد تطول من ٧ إلى ١٠ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. قزونها الاستشعارية خيطية منتصبة. كواسلها وانغادها وحواشي بطونها مدرزة بالشوك اللدقيق الخاد. اتحادها شبه نجية الشكل مستدرة المؤخر الاذن. أوتابها متباينة الالوان والمواجه، يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجروي ثم الكستني والبي.

(١٦٩٥-١٧٢٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة الفويات. أعطائها البلاد الامريكية. جميعها اشباب سريوية ممره. اوراقها متقابلة. ازهارها قمية الشكل، مستطيلة المالحق || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٢٩٩٠٣ - هسپيرنته أرجوانية

*Houstonia purpurea* (S). *Houstonie purpurine* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضيه النصل، صغيرة القد، ثلاثية أو خماسية الفلوع. ازهارها ارجوانية اللون، هامة الارتكاز. تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

### ٢٩٩٠٤ - هسپيرنته ترشاهية

*Houstonia coerulea* (S). *Houstonie-bleue* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها بيضيه أو اخلاصية النصل، صغيرة القد، فردية الفلوع. ازهارها الى الزرقه البنفسجية المواج. ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

### ٢٩٩٠٥ - هسپيرنته صغريه الورق

*Houstonia serpyllifolia* (S). *Houstonie à feuilles de serpolet* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها ضمية تحيلة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها كاوراق الصغري البري شكلا وقد ولوا. ازهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنورها يستمر من ايار الى آب.

### ٢٩٩٠٦ - هسپيرنته

*Hister* (S).  
جلس حشرات مقترنة من فصيلة الهسپيريات. انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٥ الى ١٥ م. الوها الى السواد الاعم يملو تنقيط وتبييض اخر || يرقاها قانصة مقترنة لا تمتع من كل حشرة تستطيع اليها سيلا. اشهر انواعها :

*Hister purpurascens* (S). هسپيرنته احمر الغمد

*Hister uncinatus* (S). هسپيرنته احمر النقطة

*Hister quadrimaculatus* (S). هسپيرنته رباعي النقط

*Hister inaequalis* (S). هسپيرنته لا متساوي الفك

### ٢٩٩٠٧ - هسپيرنته أحمر الغمد

*Hister purpurascens* (S). *Hister pourpré* (F).  
*Hister purpurascens* (E).

حشرة نائلة جاسة من فصيلة الهسپيريات ورتبة غديات الاجنحة. تألف المراعي وجوانب الطرقات والمواق القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه الروث والزبل والقمامة || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م. ثوبا الى السواد العايق غمداه الى الحمرة الارجوانية. راسها صغير الحجم. عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان. ظهرها سداسي التخديف الغمدى، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية النقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الاجلانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تصادف في اوائل آب وتختبئ المكان في اكرام الزبل ... || البرقة عند كمال نموها تقول نحو ١٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، اغبر اللون، كسني الرأس والشرج والرواجب، مثلث الجانبين، مهدب الفلوع.

السمة السوداء المواج. رواشن ذكورها غراء اللون، خضر الزراكش والتبايع والتجاذيع. رواشن اناثها الى السمة يملوها بفتح ابيض. يكثر وجودها من ايار الى آب. يرقاها تركيب القرطم وسائر الخيازات.

### ٢٩٩٩٦ - هسپيرنته، زهرة الخبيز

*Hesperantha* (S). *Hespérante* (F).  
*Hesperantha* (E).  
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السوسنيات. منتبها بعض مناطق افريقية الجنوبية. اوراقها ثنائية الصف، ضيقة النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، فواحة العرف المعطري تفتتح عند غروب الشمس || انواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

### ٢٩٩٩٧ - هسپيرنته زباء

*Hesperantha pilosa* (S). *Hespérante velue* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها خلية ومزغبة. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

### ٢٩٩٩٨ - هسپيرنته قرفية العرف

*Hesperantha cinamomea* (S).  
*Hespérante à odeur de cannelle* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها جرداء مخددة السطح. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها صغيرة القد، قرفية العرف. بتلاتها الاخارجية الى الحمرة الخمرية. بتلاتها الداخلية يصفاه اللون || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

### ٢٩٩٩٩ - هسپيرنته منحنية

*Hesperantha recurvata* (S).  
*Hespérante recourbée* (F).  
نوع من الهسپيرنته. ساقها شراخية شيطلة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. ازهارها سنبل التجميع. ازهارها كبيرة القد مخددة الانابيب، حر البتلات الخارجية، بيض الداخلية || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

### ٢٩٩٠٠ - هسپيريات

*Hesperilidae* (S).  
*Hespéridés, Hespéridés* (F). *Hesperilidae, Common*

*Skippers* (E). *Dickkopfläuter* (D).  
فصيلة حشرات من سرخشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. رؤسها غليظة. قربها الاستشعارية دقيقة منفرجة. ارجلها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكها قلنسوي الشكل. يرقاها عارية او مبشرة الحلب، مستدقة الاطراف، ضخمة الوسط. خادراتها تلحف بقلاف رقيق الصفحة متين الحياك يشبه الشرفة تنسج بين الاوراق المتشابكة || اشهر انواعها واصرها باللاتصااد الدرامي الهسپير والتزيين والياروز واليانوف والكركرود.

### ٢٩٩٠١ - هسپيرنته

*Funkie* (F).  
هي الفكنة، نبات من الزنبقيات. اطلبها.

### ٢٩٩٠٢ - هسپيرنته

*Houstonia* (S).  
*Houstonie* (F).  
جنس نباتات مقنودة التعريف على اسم العلامة هسپير



هسپيرنته



هسپير



هسپير احمر الغمد

## ٢٩٩٠٨ - هستير رباعي النقط \*

Hister quadrimaculatus (S). Hister à 4 points (F).  
Hister quadrimaculatus (E).

حشرة ثالثة جاسنة من المستيريات ورتبة مغذيات الاجنحة. تألف المزارع والمواقع القريبة من العمران لانها تعيش على الخث والروث وفي المزاليل || جسمها صغير القند يطول من ٨ الى ١١ سم. ثوبها الى السواد اللامع يعلوه في كل غمد بقعتان ارجوانيتان. رؤساها صغير الجرم ، ضليح القنكين. زياتها صولطانيان. عينها صغيرتان. ظهرها رباعي التخذيد الغمدي ، يلحف ثلاثة ارباع البطن. ارساغها خماسية العقول || الاثنى اصغر قدأ من الذكر واهت ثوبا منه واقتصر زياتا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تساقط في اواسط شهر آب || البرقة عند كمال نموها تطول من ١٨ الى ٢٤ سم. جسمها مردني الشكل ، اغبر اللون ، اسود الرأس والشرج والرواجب. مثلل الجانبيين الايمن والايسر.

## ٢٩٩٠٩ - هستيريات \*

Histeridae (S).  
Escarbots, Histeridés (F). Steel beetles, Hister beetles (E). Stutzkäfer (D).

فصيلة حشرات مفترسة ناعمة من رتبة غديات الجناح. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القند لامة الثوب. قرنها الاستثمارية مرفقية الشكل دوسية الطرف. جرابها الانامية مجهزة الحفر. ريقاتها مفترسة تعيش في انفاق تخلفها في المواد المنسوية وتحت لاء الانجار اليابسة. اعرف اجناسها واشهرها المستير والحتروس والغطوس والصبرين.

## ٢٩٩١٠ - هشاب

Acacia du Sénégal (F).  
هو سبط السقال ، اطلبه .

## ٢٩٩١١ - هشار \*

Echinaria (S). Echinaire (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوفها كثيرة الاشطاء . عصفها ضيق ، مستطيل ، شخن اللمس . ازهارها سنبل ، سابلها مركبة متبادعة .

## ٢٩٩١٢ - هشاش \*

Malacophage (F).  
Malacophagous (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او طائر قوته الرغويات واللدنان . الحلف طائر هشاش .

## ٢٩٩١٣ - هستة

Hechtia (S). Hechtie (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة جادسة من فصيلة الانناسيات . اوراقها قرصية الالتشاب عصفية الشكل ليفية الصفحة الجامدة . نصلها ملون الصفحة العليا ، اغبر السفل ، شالك الحافة . ازهارها شرخايرة الارتكاز ، لاتياسية التجميع . اشهر انواعها ما يتبع .

## ٢٩٩١٤ - هستة فضية

Hechtia argentea (S).  
Hechtie argentée (F).  
نوع من الهسته . عصفها يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. نصلها فضي اللون على صفحته . اشواك حنارها كوكبية التجميع عجنة الاطراف . شرخايرة فردي . ازهارها غمية ، هامة الارتكاز ، بيضاء اللون . ازهارها صبي .

## ٢٩٩١٥ - هستة كنفدية

Hechtia glomerata (S). Hechtie à glomérules (F).  
نوع من الهسته . عصفها يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا يحمر مع التقادم . اشواكها كوكبية التجميع عجنة . ازهارها غمية ، رتاجية ، بيضاء اللون ، تقوم على شرخين او ثلاثة شرخين تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها يستمر طوال فصل الصيف

## ٢٩٩١٦ - هشير ، هشور

نعت تعريفي يطلق على الانجار النغيفة التي يسقط ورقها سرياً .

Feuille de plante herbacée (F).  
ورقة كل نبات عشبي مهما كان نوعه .

## ٢٩٩١٨ - هصور \*

Halosaurus (S).  
Halosaure (F). Halosaurus (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وقصيلة الصابونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، ضيقة ، معتدلة التطييط . تطول نحو ٤٠ سم. رؤوسها صغيرة شبه ودية الشكل . فكوكها العليا تتقدم السفلى . زعانفها الظهرية شرابية الشكل ، الحوضية مروحية ، الصدرية صغيرة . الشرجية مستطيلة تمتد حتى طرف الذيل العادم الزعنفة . اثوابها قضية تمبق بعض الشيء في الظهر || لحوبها مأكولة انما مبتلة .

## ٢٩٩١٩ - هصون \*

Hussonia (S). Hussonie (F).  
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة || سوفها قرعاء قليلة الغذاء . فروعها عاضة الزغب . لوراقها متناقبة ، احادية التفصيل الريشي او ثنائيتة . ازهارها صغيرة ، خطية البتلات ، ثنائية اللون || تنويرها صيفي .

## ٢٩٩٢٠ - هصام ، هصوم

Digestif (F).  
Digestive (E).  
المضام والمضوم هو ما له قوة الهضم التي تحول الاغذية وتجعلها قابلة للتشيل .

## ٢٩٩٢١ - هصامة ، قاعوسيت

Phagocyte (F).  
خلية في الجسم الحيواني تتمدد على الجسبات العضوية وغير العضوية تقتضي عليها .

## ٢٩٩٢٢ - هضم

Digestion (F).  
جماع الاعمال الطبيعية الميكانيكية والكبائية التي تحول عناصر الغذاء الى مواد تمثيلية يستفيد منها الجسم .

## ٢٩٩٢٣ - هضمون

Peptone (F).  
هي المواد الاحية المحضرة . راجع بيتون .

## ٢٩٩٢٤ - هضمين

Pepsine (F). Pepsin (E).  
هي خيرة الهضم في عصارة المعدة وهي التي تحول المواد الاحية الى هضمون . راجع ببسين .

## ٢٩٩٢٥ - هفيل \*

Ananthe (F).  
هفيل م. هفيلة ، نعت تعريفي يطلق على كل نبات عديم الازهار .



هستير رباعي النقط



مصور



هَظْلَة



هَفَة جَزَارَة



هَفَة سَرَوِيَّة



هَفَة سَرَوَة



هَفَة عَطْلَاة

٢٩٩٢٦ - هَظْلَة \*  
Péluat (F).  
Peculation, Embezzlement (E).  
الهَظْلَة سرقة الأموال الأميرية من قبل المولى بمجانبها .

٢٩٩٢٧ - هَظْلَة \*  
هو الخُطْي القرمزي ، اَظْلَب .

٢٩٩٢٨ - هَظْلَة \*  
Eupomatia (S).  
Eupomatie (F).

جنس نباتات جنينية بيرة وتزيينية من فصيلة الهَظْلِيَّات .  
لها نوعان فقط الهَظْلَة الغارية والشرقية . اصطلاحاً تمتد  
من الهند إلى الجزائر فاسترالياً || ساقها مرطاة قليلة الفروع .  
أوراقها متعاقبة ، منعقة ، اهليلجية النصال الجامدة  
الزاهية الخضار . أزهارها كبيرة ، فردية ، حيلة الشكل ،  
حمر اللون أو صفراء ، محورية الانتساب أو طرفية .

٢٩٩٢٩ - هَظْلِيَّات \*  
Eupomatiaceae (S). Eupomatiacées (F). Eupomatiacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة العائلات . اجناسها  
وانواعها قليلة العدد اعطائها تمتد من الهند إلى اليابان  
واستراليا || جميعها شجيرات وجنبسات . سوقها مرطاة .  
أوراقها منعقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصال . أزهارها  
فردية ، كبيرة ، لسينية الثلاث العددية ، حيلة الألوان  
الزاهية || أشهر اجناسها الهَظْلَة .

٢٩٩٣٠ - هَف \*  
Athérine (F).  
هو الحساس ، من الأسماك الصغيرة ، اَظْلَب .

٢٩٩٣١ - هَفَة المَوسَط \*  
Sauclet  
سمكة بحرية تدعى قفوش ، اَظْلَبها .

٢٩٩٣٢ - هَفَة جَزَارَة \*  
Ephra macellaria (S).  
ذبابة مسخرة من الهَفَات . طولها نحو ٣ م . ثوبها إلى  
الأخضر النحاسي اللامع . اجنتها وأرجلها إلى الصفرة .  
تمشي على سطح الماء ، يكثر وجودها في مناطق الارز حيث  
تأتي بمكبها الذي يتفح عن رقات تعيش على المواد العضوية  
وقد تثبتت بجلود الارز وبذيراتها فتمتصها عن كامل  
تطورها الثشوي فتسبب تأخير النمو وضعفه .

٢٩٩٣٣ - هَفَة سَرَوِيَّة \*  
Ochthera mantis (S). Mouche mante (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الهَفَات .  
جسمها صغير القد يطول من ٤ إلى ٦ م . ثوبها إلى الوردية  
السمر . رأسها مستعرض . عَظْمها قصير . زباناها  
صغيران ، دقيقان اسمران . عيناها كبيرتان ، ناشزتان  
قرمزيتان . الزوج الامامي من قوائمها قريب الشبه بمخفاي  
السرورقة والفلخ مستطيل شاكك والظنوب مقوس ينتهي  
بمنخس حاد . روشاها كبيران ، اسمران . قوائمها إلى  
السمر || تظهر الحشرة الجملانة من أوائل تموز إلى  
اواخر ايلول ، تسرح قرب مجاري الماء .

٢٩٩٣٤ - هَفَة سَمَرَة \*  
Telchomyza fusca (S).  
Telchomyze brun (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة الهَفَات .  
جسمها صغير القد يطول من ٤ إلى ٦ م . يملو هلب  
مستطيل مبهر . ثوبها إلى السمره الخفيفة المالح . رأسها  
كبير اسمر اللون . عَظْمها معتدل القد . زباناها صغيران ،

نحيلان . عيناها ناشزتان ، جزويتان . روشاها كبيران ،  
اسمران . قوائمها قصيرة الهلب ، سمره اللون || الحشرة  
الجملانة موجودة على مدار السنة انما يكثر عددها في  
فصل الصيف والخريف || مسرحها الحدائق المنزلية  
والمراحيس || يرقاتها تعيش في المراحيس على المواد  
العضوية .

٢٩٩٣٥ - هَفَة طَحْلَة \*  
Hydrellia griseola (S).

Hydrellie grise (F).  
ذبابة صغيرة من الهَفَات . طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م .  
ثوبها إلى الرمادي الاطل . زباناها وأرجلها سود . يكثر  
وجودها من ايار إلى ايلول . تمتص مكبها على مختلف النباتات  
المائية وعلى بعض النباتات البرية ينبتف عن رقات  
ناعمة ، دقيقة ، مستطيلة تلثم نصال الاوراق وتسبب  
اصفرارها وذبولها .

٢٩٩٣٦ - هَفَات \*  
Ephyridae

فصيلة حشرات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها  
وانواعها زهاء ٣٠٠ ، يكثر وجودها قرب الماء وفوق سطحه .  
طيرانها بطيء الحركة . تجمعهاها هائلة العدد . تعيش على  
النباتات المائية وعلى الصخور التي تكتنفها المياه . وهي  
من الحشرات الواجبة الملوكة وقد تكون نائلة في ظروف  
خاصة || انثاها تمتص المكان في نسج النبات وقد تلقه  
على صفحات الماء أو ترز في وسط المنائق || يرقاتها  
قد تكون ارضية أو مائية فالارضية هوكاة خاضعة تعيش  
على المواد النباتية المنحلة وقد تلثم سوق النبات وأوراقه .  
اما المائية فتعيش في جميع أنواع المياه من العذبة إلى الاجاج  
وتحمل في طرفها انبوبة شرجية مقلاعية ثاقبة تستخلص  
بواسطتها ، من النسج النباتية ، ما تحتاج اليه من اكسجين .

٢٩٩٣٧ - هَقْعَة \*  
الهَقْعَة منزل من منازل القمر الشامية وتُدعى رأس الجوزاء

وهي ثلاثة نجم نيرة فوق منكب الجوزاء وقرب بعضها من  
بعض كالكلائي . سميت هَقْعَة تشبهاً بعرض زور القوس  
الذي يقال له الهَقْعَة . وعندما تطلع مع الفجر يشتد حر  
الصيف || رقيب الهَقْعَة يدعى الشولة .

٢٩٩٣٨ - هَقْل \*  
Autruchon (F).  
هو الزال ، اَظْلَب .

٢٩٩٣٩ - هَكَاكِي \*  
Erogène (F).  
Erogenic, Erogenous (E).

ما من شأنه إثارة الشبق .

٢٩٩٤٠ - هَكْتَار \*  
Hectare (F).  
قياس مساحي يوازي عشر دُمَات أو مئة آر أو عشرة  
آلات متر مربع .

٢٩٩٤١ - هَكْتُورَام \*  
Hectogramme (F).  
قياس وزني يساوي مئة غرام .

٢٩٩٤٢ - هَكْتُولِيتر \*  
Hectolitre (F).  
قياس حجمه يساوي مئة ليتر .

٢٩٩٤٣ - هِكْرَس \*  
Pelobates (S).

Pelobate (F). Pelobates (E).  
جنس ضفادع من فصيلة الهِكْرَسِيَّات . انواعه المعروفة

٢٩٩٤٨ - هَكَسِيَّةٌ ٥  
Hexabranchus (S).  
Hexabranchie (F). Hexabranchus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الارجل  
خلفيات الخياشيم وفضيلة الدوريسيات . انواعها المعروفة  
قليلة العدد اعطائها جوار معظم المناطق الحارة من المحيط  
الهادي والهندي || اجسامها عريضة اهليلجية مبطلة .  
رؤوسها صغيرة لواسها كبيرة . خياشيمها سداسية الاثناي  
التيقة . ارجلها وريدة مستعرضة .



هَكَرْسُ اسمر

٢٩٩٤٩ - هَلَانِيَّةٌ  
Lunule (F). Lunula (E).

شبة شكلها كالحلقل .

٢٩٩٥٠ - هِلَالِيَّةٌ \*  
Heterotoma (S).  
Hétérotome, Oiseau pendu (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة اللوريبيات . مهدا  
المكسك . انواعها المعروفة قليلة العدد ، زرغ اللون .  
اولاها معتقة متناحية بيضيه الشكل ، نصلها جامد  
الصفحة سنن الحافة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها  
كبيرة القد صفراء اللون او حراء ، شكلها كالحلال الملقق .  
تنويرها يستمر طول فصل الصيف .



هَكَس

٢٩٩٥١ - هَلَامٌ ، جِيلَانِيَّةٌ  
Gélatine (F).  
Gelatine (E).

مادة لزوية تستخرج من نسيج الحيوانات .

٢٩٩٥٢ - هَلَامِيَّاتٌ ، مَخَاطِيَّاتٌ

Deutéromycètes, Myxomycètes (F). Deuteromy-  
cetes, Myxomycetes (E).

رتبة من الفطور عديدة الفصائل والأجناس . فطورها  
كحل هلامية لا شكل لها تعيش على الأخشاب الفتنة وعلى  
الاشنة واللحالب ...

٢٩٩٥٣ - هَلَاهَلٌ هو الاكثيت الهلهل ، اطبله .

٢٩٩٥٤ - هَلَبٌ  
Crins, Soles, Jarres, Jards (F).  
Coarse hair, Silken hair (E).

ما غلظ من الشعر كسبيب ذنب الفرس ووبر الناقة وشعر  
الخزير ، الخ ... واحدته هلبة .



هَلَالِيَّةٌ

٢٩٩٥٥ - هَلْبَسَةٌ ٥  
Pilosity (F). Pilosity (E).

٢٩٩٥٦ - هَلْبُسٌ \*  
Holobus (S).

جنس حشرات من فصيلة الدفنيات . انواعها قليلة العدد جميعها  
صغيرة القد طولها يراوح من ١ الى ٣ م . اوثانها الى السرة  
السوداء ، ارجلها وقربها الاستشمارية الى الشفرة . تركيب  
الازهار وتعيش تحت لحاء الاشجار السقيمة السائرة نحو  
اللياس .

٢٩٩٥٧ - هَلْبُسُ أَشْفَقِ الرُّبَانِ ٥

Holobus flavicornis (S). Holobe à antennes  
rousses (F). Holobus flavicornis (E).

حشرة وائمة هواكة من فصيلة الدفنيات ورتبة غدييات  
الاجنحة . تألف الاجراع والحدائق والجائبان . غناصها  
تعيش على طلع الازهار . يرقاتها تعيش على المواد الخشبية  
المنحلة في سراديب الحشرات الخاشية || جسمها صغير  
القد يطول نحو ٢ م . ثوبها اسود . زيانها وجرانها الى  
الشفقة الصفراء . رأسها صغير الحجم . عينها صغيرتان .



هَلْبُس

ثلاثة . اعطائها الشرق الاوسط ومعظم الاصقاع الاروية  
المعتدلة الحرارة || يتميز براحة النوم التي تفوق منه عندما  
يؤخذ وينتقيع الحاد المتتابع وباستمالة بلاعيطه التي يبلغ  
طولها نحو ١٧ سم . || أشهر انواعه الهَكَرْسُ الاسمر  
وهَكَرْسُ الشواطئ .

٢٩٩٤٤ - هَكَرْسُ اسْمَرٌ \*  
Pelobates fuscus (S).  
Pelobate brun (F). Brown Pelobates (E).

نوع من ضفادع الهَكَرْسُ ، مهده الشرق الادنى ومعظم  
الاصقاع الاروية || جسمه صغير القد مربع الشكل  
يطول نحو ٧ سم . عند الذكر ونحو ٩ سم . عند الانثى .  
رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، عيناه كبيرتان ،  
جاحظتان . حلقة عينه عرودية الارتكاز . جلده متباعد  
التحول المسامية تتخللها غدد فارزة || ثوبه الى السرة  
الخطية يعلوها تبقيع جويوي ورقشة بنية || يعيش قرب  
الماء . سميه قفز قصير المدى . يسرح في الليل ويبيت  
في التهار داخل انفاق يحفرها في التربة اللينة على عمق  
يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم . || قوته الحشرات المختلفة  
والديدان || اثناء تسرأ الدعليل ضمن جبال دقيقة تلغها  
على النباتات المائية التي لا يغمرها الماء أكثر من ١٠ سم . ||  
بلاعيطه كبيرة القد تطول نحو ١٥ سم .

٢٩٩٤٥ - هَكَرْسُ الشَّوْاطِي

Pelobates cultripes (S). Pelobate cultripède (F).  
Cultriped Pelobates (E).

نوع من ضفادع الهَكَرْسُ . اعطائها تمتد من الشرق الادنى  
الى ااروية الجنوبية والغربية || جسمه متوسط القد ،  
مجموع الشكل يطول عند الذكر نحو ٩ سم . ويطول عند  
الانثى نحو ١١ سم . رأسه مستعرض الجرم ، قصير الخطم .  
عيناه كبيرتان جاحظتان ، تعلوها قبتان مستديرتان .  
حلقة عينه عرودية الارتكاز . جلده قليل التبول والتدد  
الفارزة . ثوبه الى الخفسار الاسمر يعلوه تبقيع عابث  
ورقشة سوداء لامعة || يعيش قرب الماء . سميه قفز قصير  
المدى . يسرح في الليل ويبيت في التهار داخل انفاق  
يحفرها في رمال الشواطئ والكثبان التي يفضلها على غيرها  
من المواقع || قوته الحشرات والديدان || اثناء تسرأ الدعليل  
ضمن جبال دقيقة مستطيلة تلغها على بعض النباتات  
المائية التي لا يغمرها الماء أكثر من ٨ الى ١٠ سم . ||  
بلاعيطه كبيرة القد تطول نحو ١٧ سم .

٢٩٩٤٦ - هَكَرْسِيَّاتٌ ٥  
Pelobatidae (S).  
Pelobatidés (F). Pelobatidae (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازية من لمة اللوبيات ورتبة  
السؤيات ورتبة عديمات الذنب || اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تصنيها الفيزي  
يأتي بين الصفاجيات والمجموييات || اعرف اجناسها  
واشهرها الهَكَرْسُ والكركوس .

٢٩٩٤٧ - هَكَسٌ \*  
Hoccus

جنس طير من فصيلة الغرناسيات . انواعه قليلة جميعها  
مستطيلة الشكل قوية المنقار الفليلظ الاسحين تعلو لحية  
تعلو لية الشكل . رؤوسها قزعية الريش . اجنحتها مستديرة .  
اذياها طويلة ، اوثانها الى السرة الداكنة . بطونها بيض .  
تألف الاجراع والغابات الظليلة . قوتها الثار والمجرب .  
تعيش ذكراً واثناً . تدفن عشها في الاشجار . اناثها  
تبيض نحو ١٠ بيضات تحضنها وحدها اربعة اسابيع .

Tuberculosis (F).

## ٢٩٩٦٤ - هتس

هو مرض السل عند الحيوان .

Helostoma (S).

## ٢٩٩٦٥ - هتستوم

Hélostome (F). Helostoma (E).

جنس اسماك نهريه من شالكتات الزعانف وفتة البليوميوات التبيجة . انواعه المعروفة قليلة العدد وموطنها انهر ماليزية . جميعها تخرج من الماء وتسترع في البر بعض الوقت || اجسامها صغيرة القد ، متدلة التبطيط ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . رؤوسها متوسطة الحجم ، مخروطية الشكل ، صغيرة الاخطام والاشداق . عيونها كبيرة جاحظة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة ، كثيرة المناخس الذرية . زعانفها الذيلية مقطوعة الاطراف . اثوابها تراوح بين الشقعة النحاسية الموجاج والسمرة الخنطية ، جميعها منسجة بخطوط قاطبة اعين من اللون السائد || لونها جيدة الصنف ، مرغوب فيها .

## ٢٩٩٦٦ - هتسوتيات

Alcyonaires, Alcyonnaires (F).

شعبة حيوانات بحرية من المزهاريات . مداخنها ثمانية القوامس عديدة الشيلات . هياكلها ، إن قرونية المادة او كلسية ، حراء اللون او زرقاء .

Helicina (S).

## ٢٩٩٦٧ - هليسية

Hélicine (F). Helicina (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيوات . انواعها المعاصرة المعروفة كثيرة العدد ، نحو ٥٠٠ ، منتشرة في جميع الاقطار الاستوائية باستثناء افريقية . تعيش في المواعق الرطبة وبعضها يتسلق الاشجار || اصداها صغيرة شبه كروية الشكل صغيرة الاعقاب المحلزة القليلة التثود .

Arracher (F). To grub up (E).

## ٢٩٩٦٨ - هلكف

Arrachage (F). Pulling up (E).

## ٢٩٩٦٩ - هلكس

## ٢٩٩٧٠ - هلكس صوفي

Holcus lanatus (S). Houlque laineuse, Petite fenasse (F). Meadow soft grass, Velvet grass (E). Wolliges Honigrass (D). Olco lanoso, O. vellutato (I).

نبات عشبي بري مرعوي من فصيلة النجيليات . يدخل في اخلاط بزور المرعي الاصطناعية . ثمة علف جيد الصنف || ساقه فارغة ثنائية او ثلاثية الاشطاء . حشفه اخضر النصل المتوسط القد . ازهاره سنبلية تتجمع يعلو زغب لبد كالصوف . بزوره مستدقة مبططة .

Holcus mollis (S).

## ٢٩٩٧١ - هلكس مداد

Houlque molle, Houque molle (F). Couch grass, Rot grass, Soft grass (E). Weiches Honigras, Weiches Wollgras (D). Olco molle, O. setaceo (I).

نوع آخر من الهلكس وهو نبات عشبي بري مداد معمر من النجيليات . يكثر في الاراضي المزروعة المروية وهو كالنجيل من النباتات الضارة الواجب استئصالها من التربة . ساقه فارغة رطلة . حشفه ضيق النصل . جلوره مدادة كثيرة الانشعاب .

## ٢٩٩٧٢ - هلكوفيل ، هليكوفيل

Helicophyllum (S). Hélicophylle (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة القلقاسيات . انواعه

زنانها خيطيان . ظهرها خلى القشار يلحف نحو نصف البطن . ارسافها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع نيسان وتعيش حتى اواسط تموز . تساقط في سيزيران وتعيش المكن في مؤخر النفق الذي تعيش فيه || البرقة عند مجها الكامل تطول نحو ٥ سم . جسمها دبوسي الشكل . ثوبها الى الغيرة السمراء . رأسها وبزومها سود .

## ٢٩٩٥٨ - هتتي ، ليسان العصفور المُر

Holarrhena (S). Holarrhène (F). Holarrhena (E). Ruhrholarrhena (D). Olarrhena (I).

جنس شجيرات طيبة برية من فصيلة الدفليات . انواعها قليلة ، اصلها الهند . سوقها سرسة فراء . اوراقها منعقة متعاقبة اهليلجية النصل الامرط الجامد . ازهارها عشكولية تتجمع تاجية الارتكاز زاغية اللون المختلفة || ازهارها وبزورها وجلورها طيبة تستعمل في عدة علاجات معوية .

## ٢٩٩٥٩ - هتج \* ، هليج ، بلح الصحرَاء ، زكُون ، زَكُون

Balanites aegyptiaca, Ximenia aegyptiaca (S). Balanite, Dattier du désert, Zacon, Zacon (F). Egyptian balsam, Thorn tree, Zachum oil tree (E). Zahunbaum, Ägyptischer Zahnbaum (D). Dattero deserto (I).

جنية شاذكة الافناد والافان من فصيلة السذابيات . اوراقها منعقة ثنائية الانتشاب ، بيضية الشكل ، مستطيلة . نصلها جاند الصفعة ، باهت الخضار . ازهارها محورية الارتكاز . ثمارها نورية كالتزيتون ، حامزة ، مرة ، تسهل المعدة قبل ادراكها ، سكرية الطعم مأكولة عند نضجها . ويستخرج من عجمها دهن مأكول يستعمل استعمال الزيت .

Autoclave (F). Sterilizer (E).

## ٢٩٩٦٠ - هلتجاب

مرجل السك يستعمل للتطهير بواسطة البخار المضغوط .

## ٢٩٩٦١ - هلتزين الزيتون

Hylesinus oleiperda (S). Hylésine de l'olivier (F).

حشرة من الكراشيات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثوبها اسود اللون ، غدها منسجة بالاسمر || تركب الزيتون فتنتج شكير افادته وافنائه السقيمة الضعيفة الحيوية . انفاقها وبرزادها تشبه انفاق وبرزاديب التيرون الا انها اقل عددا واستطالة .

## ٢٩٩٦٢ - هلتزين الصنوبر

Myelophilus piniperda (S). Hylésine du pin (F).

حشرة من الكراشيات . طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى السدرة السوداء يملوها خلى سنطلي || الحشرة الكاملة تخلف طاء الخواصير لتعيش على عصائها ثم تمتع مكنها داخل السرداب الرئيسي فينفذ من رفاق تخلف الشكير في جميع الاتجاهات ابتداء من السرداب الام || جيلها سولي . مكانتها صعبة .

## ٢٩٩٦٣ - هلتزين المران

Hylesinus fraxini (S). Hylésine du frêne (F).

حشرة من الكراشيات . طولها نحو ٣ سم . ثوبها كسني اللون ، غدها متعددة بالاسود يملوها خلى الحمل || تركب المران فتنتج شكير اغصانه . يكثر وجودها في الاغشاب لمقطوعة .



هليج



هلتزين الزيتون



هلتزين الصنوبر



هلتزين المران



هلتسوم



هلتسية



هلتس مداد

هلتس صوفي



المعروفة اربعة منبتها السواحل البحرية . اوراقها معتقة غليظة . ازهارها عريضة وسيدة الشق تجمعها ضبة نحيلة . ثمارها عنبية قدورها قدر الحمص .

## ٢٩٩٧٣ - هَلَك

الحلل نسج التيكوت وأول المطر .

## ٢٩٩٧٤ - هَلَم

الهم : غياه الجبل .

## ٢٩٩٧٥ - هَلَم

هو الحاكك، مرض جلدي .

## ٢٩٩٧٦ - هِلْمَتِيَتَاَز

مرض درد الامعاء، ومن سببه وجود الديدان ونموها وتكاثرها في الامعاء .

## ٢٩٩٧٧ - هَلْمُوش

هو الكشمش الاسود ، اطبله .

## ٢٩٩٧٨ - هَلَهَل

هو الاكوييت الملهل ، اطبله .

## ٢٩٩٧٩ - هَلَهَل

هو الجالحة اي كبة الثلج عند سقوطها على الارض .

## ٢٩٩٨٠ - هَلْدُ الْمَنَاحِ \* ، هَلْدُ صَير \*

**Helodes minuta (S). Héléde chétif, Héléde menu (F). Helodes minuta (E).**  
حشرة خاخصة رابلة من فصيلة الهلوبيات ورثة مفدمات الاجنحة . تألف المنافع وصفات مجاري الماء . خنافسها تعيش على صفت الاشباب واوراقها . يرقاقها رابلة تعيش في محيط الجذور التي تركبها وتقضي عليها || جسمها صغير القدر بطول من ٥ الى ٦ سم . نوبها الى الصهبة . رأسها صغير الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحق الفارق ، تحيل التحزير الغمدى ، كثيف الخمل . ارساغها خاسية المعقل || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجملة في ايار وتميش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تساق بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن، مجاديا تحت الجبل او في اربومات الاعشاب المنقعية || البرقة بطينة النمو . تطول عند ادراكها التام من ٨ الى ١٠ سم . جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اغير اللون ، اصفر المواجه ، اسمر الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوما ينتهي في التربة .

## ٢٩٩٨١ - هَلْدُودِيَات \*

**Helodidae (S). Helodidae (F). Helodidae (E).**

فصيلة حشرات رابلة من رتبة غمديات الجناح || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الممتدة الحارزة . تألف المواقع الرطبة . قوتها عصف الاعشاب واوراقها . يرقاقها رابلة تعيش في محيط الجذور || اجسامها صغيرة القد ، اهليلجية الشكل ، خلية الفشار ، مستعرضة الرؤوس الصغيرة ، مستطيلة الزباني الخيطية . قوية الجرامز ، خاسية المعقل الرسفية || اشهر اجناسها الهَلْدُودُ .

**Holotidae (F). هَلُوسِيد**  
واحد من قسمي الفلوكوزيد والثاني يدعى هَلُوسِيد .

## ٢٩٩٨٣ - هَلُوف \* ، خَنْوِير اَبُو قَرْتِين

**Phacochærus (S). Phacochère (F).**  
جنس حيوان من فصيلة الخنزريات . رأسه قبيح الشكل مسخ تعلوه لملول جلدية . فتعلسته مفلطحة مستطيلة . اذناه صغيرتا القد ذلقتان ، عفرته طويلة الهلب ، انياه كبيرة مقنفة تطول نحو ٢٣ سم . قطرها عند قاعدتها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ذنبه طويل دقيق || موطنه افريقية الاستوائية . قوته الجلود والجبوب والبار . يعيش جماعات يراوح عددها من ١٠ الى ٢٠ || له نوعان الحشيش والافريقي .

## ٢٩٩٨٤ - هَلُوف اِفْرِيقِي

**Phacochærus africanus (S). Phacochère africain (F). African wart-hog (E).**

نوع من الملوف . طوله نحو ١٧٥ سم . وارتفاعه ٧٥ سم . نوبه الى الحشيش الاسهب ، ظهره اعين من بطنه . عفرته مستطيلة الهلب ، لونها الى الحشيش الاسفر . رأسه كبير وظليل ، فتعلسته مفلطحة || موطنه المناطق الاستوائية .

## ٢٩٩٨٥ - هَلُوف حَشِي

**Phacochærus aethiopicus (S). Phacochère d'Ethiopie (F). Ethiopian wart-hog (E).**  
نوع من الملوف ، يتميز بفتعلسته الغليظة وبخناجيه الفارقتين . طوله من ١٥٠ الى ١٦٠ سم . علوه من ٦٥ الى ٧٠ سم . نوبه الى السمرة الحشيشية . ظهره اعين لوناً من بطنه . عفرته مستطيلة الهلب الاسود . || موطنه الحشيش واليزيب والكفر .

## ٢٩٩٨٦ - هَلِيَّاس \*

**Heliases (S). Héliasse (F). Heliases (E).**  
جنس اسماك بحرية من شائكات البحرية من فصيلة الشحليات انواعها المعروفة ١٢ اعطائها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه بيضيه الشوزن ، مبطلة ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . اعطائها صغيرة ، عيونها ناشزة . زعانفها الظهرية شاذكة والذيلية فارقة || لونها متوسطة الصنف ، مأكولة .

## ٢٩٩٨٧ - هَلِيَج

هو الملح ، اطبله .

## ٢٩٩٨٨ - هَلِيَقَة دَقِيْقَة \*

**Triphleps minuta (S). Triphlepe menu (F).**  
حشرة مقنفة من فصيلة القنطرسيات . جسمها شديد الصغر بطول نحو ٢ سم . نوبها الى السمرة السوداء تشته في الرأس والكريل والحجفة وفي اطراف الحنجبتين . حنجبتها الى الشقعة الصنابية تملوها نمشة سمراء . ورشها الى القدره الشهباء || تألف جميع المراتع التي تكثر فيها الاعشاب . تعيش بين الارواقي وفي الجلالة . قوتها ما تستطيع قصه من نفق الحشرات .

## ٢٩٩٨٩ - هَلِيَكْتِين \*

**Heliactin (S). Héliactine (F).**  
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقا المنافع وفصيلة الفريسيات . موطنه امريكية الجنوبية || جسمه صغير . اهيف يطول نحو ١٥ سم . رأسه مزين الجانبين بارياش قسطانية اللون . منقاد رقيق مستطيل . جناحاه



ملود الناتج



ملوف



هلياس



هليكين



هليكويا



هليم



هليوت ركي



هليوت سلع



هليوت رب



هليوت ريس

ذريا الاطراف . ذيله راجي الرقال . ثوب الذكر الى الخضار الاسفع ، رأس الى الزرقه ، زوره ومحصراه سيد . بطنه ونبكاه يبيض . ثوب الاثني الى الشقة واللحله وبض النقيج الاسود || قوته الذباب والحوام وريحق الازهار || يذثن عشه في الاشجار الفناء . الاثني تحضن مرتان في الحول . مفضتها ٥ يبيضات ترخلها بمنابيه الذكر .

### ٢٩٩٩٠ - هليكويا\* ، وشيج

Heliconia (S). Héliconie (F). Bastard plantain (E). Heliconia (D). Elconia (I).

جنس نباتات ارومية برية و زربينة من فصيلة الموزيات . انواعها المعروفة نحو ٨ تشبه الموز والقنا والمازرون . ساقها قصيرة ، اوراقها مستطيلة الاعناق ، كبيرة النصل الذي يطول من ٦٠ الى ١٣٠ سم . ويمرض من ٢٠ الى ٤٠ سم . ثمراتها كبيرة القد ، بالغ التحديد ، ارجواني اللون ، اصفر الطرف . ازهارها عنقودي التجميع يطول نحو ٦٠ سم . ويمرض نحو ٣٠ سم . ازهارها الى الصفرة الخضراء المواج . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٩٩٩١ - هلي\* ، طيني أزرقي

Cephalophus (S). Céphalophe, Antilope des buissons (F).

العلم ج هلم . جنس حيوان من ذوات الخلف المغترات افرجات القرون . انواعه نحو ١٠ جميعها صغيرة القد ، وشيقة القوام . رؤوسها متوجة بقر من الور اليلد المستطيل . قربها صغيرة ، متصبية ، ذرية ، حادة الاطراف . اذنانها قصيرة . اثوابها سوية الالوان تغلب فيها الريدة الزرقاء المواج || اناثها جماء الرؤوس ، رباعية الاعلاف || تألف الادغال والقفاف المشبية .

### ٢٩٩٩٢ - هليوت\*

Heliothis

جنس حشرات فراشة من فصيلة النسيقات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها الى السرة الرمادية . رواشها مزركشة متراكبة الالوان الزاهية والمابقة . يرقاتها الى السرة يطولها مواج وردي وغطان جانبيين قاطبان . وهي تعتبر من اليرقات الناهمة التي تركب معظم النباتات النجيلية . بعضها يركب الذرة فيلثم الحب ايان تكونه .

### ٢٩٩٩٣ - هليوت ركني\*

Heliothis rexiae (S). Heliothis roi, Ver des bourgeons (F). Bud worms (E).

فراشة من الهليوت . طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . وبسطها من ٣٠ الى ٣٦ سم . ثوبها الى الخطي . خملها اطحل اشهب . زباناها خيطية . رواشها الاسمان الى الكهية الخضراء المجدعة بالاسمر . رواشها الخلفيان الى الخضار القاتع يطولها اثار اسمر ينتهي بنهيد فضي . ذكورها اصفر قدماً من اناثها . مسرعها دجوي . ايجالها الحولية ثلاثة . رقبها اسطوانية الشكل تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . ثوبها اغير اللون اخضر الحلقات ، اشهب الملب . يرقاتها تركب الزيمات والبرام الهامية في عدة نباتات انحصا القطن وركب حقاك التبغ فتفترها وتقصي حل معظم بزورها || تكاثره باستمال الحواشير النافذة التي تؤثر في الجهاز العصبي او الهضمي .

### ٢٩٩٩٤ - هليوت مستع\* ، غسقية الذرة

Heliothis armigera,

الاصفراء  
H. obsoleta (S). Heliothis armé, Noctuelle du maïs, Noctuelle des tomates (F). Corn earworm,

Tomato caterpillar (E). Baumwollkapselwurm (D). فراشة من الهليوت ، طولها يراوح من ١٦ الى ٢٠ سم . وبسطها من ٢٢ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الكهية الغبراء . زباناها خيطية . رواشها الاسمان والخلفية مجعدة ومبقعة بالاسمر . ايجالها الحولية ٤ الى ٣ . ذكورها اصفر قدماً من اناثها || وهي من الحشرات القواطع التي تجوب البلاد في طلب الزرق . رقبها تطول من ٣٦ الى ٤٠ سم . ثوبها الى الخضار الاصفر المواج تقطبه ثلاثة خطوط اسمر . مذهبها رمادي اللون . وهي ناهمة تركب براعم مختلف النباتات انحصا القطن والذرة الصفراء والتبغ والبنندره وقد تؤذيها ، عند كثرتها ، شديد الأذى وتثقب حقاك التبغ وتلتهم البذور من حين تكونها الى تمام نضجها . تكاثره باستمال الحواشير النافذة التي تؤثر في الجهاز العصبي او الهضمي .

### ٢٩٩٩٥ - هليوتروب\* ، رقيب الشمس ، إكركار

Heliotropium (S). Hélotrope (F). Heliotrope, Cherry-ple (E). Heliotrop, Sonnenwende (D). Elio-tropio (I).

ومن اسمائه طامرموما وهي تحريف صار يوبا السريانية . ثم حشيشة القروح . وهو جنس نباتات من فصيلة المسمحيات انواعه المعروفة ١٧٠ اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . معظمها عشبي وبعضها جنبي . اوراقها متعاقبة منعقة كاملة . ازهارها عثكولية التجميع هامة الازركان تدور مع الشمس || منه انواع زراعية ازهارها عطرية العرف زرقاء اللون او ليلكية يستخرج منها بالتقطير ادهان ثمينة || اوراقه طيبة تسكن الانهبات وتطهر الجروح .

### ٢٩٩٩٦ - هليوتروبس\*

Heliothrips haemorrhoidalis (S). Thrips des serres, T. de la vigne (F).

حشرة من التريبس صغيرة القد طولها يراوح من مليمتير وخطين الى مليمتير واربعه خطوط . ثوبها الى السرة الحمرنوية . تتحم مكثها في نسج النبات فينتفخ عن ريقان ناهمة صفراء اللون تقفل فمل الحشرة الكاملة التي تقطع بشرة النسيج وتمتص عصارة الخلايا || ايجالها الحولية تراوح من ٤ الى ١٠ وذلك لانها شديدة التأثر بموالم الحرارة والبيئة || تركب الكروية والشام والخيارد وتختلف نباتات المصاري من اي نوع كانت .

### ٢٩٩٩٧ - هليوفيت\*

Héliophyte (F).

Heliophila (S). Héliophile (F).

جنس نباتات حولية برية و زربينة من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ معظمها من نباتات افريقية الجنوبية . سوقها فراء . اوراقها متعاقبة ، السفلية ملبية ورشية خمرية ، الوسطى اعليجية مستنة الحافة . العليا سنانية . ازهارها طرفي ، عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، مختلفة الالوان ، منها الالبيص والاصفر والوردي والالزرق . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

### ٢٩٩٩٩ - هليوكريد ، هليوكريس

Helleboris (S). Héléobcharis, Héléocharide (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة السمديات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . سوقها دقيقة تنتهي بسبيلات مفردة .



هليوفيل

الاصفر . ثماره جزئية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قلبية الشئانة ، ذكية الطعم ، فاقرة الصنف .

### ٣٠٠٠٧ - هَلِيُون عَارِش

*Asparagus scandens* (S). *Asperge grimpante* (F). نوع من الهليون التربي السرح . ساقه متسلقة . فروعها تحيلة افاقية الانتشاب متدلية . رديئاته ثلاثية التجميع ، نصلها مبسط الصفحة يطول من ٦ الى ١٣ سم . ازهاره الى الخضار العابق . ثماره حراء اللون وحيدة البزرة .

### ٣٠٠٠٨ - هَلِيُون مَعْرُوف \* ، هَلِيُونَس ، يَمَع

*Asparagus officinalis* (S). *Asperge commune* (F). *Common asparagus*, *Sparrow-grass* (E). *Echter Spargel*, *Asparagen* (D). *Aspargo comune*, *Sparago coltivato*, *Asparago* (I).

هو الهليون البقلى المشهور . ضروريه واصرامه الزراعية عديدة جميعها مأكولة الاغاليج . اروتته قهقرية . اغاليجها غليظة . ساقها سرسة فراء تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . رديئاته حزبية التجميع تمد من ٣ الى ٦ نصلها خطي الشكل يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره خضراء اللون . ثماره الى الحمرة المابقة .

### ٣٠٠٠٩ - هَلِيُونِيَّات ، هَلِيُونِيَّات

سبط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسها الهليون .

### ٣٠٠١٠ - هَلِيُونِيْن ، آسْفَرَجِيْن ، آسْبَرَجِيْن

*Asparagine* (F). *Asparagin* (E). مادة حيوية قابلة التبلور عادمة الريف نافعة الطعم لاتذوب في الكحول ، تذوب في الماء الغالي وفي الحوامض والقل . توجد في عصارة معظم النباتات تكثر نسبها في اغاليج الهليون . تستعمل لدر البول .

### ٣٠٠١١ - هَمَاشِيَّة ٥

*Platypiza* (S). *Platypezia* (F). *Platypezia* (E).

جنس حشرات من فصيلة الماشيات رتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اعظامها قصيرة . ملاسها حبيبة العقلة . كواسلها شبيهة شبيهة ، مبرمة . مبرمة الحلب . بطونها بارزة الحلب ، مبرمة الحلب . رواشها كبيرة ، قسطانية التخفيف ، قوائمها نسيطة || تألف المواقع الدفلة والحراج المبرمة الانشجار . يرقاتها عاردة تعيش على الفطور .

### ٣٠٠١٢ - هَمَاشِيَّات ٥

*Platypexidae* (S). *Platypezidae* (F). *Platypezidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والمروج والنايات || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها مستضخمة . عيونها متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . ملاسها وحبيبة العقلة . اعظامها قصيرة . شفاهاها السفلى لاقعة او ثاقبة ، كواسلها شبيهة مبرمة الشكل ، مبرمة الحلب الدقيق . رواشها كبيرة ، شفاقة . بطونها مردنية ، خلية القشار . قوائمها قياسية || يرقاتها مبطلة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية الجزئية الانحلال || اشهر اجناسها الماشية .



هليون معروف

اوراقها عصفية . يكثر وجودها في المناطق وفي الموائع الرطبة .

### ٣٠٠٠٠ - هَلِيُونَس ٥

*Héliomètre* (F). *Heliometer* (E). هو الميزان ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

### ٣٠٠٠١ - هَلِيُون ، هَلِيُون

*Asparagus* (S). *Asperge* (F). *Asparagus* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ جميعها اشباح قهقرية ممرمة . معظمها بري وبعضها زراعي وتربي . ساقها منتصب وعارضة ومتدلية . اوراقها ردينية . ازهارها تحيلة خضراء اللون ، ثمارها عنية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٣٠٠٠٢ - هَلِيُون اجْعَد

*Asparagus crispus*, *A. decumbens* (S). *Asperge crépue* (F).

نوع من الهليون التربي . ساقه دقيقة متسلقة مترعة كثيرة التفرع المنتبسة المتدلية العادية الشكل . رديئاته ثنائية او ثلاثية التجميع ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٤ الى ٧ سم . ثماره حراء اللون مداسية البزور .

### ٣٠٠٠٣ - هَلِيُون بَرِّي ، هَلِيُون شَالِك

*Asparagus acutifolius* (S). *Asperge piquante*, *A. sauvage* (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchspargel* (D). *Asparago salvatico*, *Sparagio agreste*, *Corrudo* (I). نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه تحيلة مستطيلة متقلبة . فروعها قليلة متبادلة . رديئاته ضمية التجميع ، حزبتها تمد من ٤ الى ١٢ نصلها جامد الصفحة ، شالك القصص ، يطول من ٥ الى ٦ سم . ازهاره عطرية الريف . ثماره سوداء اللون . اغاليجه صغيرة القدر تحيلة القدر مأكولة .

### ٣٠٠٠٤ - هَلِيُون رِيْشِي \*

*Asparagus plumosus* (S). *Asperge plumueuse*, *A. plumée* (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E). *Zierspargel* (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I). نوع من الهليون التربي الدائم الاخضرار . ساقه فراء شائكة ، فروعها مبرمة الركب غزوية الشكل ، رديئاته حرشقية دقيقة شائكة تطول من ٣ الى ٦ سم . حزبتها تمد من ٦ الى ١٢ || ضروريه واصرامه عديدة جميعها تربيية تزور في المرائن .

### ٣٠٠٠٥ - هَلِيُون سَرْخَسِي

*Asparagus filicinus* (S). *Asperge fougère* (F).

نوع من الهليون التربي السرح . ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . فروعها افاقية الانتشاب والجلوس شكلها كالسرخس . رديئاته مجنحة لاقسية الطول حزبتها تمد من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاصفر . ثماره ودية اللون .

### ٣٠٠٠٦ - هَلِيُون ضَمِي

*Asparagus verticillatus* (S). *Asperge verticillée* (F). نوع من الهليون البقلى . مهدد القفاز . اقليمه البلاد الباردة . ساقه ليلية مخشوشية تملو نحو ٣٠٠ سم . رديئاته ضمية التجميع حزبتها تمد من ٣٠ الى ٣٠ نصلها جامد الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الخضار

٣٠٠٢١ - هَمَدَارِيَّات (S).  
Hémadoracées (F). Haemadoraceae (E).  
فصيلة نباتية من وحدات اللقمة . اجناسها ٢٠، انواعها زهاء ١٠٠، معظمها جذموري معمر وبعضها عشقوي . اوراقها باغليبتها مزدوجة الصصيف . ازهارها نظامية . اسديتها ثلاث أو ست . مذاقتها لا قياسية الارتفاع لذلك فستوى سطحها قد يكون ارفع أو اسفل من مستوى الاسدية . أشهر اجناسها الهدار .

٣٠٠٢٢ - هَمَدَكَة Folletage .  
Apoplexie de la vigne .  
وصم فجائي شديد الوقع مجهول الاسباب يصيب الكرمة فيقبل اوراقها ويسم سرورها في تجف في بضع ساعات .

٣٠٠٢٣ - هِمَرُوفِيلَة الْوَزَال \*  
Hemerophila abruptaria (S).  
Hémérophile à ailes dentelées, Phalène des genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).  
حشرة من فصيلة الافاتيا ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم الداخلية المتاخمة . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها ابيض الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطتها نحو ٣٨ سم . رأسها كبير الجرم . ضيقها كيرتبان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الخطي الكلف المواج || روشناها الاساميان الى الخطي الاكلف تملو سرجة معترضة سمراء وزراکش وتزاورق كستية . روشناها الخلفان الى الخطي الاشجع يملو تشيظ اسمر وسرجة كستية . تسليتها خاسي القروش اسمر الحار . ادهابها الى الشصمة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة الجبل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه وشعي الشكل . ثوبها الى الشبهة الخطية المواج يملوها في كل سكة ابتداء من الرابعة زوج من النقط جانبية الازرناكز . سمراء اللون . رأسها شديد السمرة . رواجبها البطنية الوسطى ماصحة بما يجعلها تقفوس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلجة تحبكهما السرعة في كل مكان باستثناء التربة .

٣٠٠٢٤ - هَمَق الصغير من الفباء .

٣٠٠٢٥ - هَمَقِي  
Herbes tendres (F).  
الكلام الحش اللين .

٣٠٠٢٦ - هَمَق  
Boreava (S). Bordave (F).  
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات . منته بعض اصقاع الشرق الاذن || ساقه مالة فرعاء منصبة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها متناقبة ، طري ، ازهارها صغيرة ، لونها الى الصفار الباهت . تنويره ديني .

٣٠٠٢٧ - هَمَقِي  
Hammatolobium (S).  
Hammatolobion (F).  
جنس نباتات عشبية بوية معمرة من فصيلة القرنيات .

## ٣٠٠١٣ - هَمَاق مَرَقُوش \*

Cinclosoma punctatum (S).  
Cinclosome punctué (F).

طائر من الجوارثم سنيات المنساقير ينتمي الى فصيلة الشحروبديات يألف الغابات والاسراج القريبة من الحدائق والجانثان . قوته الحشرات الصغيرة والثار على اختلاف اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٤ سم . ثوبه الى الطحلة يملوها مواج اشجع ورقشة سوداء . رأسه مجعد بالابيض . محسراء الى البياض الماجي . زوره الى الجؤرة . بطنه الى الغيرة المنمشة بالصبهة . ذنبه معتدل الطول ، ضيق الطرف . قائمتاه رفيعتان دقيقتان ، لونها الى السمرة الزرقية || يدثن عشه في الاشجار الزينة الوارفة الظل . الانثى تحضن وحدها من ٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يؤين لها الغذاء .

٣٠٠١٤ - هَمَامِيلِس  
Hamamèle (F).  
هو المشتركة ، اطلبها .

٣٠٠١٥ - هِمَمِيَّت \*  
Hématite (F). Haematite (E).  
معادن حديدية اديس اللون يعرف كياويا باسم اكسيد الحديد الطبيعي . انواعه عديدة اشهرها واكثرها انتشارا الليمونيت . راجع حجر الدم .

٣٠٠١٦ - هِمَمِيَّتِ اسْمَر \*  
Hématite brune (F).  
هو الليمونيت ، اطلبه .

٣٠٠١٧ - هَمَجَة  
Drosophila (S). Drosophile (F).  
جنس حشرات من فصيلة الحميجيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها صغيرة القد ، سوية الثوب ، شفاقة الجناح التائر الاصاب || يرقاتها مياضاة ، نيرة ، هواكة ، نائلة ، تعيش على جمع المواد المختصرة أو السائرة نحو الاغيار والاختلال .

٣٠٠١٨ - هَمَجَة الْاَبْحَاث \*  
Drosophila melanogaster (S). Moucheron des caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).  
Tauffiege, Essigfliege (D).  
نوع من الحمجة . طولا نحو ٢ مم . ثوبها الى الصفرة البرتقالية . تركيب جميع انواع الثار الساقطة المطوية وتجنبد بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والمضوية . تمتع مكها او تلقية حيث تعيش يفتق عن رقات دقيقة طولا نحو ٦ مم . لونها الى الغيرة || كزودها كستنية اللون ، قصيرة القد ، غليظة الشكل ، تقضي طورها البذري في نفس المحيط || وهذه الحمجة هي التي يستخدمها علماء الوراثة والورث في اجابهم الحياتية والتناسلية .

٣٠٠١٩ - هَمَجِيَّات  
Drosophilidae  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطينة الطيران تعيش على المواد النباتية المختصرة || يرقاتها نيرة هواكة ونائلة تعيش ايضا على مختلف العصارات والانتاجات النباتية .

٣٠٠٢٠ - هِمْدَار \*  
Haemodorum (S).  
Hémodore (F).  
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة الهمداريات . انواعه عديدة جميعها ترابية . ازهارها هامة الازرناكز . عشقودية التجميع او سنيلية ، حيلة الاشكال والالوان الزاهية .



هَمَاق مَرَقُوش



هَمَجَة الْاَبْحَاث



هَمُوفِيلَة الْوَزَال

## ٣٠٠٣٦ - هَمَيْتْسُ الصُّفُور

*Haemanthus rupestris* (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته ثنائية الساق القطبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من ورتين إلى أربع ورتات وساق شمرخاية تحمل الأزهار. أوراقها أهليجية جميلة الأخضر. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شمرخاه يطول نحو ٣٠ سم. يتوجه صيوان قفله نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ إلى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر أيار.



هَمَيْقِي

## ٣٠٠٣٧ - هَمَيْتْسُ بَهِي

*Haemanthus magnificus* (S). *Haemanthe magnifique* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستطيلة الشكل. أوراقها طرفية الانتشاب تركز على ساق جدفة، نصلها يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ إلى ١٠ سم. عروقه شععية الترتيب بارزة، ثمانية أو عشارية الأزواج. شمرخاه الزهري يطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم. صيوانه كبير القفله يراوح من ٢٠ إلى ٢٥ سم. أزهاره كثيفة التجميع لوها إلى البرتقالي الأرجواني المولج. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.

## ٣٠٠٣٨ - هَمَيْتْسُ زُجْجَرِي

*Haemanthus cinnabarinus* (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب، شععية العدد الذي يراوح من ٤ إلى ١٦؛ نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. شمرخاه الزهري يتوسط الأوراق ويطول نحو ٣٠ سم. صيوانه يد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة جملة اللون الأحمر الباقى الأصفر المولج. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.



هَمَيْتْسُ

## ٣٠٠٣٩ - هَمَيْتْسُ كَثِيرُ الزَّهَر

*Haemanthus multiflorus* (S). *Haemanthe multiflore* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته وحيدة الساق الشمرخاية. أوراقها ورتية، ثلاثية أو خماسية. نصلها بارز العروق السداسية أو الثمانية الأزواج، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شمرخاه الزهري يطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. يكمله صيوان قفله يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ إلى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، محجنة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

## ٣٠٠٤٠ - هَمَيْتْسُ لِيْشْدَن

*Haemanthus lindenii* (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته كالاروية. أوراقها عميقة دائمة الخضار. نصلها أهليجي الشكل، سنائي الزام الأخير، يطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. شمرخاه الزهري يطول نحو ٤٥ سم. يتوجه صيوان قفله نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٠٠ زهرة أرجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر أيار.

## ٣٠٠٤١ - هُمُوش أَخْضَر

*Chironomus tendens* (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من الهُمُوش طويلاً يراوح من ٧ إلى ٨ سم. لوها من الخضار الأصفر المولج. قربها الاستشعارية مركبة إلى ٤٠ عتلة عند الذكر ومن ٧ عتلة عند الأنثى. أرسافها الامامية مهدية مستطيلة رقبها تلثم أوراق النباتات المائية.



هُمُوش أَخْضَر

أنواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض اصقاع الشرق الأوسط وأفريقية الشرقية والشمالية || سوقها مذبذبة مستطيلة متدلة الانتشاب. أوراقها مركبة ورتية التجميع. وريقاتها صغيرة بيضيه النصال المستطيلة. أزهارها ذهبية اللون وأرجوانية. تنويرها ريمي.

## ٣٠٠٤٨ - هَمَيْقِي \*

*Tiarella* (S). *Tiarele* (F).  
جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة الفلييات. أنواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها خشوشة منتصبة فراء. أوراقها مركبة، مستطيلة الاضلاع، لا قياسية التفريش والتسكين. نصلها إلى الخضار الزاهي. أزهارها عتقودية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون أو صفراء. ثمارها جراء لا متساوية المصارع. تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار.

## ٣٠٠٤٩ - هَمَلِاج

*Hybride* (F). *Hybrid* (E).  
هو الهجين النباتي. ج. هالاج.

## ٣٠٠٥٠ - هَمَلِجَة، رَهْوَكَة

*Amble* (F).  
ضرب من سير الدواب.

## ٣٠٠٥١ - هَمَمَن

*Marcescence* (F).  
*Marcescence, Withering* (E).

حالة كل زهرة أو نبات في طور الذبول أو التحاتمة.

## ٣٠٠٥٢ - هَمَيْتْسُ \*

*Haemanthus* (S).  
*Haemanthe* (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الرجسيات. أنواعها عديدة. مهدها البلاد الحارة والاستوائية. سوقها شمرخاية تنتهي بانزهار مستديرة التجميع يرتكز على شرعان عديد المصارع. ثمارها فردية الخدر. عنبة الشكل، وسيدة البرية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

## ٣٠٠٥٣ - هَمَيْتْسُ أَيْبِيْش

*Haemanthus albillos* (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة صغيرة القد. أوراقها رباعية العدد، خمسة التركيب، صفعية الشكل؛ نصلها يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. شمرخاه مهدب الخفافة. شمرخاه الزهري يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم قفله نحو ٧ سم. أزهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

## ٣٠٠٥٤ - هَمَيْتْسُ أَحْمَر

*Haemanthus coccineus* (S). *Haemanthe ponceau* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة القد، ثنائية الأوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. شمرخاه الزهري يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم، قفله نحو ٨ سم. أزهاره كثيفة التجميع حمراء اللون. تنوره يستمر من آب إلى تشرين.

## ٣٠٠٥٥ - هَمَيْتْسُ أَرْجَوَانِي

*Haemanthus punicens* (S). *Haemanthe écarlate* (F).

نوع من الحمئس. دوفسته مستديرة الشكل. أوراقها قرصية الانتشاب شتى العدد. نصلها جميل الخضار الزاهي، ضيق الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. ويعرض من ٥ إلى ١٢ سم. شمرخاه الزهري يتوسط الأوراق ويطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. صيوانه يحمل من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة جملة اللون الأرجواني. تنوره يستمر من حزيران إلى أيلول.



هُمُوش ريشي

٣٠٠٤٧ - هَمِيلِيَّة الْبُنْ \* ٥ ، صَدَا الْبُنْ ،  
فَطَر الْبُنْ .  
Hemileia vastatrix (S).  
Rouille du caféier (F).

فطر مجهري يصيب اوراق البن فيعطها ويشل عملها  
التضخيري الواجب فيؤذي الشجرة ويهيء الى حملها  
وانتابها || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستندرة قطرها  
ارواح من ١ الى ١٥ سم . تركب نصال الازراق على  
صفحاتها السفلى ، تبدو مبدرة رتقالية اللون ثم تتكاثف  
وتتشعب بفشاء خلي الشكل ، لزج المادة ، يسبب جفاف  
النسيج ويهاسه || يكافح باستعمال سائل بوردو المركز  
من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من  
نهاية فصل الشتاء .

٣٠٠٤٨ - هَمِين -  
Marchesible (F).  
الحمين ما كان قابلاً للذبول .

٣٠٠٤٩ - هَمِينَة \* ٥  
Haminée (S).  
Haminée (F). Haminée (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل  
وفصيلة الطليانيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ،  
منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه بيضيه  
الشوذن ، شفاقة ، ماله ، مساوية الالوان الوحيدة  
الخضاب . اجسامها فضفاضة الرداء اللاحق .

٣٠٠٥٠ - هَمِينُون  
Hémione (F).  
هو فراء الثبت ، نوع من الحمر الوحشية وفصيلة الخيليات .

٣٠٠٥١ - هَمِينُولِيَّت  
هي السباج الشبكي ، اعطيه .

٣٠٠٥٢ - هَمَاء  
Péduncle (F). Peduncle (E).  
هو ملاقق الثمرة ويقال له إهان . ج أمن .

٣٠٠٥٣ - هَمَاجِل \* ٥  
Sirens (F). Sirens (E).  
رتبة حيوانات قازية من صف الضفدعية ، لها ، حتى  
الآن ، فصيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع || جميعها من  
مستقرات الخياشيم . اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم ،  
رباعية الاصابع || تعيش على ضفاف المستنقعات وبحاري  
الماء . بلاعيطها مائية || قوتها الديدان والوديات الصغيرة .

٣٠٠٥٤ - هَتَان  
Lavande spic (F).  
هو الخزامى الذكورية ، اعطها .

٣٠٠٥٥ - هَشِير  
Anon (F).  
هو الجشش ابن الاثان .

٣٠٠٥٦ - هَشِير  
Moqueur (F). Mocking-bird (E).  
جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة  
الحديديات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة  
مستقلة تدعى هيريات || انواعه المعروفة ١٢ اعطائها  
المناطق الاستوائية . معظمها افريقي وبعضها اسوي  
وامريكي || تتميز بطول مناقبها المحدودة وباستطالة  
اذنابها الرتاجية الريش . اجنتها قصيرة تكاد لا تلمح  
قاعدة الافليك || جميعها تألف الغابات والحراج \* قوتها  
الحشرات اغصها الخنافس والارض والديدان والجراد والنمل  
والدغذخايات والعناكب وبعض الثآير البرية || اشهر  
انواعه المختبر الاحمر المتقاد .

٣٠٠٤٢ - هَمُوش ريشي \* ٥  
Chironomus  
plumosus (S). Chironome duveteux (F).  
حشرة من الهموش طولها يراوح من ٩ الى ١٣ م . ثوبها  
اطلح اللون يقطعه خط اسود ويعترضه تجديع اصفر .  
سيقانها صفراء اللون . ارضائها الامامية مهدبة مستطيلة .  
يرتبتها حراء اللون تعيش على النباتات المائية وقد تلثم اوراق  
بعضها .

٣٠٠٤٣ - هَمُوشِيَّات \* ٥  
Chironomidae,  
Tendipedidae (S). Chironomides (F). Midge (E).  
Zuckmücken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
كثيرة العدد جميعها صغيرة القدر قريبة الشبه من البعوض .  
اجسامها عادمة الحراشف . قرونها الاستشعارية ريشية .  
رؤوسها صغيرة . اغطائها وتوابيعها قصيرة لا تمكنها من  
اتصاض الدم || تكثر على الاعشاب المائية وعلى المواد  
العضوية المختصرة قرب مجاري الماء . تعتبر من الهوام  
المزعجة غير الضارة .

٣٠٠٤٤ - هَمِيد  
Dette non réglée (F).  
كل دين لم يدفع بتاريخ استحقاقه .

٣٠٠٤٥ - هَمِينَة صَيْفِيَّة \* ٥  
Hemitea aestivaria (S). Hémichée estivale (F).  
Hemitea aestivaria (E).

حشرة من فصيلة الاقليات حرشقيات الاجنحة . موطنها  
بعض الاقاصع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس  
واروپة . فراشها جارية قوتها رقيق الانزاع . سرفتها  
تعيش على اوراق السديتان || جسمها قصيف يطول نحو  
١٠ م . بسطها نحو ٣٠ م . رأسها معتدل الحجم . عينها  
ناشرتان . زباناها مطشيان عند الذكر ، غيطيان عند  
الانثى . جرشها وبطنها الى الخفسار الزيتي الخيطي المواج ||  
رواشنها عند التشقين الى الخفسار الزيتي الاسمر المواج  
يتوسطه خط متعرج حطلي ويملوه عند الذكر تسع نقط  
حطارية سراء اللون ، وسبع نقط حطارية عند الانثى ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى  
حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تماثل بعل ظهورها  
بنحو ستة اسابيع وتمتلك المنك لطعاً صغيرة مربعة على  
الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرقه عند بلوغها  
الكامل تطول نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،  
مقوس المؤخر . ثوبها الى السمرة الزيتية المواج تعلوها رشفة  
غراء واسع خطوط متعرجة جذوية . رأسها الى الجوزة ||  
رواشنها لبطنية الوسطى ماصة مما يجعلها تنفوس عند  
الاتصال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً  
ينقضي تحت القشور وبين قشورق اللحاء ضمن صلجة  
خاوية تحببها السرقه باقلم من اربعة ايام .

٣٠٠٤٦ - هَمِيلِيَّة \* ٥  
Hemileia (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات . تتميز بدعماها  
اللاقياسية التي تلبق فيها الاشكال المردنية والبرمية .  
مشيها يعيش ويتكاثر في النسيج النباتية السطحية .  
هيفها مجهز بمراشف خضمة . نكاتها حزنية التجميع ،  
اسطوانية الشكل او صوانية || انواعها المعروفة ٢٣  
جميعها من فطور البلاد الحارة والاستوائية . اعرفها  
واشهرها هميلية البن .



هَمِيَّة صَيْفِيَّة



هَمِيلِيَّة الْبُنْ



هَمِيَّة



هَبْرَ أَحْمَرُ الْمِقَار

المحب الدقيق الشاك، ترتفع من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقتها حافسة متعاقبة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. تصالها سنانة، ذرية، مزينة الصفحات العليا. أزهارها بيضاء اللون مرقوشة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. تنويرها ربيي أو غريفي.

٣٠٠٦٥ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة (S). *Tricyrtis pilosa* (S).

*Tricyrtide velu* (F).

نوع من الهنداء. منبها الهند. ساقها خلية اللحاء، قليلة الفروع، ترتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقتها حافسة متعاقبة، خلية اتصال السنانة الشكل || أزهارها إلى البيضاء المجاني، قطرها نحو ٢ سم. تنويرها يستمر طوال شهر أيار.



هنداء شاكّة

٣٠٠٦٦ - هَبْرَ أَحْمَرُ مُسْتَطِيلَةُ الزُّنَيْد (S).

*Tricyrtis macropoda* (S).

*Tricyrtide à long pédicelle* (F).

نوع من الهنداء. منبها الصين. ساقها قليلة الخيل والزغب ترتفع من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقتها متعاقبة معقّة؛ تصالها اهليلجية ماسلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. || أزهارها مستطيلة الزنيد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى البياض المجاني يعلو تمسح برقالي ينصرف نيا بعد إلى الاصفر || تنويرها ربيي.



هندب

٣٠٠٦٧ - هَبْرَ أَحْمَرُ \*، طَرَحَقُون

*Taraxacum dens leonis*, *T. officinalis*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). *Pissenlit officinal*, *P. commun*, *Dent-de-lion* (F). *Dandelion*, *Blow-ball*, *Canker-wort* (E). *Echte Kuhlmann*, *Löwenzahn* (D). *Tarassaco*, *Tarassaco*, *Dente di leone* (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الأراضي المزروعة ويعبر من النباتات الكاسحة الصارية. جذوره غليظة أسطوانية. أوراقتها قرصية الانتشاب ضمية. أزهارها رؤسية التجميع. أوراقتها الفينة مأكولة عديدة المنافع الصحية || ضروبه الزراعية البقلة المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبزر. تيزر مشالته من أوائل الربيع إلى أواسط الصيف. تدرس الشتول في مستقرا على أبعاد تراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.



هندب

٣٠٠٦٨ - هَبْرَ أَحْمَرُ \*، هَبْرَ أَحْمَرُ

*Cichorium endivia* (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batavian endive* (E). *Endivie*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli orti* (I). نبات يقل من فصيلة المركبات السبئية. أصرامه عديدة تتجمع إلى ضربين الهندباء الجعدة والهندباء الخسنة. جذوره غليظة حزامية الشكل. أوراقتها قرصية الانتشاب. أزهارها إلى الزرقعة السانجورنية.

٣٠٠٦٩ - هَبْرَ أَحْمَرُ بَرِّيَّة \*، هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة

شيكوريّة

*Chichorium intybus* (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Cichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglio*, *Radichio* (I).

نوع من الهندباء وهو نبات يقل بري وزراعي. ضروبه المشهورة عديدة فأورقها الممّزة شاكّة، خواصها الصحية والطبية واحدة، جميعها ناعمة نقي الدم. جذورها حزامية مستطيلة. سوقها فراء تعلو نحو ٢٠٠ سم. أوراقتها



هندباء برية

٣٠٠٧٠ - هَبْرَ أَحْمَرُ الْمِقَار \*

*Irisory erythrorhynchus* (S). *Moqueur à bec rouge* (F).

نوع من الهبّر. موطنه أواسط افريقية. جسمه أخيف القد يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه إلى الزرقعة السفام يعلوها مواج براوح من الاربواقي إلى الأخضر اللامس. جناحاه وذنبه مبقعة بالأبيض. عيناه عسلتان. منقاره وساقاه إلى الحمرة || يألف الثابات والاراج الكثيفة. سر به يعد من ٤ إلى ١٠ أزواج. قوته الحشرات والديدان وتلثل الحنّس || يبدن شته في تجاوير الاشجار. انشاء تحضن ٨ بيضات نحو ١٦ يوماً.

٣٠٠٥٨ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة (S).

*Mimidae* (S). *Mimidae* (E).

فصيلة طير من لافقات النمل ورثية الجواثم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة. معظمها من طيور القصرة الامريكية وبعضها افريقي واسيوي || القسم الذي يستوطن امريكة الجنوبية أبدي في مناطقه. اما القسم الذي يستوطن امريكة الشمالية فانه من القرواط التي تجوب البلاد في طلب الحصيد والمشي || اشهر اجناسها الهبّر.

٣٠٠٥٩ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة (S).

*Siren* (F). *Siren* (E).

جنس حيوانات قازية من فصيلة الهنجلديات. انواعها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا. تألف ضفاف مجاري المياه العذبة. تعيش معظم حياتها في الماء || اجسامها شبه قريشة الشكل تطول من ٣٥ إلى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة. اسنانية. اعطائها مستعرضة الاشدق. عيونها شديدة الصغر. اعانقها مجهره باطافن مجمدة وشرومة. وهي مجهره ايضاً بقاقتين فقط. قائمتها صغرتان. اماميتا الارتكاز || قوتها الديدان والديدويات الصغيرة.

٣٠٠٦٢ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة (S).

*Sirenidae* (S). *Sirenidae* (E).

فصيلة حيوانات قازية من رتبة الهنجل. كانت، قبل التصنيف الاخير الذي يعود إلى ١٩٦٥، تنتمي إلى رتبة السرفقيات. اما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة إلى رتبة الهنجل || انواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق امريكة الشمالية وكندا.

٣٠٠٦٣ - هَبْرَ أَحْمَرُ مَرْغَبِيَّة (S).

*Tricyrtis* (S). *Tricyrtide* (F). *Tricyrtis* (E).

جنس نباتات جذمورية جادحة معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعها المعروفة سبعة مهددا الشرق الاقصى || سوقها شراخية مرققة. أوراقتها حافسة متعاقبة سنانة التصل. أزهارها طرفية بيضاء اللون أو مرقوشة بالبنفسجي || تزور للزئين ولا تخشى البرد. ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج، المساوية التركيب العنصري، الغنية بالمواد الضفوية والازوت || اشهر انواعها الهنداء الشاكّة والمزينة والمستطيلة الزنيد.

٣٠٠٦٤ - هَبْرَ أَحْمَرُ شاكّة \* (S).

*Tricyrtide hirsuta* (S). *Tricyrtide hirsuta* (F).

نوع من الهنداء. مهددا اليابان. ساقها منتصبه كثيفة

Genie rural (F). هندسة ريفية  
Rural engineering (E).  
علم يتناول التشييد الزراعي على اختلاف أنواعه من الابنية الى الاقنية .

Genie agricole (F). هندسة زراعية  
Agricultural engineering (E).  
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاستثمار .

Géométrie plane (F). Plane geometry (E).  
علم يبيحث في السلوح ذات البعدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).  
علم يبيحث في الاشكال ذات الابعاد الثلاثة اي الاجسام كالكرة والمكعب والمهرم .

Genie électrique (F). Electric engineering (E).  
علم يتناول انتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

Genie civil (F). Engineering (E).  
علم يتناول البناء باشمل مراحله .

Genie mécanique (F). Mechanic engineering (E).  
علم يتناول الميكانيكا وما ينشئ منه من آليات .

Counolisseur (F). هندس  
Counolisseur (E).  
المهندس من كان علمه او اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

Volvula (S). هنيك  
Volvule (F). Volvule (E).  
الحنة منزل من منازل القمر الشامية وهي مجموعة من حنة كواكب يقال لأجزاء الرز والثاني الميسان . وهي تشبه بشكلها الألف الكوفي في رقيب الحنة يدعى النام .

Paroplia scamica (S). هنيكة المروج  
Paroplie des prairies (F).  
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يظل من ٣ الى ٤ م . || ثوبها حنطلي اللون تملوه رقة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها ممتد الطول . عيناها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والدة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . جميعتها بحمرة . ظهرانها كابل

مستطيلة مفرسة . اذهارها الى الزرقاة الزاهية || زراعها تستوجب بعض العناية اخصها الطمر بالقلش او بالمواد الدبالية للحصول على اوراق عادمة الخصب .

Chicorée frisée (F). هندباء جعدية  
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها قرصية لينة مجمدة النمل الكثير التشرم والتسنين .

Escarole, Scarole, Scariole (F). Endive (E).  
ضرب من الهندباء الزراعية المأكولة . اوراقها فائضة مستعرضة متراكبة . نصلها متمم الصفحة ، مفرس الحار .

Witloof, Chicorée de Bruxelles (F). Witloof (E).  
نوع من الهندباء الزراعية تتميز بجنودها الحمرلية الشكل والقد وباوراقها الضمية المنتصبة . راجع ونلوف .

Hendersonia (S). هندرسونية  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . انواعها قليلة لا مؤذية . ونباتها سمراد اللون تحضن القصاصات البكتيرية التي تخترقها فتقوب الحق . بونياتها اهليلجية الشكل ، عديدة الخلايا حنطية اللون .

Hendersonia (S). هندرسونية  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . انواعها المرفوعة زهاء ٢٠٠٠ مملتها يدعى علم الاذى او قليله || يكندباتها كروية الشكل او مغلطة ، محصورة الارتكاز او شارفة . جودا لحمي التسج اسمر الصفحة الخارجية . بونياتها وشعبة ، مؤثرة ، حنطية اللون || اشهر انواعها ما يتبع .

Hendersonia acicola (S). هندرسونية إبرية  
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص فيوشها برقة حنطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تنسج الى النصل اذا لامتها العوامل الطبيعية وتسبب الاعبال الباكر .

Hendersonia paricola (S). هندرسونية إجاصية  
فطر مجهرى من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص والسفرجل والتفاح فيوشها برقة مزوانية الشكل سمراد اللون تسبب تميم نسيج النصل والاعبال الباكر .

Hendersonia canina (S). هندرسونية وردية  
فطر مجهرى من الهندرسونية يصيب اغصان الورد وثمار . مظهره الخارجي بقع صفراء مزوانية مبهمة سوداء اللون تملو الاغصان والثمار دون ان تقع بها شديد الاذى .

Genie électronique (F). Electronic engineering (E).  
علم يتناول الالكترونىك وتجهيزاته .

Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).  
علم يبيحث في تطبيق القواعد الجبرية على الهندسة .



هنيك



٣٠٠٩٨ - **هَوَالِيَّة** ، **اَيُرُوِيَّة** Aerobique (F).  
Aérobic (E).  
نمت تعريف يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.



هَوَك

٣٠٠٩٩ - **هَوَاتِي الْجُدُر** Exorhize  
نمت تعريف يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة.

٣٠١٠٠ - **هَوَالِيَّة** ، **اَيُرُوِيَّة** Aérobie (F).  
Aerobe (E).  
صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش منقطعة عن الهواء.

٣٠١٠١ - **هَوَالِيَّة** Pulsatile (F).  
هي شقيق النهران ، اطليه .

٣٠١٠٢ - **هَوَبَر** ، **طَنَج** Rhinopithecus (S).  
Rhinopithèque (F).  
جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاسراج الجبلية التي ينمرها الثلج نحو اربعة اشهر || اجسامها متوسطة الحجم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم . وجوهها الى الخضار الاسفر . منامها رقيقة الالبنة . اذنها طويلة الشعر المزعري الشكل والقد ، لونه الى الوردية الصنائية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو موج فضي . اذنانها جللة تطول نحو ١٠٠ سم . || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ || قوتها الثار والاشباب والجلود والبراعم والنواهي . اناها تقص جرواً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور.



هَوَبَر

٣٠١٠٣ - **هَوْتَة** الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - **هَوْتَسْتَرَا** Hutchinsia (S).  
Hutchinsia (F). Hutchinsia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العائلة الايرلندية السيدة هوتستر . عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اعطائها تشمل بعض اقالم البحر الابيض المتوسط || ساقها فروع قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم . اوراقها متعاقبة مركبة ، وثرية العدد ، لحاسية او سباعية او تساعية الورديات السنانية الصغيرة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٣٠١٠٥ - **هَوْتِين** Hotinus (S).  
Hotine (F). Hotinus (E).

جنس حشرات واشمة من نصفيات الاجنحة المشجاسة وفصيلة البراقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تمتد من الهند الى الصين . تألف الغابات والحدائق قوتها وحرق الازهار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها صغيرة ناشرة . قربوها الاستشعارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت العين . جباهها ناتئة تمتد كالقرون المتسلسلة الشفافة . اذنها بيضاء اللون تكثر فيها السمرة الصنائية الموج . رواشها لاحقة مبقجة بالاعصر والاصفر .



هَوَجَل

٣٠١٠٦ - **هَوَجَل** \* Hugonia (S).  
Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).  
جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكنائيات . مهدا

الحنجية ، لاحف ، حنطلي اللون ، اسمر العروق . رواشها غشائيات ، شفافة . بطنها الى الحنطلي ، يسمر في الصفحة السفلى ويصفر في العليا . قوامها حنطلية سمراء || مسرحها المروج والمراعي . قوتها التسع .

٣٠٠٩٢ - **هَنْتِيلُوك** ، **هَوُدِي** \* Heniochus (S).  
Hénioque, Cocher (F). Whip-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكاكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رقيقة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . بطنها دالقة المتضر . زعانفها الظهرية تنتهي بعرق غضروفي المادة يشبه سوط الحودي . اذنها الى الوردية الخضراء او الوردية الفضية يعلوها تجديع معترض اسود || فوهها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٠٩٣ - **هَوَاك** Air  
هو ما يستنشقه كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تغلف سطح الكرة الارضية فتكون السكاك او السحاح ، وتقل كثافتها كلما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مربي الموج وارتفاع ٦٠٠٠ م . اما العناصر التي يتكبد منها الهواء ونسبها فهي :  
ازوت نحو ٧٨ جزءاً  
اكسجين نحو ٢١ جزءاً

ثم التزير من الازوين وغاز الكربون والازون والنيون والكربتين والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - **هَوَاكُج** Sylviadés (F).  
في الدخليات ، اطليه .

٣٠٠٩٥ - **هَوَاك** Saprophage (F).  
Saprophagous (E).  
الحشرات المهاوكة هي التي تعيش على المواد النباتية للمحلة .

٣٠٠٩٦ - **هَوَاك** \* Calorampus fuliginosus (S).  
Calorampe fuligineux (F).

طائر من المتسلقات وفصيلة البقاقيات . موطنه بعض اصقاع الهند والبلاد المحررة . يألف الادغال والخراج البميثة الانجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملجئه الحياتي جماعي ، فريه قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق عرضه . جناحاه صغيران ، ذقان . ذنبه معتدل الطول ضيق العرض ، مقطوم الطرف . ثوبه الى السمرة الساجية المتفاوتة المائج . منقاده وقامتساة الى السمرة الزنية || صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والثار النسية البرية || يدن عشه في تخاليف الانجار . الانثى تحض رسدها من ٣ الى ٤ بيضات بينا الذكر يؤين لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - **هَوَاْمَانِي** \* Aérhydrique (F).  
نمت تعريف يطلق على ما يتنقل بالهواء والماء او يعمل بالهواء والماء .

الهند. جذورها ولحاء ساقها وفانداها مرققة وتدر البول. ساقها فروع تملو نحو ثلاثة أمتار. أثمارها فردية أو ثنائية الخواص. أوراقها متعاقبة، متعقبة، نصلها صغرة الجسمية الشكل، سنانية الاطراف. ازهارها عذقي التجميع، عمودي الاذنكاز وطرفي. ازهارها صغرة الحجم خاصة البتلات، وردية اللون. ثمارها صؤفكية تلحف عجمة صغرة عذدة السطح. ازهارها وجذورها عطرية العرف المحتسب الشبيه بالبفسنج.

### Phaeostillibaceae

٣٠١١١ - هُودُ الْيَتَات °  
عارة فطور مجهرية من فصيلة الكحيبيات. تتميز بأعضائها الخواصية المباشرة اللون. تشمل عدة أنواع تنتمي إلى ثلاثة أجناس: الأزارويسيس والسيزانوس والشلفة.

### Ranella (S).

Ranella (F). Ranella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معليات الأرجل وفصيلة البسويات. أنواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة أعصها المحيط الهندي || أعضائها شبه أهليجية الشكل محاذية يعلوها جذاران جانبيين ممددان أو مائلان أو شاككان يكتنفانها من طرف الفوعة إلى العقب.

### Stigmatopélie (F).

٣٠١١٣ - هُودُ كَلَة °  
طائر من فصيلة الحاميات قريب الشبه بالترغلة. مهدد المناطق الحارة من العالم القديم يجوبها في طلب المرتع والمصيف والشتى || جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٧ سم. ثوبه إلى الطحلة الصنابية المقد تسمر في الرأس والظهر والجناح والذنب، وتغير في المحصر والعنق والصدر والبطن والافتيك. متفادع حنطلي اللون. رجلاه إلى السمرة || يدخن عشه في الأشجار المتوسطة الارتفاع. حضنته بيضتان. الانثى تقوم بالترنيم اما الذكر فيؤتي لها القوت.

### Surnia funerea (S).

Surnia, Chouette-épervière (F).

٣٠١١٤ - هُودُ كَة °  
طائر من البويات وعماراة القاديات. ثوبه إلى البياض الكاهب يملو تسنج اسمر يطوق العين والاذن. رأسه عادم القترعة مستعرض وقصير. محصره لاطى القورس. منفره قوي البهرة. سقطه كبير القد منفرج الزاوية. ذنبه منفض الريش، مستطيل. أرساغه ومخالبه قصيرة كاسية. موطنه فسح الارباع يشمل معظم المناطق المعتدلة. يألف أحرار الصنوبر والمزر. يسرح في النهار وفي الليل يستريح من الساعة العاشرة إلى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة ليلاً إلى الثالثة بعد نصف الليل. || يدخن عشه في تجاويف الأشجار ومخالبه الصنوبر. الانثى تضع من ٤ إلى ٨ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر. || قوته الجرذ والفأر والحشرات على اختلافها. ج. هؤ.

### Monstruosité (F).

Monstrosity (E).

٣٠١١٦ - هُودُ كَة °  
الابتعاد المسهبين عن الشكل المألوف ان في الحيوان أو في النبات.

### Etang naturel (F).

Natural pond, N. pool (E).

٣٠١١٧ - هُودُ °  
بحيرة صغرة تفيض بها مياه غياض وأجام فتسع. ج. أهود.

### Haworthia (S).

Haworthia (F). Haworthia (E).

٣٠١١٨ - هُودُ رِيَا °  
جنس نباتات لحمية مرققة معمرة من فصيلة الزنبقيات.

### Heodes phlaeas (S).

Culvré de l'oseille (F). Heodes phlaeas (E).

٣٠١١٧ - هُودُ البَطْبَاط °  
حشرة من فصيلة القنقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمنة من الشرق الاوسط إلى اروبة. فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار. سرقتها تعيش على اوراق البطاطس والمبيض جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م. بسطتها نحو ٢٨ م. رأسها صغير الجرم. عينها ناشترتان. زباناها نحو صولبانيان. جوشنها حنطلي اللون كسنتي المراج بسطها كسنتي اللون || روشنها الامانيان إلى الصهبة المنعفة يملوها سبع نقط كسنتية وشعار خارجي من اللون نفسه. روشنها الخلفيان إلى السمرة الكسنتية الغبراء المراج يملوها قرب الطرف الخارجي جدة مذبذبة الاطراف لونها إلى الصهبة المنعفة || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في البهار. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج المكن ميحادياً إلى نصال اوراق المائل || السرعة عند بلوغها التكال تطول نحو ١٥ م. جسمها أهليجي الشكل، المحسد الظهر، كيف الحمل القصير. ثوبها إلى الخضراء الاسود يملو غط قاطب احمر وتسه اطواق كسكية جزوية اللون. رأسها ارجواني اللون. مذهبها ورواجها إلى الطحلة السمره || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ثلاثة اسابيع، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعاً.

### Heodes virgaureae (S).

٣٠١١٨ - هُودُ الحَمَاص °  
فراشة من فصيلة القنقيات. طولها نحو ٣٣ م. ذكرها اسمر الجسم غليظ الصدر مستند البطن. رواشته إلى الصفرة الحمراء المراج يطوقها حطار اسمر ويملوها تنقيط لا قياسي الحجم والبهره. أثمارها صغرة الحجم غليظة الصدر والبطن رواشها إلى الصفرة الخنطية يطوقها حطار اكهب ويملوها تنقيط اسمر اسود || يألف المنافع والمراعي. يسرح من حزيران إلى آب. يرقته غصاة تركب اوراق الحمص.

### Heodes chryseis (S).

٣٠١١٩ - هُودُ التَنَافَع °  
فراشة من فصيلة القنقيات. طولها نحو ٣٢ م. ذكرها اصهب الثوب يملو مواج مذهب. رواشته إلى الحمرة الصنابية يملوها تنقيط اسمر وتمشج أزرق، حطارها عابن اللون، ابيض الطرف. أثمارها صغرة الحجم، حنطية الراوشن الموضحة بالاصفر والاخير يملوها تنقيط اسود ويملوها حطار اسمر || يألف المنافع والمواقع الرطبة. يسرح من حزيران إلى تموز. يرقته تركب اوراق معظم النباتات المنعفة.

### Heodes dorilis (S).

٣٠١١٠ - هُودُ الوَرَّال °  
فراشة من فصيلة القنقيات. جسمها مخروطي الشكل اسمر اللون يطول نحو ٣٠ م. ذكرها كسنتي الراوشن المنقطه بالاسود. أثمارها خضمة الشكل، رواشها إلى الصهبة الخضراء



هود البطاط



هود الحامص



هود المنافع



هودعة



هودنة



هودة

مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية. سوقها متدعة لا أثر لها. أوزانها صغيرة الحجم، خمية النصل. أزهارها بيضاء اللون || تزرع للزيت ضمن البيوت. ترفع في التربة المعتدلة الانتماع، || الوافرة الحصب، الغنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || أنواعها عديدة أشهرها التالية :

#### ٣٠١١٩ - هَوْرِيَا جَامِدَة (S). Haworthia rigida (F). Haworthie rigide (F).

نوع من الهورثيا. أوزانها مشققة، خسمية الصفوف، عمودية الارتكاز، تطول من ٧ إلى ١٢ سم. نصلها شديدة الصلابة، بحرية الخضار، يطولها موج اسمر. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ٣٠١٢٠ - هَوْرِيَا سَوْدَاء (S). Haworthia atrovirens (S). Haworthie noire (F).

نوع من الهورثيا. أوزانها منتصبة، خسمية النصل، عرجونية الشكل، تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٨ سم. نصلها مثالثة، منشارية الحفاف. لونها إلى الخضار اللامع الشديد السمرة. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ٣٠١٢١ - هَوْرِيَا لَوْرَجَة (S). Haworthia viscosa (S). Haworthie visqueuse (F).

نوع من الهورثيا. أوزانها مشققة، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب، عمودية الارتكاز، تطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٢٠ إلى ٣٥ سم. عقمها شائكة. عصارة نصلها لزجة. أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ٣٠١٢٢ - هَوْرِيَا مُرْدَدَة (S). Haworthia fasciata (S). Haworthie zébrée (F).

نوع من الهورثيا. أوزانها مشققة أفقية الارتكاز، تطول من ٣ إلى ٤ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم. نصلها مائل الصفحة العليا، لؤلؤي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب، عشن الصفحة السفلى. أزهارها بيضاء اللون، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ٣٠١٢٣ - هَوْرِيَا مُشَبَّكَة (S). Haworthia reticulata (S). Haworthie réticulée (F).

نوع من الهورثيا. أوزانها مشققة، أفقية الارتكاز، مقطعية الرؤوس، تطول نحو ٢٥ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها محدبودة الصفحات العليا، محددة السفلى. لونها إلى الخضار الزاهي تملوه خطوط متشابكة سمراء اللون. أزهارها تبينة اللون يطولها موج اسمر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ٣٠١٢٤ - هَوْرَس (S). Rhacophorus (F). Rhacophore (E).

جنس حيوانات قازية شجرة من الصفادح وفصيلة الموريات. أنواعه المعروفة نحو ٣٠ أعطانها تمتد من الهند إلى الصين واليابان وجزيرة مدغشقر || أجسامها متباعدة القد يكثر فيها الحجم الوسط. أوزانها ثمانين البيئة التي تعيش فيها. أصابع قوائمها مقيدة بحظب رعية تمتد

#### ٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيَّات (S). Rhacophoridae (F). Rhacophoridae (E).

فصيلة حيوانات دوداء قازية شجرة من لم الحديديات ومربية السنويات وربة البربات. أجسامها وأنواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الآسيوية والأفريقية ومدغشقر. جميعها من الصفادح المعتدلة الحجم || أجسامها متوسطة القد. أوزانها مختلفة الألوان يكثر فيها الأخضر. تنسج بجاذية البيئة التي تعيش فيها وتتميز أيضاً بمساحة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز قناتها، وتخلو فقرة العجز من التواءات العظمية الجانبية. فكلها العليا مسنة. أصابع قوائمها مقيدة بحظب متباعدة الرحابة والامتداد. أطراف أصابعها مجزأة بلبب محمية تمكثها من تسلق السطوح المائلة || تعيش معظم حياتها على الأشجار وتختلف النباتات || أناثها تترأ في مخاض خاصة تتخلها بمؤازرة الذكور على شفاف المنافع والقدان فوق مستوى الماء ينحو ١٠ سم. ثم تحله نقاً ثانياً منحدراً من المخضن إلى سطح الماء. الإناث عند التفرقة تفرز أولاً مادة رغوية فوّارة تمسكها شلة الدليل المؤلفة من ٤٠ إلى ٦٠ ديلة. ويبقى الدليل ضمن هذه الرغوة التي توفن له الرطوبة حتى التفت فيزلق أذاك على سطح المنحد ويغوص في الماء.

#### ٣٠١٢٦ - هَوْرَسَة (S). Aphomia sociella (S). Aphomie sociale (R).

فراشة من فصيلة التاريات وربة حرشيات الاجنحة. الاثنى اكبر قدماً من الذكر. يسطها نحو ٣٥ سم. وبسطة الذكر ٢٦ سم. جسمها إلى البياض الخططي الموج. ريشها الامامية إلى البنية الشبه في الزاين الأولين ثم إلى الطحلة الخضراء. تمتدتها خطوط سمر ونقط سود تنامح الاعصاب. ريشها الخلفية إلى البياض الأفر. اهداب ريشها فضية تركز على جده سوداء قليلة العرض || يربطها إلى الطحلة الصفراء تملوها ثمل سمر. رأسها جويوي اللون || تعيش في عشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدغل المنازل والمكاتب وتستودعات الورق ففرض الورق والكذب والقلين ...

#### ٣٠١٢٧ - هَوْرَس، لَاهِر (F). Falaise (F). Cliff (E).

حدود مجذاعي ملتف من ارتطام أمواج البحر. ج. هوراع ولواهر.

#### ٣٠١٢٨ - هَوْرَن (F). Huron (F).

حيوان لاحم مفترس يدعى غرزون، اطلبه.

#### ٣٠١٢٩ - هَوْرَة (S). Hura (S).

Hure, Sablier (F). Sandbox, Possumwood (E). Sandbückenbaum (D). Sablier blanca (I).

جنس اشجار برية وعرجية من فصيلة الفربيونيات. أنواعها المعروفة ٥ أعطانها البلاد الاستوائية والحارة. أوزانها منقطة متناقبة نغيفة. نصلها قليلة الشكل، مدببة القصعة. ثمارها مجموعة من القفوص الثنائية الغلغة تحضن زوراً لبها جعالي المادة الفعالة. والجار عند الافلاحة يد الادراك التام تحدث دوراً يشبه دور الانجاز يستخرج من عصارة سوقها ومن لباب ثمارها مادة قلبية جمالية شديدة التلظ.



هورس



هورة

## ٣٠١٣٦ - هُوشِيرَا مُدَمِّمَةٌ

*Heuchera sanguinea* (S). *Heuchère sanguine* (F). *Coral bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglöckchen* (D). *Eucera sanguina* (I).

نوع من الهوشيرا ، شارينغا تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اورانها مدارة خماسية او سباعية الفصوص المسنة المهدبة. نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع ، لونها الى الحمرة الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

*Hovenia dulcis* (S).

## ٣٠١٣٧ - هُوفِينِيَّة

*Hovénie*, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovenie*, *Zieseln* (D). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البقيات . هذه الشرق الاقصى من اليابان الى الصين . ثمرته تملو حتى ٢٠ م. اورانها معتقة متعاقبة عابلة؛ نصلها قلبي الشكل يطول ١٦ سم. ويعرض نحو ٩ سم. صفحته مائلة البشرة ، مسنة الحافة. ازهارها عشوية التركيب ، صغيرة القند ، ريجالها وقناياتها لبانية الماددة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

*Spermophilus* (S).

## ٣٠١٣٨ - هُوقِل

*Spermophile* (F). جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة السنجائيات. انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكا الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة القند طولا يراوح بين ٢٠ و٢٥ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشيقة . رؤوسها احشوية الشكل . عيونها كبيرة . اذنانها مستديرة . جرائرها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فمخنثية . اذنانها قصار جيلات الصفوف . اثوابها سوية اللون ورؤوسها واطراف جرائرها الى الجفوة الصنانية . ظهورها الى الريد . بطونها الى الصفار الشبي . وفي بعض الانواع الامريكية الثوب مخططة ومنها مؤطرة . تالفة الادغال والحقول المزروعة . تنسلق الانجار بحفّة ، لكنها تقضي حياتها على الحفيض . ججورها حشرات فسيحة مستديرة عديدة الاتفاق تمرزها في الهواء على اعماق تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سم. قوتها البزور والحبوب والجنود والغار والوزغ والطير . انائها تقع من ٣ الى ٦ ادراس تبصر وتكتسب بعد اسبوع .

*Semnopithèque* (F).

## ٣٠١٣٩ - هُولَان

نوع من القرود المقدسة يدعى هبار ، اطلبه .

*Sphingidae* (F).

## ٣٠١٤٠ - هُولِيَّات

هي فصيلة الصمليات من حرشفيات الاجنحة .

*Protoparce* (S).

## ٣٠١٤١ - هُولِيَّة

*Protoparce*, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصمليات او الهوليات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القند لا يقل طولا عن ٦ سم. وبسطةا تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها مخططة عابطة المواجه يملوها بنمط تجميع وتبيّج اسمر . رؤوسها الامامية. والخلفية مزرققة ومزركشة بالاسمر والاحضر

*Horia* (S).

*Horie* (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منغطة طلية من غمديات الاجنحة وفصيلية الفراحيات . انواعه المعروفة قليلة الممد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من المالحين القديم والجديد . الجملانة منها غاشلة واثمة ، اما البرقة فقائصة وبعضها يتطفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها كبيرة ناشزة . ملاحها الشفوية قاضية . قرونها الاستشعارية صولجانية مقوسة . كوسلها اضيق من الرأس والبطن . اغمادها بجنية الشكل . الثوبا متباعدة الاوان يكثر فيها الاحمر الحمرى والجذوي ، بعضها ملقو الغمد بطوقين ، قاعدي وطرفي || جميعها نافطة تستعمل استمال الذراع .

*Gyps des Indes* (F).

## ٣٠١٣١ - هُوزَب

هو القشعاه الهندي ، اطلبه .

*Ketupa*

جنس طير من البويات وحمارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يند من الصين الى الهند وبلاد فارس. جميعها كبيرة القند ، قريبة الشبه من البو . طولا يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اثوابها الى الطحلة يملوها رقعة سوداء. تالفة النابات الظليلة القائمة على مجاري الماء . مسرحها جدوي يند من النسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقشريات || تدن في تجاوب الانجار . حفنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هوزن جابا وهوزن سرتديب .

*Heuchera* (S).

## ٣٠١٣٢ - هُوشِيرَا

*Heuchère* (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I).

نبات معقود التعريف على اسم الطبيب النساوي هوشير (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشوية برية ويزينة من فصيلة القليات . انواعه نحو ٤٢٠ جميعها جذسورية معمرة . اورانها جذعية الانتشاح لا قياسية الاشكال . والتفصيص . ازهارها صغيرة القند لا نظامية التجميع ، منها العشوية والنسيلية والشكلية . جميعها تركز على شارينغ منتصب رفيعة .

## ٣٠١٣٤ - هُوشِيرَا امْرِيكِيَّة

*Heuchera americana* (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينغا تملو نحو ٥٠ سم. اورانها مدارة خاسية او سباعية الفصوص المسنة الحافة . نصلها مثل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع ، صغيرة القند ، تبلى الى الخضار الباهت ثم تنحرف الى الحنطلي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٣٠١٣٥ - هُوشِيرَا صَغِيرَةُ الزَّهَر

*Heuchera micrantha* (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوشيرا . شارينغا تملو نحو ٦٠ سم. اورانها مدارة خاسية الفصوص المسنة . نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها عشوية التجميع يبيض البتلات ، خضر الكؤوس ، هو المابر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هوزن



هوشيرا



هوفينية



هوقل



هوليّة

٣٠١٤٩ - **هُومِيرَة الحُصَاب** (S). *Homeria collina*  
*Homerie des collines* (F).

نوع من الهوميرة. منبتها الغصبات المشرفة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وريتها وحيدة مستطيلة النصل. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الحمرة السفعاء أو الحمرة الموحشة بالبرتقالي في تنويرها صفبي.



هومية أنيقة

٣٠١٥٠ - **هُومِيرَة أَنْيَقَة** (S). *Homeria elegans*  
*Homerie elegante* (F).

نوع من الهوميرة. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. وريتها وحيدة مستطيلة. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الصغار الكبرى تعلو رقعة زرقاء في تنويرها صفبي.

٣٠١٥١ - **هُومِيرِيَّات** (S). *Humiriaceae* (F). *Humiriaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات، رقيقة المبيض. اجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٠ أعطانها البلاد الاستوائية اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها شجيرات ونباتات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، عادية الزينات، جلدية النصال. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها خنثوية، نظامية، خاسية الاجزاء. ثمارها نوية || اشهر اجناسها الهومير.

٣٠١٥٢ - **هُوهُو، كُوكُو مَذْهَب**

*Chrysococcyx auratus* (S). *Chalcite doré, Coucou doré* (F). *Gilded cuckoo* (E).

طائر من القوقايات وفصيلة القيقويات. أصله افريقية الشرقية من البحر الاحمر الى الموزنيك. يألف الغابات الكثيفة. يحمله الاغصان الاقنية الارتكاز في الانجبار البائقة || وهو من الضوارب التي تجوب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم. نوبه إلى السمرة الخفيفة يملؤها مزاج اسفع في الجناحين وماجة ذهبية في ريش سائر الجسم || قوته الخشراة والاساريع اثناء كاش الوقواق لا تحضن البيض بل تقعه في شاش غيرها من الطير اخصها عشاش العصافير الحاضرة.



هويا

٣٠١٥٣ - **هُوَيَا** (S). *Hoya* (S).

*Hoya, Hoyer, Quadrille* (F). *Fleshy leaved, Wox flower plant* (E). *Fleischige Hoya, Porzellanblume* (D). *Fior di cera, Fiore della cera* (I).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الصقلابيات. جميعها جنبات مستطيلة عارشة قرواء. أوراقها متعاقبة منقطة بيضة الشكل. نصلها جامد الصفحة، قائم الخضار. أزهارها صيواني التجميع قلنسوي الشكل ايلي الارتكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بتلاتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

٣٠١٥٤ - **هُوَيْسَة** (F). *Lophiomyx d'Inhaux* (F).

حيوان لبون قاصم يدعى لفيوم، اطليه.



مياد

٣٠١٥٥ - **هَيَاد \*، هَيَاص** (S). *Hyas* (S).

*Hyade* (F). *Hyas* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الأرجل قصيرات الذيل المحرمات وفصيلة المامجات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها محرمة، معتدلة التسطيط، مثلثة الصفحة العليا، تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. ملاقطها نشطة. قوائمها

والاصفر والاخر المجزوي. || تظهر الفراشات وهي وحيدة أو ثنائية الجليل الحولي في اوائل حزيران فتتمائل ثم تمتع مكبها على أوراق التبغ وسائر نباتات الفصيلة الباذنجانية فينتفخ بعد تمتعه بخمسة ايام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران. يرقها تدعى الدودة القرنية || يرقها غفرارة اللون، سمره الملب، كبيرة القد، مجعدة الجوانب، تحمل في اعل مؤخرها زائدة صفنية التركيب تشبه القرن. وهي تبلغ حجمها النهائي بعد نفقها بأربعة اسابيع فيراوح اذ ذاك طولا من ٨ إلى ٩ سم. || اغرارها كبيرة لانها تلتهم النصال من عروقها ولا تلبى الا على الاصلاح الشخينة || تكافح تغيرا أو نضجا باستعمال اخضر باديس او زرينخات الرصاص او الكربوليت او الاندريد.

٣٠١٤٢ - **هُوم** (F). *Sous-sol* (F). *Subsol* (E).

الحوم هو بطنان الارض لا يظاله حرث او قنب.

٣٠١٤٣ - **هُومُ الجُوس**

» شجرة شبيهة بالياسمين فيها بعض الحلاوة الحدة وأجود زهرها الاخير الذي يملوه صفرة ويكون حديفاً وسحيت هوم الحوس لأن عدة النار يستعملونها في عبادتهم ويسندون لها منافع عجيبة.

٣٠١٤٤ - **هُومَات** (S). *Humate*

ملح يتأتى عن الحامض الدهالي.

٣٠١٤٥ - **هُومُس**

هو الببال، اطليه.

٣٠١٤٦ - **هُومِيَة أَنْيَقَة** (S). *Humea elegans* (S).

*Humée élégante* (F). جملة سبروتية زينة عملة من فصيلة المركبات. مهدها استرالية. ساقها قرواء معلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة حاسنة. نصلها اهليجلي الشكل، جميل الخضار، خلى الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رائحته، عند اللمس، هوموية العرف. أزهارها رؤسية التجميع، صغيرة القد، كثيرة العدد، تطول من ٨ إلى ١٠ سم. لوناً يختلف مع الفرب، منها القرمزي والياقوتي والاشقر الخفي والابيض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين. تتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاثرية المعتدلة الاندماج والرطوبة.

٣٠١٤٧ - **هُومِير** (S). *Humirum* (S).

*Humirie, Houmiris* (F).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الهوميريات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدها امريكة الاستوائية. سوقها معتدلة التفنيد. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصال. أزهارها عشكولي التجميع، طرفي الارتكاز. أزهارها بيضاء اللون أو تبنية أو وردية.

٣٠١٤٨ - **هُومِيرَة** (S). *Homeria* (S).

*Homerie* (F). *Homeria* (E).

جنس نباتات عشبية ووفسية برية وزراعية زينة معقودة التعريف على اسم هوميرس. منبتها بعض اصقاع الشرق الاذن وافريقية الشمالية. سوقها شراخية. أوراقها فردية ضيقة النصال المستطيلة. أزهارها جملة الشكل، متساوية البتلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب || وهي من فصيلة السوسنيات. انواعها قليلة العدد اشهرها التالية.



هَيْبَال



هَيْبَر الْجَزَاب



هَيْبَر الْقَرْفَل



هَيْبَر الْقَطَانِيَّات



هَيْبَر مُتَلَوِّن



هَيْبَقُون

كبيرة . اثوابها الى المغرة الصفراء المواج || تألف المواقع التي يكثر فيها الخث او الانثاق او الحيوانات الطحلبية حيث ترتب طرائدها بامشاطن || اشهر انواعه الهياذ المنكوبتي (H. arancus) .

٣٠١٥٦ - هَيْبَار (E). Ebouls (F). Fallen rocks (F). هي المواد المنهارة من حفور وغيرها .

٣٠١٥٧ - هَيْبَاط (F). Marée montante (F). Flood-tide (E).

هو اندفاع مياه البحر ودونها من الشط . ويدعى المد ذلك لان العياجة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة تنتشر وتمتد وتقرب .

٣٠١٥٨ - هَيْبَب (S). Hippa (S). Hippe (F). Hippe (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الاذناب وفصيلة الهيببات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة || اجسامها صغيرة القد ، محبة الظهور ، تطول من ٢ الى ٤ سم . تتميز بقرونها الاستعمارية المشارية التركيب المستطيلة المحجبة وبمعاليقها العينية المستطيلة وبارجلها القصيرة المستعرضة الاطراف التي تمكنها من الانتقال بسرعة . اثوابها تراوح بين الزرق والبركة يطولها الى السرة .

٣٠١٥٩ - هَيْبَبَال (S). Hybalus (F). Hybale (F). Hybalus (E).

جنس خنافس من غديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الخنافس . انواعه المعروفة ١٢ اعطائها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والجزيرة العربية || اجسامها شبه بيضية الشوزن تطول من ١٠ الى ١٥ سم . كواسلها وانحادها متدلة الاحديداب . رؤوسها مخروطية . متاكها ناشرة مدبية . عيونها صغيرة ماصحة . قرونها الاستعمارية مكررة الاطراف الصفيحية . قوائمها نشيطة متكاثفة الحلب الذي يطوق ايضا الرأس والجزء الاسامي من الكوسل . اثوابها تراوح من الشفحة السمر الى الجفوة . انحادها لاحفة ، مستديرة الاطراف || جميعها جامدة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة .

٣٠١٦٠ - هَيْبَر (S). Hypera (S). جنس حشرات من السوسيات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٣ الى ٧ سم . اثوابها مختلفة الانواع يكثر فيها الخنثى الاسمر . قرونها الاستعمارية مرفقة منفردة الزوايا || اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . مسرهما دجوي . اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠١٦١ - هَيْبَر الْجَزَاب (S). Hypera fasciculata (S).

نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ سم . ثوبه حنطي اللون تملوه مشعة رمدية وتغطي قاطب اسود . يألف الارربة الرملية . يركب جميع انواع الجزاب وبمظم النباتات الزرقية التي يقضم اوراقها || يرقاته مؤذية تنخر البزاعم وقد تسبب تلفها .

٣٠١٦٢ - هَيْبَر الْقَرْفَل (S). Hypera arator (S). نوع من الهيب . طولها يراوح من ٥ الى ٧ سم . ثوبه الى

السرة الخنطية يملوها توسيع قاطب قليل السرة والدكانة . يرغب في الارربة القليلة الاندماج والرطوبة . يركب اكثر القرفليات فيقضم الارقاق ويؤذيها .

٣٠١٦٣ - هَيْبَر الْقَطَانِيَّات (S). Hypera nigrirostris (S).

نوع من الهيب . طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم . ثوبه الى الخضرة الزاهية ، خطمه اسود . يرغب في المواقع القليلة الرطوبة . يركب القطانيات فيقضم الارقاق ويؤذيها . يرقاته تلهم البزاعم والازهار تنفض عليها .

٣٠١٦٤ - هَيْبَر مُتَلَوِّن (S). Hypera variabilis (S).

نوع من الهيب . طولها نحو ٥ سم . ثوبه الى الصفار الخنطي يملوه مواج اسف . يركب اوراق البرسيم فيعملها كالغزال . يرقاته صغيرة القد فستقية اللون تعيش على البزاعم والارقاق الناشئة .

٣٠١٦٥ - هَيْبَر سَيْسِيَّة (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الدلانيات . انواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع جزر الزايج واوقيانية واورالية واسبانية || نصف نباتات شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي او مستلق واعراض . اوراقها متعاقبة ، كبيرة النصال ، معتقة او حاصنة . ازهارها محورية الاوتكاز او البطية ، كبيرة القد ، خماسية البتلات المنسطة ، يسود فيها الابيض التبي المواج ، ومنها الصفراء والناارية والاريجوانية والمروضة .

٣٠١٦٦ - هَيْبَر سَيْسِيَّة (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

٣٠١٦٧ - هَيْبَقُون ، \* اَفِقَقُون ، \* جَهْرَة (S). Hypocum procumbens (S). Hypocum, Hypocoon, Cumin cornu (F). Procumbent hypocum, Horned cumin (E). Pfefferkummel, Hornkummel (D). Cornacchia (I). نبات عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه بحرية اللون كثيرة التفريش والتشريح . ازهاره فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، رباعية البتلات المزدوجة التركيب . محار قرون مستطيلة منجلية الشكل .

٣٠١٦٨ - هَيْبُوب (S). Hippopus (F). Hippopus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات صفيحيات الخياشم وفصيلة الجربانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض بحار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والخليج الهندي || اصدها لامتساوية المصارع والاضلع والتخديد الطولي ، ملونة ومبجبة بالاحمر والاسفر || تعيش بمنمنمة في الرمال وفي الاسمال على اعماق تراوح من مترين الى خمسة امتار .

٣٠١٦٩ - هَيْبِيَّات (S). Hippidae (F). Hippidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ، طويولات الاذناب . اجسامها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ || اعطائها بحار البلاد الحارة . تألف المواقع الكثيرة الامات والتي لا يزيد عمقها عن ٣٠ متراً || دعاميها قريبة الشبه بدعاميصر السرطان الا ان اذنابها عادة الحمة || اعرف اجناسها الهيب .



هيبي

السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٦ سم. جسمها اسطواني الشكل. ثوبا الى الحلة الفراء يملؤها تمشيش اسود وعظوظ قاطبة ومترسة صفراء اللون وثعلو جانبيه مهدية. رأسها شديد السرة. تحمل في اعل عنقها زائدة صغيرة فيجأة نارية اللون تنتشر عند الانقضاء وتقوق منها رائحة حريفة مزجية. وراجهما ومدهما الى السرة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٨ اسبوعا تحضيا الحادرة متدلية برباط المشتن تقضده الحاصية.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة Aglon (F). Eaglet (E).

هو فرخ العقاب لا يزال بحاجة ابيه واه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة بقلة من التيجل (اللسان).

٣٠١٧٨ - هَيْج Etiolement (F). Etiolation (E). اصفرار النبات وتحوله. راجع قضاة.

٣٠١٧٩ - هَيْج \* Nycticebus tardigradus (S). Nycitébée tardigrade, Loris tardigrade (F). Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة البوريات موطنه يمتد من الهند الى صومال. يألف الغابات والارحاج المبهمة الاشجار التي يتسلقها بحقة مدعشة. جلته الحياتي جامعي. جماعته قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ سره دجوي يستمر من لعمه الليل الى فجر العميق. قوته اوراق الاشجار وزمعاتها والرائحة البانعة والغرثات والعصافير ويضها || يمتد من الحيوانات الشاجرة لانه يحضي معظم حياته على الاشجار. جسمه قصيف صغير يطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالعدم الذنب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الخطم والانف. عيناه كبيرتان مستديرتان. اذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان. شعره جتل بالغ النوية خلي للمس. ثوبه الى الصبهة الصفراء المواج يملؤها تمشيش ادهس في الايطان يملوهو خط قاطب كستني يمتد من الحاجبين الى قة الرأس فتج الظهر فالسرم. عيناه مطوقتان بالاسود ادهس. قصبه انفه غبراء اللون. وثوبه هذا يتحور مع العمر اذ تملوه نمشة فضية تزداد مع مرور الاعوام || الانثى تتحل ينوب الذكر الا انه اهدت ماجة وهي ثنائية الثدي. يحملها يستمر نحو سبعة اشهر تقفع في تمام جروا واحدا.

٣٠١٨٠ - هَيْب Cumulus هو الصير، نوع من الغيوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هيدرات Hydrate جزيء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربائية.

٣٠١٨٢ - هيدرات الكربون، مَوَاد هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّة Hydroates de carbone, Matières hydrocarbonées (F). Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها الخلاصات غير الأروية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هَيْدُرُوكِيلِيَّات Hydroptilidae (S). Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملنيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد

٣٠١٧٠ - هَيْمَة Fibigia (S). Fibigie (F). Fibigia (E).

جنس نباتات نجمية او عشبية معمرة برية من فصيلة الصليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، جميعها من ثبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سورها فراء. اوراقها متعاقبة، سنانية النصال. ازهارها شبه سنبل التجميع. ازهارها صغيرة صفراء اللون. ثمارها سنكية، شبه بيضبة الثوزن، مبظلة الجرم، خلية السداة، ثنائية الزور والمقلطة المستديرة || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٧١ - هَيْمَة جُوبِيَّة Fibigia clypeata (S). Fibigie à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نجمة صغيرة. اوراقها الجذعية سنانية النصال المستطيلة، اوراقها العليا غيظية. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٢ - هَيْمَة صُورِيَّة التمر Fibigia eriocarpa (S). Fibigie laineux (F).

نوع من الهيمية. عشية معمرة. اوراقها الجذعية رجيمة النصال المستطيلة المسنة الحمار. اوراقها العليا عصفية الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحمل الذي يبدو كالصوف تنويرها صيفي.

٣٠١٧٣ - هَيْمَة مَنَحْشِيَّة Fibigia rostrata (S). Fibigie éperonné (F).

نوع من الهيمية. عشية معمرة. اوراقها كاوراك الجلوبية. ثمارها كثيفة الحمل المتوسط الطول، تنتهي بنمخش حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٤ - هَيْمَام \* Zerynthia (S).

جنس حشرات فراشية من عمارة المذانيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ سم. اجناسها اسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملوثة يكثر فيها الاحمر والخطوط القاطية. رواشها الى الصفرة تملوها زركشة سوداء وتقيج احمر وازرق || تظهر في اوائل الربيع، تمتد مكثها على مختلف النباتات البرية. يقيف عن رقات خاضلة تعيش على اوراق النبات. يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون نمشة بالاسود.

٣٠١٧٥ - هَيْمَام الزَرَاوَنْد \* هَيْمَام السَّوَالِح Zerynthia polyxena - creusa (S).

Zerynthie du littoral, Thais, Cassandre (F). Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات ورتبة عرشيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها وراشمة قوتها مغفر الازهار، سرتها تعيش على اوراق النباتات البرية واخصها الزراوند || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كستني اللون. عيناه كبيرتان ناشزتان. زباناها صرغانيان. جوشها كستني اللون. بطنها الى الخنطى العاني يملوه تنقيط جانبي اصفر وعظوظ قاطبة ومترسة كستنية || رواشها، عند الشقين الى الصفرة تملوها زراكنش وتزويق سود وبقيع ونقط حر وزرق || لها جيل واحد في الحمل. تظهر الفرائشة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع للمكن ميحاديها || تعصال اوراق النباتات البرية واخصها الزراوند ||



هيام



هيام الزراوند



هيج

٣٠١٩٢ - هيدروولوجية  
Hydrologie (F).  
Hydrology (E). علم خصائص المياه وتوابعها .

٣٠١٩٣ - هيدروميس \*  
Hydromys (S).  
Hydromys (F). جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعه قليلة موطنها أستراليا . جميعها قاذية . أجسامها مسطيلة . طولها الكامل يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها مدوية الشكل . زلاقيها مقنطرة . أذنانها مستديرة . جرابها قصيرة ، أصابعها خاسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وغفاف الأنهر والبحيرات ، تسبح وتغطس بسهولة فائقة . قوتها المواد النباتية والاسماك الصغيرة والقشريات .

٣٠١٩٤ - هيدكة \*  
Nectria (S). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . أنواعه عديدة بعضها شديد الازدى || يوهض الخارجي اهليلجي الشكل ، صغير القد ، رمعي الارتكاز . اصنافه فضحة ، نودلية السطح ، مرجانية اللون ، تركن على ونية نائقة || بوغ نكتاها ثنائي الحياء تشطره وبيرة متعرجة الى جزئين لا متساويين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعه واضرها الست التالية .

٣٠١٩٥ - هيدكة حمراء \*  
Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Né-crose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrank-helt (D). فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية اغصانها الاجاص والتبلا والبنقد والنبوت والجوز والحور والخلاف والمان والوخج والدرادر والزان والزيزريق والشرم والصفيراء والصنوبر والعنبر والغيراء والقرون والقيقب والكستة والبلابل والمران والملث والتبق والهدال الخ... فيغطها وقد يسبب يسهها || مظهره الخارجي بنور جوية اللون لا قياسية البعثة تركب الاغصان والافنان من الربيع الى الشتاء تنشط البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشاب البراعم فيديو الخشب عاريا من القشور تملو كسعة سمراء || يكافح في الانجبار المشمرة بكافة الهيدكة الحنطية .

٣٠١٩٦ - هيدكة حنطية \* ، آكلة التفاح  
Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancre du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D). فطر مجهرى يصيب التفاح والاجاص فيسبب الوص المروغ يأكلة التفاح || مظهره الخارجي بنور مقروسة لا قياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافنان والثمار || يبدو على الافناد والافنان بقع جوية تركب بشرة اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فتجدها وتقتضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتغطها || وهو على الثمار بقع غفينة تركبا قبل الادراك وعندها وبعدة فتغط السدق وتمتد بعد البشرة والقشرة . يذبل الشمر ويسقط او يقصر ويبقى كالموياء .

تكتنفه طبقة غروية لزجة لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يكافح أولا بقطع الاغصان المصابة ويتبعثر الجروح إما بسلفات الحديد المحلول ٢٪ وإما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس بايخ ٢ ، زيت كتان محروم ٢ . ثانياً باستعمال سائل بورود المحلول ٢ الى ٣٪ او غيره من الفوطاير الفعالة على ان تنفض الانجبار في الخريف

المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصفر ، سمراء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٦ الى ٨ م . اجنتها الامامية كثيفة الخدل مبقجة || ملجنا الحيائي جماعي . افواجها كثيرة العدد . طيراتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحة الليل || اساريمها تعيش في المياه الراكة ملحوة بمجاليب مبطلة او قنعية الشكل ، حريرية التسج || اشهر اجناسها :

Hydroptila (S).  
Agryleia (S).  
Oxyethira (S).

الهيدروبتلا  
الافريلا  
الاكيسيرا

### ٣٠١٨٤ - هيدروبيسيكيات \*

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).  
Hydropsychidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جلزويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، وبداء اللون . بسطة اجنتها تراوح من ٢٠ الى ٣٢ م . اجنتها قليلة الزاويين ، شبه شفافة ، مهدبة الحوافي الخلفية . ملابسها الفككية مستطيلة عند الشقين || اساريمها طليقة ، تعيش في المياه الجارية بين الاعشاب المائية والصخور . بعض اجناسها مقترس يصطنع شبك يحكمها بين الاعشاب فيقترب من يلقن من حويينات || اشهر اجناسها :

Hydropsyche (S).

الهيدروبيسك

٣٠١٨٥ - هيدروجين ، هيدروجين ، هيدروجين  
Hydrogène (F). Hydrogen (E). مولى الماء . غاز شديد الاحتراق عادم اللون والطعم والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية . رمزه (H-يد) . وزنه الاتومي ١.٠٠٨ - راجع ايدروجين .

Hydrographe (F).  
Hydrographer (E).

٣٠١٨٦ - هيدروغراف  
العالم بالياه السطحية وياصولها .

Hydrographie (F).  
Hydrography (E).

٣٠١٨٧ - هيدروغرافية  
علم المياه السطحية ووصفها .

٣٠١٨٨ - هيدروليات \*  
Hydrophidae (S).  
Hydrophidés (F). Hydrophidae (E).

فصيلة حيات خبيثة سامة من اماميات الاحاديد . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التساقط لأنها تظلم يعضها في الرمل . ومنها انواع تقسم الاغوار وتسير بعيدا في الأنهر || اعرف اجناسها واشهرها الهيدروبيس المروغ بحية الماء والقمام والبرداس والتجافة .

Hydrophis (F).

٣٠١٨٩ - هيدروفيس  
اطلب حية الماء .

Hydrocarbure (F).  
Hydrocarbon (E).

٣٠١٩٠ - هيدروكربور  
الهيدروكربور تألف الكربون والكربون والهيدروجين .

Hydrocotyle (F).  
Pennywort (E).

٣٠١٩١ - هيدروكوتيل  
هي قصعة الماء ، اطليها .



هيدروبيس



هيدكة حمراء



هيدكة حنطية



اصقاع العالم . سوقها فردية تلشعب عند القمة . اوراقها جذرية الانتشاب . ازهارها رؤسية صغيرة ملونة || اعراف انواعها واشهرها ما يلي .

### ٣٠٢٠٤ - هيراسيوم اُرْغَب ، طَقْرَة

*Hieracium pilosella* (S). Piloselle, Vélutée, Orelle de rat (F). Mouse ear hawkweed, Mouse ear (E). Kleines Habichtskraut, Mausohrchen (D). Pelosella, Pelosetta (I).

نوع من الهيراسيوم البري . جذوره طيبة يقال انها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزنية تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها جذرية الانتشاب ، بيضيه الشكل ، نصلها ازغب البشرة على صفيحتيه . ازهارها فردية ، صفراء اللون . ذهبيه المواج .

هيدكة سوداء



هيدكة صنوبرية



هيدكة قمرية



هيدكة مرجانية



هيراسيوم



هيردان



هيرة

### ٣٠٢٠٥ - هيراسيوم بُرْتَقَالِيّ

*Hieracium auranticum* (S). Epervière orangée (F). نوع من الهيراسيوم التّريبي . ساقه تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها جذرية الانتشاب باستثناء واحدة او اثنتين . نصلها اعليجي الشكل ذلك الزام الاخضر لونه الى الخضرة الداكنة . رؤسياته الزهرية برتقالية اللون ، عابكة المواج ، كثيرة العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٥ || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

### ٣٠٢٠٦ - هيراسيوم صُفْلِيّ

*Hieracium villosum* (S). Epervière à toison (F). نوع من الهيراسيوم التّريبي . ساقه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها الجذرية منمقة ، سنانية الشكل ، تطول من ٧ الى ١٠ سم . وتعرض من ١ الى ٢ سم . اوراقها الجذعية لائقة ، قلبية الشكل ، صغيرة القند ، جميعها بحرة اللون يطولها مواج ازرق . نصلها مستطيل الزغب المبعثر . رؤسياتها الزهرية فردية التجميع او ثنائية ، لونها الى الصفراء الزاهي || تنوره يستمر من تموز الى اليلول .

### ٣٠٢٠٧ - هِيرْدَان \* Falcaria (S). Falcaire, Crite (F). Falcaria (E). Sichelöldle (D). Falcaria (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الحبيبائيات . انواعها المعروفة اربعة ، منها الحقل والبراري . سوقها فروع منتصب . اوراقها كفية مستطيلة الاثنا والعشرون لاصقة . ازهارها صيولي . ازهارها صغيرة القند ودية اللون او ليلية .

### ٣٠٢٠٨ - هِيرِيَة \*

*Hyria* (S).  
*Hyrie* (F). *Hyria* (E).  
جنس حيوانات مائية من الرغويات صفيحيات الحياشيم وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها انهر وميجرات امريكية الجنوبية واعضها نهر الايازون || اصداها كبيرة القند ، متساوية المصارع الاذنية ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . غشاء اصفاها من الداخل معتدل السكاكة للؤلوي المادة || تعيش في اسماح الصفاف ومنها انواع تقترب من الاغوار || لحوها مأكولة ، متوسطة الصفت .

### ٣٠٢٠٩ - هَيْس

*Age* (F). Plough-beam (E).  
هو السلب اي الجزء الجامع لاثار اجزاء الحشرات .

بعد الاعبال || هذا مع العلم ان التفاح او الاجاص المعرض لهذا الوسم هو الموجود في الموانع الرطبة والمغروس على اعماق تقفوق ٥٠٠ سم . وفي تربة كنوم او تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

### ٣٠١٩٧ - هَيْدَكَة سَوْدَاء \* ، أَكَلَة الزَّان

*Nectria ditissima, Cylinrocarpon willkommii, Fusidium candidum* (S). Chancr du hêtre (F).  
فطر مجهري يصيب الزان بانفاته الفتية فيطعها . مظهره الخارجي لمطع قديمة الشكل سواد اللون دائرية الانتشار يراوح طولها من ١ الى ٢ سم . تصيب بشرة الانسان وتنتشر عرضاً الى ان تطوقها تنفضي على اللحماء وعلى التبادل التنسي . وقد تسبب قروصاً نائفة تملعب الخشب كما في التفاح والاجاص والحور .

### ٣٠١٩٨ - هَيْدَكَة صَنْوَبَرِيَّة \* ، أَكَلَة الصَنْوَبَرِيَّات

*Nectria cucurbitula, Cylinrocarpon cylindroides tenue* (S). Chancr des conifères (F).  
فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصنوبرية اخصها الصنوبر والتوب || مظهره الخارجي يقع مهدية الخار لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الحمرة الغراء . اهدائها بيض قصار لا متساوية الانتشار والكثافة ، تتري الاثنا المجروحة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة على التربة الرطبة || اضراره زهيدة لا تستلزم المكافحة .

### ٣٠١٩٩ - هَيْدَكَة قِرْمِزِيَّة \* ، أَكَلَة الحَوْر

*Nectria coccinea, Cylinrocarpon candidum* (S). Chancr du peuplier (F).  
فطر مجهري يصيب الحور فيصيب الوسم المعروف بأكلة الحور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والزان والسندبان . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم ، قمرية اللون . تركب بشرة القصبان والاثنا نصلها بعد ان تقرح اللحاء والشكبر . وبض الخشب || يكافح في الحور مكافحة الهيدكة الخطيفة ومن المستحسن تخفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

### ٣٠٢٠٠ - هَيْدَكَة مَرْجَانِيَّة \*

*Nectria ribis, Tubercularia confluens* (S).  
فطر مجهري يركب الكشش والاجاص والزيتون والورداد . مظهره الخارجي بياس فبالي يحل بعض افاد الشجرة ثم يعقب ظهور بثور منتفخة لا قياسية الحجم لونها الى الوردى ثم يتحرف الى المرجاني || يكافح بقطع الاعضاء المصابة عند ظهور البياس وباستعمال الطرق المذكورة في مكافحة الهيدكة الخطيفة .

### ٣٠٢٠١ - هَيْتَرَاو

*Hyrrare* (F).  
حيوان لاسم مقترن يدهي غرزون ، اطليه .

### ٣٠٢٠٢ - هِيرَازْمَاج

*Menthe crépe* (F).  
هو التمتع الجعدي ، اطليه .

### ٣٠٢٠٣ - هِيرَاسِيُوم \* ، حَشِيشَة الغُرَاب

*Hieracium* (S). Epervière, Orelle de souris (F). Hawkweed, Hawk's eye (E). Habichtskraut, Distelkraut (D). Ieracio, Orecchio di topo (I).  
جنس نباتات عشبية معمرة برية ويّزينة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة زهاء ٢٠٠ منتشرة في معظم

Choléra des poules (F). **هَيْفَةُ الطير** ٣٠٢٢٠  
هي كوليرا الدجاج ، اطلها .

٣٠٢٢١ - **هَيْفَمَان \*** ، **فُجُلُ الخَبِل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracia (F). Common horse-radish (E). Meerretich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).

جنس نباتات عشبية طيبة برية معمرة من الهيفانيات وفصيلة الصليبيات . جنورها غليظة مستطيلة يضاء اللون خردلية العلم . اوراقها متعاقبة منقطة سنانية الشكل . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، سنبلية التجميع ، هامة الارتكاز . ثمارها خربشات دقيقة مستطيلة . بزورها مستدرة سمراء اللون ، يعتمر منها زيت طيار يشبه زيت الخردل ، يذوي زيت خردل الزهوان او الخردل الالماني . وهو مضاد لداء الحفر ، يدر للصاب والبول . ويقيد الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْفَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢

سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها الهيفمان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْطَلَة** ٣٠٢٢٣  
هي الارخ السوداني ، اطلها .

Molossinés (F). **هَيْعَرَات \*** ٣٠٢٢٤  
عمارة من فصيلة الرماسيات . اجناسها اربعة ، تتميز باذنانها المنفصلة عن الفشاء الجلدی || أما اجناسها الاربعة فهي : الزغاب والصفوح والغور والهيرة .

Molosse (F). Molossus (E). **هَيْعَرَة \*** ٣٠٢٢٥  
جنس غفافيش من عمارة الهيريات . موطنه البرازيل والاقبل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة القد رمية . رؤوسها غليظة . فراطيسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ، قليلة الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاوب في الانحجار الحرجية والمغاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦  
North-East wind (E).  
رياح مهبها بين الشمال والشرق وجهها بين الجنوب والغرب . وهي رياح حارة نكباء تهيج النبات وتؤذيها .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات \*** ٣٠٢٢٧  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويغات . تتميز بهيئتها السطحي الارتكاز ، التدني الشكل . كائناتها تعمل كرمياتها الزوانية || فصائلها اربع : الكنتيات والكحيبيات واللصحيات واللصحيات .

Hyph (F). Hypha (E). **هَيْفَة \*** ، **غُرْل** ٣٠٢٢٨  
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية عادمة الخضيب يتألف منها هيكل الفطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل** ، **جَرِيَع**

Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glockenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).

جنس جنبات برية ورييانية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenèse. **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠  
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهيستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجْرَافِيَة** ٣٠٢١١  
Histography (E).

الهيستوجرافية وصف الانسجة العضوية .

Histon **هَيْسْتُون** ، **هَيْسْتُون** ٣٠٢١٢  
عنصر فرضي يقال انه اساس المواد النووية الحليوية .

Ronceraie (F). **هَيْشَة** ٣٠٢١٣  
Brake, Brambly ground (E).

هي دغل الباليق او منيته وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هو الحرف ، اطلها .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**

Carduacées, Carduinées, Cynarées, Cynarocéphales, Flosculeuses (F).

سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي شوكي والقرقرم والقتنطرين والصفهيا والكارارين والارتقطين وربي الايل والورطة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِي** ، **كُوشِيَة هَرَمِيَة** ، **مَكْنَسَة الحَنَة**

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprés (F). Mock-cypress, Summer-cypress (E). Sommer-Cypresse (D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الهيشم وهو عشبة حولية ترييانية هرية الشكل . ساقها فروع فناء . اوراقها مشرمة خطية لينة تبدو حيلة الخضار الاصفر الزاهي ثم تنحرف الى الصنابي وتستقر على الاحمر الى ان تلوي في اواسط الحريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الهيشور والحشوم واحد . قيل « نبات رغو فيه طول على رأسه برعومة كأنه عتق الرأل » . وقال ابو حنيفة : « من العشب وله ورقة شاكبة منها شوك خشن وهو يسقم ، وزهرته صفراء وتطول ، له قصبه في وسطه حتى تكون اطول من الزبل » (اللسان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْص** ، **هَيْص** ، **ذَلْق** (F). Fiente (F). Dung, Droppings (E).

هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاصدمة العضوية النشطة التي بالمادة الارزوية || يقال هاص وهاض وذلق وذلق الطائر : ربي برجيته .

٣٠٢١٩ - **هَيْصُور \***

Sisor سمكة بحرية مستطيلة وحيدة الجنس والنوع من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . اعطائها المياه الهندية . تتميز بغرابة جسمها المردني الشكل الدقيق الطرف . رأسها مقطوم الخطم . تحمل في فكها عذبتان مستطيلتان ، زعانفها كبيرة القد . زعنفتها الشرجية تفتي بذيل دقيق كالأس طولها يعادل طول الجسم .



هيصور



هيفمان



هيمرة



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي



هَيْكَلُ عَظَمِي

ساقه معتدلة الجرم ، ناشرة الطوق بيفاض اللون . نكتة كالتوبيخ قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسفع اللامع . اطراسه الى الوردي العايق .

### ٣٠٢٣٦ - هَيْكَلُ عَظَمِي \* Hypholoma fascicularis (S). Hypholome fasciculé (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على لحاء الجذوع المقطوعة . ساقه رفيعة ، دقيقة ، معوجة ، صفراء اللون . نكتة قلنسوية الشكل ، رهلة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لؤلؤ الساق . اطراسه دقيقة ، نحيلة ، زيتونية اللون . لحيتها صفراء اللون ، مرة المذاق .

### ٣٠٢٣٧ - هَيْكَلُ عَظَمِي زَنْجَارِي \* Hypholoma aeruginosum (S). Hypholome vert de gris (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في غابات السديان والمثلل . ساقه لزجة ، مستطيلة ، رمادية اللون ، رقيقة الطوق . نكتته دقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري الموح . اطراسه الى البني الزنجاري .

### ٣٠٢٣٨ - هَيْكَلُ عَظَمِي قَرْمِيدِي \* Hypholoma sublateritium (S). Hypholome brique (F).

نوع من الهيفلوم . يعيش على الارياض والجذوع النخرة . ساقه معوجة معتدلة الارتفاع والفلاحة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبطلطة . نكتته صبوانية الشكل ، قريبيية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيتها بياض اللون ، مرة المذاق .

### ٣٠٢٣٩ - هَيْكَلِيَّات \* Hyphomycetes (F). Hyphomycetes (E).

فطور مجهرية غزلية ، عارية الزود ، ظاهرة الخيط الكثيفة التجميع ، تترى لحاء الاشجار والجلود والورق وفيها ... فتسبب نوعاً من المغن القصار .

### ٣٠٢٤٠ - هَيْكَلِيَّة \* ، شَجَرَةُ المَطَاطِ ، مَطَاطِ Hevea (S). Hévéa, Arbre à caoutchouc (F). Caoutchouc tree (E). Kautschukbaum (D). Eves (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية من البنوعيات السوسيات . انواعه قليلة العدد . اوراقها مستعاقية ، معتقة ، اهليجية ، مستطيلة التصل الجادة . يستخرج من سوقها بالخر عصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيل وهيفية النويان .

### ٣٠٢٤١ - هَيْكَلِيَّات ، هَيْكَلِيَّات ، هَيْكَلِيَّات الحيق والحيقم : ذكر النعام . يقال أشم من هيق وأهدى من يجل .

### ٣٠٢٤٢ - هَيْكَلِيَّات \* Ossature (F). Framework (E).

مجموعة الاعضاء الجادة الصلبة الرئيسية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

### ٣٠٢٤٣ - هَيْكَلُ عَظَمِي Squelette (F). Skeleton (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المروعة ٦ ، مهدا يمتد من البياض الى الزوية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة عابلة . ازهارها رباعية الفصل ، خماسية البتلات المندمجة القاعدة ، ثنائية السداة ، بجلة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

### ٣٠٢٣٠ - هَيْكَلُ عَظَمِي الشُّرُوبِ Forsythia viridissima (S). Forsythie vert franc (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من مرتين الى ثلاثة اثمار . ساقه فرعاء . فروعها مجوفة السلاحيات ، منتصبه ، خضراء اللون . اوراقها معتقة سنائية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهاره الى قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهتة || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

### ٣٠٢٣١ - هَيْكَلُ عَظَمِي اُرُوبِيَّة Forsythia europaea (S). Forsythie d'Europe (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فرعاء . فروعها منتصبه صماء اللون . اوراقها معتقة قياسية الشكل ، نصلها جامد الصفحة متعاقبة التسنين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ٤ الى ٦ سم . ازهاره لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

### ٣٠٢٣٢ - هَيْكَلُ عَظَمِي اَزْهَار Forsythia suspensa (S). Forsythie à fleurs pendantes (F).

نوع من الهيفل التزييني ، جنيته تملو من ٢ الى ٤ م . ساقه فرعاء . فروعها مجوفة السلاحيات ، نحيلة اللون ، تشبه مستقيمة منتصبه من تنطف وتندل . اوراقها مركبة ثلاثية التصريح ، وريقاتها جامدة التصل مشارية الحافة . ازهاره متدلية ، لونها الى الصفار المذهب العايق . تنوره يستمر من شباط الى اذار .

### ٣٠٢٣٣ - هَيْكَلُ عَظَمِي \* Hypholoma (S). Hypholome (F).

جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحارة والحارة . تعيش على جذوع الاشجار واريوماتها وعلى الزبل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير مرغوب فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

### ٣٠٢٣٤ - هَيْكَلُ عَظَمِي مُعْطَف \* Hypholoma depilectum (S). Hypholome pelé (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه غليظة ، مضغمة ، دقة ، تنتهي بطوق متعرج الحاشية ، لونها الى الطعلة يملوها تشبه ازرقة . نكتته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطعلة الصفراء . اطراسه تبدو ليلكية ثم تتحرف نحو الحمرة الاربوانية .

### ٣٠٢٣٥ - هَيْكَلُ عَظَمِي تُونُجِي \* Hypholoma coronillum (S). Hypholome petite couronne (F).

نوع من الهيفلوم . يوجد على الزبل في المواقع الرطبة .

٣٠٢٤٤ - هَيْكَلَة

Scélotographie (F).  
Sceleotography (E).

الهيكلة علم يبحث في الهياكل العظمية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الإنسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - هَيْل ، أَنْقُرْد ، نَقِير

Hile (F).  
Hilum (E).

نقرة صغيرة في البزرة لا قياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية الثمرة .

٣٠٢٤٦ - هِيلَانِيُوم \* ، هِيلَانِيَة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سبوتية من فصيلة المركبات . أنواعه عديدة معظمها أمريكي المنبت . أوراقها متعاقبة ساذجة . أزهارها رؤسية مستعرضة للسينات المسنة . مخزنها بضيصة الشكل . بلورها خماسية الشذور المهدبة أو المسنة . اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - هِيلَانِيُوم أَمْرِيكِي

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه مزغبة فراء تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه حاشنة ساذجة سنائية النصل . رؤسياته الزهرية جوية اللون عادمة للسينات || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - هِيلَانِيُوم خَرِيفِي

Helenium automnale (S). Hélénie d'automne (F).

نوع من الهيلانيوم المعمر . ساقه سرحة فراء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقه حاشنة ساذجة سنائية النصل المسن الخار . رؤسياته الزهرية مذهبة القراص ، كبيرة السينات الثلاثية أو الخماسية التفريص || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - هِيلَانِيُوم تَحِيلِ الْوَرَق

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الهيلانيوم الحولي أو الحول . ساقه فراء تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . أوراقه خيطية النصل الذي يعرض نحو ١ م . رؤسياته الزهرية عتوكوية التجميع ، صفر الاقراص ، يفيض السينات الشارفة المقرفة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - هَيْلَسْت الصَنْوِير \* ، هَيْلَسْت أَسْوَد

Hylastes ater (S).

Hylaste des pins (F).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٤ م . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركب مع ريقاتها بطور الصنوبر فتلتهمها وتؤذيها .

٣٠٢٥١ - هَيْلَسْت النَقْل \*

Hylastinus obscurus (S). Hylaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكراشيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م . نوبها الى السمرة الفحمة يعلوها خل الحبل . مرتعها يختلف من مرتع سائر أنواع جنسها لأنها تعيش على النباتات العشبية بدلا من الاثمار . يعي مع ريقاتها تركب النفل في جذوره فتلتهمها وتقضي عليها .



هيلانيوم



هيلست الصنوبر



هيلست النفل



هيلوت سداسي الخطوط



هيلود

٣٠٢٥٢ - هَيْلَمَة الْقَمَح \*

Hylemyia coarctata (S). هي ذبابة الحنطة ، اطليها .

٣٠٢٥٣ - هَيْلَمَة الْمُخْفُوف \*

Hylemyia brassicae (S). هي ذبابة المخفوف ، اطليها .

Hylemyia cana (S). هي ذبابة الغبراء ، اطليها .

٣٠٢٥٥ - هَيْلَمَة رَصَاصِيَة \*

Hylemyia brunescens (S). هي ذبابة الخرنفل ، اطليها .

Anthomyidae (S). هي حشرات من فصيلة الذبابيات ورتبة ذوات الجناحين .

اجناسها وأنواعها عديدة جميعها ضارة تؤذي النبات . راجع ذبابيات .

Hylobate (F). هي حشرات من فصيلة الخنافس .

٣٠٢٥٧ - هَيْلُوبَات \*

هو الجبون ، اطليه .

٣٠٢٥٨ - هَيْلُوت سُدَاسِي الْخَطُوط \*

Helotes sexlineatus (S). Hérote à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . اعطائها تمتد من الهند الى استراليا || جسمها شبه وشعي الشكل ، مستدل التبطيع ، يطول نحو ١٧ سم . نوبها الى الرتبة الزرقاء المواج ، تشتد زرقته عند الظهر وتتفلس في البطن الفضي المواج ويعلوها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى الذنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هرمي الشكل ، ذرب المناخس ، القسم الثاني عادم المناخس . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

Hylostrepe (F). هي حشرات من فصيلة الخنافس .

٣٠٢٥٩ - هَيْلُوتُورِب \*

هو زعنوق الاعمدة ، اطليه .

Hyloides (S). هي حشرات من فصيلة الخنافس .

Hylope (F). Hyloides (E).

جنس صفادع شاجرة من فصيلة الكدمايات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدها امريكية الاستوائية || اجسامها صغيرة القذ تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها مستدلة الطول والعرض . عيونها مستديرة جاحضة . فكوكها السفلى عادمة الانسان . اصابع قوائمها الامامية والخلفية عادمة الخطاب بحمزة بطياف محببة تتحكم من تساق السلوح المائلة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات منتقلة من نبات الى نبات ومن شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاساريع والحوام || الانثى تترأ دعيها احاديا ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات الممسحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند التقف لا تغلو من القوائم الدقيقة النحيلة ولكنها تتميز بوجود الذنب الذي لا يتفصم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هَيْلُوفِيلَة ثَنَائِيَّة اللَّوْن \*

Hylophila bicolorana (S). Hylophile bicolore (F).

Hylophila bicolorana (E).

حشرة من فصيلة النسيقيات ورتبة خرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا . فراشها واسعة

الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . منبتة بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه مزغبة اللحاء ، منتصبه ، قليلة الفروع ، تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مركبة ، وثرية التجميع ، متناحية النصال . ازهاره صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المالحق المزغبة || ثنويره ريبيعي .

٣٠٢٦٥ - **هَيْتَمِيَّات** <sup>٥</sup> *Spirillaceae*  
نصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الخلزوني . خلاياها وحيدة الاتجاه عمودية الانقسام .

٣٠٢٦٦ - **هَيْوَلَارِيْقُون** *Millepertuis (F).*  
هو الداذي ، اطلبه .

٣٠٢٦٧ - **هَيْوَلَارِيْقُونِيَّات** *Hypéricacées (F).*  
فصيلة نباتية جاء وصفها في داذيات .

٣٠٢٦٨ - **هَيْوَلِيَّات** *Protides (F). Protid (E).*  
هي الاجسام التي تدغل في تركيب وذف حبيبرات الانسجة الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسّم الهويليات الى :

هويليدات *Protéides (F). Proteid (E).*  
وهويلينات *Protéines (F). Protein (E).*

٣٠٢٦٩ - **هَيْتَة** *Configuration*  
هي الشكل الخارجي .

قوتها رقيق الانهار . سرقها تعيش على نصل اوراق السنديان || جسمها متدل القه يطول نحو ١٥ م . بسطتها نحو ٢٢ م . رأسها يرمي الشكل ، اخضر اللون . عيناها كبيرتان . زياناها غطيات . جوشنها اخضر . بطنها الى الطحلة الغبراء المواجه || ورشناها الاماميان الى الخفصة الجميلة يطولها حنار ابيض ويملوها : غططان ابيضان معترضان يقسمان الصفحة الى ثلاثة اقسام شبه متساوية . ورشناها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تعمق عند الذكر وتثبت عند الانثى || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مائل القشار . ثوبا الى الطحلة الخفراء المواجه . رأسها اسود . مدنها ورواجبها الى الطحلة السمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجثالة او في التربة حيث تنفخ السفة ملتصقة بجلباب من الطين .

٣٠٢٦٢ - **هَيْم** *Spirochétose aviaire (F).*  
هو زهري الطير ، اطلبه .

٣٠٢٦٣ - **هَيْمَع** شجرة المدد (اللسان) .

٣٠٢٦٤ - **هَيْمَنْوُكْرِيْس** *Hymenocarpus (S).*  
*Hyménocarpe. (F).*

ويدعى ايضاً شمردس . نبات عشبي برزي حولي وحيد



هويليلة ثنائية اللون



Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - **وَالِد**

هو الشيء القائم العمودي الانتصاب ، يقال قرن وائد وساق وائدة .

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - **وَابِطٌ، هَابِطٌ**

هو نفقيس الساعد . Descendant, Descending (E).

٣٠٢٧١ - **وَابِلٌ**

هو المطر الشديد الغصم القطر ، والربيل ايضاً .

Watsonia (S). **وَانْسُونِيَّةٌ، وَطْصُونِيَّةٌ**.  
Watsonie (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الطبيب البريطاني واتسون (١٧١٥-١٧٨٧) وهي عشية دوقسية من فصيلة السوسيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ مهدها افريقية الجنوبية . سوقها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

Watt

٣٠٢٧٢ - **وَاتٌ**

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

Xylopia (S).

٣٠٢٧٣ - **وَاتٌ، جَوْزَةُ الشَّرَاكِ**

Xylopie (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات . انواعها المعروفة قليلة، مهدها الحبيشة، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقها متعاقبة معنقة كاملة ، نصلها جامد الصفحة قصير الزناد . ازهارها ابطية او محورية الانكاز عديمة البتلات البيض . ثماره عنبة . بزوره حريفة العلم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الحبيشة .

٣٠٢٧٧ - **وَانْسُونِيَّةٌ اَرْجَوَانِيَّةٌ**

Watsonia coccinea (S). Watsonie écarlate (F).

نوع من الواتسونية البرية . شراخها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سنبلية التجميع يمد من ١٠ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشزة القصاب المستنقة . لوئها الى الارجواني الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٤ - **وَاتٌ الْحَبِشَةُ\*، فِلْفِلُ السُّودَانِ**

Xylopia aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohrenpfeffer (D). Pepe d'Ethiopia (I).

نوع من الوات الزراعي يكثر في الحبيشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معنقة . نصلها اهليجي الشكل جامد الصفحة . ازهاره فردية التجميع ، ابطية الانكاز . ثماره عنبة مستطيلة تلتف صفاً واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزوره من التوابل المشطلة الشائعة الاستعمال .



وات الحبيشة

٣٠٢٧٨ - **وَانْسُونِيَّةٌ قَصِيْرَةُ الْوَرَقِ**

Watsonia brevifolia (S). Watsonie à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية الزينية ، شراخها الزهري يعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهارها سنبلية التجميع يمد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محبنة القصاب القمية الاطراف . لوئها الى البياض الموشع || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

## ٣٠٢٢٧ - وَأَسْتَوْنِيَّةٌ كَثِيْفَةُ الزَّهْرِ

*Watsonia densiflora* (S). *Watsonie à épi dense* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية البريوتية. شراخها الزهري يعلم من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقها عسقية النصل تطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض نحو ١٢ م. حناها سبيك الحاشية تبني اللون. أزهارها سنبل التجميع كثيف الترتيب يعد من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة. أزهارها محجنة القصائب المستطيلة، قصيرة البلات، لونها إلى الوردي ومنها غروب بيض || تنورها يستمر من أواسط أيار إلى أواسط حزيران.

## ٣٠٢٢٨ - وَأَسْتَوْنِيَّةٌ مِرْيَالِيَّةٌ

*Watsonia meriana* (S). *Watsonie mérane* (F). نوع من الواتسونية البريوتية. شراخها الزهري يعلم من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سيفية الشكل تعرض نحو ٣ م. أزهارها سنبل التجميع، بعلى الترتيب، يعد من ١٢ إلى ٢٠ زهرة. أزهارها محجنة القصائب مستطيلة البلات. لونها إلى البياض الناصع ومنها غروب وردية وموهجة || تنورها يستمر طوال شهر أيار.

## ٣٠٢٢٩ - وَأَسْتَوْنِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ الزَّهْرِ

*Watsonia strictiflora* (S). *Watsonie à fleurs dressées* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية. شراخها الزهري يعلم من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها عسقية النصل المستدق. أزهارها سنبل التجميع يعد من ١٢ إلى ١٨ زهرة. أزهارها مستقيمة القصائب المنتصبه التي تطول نحو ٤ سم. بتلاتها معتدلة القد جراء اللون تتوسط كل منها نجمة بنفسجية اللون قرمزية الملاج || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

## ٣٠٢٢٢ - وَأَسْتَوْنِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

*Watsonia rosea* (S). *Watsonie rose* (F). نوع من الواتسونية الزيبينية البريوتية. شراخها الزهري متشعب الفروع يعلم من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقها عسقية النصل. أزهارها محجنة القصائب. قصائبها وبتلاتها متساوية في الطول، لونها إلى الوردي الزاهي || تنورها يستمر من تموز إلى أيلول.

## ٣٠٢٢٣ - وَأَلْنِ ٥

*Alizé* (F). *Trade-winds* (E). اسم يطلق على الرياح السائدة المنتظمة التي تهب بين دارتي الانقلاب من الشرق إلى الغرب. وهما واتان، وآن الشمال الذي يهب من الشمال الشرقي ويتهج نحو الجنوب الغربي وواتان الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويتهج نحو الشمال الغربي. والواتان تستعمل أيضاً بمعنى الصفة أو التمتع.

٣٠٢٢٤ - وَأَلَج ٥ *Zoophage* (F). *Zoophagous* (E). الواج ويدعى اللحم ما كان قوته اللحم حيواناً كان أم دوية أم حشرة.

٣٠٢٢٥ - وَأَجِب *Débet* (F). *Debit* (E). هو ما يلزم دفعه بعد الحاجة.

٣٠٢٢٦ - وَأَجِب الْأَدَاء *Exigible* (F). *Demandable* (E). هو ما كانت المطالبة به ممكنة.

## ٣٠٢٢٧ - وَأَحَاح

*Oasis* بقعة خضراء نظرة توفر لها الماء ونصب التربة في وسط صحراء قاحلة.

## ٣٠٢٢٨ - وَأَحِيف

جناح كثير الريش.

## ٣٠٢٢٩ - وَأَحِل ٥

*Limicole* (F). تمت تعريفه يطلق على الديدان والحشرات الدنيا الشاملة التي تعيش في الطمي والأوساح.

## ٣٠٢٢٩ - وَأَرُث

*Héritier, Holr* (F). *Heir* (E). هو أحد اقرباء الميت الذين يحق لهم شرعاً اخذ نصيب معين من تركته.

## ٣٠٢٢٩ - وَأَوَش ٥

*Hétérotrophe* (F). *Heterotroph* (E). هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحرمها ويغفلها النبات الشاح.

## ٣٠٢٢٢ - وَأَرْف

*Verdoyant* (F). *Verdant* (E). ورف النبات: نضر واهتز فهو وارف أي ملج أو ناضر.

## ٣٠٢٢٣ - وَأَرْق

*Frondicole* (F). الوارق ما كانت حياته مستمدة من الورقة أو أنه يعيش عليها.

## ٣٠٢٢٤ - وَأَزِع

*Chien de berger* (F). *Shepherd's dog* (E). الوزاع هو كلب الراعي لانه يزع الوحش عن النعم.

## ٣٠٢٢٥ - وَأَشَع، وَأَشَعَة

هي الجارسة، الحشرة التي تعيش على الأزهار.

## ٣٠٢٢٦ - وَأَشَع

*Anthophage* (F). *Anthophagus* (E). من يعيش على الأزهار ومنها، راجع جابس.

## ٣٠٢٢٧ - وَأَشِل ٥

*Cryptandre* (F). تمت تعريفه يطلق على كل ذكر من الحيوان طلاس الثوار الشقي.

## ٣٠٢٢٨ - وَأَشْنُرِيَّة ٥

*Wachendorfia* (S). *Wachendorfia* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهادريات. أنواعها المعروفة أربية. مهدها منطقة رأس الرجاء الصالح في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزيبينية. أوراقها لاطة، كبيرة، مستطيلة النصال المحددة المدبة الأطراف. شاربها الزهرية تنتهي بمجموعات من الأزهار سنبلية التركيب. أزهارها سداسية البتلات، مستحبة العرف الخافت، حجلة الألوان الزاهية.

## ٣٠٢٢٩ - وَأَشْنُطُونِيَّة ٥

*Washingtonia*, *Pritchardia* (S). *Washingtonie*, *Pritchardie* (F). جنس اشجار زيبينية من فصيلة النخلات معقودة التعريف على اسم واشنطن رئيس الولايات المتحدة || أنواعها



واشنردية



واشنطونية

## ٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَرِ\* ، غُرَابُ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشونيات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرقبة ، أخضر الظهر ، أخضر العنق والذنب . يجعل على رأسه بعض الريش الدقيق الطويل الشبيه بالبيض .

## ٣٠٣٠٨ - وَاقِ صَغِير\* ، مِلْبَحَّة

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشونيات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، بطنه الى الصهبة ، باطن جناحه ابيض ، منقاره اصفر الجسم اسمر المشتش . ساقه الى الخضار البحري .

## ٣٠٣٠٩ - وَاقِعَةٌ ، واقعة

Evénement (F).

الواقعة هي الحادث ، اطلبه .

## ٣٠٣١٠ - وَاقِل

Balaena japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E). نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيا وبزر أرويا . جسمه كبير القد ، رمي كاليفورني وبزر أرويا . يقم مع اقترابه من ثوبه فني اللون ، الشكل ، يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبه فني اللون ، رصاصي الموج ، يقيم مع اقترابه من ثوبه الفهر ويغير عند البطن . انشاء تضع جرواً واحداً ترضعه نحو الحول .

## ٣٠٣١١ - وَاقِيَّة

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة من الاشطاء ، راجع شطه واشطاء .

## ٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَّانُ أَخْرَ ، Valériane rouge (F).

هو الزهرة الحمراء ، اطلها .

## ٣٠٣١٣ - وَاقِم

Serre (F).

هو المصري ، اطلبه .

## ٣٠٣١٤ - وَاقِك

الواكك والواكك : نعت تمريني يطلق على كل طائر حاضن .

## ٣٠٣١٥ - وَاقِيْف

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواخفة المهترئة من كثرة الأوراق الخضراء .

## ٣٠٣١٦ - وَاهِيَّاتُ الشَّاقِيرِ ، Lévirostrés (F).

Levirostrate (E).

مرتبة من الطيور الجواثم التي تتميز بضعف منقارها الكبيرة . فصائلها واجناسها عديدة . اشهر فصائلها الخضاريات والشرقيات والاركوبيات .

## ٣٠٣١٧ - وَاقِيْ ، Chacal (F).

هو ابن آوى ، اطلبه .

## ٣٠٣١٨ - وَبَاءٌ ، مَوْتَان

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شبيه العدوى سريع الانتشار يصيب الانسان او الحيوان او النبات وينتقل من مكان الى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها اسطوانية السوق الليقية المائلة المنتصبة . اوراقها مروحية الشكل جميلة الخضار القستي ، كرتها مستطيل العمود دقيق شائك ، شوكة صندب القد محجن . ازهارها متكوي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . ازهارها خشوية التركيب . ثمارها ثنوية جامدة اللب الماد القالدة . بزورها خشوية صلبة لا تصلح لثي . مهدها كاليفورني وبزر الاوقيانوس الهادي . اشهر انواعها ، واشطنوية القوية والواشطنوية الليمانية .

## ٣٠٣٠٠ - وَاشْطُنِيَّةٌ قَوِيَّةٌ

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robuste (F).

نوع من الواشطنوية . جذعها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستند الطرف ، يطول من ٦ الى ١٠ أمتار . اوراقها ذرية مروحية قطرها نحو ٢٠٠ سم. لونها الى الخضار القستي الالسن الموج . كرتها شديدة الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة اصفر اللون صغير القد شديدة التحجيج . مهدها شواطئ نهر سكرمنتو في كاليفورنيا . تعيش ويجود اينما زرع بشرط ان لا تنخفض الحرارة عن ست درجات ستيفراد وان يؤمن لها الري الوافي عند الحاجة .

## ٣٠٣٠١ - وَاشْطُنِيَّةٌ لَيْفَانِيَّةٌ

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamenteuse (F).

نوع من الواشطنوية . جذعها اسطوانى مستقيم يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها ذرية مروحية قطرها نحو ١٥٠ سم. لونها الى الخضار القستي الزاهي بعلما خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كرتها دقيق متين شائك طوله نحو المتر . مهدها كاليفورني ، تتحمل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تحبب العطش . تعيش في جميع الاربية لكنها تفضل الخوازة حيث تجود وتنمو بسرعة .

## ٣٠٣٠٢ - وَاقِسَم

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل ممرض او كائن حي يسبب مرضاً ما .

## ٣٠٣٠٣ - وَاقِدَةٌ

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .

## ٣٠٣٠٤ - وَاقِي

Préventif (F). Preventive (E).

Botaurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشونيات ، طويل العنق والمنقار والرجلين والاطراف ، قصير الزنكي ، اصفر الريش المرقش المشوش . يحب العزلة فيختفي في النهار بين الامل ويكثر الصباح في الليل . قال الشاعر مرقش السدوسي :

ولقد عدت وكنت لا اعدو على واق وسام  
فاذا الاشام كالآيا من واليا من كالآسام

وكذلك لا خير ولا شر على احد بدائم

## ٣٠٣٠٦ - وَاقِ أَبْيَضُ ، سَيْبَةِ

Ardeola rallioides (S). Héron crabier (F).

Boatbill (E).

طائر من البشونيات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه الى البياض الاخير يحمل على رأسه طرة من الريش المستطيل الدقيق الابيض والاسود . منقاره الى الزرق ، اسود المشتش والقاعدة .



واق



واق الشجر



واق صغير



## ٣٠٣٣١ - وَبِيلَةٌ ٥ Calonectria (S).

جنس فطور مجهرية من النساخيات وفصيلة الشوفيات .  
أعضائها خضنة ، محبة السطح ، مرجانية اللون ، تتركز  
على ونبية ناتئة . تكاثفها صفية الشكل . وبؤها عديد  
الخلايا المؤثرة بالانقسام المتوازي || أنواعها المؤذية قليلة  
أعرفها وبلة الزرع .

## ٣٠٣٣٢ - وَبِيلَةُ الزَّرْعِ ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniutulum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزرع وأعضائه الشيلم والخطة والشوفان  
وبعض التجيليات البرية || مظهره الخارجي يكون على  
شكلين : الأول عندما يصيب الزرع في أبان خبه فيبدو  
ككتلة من القطن المنفوش تلحف نواحي الزرع وعصفه  
كالخلفة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد خبه  
فيبدو أن ذلك لطخاً خليلاً لا يقاسية الشكل والحجم ، لونها  
الى الغبرة تملو الصف واللايات || أضراره  
منوطة برطوبة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح  
بتطهير البذار بواسطة أحد الفوطير الناجمة منها املاح  
الذئبق .

## ٣٠٣٣٣ - وَبِيرَةٌ ٥ Phacelia (S).

Phacelia (F). Phacelia (E).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حزة » . جنس نباتات  
عشبية ، حولية أو محولة من فصيلة البقيليات . أنواعها  
المعروفة عديدة منبهاً المناطق الحارة من العالمين القديم  
والجديد || بعض أنواعها الحولية مرعوية تزرع للإبقار  
والأغنام . سوقها خلية السحاء ، فرعاء . أوراقها متعاقبة ،  
ريشية . أزهارها سنبل التجميع . أزهارها رחاقية يجبرها  
النمل وهي زرقاء اللون أو بنفسجية أو ليلية أو بيضاء ||  
أشهر أنواعها التالية .

## ٣٠٣٣٤ - وَبِيرَةٌ جُرُوسِيَّةٌ ٥

Phacelia campanularia (S). Phacélie campanulée (F).  
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ١٥ الى  
٣٠ سم . أوراقها اهليلجية الشكل مفرسة ويسنن . أزهارها  
بيضاء اللون . توجعها متعرة جريسية الشكل ، لونها الى  
الزرقه المائقة يعلوها عند قواعدها خمس نقط سود ||  
تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

## ٣٠٣٣٥ - وَبِيرَةٌ لَبْدَةٌ ٥ Phacelia congesta (S).

Phacélie dense (F).  
نوع من الويرة التريينية . عشية حولية تملو من ٣٠ الى  
٥٠ سم . ساقها وفروعها مزينة باللحاء . أوراقها ثلاثية  
او خماسية أو سباعية التشرم القدي . أزهارها كبيرة القد  
قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرقه الجليمة . توجعها خلية  
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة النشور ||  
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٣٠٣٣٦ - وَبِيرَةٌ لَرَجَةٌ ٥ Phacelia viscosa (S).

Phacélie visqueuse (F).  
نوع من الويرة . عشية حولية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .  
أوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٦ سم . نصلها  
لزنية ، مسننة الحنار . أزهارها معتدلة الحجم ، قطرها  
نحو ٣ سم . لونها الى الزرقه تتوسطها بقعة أرجوانية ||  
تنويرها يستمر من تموز الى آب .

منطقة جغرافية الى اخرى . وهو بذلك يتنبر عن الامراض  
المعدية التي لا تنتقل من منطقة جغرافية الى اخرى .

## ٣٠٣٣٩ - وَبَاءٌ مُؤْصِيٌّ ٥ Enzootie (F). Enzooty (E).

هو الوباء المحدود الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة او  
المنطقة الجغرافية .

## ٣٠٣٣٠ - وَبَاءٌ ٥ Epidémiologie (F).

Epidemiology (E).  
الوباء علم يبحث في ماعية الامراض الوبائية وفي اسبابها .

## ٣٠٣٣١ - وَبَاتٌ ٥ Adaptation

من وبات بالمكان : اقام . الوبات هو الالاب الموق  
الناجم .

## ٣٠٣٣٢ - وَبَاكٌ ٥ Tridax (S). Tridace (F).

مجلسة عشبية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها  
حزمية الفروع تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها متقابلة مثله  
الفصوص المدببة الشائكة . أزهارها كثيف التجميع .  
رويساتها الزهرية صفراء اللون ، شائكة السينات المثلثة  
الحسك . بزورها ريشية التهديب . تنويرها يستمر طوال  
شهر حزيران .

## ٣٠٣٣٣ - وَبَاتٌ ٥ Rabougrissement (F).

Stunted (E).  
هي حالة كل حيوان أو نبات شذ مجعته وقلة نموه عن  
معدل نوعه || أما الحيوان أو النبات الذي يشذ يصغر  
جسمه عن معدل نوعه فهو ازعب وهي زبءاء .

## ٣٠٣٣٤ - وَبَدٌ ٥ Disproportion

الويد هو النقص الجسوري العائب ، ج . أوباد .

## ٣٠٣٣٥ - وَبَرٌ ٥

هو الزلم ، حيوان من الدمانيات ، اطلبه .

## ٣٠٣٣٦ - وَبَرٌ ٥ Poil, Duvet (F). Hair, Down (E).

الوبر هو لدابل واللامه والارانب ونحوها كالصوف للتم .  
وهو احدى خامات النسيج المشهورة يستخدم في صنع  
للمسوجات المختلفة وسبور آخركات التي تتعرض للرطوبة .

## ٣٠٣٣٧ - وَبَرَكَةٌ ٥ Cathcartia villosa (S).

Cathcartie velue (F).  
نبات عشبي حولي بري وترييني من فصيلة الخشخشيات .  
ساقها فرعاء كثيفة الزغب المستطيل تملو نحو ٣٠ سم .  
أوراقها بيضيه الشكل مستعرضة . نصلها خشن الصفحة ،  
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زغبها وأهدابها جذوية  
اللون . أزهارها تاجية فردية كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .  
لونها الى الصفراء الكبريتي الزاهي || تنويرها يستمر  
طوال شهر حزيران .

## ٣٠٣٣٨ - وَبَرِيٌّ ، زَغْبِيٌّ ٥ Tomenteux (F).

Tomenteous, Downy (E).  
نعت تعريفي يطلق على اجزاء النبات والحيوان المغلفة  
وبر قصير نام .

## ٣٠٣٣٩ - وَبَسٌ ٥

وبس الجرو : فتح عليه .

## ٣٠٣٣٠ - وَبَلَةٌ ٥ Rut, Chaleurs (F). Rut, Heat (E).

طلب الصان أو بالآخرى التناج للسفاد .

مفتول، اما اذا انبسط فيدعى الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين اطراف العظام والمضلات او بين العضلات نفسها.

٣٠٣٤٧ - وَتْر Impair (F), Odd, Uneven (E).  
الوتر ما لم يتشقق من العدد.

٣٠٣٤٨ - وَتْر التماس Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - وَتْر الزاوية القائِمة Hypoténuse (F).  
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - وَتْرِيَّة ، فَتْرْدِيَّة Imparité (F).  
Imparity (E).  
كون الشيء غساً او فرداً.

٣٠٣٥١ - وَتْرِيَّة التَرْكِيب Imparipennée (F).  
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المنتهية بورقة فردية واحدة.

٣٠٣٥٢ - وَتْر Waltzia (S), Waltzie (F).  
جنس نباتات حولية برية وتربيتية من فصيلة المركبات. انواعها المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرق. سويها فراء. اوراقها متعاقبة جامدة التصل. ازهارها رؤسية. يزورها مجهرة بانتداد متقادي الشكل || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٣٠٣٥٣ - وَتْرَة بَيْضَاء Waltzia nivea (S).  
Waltzie blanche (F).

نوع من الوتر، عشبته تعلو نحو ٥٠ سم. رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد. ازهارها الى الصغار الكبريتي، قناياتها مدببة الاطراف، بيضاء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٤ - وَتْرَة عَشْكَلِيَّة Waltzia corymbosa (S), Waltzie en corymbe (F).  
نوع من الوتر، عشبته تعلو نحو ٦٠ سم. ازهارها عشكولي التجميع، لبد الترتيب. رؤسياتها الزهرية كثيرة العدد. ازهارها وريدية اللون قناياتها مستطيلة لسة بيضاء اللون. تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٥ - وَتْرَة مُدْهَبَة Waltzia aurea (S).  
Waltzie dorée (F).

نوع من الوتر، عشبته تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهارها عشكولي التجميع، وهل الترتيب المتتابع. رؤسياتها الزهرية كبيرة القليلة العدد. ازهارها وقناياتها ذهبية اللون || تنورها يستمر من آب الى ايلول.

٣٠٣٥٦ - وَتْلُوف \* Cichorium Intybus (S).  
Witloof, Chicorée à grosse racine (F), Witloof (E).  
نوع من الهندباء الزراعية الخضرية. وهي بقلة مأكولة الجذر والاوراق تكثر زراعتها في البلاد الاروروبية. ترغب في التربة الخوارة المتوسطة الانتعاج الفنية بالمواد العضوية. زراعتها تتطلب بعض العناية اخصها طمر الاوراق عند ازرباب الاربعه الاولى منها || أما التولوف فهو يحوي ما قدره :

من الماء	٩٣,٠٠ %
من المواد الازرقية	١,٢٢ %
من المواد الدهنية	٠,٤٧ %
من المواد المستخلصة	٥,٣١ %

٣٠٣٢٧ - وَبِيرَة مُهْدَبَة Phacelia purshii (S).  
Phacélie frangée (F).

نوع من الوبيرة. عشبته حولية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها السفلى مفتحة تطول نحو ١٠ سم. وتنقسم الى ١٥ سكة. اوراقها العليا لاطئة، خاسية السك. ازهارها صغيرة القند قطرها نحو ١٥ سم. لونها يراوح بين الازرق والبيكلي. فلق توجعها مهدة الاطراف || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٣٠٣٢٨ - وَبِيلَة ، وَبِيلَة Fagot (F), Faggot (E).  
حزمة الحطب الدقيق العيدان.

٣٠٣٢٩ - وَتْ Cri du palombe (F).  
الوت والوت : صياح الورشان.

٣٠٣٤٠ - وَتَح ، كَبْنُود Capnodium (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرتجات. انواعه عديدة، منتشرة في معظم اقطار العالم، تركب الحفصيات والرتيون والصفصاف والسنديان الخ... اعسانها مكورة ترتكز على اذن دقيقة تنشب في وثبات المشج. ابرواغها الزرقية مؤنورة التركيب ثويتية الشكل سمراء اللون || وهو ركب لحاء السرق والافضان وبشرة الاذن ولا يعترى الاوراق. منظره الخارجي وشاح كالسقام لا قياس الكثافة والسك، لزج للمس، اسمر اللون.

٣٠٣٤١ - وَتَح المَهْلِيُون Zopfia rhizophila (S).  
فطر مجهرية رمي من الرتجات ركب جذور المهلين والسفندر فيؤذيها وقد يقضي عليها. اعسانه سود كروية الشكل. رقه يضي مدبب الرأس والمقب، مشدود الوسط يحسن ٨ ابراغ ثنائية البويغات المائلة.


٣٠٣٤٢ - وَتَحِيَّات Capnodiaceae, Perisporiaceae (S), Périssporiacées, Capnodiciées (F), Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى رتبة الرتجات. اناقتها محصورة مترابكة منفصلة سمراء اللون. بويها يتحدر عند نضج الاعسان، من مرق رأسي لا نظامي الانشقاق وهو كثير العدد اسطواني الشكل او يبيضي، غيراته لا قياسه العدد || اجناسها وانواعها كثيرة اما التي تركب النبات وتطفل عليه فقليلة، اشهرها التوح والعشان.

٣٠٣٤٣ - وَتْد Pilot (F), Pile, Stake (E).  
عمود من خشب متوسط الغلاظة والطول يستعمل للفرز في المنافع.

٣٠٣٤٤ - وَتْدَة Tragus  
هنة مثلفة الزوايا مركزها عند فوغة صياح الاذن.

٣٠٣٤٥ - وَتْر Corde (F), Chord (E).  
جسم خيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية. تصنع الاوتار عادة من امعاء بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية. ويجب ان يكون الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله.

٣٠٣٤٦ - وَتْر Tendon (F), Tendon, Sinew (E).  
الوتر ضفيرة من الالياف تتكون من الحبيرات العضلية التي لم تحوّل نهائياً الى نسج عضلي. وهو عادة مستدير



وتح المهلين



وتلوف



٣٠٣٩٦ - وَجِين - الوجين هو شط الوادي المزدرع .

٣٠٣٩٧ - وَحَاف - Banc (F). Layer bed (E).

هو الطبقة من الرمل أو الساف من الصخر أو الرصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - وَحَال - Terrivome (F). Terrivomous (E).

الوَحَال قاذف الوَحْل أو التراب . بركان وَحَال .

٣٠٣٩٩ - وَحْدَانِي - Sporadique (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف العيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - وَحْدَة - Unité (F). Unity, Unit (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية أساساً لقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الاطوال والمساحات والاجسام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس ومن اجزائه ومضاعفاته أشقت المقاييس الأخرى . وفي الاوزان يعتبر الغرام واجزائه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الاطوال والمساحات والاجسام ، والباوند وحدة الاوزان || وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة عن تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً || وفي علم الحرارة تعتبر السرعة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية || وفي الكهرباء يعتبر الاميپر وحدة التيار ويعتبر الاوم وحدة المقاومة || وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشعة . وفي علم الصوت فوسدة القياس هي اليل .

٣٠٤٠١ - وَحْدَة غِذَائِيَّة - Unité nutritive (F). Nutritive unity (E).

هي عنصر الغذاء الرئيسي او القيمة الغذائية القابلة للتشيل الموجودة في مادة معينة او شكك مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يركز على محوى العناصر الغذائية وما ينتجم عنه من وحدات . راجع جدول العلف .

٣٠٤٠٢ - وَحْرَة \* - Nycteris (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الخواريات . انواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تملأ حناجر التجويف الايمن واليسار || اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . انواها الى الصهبة الخطية المختلفة المواج ، بطونها زاهرة || موطنها افريقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوريات والمولوم .

٣٠٤٠٣ - وَخْرِيَّات - Nycteridae (S). Nyctéridés (F).

فصيلة من الخفافيش مركزها بين الخفافيش والمماشيت . انواعها ١١ ينتمين الى جنسين الوحرة والمطالب || من ميزاتها الخاصة زوائدنا المنخرية المزركشة وكبر آذانها الوتيدية القاعدة المحمية || اناتها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً حتى بلوغه . موطنها افريقية الشرقية وبسلاد الحبيشة .

٣٠٣٨٠ - وَكِيْرَة - Cloison (F).

هي الحاجز الخليوي . Dividing membrane (E).

٣٠٣٨١ - وَكِيْيَة ، مُسْتَنْدَة - Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالمسافر المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - وَكِيْيَة التَّامِيْن - Police d'assurance (F).

هي المقد الحرر الذي يثبت انعقاد التأمين وشروطه . Insurance policy (E).

٣٠٣٨٣ - وَكِيْيَة - Pierre à briquet (F). Flint (E).

حجر القداحة . « لا والذي اخبر النار من الوتيمة » .

٣٠٣٨٤ - وَكِيْيَة مُحَدَّدة \* - Acilius sulcatus (S).

Acilius silloné (F).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكنوزيات ورتبة غديات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المتدلة الحرارة . تألف المنائق والندران . تعيش في الماء . تنفترس كل ما تيسر لها من الحشرات الدنيا والارالي ولا تترك الماء الا في زين الكوم والتمكنة لانها تمتع المكن على الصفحات السفلى من تصال الاوراق التي تلتاس سطح التربة || جسمها شبه بيضي الشكل يطول نحو ١٨ سم . ثوبها الى الخنثي الاسمر المواج . ظهرها مائل الصفحة عند الذكر ، مخدعها عند الانثى || لها جبل واحد في الحول . وقتها تسعى الى الماء بعد التفت بنحو اربعة ايام وهي قانصة كاششرة الجملانة .

٣٠٣٨٥ - وَج - هو عود الوج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - وَجَار - Chenil (F). Dog-Kennel (E).

الوجار . ج ابرة وجير . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . وفي الاصل هو سرب الفصيح والذئب والعلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - وَجَب - الوجب هو انعقاد البيا في الضرر .

٣٠٣٨٨ - وَجْبَة - Cure, Fournée (F).

Batch, Baking (E).

ما يستوصيه الخباف من تبخ على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - وَجَر ، وَكْر - Garenne (F). Warren (E).

هو مأوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - وَجْن - Moraine (F).

صخر على طانية جليدية .

٣٠٣٩١ - وَجْه - Face (F).

٣٠٣٩٢ - وَجْهِيَّ - Facial (F).

٣٠٣٩٣ - وَجُوبِ الأَدَاء - Exigibilité (F).

Exigibility (E).

هو ان يصبح الدين واجباً اداراً الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - وَجِيَّات - Acorées (F).

سبط من فصيلة الفلقاسيات .

٣٠٣٩٥ - وَجِيد - Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج وجدان .



وَيْزَة مُحَدَّدة



وَحْرَة

Monopétale (F). وَحِيد البَتَلَة ٣٠٤١٧

Monopetalous (E).

نمت تمريني وصني يدل على التوزيع الوحيد البتلة .

Monorchide (F). وَحِيد الخِصْبَة ٣٠٤١٨

Monorchid (E).

من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

٣٠٤١٩ وَحِيد الخَلِيَة

Monocellulaire, Unicellulaire (F). Monocellular, Unicellular (E).

مركب من خلية واحدة ، او ذو خلية واحدة .

Monoatomique (F). وَحِيد الذَرَّة ٣٠٤٢٠

Monatomic (E).

Uniflore (F). وَحِيد الزَهْرَة ٣٠٤٢١

Uniflorous (E).

ذو زهرة واحدة .

Unicaule ٣٠٤٢٢ وَحِيد السَّاق

Monandre (F). وَحِيد السَّدَا ٣٠٤٢٣

Monandrous (E).

من النبات ما كان ذا عضو تدكير واحد .

Monostigmaté (F). وَحِيد السِّمَة ٣٠٤٢٤

Monostigmatous (E). ذو ميسم واحد أو اعْلُوَة واحدة .

Unilabé (F). وَحِيد الشِّفَة ٣٠٤٢٥

Unilabiate (E).

ذو شفة واحدة .

Unisexué (F). وَحِيد الشَّيْ ٣٠٤٢٦

Unisexual (E). ذو اعضاء تناسلية ذكورية او انثوية .

Monoploid ٣٠٤٢٧ وَحِيد العِشْرَة

هو كل نبات قوام تركيبه العلائي عترة بسيطة .

Unilobé (F). وَحِيد الفِصْل ٣٠٤٢٨

Unilobate (E).

نمت تمريني يطلق على كل نصل ورقة وحيد الفص .

Monosépale (F). وَحِيد الفِصْلَة ٣٠٤٢٩

Monosepalous (E).

Monocotyédone (F). وَحِيد الثَّلَاثَة ٣٠٤٣٠

Monocotyledonous (E).

اسم او صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة . والنباتات وسيدات الفلقة تولد احد قسمي مستورات البزور .

٣٠٤٣١ وَحِيد القَرْن هو الكركدن الهندي ، اعظم .

Monocéros, Licorne (F). وَحِيد القَرْن ٣٠٤٣٢

Monoceros (E).

كوكبة نجوم جنوبية المنقح مركزها بين الكلب الاكبر والكلب الاصغر والجبار والشجاع الاثني . وهي تمثل حيوان غرابي له جسم الفرس وفي رأسه قرن واحد || نجوميها متفاوتة الاشكال والالوان والرتب عددها ٣١ .

Unipolaire (F). وَحِيد القُطْب ٣٠٤٣٣

Unipolar (E).

Bête sauvage (F).

Wild animal (E).

٣٠٤٠٤ وَحْش

Bête féroce (F). وَحْش غَافِر، سَبُع ٣٠٤٠٥

Carnivorous animal (E).

Férin (F). ٣٠٤٠٦ وَحْشِيَّة

نمت تمريني يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات الوحشية .

٣٠٤٠٧ وَحْشِي

الوحشي الجانب الخارجي او الايمن من الرشفة ومن كل شيء يقابله الاثني اي الجانب الداخلي او الايسر .

Pustule (F). ٣٠٤٠٨ وَحْشَة

Pustule, Pimple, Blotch (E).

هي البثرة تركب النسيج الحيواني والنباتية . ج وسمن .

٣٠٤٠٩ وَحْف

الوحد : النبات الريان من اي فئة كان .

Terre noire (F). Black soil (E). ٣٠٤١٠ وَحْفَاء

التربة السوداء وتدعى البتيجور .

Rocher noir (F). Black rock (E). ٣٠٤١١ وَحْفَة

هي الصخرة السوداء .

Fange, Boue, Bourbe (F). ٣٠٤١٢ وَحْل

Mud, Mire, Silt (E).

مزيج من الطين وبعض المواد المعوية يرسب في المنافع وحل فضلات مجاري الماء .

٣٠٤١٣ وَحْن ٥، لُؤْس

رواسب طينية رملية عادمة الاحافير تنفثي بعض الارربة في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الامير مصطلقي الشهابي .

٣٠٤١٤ وَحْخ \*

Chalcopelia afra (S).

Chalcopelle africaine (F).

طائر من الزغل . اعطاه تتمد من افريقية الشرقية الى الشالية || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم . رأسه الى الصهبة الرمادية . ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية الموراج . انفيه اسود . جوشنه احمر . بطنه الى البياض الاغبر . جناحاه الى السمرة السوداء . حدقة عينه كالقوتور . منقاده اسود . رجلاه الى الجوزة || ملجنه الحياتي جماعي . سربه يمد عشرات الازواج . يالفت البياض وضفاف مجاري الماء . قوته البزور والجويوب || يلدن عشه في الادغال الاثنية . الاثني تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

Monocarpien (F). وَحِيد الإِزْهَرَار ٣٠٤١٥

Monocarpous (E).

نمت تمريني يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة واحدة .

Monobasique (F). وَحِيد الأَسَاس ٣٠٤١٦

Monobasic (E).



وَحْش

أنواعها المعروفة نحو ١٥ أعطائها تمتد من الجزيرة العربية إلى أوروبا الجنوبية وإفريقية الشمالية || تأثف الرمال والقياني . قوتها الذباب والحمام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ إلى ٢٢ سم . انوثتها بلون الرمال وقد تماثلت البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

Osmie (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ سم . انوثتها قائمة تكثر فيها السمرة السوداء المواج والسمرة السفعاء . قشورها كثيف الملبس اللينق الناعم اشعث اللون او اخضر || ملجئها الخياشي انزالي . تشيد غشائياتها في جذوع الاشجار النخرة وفي حيطان الخراب . قوتها رحيق الازهار والطلع وما يجمعه من عسل في تخاريبها المسدسة الاصلع . الواحدة ورشاة .

Cerceris (S).

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة وانجمه ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الالقيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الحيات . انوثتها ملونة يكثر فيها الاسود المخلوع بالاصفر والاسود المخلع بالابخر || تصفرق في المواقع الرملية . اصغافها رداء فسيحة متركبة الخلايا المحجورة المنفصلة || قوتها بعض غديات الاجنحة اغصها السوس والزرقون وتقتصمها تخندرها وتنقلها الى اصغافها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

حالة عدم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحجب في طور استنسابها .

٣٠٤٥٢ - وَخْفٌ ، وَتَوْخِيفٌ ، نَقْعٌ

Macération (F). Maceration (E).

مرث الشيء بالماء لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

جنس حشرات غشائية من فصيلة التفريات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ٢ الى ٤ سم . انوثتها حنطية اللون يملوها تجلجج اسود || رقاتها همة تركب لها وشكير مختلف النباتات المتسلقة العارضة اغصها اللباب .

Sphaerostilbe (S).

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات . يتميز باعسانه الجامعة الانتشاب المرتكزة على ونية دموية لاجولية . يوغها ثنائي العدد ، ثنائي الخلية ، يجمعه تكات صقية الشكل || له نوعان مؤذيان وشميش الموز وشميش مفاجي .

٣٠٤٥٥ - وَخَيْشُ الْمَوْزِ

Sphaerostilbe musarum, Calostilbella calostilbe (S).

Unipétale (F).

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها وحيد البتلة او القعالة .

Monostylé (F).

Monostylous (E).

Monochrome

Homocentrique (F).

Homocentric (E).

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

Monochrome

٣٠٤٣٤ - وَحِيدُ الْقَعَالَةِ

٣٠٤٣٥ - وَحِيدُ الْقَعْمِ

٣٠٤٣٦ - وَحِيدُ اللَّوْنِ

٣٠٤٣٧ - وَحِيدُ الْمَوْزِ

٣٠٤٣٨ - وَحِيدُ الْمَسْكَنِ

٣٠٤٣٩ - وَحِيدُ الْمِصْرَاعِ

٣٠٤٤٠ - وَحِيدُ الْمَكَافَا

٣٠٤٤١ - وَحِيدَاتُ الْأَجْهَرَةِ

٣٠٤٤٢ - وَحِيدَاتُ الْأَذْيَنِ

٣٠٤٤٣ - وَحِيدَاتُ الْأَصْدَافِ

٣٠٤٤٤ - وَحِيدَاتُ الْقَفْصَالِ

٣٠٤٤٥ - وَحِيدَاتُ الْمَسْلِكِ

٣٠٤٤٦ - وَحِيدَةُ الْبُرْزَةِ

٣٠٤٤٧ - وَحِيدَةُ الْخِيَاءِ

٣٠٤٤٨ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٤٩ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٠ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥١ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٢ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٣ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٤ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٥ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٦ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٧ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٨ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٥٩ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٠ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦١ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٢ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٣ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٤ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٥ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٦ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٧ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٨ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٦٩ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٠ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧١ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٢ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٣ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٤ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٥ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٦ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٧ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٨ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٧٩ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٠ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨١ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٢ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٣ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٤ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٥ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٦ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٧ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٨ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٨٩ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٩٠ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٩١ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٩٢ - وَحِيرَةُ

٣٠٤٩٣ - وَحِيرَةُ



وَخْش



وَخْش



وَخْش

خاصة بتحويل الوذاف واكثره وباستنفاض الايلاع والشهوة الجنسية .

### ٣٠٤٦٢ - وَدَاقِي، وَدَقَان، وَدُوقِي

*Rut des solipèdes* (F). *Rut of the solipeds* (E).

شهوة أنثا ذات الحافر أو التعلل أو الزين الذي تطلب فيه الاناث تحوطا للسفاد .

### ٣٠٤٦٣ - وَدَج

*Mobile, Motif* (F).

*Mobile, Moving* (E).

هو السبب والوسيلة .

### ٣٠٤٦٤ - وَدَح، قَانَانِيَا، قَوْلِيَّة، عَوْدُ الصَّليب

*Paeonia* (S). *Pivoine, Peonie* (F). *Peony* (E). *Paeonie* (D). *Peonia* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشقاريات. أنواعه نحو ٢٠، معظمها بري وبعضها تزييني. جذورها خزنية، لحمية، غليظة. أوراقها متناقية. أزهارها كبيرة القد، لحسية الفصل، عديدة البتلات، لا قياسية الكبرال. أشهر أنواعه ما يلي .

### ٣٠٤٦٥ - وَدَحْ جِلْدِي الْوَرَق

*Paeonia coriacea* (S). *Pivoine à feuilles coriaces* (F).

نوع من الودح، ساقه عشبية جؤرية اللون تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم. أوراقه قليلة التفريش المستعرض، نصلها جلدي الصفحة، عابك العليا بحري السفلى. زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض من ١٠ إلى ١٢ سم. لونها الوردى أو الأبيض || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

### ٣٠٤٦٦ - وَدَحْ شَاذْ

*Paeonia anomala* (S).

*Pivoine anomale* (F).

نوع من الودح التزييني، ساقه عشبية تملو من ٦٠ إلى ٧٠ سم. أوراقه كبيرة القد كثيرة التفريش والتشريح والعروق والتشرايين. عروقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض نحو ١٠ سم. لونها الوردى . تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

### ٣٠٤٦٧ - وَدَحْ شَجَرِي

*Paeonia moutan* (S).

*Pivoine en arbre* (F).

نوع من الودح التزييني، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة القد ثلاثية أو لحسية التفريش، نصلها عابك الصفحة العليا بحري السفلى. أزهارها كبيرة القد تعرض من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب، منها الأبيض والوردي والاحمر والقرمزي || تنوره يستمر من أوائل أيار إلى أواخر حزيران .

### ٣٠٤٦٨ - وَدَحْ صَغِير الْوَرَق

*Paeonia tenuifolia* (S). *Pivoine à feuilles menues* (F).

نوع من الودح . ادمته ركوبية . ساقه عشبية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقه قليلة متبادعة تعد من ١٠ إلى ١٢، جميعها صغيرة القد كثيرة التفريش والتشريح . زهرته هامية الارتكاز وحيدة، تعرض من ٨ إلى ١٠ سم. لونها الوردى والقرمزي العابق الملاج || تنوره يستمر من أوسط أيار إلى أوسط حزيران .

### ٣٠٤٦٩ - وَدَحْ صِيْثِيْ \*، وَدَحْ عَطِر

*Paeonia albiflora* (S). *Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose* (F).

نوع من الودح، ضروبه التزيينية عديدة . ساقه عشبية جؤرية اللون تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد

### Maladie de Bonnygate du bananier (F).

فطر مجهري يصيب الموز من جذوره الى اوراقه فيعطى ويميته || يبدو على الاوراق عصابات شبيقة مستطيلة لونها اللمعة الداكنة تغطي التسج وتسبب يباسه . ويبدو على انحاء الامورة لطخ عشبة لونها الى السمرة تحويها اهداب حر تحوي مشج الفطر الذي ينخر التسج ويرقى انقياً من نمد الى نمد يلحفه حتى القلب || وهو في الجذور عند انتشارها بؤرة عفن تقود التسج الى الانحلال . وإذا أعترها عند أطرافها أو بعيداً عن زاوية انتشارها فهو بقعة سمراء اللون مهدبة بالأحمر || يكافح باقتلاع وطمر الموز الموبوء بعد تنغيره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البش أيضاً قبل طمره .

### ٣٠٤٦٩ - وَغَيْشْ مُفَاجِيْ

*Sphaerostilbe repens, Stilbum* (S).

فطر مجهري شديد الاذى يسبب عفن الجذور في بعض الانواع النباتية انحصار المطاط واللباية والمزقة والاهوكراتية، وقد شوهد على جذور الليمون الحامض || مظهره الخارجي عفن خلى الشكل ليد التجميع لونه الى الجؤوة السمراء وهو كثير العرصات الفسيحة الحجم || اغمراره جسيمة لانه يمت الاشجار بعد ان يقضي على جرادة جلورها . يكافح باقتلاع وحرق الاشجار الموبوءة وتطهير مواقعها وتخفيض التربة . ومن الانسب اجتناب التربة الرطبة الكثوم لانها تلام انتشار هذا الوسم .

### ٣٠٤٧٠ - وَدَأْ، فَدَنْ

*Aplanir, Nivelor* (F).

*To smooth, To level* (E).

ودأ الارض أو فدنها : بسط سطحها وسواه انقياً .

### ٣٠٤٨ - وَدَآب

*Alcadium* (S).

*Alcadium* (F). *Alcadium* (E).

الوداب فطر ينمو على جذوع وأعصان الاشجار اليابسة .

### ٣٠٤٩ - وَدَاج، وَدَحْ، شَرِيَانْ سُبَانِي

*Carotide* (F). *Carotid* (E).

شريان في العنق وهما وداجان أو ودجان : شريانان غليظان عريضان عن بين ثغرة الشنر ويساها .

### ٣٠٤٩٠ - وَدَأْسْ

*Enoploteuthis* (S).

*Enoploteuthis* (F). *Enoploteuthis* (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات رأسيات الايل، مزدوجيات الخياشيم، عشاريات الجرامز وقصيلة الطردوسيات . انواعها المعروفة ستة، اعطائها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تزيد الى النوع . اصفر الانواع وهو وداس المتوسط يعطول نحو ثلاثة امتار . اما الانواع الكبيرة كوداس اقيانية فيعطول نحو عشرة امتار . ووداس جزر الزايج يعطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الارتكاز، منها قليلة الشكل ومنها زروانية . جرامزا مجمعة، متساوية الطول باستثناء الزوج القفيف فانه شديد الطول، ينتهي برحى ستانية الشكل تملوها الهامم الكبيرة والكلايب القزينة المادة .

### ٣٠٤٩١ - وَدَاقِيْ

*Spermatopé* (F).

نمت تعريفية توصف به الاغلبية الخاصة أو المزموم انها



ودح صيْثِيْ

Mouillage (F).  
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدْن

٣٠٤٨٠ - وَدْن الْأَسَد

هو الصلج، نبات عسقلي من البرباريات .

٣٠٤٨١ - وَدْن الصَيْل

شجيرة برية تدعى ككولوب كينو، اطلبه .

Pousse (jeune) (F).  
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَة

هي القثيث جاز اقتلاعه . ج. ودي .

Ophiorhiza (S).  
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَة \*

جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات . أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها الخولية والحولة والمعمرة . أعطانها بعض مناطق البلاد الحارة معظمها من ثبوت الهنـد وماليزية وبعضها الآخر من ثبوت امريكة الجنوبية || سوقها متباينة الارتفاع . أوراقها متقابلة ، منقطة ، سنائية النصال . أزهارها ضبي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . أزهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات ، مختلفة الألوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردى ثم الابيض . ثمارها جراء ثنائية الخدر . بزورها سوداء اللون مكورة تستعمل كدافعة للحمى . ومنها نوع هندي المشب يدعى ودية ترياقية (Ophiorhize mitréole) جلوه ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي .

٣٠٤٨٤ - وَدَيْس يبيس العشب من امي جلس كان .

٣٠٤٨٥ - وَدَيْشَة ٥ Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجانيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والتريبينية . سوقها فروعاً تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها متقابلة ، سنائية النصال . أزهارها سنبتين الاشكال . أزهارها عديدة الألوان || أشهر أنواعها التريبينية الثلاثة التالية :

٣٠٤٨٦ - وَدَيْشَة تَحَلِيَا ٥

Triosteum Himalayanum (S).  
Triostée de l'Himalaya (F).

نوع من الوديشة التريبينية . ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها حاضرة ملتصقة الاذيتان ، سنائية النصل ، تطلو من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || أزهارها سنبتين التجميع . أزهارها صغيرة ، فسقية اللون . ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٤٨٧ - وَدَيْشَة ضَبِقَة الْوَرَقْ ٥

Triosteum angustifolium (S).  
Triostée à feuilles étroites (F).

نوع من الوديشة التريبينية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها حاضرة ، سنائية النصل ، تطلو من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . أزهارها محورية الانتساب ، فردية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

قليلة التفريش المستعرض . نصلها تمتع الصفحة جبل الخضار الباقى ، خلي البشرة السفلى . أزهارها هامي الارتكاز يعد من ٣ الى ٥ أزهار . زهرته فواحة العرف المعطري ، كبيرة القند ، يبيض اللون او مخضبة || تنويره يستمر من ايار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٧٠ - وَدَحْ مَخْرُفِي \* Paeonia officinalis (S).  
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérane, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودح التريبي ، ساقه عشبية جذوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . أوراقه كبيرة القند ثلاثية او خماسية التفرع ، نصلها مائل الصفحة المتموجة مضرب العروق . أزهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم . بتلاتها مهدبة الاطراف ، لونها الى الحمرة المختلفة المواج || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٧١ - وَدَحْ مَرَجَانِي Paeonia corallina (S).  
Pivoine corall (F).

نوع من الودح ، ساقه عشبية جذوية اللون تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه قليلة التفريش المستعرض ، نصلها جامد الصفحة جبل الخضار . زهرته هامية الارتكاز وسيدة ، تعرض نحو ١٥ سم . لونها كالمرجان . كرابلها خلية القشور . بزورها تبدو قرمزية وتنتهي عند تمام الادراك ، بالسواد اللامع . تنويره يستمر من نيسان الى حزيران .

٣٠٤٧٢ - وَدَرّ Trier (F). To pick (E).  
نحى ما لا يلجم مع غيره .

٣٠٤٧٣ - وَدَسْ Défaut (F). Flaw (E).  
العيب البين ان في الحيوان او في النبات .

٣٠٤٧٤ - وَدَعَة \* ، مَسَقَلَة Porcelaine (F).  
ج ودع . الودع ، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرسة كالقواقع وغيرها . وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال والألوان يكثر فيها الشكل الحلزوني .

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات Cypridae (S).  
Cypreides (E). Cypridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل اُميات الحياض المشطية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المتدلة الحارة || جميعها مفترسة ، يبيضه الاصداق الصغيرة القامة . فواها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى . محدبة اليمنى المسنة الخار الداعلي ، المنقطة الخار الخارجي || أشهر اجناسها الودع .

٣٠٤٧٦ - وَدَفْ Sperme (F). Sperm (E).  
الودف والوداف هو ممي الحيوان .

٣٠٤٧٧ - وَدَلْ Lard (F). Bacon (E).  
هو الشحم الذي يتكون تحت جلد بعض الحيوانات كالخنزير مثلاً ...

٣٠٤٧٨ - وَدَلْ Animaux ruminants (F).  
Ruminant animals (E).

الودك ما يجترّ من الحيوان الوحشي ، وما لا يجترّ فهو الزُغم .



ودح مخرفي



ودعة



ودجة



## ٣٠٤٨٨ - وَدَيْشَة مُتَقَوِّبَة الْوَرَق (S).

Triosteum perfoliatum (S).

Triostée perfoliée (F).

نوع من الوديشة الأريينية. ساقها تعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافسة ملتصمة الإزديات تبدو كالشقوقية. نصالها بيضية الشكل تطول من ١٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها محورية الالتشاب، ضمية التجميع، صغيرة القند، أرجوانية اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز.

Dépôt (F). Deposit (E).

عقد يتسلم به شخص متقولا بملكه شخص آخر ليحفظ عيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرد متى طلبه صاحبه.

## ٣٠٤٩٠ - وَدَيْشَة مَبْدُولَة \* (S).

Liparis nostras (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الشحطاريات موطنها بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || جسمها شبه وشي الشكل، ضخم المقدم، دقيق الخنصر، بطول نحو ١٦ سم. مسكها أدام السهف، لزج. رأسها مستطيل الجرم، قصير الخط، كبير الشفق. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها. زعانفها الصدرية والخصوية مندوخة تتأخر الرأس عند فكها. زعنفتها الذيلية صغيرة من مزوانية الشكل. ثوبها إلى السرة الحنفية الملوحة بالأسود. بطنها إلى الغبرة الزرقاء المواج || لحمها متوسط الصنت، مأكل.

## ٣٠٤٩١ - وَدَيْشَة (S). Odontites (S). Odontite (F).

جنس نباتات شبيهة بيرة، حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منبتها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || سوقها قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة. نصالها اهليلجية متجمعة. أزهارها صغيرة حراء اللون || تنويرها ربيعي.

## ٣٠٤٩٢ - وَدَيْشَة جَمِيلَة (S). Enidella speciosa (S).

Enidelle élégante (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الأجنحة. جسمها صغير القند بطول من ٦ إلى ٧ مم. || ثوبها إلى الحنفلي الاشعاع المواج يطولو بتتبع في الظهران. رأسها معتدل العرض، ناضج البافوخ الذي يبدو كالقرن. عيناها كبيرتان. زبابانها مستطيل الفصّل الاول والثانية. كويلها قصير. حنجلتها بحرمة. ظهرانها كامل الحنجبة. شارب، بين المروق. روشانها غشائيات، شفافان. بطنها معتدل التبطيط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || سرسها غصاف مجاري الماء.

## ٣٠٤٩٣ - وَدِين (F). Mouillable (F). Wetable (E).

## ٣٠٤٩٤ - وَدَشَة التَنَوْب \* (S).

Glischrochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الودشيات، صغيرة القند بيضية الشكل، طولها براوح من ٥ إلى ٦ مم. ثوبها إلى السواد اللامع يطولو في كل من عهديا تربية ونقطة يرتقالية اللون، زبابانها وأرجلها شقر. تعيش تحت لحاء التنوب. قوتها ما تقتصر من الكراشيات.

## ٣٠٤٩٥ - وَدَشَة النَّيَّارِ الْجَفَاءَة \*، كَرْبُفِيل النَّيَّارِ الْجَفَاءَة

Carpophilus hemipterus (S). Carpophile des fruits secs (F).

حشرة من الودشيات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ مم. عهديا لا يطيلان كامل ظهرها. ثوبها إلى البني اللامع. تركيب النيار الناضجة الساطعة ثم الجافة اصعبها التين والشمش.

## ٣٠٤٩٦ - وَدَشَة السَّلَجَم \*، مَلْشِيَتِ السَّلَجَم Meligethes viridescens (S). Mélégethe du colza (F).

حشرة من الودشيات، صغيرة القند، طولها براوح من ٢ إلى ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الأزرق المواج. زبابانها وأرجلها شقر. تركيب مع ريقها جميع النباتات الصليبية واصعبها السلجم.

## ٣٠٤٩٧ - وَدَشَة الْمَلْفُوف \*، مَلْشِيَتِ الْمَلْفُوف Meligethes aeneus (S). Mélégethe du chou (F). Pollen beetle (E). Rapskollanzkäfer (D).

حشرة من الودشيات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الزرجدي، زبابانها وأرجلها سود. تركيب هي وريقها معظم النباتات الصليبية اصعبها الملفوف.

## ٣٠٤٩٨ - وَدَشَة حَنْطَلَة \*، كَرْبُفِيل حَنْطَلَة Carpophilus dimidiatus (S). Carpophile brune (F).

حشرة من الودشيات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الحنفلي الاسمر المواج. تركيب النيار الجافة قنصرها مع ريقها وتنطها.

## ٣٠٤٩٩ - وَدَشَة غَبَرَاءَة \*، صُرُونِيَّة رَسَادِيَّة Soronia grisea (S). Soronie grise (F).

حشرة من الودشيات، طولها براوح من ٢ إلى ٥ مم. ثوبها حنفلي اللون يطولو بتتبع ويتجمع اسمر. زبابانها وأرجلها حنفية. تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والمثمرة.

## ٣٠٥٠٠ - وَدَحِيَّات Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F). Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عديدات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القند بيضية الشكل مغلطة. قربونها الاستثمارية صولجانية مركبة. ١١ فاصلة. ارسافها خاسية أو مختلفة الاجزاء. تعيش على الاغذاء وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

## ٣٠٥٠١ - وَدَقَّة Protoplasme (F). Protoplasm (E).

هي البروتوبلازما، المادة التي تتكون منها حبيرة أو خلية الاجسام الحية.

## ٣٠٥٠٢ - وَدَقِي Protoplasmique (F).

ما هو متعلق بالودقة اي بالمادة الاولية الحجرية أو الخلية.

## ٣٠٥٠٣ - وَدَمَاء Bréhaigne (F). Barren (E).

الودماء العاقر. نعت تعريفي يطلق على كل انثى عاقر من الحيوان.

## ٣٠٥٠٤ - وَدَمَة Edème (F). Edema (E).

هي الاوذما اي الاستسقاء اللوزني.



وديشة مبدولة



ودشة التنوب



ودشة النيار الجافة



ودشة السلجم



ودشة الملفوف



ودشة حنطلة



ودشة غبراء

## \* ٣٠٥١٤ - وَرَّةُ الصَّبَاغِين

*Serratula tinctoria* (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورق ، ساقها منتصبه سرحة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها لا قابسية التفريص . رؤيساتها الزهرية عثكولية التجميع ، كثيرة العدد ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهارها متساوية القد قريزية اللون . قنايات قلافاها خضر الصفحات الخارجية حر المواج || وهي نبات خضابي يستخرج من ازهاره وسوقه وجذوره صباج يفتق اللون مرغوب فيه || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

## ٣٠٥١٥ - وَرَّةُ مُحَاسِيَةِ التَّفْصِيسِ

*Serratula quinquefolia* (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورق ، بجملته فرعاه الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. فروعهها منتصبه زياه اللحاء . اوراقها خماسية التفصيص . فصوصها المتقابلة سنانية الشكل صغيرة القد ، فصها الاخير كبير القد مستدق القاعدة . نصلها ماس الصلحة مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز ، فردية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٦ - وَرَّةُ شَعَاعِيَّةِ

*Serratula radiata* (S). *Sarrette radiée* (F). نوع من الورق ، بجملته صغيرة القد فرعاه تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. فروعهها منتصبه زياه اللحاء . اوراقها خطية التفريص ، فروعهها تعد من ١٩ الى ٢١ ، جميعها مسنة الحافة . رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز ، فردية التجميع ، شعاعية التركيب والشكل . ازهارها حراء اللون قريزية المواج . تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٧ - وَرَّةُ عُرُطِيَّةِ

*Serratula centauroides* (S). *Sarrette centaurée* (F). نوع من الورق ، بجملته تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقها فرعاه . فروعهها سرحة . اوراقها كبيرة القد عرطية الشكل ، كثيرة التفصيص . نصلها مسنن الحافة ، اخضر الصلحة العليا المماسية ، اطحل السفلى المزغفرة . رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز ، فردية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها براوح من ٦ الى ٧ سم. لونها الى البياض الناصع . قنايات قلافاها حنطية اللون مهذبة الحنار || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

## ٣٠٥١٨ - وَرَّةُ مُتَوَجِّعِ

*Serratula coronata* (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورق ، بجملته منتصبه قليلة الفروع تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. فروعهها سرحة . اوراقها مفصصة لا قابسية الترتيب . نصلها ماس الصلحة ، مسنن الحافة . رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز فردية التجميع . ازهارها قريزية اللون ، الخنارية منها اطول من الوسطى والوسطى اطول من المركزية . قنايات قلافاها زغبية البشرة عل صفحتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

## ٣٠٥١٩ - وَرْدٌ هو القطيع من الطير .

## ٣٠٥٢٠ - وَرْدٌ Lion du Guzerat (F).

هو اسد الهند ، اعطيه .

## ٣٠٥٢١ - وَرْدٌ ، جُلْ Rosa (S).

Rosier (F). Rose-tree, Rose-bush (E). Rose (D). Rosa, Rosajo (I).

جنس نباتات جنيبة معمرة من فصيلة الورديات . انواعه

## Ultra-violet

## ٣٠٥٥٥ - وَرَاةُ الْبَيْسَجِيِّ

*Hérédité* (F). *Heredity* (E). وَرَاةٌ ٣٠٥٥٦ هي انتقال صفات الآباء الى انسلهم وسلالاتهم الى الحيوان والنبات تباً لنظام خاص يعرف بقانون الوراثة . وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في ديس الاحياء ويميزى الففضل في لفت الانتظار اليها الى اباحت العلانة « مندل » .

## ٣٠٥٥٧ - وَرَّاشَةٌ Bembex (S).

*Bembex* (F). *Bembex* (E). جنس حشرات قانصة وانجحة نافعة من الحويوات غشائيات الاجنحة المحصورة وفضيلة الانليات ، انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتندلة الحارة || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . اثارها ملوكة يكثر فيها الاصفر المالح بالاسودم الاصفر الاخضر البليج بالاسود || جميعها تصفن في التربة . اصفاها رداء قميصية متراكبة الخلايا المسدسة السطوح تغور من ٣ الى ٧ سم. مداخلها انبوبية منحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحوام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدرها وتنقلها الى اصفاها زادة لها وليرقاتها .

## ٣٠٥٥٨ - وَرَاقِ Feuillaison (F). Folliation (E).

وقت خروج الورق .

## ٣٠٥٥٩ - وَرَّانِ Urania (S).

*Uranie* (F). *Urania* (E). جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات ، انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تهام البحر الاخر الى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشكر || جميعها كبيرة القد ، مذنبية الراوش الخلفية ، جميلة الزخارف والالوان البهية المتداخلة || ريقاتها الى البياض الكبريتي المواج تعلوه نمشة سوداء . رؤوسها صفراء اللون او حراء . اجيالها الحولية ثلاثة .

## ٣٠٥١٠ - وَرَّانِيَّاتُ Uranidae (S).

*Uranidés* (F). *Uranidae* (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشكر || جميع انواعها كبيرة القد ، متراكبة الالوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران .

## ٣٠٥١١ - وَرْبُ الورب : وجار الوحشي .

## ٣٠٥١٢ - وَرَّةُ Trou de plantation (F).

الوردة : الحفرة الصغيرة المعدة لاقتبال الفرس .

## ٣٠٥١٣ - وَرْدُ Serratula (S).

*Sarrette*, *Serrate*, *Serratule* (F). *Saw-wort*, *Dyer's savory* (E). *Färbescharte* (D). *Serratola*, *Sarretta*, *Serretta* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ، معظمها بري وبعضها تربيني . اوراقها شوكية لا قابسية التفريص . رؤيساتها اسطوانية . ازهارها انبوبية . يزورها ذنعية الغنط . تعيش في جميع الارربة الزراعية وتكثر بالبذر . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



ورقة الصباغين

الخضار الأزرق . أزهاره عكوكلي التجميع . أزهاره عادمة العرف ، حراء اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب .

### ٣٠٥٢٦ - وَرْدْ أَصْفَرْ \* ، وَعَاط

Rosa lutea (S). Rosier jaune (F). Austrian briar (E). Gelbe Rose (D). Rosa canina lutea, R. c. fetida (I). نوع من الورد البروتي . جنته مدادة تطول من ٢ الى ٤ أمتار . ساقه وفروعه متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحدياد . أوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات . وريقاته أهليجية الشكل . نصلها مستن الحافة بارز المروق . أزهاره صفراء اللون كرية الرائحة ، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز .



ورد احمر

### ٣٠٥٢٧ - وَرْدْ الْبَنَفَسَج

Rosa Banksiae (S). Rosier de Banks (F). قرع من الورد الجادح الذي يتطلب موطن خاصة ، مرضها الجنوب . جنته تطول من ٣ الى ١٠ أمتار ، فروعه نحلة عادمة الشوك . أوراقها خماسية أو سباعية التركيب غرزية الزينات . وريقاتها مائلة لامعة . نصلها مستن الحافة خلي الصلم . أزهارها غمي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، بنفسجية العرف ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

المعروفة زهاء ٥٥ ، ضروبه وأصرامه وجهته لا تقل عن ٧٠٠٠ ، سوقها شائكة منتصبة أو مدادة ، شوكة أو مناسخها غر وعلية الشكل مدبية الحمة المحجنة . أوراقها مركبة متناقبة . أزهارها طرية الارتكاز ، فدية أو عكوكلية التجميع . كؤوسها لا قياسية التفصيص يكثر فيها الخمسين . بتلات توجعها لا نظامية العدد منها الرباعية والخامسة والكثيرة العدد . أسديتها عديدة . خدورها طليقة وحيدة المساكين . بزورها بيضبة صغيرة خلية البشرة . يعتبر الورد من أشهر النباتات التزيينية وأجسها للانسان وأرقاها . يحوي في جميع الأثرية القليلة الاندماج . يرغب في الخصبية ولا يصمر كثيرا في الرمية . يتكاثر بالفسائل والمقل والبذور والتعلم . يستخرج من زهر بعض أنواعه ، بالتقطير ، دهن الورد وماء الورد || أشهر أنواعه ما يتبع .

### ٣٠٥٢٨ - وَرْدْ أَبْيَضْ

Rosa sempervirens (S). Rosier toujours vert (F). نوع من الورد الرف ، جنته مدادة تطول من ٤ الى ٦ أمتار . فروعه سريعة مستطيلة . أوراقه أيدة ، خاسية أو سباعية التركيب . وريقاتها جلدية النصل اللامع العادم الحمل . أزهاره عطرية العرف ، كبيرة القد ، قصيرة النصل ، يبيضه اللون أو قشدية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

### ٣٠٥٢٩ - وَرْدْ أَبْيَضْ ، وَتِير

Rosa alba (S). Rosier blanc (F). White rose, Single white rose (E). Weisse Rose, W. Gartenrose (D). Rosa bianca, R. angiola, R. carnica (I). نوع من الورد البروتي . جنته تملو من ٢ الى ٤ أمتار . ساقها منتصبة ، فروعه متدلية . مناسخها لا قياسية الترتيب والحجم والتجسين . أوراقها سباعية التركيب . وريقاتها بيضبة الشكل ، نصلها أخضر اللون ، مالم الصفعة العليا ، خلي الصلم . أزهارها نورتي التجميع . أزهارها كبيرة القد ، يبيضه اللون ، مستحبة العرف || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

### ٣٠٥٣٠ - وَرْدْ أَحْمَرْ \* ، حَوْجَم

Rosa gallica (S). Rosier de France, R. de provins, R. rouge (F). French rose, Common rose (E). Gallic Rose (D). Rosa domestica, R. incarnata, R. d'orto (I). نوع من الورد البروتي . أصرامه وجهته كثيرة العدد . سوقها وفروعها مستطيلة . مناسخها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز ، حادة الحمة المحدودة . أوراقها ثلاثية أو خماسية التركيب . وريقاتها كبيرة القد مستطيلة ؛ نصلها غشخ الملس مستن الحافة . أزهارها كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم. || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

### ٣٠٥٣١ - وَرْدْ أَحْمَرُ الْوَرَقْ

Rosa rubrifolia (S). Rosier à feuilles rouges (F). نوع من الورد البروتي الميبل . ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . مناسخها متساوية القد ، ميمرة التجميع . فروعه موزوية اللون ، خلية اللحاء ، متبادعة المناسخ الجالسة أو القليلة الإحدياد . أوراقها خماسية أو سباعية التركيب وريقاته حر الزخفات والأهن والفسلوع ، نصلها مالم الصفعة ، خلي الصلم الناشزة ، لونه إلى

### ٣٠٥٣٢ - وَرْدْ الْحَمْلُ ، وَرْدْ مَدَّاد

Rosa arvensis (S). Rosier rampant, R. d'Ayrshire (F). نوع من الورد الجادح . جنته مدادة تطول من ٢ الى ٤ أمتار . فروعه دقيقة مستطيلة ، مناسخها متوسطة التحديق . أوراقه ثلاثية أو خاسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها أهليجية ستانية ؛ نصلها عاكب اللون ، متوسط اللعة ، خلي الصلم . أزهاره متوسطة القد ، قليلة العرف ، حراء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران .

### ٣٠٥٣٣ - وَرْدْ الْحَبَّارْ

Bupthalma fétide (F). نوع الريد النتن ، أطلبه .

### ٣٠٥٣٤ - وَرْدْ الْوَرَقِي

Ketmie de Syrie (F). هو الخطي السوري ، أطلبه .

### ٣٠٥٣٥ - وَرْدْ السَّمَاءْ

هو اللخني ، أطلبه .

### ٣٠٥٣٦ - وَرْدْ السَّجَاجْ

Rosa agrestis, R. sepium (S). Rosier des haies (F). نوع من الورد البروتي الميبل . جنته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها كثيفة المناسخ المتساوية القد ، القليلة الإحدياد . أوراقها خماسية أو سباعية التركيب ، وريقاتها ثنائية التسين ؛ نصلها مالم الصفعة عاكب الخضار . أزهاره صغيرة القد ، يبيضه اللون أو وردية ، مستحبة العرف العطري || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

### ٣٠٥٣٧ - وَرْدْ الشَّايْ

Rosier thé (F). هو ورد الهند ، أطلبه .

### ٣٠٥٣٨ - وَرْدْ الشَّمْسْ

هو التيدمان المستدير الورق .



ورد اصفر

منها دهن الورد ودم الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى الآخر الخريف .

### ٣٠٥٤٣ - وَرْد حَرِشْ \*

Rosa rugosa (S).  
Rosier rugueux (F).  
نوع من الورد السبروتي. اصراعه كثيرة العدد، ساقها منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناخسها متباعدة، ثنائية الترتيب، قليلة التحجين. فروعها زياء اللحاء متقاربة المناسخ اللانسياسية الحجم. اوراقها لا نظامية التركيب، ورتية التجميع، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها تتمع الصفحة، باث اللون، خلي البشرة السفلى. ازهارها فردية او ثلاثي التجميع. ازهارها عطرة متفاوتة اللد تختلف باختلاف الاصرام، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة اللد لها الى الحفرة الزاهية. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

### ٣٠٥٤٤ - وَرْد تَحْلِي

Rosa villosa, R. pomifera (S). Rosier velouté (F).  
نوع من الورد السبروتي المبدول. جنبته مدادة تطلو نحو ٤ أمتار، ساقها وفروعها متباعدة المناسخ المتساوية اللد قليلة الاحديداد. اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ وريقة، نصلها خلي البشرة على صفحته. ازهارها عطرية العرف حراء اللون، قطرها يراوح من ٦ الى ٩ سم. نصلها وثمارها حلبيّة البشرة || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

### ٣٠٥٤٥ - وَرْد صَغِيرِ الْوَرَق

Rosa microphylla (S). Rosier à petites feuilles (F).  
نوع من الورد، ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها عادمة الزغب، ثنائية المناسخ المستقيمة المراسا اللون. اوراقها ابيدة، مركبة، تتألف من ١١ او ١٣ وريقة. نصلها جامد الصفحة اخضر اللون. ازهارها وردية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين.

### ٣٠٥٤٦ - وَرْد عَجَمِي

Rosa persica (S).  
Rosier à feuilles d'épine-vinette (F).  
نوع من الورد السبروتي، بجته تملو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعها قليلة المناسخ المتباعدة. اوراقه كاملة بسيطة، نصلها مسن الحافة، بحري اللون على صفحته، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرض من ٥ الى ١٥. ازهارها طرفية فردية، لها الى الصغار الموشع بالاحمر || تنوره يستمر طلول شهر حزيران.

### ٣٠٥٤٧ - وَرْد فِيرْجِينِيَّة

Rosa virginiana, R. fraxinifolia, R. blanda (S). Rosier de Virginie (F).  
نوع من الورد السبروتي. مهد البلاد الامريكية. جنبته تملو من ٢ الى ٣ أمتار. ساقها وفروعها جزوية اللحاء، مناخسها لا قياسية الحجم والترتيب والتحجين. اوراقها خاسية او سباعية التركيب، وريقاتها صغيرة اللد اهليجية الشكل، نصلها جامد الصفحة، تباعد التنسين، قليل الزغب على الجهة السفلى. ازهارها كبيرة اللد حراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز.

### ٣٠٥٤٨ - وَرْد فِينِي

Rosa phaenicia (S).  
Rosier de Phénicie (F).  
نوع من الورد البري المبدول في جبال لبنان والمولوين.

Rose de Chine (F). ٣٠٥٣٥ - وَرْد الصين  
هو الأجره الهندي، اطلبه.

### ٣٠٥٣٦ - وَرْد المَرَاي

Rosa setigera (S).  
Rosier de la prairie (F).  
نوع من الورد السبروتي. جنبته مدادة تطلو من ٣ الى ٦ أمتار، فروعها سريعة، مناخس غليظة جالسة. اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب. وريقاته اهليجية مسنة، نصلها اخضر الصفحة العليا، خلي السفلى الغبراء اللون. زيمتا اوراقه واعناقها حلبيّة الحمار. ازهارها عشكولي التجميع. ازهارها عادمة العرف بيضاء اللون او وردية. تنوره يستمر طلول شهر تموز.

### ٣٠٥٣٧ - وَرْد النَيْسِلْ

Pastel des teinturiers (F).  
هو وسمة الصباغين، اطلبها.

### ٣٠٥٣٨ - وَرْد الهِنْد، وَرْد الشَّاي، عُرْشِي

Rosa indica (S). Rosier de l'Inde, R. thé (F).  
نوع من الورد السبروتي الشائع الزراعة. اصراعه وجهته كثيرة العدد. ساقه منتصبه تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب. وريقاته اهليجية مدبية، نصلها لامع البشرة عايق الخصار. ازهارها متوسطة اللد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. الوانها تختلف باختلاف الصرم والمخلج، يكثر فيها الاصفر والبرتقالي والاحمر ومشتقاتها. || تنوره يستمر طلول فصل الربيع والصيف والخريف.

### ٣٠٥٣٩ - وَرْد بَرِّي

Eglantier (F).  
هو التسنين، اطلبه.

### ٣٠٥٤٠ - وَرْد بِلَانِي

Rosa pimpinellifolia (S).  
Rosier pimprenelle (F).  
نوع من الورد السبروتي. جنبته تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيرة المناسخ والمحب. اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ او ٧ الى ٩ وريقة. وريقاتها ثلاثية الشكل. نصلها خلي الصفحة السفلى، وفي المراج. ازهارها صغيرة اللد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لها تختلف باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

### ٣٠٥٤١ - وَرْد جَبَار

Rosa gigantea (S).  
Rosier géant (F).  
نوع من الورد السبروتي العارش. جنبته تطلو من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعها عادمة الشوك. اوراقه خاسية او سباعية التركيب. وريقاته اهليجية الشكل نصلها ماس اللون البشرة على صفحته. ازهارها كبيرة اللد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لها الى البياض التني او الصغار الباهت. تنوره يستمر طلول شهر ايار.

### ٣٠٥٤٢ - وَرْد جُورِي، وَرْد بَلَدِي، وَرْد شَامِي

Rosa damascena (S). Rosier de Damas, R. des quatre saisons (F). Damask rose (E). Damaszenerrose (D). Rosa damaschina, R. delle quattro stagioni (I).  
نوع من الورد السبروتي المبدول. جنبته تملو من ٦٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة الشوك. مناخسها حادة الحمة المحجنة. اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها بضيّة الشكل، جامدة التصل المسن الحافة. ازهارها وردية اللون، كبيرة اللد، فواصة العرف المعطري، يستقر



ورد حرش

لونها الى الازيس او الوردي ؛ فصلها تنتهي برؤائد وريقة .  
تنوره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٤ - **وَرْدَ مَسْكِيَّ\***  
*Rosa moschata* (S).  
*Rosier musqué* (F). *Muskatrose*,  
*Bismarose* (D). *Rosa muschata* (I).

نوع من الورد . ساقه منتصبه تملو نحو ٣ امتار ، فروعه  
مستطيلة مثدية . اوراقه خماسية او سباعية او تساعية  
التركيب . وريقاته بيضيه سناينة ؛ فصلها مائل للصفحة  
العليا ، خلي السفلي . ازهاره عتكرولي التجميع . ازهاره  
مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . لونها الى  
البياض الاصفر || تنوره يستمر من تموز الى تشرين .

٣٠٥٥ - **وَرْدَ كَانِي**  
*Colombi-moineau* (F).  
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة المدد جميعها  
ربعة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة العنق ، معتدلة  
الجناح ، مستديرة الانفيك القصير ، نحيلة المنقار ، عارية  
الرسم || اشهر انواعه الورداني المطروق .

٣٠٥٦ - **وَرْدَ كَانِي مَطُوق**

*Chamaepelia passerina* (S). *Colombi-moineau pas-*  
*sarine*, *Pigeon de terre* (F). *White-throat* (E).  
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد ، طوله نحو ١٨ سم .  
ثوبه الى الصهبة الزرادية . رأسه وقرنيه وصفه زرق المراج .  
عنقه مطوق بالابيض . جناحه اغمر الزرقه تملو وشمه  
سمراء صفراء المراج . قوادمه واباهره حر الالوان الخارجي .  
بيض الداخل . عيناه برتقالية اللون ، منقاره وساقاه حر .  
يألف المراعي والسهول المزروعة والحدائق والبساتين . سريره  
يعد من ١٠ الى ١٦ . قوته الحبوب والبزور على اختلافها .  
يدشن في الجنيات والادغال . انشاء تحضن سنوياً من مرتين  
الى ثلاث مرات ، حضنتها ييشتان .

٣٠٥٧ - **وَرْدَ الْيَتَامِيَّ**  
*Blattopteroides* (F).  
طبقه من الحشرات تنتمي الى شعبة البرقائيات وطلافة  
المنحنيات اصل . رئيسها الحالية ثلاث : السرغائيات  
والعفغائيات والسرغائيات . اشكالها واحجامها عديدة ومختلفة .  
تتميز بارساغها المركبة التي يلبس فيها التحشيش .

٣٠٥٨ - **وَرْدَة**  
*Rose* (F).  
زهرة الورد . اشكالها واحجامها وعدد بتلاتها والوانها وعرفها  
تختلف باختلاف النوع والرمح .

٣٠٥٩ - **وَرْدَة اُرْبَحَا** هي كف العذراء ، اطلبها .

٣٠٥١٠ - **وَرْدَة التَّيْل** هي لولس التيل ، اطلبه .

٣٠٥١١ - **وَرْدَة الحَيْد** هي الخفلية المنتصبه ، اطلبها .

٣٠٥١٢ - **وَرْدَة الْيَابَان** هي الكاكييه ، اطلبها .

٣٠٥١٣ - **وَرْدِيَّات**  
*Rosaceae* (S).  
*Rosacées* (F). *Rosaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مدلية خاصة معرضها  
المعروفة زهاء ١٠٠٠ تنتمي الى ٧٠ جنساً تجمعها عدة  
اسباط . نباتاتها بمجموعه كاملة من الاشباب والجنابات  
والشجيرات والاشجار . اوراقها متشابهة مختلفة الاشكال  
والترتيب . ازهارها نوري التجميع . ازهارها خشوية .  
ثمارها متجانسة الاشكال والاجسام والالوان . وهي تشمل

يرطب في المواقع الرطبة . جنبته منتصبه حزمية الفروع  
تملو من ٨٠ الى ٢٥٠ سم . مناسخها متينة مجتمعة مبرنة  
لا قياسية التجميع . اوراقها ثلاثية او خماسية التركيب .  
وريقاتها اهلبيجية الشكل . فصلها ازغب البشرة على  
صفحتيه . ازهارها عتكرولي التجميع . ازهارها صغيرة القد  
بيضاء اللون خابطة العرف || تنوره يستمر من ايار الى  
آب .

٣٠٥٤٩ - **وَرْدَ قَيْنَانِي**  
*Rosa bracteata* (S).  
*Rosier bractéolé* (F).

نوع من الورد المجاذب الذي يتطلب مواعع معينة معرضها  
الجنوب . جنبته تقوّل من ٣ الى ٤ امتار . ساقه وفروعه  
مزغرة اللحاء ، مبرنة المناسخ المجتمعة . اوراقه تساعية  
التركيب ، زخماها مفروضة مهدية الخمار . وريقاته اهلبيجية  
الشكل ، فصلها لامع الصفحة العليا خلي السفلي الصفراء  
اللون . ازهاره كبيرة القد ، مشمشية العرف ، بيضاء  
اللون ، مطوقة بقلادة من القناب || تنوره يستمر طوال  
شهر تموز .

٣٠٥٥٠ - **وَرْدَ كَثِير الزَّهَر \***

*Rosa multiflora* (S). *Rosier multiflore* (F).  
نوع من الورد البروتي المداد . جنبته تقوّل من ٤ الى  
٦ امتار . فروعه سريعة مستطيلة . اوراقه خماسية او  
سباعية او تساعية التركيب . وريقاته اهلبيجية الشكل ؛  
فصلها مائل للصفحة العليا خلي السفلي . زخماها مهدية  
التسعين المشطلي . ازهاره هرمي المنقود . ازهاره متوسطة  
القد ، كثيرة المدد ، بيضاء اللون او وردية || تنوره  
يستمر من اوائل حزيران الى اواخر تموز .

٣٠٥٥١ - **وَرْدَ كَرْوَلِيَّشَة**

*Rosa carolina* (S).  
*Rosier de la Caroline* (F).  
نوع من الورد البروتي ، يرطب في المواقع الرطبة . جنبته  
منتصبه الساق تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه  
جزوية اللون ، ثنائية المناسخ المجتمعة . اوراقه لا قياسية  
التركيب منها الثلاثية والخماسية والسباعية والتساعية . وريقاته  
اهلبيجية الشكل ؛ فصلها منشاري الحافة خلي البشرة السفلي .  
ازهاره فردية ، وردية اللون ، كثيرة المدد ، قطرها يراوح  
من ٤ الى ٧ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥٥٢ - **وَرْدَ لَمَاع**

*Rosa nitida* (S).  
*Rosier brillant* (F).  
نوع من الورد . جنبته صغيرة القد ، ساقها تملو من  
٤٠ الى ٦٠ سم . مناسخها ثنائية ، متفرقة ، جالسة  
الانتصاب ، كثيرة الهاب . اوراقها لا قياسية التركيب ،  
وردية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات ؛ فصلها  
مائل البشرة على صفحتيه ، شديد الزهراء واللحمة ، مسن  
الحافة . ازهارها عادمة العرف ، قطرها يراوح من ٣ الى  
٦ سم . لونها الى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر  
طوال فصل الصيف .

٣٠٥٥٣ - **وَرْدَ مَعْتَلَّ الْأُورَاق**

*Rosa laevigata* (S). *Rosier trifoliolé* (F).  
نوع من الورد المجاذب الذي يتطلب مواعع خاصة معرضها  
الجنوب . جنبته مستطيلة تقوّل نحو ٤ امتار ساقها وفروعه  
كبيرة الشوك ، غليظة المناسخ المجتمعة . اوراقها ثلاثية  
التركيب ، مخززية الزنات . وريقاتها سناينة مستطيلة  
المقصنة المدية . فصلها مسن الحافة لامع البشرة السرسه  
على صفحتيه . ازهارها قليلة العرف قطرها نحو ٧ سم .



ورد كبير الزهر



ورد مسكي

des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الجثة ، طولوه نحو ٤٥ سم . رأسه وعنقه وزنكاه الى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحاه الى الرمادي الاسمر . زوره وصدره وبطنه متراكبة الا لوان فيها الرصاصي والرمادي والازرق والاحمر والاشقر . جميعها سفاه المواج || ضرابه عديدة معظمها من القواطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . اوابده قليلة اعطاهها البلاد الحارة . وهو يائث الاحراج والغابات . يعيش اسراباً كبيرة العدد . قوته الثار والحبوب والبزور . يدثن في الاشجار . يبيض ويبيض من مرة الى مرتين في السنة . ج وراثين وورشان .

Epilatre de Germanie (F). **وَرْدِيَّة** - ٣٠٥٧١  
هي السطاس الجرماني ، اطلبه .

**وَرَق** - ٣٠٥٧٢  
ورق النبات : نسر واهتر فهو وارث اي ناسر راف شيد الخصرة .

Sideroxylon (S). **وَرَق** \*  
Sideroxyle, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumelia, Legno ferro (I).

جنس نباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطليحات . انواعه زعم ٨٠ منها الاشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القد والصغيرة . اوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية التصل . ازهارها ابضية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والقصد ، بعضها مأكول او دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لشيء . اخشابها شديدة الصلابة ، تبنية اللون ، يدعونها غشب الحديد الأبيض . قشورها طيبة مضادة للحميات .

Morceler, Partager (F). **وَرَق** - ٣٠٥٧٤  
To parcel out, To divide (E). ورق الارض : قسمها .

Urvillea (S). **وَرْدِيَّة** \*  
Urvillée (F). Urvillea (E).  
جنس نباتات عارشة ، معمرة ، برية وتزدينية من فصيلة السابندبات . انواعها المعروفة ثمانية ، مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية الحارة || سوقها مزينة للسما ، فراء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكفكية المحرفة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . ازهارها عنقودي التجميع ، ابلي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الالوان ، منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر المختلف الماهات || تزويرها ربيعي او صيفي .

Papiers (F). Papers (E). **وَرَق** - ٣٠٥٧٦  
صعائف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المسواد النباتية ، اخصها الخشب ، بعد تحويلها الى عجينة يمكن مدها وتوطيدها وصقلها .

Effeuillage (F). **وَرَق** ، **مَشَق** - ٣٠٥٧٧  
Stripping of the leaves (E). ورق الشجرة : انزع ورقها .

اكبر مجموعة من الاشجار الزراعية المثمرة وما لا يستهان به من النباتات العطرية والطبية . اسباطها ما يتبع :

Pirées, Pomacées (F). **نفاحيات**  
Chrysobalanées (F). **لبيكيات**  
Potérilées (F). **بلاليات**  
Rosées (F). **جليات**  
Dryadées (F). **دندميات**  
Spirées (F). **عراويات**  
Rubées (F). **عليقيات**  
Fragarilées, Potentillées (F). **فراويات ، شيلكيات**  
Quillaées (F). **كلاجيات**  
Amygdalées, Prunées (F). **لوزيات**  
Neuradées (F). **نورديات**

**وَرْدِيَّة** - ٣٠٥٦٤  
هي العسل ، اطلبه .

**وَرَس** - ٣٠٥٦٥  
ورس النبات اخضر . وورس الصخرة في الماء : ركبها الخث .

**وَرَس** \* ، **غُمرَة** - ٣٠٥٦٦  
Memecylon tinctorium (S). Mémécyle tinctorial (F). Ceylon cornel tree (E). Safranbaum, Beerenbaum (D). Corniolo (I).  
شجيرة برية وزراعية من الورسيات وفصيلة القرانيات . اوراقها متعاقبة متقابلة . نصلها سنائي الشكل ، جامد الصفعة . ازهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيف . اوراقها غضائية مشهورة يستخرج منها صباغ احمر اللون .

**وَرَس مَلَوْتَا** - ٣٠٥٦٧  
هو القنبيل ، اطلبه .

**وَرَسِي** \* - ٣٠٥٦٨  
Pelopus (S). Pelopla (F).  
طائر من الحمام الوحشي شبيه بالترفة . موطنه يمتد من الهند الى جزر اقيانية . يعتنر من الضروب التي تجرب البلاد في طلب الرزق . ملحنه احيائي جامعي . جماعته متوسطة العدد . قوته البزور وبعض الحشرات || جسمه معتدل القد يطول نحو ٣٢ سم . ثوبه اخضر الرأس والرداء والجناح والذنب ، صنابي الصدر المؤتم بالاحمر ، اصفر البطن المشع بالوردي || يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين الى ثلاث مرات في المحل . حفصتها بيشتان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

**وَرَسِيَّات** - ٣٠٥٦٩  
Mémécylées (F).  
سبط من فصيلة القرانيات . اجناسه وانواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها سنائية متعاقبة متقابلة . ازهارها شكلوية التجميع ، محورية الارتكاز ، متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها عنبية التكوين بعضها مأكول مستحب العلم . منها انواع صناعية صبغية الالوان اشهرها الورس .

**وَرَشَان** \* - ٣٠٥٧٠  
Columba palumbus (S).  
Colombe ramier, Grand ramier, Palomba, Pigeon



ورس



ورسي



ورشان



ورق



ورقة



ورواق

Feuille crépue  
Feuille alguë  
Feuille auriculée  
Feuille curvinervée  
Feuille verticillée  
Feuille linéaire  
Feuille peltée  
Feuille peltinervée  
Feuille pétiolée  
Feuille lyrée  
Feuille mucronée  
Feuille pennée  
Feuille penninervée  
Feuille pennatifide  
Feuille pennatifidite  
Feuille pennatifidulée  
Feuille lancéolée  
Feuille sagittée  
Feuille spinuleuse  
Feuille entière  
Feuille hastée  
Feuille engainante  
Feuille roncinée  
Feuille décurrense  
Feuille palmée  
Feuille palmatinervée  
Feuille palmatifide  
Feuille palmatifidite  
Feuille palmatifidulée  
Feuille sessile  
Feuille spiralee  
Feuille connée  
Feuille alterne  
Feuille opposée  
Feuille déscussée  
Feuille boursofflée  
Feuille perforlée  
Feuille dentée  
Feuille subulée  
Feuille composée  
Feuille rectinervée  
Feuille laciniée  
Feuille pétiolée  
Feuille crénelée  
Feuille séquée  
Feuille émarginée  
Feuille tronquée

ورقة جعداء، مجمدة  
ورقة حادة، مدببة  
ورقة حاصنة  
ورقة حذاء العروق  
ورقة حلقية  
ورقة خطية  
ورقة درقية  
ورقة درقية العروق  
ورقة دوارة  
ورقة رباعية  
ورقة رهاية  
ورقة ريشية  
ورقة ريشية العروق  
ورقة ريشية مخرومة  
ورقة ريشية مشرمة  
ورقة ريشية ملفقة  
ورقة سنانية  
ورقة سهمية  
ورقة شوكية  
ورقة صحفية، كاملة  
ورقة طبرزينية  
ورقة غمدية  
ورقة فأرية  
ورقة نقفاء  
ورقة كفية  
ورقة كفية العروق  
ورقة كفية مخرومة  
ورقة كفية مشرمة  
ورقة كفية ملفقة  
ورقة لاطنة  
ورقة لولبية  
ورقة متحدة  
ورقة متعالية  
ورقة متقابلة  
ورقة متقاطعة  
ورقة متجمعة  
ورقة مثقوبة  
ورقة مخززة، مسننة  
ورقة مخززية  
ورقة مركبة  
ورقة مستقيمة العروق  
ورقة مشرشرة  
ورقة منقطة  
ورقة مفروضة  
ورقة ملفقة  
ورقة مفروقة  
ورقة مقطوعة

Billet de banque (F).

Bank-note, Bank-bill (E).

هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلتزم بها أن تدفع نقداً لحاملها لدى الإطلاع مبلغاً معيناً فيها .

Papier filtre (F).

Filter paper (E).

٣٠٥٧٩ - رَوَقُ شَائِلٍ

Chalcophaps (S).

Chalcophaps (F).

طائر من الفصائل ينتمي إلى فصيلة الحماميات . موطنه يمتد من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان . ينتقل مع فصول السنة من مكان إلى مكان . ملجئه الحياتي زويبي الأ في زمن الرحيل . يألف الإحراج والبراري . يعدو على الأرض بصفعة ويظهر بسرعة فائقة . قوته الحبوب والبرور البرية وبضغ الحشرات || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٤٢ سم . قوته متداخل الشبهة والبردة والكهبة ، جميعها سفراء المراج ، ويعملون في أواخر الظهور خطان أغبران . ذنبه معتدل الطول ، مستدير الطرف . متقاد وقائمته إصابعه إلى السمرة الزيتية || يدن عشه في الأشجار الرقيقة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام . حضنتها ببضتان فقط .

Chape (F).

Cope (E).

٣٠٥٨١ - رَوَقَة ، إَصَاد ، شَيْد

هو ما طلي به الحائط ونحوه .

Feuille (F). Leaf (E).

٣٠٥٨٢ - رَوَقَة

هي في النبات عضو التشثيل والتنفس والتشح الذي يستمد طاقته الفعالية من الضوء والهواء . تتركب الورقة من ثلاثة اجزاء : النصل والعنق والقاعدة . فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملؤها الخشب ، يتكون هيكله من ضلع وعروق وأصابع يختلف وضعها وتوازنها وشبكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع . أما العنق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين النصل والفرع والنصل . ومن الأوراق ما كانت عادمة الدبق وتعرف باللاطئة والجالسة والحاجنة الخ ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال العنق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة ثعلولية كما في الكروية أو لاحصة الساق كما في التنجيليات أو قرصية مخترزة كما في البصل . وقد تنمو من القاعدة زوائد ورقية تدعى الاذنيات || وتنقسم الأوراق إلى ابيدة أو عروية أي دائمة الخضرة وإلا عابدة أو نافضة وهي التي تسقط في الخريف . أما أشكال الأوراق وتزييفاتها فعديدة تخص منها بالذكر أشيعها وهي التالية :

Feuille aciculaire

ورقة إبرية

Feuille cunéiforme

ورقة إسفينية

Feuille oblongue

ورقة إهليلجية

Feuille pédalée

ورقة رلنية

Feuille simple

ورقة بسيطة

Feuille ovale

ورقة بيضبة

Feuille obovale

ورقة بيضبة منكسة

Feuille trifide

ورقة ثلاثية التفريم

Feuille tripartite

ورقة ثلاثية التفرم

Feuille bifide

ورقة ثنائية التفريم

Feuille bipartite

ورقة ثنائية التفرم

Sciatique, Ischiatique (F).  
Ischatic (E).

٣٠٥٩٢ - وَرَقِيٌّ

Feuille rétuse

ورقة مقنرة

Varanus (S).

٣٠٥٩٣ - وَرَقٌ \*

Feuille caulinnaire

ورقة ملتصقة

Varan, Monitor (F). Warran-lizzard, Monitor (E).  
جنس زحافات من فصيلة الورليات . أنواعه المعروفة ٢٧.  
معظمها قازب . أجسامها مستطيلة ، أعناقها وخواصرها  
دقيقة ، أذناها لا قفارية ، مستندة الطرف . قوتها الحشرات  
وكل حيوان تتمكن منه . موطنها البلاد الحارة . ج أورال  
وورلان ولاني وورلة || أشهر أنواعها ما يتبع .

Feuille amplexicaule

ورقة ملتفة

Feuille sinuée

ورقة ملتوية

Feuille spatulée

ورقة ملوئية

Feuille acuminée

ورقة مؤنفة

٣٠٥٨٣ - وَرَقَةٌ ذَائِمَةٌ، عَظْرَةٌ، أَيْدَةٌ  
persistante, F. toujours verte (F). Evergreen (E).

٣٠٥٩٤ - وَرَقُ الْبَرِّ، وَرَقُ الْأَرْضِ، وَرَقُ الْحَبَسِلِ  
Varanus griseus (S). Varan des sables (F). Desert  
warran (E).

هي الورقة التي تعمر أكثر من حول ولا تخضع لنظام  
الأعوال الموسمي .

Feuille caduque (F).

٣٠٥٨٤ - وَرَقَةٌ عَائِلَةٌ

Deciduous leaf (E).

هي الورقة الموسمية التي تخضع لنظام الأعوال .

Follaire (F).

٣٠٥٨٥ - وَرَقِيٌّ

Follar (E).

هو ما اغتصص بالأوراق .

٣٠٥٨٦ - وَرَقِيٌّ

Feuilleté (F). Leafy (E).  
نمت وتغني بطلق على الزيات التي تكون فواصلها الأخيرة  
كالأوراق المبسطة المتراصة .

Phyllobranche (F).

٣٠٥٨٧ - وَرَقِيٌّ انْفِشْشُومٌ

نمت وصغني بطلق على كل حيوان من الرغويات غياشيمه  
ورقية الشكل .

Phyllostomidae (S).

٣٠٥٨٨ - وَرَقِيَّاتٌ ٥

Phyllostomidés (F). Phyllostomidae (E).

٣٠٥٩٧ - وَرَقٌ كَبِيرٌ  
Varan sauvegarde (F). Salvator warran (E).  
نوع من الورل القازب الكبير الجثة . يطول نحو ٢٣٠ سم .  
قوته الحشرات والسلم والحويان . موطنه ضفاف نهر الهند  
ومدغشكر وأستراليا .

فصيلة من الخفاش تتميز برووسها الفمحة القصيرة ،  
برؤاها المنخرية الورقية المزركشة ، بالثعالب التي تملو  
مقاييم فراططيسها ، بانشراق شفاهها السفلى وبشفتيها الذي  
يختلف مع الاجناس || قوتها الثمار والحشرات واللحوم  
والدم . ألتانها تضع جرواً واحداً . ترضعه وتحمله حتى الفطام .  
أنواعها المعروفة عديدة تنتمي الى خمسة اجناس : العلوق  
والعلوق والمصاص والزئاف والورقية . (اطلها في مواضعها).

Varanidae (S).

٣٠٥٩٨ - وَرَقِيَّاتٌ

Varanidés (F). Varanidae (E).

الورليات والورلان ، فصيلة زحافات من رتبة العظاليات  
المشقوقات الاسن . اجناسها وأنواعها عديدة ، أشهرها  
الورل .

Phyllopodes (F).

٣٠٥٨٩ - وَرَقِيَّاتُ الْأَرْجُلِ

مجموعة حيوانات من القشريات .

٣٠٥٩٩ - وَرَمٌ، دُمْلٌ، سَلْمَةٌ  
Tumeur (F).  
Tumor, Swelling (E). نمو في النسيج يرفخها ويؤذيها .

Phyllostomus (S).

٣٠٥٩٠ - وَرَقِيَّةٌ ٥

Phyllostome, Fer de lance (F).

٣٠٦٠٠ - وَرَمٌ الْخِصِيَّةُ الدَّمَوِيَّةُ  
Hématocèle (F).  
Haematocèle (E).

جنس خفاش من فصيلة الورقيات . أنواعه ثلاثة فأورها  
طفيفة . ألتانها من الربادي الى الكسفي . ظهورها أعيق  
من بطونها . أجسامها صغيرة القد ، طولها بأرواح من ١٠ الى  
١٢ سم . أذناها صغيرة وديقة . زوائدها المنخرية سنانية  
الشكل ، كبيرة القد . شفاهها السفلى وأضحة النقرة الفائرة  
التعليلية الختار || موطنها امريكا الجنوبية اغصها  
البرازيل . تعيش منفردة ، ذكورها تقرب ألتانها عند  
الكرم فقط . تألف الاثمار الغضة في الإخراج الكثيفة .  
مسرهما في الليل . قوتها الحشرات والثمار وتستنزف الدم  
عند الصدقة والجوع .

٣٠٦٠١ - وَرَمٌ دَمَوِيٌّ  
Hématome (F).  
Hematoma (E).

يحصل في الخيل من لبطة او وقعة وما اشبه .

٣٠٦٠٢ - وَرَمٌ شَحْمِيٌّ  
Lipome (F). Lipoma (E).  
يحصل في اجزاء جسم الحيوان الممرضة للضغط كالصهوة  
والكتف والعنق ..

٣٠٦٠٣ - وَرَمٌ لَيْثِيٌّ، فَيْرُومٌ  
Fibrome (F).  
Fibroma (E).

Hanche, Culotte (F).

٣٠٥٩١ - وَرَلٌ

Hip, Hook (E).

جزء من الجسم مركزة في الزاوية الخارجية من عظم الحرقفة  
وهو موجود بين الحاصرة والكفعل .



ورَقِيٌّ



ورل





وَرَكَة



وَرَكَة قَطِيْبِيَّة



وَرَّكَة مَرْخَرَقَة

وتعود في اواسط الربيع الى موطنها الشمالية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

Anser erythoropus	وَرَكَة الشَّرْقِيَّة
Anser neglectus	وَرَكَة الشَّيْثَالِيَّة
Anser jubalis	وَرَكَة الصَّيْنِيَّة
Anser gambeli	وَرَكَة اَمْرِيْكِيَّة
Anser montanus	وَرَكَة جَنْبِلِيَّة
	وَرَكَة رِبْدَاء، وَرَكَة رِبْدَاء، وَرَكَة شَالَمَة
Anser anser, Anser sinereus	هو النوع الذي تَحَدَّرَتْ مِنْهُ السَّلَالَاتُ الدَّاجِنَة المَرْقُوقَة .
Anser rubrirostris	وَرَكَة سَبْرِيَّة
Anser albifrons	وَرَكَة غَرَاء
Anser canadensis	وَرَكَة كَنْدِيَّة

### ٣٠٦١٧ - وَرَّ قَطِيْبِي \* ، وَرَّ بَحْرِي

Bernicla (S). Bernacle, Barnache, Bernache, Oie marine (F). Barnacle-goose (E).

جنس طير مائية من فصيلة الوزيات . انواعه المَرْقُوقَة خمسة ، ثلاثة منها تعيش في المناطق الباردة اواردها تمد من ٢٠٠ الى ٣٠٠ واثنان يعيشان في المناطق المعتدلة والحرارة وريدها يمد من ٥٠ الى ١٠٠ || جميعها من القواطع تجوب البحار وترتج من شط الى شط في طلب المصيف والمخفق || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :

Bernacle à collier (F). الوز المَطُوق  
Bernacle armée (Oie d'Egypte) (F). الوز المصري

### ٣٠٦١٨ - وَرَّاقَة سَوْدَاء ° ، Penthimia nigra (S). Penthimie noire (F).

حشرة من فصيلة الوزيدات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل يطول نحو ٦ مم . || ثوبها الى السواد الفحشي ، يطولها في كوسها نقطتان ارجوانيتان . بطنها الى السمره السوداء || راسها مستعرض . عينها كبيرتان . زبابها نحيلان ، قصيران . كوسها مستطيل الشكل . حقيقتها محرمجة . طهارتها كامل الحنجية ، لاصف ، غدد السطح . رشناها غشائيان ، شفافان . قوائمها نشطة ككيفية الهلب الثالث || تألف ضفاف مجاري الماء حيث يكثر الدلب . قوتها التبغ تنحصر من الارواق .

### ٣٠٦١٩ - وَرَّاقَة ° ، Acidalia (S). Acidalie (F). Acidalia (E).

جنس فراشات صغيرة الحجم من فصيلة الايديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المَرْقُوقَة اربعة جميعها من حشرات البلاد المعتدلة الحارة . تألف الغابات الاحراج . مسرهما دجوي || اجبالها الحولية واحدة . تظهر القفرشات في حزيران ويموز ويثبي نحو حشة اسابيع . تمتع الكمن على الصفحات السفلى من نصال الارواق فينفض عن يرقات صغيرة تعيش على المواد النباتية || اشهر انواعها الوَرَّاقَة المَرْخَرَقَة .

### ٣٠٦٢٠ - وَرَّاقَة مَرْخَرَقَة °

Acidalia ornata (S). Acidalie ornée (F). نوع من الوَرَّاقَة . وراشها الى البياض الاخر تعلو رقعة خفيفة سمراء وزراكن قاطبة لونها الى الحمرة

### ٣٠٦٠٤ - وَرَّكَة هو الشفنين المَرْقُوق ، اطليه .

٣٠٦٠٥ - وَرَّهَاء ، وَرَّهَة نعت تعريفي يطلق على السحابة الكثيرة المطر . صاحب وره .

٣٠٦٠٦ - وَرَّوَار ، وَرَّوَر Guépier (F). Bee-eater (E). وَرَّوَر هو الخضار ، جنس طير تميز بجبال اوتهاها المَرَاقِيَّة الالوان . انواعه عديدة اعرفها القُرْبَرِي والمُذِل .

٣٠٦٠٧ - وَرَّوَار ، خُفَّيْرَاء ، خُفَّار Mérope (F). Merope (E). الوروار او الخفيرا او الخفار ، اكبر نجم من النجوم السبعة التي تؤلف مجموعة الثريا .

٣٠٦٠٨ - وَرَّيْنَحَة ° Phytotome (F). كل منطقة شديدة الرطوبة في الغابات الاستوائية تدعى وريضة .

### ٣٠٦٠٩ - وَرَّيْد Veine, Vaisseau sanguin (F). Vein, Blood-vessel (E).

الاوردة جمع وريدي هي الاوعية الدموية التي تعيد الدم من انسجة الجسم الى القلب . تبدأ اوردة شعيرية ثم تتحد فتكون اوردة كبيرة . وهي اكثر عدداً من الشرايين واكثر منها حجماً واقع جداراً الا انها عادمة المرونة وقد تتقلص في حالة غلغها من الدم . وهي مجهزة بصمامات باطنية تمنع رجوع الدم الى الشرايين || تقسم الاوردة الى رتوية وجسمية . فالاوردة الرتوية وعددها اربعة ، اثنان لكل رة ، تنقل الدم الاخر التي المشح بالاكسجين الى الاذين الايسر . أما الاوردة الجسمية وهي التي تنقل الدم الفاسد من جميع اجزاء الجسم باستثناء الرتيتين فصب في الاذين الايمن || وقد تقسم الاوردة ايضاً الى سطحية تقع تحت الجلد وغائرة تراقق الشرايين .

٣٠٦١٠ - وَرَّيْد وِدَاجِي Jugulaire (F). Jugular vein (E).

٣٠٦١١ - وَرَّيْف Feuillu (F). Broadleaved tree (E). نعت تعريفي يطلق على الاشجار الكثيفة الاوراق ، الكبيرة ، النصال ، العابلة ، من ذوات الفلقتين . م . وريفة .

٣٠٦١٢ - وَرَّيْق Frondiforme (F). Frondiform (E). ما كان شكله وشيابه كالورقة .

٣٠٦١٣ - وَرَّيْق Feuillu (F). Follous (E). كثير الوراق .

٣٠٦١٤ - وَرَّيْق جَسَبِي Dryade (F). هو الدبسي ، نبات عشبي مداد ، اطليه .

٣٠٦١٥ - وَرَّيْقَة Foliole (F). Foliole, Leaflet (E). واحدة من الورديات التي تتألف منها الورقة المركبة .

٣٠٦١٦ - وَرَّ \* ، لَوَّر Anser (S). Oie (F). Goose (E).

جنس طير من فصيلة الوزيات ورتبة كفيات القدم صفحيات المنائر . انواعه ١٢ جميعها برية باستثناء نوع واحد تَحَدَّرَتْ مِنْهُ السَّلَالَاتُ الدَّاجِنَة المَرْقُوقَة . وهي من القواطع التي تقضي فصل الشتاء في الاسقام المعتدلة

Throschnus (S).

\* ٣٠٦٢٧ - وَزَّان \* ٥

Throschine (F). Throschnus (E).

جنس حشرات من فصيلة الوزانيات ورتبة غمديات الاجنحة اذواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيأة ، تطول من ٨ الى ١٤ سم. رؤوسها صغيرة ، قليلة التشوش ، تبدو كأنها مندرجة بالكوسل. عيونها صغيرة ، بارزة. تأشيرها وبلاصها نظامية. قرونها الاستشعارية غيبطة. كواسلها شبه مقببة الشكل. اغداها لاسقة ، ضيقة المؤخر. قوائمها نشطة. اثنواها ملونة || تألف الغابات والحراج. الحشرة الجماللة واشعة وغاخلة. البرقة دامتة تعيش في الجفوع النخرة وفي الجلالة والجويل.

Throschidae (S).

\* ٣٠٦٢٨ - وَزَّانِيَّات \* ٥

Throschidés (F). Throschidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار بلاد العالم || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٣ الى ١٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها بارزة. تأشيرها وبلاصها نظامية. قرونها الاستشعارية غيبطة ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها ضيقة المقدم ، مستعرضة المؤخر. اغداها لاسقة. قوائمها نشطة. ارساغها خاسية العقل. اثنواها ملونة || تألف الغابات والحراج. تعيش على الجفوع والافصان النخرة || اشهر اجناسها الزوان والدريس.

\* ٣٠٦٢٩ - وَزَغَة ، سَامْ ، اَبْرُص ، اَبُرْ بَرُص ،

Gecko (S). Gecko,

ثُعْبِيَّة ، مَدَاد

Gecko (F). Gecko, Tokal (E). Margouillat, Tarente, Tokal (F). جنس غطاء من فصيلة الوزغيات. اذواعه ثلاثة تتميز بصغر اجسامها. رؤوسها اسطوانية الشكل، جلودها حرة اثنواها مرقوفة. جميعها من الزغافات النافذة التي تلثم الحشرات والحوام. ج وزغ ولوزاغ ووزغان || أما انواعها الثلاثة فهي التالية:

Gecko gymnodactylus (S).

وزغة عريانة الاصبع

Gecko platydactylus (S).

وزغة عريضة الاصبع

Gecko hemidactylus (S).

وزغة نصفية الاصبع

\* ٣٠٦٣٠ - وَزَغَة مُهْدَبَة \*

Uroplatus fimbriatus (S).

Gecko framé, Gecko à queue plate (F).

Fringed Gecko (E).

حيوان بيوض من الغطاء وفصيلة الوزغيات قابلات الاثنان. مالمات الالسنه ، رباعيات القوائم ، خماسيات الاصابع || جسمها مستطيل الشكل ، مبطط الجرم يطول من ١٧ الى ٢٠ سم. رأسها مخروطي الشوزن. عيناها جانبيتا الارتكاز ، تلحفها اجفان شفافة ثابتة. اذناها رافعتا الفشاء الصيواني المكفوف. لسانها قصير مفلوق. ظهرها متتابع التعاليل. يبطها كثير الحراشف. ذنبها مبطل كالحذاف. جسمها وقوائمها مهذبة الاطراف التي تلبس الاشياء. اصابعها نصفية الخطاب مزهجة بلواقظ ناشطة تمكئها من السير على السطوح المماسه لظهرها باتجاه الارض. ثوبها الى الصبغة الخنطية تنشأها رشفة وريدية مختلفة الزراكش. وثوبها يتميز بالشوذة اي انه يمتان المحيط الذي يوجد فيه. يبياتها الشوري يستمر نحو اربعة اشهر || الانثى اصفر قدماً من الذكر ولا تبيض اكثر من مرتين

القرميديا || تظهر الفراشة في اوائل حزيران وتبقى حتى اواسط او اواخر تموز .

\* ٣٠٦٢١ - وَزَّال ، جَسَدَح ، جَوَلَق

Ulex (S). Ajonc (F). Furze, Gorse, Thorn-broom (E). Stechginster (D). Ulecece (I).

جنس نباتات جنينية برية معمرة من فصيلة القرنيديات الفرائشية. مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الصوانية وبين الصخور. سوقها كثيرة الفروع المنشعبة الشاذلة الاطراف. اوراقها سائنية خيطية لا يوجد لها على الفروع القديمة. ازهارها مغرية تجرسها النحل وهي فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون. ثمارها سنغية صغيرة القند. يزورها صلبة مبططة || اعرف انواعها واشهرها الوزال الكبير والمثدثون.

\* ٣٠٦٢٢ - وَزَّال الشرق \* ، بَدَسَكَنان ، سِت

Spartium junceum (S).

خَدَّيْجَة

Genêt jonciforme, G. d'Espagne, Spartier genêt (F). Rush broom, Spanish broom (E). Binsenfriem (D). Sparzio ginestra, Ginestra di Spagna (I). جنبة برية وزبينية من فصيلة القرنيديات الفرائشية. مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في المناطق المتوسطية الارتفاع وترغب في الآتربة الكلسية. ساقها فرواء غنية تملو من مترين الى خمسة امتار. اوراقها بسيطة مستنقة. ازهارها عنقودية التجميع ، طرفي الارتكاز. ازهارها كبيرة القند ، فواحة العروق المستعجب ، جملة الصفار الزاهي || تنورها يستمر من ايار الى ايلول.

\* ٣٠٦٢٣ - وَزَّال الشَّيْخ \*

Sarothamnus (S).

Sarothamne, Genêt à balais (F).

جنس نباتات سبروتية معمرة برية وزبينية من فصيلة القرنيديات الفرائشية. ترغب في الآتربة الرملية. اذواعه قليلة القند جميعها جنات صغرة القند تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. سوقها فرواء ، فروعها دقيقة منتصبه قليلة الورق. اوراقها صغرة الحنج ، بسيطة او مركبة ، ثلاثية الوردقات. ازهارها فردية التجميع ، كبيرة النورة ، مستحبة العروق العطري، صفراء اللون او بيضاء او ارجوانية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

\* ٣٠٦٢٤ - وَزَّال كَبِير \*

Ulex europaeus (S).

Grand ajonc, Thule, Lande (F).

نوع من الوزال المبلذل. جنيته تملو من مترين الى اربعة امتار. فروعها كثيفة التجميع. اشواكها مستطيلة قوية حادة. اوراقها غطية مبرمة على النواحي اللتية. ازهاره عطرية ، مغرية ، كبيرة القند. سفناتها تطول نحو ٣ سم. تنورها يستمر من شباط الى حزيران.

\* ٣٠٦٢٥ - وَزَّال مَدَّوْن \*

Ulex nanus (S).

Ajonc nain, Landier, Launet (F). Dwarf-furze, Whin (E). Echter Heckensame (D). Ginestrone (I). نوع من الوزال المبلذل. جنيته تملو نحو ٧٠ سم. فروعها لبدة ، اشواكها مستنقة. اوراقها صغيرة مبرمة على النواحي اللتية الحولية. ازهاره مغرية صغيرة القند. تنورها يستمر من تموز الى كانون الاول.

\* ٣٠٦٢٦ - وَزَّامَة

Gynérion (F).

نبات عشبي معمر يدعى جينريوم ، اطليه .



وزال الشرق



وزال الشيخ



وزال كبير



وزال مثدثون



وزان



وزغة مهذبة

٣٠٦٣٨ - وَزْن Beta du Centaure (F).  
الوزن نجم من كوكبة قنطورس. تقول العرب حصار  
والوزن علفيتان ذلك لانها يطلان قبل سهيل فيحلف انها  
سهيل لشبهه. راجع بيتا قنطورس.

٣٠٦٣٩ - وَزْن اَتْمِيْهِ Poids atomique (F).  
Atomic weight (E).

٣٠٦٤٠ - وَزْن جَزِيْمِيْ، وَزْن ذَرِّيْ Poids moléculaire (F). Molecular weight (E).

٣٠٦٤١ - وَزْنَة Pesée (F). Weighing (E).

٣٠٦٤٢ - وَزِّيَّات Anseridae (S).

أنسريدات (F). Anseridae (E).

فصيلة الوز، من صفيحيات المناشير وزيرة كليات القدم.

٣٠٦٤٣ - وَزِيد \* Cicadella viridis (S).

Cicadelle verte (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات، طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم.  
جسمها اخضرىليلى الشكل. زناياتها خيطية. قوتها الى  
الخضار الاصفر الخنطي المالح. مدنها اصفر عايق.  
تكثر في الاماكن الرطبة. مرتعها يشمل جميع النباتات.  
تظهر في اوائل حوز وتخفي في اواسط تشرين الاول.

٣٠٦٤٤ - وَزِيد مُزَيِّن Cicadella ornata (S).

Cicadelle ornée (F).

حشرة من فصيلة الوزيديات. جسمها صغير القد يطول  
من ٧ إلى ٩ سم. قوتها الى الخضار الاصفر تعادو  
زخرفة سوداء وتيجيق وتيجيق. رأسها كبير، مجرم.  
عظمها معتدل الطول. عيناها كبيرتان. زناياتها صغيران،  
خيطيان. كوسلها اخضر اللون، اسود الزخرفة. حجبها  
صغيرة، مجرمة. لظهرها كامل الخشبية، لاحت.  
رؤسها غشائيان، شفافان. قوائمها متكاثفة الملب،  
ملقعة الافخاذ || تألف كل موقع تكثر فيه الاعشاب.  
قوتها النتح.

٣٠٦٤٥ - وَزِيدِيَّات Cicadellidae, Jassidae (S).

Cicadellidés, Jassidés (F). Cicadellidae, Jassidae,  
Leafhoppers (E). Kleinzirpeen, Zwergzikaden,  
Kleinzikaden (D).

فصيلة حشرات من تصنيفات الاجنحة الخفيفة. اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد. اعطائها العالم. تألف الادغال  
والمراعي. جميعها صغيرة القد. تتميز بظنايبها الشائكة  
الرباعية الاكظار. زناها عند وجودها لا تقياس الارتكاز.  
اشهر اجناسها الوزيد.

٣٠٦٤٦ - وَزَيْرَة \*، وَزَيْرُو Zizyphus joazeiro (S). Joazeiro (F).

نوع من العناب الامريكى، وهي شجرة مشرة من فصيلة  
التينقيات. مهددا البرازيل. ساقها عجرة سلفة القشور.  
اغصانها وانفادها شائكة. اوراقها متعاقبة بيضيه، نصالما  
جامدة الصفحة عايقه الخضار. ثمارها كروية الشكل،  
صغيرة القد، قفطها نحو ٣ سم. قشورها حلاوة اللون  
تصفر عند الادراك. سوقتها يقب الماددة التينقية الحامضة.  
لباب حجابها غروي الماددة الشفافة المأكولة || وهي شجرة  
غدة متعاقبة الحبل، لا تخشى الحر، تعيش وتثمر في  
الاقليم الشحيحة الامطار.

في الحول وتضع في كل مرة من بيضتين الى اربع بيضات  
تطعمها في التربة على عمق ٥ او ٦ سم. || تألف المساكن  
الاكلة والخرائب والحيطان القديمة. وتتسلق الانجار.  
تسرح في النهار ولكنها تجتنب النور. قوتها الحشرات  
والنايكب والذباب والبعوض وصغار العقارب ... || تعتبر  
من الزحافات المخلية النافعة.

٣٠٦٤١ - وَزَّيْعَات Geckonidae (S).

Ascalabotes, Geckonidés (F). Geckonidae (E).

فصيلة حيوانات زسافة من رتبة العقائيات الحميميات  
الاسنة. اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة، قوتها  
الحوام والحشرات المفذية.

٣٠٦٤٢ - وَزِّيْن، وَزِّيْن Vaseline (F).

Vaselin (E).

دهن معادني يستخرج من النفط ويستعمل في عدة صناعات  
وبرقيات.

٣٠٦٤٣ - وَزْم Urophycitis (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصعقريات. انواعه  
المعروفة قليلة العدد، تكاثرها لا شيء. تتميز بجفافها البوذية  
المستديرة. بعضها يضيى الشكل يعمل هدية خيطية دقيقة  
مستطيلة || يتطفل على عدة نباتات زراعية اغصانها النفل  
والجزر والشوئدر والفسفة.

٣٠٦٤٤ - وَزْمَة الزَّيْتُون \* Parlatoria oleae (S).

Parlatoria globuleuse (F).

حشرة من القرميزات تطول نحو ٢ مم. ذكورها مستطيلة  
الشكل طرفية السرة. اناثها بيضيه مخدبة الظهر منبسطة  
المدب جانبية السرة السمر. اما ثوب الحشرة تحت مقفراها  
فهي بنفسجي اللون، احمر المالح، مذعب القصيص.  
تركب الزيتون ومظم الانجار المشمرة اغصانها  
الفصيلة الوردية.

٣٠٦٤٥ - وَزْمَة التَّيْمُون \* Parlatoria pergandei (S). Parlatoria des citrus (F).

حشرة من القرميزات تركب الليمون والحوخ والمشمش  
وبعض النباتات الزيبية كالغار والمضاص والقوسون...  
فنتشي الجنوح والاغصان والاوراق وتبدو كأنها جزء من  
النماء او البشرة اطحل اللون اغبر المالح. اجسامها  
بيضية مخدبة الظهر. اناثها تطول من ١,٢ إلى ١,٦ مم.  
وتعرض من ٧ إلى ١ مم. ذكورها دقيقة الاجسام طولها  
يراوح من ٧ إلى ٨,٥ مم. وعرضها نحو ٠,٣ مم. اثواب  
اناثها الى الصفيرة التبنية. اثواب ذكورها رباعية اللون  
بنفسجية المالح. اجسامها الحولية ثلاثة. مكنها اسطواني  
الشكل، ذري الحجم اغبر اللون.

٣٠٦٤٦ - وَزْمَة النخيل Phoenicococcus marlati (S).

حشرة من القرميزات صغيرة القد جزوية اللون مستديرة  
الشكل قفطها نحو ١ مم. زفيها الشمعي الماددة ينشأ بهاالة  
بيضاه. تركب قواعد جزائل النخيل ملتحفة باليات الجذع  
هريا من النور الذي يضيها. اغصانها زعيدة لا تستوجب  
المكافحة.

٣٠٦٤٧ - وَزْمَة النخيل الجِرَادِيَّة \*، حَشْرَة

النخيل القشريَّة Phoenicococcus marlati (S).

حشرة من القرميزات صغيرة القد جزوية اللون مستديرة  
الشكل قفطها نحو ١ مم. زفيها الشمعي الماددة ينشأ بهاالة  
بيضاه. تركب قواعد جزائل النخيل ملتحفة باليات الجذع  
هريا من النور الذي يضيها. اغصانها زعيدة لا تستوجب  
المكافحة.



وزمة الزيتون



وزمة الليمون



وزمة النخيل



وزمة النخيل



وزيد



وزيرة

Wistaria (F). ٣٠٦٥٦ - **وِسْتَارِيَه**  
هي البلبعة ، نبات عارض تزيتي ، اطلبها .

Oulstiti (F). ٣٠٦٥٧ - **وُسْتِي**  
هو الهبال ، من القردة الدبية ، اطلبه .

Billonner (F). To ridge (E). ٣٠٦٥٨ - **وَسَد**  
وسد التربة توسيداً : اقام فيها الاتلام .

Médius (F). Middle finger (E). ٣٠٦٥٩ - **وُسْطَى**  
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصير .

Décortiquer (F). ٣٠٦٦٠ - **وَسَف**  
To decorticate (E).  
قشر . الثمار الموصفة هي الثمار المقشرة وقد يكثر استعمال التوسيف في اللوز والصنوبر والجوز .

Pelure (F). ٣٠٦٦١ - **وَسَف**  
Peel, Skin, Paring (E).  
الوَسَف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجز والوز والبطاطا والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاح والاجاص والخوخ الخ ، فتدعى حشاة . اطلبها .

Whisky (F). Whisky (E). ٣٠٦٦٢ - **وِسْكِي**  
مشروب كحولي مسكر يصنع من متشث الشعير والخرفال والشميل . تكثر صناعته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

Ferrade (F). Branding (E). ٣٠٦٦٣ - **وَسَم**  
كَي الحيوان بعلامة فارقة ، منماً لمرقة .

Etiqueter (F). ٣٠٦٦٤ - **وَسَم**  
To ticket, To label (E).  
وسم النبات : وضع له سمة من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

Isatis (S). Pastel (F). ٣٠٦٦٥ - **وَسَمَة ، وَسِمَة ، عَظْلِيم**  
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والعتلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . رُغِب في الاراضي الجصية . اشهرها وسمة الصباغين .

Isatis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F). Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färber wald, Wilder Indigo (D). Pastello, Glastro, Guado (I). ٣٠٦٦٦ - **وَسَمَة الصَّبَاغِين \* ، وَرْد النيل**  
نوع من الوسمة ، يملو نحو المتر ، يزرع لاستخراج مواد الصبغة الموصوفة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهليلجية والعلوية سهمية . نصلها جامد الصفحة عاكس الخضار || ينبت في اوائل الربيع . تنتزع اوراقه تباعاً ، عند ازدياد نصالها ، وتجفف في الظل ثم تسحق وتخسر .

Mycelia sterilia (S). ٣٠٦٦٧ - **وَسَيَات ، فُسْتِيَات عَاقِرَة**  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويعيات . انواعها عديدة تجمعها خمسة اجناس : الازوتوم ، الرودودوم ، الريزوكتونيه ، السليروسوم والمونيليوبسيس || معظمها

Gynécée (F). Gynaecium (E). ٣٠٦٦٧ - **وَرِيم**  
جاء اخية الزهرة ، يشمل المبيض والسمة والقلم . راجع منقصة .

Botte (F). Bundle, Truss (E). ٣٠٦٦٨ - **وَرِيمَة**  
ما حزم من البقول والئن على اختلافها .

٣٠٦٦٩ - **وَرِين**  
حب الحنظل المطحون .

Wasabi (F). ٣٠٦٥٠ - **وَسَابِي**  
نبات بقل مشهور باسم يريوه ، اطلبها .

Pelor (S). Pélor (F). ٣٠٦٥١ - **وَسَاجَة \***  
سمكة من الجلاخ الشاذكات الزعانف . اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي زعنفة مستديرة مجذعة بالاسم الجؤوي . زعانفها كبيرة ملونة وسنن كاللشار . الظهري منها تمتد من الرأس الى الذنب . راسها مخروطي الكسم تملوه التزاويق النافرة المستعربة . عينها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السمرة الطحلاء تعرضه بعض الخطوط الجؤوية وهو يقيق مع اقربائه من الظهر ويبيض عند البطل .

Empodium ٣٠٦٥٢ - **وَسَادَة**

Stenops gracilis (S). ٣٠٦٥٣ - **وَسَان \***  
Loris grêle (F). Slender loris (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الليموريات موطنه سرنيديب والهند . يألف الاحراج والغابات ويتسلق الاشجار بشفة . ملجنه الحياتي جماعي . جماعاته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . سرسحة دجوي يستمر من النعشة الى الفجر المبقي . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثار السكرية والعسل والصافير الصغيرة ويبيضه وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصيف صغير يطول نحو ٢٢ سم . يتميز باستدارة الرأس وبصر الانف ويخلو مؤخره من الذنب . عيناه كبيرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء النامدة الوبر . شعره ناعم ، لبد التجميع ، حريري الملمس . ثوبه الى الصخرة الشهباء يملوها مواج ادعش في الظهر وقفي في سائر اقسام الجسم . حينها مطوختان بالاسود . قصبة انفه ومقدم خطمه الى البياض الاغبر . نحرة واطراف قوائمها الى الربعة القلواء || الالثنى ثنائية الشدي ، رباعية الحملات الصغيرة الدقيقة . محبها يستمر نحو سبعة اشهر تقص في تمامه من جروين الى اربعة جراء .

Flaveria (S). Flavérie (F). ٣٠٦٥٤ - **وَسَب**  
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها اعشاب حولية . سوقها سرسحة اوراقها مفترقة متعاقبة مائسة البشرة . ازهارها رؤيسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الحنث .

Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F). Peruvian dyers weed (E). Flavérie (D). Flaveria (I). ٣٠٦٥٥ - **وَسَب الحَنَث \***  
نوع من الوسب وهو عشبة برية طيبة يقال انها تستعمل كسداة لسم الااعي . ساقها منصبة فراء . اوراقها مفترقة ، غطية التشرثم ، بحرية اللون . رؤيساتها الزهرية كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل بيضاء اللون .



وساجة



وسان



وسب الحنث



وسمة الصباغين



وسيم



وسيم



وشاعة



وشاعة



وشاعة

قصيرة ، ثلاثية الفصل . كوالها شبه اسطوانية . بطونها غروطية ، تنتهي بمرزات ذرية . كوالها وبطونها مبعثرة الحلب الاسمر . رواشها باعثة الخفاب ، مجذعة الاسمر || الحشرة الجملانة واثمة اما البرقة فذاتة او ثالثة || خاضلة || اشهر اجناسها الوسيمية .

من الفطور الرمية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحللة وبضعها طليل يعيش على النباتات المائلة فيعطب النج ويقرصها دون ان يقع بها شديد الاذى .

٣٠٦٦٨ - وسيم *Catalyseur (F). Catalyser (E).*  
هو المسحاح ، جسم يحدث التحليل بالحماسة .

٣٠٦٦٩ - وسيم *Remisier (F). Half-commission man (E).*  
هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين العميل والسمسار او بين البائع والمشتري .

٣٠٦٧٠ - وسيمطة ، مسخكة *Milieu de culture (F). Medium culture (E).*  
الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠٦٧١ - وسيمكة *Moyen (F). Plea (E).*  
هي السبب او الوجه القانوني او الفعلي تبنى عليه الدعوى ويدلل عليه امام المحكمة .

٣٠٦٧٢ - وسيم *Callista (S). Calliste (F). Calliste (E).*

جنس طير من فصيلة الترنيرات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ . جميعها من طيور امريكة الوسطى والجنوبية . تألفت الغابات والحراج التي يكثر فيها الدغل . نظامها الحياتي جاني . اسرارها متفاوتة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة اللد ، وشيقة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيدها غروطية الشكل تنتهي بمقاطع صغيرة ذرية . اجنتها معتدلة الحجم ، اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الاطراف . اسرارها رفيعة دقيقة . اصابعها معتدلة الحجم . اثوابها جميلة الالوان الساطعة فيها الازرق والاخضر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البذور وبعض الثمار العنينة || تدفن اعشاشها في الادغال على ارتفاع بعض الاندما عن سطح التربة . اناتها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوب الاكور نحو ١٤ يوماً .

٣٠٦٧٥ - وسيمكة *Anisophylla (S). Anisophyllée (F).*

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض الاصقاع الاستوائية الاسيوية والاريفية || اشجارها كبيرة ، رفيعة ، متباعدة الفروع . اورقها منعقة ، متعاقبة ، سنانية الاتصال . ازهارها ابيض الازركار ، سبلي التجميع . ازهارها صغيرة يبيضه اللون او صفراء . ثمارها عنينة ، بزورها عادمة الآح || اخشابها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠٦٧٦ - وشاعة *Radiolites (S). Radiolite (F). Radiolites (E).*

جنس حيوانات بحرية من الغرويات صفيحات الحياشيم وفصيلة الرشاعات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصداها شبه خدرورية الشكل ، لامتساوية المصارع ، العلوي منها صغير اللد ، جلوني الشكل ، مسقط الصفحة المخذدة ، اما السفلي فغروطي موشع .

٣٠٦٧٧ - وشاعات *Radiolitidae (S). Radiolitidae (F). Radiolitidae (E).*

فصيلة حيوانات بحرية من الغرويات صفيحات الحياشيم ، عادات الروس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين مصرعها اصداها اذ ان المصراع الايسر سقاطي الشكل في حين ان الايمن شبه غروطي || اعرف اجناسها واشهرها الوشاعة .

٣٠٦٧٨ - وشاعة *Asticot (F). Maggot (E).*

هي دعوسة ذبابة اللحم . تركيب النج الحية فتؤذيها لانها مقنونة لاحة .

٣٠٦٧٩ - وشاعة *Exostemma (S). Exostème (F).*

جنس اشجار وجنبات برية ، طيبة ، من فصيلة القويبات . انواعها المعروفة ١٢ مهدها البلاد الاستوائية || اورقها متقابلة ، منعقة . نصلها يبيض في الشون او اهليلجية او سنانية . ازهارها طرفي او محوري الارتكار ، عتيق التجميع . ازهارها انبوية التوجع ، يبيضه اللون او وردية . ثمارها حقية ، ثنائية الخدر . تحوي العديد من البذور الصغيرة المغلطة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠٦٨٠ - وشاعة كبيرة الزهر *Exostemma grandiflora (S). Exostème à grandes fleurs (F).*

نوع من الوشاعة . منبتها فزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المذاق دافعة للحس وموسلة للحملة .

٣٠٦٧٣ - وسيمكة *Palloptera (S). Palloptère (F). Palloptera (E).*

جنس حشرات من فصيلة الوسيميات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطاها بعض مناطق البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، هيفاء ، شهباء اللون او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل الدقيقة . اخطامها معتدلة الطول . ملاسها صغيرة . كوالها شبه اسطوانية . بطونها غروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكوالها وبطونها وانحادها مبعثرة الحلب الدقيق . رواشها باعثة الخفاب مجذعة بالاسمر الجفوي || جميعها واثمة تألفت كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاضلة او دامتة .

٣٠٦٧٤ - وسيميات *Pallopteridae (S). Pallopteridés (F). Palloptères (E).*

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألفت المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة ، عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

## ٣٠٦٨٧ - وَشَعَّةٌ ضَيْقَةُ الْوَرَقِ

*Centranthus angustifolius* (S). *Centranthe à feuilles étroites* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. وعرضها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها شريك الصفحة بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع. أزهارها وريدية زائفة، متوسطة الدائرة || تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

## ٣٠٦٨٨ - وَشَعَّةٌ غَلِيظَةُ السُّوقِ

*Centranthus macrosiphon* (S). *Centranthe à grosses tiges*, *Valériane à grosses tiges* (F).

عشبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لاطئة، نصلها بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع، فارش القمة. أزهارها وريدية اللون أو بيضاء أو موحدة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من حزيران إلى آب.

## ٣٠٦٨٩ - وَشَعَّةٌ نَحِيلَةٌ

*Centranthus calcitrapa* (S). *Centranthe chaussetrap* (F).

عشبة سبروتية حولية نحيلة الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخرمة. أزهارها عتقوي التجميع، هامي الاكناز. أزهارها وريدية اللون قصيرة الدائرة. تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

## ٣٠٦٩٠ - وَشَعِيٌّ

*Fusiforme* (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يدل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرفا.

## ٣٠٦٩١ - وَشَقِيٌّ

*Lynx* (F). *Lynx* (E). الشوق كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الأكبر والعناز || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المرتبة الرابعة مركزه في اواسط الذنب.

## ٣٠٦٩٢ - وَشَقِيٌّ

*Lynx* جنس حيوانات مفترمة من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس. انواعها عديدة بعضها اصفر قدماً من الفهد، بجلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الذنب مخروطية الاذن، يملو طرف اذناها جم من الزبر الاسود. قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطيور || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

## ٣٠٦٩٣ - وَشَقِيٌّ أَخْمَرُ

*Lynx rufus* (S). *Lynx rouge* (F). *Red lynx* (E). نوع من الشوق الامريكي. جسمه متوسط القد يملو نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امغر اللون احمر يعلو توشم امسح وتوشيع اسمر.

## ٣٠٦٩٤ - وَشَقِيٌّ أُرُوِيٌّ \*، وَشَقِيٌّ مَبْدُولٌ

*Lynx vulgaris* (S). *Lynx vulgaire*, *L. d'Europe* (F). *Common Lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الشوق، كثير القنص، شديد الاذى موطنه اوروبا. وهو كبير الجثة يملو نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فنحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوته الطير وصغير الحيوان.

## ٣٠٦٩١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

*Exostemma floribonda* (S).

*Exostème floribonde* (F).

نوع من الوشاكَّة. منبتها الانتليل. ساقها ترتفع نحو خمسة امتار. خواصها الطبية كخواص الوشاكَّة الكبيرة الزهر.

## ٣٠٦٩٢ - وَشَاكَّةٌ \*

*Cynogale* (S). *Cynogale* (F). حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزباديات. موطنه

جزر الزابج. ياتلف البحيرات وبحار الماء. ملجئه الحيائي فري لا يجتمع الذكر والانثى الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يملو نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. رأسه شبه مخروطي الشكل، مبسط الجرم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بغلق ينطلق عند الحاجة. سباله كثيف الملب الطويل الاشر. قوائمه خاسية الاصابع. ذنبه وافر الوبر اللبد الجلل. ثوبه الى الكهبة السمراء يقيق في الرأس والظهر ويغير في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويمدو على الارض بسرعة وينسلق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلا من الطير والحيوان.

## ٣٠٦٩٣ - وَشَعٌ

*Fleurs des légumes* (F). الوشع : زهر البقول.

## ٣٠٦٩٤ - وَشَعُ الْمَاءِ \*، وَكَيْسَتَارِيَّةٌ

*Vallisneria* (S). *Vallisnerie*, *Vallisnerie* (F). *Eel grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Valisneria* (I).

جنس نباتات عشبية رثدية مائية المسكن من فصيلة كلويات الماء. تعيش وتكثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها عصصية تطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. وتقرض من ٦ إلى ١٢ سم. أزهارها صغيرة القد، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل عن قاعدتها وتطفو على سطح الماء بانتظار الزهرة الانثى المركزة على زناد لولبي نابض يومه الزهرة عند ادراكها التناهي بالتالي بالجماع الواسع العالم.

## ٣٠٦٩٥ - وَشَعَّةٌ

*Centranthus* (S). *Centranthe* (F). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الناريديات. انواعها المعروفة ستة، مهدها حوض البحر المتوسط. سوقها نرسمة، أوراقها متعاقبة، أزهارها سوية اللون الاحمر او الابيض. خواصها الطبية لا تختلف عن خواص سائر الناريديات لكنها اضعف منها بالعناصر الفعالة || اشهر انواعها واعمها زراعة ما يتبع.

## ٣٠٦٩٦ - وَشَعَّةٌ حُمْرَاءُ \*، وَالْيَرِيَّانُ أَخْمَرُ

*Centranthus ruber* (S). *Centranthe rouge*, *Valériane rouge*, *Behen rouge*, *Barbe de Jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rote Spornblume* (D). *Valeriana rossa*, *Barba Giove* (I).

بجلة سبروتية معمرة طيبة وزيينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سوقها موقرة. أوراقها بيضبة ذرية، نصلها كامل الصفحة مسنن الحافة جميل انقشار يملو من ٨ إلى ١٢ سم. ويرض من ٤ إلى ٤. أزهارها عتقودي التجميع، صبورانيي القمة. أزهارها عطرية العرف، مستطيلة الدائرة، اردوانية اللون || تنورها يستمر من أيار إلى آب.



وشاكَّة



وشع الماء



وشعة حراء



وشق أروبي

٣٠٦٩٥ - **وَشَقَّ الْفَقْرَ** هو عناق الارض ، اطلية .

٣٠٦٩٦ - **وَشَقَّ الْمَنَاقِعَ \* ، شَيْب**

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).  
نوع من الشوق ، طوله نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه  
املح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، اكلع العين ، اسمر  
المراشف . موطنه شاسع الاطراف يعم الحبيشة والتونوية  
ومصر ولبنان وسورية والعراق وبلاد فارس حتى بحر  
قزوين .

٣٠٦٩٧ - **وَشَقَّ حَيْثِي \* ، شَيْب**  
Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).

نوع من الشوق ، طوله نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠ ، ثوبه  
اغبر اللون ابيض العنق اسمر الخد . رقشة الذكر عاقبة  
لامعة وذنبه زرقاء الموالج . رقشة الانثى باهية وفيرتها وردية  
المالج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر  
في الحبيشة .

٣٠٦٩٨ - **وَشَقَّ قَهْدِي \* ، نَهْ ، فُنْجُل**

Lynx pardus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx,  
Southern lynx, Spanish lynx (E).  
نوع من الشوق ، موطنه الشرق الاوسط واروية الجنوبية .  
وهو اصغر جثة من الشوق الاروبي واشرس خلقاً . ثوبه  
كثوب الفهد لوناً ورقشة . راجع نفه .

٣٠٦٩٩ - **وَشَقَّ كَنْدِي \* ، شَيْب**

Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).  
نوع من الشوق الامريكى ، اصغر جثة من الاروبي واكبر  
من القهدي . طوله نحو ١٠٠ سم. وذنبه ٥١ ، موطنه كندا  
وبعض ارجاع امريكة الشاليسية . ثوبه املح اللون ،  
حنطلي الموالج ، اسمر الرقشة . ذنبه اغبر اللون احر الموالج  
اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - **وَشَكَل**

Suint (F). Yolk (E).  
هو تتورع او مصالة صوف الغنم . راجع نفس .

٣٠٧٠١ - **وَشَلِي \* ، شَيْب**

Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).  
الجهاز الوطلي بمجموعة اقنية متشابهة تسمح بمرور الغذاء  
عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - **وَشَم**

اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم ووشام .

٣٠٧٠٣ - **وَشَمِيَّة \* ، شَيْب**

Mastigosporium (S).  
جنس فطور مجهرية من الوطحيات يتميز بجهره الكتيبة  
الاسطوانية ، القصيرة ، المتناوبة ، الشفافة التي تحمل في  
اطرافها كنانة فردية ، مردنية ، وتربة الانقسام الوثيري .  
يوسفاته مستطيلة عليية || انواعه قليلة ، اعرفها وشية  
التجليل وشية التريس .

٣٠٧٠٤ - **وَشَمِيَّةُ الزُّفْرَس \* ، شَيْب**

Mastigosporium lupini (S).  
فطر مجهرى يركب اوراق الترس فيسبب ذبولاً واعمالها  
الباكس || مظهره الخارجى بلطح خفيفة مستطيلة سمراء  
اللون ، زيتونية الموالج ، تركب الاوراق فتذويها وتقودها  
الى الذبول والاعمال || ينشط في الموامق الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - **وَشَمِيَّةُ التَّجِيل \* ، شَيْب**

Mastigosporium calvum (S).  
فطر مجهرى يصيب اكثر التجييلات البرية في اوراقها

فيجعلها ويذويها || مظهره الخارجى بلطح مستطيلة بيضاء  
طلياً يراوح من ١ الى ٨ سم. لونياً الى الجوزة العاقبة .  
تركب نصل العصف فتقرحه وتذويه || ينشط في الموامق  
الرطبة وتزيد نشاطه العوامل الجوية المواتية .

٣٠٧٠٦ - **وَشَنَ ، شَيْب**  
Etiage (F). Low-water mark (E).  
وشن ووشن الماء : قل . زين الشوق هو زين البروس اى  
قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - **وَشَنَّة ، شَيْب**  
Griotte (F). Morello cherry (E).  
اسم شامل يطلق على مختلف ثمار فروب الكرز العادي  
التي تتميز بصفرها وحوضها .

٣٠٧٠٨ - **وَشَه**

طائر من الصقور وهو غرب من الشاين او عرق منه .  
كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشاين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - **وَشَيْج ، هَلِكُونِيَا**

Heliconia (S). Héliconie (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات . انواعه  
المعروفة ٩ ، اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . تزرع  
للتزيين وهي قريبة الشبه من الموز تملو من ١٠٠ الى  
٤٠٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اهليلجى الشكل  
مالس الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كيانها كبيرة  
القد تطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. انواعها متراكبة ، كثيرة  
العدد ، مختلفة الالوان البهية .

٣٠٧١٠ - **وَشَيْجَة ، شَيْب**

Racine secondaire (F). Secondary root (E).  
من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسة . ج وشائج .

٣٠٧١١ - **وَشِيْع ، شَيْب**

Palissade, Hale (F). Palissade, Hedge (E).  
سياج من قصب او قضبان متشابهة وكل ما غرس او  
وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك منسجماً  
لإباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - **وَشِيْع ، شَيْب**

هو سقف البيت وهو ما ييسر وسقط من ورق الشجر .  
ج وشائج .

٣٠٧١٣ - **وَشِيْعَة ، شَيْب**

Fuseau (F). Spindle (E).  
شكل تشلذب هيكلي شائع الاستعمال في بعض انواع الانجار  
المشتركة . والشكل الوشي يكون عادة اوسع قاعدة من المردني  
واقبل ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - **وَشِيْعَة ، شَيْب**

Allantoide (F). Allantoid, Allantoic (E).  
ملحق جنيني يظهر في اول الحمل ويستمر نحو ستون يوماً  
ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - **وَصَامَةُ \* ، شَيْب**

Pathologie (F). Pathology (E).  
علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - **وَصَامَةُ نَبَاتِيَّة \* ، شَيْب**

Pathologie végétale (F). Vegetable pathology (E).  
علم يبحث في اسباب الاوصام النباتية وعوارضها .



وشق الناقع



وشق حشبي



وشق فهدى



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص  
Tuteur légal وصي شرعي  
Tuteur ad hoc وصي فعلي  
Cotuteur وصي مع غيره

٣٠٧٢٧ - وصية، مؤسسى به  
Legs, Testament (F). Legacy, Will (E).  
هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وصية عهدية، وصية إستثنائية  
Fidélcommiss (F). Fidé-commissus (E).  
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص  
ثان بعد مدة معينة . فالوصي له الاول يدعى المهدود أو  
المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق المهدى .

٣٠٧٢٩ - وصيد  
Athermane, Athermique (F). Athermanous (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل مادة لا تحترقها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وصيد  
Dru (F). Thick (E).  
الزراع الوصيد هو الزرع المتقارب الاصول . والزراعة  
الوصيدة : المتقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وصيدة  
حظيرة من الحجارة تتخذ للال بيتا الحظيرة تكون من  
الفصص .

٣٠٧٣٢ - وصينغ  
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).  
صوت المصافير . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وصيف  
هو كزبرة الير ، اطلبها .

٣٠٧٣٤ - وضاء  
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F).  
Nocturnal radiation, N. radience (E).  
ونهم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت  
قد تجتمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وضام  
Rémanence (F). Remanence (E).  
خاصة تتميز بها بعض الماشع التي يستمر انفعالها برعة  
من الزين بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وضع ، ولادة  
Mise bas, Part, Parturition (F). Parturition (E).  
خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وضع الحدود  
Abornement, Bornage (F). Delimitation, Fixing  
limits (E).  
وضع علامات بين ارضين للدلالة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وضع اليد  
Mainmise, Occupation, Possession (F). Seizure,  
Possession (E).  
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والآخر هو  
المستولي أو الشاغل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وضعية  
Assiette (F). Posture, Seat (E).  
هي حالة الاسس التي تقوم عليها بعض الامور .  
Assiette de droit (F). كوضعية الحق

٣٠٧١٧ - وصاية  
Tutelle (F). Tutelage (E).  
نظام قانوني لحماية القمتر .

٣٠٧١٨ - وصع ، وصع  
Troglodytes parvulus (S). Troglodyte mignon (F).  
Wren (E).  
عصفور آبد من الجوام . جسمه صغير القد يطول نحو  
١٠ سم . مقامه دقيق حاد الطرف . جناحاه قصيران .  
ذنبه متوسط الطول . ثوبه الى الزبداء السوداء يعلوها تجميع  
معرض اسود . يالغ الحادائق والادغال والموج والسيجات .  
قوته الديدان والناكب والذباب والحوام . يدثن في الادغال  
والجنانبات الكثيفة . اثناء تحضن مرتان في السنة . حضنتها  
تراوح من ٨ الى ٨ بيضات وتستمر ١٣ يوما .

٣٠٧١٩ - وصعيات  
Troglodytidae (S). Troglodytidae (F). Troglodytidae (E).  
فصيلة طير من الجوام لاقفات النمل سنيات المناقير .  
اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠٠ موطنها يشمل معظم  
مناطق القاروين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة  
القد ، نحيلة المناقير القليلة الانعطاف . قصيرة الاجنحة  
والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارباع الرفيعة ||  
تألف الادغال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصعيد  
والتهبيط . ترحل على الارض تحفة وتندو بسرعة . قوتها  
النمل والحشرات الصغيرة والدويبات || اشهر اجناسها  
اطلافاً الوصع .

٣٠٧٢٠ - وصف ، تعريف  
Signalement (F). Description (E).  
تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه  
او رقه وتحدره وسلالته وعمره .

٣٠٧٢١ - وصف ، تعث  
Qualification (F). Qualification, Title (E).  
هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو  
في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق القاطع  
وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وصل  
Récépissé (F). Receipt (E).  
محرد يدون فيه تسلم اوراق او اشياء للاطلاع او للحفظ .

٣٠٧٢٣ - وصم  
Maladie (F). Disease (E).  
الوصم هو المرض . ج وصوم وأوصام .

٣٠٧٢٤ - وصم سكو  
Mal secco  
هو سندارية الحمضيات ، اطلبها .

٣٠٧٢٥ - وصنبيات  
Périnosporées (F). Peronosporae (E).  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنبايات . تتميز بمشيجها  
المزجي الخليوي الداخلي الذي لا يخرج من دعاماته .  
تكاثرها ببني خارجي || اجناسها ستة . اربعة منها  
تركب النبات فتؤذي بهي التنس والصناء والصصيل واللثة .  
واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وصي  
Tuteur (F). Guardian (E).  
هو الذي يمارس تميمته السهر على مصلحة القاصر وادارة  
امواله وتمثيله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية  
Tuteur testamentaire



وصع



وضعية الريهن  
وضعية الضريبة  
وضعية العقار

٣٠٧٤٠ - وَصَمَ غشبة الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِيَّ  
هو أرغ الجزيرة ، اطلبه .

٣٠٧٤٢ - وَطَ Cri de la chauve-souris (F).  
Cry of the flittermouse (E).  
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وغفاش وسما الخ .

٣٠٧٤٣ - وَطَارَ \* Cereopsis (S). Céréopsis (F).  
طائر وحيد الجنس والنوع من كفيات القدم وفضيلة صفيحات المنابر || ملجئه الحياتي جماعي . يكثر وجوده في جزر المحيط الهادي || جسمه متوسط القد . حجمه حجم البطة الصغيرة . رأسه معتدل الجرم . يتميز برحابة الزند الذي يلفظ الصفحة العليا من المنقاد . عنقه معتدل الطول . جناحاه كبيران لا لحافان . ذنبه قصير مقطوع الطرف || ثوبه الى الريدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء بطنه الى البياض الاغبر .

٣٠٧٤٤ - وَطَافَة حُرْبَاءَ

Stratiomyia chamaeleon (S).  
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).  
حشرة من فصيلة الوطافيات . تألف الماواقع الرطبة . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ م . رأسها كبير الجرم ، قليل التنشور . عيناها فارتقتان . زباناها مرفقيان . صدرها كثيف الحمل . حفيقتها صفراء اللون ، ثنائية المناخس الحادة . ثوبها الى الزرقة السمراء يعلوها في بطنها تبيج اصفر هندسي الشكل || يرقتها دودية ، غبراء اللون ، سمراء الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَافِيَّات (S).  
Stratiomyidae (F). Stratiomyidés (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها منحنية ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة بالذباب . رؤوسها شبه مستديرة . عيونها لاقصية الارتكاز متناكها هشة لا تصلح لمس . قرونها الاستعارية متباعدة الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، عاد فصلها يراوح من ٤ الى ٨ . صدورها ملحوقة بجمل قصير ملهب اللون او قفي . حيافاها شاذكة او سرخة . قوائمها عريضة . بطونها خماسية او سداسية السكم الواضحة . رواشتها نشيطة ، شفاقة ، مطيعة الاسترسال عند الراحة || اناثها اكبر من ذكورها . يرقاتها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيحة الرؤوس التي تنتهبس في مقدم الجلوش . جميعها نائمة تعيش على المواد النباتية والمعضوية || اشهر اجناسها الوطافة والبرية والسمنة .

٣٠٧٤٦ - وَطَافَمَة \*  
Monotoma (S).  
Monotome (F). Monotomidae (E).

جنس حشرات من فصيلة الوطافيات ورتبة غديات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ م . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها

صغيرة ، نائرة . تأثيرها وفكرها نظامية . قرونها الاستعارية دويسية الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ، مسننة الحثار . انحدادها وشعبة ، لا تغلف كامل البطن . اثلوبها وحيدة اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصفر || جميعها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَافِيَّات (S).  
Monotomidae (F). Monotomidés (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قرونها الاستعارية دويسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها مسننة الحثار . انحدادها شبه منحنية الشكل ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . اراسها رباعية المقل . اثلوبها ملونة || جميعها دائمة . بعضها يعيش في قرى التلل اعصها التلل الاكثف || اشهر اجناسها الوطافمة .

٣٠٧٤٨ - وَطَاطِيط

Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F). Megachiroptères (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة الوطاطيات والعديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذنانها اللارندية ، بأنوفها اللازخرقية وبأذنانها ، عند وجودها ، المركزة تحت الفشاء الجلدلي والقاعدة النخذية .

٣٠٧٤٩ - وَطَبَ

هو الصرع العظيم في البقر والغنم والماعز .

٣٠٧٥٠ - وَطَبَاءَ

الوطباء : المنظمة الفرع كقولك بقرة وطباء او عز وطباء .

٣٠٧٥١ - وَطَحَانِيَّات (S).

Mucédinées (F). Mucedinas (E).  
عارة فطور مجهرية من فصيلة الكفنيات . تتميز ببوغها الشفاف او القليل التلون || اجناسها عديدة ، فوارقها مرتكزة على تركيب شكل الكناكث . اعزها من الربيعة الاقتصادية الزراعية خسة : الخدون ، الدندام ، السليحة ، الكتن والكفنية .

٣٠٧٥٢ - وَطَحْنِيَّات (S).  
Mucedinaceae (F). Mucedinaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الحيفانيات ورتبة الزروعات . تتميز بهيئها الالاقسي والترتيب والتخصيب فهو ضمي التجميع او مبشر وهو عادم اللون شفاف او مشبع التخصيب الزاهي . كناثلها ممتدة الاشكال والالوان . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها خمس عمارات : الزيكيات واللبليات والفقيشيات والماصويات والزنوسيات والهوبليات .

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ Tasser (F). To compress (E).

وطد الارض ضربها بالبطلة لتصلب لاساس بناء او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَضْرِيَّة

هي الواتسويا ، اطلبه .

٣٠٧٥٥ - وَطَنَ راجع بلد .



وطَار



وطَافَة

### ٣٠٧٥٦ - وَطَوَّاط

Chauve-souris (F).

Bat, Flittermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة مجنحات الالبيد.

### ٣٠٧٥٧ - وَطَوَّاط

سمكة بحرية تدعى شفين العمق، اطلها.

### ٣٠٧٥٨ - وَطَوَّاطِيَّات

Pteropodidae (S).

Ptérópodidés (F). Pteropodidae (E).

فصيلة من البطاريق. أجناسها ٨ وأنواعها ١١٠ جميعها ثامرة، كبيرة ومتوسطة القد. تتميز بقوف أذنبا البوقي الشكل. انثاها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً وترضعه في انثاء طيراتها. أما أجناسها الثانية فهي: الحيت، الحويش، الرذاسة، السرحاب، السفلوم، الشقاسة، الثلاثة والساعة. (اطلها في مواضعها).



وطيب

### ٣٠٧٥٩ - وَطَّيب \*

Isocardia (S).

Isocarde (F). Isocardia (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطريبات ورتبة الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل. أنواعها المعروفة عديدة اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة اسماءها شبه قليلة الشكل معتدلة الحجم او صغيرة، مائسة الصفحة او خافتة التخديد التحيل يلحفها غشاء ليفي المادة دقيق تميش في رمال واسحال مصبات الانهر.

### ٣٠٧٦٠ - وَطَّيْبَة

Utricule (F). Utricule (E).

تجويف كالتفرة يوجد في جذرة الطلع يستوعب المادة المنصبة.

### ٣٠٧٦١ - وَطَّيْبَة

Assise du mur (F).

وطيطة ج ومالدة: هي قواعد البنيان أي اساسه.

### ٣٠٧٦٢ - وَطَّيْبَة

سياه الاثنى من ذوات الحافر.

### ٣٠٧٦٣ - وَطَّيْب

Canon (F). Shin (E).

عضو من قوائم أخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في القامتين الاماميتين، وبين العروقوب والحوشب في القامتين الخلفيتين.

### ٣٠٧٦٤ - وَعَاء

Vaisseau (F). Duct (E).

هو الانبوب الكاثي في نسج النباتات الوعائية، وهو يقع على اشكال مختلفة اشبهها بالخزوفي والشبكي والمنقط.

### وعاء حلزوني

Vaisseau spirale (F).

Spirally duct (E).

### وعاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

### وعاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).



وعاء

### ٣٠٧٦٥ - وَعَات \*٥

Melyris (S).

Mélyris (F). Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوعائيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط اسماءها شبه اهليلجية الشكل، معتدلة الاحديداب، تطول من ٨ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة التشويز. عيونها صغيرة، بارزة.

تأثيرها وملاسها نظامية. قرونها الاستشعارية قلادية. كواسلها مقببة الشكل. اغمارها لاحفة، ثنائية الفلوع الناشرة القاطية. قوائمها نسيطة. اثنائها ملونة تكثر فيها الحوة والصحة اسماءها واسعة ومفترسة تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات. يرقاتها مفترسة.

### ٣٠٧٦٦ - وَعَاتِيَّات ٥

Melyridae (S).

Mélyridés (F). Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها بعض مناطق افريقية الشمالية وحوض البحر الابيض المتوسط اسماءها شبه اهليلجية الشكل، تطول من ٦ الى ١٨ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة التشويز. عيونها صغيرة، بارزة، تأثيرها وملاسها نظامية. قرونها الاستشعارية قلادية، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها مقببة. اغمارها لاحفة، ثنائية الفلوع القاطية، قليلة الرخافة، معتدلة الصلابة. قوائمها نسيطة. ارساغها خماسية المقل. اثنائها ملونة اسماءها واسعة ومفترسة، تعيش على رحيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات. يرقاتها مفترسة اسماءها الوعائيات.

### ٣٠٧٦٧ - وَعَاط

Rosier jaune (F).

هو الورد الاصفر، اطلها.

### ٣٠٧٦٨ - وَعَاتِيَّات البُذُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وعائيات البذور او مستورات البذور او النباتات مغطاة البذور هي احد قسمي باديات الزهر. وهذا القسم يشعل النباتات التي تكون يبيغها في مبيض ويزدها في ثمرة.

### ٣٠٧٦٩ - وَعَاتِيَّة

Vascularisation (F).

تعير فيزيولوجي، راجع قَسَوِيَّة.

### ٣٠٧٧٠ - وَعَب

Terrain plac et vaste (F).

الموضع الواسع المستقر من الارض. ج وعاب.

### ٣٠٧٧١ - وَعَث

Epiphytie (F). Epiphyty (E).

وعوث النبات: عللها واصوامها في منطقة معينة.

### ٣٠٧٧٢ - وَعَثَة ٥

Coleosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوعائيات يتميز بانثاته المتراكبة المتشابهة وبدعاماته الاسطوانية المسطيلة الدقيقة القاعدة اسماءها قليلة تنطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية متركب الاحداب وتؤذيها مظهرها الخارجي بطور مستدرة مبرنة متفرقة لونها الى الجوزة يحضنها اطوار بنفسي، تثبت على النصل نحو السنة ثم تتطور بعد ذلك الى حويصلات مفلطحة القاعدة العريضة، مستدرة القمة، طولها من ١ الى ٢ م. لونها الى البياض التي يرشح منها عند اكتمال دورها الفطري وبعد انفجارها نقطة من الراتنج اسماءها زهيدة لا تستوجب المكافحة.

### ٣٠٧٧٣ - وَعَثِيَّات ٥

Coleosporiaceae (S).

Coléosporiacées (F). Coleosporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بركبائها التي تحضن الدعامات. دعاماتها عويدية الانفاق، رباعية الاضلاع، شمعية الانقسام، غليظة الجراب البوقي اسماءها قليلة، اعرفها الوعة والسبع.

## ٣٠٧٨٣ - وَعَلْفُ الْمَصْرِيِّ الْحَارِي\*

*Dactylopius adonidum* (S). Pou blanc des serres (F).  
حشرة صغيرة من القرميزات. حمارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، غبراء الترس الشمعي. تركيب نباتات المصاري وتفتك بها.



وعف التين

## ٣٠٧٨٤ - وَعَلْفُ صَيْثِي

هو قرمزية فورموزا، اطلبها.

## ٣٠٧٨٥ - وَعَلْفُ مَحَارِي

هو قرمزية التفاح، اطلبها.

## ٣٠٧٨٦ - وَعَل، وَعَل، تَبْسِ الْجَبَل

*Bouquetin* (F). *Steinbok* (E).  
جنس حيوان بري جبلي يجتر من فصيلة الغنميات. قريب الشبه من الماعز التي تحدثت عنه. أنواعه عديدة، جميعها ربعة الجثة، كبيرة القرون الغليظة المنحنية القوية. الاثنى ثنائية الاختلاف تقصع جذبا واحدا في اواخر حزيران يتبع امه بعد الوضع بثلاث او اربع ساعات || اعرف انواعه واشهرها: الوبل والبدن والثيلق والمخور والمزعز. ج اوصال ووصل.



وعف المصرى المبطل

## ٣٠٧٨٧ - وَعَلْ أُرُوْبَة \*، وَعَلْ الْأَلْب

*Capra ibex* (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوبل. موطنه جبال الالب. جسمه ربع الجثة مسنوب القالب يطول ١٥٠ سم. يطو نحو ١٠٠ وزن من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو. ثوبه سوي اللون يختلف مع العمر ومع فصل الصيف والشتاء. وهو يراوح بين الشبهة الصنابية والصخرة. خط ثيبه كهيب اللون. ابطاءه وبطنه اعيق من ظهره. قترناه ضليخان منحنيان كسيفين احديين. الاثنى اصفر قرنا من الذكر.

## ٣٠٧٨٨ - وَعَلْ الْقَفْقَاس، تُرْ

*Capra cylindricornis* (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوبل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طوله يراوح من ٦٠ الى ٦٥ سم. وارتفاعه كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكبيش شكلا وانطلاقا. ثوبه الى الكهبة، لحته قليلة الشعر سواد اللون. إجله يعد من ١٠ أزواج.



وعف المصرى الحاربي

## ٣٠٧٨٩ - وَعَلْ حَبْثِي

*Capra wail* (S). *Bouquetin d'Abysinie* (F).  
نوع من الوبل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ م. وهو صغير الجثة احسن القرن محدب الجبهة. إجله يعد من ٧ الى ١٥ زوجا.

## ٣٠٧٩٠ - وَعَلْ سِيْبِرِيَّة

*Capra sibirica* (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).  
نوع من الوبل. موطنه شاسع الاطراف يمتد من حلايا الى شري سيبريه. جسمه كبير القند قدره قدر الوبل الاروبي. الا انه افتح لونا وهو كثيب اللحية مستطيل القرن. إجله يعد من ١٢ الى ٢٠ زوجا.



وعف اوروپ

## ٣٠٧٩١ - وَعَلْ عَرَبِي

ويُدعى ايضا وعل التوبة، هو البدن، اطلبه.

## ٣٠٧٩٢ - وَعَلْ قَارِصِي

هو البزل، اطلبه.

## ٣٠٧٧٤ - وَعَسَّس Dryandra (S). Dryandre (F).

جنس جنبات ابيدة معمرة من فصيلة القضييات. اوراقها لا نظامية الترتيب منها المتعاقبة والقصية والمبثمرة. ازهارها رويسية الجميع تغشها قلافة من القباب الغروطي الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

## ٣٠٧٧٥ - وَعَسَّس ثَلْجِي Dryandra nivea (S).

*Dryandre blanc de neige* (F).  
نوع من الوبس، جنته تملو نحو ١٠٠ سم. اوروها مدادة. فرووها قصيرة عقداة. اوراقها مفصصة، نصلها يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. مسفته السفلى خلية البشرة فضية اللون. رؤوساتها الزهرية بيضيه الشكل. ازهارها يفياء اللون، قناباتها خلية البشرة حنطية اللون والمواج. تنوره يستمر من آذار الى ايار.

## ٣٠٧٧٦ - وَعَسَّس قَاخِر Dryandra formosa (S).

*Dryandre magnifique* (F).  
نوع من الوبس، جنته تملو نحو اربعة اشرار، ساقها عقداة. فرووها المروحية منتصبه مستطيلة. اوراقها خمبة متراكبة، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ الى ٢٠ سم. ويعرض من ٦ الى ٨ سم. رؤوساتها الزهرية بيضيه الشكل. ازهارها برتقالية اللون، قناباتها حر || تنوره يستمر من ايار الى تموز.

## ٣٠٧٧٧ - وَعَسَّس كَثِيرُ الزَّهَر Dryandra floribunda (S). Dryandre multiflore (F).

نوع من الوبس، جنته تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها قزواء. فرووها لينة العود اللتين. اوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليلجي الشكل، مسن الحافة، ملس البشرة على مسفحيتها. ازهارها صفراء اللون، قناباتها حنطية. تنوره يستمر طوال فصل الصيف.

## ٣٠٧٧٨ - وَعَسَّسَاء

الرملة البنية يصعب فيها المشي. ج وعاس وواعاس.

## ٣٠٧٧٩ - وَعَسَّسْ أَرْجَوَانِي

هو قرمزية الحفصيات، اطلبها.

## ٣٠٧٨٠ - وَعَسَّسُ الثَّيْنِ \*

*Lepidosaphes minima, L. conchyiformis, Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgule du figuier* (F).

حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها كروي الشكل قله يراوح من ٢ الى ٣ سم. ثوبها ابيض اللون، ترسا الشمسي قليل الماددة والانتشار. جبلها الحولي واحد. تمتع مكها تدريجيا طوال شهر نيسان فينتف عن يرقات نهبي انسلخاتها في اواخر الصيف. اقلهايم حوض البحر المتوسط. تركيب الثين دون سواه تنوذه اذا كثرت لانها تنثني الساق والاذغاص.

## ٣٠٧٨١ - وَعَسَّسُ الْحُمْضِيَّات

هو قرمزية الحفصيات، اطلبها.

## ٣٠٧٨٢ - وَعَسَّسُ الْمَصْرِيِّ الْمَبْطَط \*

*Eucalymnastus tessellatus, Lecanium tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).

حشرة صغيرة من القرميزات، جسمها يفيي الشكل مبطل يطول من ٣ الى ٤ م. ويعرض نحو ٢. ثوبها الى البني الاسمر. اطرافها غبراء اللون مسنفة، جانباها شاذغان. تركيب مبطل نباتات المصاري اغصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنٌ، وَعْنٌ** ٣٠٨٠٢

Fattening (E).

توعنت الغنم والإبقار : بلغت غاية السمن .

Latérite (F). **وَعْنَة** ٣٠٨٠٣

شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Latéritique (F). **وَعْنِيَّة** ٣٠٨٠٤

صفة الوعة وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْنَوْع** ٣٠٨٠٥

راجع ابن آوى الافريقي .

٣٠٨٠٦ **وَعَالٌ** البقال وكل بائع يغلي ثمن الاشياء .Aubergine (F). **وَعْدٌ** ٣٠٨٠٧

هو الباذنجان ، اعطيه .

Imperméable (F). **وَقَاضٍ** ٣٠٨٠٨

Impermeable, Impervious (E).

الوقاض : المكان يمسك الماء . والترية الوقاض هي التي تحفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَلٌّ، وَقَلٌّ** ٣٠٨٠٩

وقل وقول الشيء قشره فهو واقل .

Philodendron (S). **وَقِيلٌ** ٣٠٨١٠

Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جذمية مدادة معمرة من فصيلة التفلجاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منهاها بعض مناطق البلاد الاستوائية اغصنها امريكة الجنوبية ||  
 سوقها جذمية مدادة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، كبيرة ، القد ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة النصل المفرض والمشرم . ازهارها طلحة كما في النخل . ازهارها شديدة الصغر ، عريفة ، مستحبة الارباع || تزروع قلائد في المراكن داخل المساكن .

Exalbuminé (F). **وَقِينٌ** ٣٠٨١١

نمت تعريفي يطلق على كل بزة او ثياب عادم الاح اي الابوين .

Cri de la pie-grièche (F). **وَقِيٌّ** ٣٠٨١٢

الوق هو صباح الصرد .

Chronomètre (F). **وَقَاتٌ** ٣٠٨١٣

Chronometer (E).

جهاز ضبط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي استوجبه العمل المطلوب .

Chronométrie (F). **وَقَاتَة** ٣٠٨١٤

Chronometry (E).

Combustible **وَقَادٌ** ٣٠٨١٥

ما توقد به النار ، اطلب وقود .

Cérthiola (S). Certhiole (F). **وَقَالٌ \*** ٣٠٨١٦

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغرثيات . انواعه المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة . اغصها امريكة الجنوبية || اجسامها متوسطة القد .

Commelina (S).

Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E). Commelina (D). Commelina (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوعلانيات . انواعها ٨٠ معظمها بري وبضها طبي وزيني . سوقها منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان تغلب فيها الزرقاء || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ **وَعَلَّانُ البَغْلَانِ**

Commelina benghalensis (S). Commeline du Bengale (F).

نوع من الوعلان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها . اوراقه بيضيه مقطوعة ، نصلها الى الخضار الزاهي ، اغنادها موشحة بالاحمر . ازهاره كثيرة العدد ، بنفسجية اللون ، صغيرة القد || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ **وَعَلَّانُ سَيَاوِيَّ**

Commelina caelestis (S). Commeline céleste (F).

نوع من الوعلان ، قاعدة ساقه دوفصية الجنت المستطيل . ساقه فروع زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطئة اهليجية الشكل . نصلها خلى الصفحة العليا ، املط السفل . ازهاره الى الزرقه السابجوية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ **وَعَلَّانُ فِيرَجِينَة**

Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة فروع تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . اوراقه سنانية الشكل ، نصلها جامد الصفحة يطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقه المايقة الزاهية ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ **وَعَلَّانُ مُنْتَصِبٌ**

Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).

نوع من الوعلان ، ساقه منتصبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه محدبة ضيقة النصل تطول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٥ م . نملها خلى البشرة يطول من ١٥ الى ٢٥ م . ازهاره الى الزرقه الجملبية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ **وَعَلَّانِيَّاتٌ**

Commelinaceae (S).

Commelinacées (F). Commelinaceae (E).

فصيلة نباتية من رسيدات الفلقة . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوعلان والمكايبة والزبرية والطينيسيا .

٣٠٧٩٩ **وَعِلَة**

Bouquetin femelle (F).

Cow-bouquetin (E).

الوعيلة انثى الوعل .

٣٠٨٠٠ **وَعْنَة**

Gazelle femelle (F).

Cow-gazelle (E).

الوعنة انثى الغزال .

٣٠٨٠١ **وَعْنٌ**

Fourmière délaissée (F).

الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وعلان



وقل



وقال

منادبها مستطيلة، اذناها مستديرة الأطراف. انواطها  
جيلة الاوران الزاهية يكثر فيها الاحمر والازرق البنفسجي  
المواج || قوتها اخشاش وبعض الثار الباتعة .

٣٠٨١٧ - وقائد  
Tablettes en pierre (F).  
الوقائد : الحجارة المفرشة في الحدائق والممرات ، واحدا  
وقيد وقيدة .

٣٠٨١٨ - وقائع الدعوى  
Points de fait (F).  
في البيان باسما المتقاضين والحوادث التي نشأت عنها  
الدعوى .

٣٠٨١٩ - وقاية  
Prophylaxis (F). Prophylaxis (E).  
في جماع وسائل الحيلة والعناية الممكنة اتخاذها لئلا  
الامراض . راجع انتقاء واحتراز .

٣٠٨٢٠ - وقب ، حجاج العين  
Orbite (F). Orbit, Socket (E).  
في نفرة العين شبه هرية الشكل رباعية السطوح . وما  
الثتان .

٣٠٨٢١ - وقبة  
Orbitale (F). Orbital (E).  
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - وقبي  
Orbital (F). Orbital (E).  
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - وقبيات  
Arcifères (F). Arciferous (E).  
لغة من مرتبة السنويات عديمات الذنب سليات اللسان .  
انواعها المعروفة كثيرة العدد جميعها خمس فصائل :  
الشرغويات والمجبويات والصفاجيات والكداميات  
والهكرسبات || تتميز جميع صفاد هذه اللمة بدم مساواة  
سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز ثلاثيها || اشهر  
صفاد هذه اللمة المعجوم والشرغوف .

٣٠٨٢٤ - وقبر  
Charge (F). Load (E).  
هو ثقل الحمل الذي يقع على اعمدة وسقوف وجدران  
المباني . وهو يقسم الى ثقل ميت مستقر وثقل حي مفروض .  
ونظراً لكثرة العوامل التي تدخل في حسابه فالوقر قد يكون :

وقر الكسر  
Charge de rupture (F).  
Breaking load (E).

وقر متحرك  
Charge mobile (F).  
Travelling load (E).

وقر مستديم  
Charge permanente (F).  
Permanent load (E).

وقر لامركزي  
Charge excentrique (F).  
Essentrick load (E).

وقر منفرد  
Charge isolée (F).  
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي  
Charge uniformément répartie (F). Uniformly dis-  
tributed load (E).

٣٠٨٢٥ - وقرة  
Cicatrice (F). Scar (E).  
هي الاثر في الجسم من اي سبب كان . ج وقرات .

٣٠٨٢٦ - وقس  
Gale (F). Scab, Scurf (E).  
اسم شامل يطلق على جميع انواع الجرب التي تتركب الحيوان  
والنبات . ومن قاربه الجرب فهو مقوس وهي مقوسة .

٣٠٨٢٧ - وقسيات  
Gymnosaceae (S).  
Gymnosacées (F).  
فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة التفطيات ورتبة  
الزقيات . تتميز بازقاق عريضة تلحمها غلفة السن البين  
الموجبه || اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاث عمارات :  
الزقيات والظفريات والمجبويات .

٣٠٨٢٨ - وقف  
Wakf  
هو حبس العين ورصد ريعها على الوقائف وذريه او من  
يحبس .

٣٠٨٢٩ - وقف  
Suspension  
٣٠٨٣٠ - وقف الأثر  
Surannance (F).  
وقف اثر المقد الموقوف الموقوف عند اجل ما اذا هو لم  
يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - وقمل ، كميرويس  
Chamaerops (S).  
Chamérops (F).  
جنس اشجار ليغية برية ورتبينة من فصيلة النخلات .  
مهدا البلاد الحارة . انواعها عديدة معظمها اسوي المنبت  
ومنها الافريقي والامريكي . سوقها جالسة تعلو من متر  
الى عشرة أمتار . اوراقها مدوارة ، كبيرة القد ، جيلة  
الخضار ، مستطيلة الزناد || اشهر انواعه الترتبينة  
ما يلي .

الوقل الخافض  
Chamaerops humilis (S).  
الوقل الشائك  
Chamaerops hystrix (S).  
الوقل الصلب  
Chamaerops martiana (S).  
الوقل الفاخر  
Chamaerops excelsa (S).  
الوقل الكوششي  
Chamaerops cochinchinensis (S).  
الوقل المنفرد  
Chamaerops fortunei (S).  
الوقل المنشاري  
Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - وقمل خاشع ، مرموحة  
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Pal-  
mier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European  
fan-palm (E). Hanpalme, Schirmpalme, Europäische  
Zwerpalme (D). Palma camerops, P. minore, P.  
femmina (I).

نوع من الوقل لا ينحس البرد العادي يعيش على معظم  
شطوط المتوسط . ساقه قصيرة . اوراقه مروحية جيلة  
الخضار الرتي المواج . يزود ثريين ويستخرج من  
اوراقه الياق قوية تصنع لصناعة الحبال . يتكاثر بالبر .

٣٠٨٣٣ - وقن  
Dénicher (F).  
To take out of the nest (E).

وقن وأقن : اخذ الطير من مضانها .  
الوقنة : حفن الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٤ - وقنة  
Nid (F). Nest (E).

٣٠٨٣٥ - وقواق ، ققب  
Cuculus (S).  
Cucou (F). Cuckoo (E).  
جنس طير من عمارة الوقواقيات وفصيلة القيقوبيات . انواعه  
نحو ٧٥ معظمها متوسط القد قدره الحماة . الواجا  
قريبة الشبه من ثوب الباشق مع ابريدها ورشيته وحسن  
تبيجه . تألف الاحراج . قوتها الخشاش . لا تحسن  
بيضا ولا ترق فراخها بل تضع بيضا خلسة في اركان



وقل



وقوان

بالاسود الابرجواني وبالباليص . ودوارجه ، من الحوافر الى الركب ، تبنية اللون . حوافره الى السواد الاحمر اللامع . ذنبه ذئب الزرافة والجلل || الاثنى اصفر قدماً من الذكر وانحل جسماً ، اما الذئب فنفسه .

### ٣٠٨٤٣ - وَكَاحَة حَرْجِيَّة \* ٥

*Drassus silvestris* (S). *Drassode sylvestre* (E).  
*Syla drassus* (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايب سداسية المشاقق تنتمي الى فصيلة الوكاحيات || جسمها متوسط القد بطول عند العنكب نحو ١٣ م . وعند العنكب نحو ١٧ م . صدراسها زرواني الشكل ، اشجع اللون حطفي المواج . عينها زعنبيان . شيفهاها غليسيان . فكاهها مستطيلان نشيطان . جزامها كبيرة ، كثيرة الهلب . بطنها بيضي الشكل ، حطفي اللون ، احمر المواج ، اسود التقطع المجرى ، ينتهي بشلولة دقيقة فارقة || تألف الحراج والبراري . عكبتها وطاق تنسجه تحت الحجارة والجفوع المستلقية . مسرحها جدوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريح . تسمى الى قصصها ركساً وتتميز بالمرارسة والخلع || بيابها الشتوي يستمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعاً . تعيش نحو ثلاث سنوات . والاثنى تمتع المكان على دفء واحدة في غشاء من النواس متين الحيك تلفه وتحمله لاصقاً بمشاتها الى ان يمّ النقف . ثم تحضن الصغار على سطح بطنها نحو اربعة اسابيع || تعتبر من الدويبات النافعة للازودية .

### ٣٠٨٤٤ - وَكَاحِيَّات \* ٥

*Drassidae* (S). *Drassidae* (E).  
فصيلة عناكب من رتبة الزيليدات . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم . جميعها مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بصدرها البيضي الشوزن ، المبطنة الجرم وبامتداعه اجهزتها الشفوية || اثنائها متبانية الالوان . شعها وطاقات تقعيها تحت الحجارة والجفوع المستلقية ولها الانجار والجمالة || اشهر انواعها الوكاحه .

### ٣٠٨٤٥ - وَكَار \* ٥

*Coureur* (F). *Runner* (E).  
هو الداء ، اطلبه . رابع عقد الوكالة .

### ٣٠٨٤٧ - وَكِب \* ٥

*Coloré* (F). *Coloured* (E).  
وكب الثمر : لون وزهي وقد يكون ذلك عند الادراك .  
*Coloris* (F). *Colouring* (E).  
هو زعاه ماجة لون الثمر او اي لون كان .

### ٣٠٨٤٩ - وَكْسَة \* ٥

*Point (noir ou rouge)* (F).  
*Point (black or red)* (E).  
نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوة : ظهر فيها نقط .  
٣٠٨٥٠ - وَكُج \* ٥  
الوكج : هو المكان الصلب . يقال بلغ في سفره الوكج اي بلغ الصخر .

### ٣٠٨٥١ - وَكُر \* ٥

*Nid* (F). *Nest* (E).  
الوكر : عش الطائر وان لم يكن فيه .

بعض الطيور ولا تلقي في العش الواحد أكثر من بيضة واحدة . ذكرها أكثر عدداً من اناثها . وهي من الطيور شبه القواطع تسير في الليل . تحضي الربيع والصيف في الاقاليم المعتدلة والخريف والشتاء في الاقاليم الدافئة || اشهر انواعها : البوق المائلون والبوق المطرق والبوق المرقط والبوق الكبير الدارة والمقرض والقيقب والقيقبو والكوكو والكركر والكركر والكركر والفوق والفوق والحمام والفوق والطاووس .

### ٣٠٨٣٦ - وَقَوَائِيَّات \* ٥

*Cuculinés* (F).  
عارة طير من فصيلة القيقوبيات . اجناسها اربعة وانواعها المعروفة ١٤٠ موطها احراج العالم القديم . وهي باكريتها من الطيور النافعة التي تلتهم الحشرات . من مزاياها الخاصة انها لا تحضن بيضها ولا ترق فراخها وصوتها يشبه الوقوة .  
*Combustible* \* ٥  
في المواد التي تستخدم لتوليد الحرارة باسترقاقها في الهواء .  
تقسم الوقود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام تعرف بالصلبة كالقحم والسائلة كالنفط والغازية كغاز الاستسجاج . وتقسم ايضاً من حيث مصدرها الى طبيعية كالنفط والقحم ومحفرة كالكمحول .

### ٣٠٨٣٨ - وَكِيد \* ٥

*Brûlis* (F).  
*Denshered, Patch of burnt* (E).  
ما يوقد به النار من حطب ونحوه ؛ والارض التي احترق نباتها .  
٣٠٨٣٩ - وَكَيْسَة \* ٥  
المقع الذي اعتاد الطائر اتيانه والوقوع عليه .

### ٣٠٨٤٠ - وَكَيْمَة \* ٥

*Lamelle* (F). *Lamella* (E).  
الوكيمه والشارة ، راية صغيرة من الزجاج متناهية في البقة تستعمل لتغطية المستعمية . مناطق مرتفعة فحضا تحت الجهر .  
*Dichroisme* (F). *Dichroism* (E). \* ٥  
الوكاب غاصة تتميز بها بعض الاجسام فتنظر للناظر اليها كأنها مخضبة بلونين وذلك بالنسبة الى انعكاس النور او انكساره .

### ٣٠٨٤٢ - وَكَب \* ٥ ، وَكَبِي \* ٥

*Okapia Johnstoni* (S). *Okapi de Johnston* (F).  
حيوان يون غاشب يجتر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير جوستون عام ١٩٠٠ في غابات الكونغو المتاخمة لفضة الشالية من نهر « سلبكي » . يبدو ، من الهيكل والشكل الخارجي ، كأنه يتحد من الزرافة والمهاة وحمار الزرد . يألف الغابات المستعمية . مناطق مرتفعة عن سطح البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجئه الحيواني زروبي || جسمه بطول نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتقاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . معادلته السنوية ٣٢ كرا .  
هي الحال عند الزرافة . رأس معتدل الجرم . قصبة انفه مخدبة . غنطه وشي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر . عنقه عنق المهاة . ككله كفل حمار الزرد ودوارجه متساوية كدوارجه || ثوبه الى الجفوة القرمزية المواج . محصره الى البياض الاصفر . غنطه الى السمرة القامحة . جبهته الى الحمرة الدموية . سيالته سوداء تمتد حتى الجحفلة . اذناه اكبر من اذني الحمار ولها كاسيتان جؤويتا اللون . عنقه ومكباها الى الجفوة السوداء المواج . فخذاه مجتمعتان



وَكَب



وَكَاة حَرْجِيَّة

Curatelle (F). **٣٠٨٦٤ - وَلايَة ، قِوَامَة**  
Guardianship, Trusteeship (E).  
هي إدارة شؤون وأموال المجهور عليه .

**٣٠٨٦٥ - وَلَث** الولث هو القليل من المطر .

**٣٠٨٦٦ - وَلَتَح**  
Herbes effilées (F).  
الولح هو العشب المستطيل .

**٣٠٨٦٧ - وَلَغ ، وَلُغ ، وَلَغَان**  
Lapement (F).  
شرب السباع بالسنها .

**٣٠٨٦٨ - وَلُود**  
Vivipare (F). Viviparous (E).  
مدلول التكاثر النسلي بالولادة ، بماكسها يبيض .

**٣٠٨٦٩ - وَلُول ، \* ، بُوَسَة الْأَطْلَال**  
Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).  
طائر من البوم ينتمي إلى عمارة البوميات . موطنه إفريقية  
الشالية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه  
صغير القد يطول نحو ٣٠ سم . ثوبه أعين من ثوب البومة  
وأكتف رقيقة . يألّف الأطلال والاحراج ولا يقرب إلا ما كان  
الأكله إلا عند ميسر الحاجة . يتلصق قوته في الليل . يصيد  
جميع أنواع القراصم والحشرات .

**٣٠٨٧٠ - وَلِيسْتَارِيَة** هي وشع الماء ، اطلبه .

**٣٠٨٧١ - وَلِغ**  
Pollen  
هو الصلح ، اطلبه .

**٣٠٨٧٢ - وَلِغِي**  
Pollinique (F). Pollinic (E).  
اطلب علمي .

**٣٠٨٧٣ - وَمَاشَة النَّحْل**  
Braula coeca (S).  
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة البوميات ورثة ذوات  
الجناحين || جسمها شديد الصغر يطول نحو ١ م . تعيش  
كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكثا شديد  
الصغر تحتحه الاثنى فردياً في الخلايا فينثف عن يرقات  
متناهية الصغر واللثة تعيش على المكبر الحزون والتغاريب .

**٣٠٨٧٤ - وَمَاشِيَات**  
Braulidae (S).  
Braulidés (F). Braulidae (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناحين .  
لها نومان يصممها جنس واحد || أجسامها صغيرة ، محدبة ،  
شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ إلى ١.٥ م . رؤوسها  
صغيرة ، مبطنلة . عيونها دقيقة فارقة . قربها الاستشعارية  
صغيرة ، قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها وبطنها  
متناسقة . وهي عادمة الجناح والزران . قوائمها قوية ،  
مشطية الأطراف || أشهرها ومشة النحل .

**٣٠٨٧٥ - وَصَحَة**  
Asterocystis (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغيات . تكاثرها  
لاشي . تتميز بجفها البيضي المستطير الشكل العادم الرباط .  
تنقل على عدة نباتات زراعية فتركب جذورها وتؤذيها  
وقد تميتها .

**٣٠٨٧٦ - وَصَحَة الْجُدُور**  
Asterocystis radialis  
نوع من الرمحة تركب جذور بعض النباتات اخصها  
الكتان والسلمج واللث وأنس والكراث والشوان والتف

Parade (F). Pairing (E). **٣٠٨٥٢ - وَكَع**  
الوكع هو مئاد الطيور الالهية . واكم الديك اللجاجة :  
سفدا . وكمت الهامة والطة : خضمت لسفاد الذكر .

**٣٠٨٥٣ - وَكَصَف**  
Vice (F). Defect, Viciousness (E).  
هو العيب الظاهر في الشيء . ج أوكاف .

**٣٠٨٥٤ - وَكَن**  
الوكن والوكنة : هي محض الطائر في حضن أو جدار .

**٣٠٨٥٥ - وَكِنِغ**  
Menon (F).  
الكيش أو الشاة تنبها النعم .

**٣٠٨٥٦ - وَكِيل**  
Mandataire (F). Mandatory (E).  
هو من استندت إليه الوكالة .

**٣٠٨٥٧ - وَكِيل ، جَرِي**  
Régisseur (F).  
Manager, Bailiff (E).  
هو الذي يدير المزرعة ويقوم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

**٣٠٨٥٨ - وَكِيل ، خَوَلِي**  
Contremaître (F).  
Overseer, Foreman (E).  
هو رئيس العمال في ورشة معينة .

**٣٠٨٥٩ - وَكِيل التَّفْلِيسَة ، سَتْدِيك**  
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).  
هو الوكيل القانوني من كتلة الدائنين ويعتبره القانون  
وكيلاً ايضاً عن المفلّس ليدر امواله ويصفها .

**٣٠٨٦٠ - وَلَاب**  
Macropus (S). Wallable (F).  
جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة القنقرات .  
انواعها المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتبانية . تألف  
الاجام واللبايس والادغال . ملجئها الحيائي جماعي ||  
اجسامها معتدلة القد تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . بما  
فيه الذنب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . اثولها الى  
الطحلة المتفاوتة السمرة . انثاها رباعية الاغلاف ||  
اعرف انواعها واشهرها :

**ولاب احمر العنق** Wallable à cou rouge (F).  
**ولاب أسود الذنب** Wallable à queue noire (F).  
**ولاب رشيق** Wallable agile (F).

**٣٠٨٦١ - وَلَادَة**  
Mise bas (F).  
هي الوضع أي خروج الجنين من رسم الاثنى في نهاية  
مدة الحمل .

**٣٠٨٦٢ - وَلَادَة الْعَدَاكِي**  
Parthenogénèse (F).  
Parthenogenesis (E).  
هي الولادة التي لا يستيقها كوم ؛ وقد تحصل في بعض  
الحشرات منها الأرق .

**٣٠٨٦٣ - وَلَانَة**  
Avellana (S).  
Avellana (F). Avellana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مئديات الارجل  
وفصيلة الجليديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
منشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر  
الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحصبية والربلية ||  
اعداها بتدنية الشكل والقد ، مستندرة القوفا الثلاثية  
الاستنان . مالة الصفحة المعتدلة الساكنة ، الجميلة  
الالوان الزاهية ، يكثر فيها المجزوي .



ول

للاستعمال إلا بعد مرورها بمدة مراحل تخميرية وتخميرة تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - وَكِيلِين Vanilline (F). Vanillin (E).  
عطر الونيلية يستخرج من الثأر التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَكِيْمَة Sclérote, Stroma (F).  
مشيعة نباتية صلبة المادة تتكون من بعض الفطور فتحفظها وتقودها . ج ونم .

٣٠٨٩١ - وَهَاجَة Photomorphose (F).  
Photomorphosis (E).  
الوهاجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهَآئَة Sénescence (F). Senescence (E).  
هو الدور الذي يسبق الذبول في النجج الحية ان حيوانية او نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهَجَنَة Photologie (F).  
Photology (E).  
الوهجنة علم يبحث في وهج الضوء ومناخه ومعطياته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد Terrain bas, encaissé (F).  
الوهد والوهدة : الارض المنخفضة ايأا كان مؤدها .  
ج أود ووهدان ووهاد .

٣٠٨٩٥ - وَهْر  
الوهر : نوع يقع الشمس على الارض حتى ترى له اضطراباً كالبخار .

٣٠٨٩٦ - وَهْص Emasculation  
هو انتزاع الخصيتين لانساد عمل التناسل في ذكر الحيوان .  
الغاية منه حث الحيوان على التوطين .

٣٠٨٩٧ - وَهْط Bocage (F). Copse, Basket (E).  
غابة صغيرة ظليلة وكل حرجية من عشر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).  
جناح اوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق Lasso  
هو حبل في طرفه انشطة يطرح في عتق الدابة للقبض عليها . يقال صاده بالوهق . ج اوراق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلَنِيْرَجِيَّة \* Wahlenbergia (S).  
Wahlenbergie (F). Wahlenbergia (E).  
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الجريسيات .  
جنسها واوراقها متباينة الاشكال والاحجام . ازهارها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الازرق || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلَنِيْرَجِيَّة صَعْتَرِيَّة الْوَرَق \*  
Wahlenbergia serpyllifolia (S).  
Wahlenbergie à feuilles de serpolet (F).  
مهدها البلقان . ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . اوراقها

والقصبة || منظرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجذور عند انتشارها . وعند تقاطع شراها تعطب الاوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَدَيد الود والوده : شدة حر الليل .  
٣٠٨٧٨ - وَدَس ويس وادس المنب : لان وقرب النضج

٣٠٨٧٩ - وَدِيض Fulguration (F). Fulguration (E).  
لمعان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يعقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - وَدِيْثِر \* Winters (S). Wintère (F).  
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة النوتريات .  
انواعها المعروفة خمسة . جميعها جنيات معمرة فراء .  
اوراقها معنقة ، جامدة النصال السنائية الشكل ، الجميلة الخضار اللامس . ازهارها جملة ، كبيرة ، خاسية البتلات الملونة ، عديدة الاسدية الصفراء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وَدِيْثِرِيَّات \* Winteraceae (S).  
Wintéracées (F). Winteraceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القمالات .  
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جزر الزايج ||  
جميع نباتاتها شجيرات وجنبات فراء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، نصالها سنائية جامدة . ازهارها عثكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة جملة القالب ملونة ||  
اشهر اجناسها الوديثير .

٣٠٨٨٢ - وَدَس هو الغساس المتوج ، اطلبه .

٣٠٨٨٣ - وَدَكَ ، وَدَكَ حَضَنَ Couver (F).  
وندك الطائر : حضن البيض .

٣٠٨٨٤ - وَدَنَكَا هي القضا ، اطلبه .

٣٠٨٨٥ - وَدَمَة ، وَدِيم سلح الذباب .

٣٠٨٨٦ - وَدِيْلَة ، وَدِيْلَة Vanille (F). Vanilla (E).  
ثمره الونيلية وهي على شكل سفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَدِيْلِيَّة ، وَدِيْلِيَّة Vanilla (S).  
Vanillier (F). Vanilla-plant (E).  
جنس نباتات مدادة عارشة من فصيلة السحليات .  
انواعها عديدة ، اعطائها المناطق الحارة ، معظها بري وبعضها  
تربتي وصناعي || اشهر انواعها الزراعية الونيلية المنبسة  
الورق .

٣٠٨٨٨ - وَدِيْلِيَّة مُنْبَسَطَة الْوَرَق \*  
Vanilla planifolia (S). Vanillier commun (F).  
Common vanilla-plant (E). Echter Vanille (D). Vaniglia,  
Vanigliero (I).  
اشهر انواع الونيلية واعماها زراعة . جنبها قصبة عارشة متدللة . اوراقها معنقة متعاقبة منبسة الصفحة قليلة

العمل . حوافها دقيقة مستطيلة تقابل الاوراق . ازهارها عثكولي التجميع عمودي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد عطرية العرف . ثمارها سفية الشكل مستطيلة لا تصلح



وديثير



ونيلية منبسة الورق



وهلنيرجيه



۳۰۹۰۶ - وَهَيْجِيَّة ٥  
Faculaire (F).  
نمت منسوب الى وهيجة الشمس .

۳۰۹۰۷ - وَئَلَار ٥  
Carrière de terre glaise (F).  
Quarry of clay (E).

هو محفر الطين الذي تلاط به الحياض وغيرها منها  
لرشح الماء .

۳۰۹۰۸ - وَبِيَّة ٥  
الويه طائر يعرف بالطيطوى الخيسال ، اطابه . وهي  
ايضاً نبات غزام الصباغين .

۳۰۹۰۹ - وَئِج ٥  
Age de la charrue (F).  
Plough-beam (E).  
هو سلب الخراش الجامع لساير اجزائه .

۳۰۹۱۰ - وَرَاتَرِين ، وَرَاتَرِين ٥  
Vératrine (F).  
Veratrine, Veratria (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بذور الخربق  
الابيض . تستعمل طبياً ضد الحميات والالتهابات .

۳۰۹۱۱ - وَغَنْدِيَّة ٥  
Wigandia (S).  
Wigandie (F). Wigandia (E).

نبات معقود التعريف عل اسم الطبيب « وغاند » . مجلة  
معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة التجميات . مهدها  
بعض مناطق بوليفيا || مجلّتها تملو نحو ثلاثة امتار .  
ساقها قليلة الفروع متكاثفة الغماء الجامد الشائك . اوراقها  
متعاقبة ، معتقة ، متعجبة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها  
نحو ٩٠ سم . وعرضها نحو ٥٠ سم . صفحاتها العليا الى  
الخضار البحري . صفحاتها السفلى كثيفة الغمل ، فضية  
المواج || ازهارها سستيمى قرق . ازهارها كبيرة ، عقرية  
الشكل ، بنفسجية اللون ، خليسة التويج || تنويرها  
يستمر طوال شهر نيسان .

۳۰۹۱۲ - وَئِنْ ٥  
Raisin noir (F). Black grapes (E).  
هو العنب الاسود اللون من اي ضرب كان .

كاوراق الصمتر تطول نحو ٣ سم . نصالها خلية فضية  
المواج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حر الكؤوس ،  
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف .

۳۰۹۰۲ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةُ الْوَرَقِ ٥  
Wahlenbergia hederacea (S).

Wahlenbergie à feuilles de lierre (F).  
منتجها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا ، يكثر وجودها  
في المناقع وعل الضفاف الرملية . ساقها نجيله مستقيمة  
تطول نحو ٣٠ سم . اوراقها كاوراق المشقة شكلاً وقدأ .  
ازهارها فردية ، مستطيلة المالحق ، زرقاء اللون ، قطرها  
من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى  
تشرين الاول .

۳۰۹۰۳ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ ٥  
Wahlenbergia graminifolia (S).

Wahlenbergie à feuilles de graminées (F).  
مهدها يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط .  
ساقها تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها عصفية الشكل  
كاوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء  
اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران  
الى آب .

۳۰۹۰۴ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كَرَوَاتِيَّةٌ ٥

Wahlenbergia croatica (S).  
Wahlenbergie de Croatie (F).

مهدها كرواتية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم .  
اوراقها سنانية خفيفة تطول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها  
بنفسجية التويجات والكؤوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو  
٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

۳۰۹۰٥ - وَهَيْجِيَّة ٥  
Facule (F). Facula (E).

الويجة بقمة اكثر تاجباً ولعناً من غيرها في القصر  
الشمسي . ج وهائج .



وغندية



ي

### ٣٠٩١٨ - ياسم ، قغو ، وثافية ، نزار أبيض

Ligustrum (S). Troène, Prûne, Bois noir (F). Privet, Priry, Prim (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baclare, Ligustro, Lamitra, Rovistica, Olivella, Mimolo (I).

جنس نباتات برية وريضية من فصيلة الزيتونيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها زريبي . نباتاتها تختلف الاحجام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات . سوقها فراء فناء . اوراقها معنقة متقابلة ابيدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل . ازهارها مستحبة العرف صغيرة القذ عكوكية التجميع تاجية الارتكاز او هامة || تزور في الحداث والبساتين للتسييح وعلى جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة اثار || اشهر انواعه الزيزينية ما يتبع .

### ٣٠٩١٩ - ياسم بيضي الورق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنية صغيرة القذ فناء . اوراقها بيضية الشكل عابلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر الموج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحداث المرتبة المصممة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعجيل .

### ٣٠٩٢٠ - ياسم صيني

Ligustrum sinensis (S). Troène de Chine (F).

شجيرة سريوية فناء تملو نحو ٤ اثار . تصلح للزئين ولصد الرياح . اوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار المايق || تتكاثر بالتعجيل وبالزور .

### ٣٠٩٢١ - ياسم صيني الورق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنية متوسطة القذ تملو نحو ٢٥٠ سم . ساقتها فناء . اوراقها

Hortensia (F).

### ٣٠٩١٣ - يابانية

نبات زريبي يدي ايطاليا ، اطلبه .

Baoris zelleri (S).

### ٣٠٩١٤ - ياروز الارز \*

حشرة من الحسيرييات ، فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٣٠ م . فوها الى الي الزبي الموج . رواشها الامامية مبقجة بالابيض . رواشها الخلفية حطية اللون برتقالية الموج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . يرقاتها تنفق على عصف الارز فتلهن النصال وتؤدي النبات .

Adopaea actaeon (S).

### ٣٠٩١٥ - ياروز المرعي \*

حشرة من الحسيرييات ، فراشها تطول نحو ٢٨ م . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . رواشها حطية اللون زيتية الموج زهو في الذكور وتيق في الاناث || يكثر وجودها من بموز الى آب . يرقاتها تركب الزروع والمرعي فتؤذيها اذا كثر عددها .

Adopaea lineola (S).

### ٣٠٩١٦ - ياروز التجليات \*

حشرة من الحسيرييات فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٢٦ م . في الذكور ولاناث . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . رواشها برتقالية اللون حطية الخمار والتسليج . يكثر وجودها من بموز الى آب . يرقاتها تركب عصف التجليات فتؤذيها .

Termite femelle (F).

### ٣٠٩١٧ - ياروز

She termite (E).

هي الارضة الاثى الكاملة الاعضاء التناسلية . وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية .



ياروز الارز



ياروز المرعي



ياروز التجليات

عروة. نصلها غريق الصفحة، اخضر اللون، جوي الملمح. تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

### ٣٠٩٢٢ - باسم كثيف الورق

*Ligustrum compactum* (S). *Troène compact* (F).  
جنية زربية صغيرة القد كثيفة الالوان. اوراقها دائمة اهليلجية الشكل، نصلها جبل الخضار العابق || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

### ٣٠٩٢٣ - باسم معروف\*

*Ligustrum vulgare* (S). *Troène commun* (F).  
جنية سبروتية شائعة الاستعمال التريبي. ساقها فراء فناء. اوراقها ابيدة اهليلجية الشكل مدببة الطرف جميلة الخضار القائم الجوي الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

### ٣٠٩٢٤ - باسم ياباني

*Ligustrum japonicum* (S). *Troène du Japon* (F).  
جنية سبروتية شائعة الاستعمال التريبي ولصد الرياح. ساقها فراء فناء تملو نحو ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة نصلها اهليلجي الشكل، لسن الزام الاخير، اخضر اللون. فستى الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالبزور.

### ٣٠٩٢٥ - ياسمين\*

هو الياسمين، اطله.

### ٣٠٩٢٦ - ياسمين\*

*jasminum* (S). *ياسمين* (D). *Gelsomino* (I).  
جنى نباتات معمرة برية وزراعية من سبط الياسينيات وفصيلة الزيتونيات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها بري وبعضها زراعي تريبي وصناعي || سوقها فراء عارشة. اقلها جالسة الانتداب. اوراقها متعاقبة مركبة، وريقاتها لا قياسية التجميع والشكل. ازهارها جميلة المنظر مخلفة الالوان يكثُر فيها الالبيش ثم الاسفر والاخر. بعضها فواح العرف العطري يستخرج منه دهن فاخر الصنف مرغوب فيه || يتكاثر الياسمين بالترقيد. يوجد في جميع الارضية اغصان الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه يخفى الرطوبة المستحكة || اشهر انواعه ما يتبع.

### ٣٠٩٢٧ - ياسمين ابيض، ياسمين مخزني، ياسمين معروف

*jasminum officinale* (S). *jasmin commun*, *J. blanc* (F). *jasmine of poetry*, *White flowered jasmine* (E). *Echter jasmin*, *Weisser jasmin* (D). *Gelsomino bianco* (I).

نوع من الياسمين السبروتي المبدول. اقله البلاد المعتدلة الحرارة المنفردة نحو الحارة. جنيته متقلبة تملو نحو ٩ امتار. فروعه متعاقبة مضلفة المقطع والزاويا. اوراقه متعاقبة، وريقاته وريته الترتيب لا قياسية التجميع والعدد منها الخماسة والسباعية والتساعية. لوها الى الخضار العابق. نصلها دمل الصفعة || ازهاره عشكولي التجميع عوري الارتكاز. ازهاره متفوعة العرف العطري المستحب، لوها ابيض بلق || تنوره يستمر من ايار الى ايلول.

### ٣٠٩٢٨ - ياسمين أزغب

*jasminum pubigerum* (S). *jasmin à duvet* (F).  
نوع من الياسمين السبروتي. يعيش في جميع الاقاليم المعتدلة. بجلة منتصبة تملو نحو ١٥٠ سم. اقلها مضلفة الزوايا. اوراقها متعاقبة، مركبة، وريته الترتيب، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات. وريقاتها اهليلجية الشكل، نصلها ازغب الصفعة السفلى، غلى العليا. ازهارها عشكولي

التجميع. عشكولها يمد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة القد، صفراء اللون، خابطة العرف || تنورها يستمر من اذار الى تشرين الاول.

### ٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني، ياسمين كبير الزهر

*jasminum grandiflorum* (S). *jasmin d'Espagne*, *J. à grandes fleurs* (F).  
نوع من الياسمين السبروتي. زراعه الصناعية شائعة لاستخراج دهنه العطري. جنيته تملو نحو ٣ امتار اوراقه متعاقبة، وريقاته وريته التجميع لا قياسية العدد. لوها الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفعة. ازهاره عشكولي التجميع، عوري الارتكاز. ازهاره كبيرة القد، لوها الى البياض الموشع بالوردي، عورها فواح الرائحة الاخاذة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين.

### ٣٠٩٣٠ - ياسمين اصفر، ياسمين البر

*jasminum fruticosum* (S). *jasmin à feuilles de cytise*, *J. frutescent* (F).  
نوع من الياسمين المبدول. جنيته تملو نحو ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة مركبة. وريقاتها لرائية الشكل صغيرة القد تملو شفعية الترتيب، ثنائية او رباعية التجميع || تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

### ٣٠٩٣١ - ياسمين آصوري

*jasminum azoricum* (S). *jasmin des Açores* (F).  
نوع من الياسمين، اقله البلاد المعتدلة المنفردة نحو الحارة. جنيته عارشة. فروعه متعاقبة اسطوانية للمقطع. اوراقه مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها جامد الصفعة اللامعة. ازهاره عشكولي التجميع عوري الارتكاز. ازهاره بيضاء اللون، متوسطة القد، فواحة العرف المستحب || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

### ٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

*jasminum beesianum* (S). *jasmin de Bees*, *J. de Chine* (F).  
نوع من الياسمين السبروتي وهو بجلة معمرة صغيرة القد تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل، سنانية الزام الاخير؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وهو جامد الصفعة فستى اللون. ازهارها عطرية العرف، حراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع او فردية. تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

### ٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

*jasminum odoratissimum*, *J. suaveolens* (S). *jasmin suave*, *J. jonquille* (F).  
نوع من الياسمين السبروتي. منته جزر كناري وماويرا. جنيته تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وانادها اسطوانية المقطع. اوراقها متعاقبة، مركبة، وريته الترتيب، ثلاثية او خماسية التجميع، وريقاتها ابيدة، نصلها بيضي الشكل مقطوع القاعدة. ازهارها ثلاثية التجميع، صفراء اللون، فواحة العرف المستحب || تنورها يستمر من نيسان الى تشرين الثاني.

### ٣٠٩٣٤ - ياسمين آخر

هو الكموكلت، اطله.

### ٣٠٩٣٥ - ياسمين الليل

هو شرخات الليل، اطله.

### ٣٠٩٣٦ - ياسمين زنبقي

هو الفل، بجلة زربية عطرية، اطلها.



ياسمين صيني



ياسمين معروف



ياسمين

٣٠٩٥٢ - يَاسَمِين (F). Dextrorse (E). يَاسَمِين ٥

يامن م. يامنة. نمت تعريف يطلق على كل ساق نباتية متسلقة دورتها اللولبية من اليسار الى اليمين.

٣٠٩٥٣ - يَأْمُور \*

Capreolus capra, Cervus capreolus (S). Chevreuil (F). Roeubuck, Roedeer (E). Rehwild (D).

حيوان لبون يجبر من فصيلة الايليات. جسمه يطول نحو ١١٥ سم. ويصلو ٧٤ سم. أما ذنبه فهو نحو ٢٥ سم. ثوبه الى الحمرة الخفيفة المواج وهو اغبر البطن، ابيض العجز. قرنه مثلث الشعب يتصله كالأليل. موطنه اجراج الشرق الاوسط وأوروبا الغربية والوسطى. يعيش جماعات قليلة العدد. اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث. الانثى تحمل ٥ اشهر وتضع من يعفور الى ثلاثة.

٣٠٩٥٤ - يَأَسْنُون \* Anis (F).

هو الأيسنون، اطلبه.

٣٠٩٥٥ - يَأَسْنُون بَرِّي

هو الكمن الحثبي، اطلبه.

٣٠٩٥٦ - يَأَنَع Mature, Mûr (F). Mature (E).

نمت تعريف يوصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت دور الادراك ودخلت في دور الايناع.

٣٠٩٥٧ - يَأَثُوف \*

جنس حشرات فراشية من فصيلة المسيريات. انواعه المؤذية قليلة. اجسامها نحيلة القد تطول نحو ٢٨ مم. في الذكور والاناث. رواشن ذكورها حطيفة اللون يبيض التجذيع والزركشة. رواشن اناثها بنية اللون حر التقيج والتجذيع || يكثر وجودها من ايار الى حزيران. يرقاتها تركب النجيليات دون ان تؤذيها شديدة الاذى.

٣٠٩٥٨ - يَأُثُونُ النَجِيلَات \*

Pamphila sidae (S). Pamphile des graminées (F). Pamphila sidae (E).

حشرة من فصيلة المسيريات ورتبة ضفاريات الاجنحة. موطنها الشرق الادنى وبعض الاصاقع الاوروبية. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقتها تميش على عصف النجيليات | جسمها متوسط القد ودرني الشكل يطول نحو ١٤ مم. بسطها نحو ٢٩ مم. رأسها كبير الطرم. بني اللون. عينها كيرتان ناثرتان. زبانها صولجانيان. جوشها وبطنها الى الخنطي الشديد السرة. زغب طوقها السرمي الى الشقعة || رواشن الذكر الى الخنطي يملو تقيج وزركشة صناية. الزوج الاسامي اكثر زركشة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقط صغيرة جميعا الى السرة القائمة. رواشن الانثى الى البني يطلو تقيج احمر وتجذيع اشجع اكلس وبعض نقط صغيرة غبراء اللون || لها جبل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار. تعامل بل ظهورها بنحو سبعة اسابيع وتحت المكن مبيحاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستقيم الوسط، مبهر الهلب، ارمك اللون يطلو تمشج اسم. رأسها ونديها ودواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر يتقضي داخل صليجة تحببها السرفة بين اوراق الاشجار الابيدة.

٣٠٩٣٧ - يَاسَمِين عَرَائِيلِي

هو صريمة الجدي الشائعة، اطلها.

٣٠٩٣٨ - يَاسَمِين هِنْدِي

هو الفتنة، اطلها.

٣٠٩٣٩ - يَاسَمِينِيَّات

Jasminacées, Jasminées, Jasminiacées, Jasminidées, Jasminariées (F).

سبط من فصيلة الزيتونيات، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها أليابا، نباتاته جنبات وجنبنيات فرعاء السوق. ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة، خماسية التركيب، بعضها عطر فواح العرف المستحب.

٣٠٩٤٠ - يَاسْتَعُوس Jacinthe (F).

هو الجاسنت، اطلبه.

٣٠٩٤١ - يَاسْكِيد Alzoon (F).

جنس نباتات برية وتريبتية من فصيلة الظهريات مشهور باسم حندق، اطلبه.

٣٠٩٤٢ - يَأْ عَرَال دُور دُور. Erodion clutin (F).

هو ابرة الجوز، اطلها.

٣٠٩٤٣ - يَأَلَع Adulte (F). Adult (E).

ياقع، بالغ، ملك، شوب، مشب، نعت تعريف لمقى واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طورى اللتوة والشيوخنة.

٣٠٩٤٤ - يَأَلُوح Fontanelle (F).

فرجة غشائية في الجمجمة. Fontanel, Fontanelle (E).

٣٠٩٤٥ - يَأَلُوح Sinclut

هو قة الرأس يقابله التقن.

٣٠٩٤٦ - يَأَلُوكَة Ephémère (F).

حشرة تعرف بأبنة يوم، اطلها.

٣٠٩٤٧ - يَأَلُوفِيَّات Protephemera (E).

رتبة حشرات صغيرة القد نحيلة الجسم من طبقة البيويات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، جميعها من الحوام التي تقضي حياتها البرقية في الماء.

٣٠٩٤٨ - يَأَلُوت Corindon (F). Corundum (E).

حجر كريم شفاف، صلب الجسم رزينة، اجوده اصفاء. وهو يختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاخضر والازرق.

٣٠٩٤٩ - يَأَلُوتُ أَحْمَر

هو اللؤل، اطلبه.

٣٠٩٥٠ - يَأَلُوتُ زَهْرَفَانِي Hyacinthe (F).

ضرب من سيليكات الزرقون، وهو حجر كريم زعفراني اللون يوجد عادة في بعض طلع البراكين.

٣٠٩٥١ - يَأَلُونُ \* Polymnia edulis (S).

Yacon (Poire de terre) (F).

نبات حولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من الدهلية. منته البلاد الحارة الامريكية. جذوره صقولية. ساقه فرعاء. اوراقه متعابلة منعقة سنائية التصل المزرواني الحانة. يستخرج من عساقله مادة نشوية مأكولة وصناعية يستغل منها بعد تحميرها بعض الكحول الشائعة الاستعمال.



يَاسُون



يَأْمُور



يَأُثُونُ



يَأُثُونُ النَجِيلَات



نباتية



بيد



بيروج مخزني



بترومة

## ٣٠٩٦٦ - بَترُوح، لَفْاح، مَندَرَجُور، مَندَرَاك لَفْاح المَجانين، لَفْاح الجِنِّ

Mandrake (S). Mandragore (F). Mandrake, Devil's apple (E). Alraun, Hundsapfel (D). Mandragora, Mano di gloria (I).

البُروج عبر التاريخ : اصل الاسم العلمي من المبروطاني ويطلق مَندراغور . أما لفظة بروج فهي مبريانية ومعناها ناقص الروح وذلك لان شكل جذره هذا الثابت يشبه جسم الانسان . وقد ورد ذكر البروج كسكن في بعض الاساطير الفروسيّة المألفة الى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد . وقد استعمل منبوا عند الاشوريين وصنعت منه مرام مخدرة في عصر الولادة وآلام الانسان . وكان القدماء يستعملون الجذور والاوراق كخدر للاصصاب في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المقلوبة . وقيل ان جذره المشدودة اذا تقطعت في الخلل كانت مقوداً جنسياً عظيماً . وكان ايضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس افروديت .

تخليته العلمية : جنس نباتات مقرية ، عشية ، طيبة ، ممررة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سوقها جنود لينة لحية تلتصق فيها الازداجية . شكلها شكل جسم الانسان . اوراقها قرصية الارتكاز ، كبيرة القد ، معنقة . نصلها رافع الصفحة ، متمع الحافة . ازهارها متصلة القد ، كثيرة العدد ، فردية التجميع تقوم على مائلي قرصية الانتشاب . الوانها مختلفة مابا الابيض والازرق والاحمر والبنفسجي . ثمارها باذنجانية مستديرة . جذورها وثمارها واوراقها تحوي مادة مخدرة عنصرها كمنصر الاثروبين ان لم يكن اقل || اعرف انواعه واشهرها البروج اخجري .

## ٣٠٩٦٧ - بَترُوح مَخزُني \*

Mandrake officinarum (S). Mandragore officinal (F).

نوع من البروج وهو نبات مقرى طبي بري وزراعي . مهدد المقدد الشرق الاوسط . ساقه جذرية ، حزنانية الشكل ، فرقة ، لونها الى الخلفي الاسمر . اوراقه قرصية الانتشاب ، معنقة ، كاملة ، مستطيلة . نصلها سبك الصفحة متمع الاطراف . ازهاره فردية التجميع ، قصيرة الماعلي المنصبة . بيضاء اللون ، خضرار المواج . ثماره مستديرة ، كبيرة القد . راجع خواصه الطبية في المادة السابقة .

## ٣٠٩٦٨ - بَترُوق

Picrasma (S). Picrasme (F). Picrasma (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزيينية من فصيلة السمروبيات . مهدد الشرق الاقصى . ساقها مسطحة الصفا حراء اللون مبقية بالاصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . اوراقها مركبة . وريقاتها تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها علقي التجميع . ازهارها الذكرية رباعية الفصل والنباتات والاسدية . ازهارها الانثوية خنثية المياس . احشائها صلبة صفراء اللون . لحاء السوق والاصقان مرة الطعم طيبة .

## ٣٠٩٦٩ - بَترُومَة \* ، وَسَابِي \*

Eutrema wasabi (S). Wasabi (F).

نبات بقل معمر من فصيلة الصليبيات . مهدد اليابسان . ساقه حزنانية مستطيلة . اوراقه قرصية الانتشاب ، غليظة الاضلاع ، كبيرة النصال القليلة الشكل . شراخه الزهري يملو نحو ١٠٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره

Potomagalus velox (S). Potomogale véloce (F).

حيوان وحيد الجنس والنوع من فصيلة البليبيات . اصطناعه بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف الوبر الناعم ، يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم . راسها شبه مخروطي الشكل ، مستدير الخلف . اسنانها صغيرة ، متراصة ، حادة الاطراف ، عددها ٤٠ . ساقها متوسط الكثافة والصلابة . عينها كبريتان لوزيتان . اذناها مستديرتان صغيرتان . ذنبها شبه مردي الشكل جلل الوبر . قوائمها قصيرة . ثوبها الى السرة يملوها في الراس والظهر مواج ارجواني . ابطاها ويطنها الى البياض البني || تتميز بخلو هيكلها العظمي من الترقوة || تألف صفات مجاري الماء . قوتها الاسماك والمظاء والافاعي والغشرات الكبيرة .

٣٠٩٦٠ - بَيبَاجِيَّات \*  
Potomagalidés (F). Potomagalidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حائرة وحيمة الجنس والنوع تشبه القفصاعة تعيش على صفات مجاري الماء || نوعها الوحيد البياية .

٣٠٩٦١ - بَيبَاجِيَّات \*  
Dothidéacées (F). Dothideaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة المشويات ورتبة الرقبات . تتميز بأساسها المركبة المحققة القائمة على رزمة لاجولية . انفلاقها يحصل في مق ساهها المستديرة || اجناسها التي تتم الانتفاذ الزراعي قليلة وهي التبيكة والديمية والديوريون والنيخية .

## ٣٠٩٦٢ - سَيسَند \*

Sesleria (S). Sestérie (F).

جنس نباتات عشية ممروعة من فصيلة النجيليات . انواعه قليلة العدد . سوقها خماسية او سداسية الاشطاء ، دقيقة القصب ، ثنائية او ثلاثية السلايات . عصفها ضيق النصل المستطيل . ساقها اسطوانية الشكل ، صغيرة القد . يكثر وجودها في الاراضي الجبلية الكلسية للمساة . اشهر انواعها ما يتبع .

## ٣٠٩٦٣ - سَيسَند اُزُوق

Sesleria caerulea (S). Sestérie bleue (F).

نوع من اليبس البروتي المبدول . عشية سداسية الاشطاء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . عصفها مستطيل النصل المحجن يعرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة القد اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ م . قطرها ٧ م . ساقها الى الزرقة الجميلة . يوجد في الارتفاع الكلسية القليلة او المتوسطة الرطوبة .

## ٣٠٩٦٤ - سَيسَند فُصِّي \*

Sesleria argentea, S. nitida (S). Sestérie brillante (F).

نوع من اليبس البروتي المبدول . عشية خماسية الاشطاء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . عصفها مستطيل النصل المقوس يعرض نحو ٢ م . ساقها مستطيلة لونها الى الزرقة العابقة يملوها مواج فصي .

## ٣٠٩٦٥ - بَيرُوكَة

Feuille de vigne (F).

البيركة ورقة الكرمة . ج يرق . وتدعى ايضاً الخُلب .

الارتكاز . ازهارها وردية اللون مشيرة بالارجواني . بتلاتها مهدبة الخمار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٠ - يُثْمَر عَطِير (S). *Adenandra fragrans*  
٣٠٩٨١ - يُثْمَر عَطِير (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليثوم الزينبي . ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم .  
اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها منبسطة مرطاه جملة  
الخضار الزاهي . ازهارها عتيق التجميع ، طري الارتفاع .  
ازهاره مستطيلة المالحق ، وردية اللون ، مفرسة الفصل  
والبتلات ، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال  
شهر ايار .

٣٠٩٨١ - يُثْمَر قَرْدِي الزَهْرَة

(S). *Adenandra uniflora*  
(F). *Adenandra à fleurs solitaires*

نوع من اليثوم الزينبي . ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم .  
اوراقه سنائية الشكل ، مدببة ، شاذكة . نصالها ملتفة  
الاطراف . ازهارها فردية التجميع ، طرية الارتفاع ،  
بيضاء اللون من الداخل ، وردية من الخارج || تنويرها  
يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٩٨٢ - يَجُوح ٥ (F). *Halophile*  
نمت تمرني يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر لتغانيا  
في الارربة المالحة .

٣٠٩٨٣ - يَحْبُور (F). *Ourarde (mâle)*  
ذكر الحباري .

٣٠٩٨٤ - يَحْمُور (F).  
قد يكون الياصور . قال الجاحظ في وصفه : « دابة  
وحشية نافرة لما قران طوليان كأنها مشاران . وقرونه  
كفرون الأيل وفي صامتة لا تجوف فيها وهو أسرع من  
الأيل » .

٣٠٩٨٥ - يَحْمُور (F). *Hémoglobine*  
(E). *Hemoglobin*  
مادة آسية يتألف منها غضاب دم الفقريات .

٣٠٩٨٦ - يَحْمُور (F).  
طائر من الفقنق ، يدعى الفقع المدسي ، اطلبه .

٣٠٩٨٧ - يَحْمُور (F). *Oena*  
هو الحنسة ، طائر من الحاميات ، اطلبه .

٣٠٩٨٨ - يَحْمُور \* (F). *Erythrinus*  
(F). *Erythrin*

الواحدة عيشية . جنس اسماء نهرية من مفتوحات الماشاة  
وفصيلة القرصانيات . انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر  
وعجيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة ، شبه  
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها  
مستطيلة مقنونة كبيرة الاشداق . زعانفها الظهرية كبيرة  
متبوعة بزعانفتها منخمية صغيرة . زعانفها الذيلية مستديرة  
الاطراف . اوتابها تراوح من الخضار اللامس الى الغضار  
الاسفم . بطونها فضية || لحوبها مأكولة ، متوسطة  
الصف .

٣٠٩٨٩ - يَحْمُور (F). *Gazon*  
هو الخضر والخضرة . ج يخاضير .

صغيرة القد ، بيضاء اللون . ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر  
بالزبر والفصال ، يرغب في المواقع الرطبة الظليلة وفي  
الارربة الصلصالية الرطبة الوارفة العناصر الغذائية .

٣٠٩٧٠ - يَتَوَح ٥ (F).  
هو الفريون ، اطلبه .

٣٠٩٧١ - يَتَوَح السُحُور (F).  
هو فريون الفجر ، اطلبه .

٣٠٩٧٢ - يَتَوَح الكُنْكِس (F).  
هو الفريون الاسريكي ، اطلبه .

٣٠٩٧٣ - يَتَوَح هِنْدِي (F).  
هو فريون الاقدمين ، اطلبه .

٣٠٩٧٤ - يَتَوَحِيَات (F).  
فصيلة نباتية تعرف بالفريونيات . اطلبه .

٣٠٩٧٥ - يَتَمَّ (F). *Michauxia*  
(S). *Michauxie*  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية محولة ومعمرة من  
فصيلة الجرسيات . انواعها المعروفة قليلة متبها الشرق  
الادق . سوقها متمسكة . اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة  
العدد . ازهارها ابيلة الارتكاز ، كبيرة القد ملتفة البتلات .  
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٩٧٦ - يَتَمَّ إِثْرَانِيَّة (F). *Michauxia levigata*  
(F). *Michauxie à tige lisse*

نوع من اليثمة المحولة . مهدبا بلاد ايران ، ساقها مرطاه  
فرداه تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها جامدة النصل  
الاذغب . ازهارها بيضاء اللون ، فردية التجميع ، ابيلة  
الارتكاز تملو الساق والفروع . تنويرها يستمر من تموز  
الى آب .

٣٠٩٧٧ - يَتَمَّ سُورِيَّة (F). *Michauxia campanuloides*  
(F). *Michauxie fussee-campanule*

نوع من اليثمة المحولة ، مهدبا الجبال السورية واللبانية .  
ساقها فرداه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . بشرتها حلوية  
الزغب الشاذك . اوراقها جامدة النصل الاذغب . ازهارها  
وردية او بنفسجية اللون ، فردية التجميع ، ابيلة الارتكاز ،  
مبشرة على الساق والفروع . تنويرها يستمر من حزيران  
الى آب .

٣٠٩٧٨ - يَتَمَّ (F). *Adenandra*  
(E). *Adenandra*

جنس جنبات برية وتربينية معمرة من فصيلة السذابيات .  
موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية . سوقها  
فرداه قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ابيلة  
متباعدة الاشكال . ازهارها خاسية الفصل والبتلات ،  
عشادية الالدية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها  
الثلاثة التالية .

٣٠٩٧٩ - يَتَمَّ صِيَوَانِي (F). *Adenandra umbellata*  
(F). *Adenandra en ombelle*

نوع من اليثوم الزينبي . ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .  
اوراقه سنائية الشكل صغيرة القد تطول من ٢ الى ٣ سم .  
وتعمر من ٤ الى ٦ م . نصالها مهدبة الاطراف ، خلية  
الصفحات السفلى . ازهارها صيواني التجميع ، طري



بخشوش



يدصور الحور



يدصور المصفاص



براعة



يربود

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والعريط . تتميز بلين القشار وبالعصيان في الظلام وبغارق الشكل الخاربي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجمنه ، اناثها مداري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ م . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ م . ثوبها الى البني الاسمر ، يتحرف الى الجوزي عند الذكر ويهبط عند الانثى . رأسها صغير الحجم كذاها ذربان . عيناها صغيرتان . زباناها غطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القد وهو عند الانثى جدمة تركيز على التربة الاولى . ارسافها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتميش حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تسافد في اوائل حزيران تتجمع المكن ميحاديا تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطله الشكل ، سداسية الرواجب سمره اللون ، تميش في اول عهدها على المواد العضوية ثم تم ما تقترسه من البزاق والحلزون .

### ٣٠٩١٧ - براعة شرقية ، حُباب شرقية ، بَصْبُوس الليل الشرقي

*Luciola orientalis* (S). *Luciola orientalis* (F).  
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة ناعمة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاماكن التي ترتادها البراعة السجوية وهي اكثر انتشارا منها واشد بصيصا في الظلام واناثها بجمنه كالكذكور || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ م . ويطول عند الانثى نحو ١٦ م . ثوبها شائي اللون ، جزوي الرأس والظهران ، حطلي الكويل والجانحة والجرازم . رأسها صغير الحجم ملحوف بالكويل . زباناها مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهورها يلحف كامل البطن . بطنها مبطل ، اسمر اللون . ارسافها خماسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتميش حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والعريط . وهي كالبزاق السجوية تمارس الهضم الاستقبالي فتحقق ضيحتها برضاب ذفاني المادة ثم تعقبه بسائل ليزيني يحل النسيج ويذيبها ثم تشربها بفكها الاجنوبي || البرقة مبطله الشكل ، سداسية الرواجب ، سمره اللون ، مقلده المواج وهي الحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٦٠ يوما ينقضي في التربة تحت الحجارة .

### ٣٠٩١٨ - برَاعِيَّات

*Lampyridae* (S). *Lampyridae* (F). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). *Leuchkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من عُمديات الاجنحة ، ليات البشرة . صغرات القد ، مستطيلة الشكل ، تنضج في الظلام لان تربياتها الطرية تحمل عدداً سفورية بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها المعروفة نحو ٥٠٠ أما انواعها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكورها الجمنه واناثها للمدري . وهي تعتبر من الحشرات الناعمة لانها تقضي على بعض الدويبات الفاسدة بالزراعة .

### ٣٠٩١٩ - يَرَبُود

*Cyclamen* (F). هو السكع ، اطليه .

### ٣١٠٠٠ - يَرَبُود

*Rhizothorus* (S). *Rhizothorus* (F). *Rhizothorus* (E).

طائر من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . موطنه ماليزيا .

### ٣٠٩١٠ - يَدِ الْجَوَزَاء

*Baudrier d'Orion* (F). يد الجوزاء ثلاثة كواكب وباصه من كوكبة الجوزاء . راجع تقار الجوزاء .

### ٣٠٩١١ - يَدِ صُورِ الحَوْر

*Idiocerus tremulae* (S). حشرة من فصيلة الزيديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ م . جسمها غرطوي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها حطلي اللون . رأسها واطراف جناحها الى الخضار الاطلح الباهت . مدها حطلي اللون اسمر الحمار والطرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .

### ٣٠٩١٢ - يَدِ صُورِ المَصْفَاص

*Idiocerus ustulatus* (S). حشرة من فصيلة الزيديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . جسمها غرطوي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها خيطية قصيرة . ثوبها الى الخضار الاسمع المواج . مدها اسمر تركب المصفاص دون ان تؤذيه .

### ٣٠٩١٣ - يَدِ صُورِ أَلَيْف

*Idiocerus socialis* (S). *Idiocerus social* (F). حشرة من فصيلة الزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اصفر اللون . خطمها معتدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها قصيرتان ، غحيلان . كويلها قليل الاحتداد اصفر . حجبها بحرسه صفراء . ظهورها كامل الحنجية ، لاحف ، حطلي اللون يطولو مواج اسمر . وريشها غشائيات ، شفافة . بطنها اصفر اللون على صفحتيه . قوائمها بكيفية الملب الشائك || تألف جميع المواقع التي يكثر فيها الاشباب والاشجار . قوتها التسنج تحمص من الاوراق .

### ٣٠٩١٤ - يَدِ مَيْمُونَة ، يَدِ مَيْمُونَة

*Idesia* (S). *Idésie* (F). شجرة برية ورتبة من فصيلة النضيات . مدها الصين واليابان . ساقها منتصبه تعلو من ١٢ الى ١٧ م . اغصانها فارقة نظامية الارتكاز . اوراقها عابله ، متعاقبة ، معنقة ، رعية الشكل ، مستطيلة المنق . فصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها وسيدة الشق ، عادية القلعة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها عشكولي التجميع ، بحوري الارتكاز . عشاها متدللة . ثمارها عنبة الشكل والقد يرتقاية اللون || تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

### ٣٠٩١٥ - يَرَاعِيَة ، حُباب

*Lampyrus* (S). *Lampyre*, *Ver luisant* (F). *Firefly* (E). جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبطله الجسم ، من فصيلة البراعيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ جميعها من ليات البشرة يضيئ في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكورها تسرح في الليل للاعتداه الى اناثها للمدري . اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الزبادي والبي .

### ٣٠٩١٦ - يَرَاعِيَة دُجُوجِيَة ، حُباب دُجُوجِيَة ، بَصْبُوس الليل

*Lampyrus noctiluca* (S). *Lampyre nocturne*, *Ver-luisant* (F). *Firefly*, *Glow-worm* (E). حشرة مفترسة ناعمة من فصيلة البراعيات ورتبة مفدمات

جوي الرقطة الصناعية التبدل . رقلته لا قياسية الحجم والشكل صدره وبطنه الى البياض الناصع || موطنه يتعد من ايران والانفان واغند الى التبت . يألف الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يَرَبُوعُون**  
Pernoptère mâle (F).  
He percnopterus (E).  
اليربوع واليربوع واليربوع هو الذكر من الربوع .

٣١٠٠٨ - **يَرْد**  
Yard  
وحدة قياس الانكليزية تساوي ٩١٤٣٨٢ م . يقال اخذت عن طول سيف الملك هنري الاول || كسور اليرد القدم والبوصة . القدم او الفوت يساوي ٣٠٤٨ م . والبوصة او الانش تساوي ٢٥٤٤ م . فاليرد يساوي اذًا ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يَرْدُون**  
Monstera (S). Monstère (F). Ceriman (E). Küstlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).  
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القاسيات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهدها البلاد الامريكية . معظمها حول ويمضها معمر . اوراقها مزديجة التصنيف . ازهارها حرة . ازهارها صغيرة لاطعة وصيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشور في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - **يَرْدُون**  
Pinasse (F).  
هو الصنوبر البري ، اطلبه .

٣١٠١١ - **يَرَسُون**  
Erycina (S).  
Erycène (F). Erycina (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الرسونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطليقات المسانية والبسائية . اصدافها بيضية الشونز او عرسية ، متعددة التبطيط ، رقيقة ، مالة .

٣١٠١٢ - **يَرَسُونِيَّات**  
Erycinidae (S).  
Erycinidés (F). Erycinidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها المعاصرة وهي من متحجرات الاراضي الثالثة ، ومنها المعاصرة || تتميز باصدافها الصغيرة الرقيقة الشافة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القالبية الانحطاط || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون والبيتون والقلبية والمخطوة .

٣١٠١٣ - **يَرَس**  
Tragelaphus scriptus (S). Tragelaphus écrit, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).  
نوع من الجهل صغير القد حجمه حجم الماعز . اصطفاه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيفة . ثوبه امفر كيت يعلو تحطيط ابيض وتبيح اسم لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - **يَرَسُون**  
Eriogonum (S). Eriogone (F).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الطليطيات . انواعه عديدة ، معظمها بري وبعضها ترابي . سوقها منتصبة عادة الفروع . اوراقها فمية التجميع لا قياسية الارتكان يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القد شديدة الانطظام ثنائية او رباعية التجميع تغلفها قلافة جرسية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعاته قليلة العدد . قوته اخشرات والتسل والبذور البرية || جسمه معتدل القد قريب الشبه بالجلجل الا انه اطول عنقا ومبقاداً واضفر رأساً . جناحه مستندرا الاطراف . ذنبه صغير القد ، مخروطي الشكل . ثوبه الى اليردة الزرقاء المزاج يعلوه توشيم ابيض واسمر . زوره وسنوره وبطنه الى القيرة السمراء يعلوه موج وردي || يذثن اضموصه من الرية بين النباتات المتشابكة . الاثن تخشن وحدها من ١٤ الى ١٦ بيضة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يئين الغذاء والحماية .

٣١٠١١ - **يَرَبُوع** \* **أُدُوع**  
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jacculus (E).  
جنس حيوانات لينة قاضمة جاسة من فصيلة اليربويات . انواعه عديدة موطنها جميع الاسقاع الصحراوية الحارة والمتندلة الحارة || شكله شكل فأرة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . عيناه جاحظتان . اذناه كبيرتان منتصبتان وهو طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب مستطيل رفيع صعداً يحمل في طرفه خصلة صوف لونها يختلف عن لون ثوبه || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل ، بطنه ابيض || يألف القفائي والمناطق الجافة يتخذ جحره في نثر الارض . انشاء تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ١٦ ادراس . قوته المواد النباتية على اختلاف انواعها ومصادرها واخشرات واليراد || اعرف انواعه واعماها ما يتبع .

٣١٠١٢ - **يَرَبُوع تَدْمَرِي**  
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).  
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .

٣١٠١٣ - **يَرَبُوع دُورْمِيَّع**  
Dipus sagitta (S).  
Gerboise flèche (F).  
موطنه العراق وتركية واروبية . ثوبه بلون الرمل . ظهره عايق السج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .

٣١٠١٤ - **يَرَبُوع مِصْرِي**  
Dipus aegyptius (S).  
Gerboise d'Egypte (F).  
موطنه فسيح الاجراء بينت من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة وفلسطين وشمال الجزيرة العربية || ثوبه الى الصهبة الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . بطنه ابيض . خصلة ذنبه سمراء ، طرفها اغبر .

٣١٠١٥ - **يَرَبُوعِيَّات**  
Dipodidae (S).  
Dipodidés (F). Dipodidae (E).  
فصيلة حيوانات لينة قاضمة جاسة من مرتبة قوقنديات الشوزب ورتبة القرواص . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جازمها الخلفية وبقصر الامامية . رؤوسها غليظة . آذانها ملعقية الشكل منتصبة . اعناقها قصيرة . اذناها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفائي والقيمان . قوتها الاشعاب والجذور والثار || اعرف اجناسها اليربوع والربود والموانة والهاقل .

٣١٠١٦ - **يَرَبُوعِيَّات** \* **نَمِر اَبْيَض**  
Felis uncia (S).  
Snow leopard, Irbis (E).  
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر كوتبتا وشغلاً . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٣٣٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس



يربوع



يربوع



يردوم



يرسون



يرع



## \* ٣١٠٢٣ - يَرْغُونُ تَاعِمِ الْحَلَبِ \*

Eriolus setosus (S). Eriolus soyeux (F).

حيوان لبون حاشر من فصيلة الدالايات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف الحشبات والتجاذب التي تكثر فيها الأعشاب سرسره دجوي . قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالفتنة ، يطول نحو ٢٤ سم . هليبه متدل الخشونة ، عديم المسال . ثوبه الى السمرة السوداء || الاثنى ثور تقصع في كل ربيع من ١٠ الى ١٢ جرأ || يياته الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .

Larvae (F). Larval (E).

## \* ٣١٠٢٤ - يَرْبُ

راجع دعومي .

Pierre calcaire molle (F).

## \* ٣١٠٢٥ - يَرْبَعُ

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفتاح .

Asperge (F).

## \* ٣١٠٢٦ - يَرْبَعُ

هو الهليون المعروف . ج رابع ، اطليه .

Sparmannia (S).

## \* ٣١٠٢٧ - يَرْمُومُ

Sparmannia (F). Sparmannia (E).

جنس جنبات وشجيرات برية وزراعية تربيتين من فصيلة الزيزفونيات . منبتها البلاد الافريقية . سوقها منتعبة تملو من مَر الى ستة امتار . اوراقها متباينة الاشكال . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

## \* ٣١٠٢٨ - يَرْمُومُ الْفِرْقِيَّةِ

Sparmannia africana (S). Sparmannie d'Afrique (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو نحو ستة امتار . اوراقه قلبية الشكل تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض من ٨ الى ١٠ سم . نصالها مسننة الخفاف ، مزينة البشرة على السفحتين العليا والسفلى . ازهارها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طويلا شهر ايار .

## \* ٣١٠٢٩ - يَرْمُومُ كَفِّي الْوَرَقِ

Sparmannia palmata (S). Sparmannie palmée (F).

نوع من البريوم . ساقه تملو من مَر الى مترين . اوراقه كفية الشكل ، خماسية التلق المسننة المختار . نصالها عديم الزغب ، بحري الخصار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من آذار الى تموز .

Henné (F).

## \* ٣١٠٣٠ - يَرْبَاءُ

هي الحناء ، اطليه .

Pedetes caffer (S).

## \* ٣١٠٣١ - يَرْبُ

Pédète cafre, Lièvre sauteur (F).

حيوان لبون قاصم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدالايات . موطنه بعض الاسواق الافريقية . طوله نحو ٤٠ سم . وذنبه ٤٠ . رأسه كراس الانب . عيناه كبيرتان جاحظتان . ذنبه جمل الصوف . جرامزه قصيرة ، خماسية الاصابع ، قوية الاطراف المقوسة . جرامزه الخلفية مستطيلة ، رباعية الاصابع ، قوية الاطراف القصيرة المستعرجة || ثوبه الى الصبغة السراة . بطنه وشوفاه بيض . يعيش جماعات كثيرة العدد || جحره ردة فسيحة تكتنفها اربعة انفاق متصالية مستطيلة . قوته الاعشاب والجلود والحطب .

\* ٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ \*  
Eriogonum flavum (S). Eriogone jaune (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه زياه تملو نحو ٣٠ سم . اوراقه معتقة ملقبة الشكل تطول من ٣ الى ٨ سم . نصالها خلى البشرة على صفحتيه . ازهاره هامة الارتكاز صيوانية التجميع ، خلية البشرة ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

\* ٣١٠١٦ - يَرْغُونُ خَيْشِي \*  
Eriogonum umbellatum (S). Eriogone en ombelle (F).

نوع من اليرغون الجبلي المنبت . ساقه تملو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه معتقة ملقبة الشكل . نصالها بحري الصفحة العليا ، خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خيشية التجميع ، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

\* ٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عَدَقِي \*  
Eriogonum corymbosum (S). Eriogone en corymbe (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مزغبة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه معتقة اهليجية الشكل ، نصالها خلى البشرة ، متصع الاطراف . ازهاره هامة الارتكاز ، علقية التجميع ، لونها الى البياض الموشع بالوردي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

\* ٣١٠١٨ - يَرْغُونُ مَرْكَب \*  
Eriogonum compositum (S). Eriogone composite (F).

نوع من اليرغون التريبي . ساقه مرءاه تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه ييضية الشكل ، قلبية القاعدة ، نصالها اغصن الصفحة العليا خلى السفلى . ازهاره هامة الارتكاز ، خيشية الشكل ، مركبة الصفوف المتراكبة . لونها الى البياض الاغبر || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

Pterostyrax

## \* ٣١٠١٩ - يَرْفِيلُ \*

جنس نباتات برية وتريبتية من فصيلة الاصطركيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها الاجبار والشجيرات . سوقها منتعبة فراءة . اوراقها عابلة معتقة-متعاقبة . نصالها اهليجية جامدة الوثل ، مسننة الحواشي . صفحتها السفلى كفية الحمل الاطلل . ازهارها محورية الارتكاز ، عقدوية التجميع . ازهارها ربيعي . ثمارها جرأ يريمية الشكل ، رباعية الاجنحة .

Ictère, jaunisse (F).

## \* ٣١٠٢٠ - يَرْقَانُ

Icterus, jaundice (E).

حال مرضية تمرى نسيج الحيوان فتفسر ، سببها العادي تعدد الصفراء عن بلوغ المعى بسهولة فتختلط بالدم .

Chlorose (F).

## \* ٣١٠٢١ - يَرْقَانُ ، يَرْقَانُ

Chlorosis (E).

ومنهم من قال ارقان . علة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الارواق وتمنعها عن القيام بعملها التنشيطي على الوجه الاكمل كما يؤدي الى تأخير النمو والذبول الباكر . ويقلل للارواق والنباتات المصابة بالارقان ميوقة .

Larve (F).

## \* ٣١٠٢٢ - يَرْقَةُ ، يَرْقَانَةُ

هي الدعوص ، اطليه .



يرقول تاعم الحلب



يرب

الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل. أعضاؤها قصيرة. ملاسها دقيقة. كواسلها وبطنها شبه اسطوانية الشكل. رواشاتها معتدلة الحجم، شفافة. قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية. قوتها المواد العضوية المنحلة. يرقاتها عادمة البصر، نائلة ودائمة.

٣١٠٤١ - **بِزْمُومِيَّات** \*  
Scenopinidae (S). Scénopinidés (F). Scenopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. أجناسها وأولاهها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تألف المواقع الجافة وتفضيئ المساكن الريفية || أجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ مم. رؤوسها كبيرة. عيونها متقاربة، متأللة عند الشقين. قربنها الاستشعارية قصيرة، ثنائية الفصل. أعضاؤها صغيرة. كواسلها وبطنها شبه اسطوانية الشكل. رواشاتها شفافة. قوائمها قوية || يرقاتها كبة، دودية الشكل. بعضها وأنج والبعض الآخر دامن || أشهر أجناسها البزومة.

٣١٠٤٢ - **بِزْمُوم** \*  
Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة البزوميات ورتبة غدديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراش الصغيرة القد، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة، ملحوة. عيونها بارزة. أعضاؤها مستطيلة. تأثيرها وملاسها نظامية. قربونها الاستشعارية قصيرة، دبسية الاطراف. كواسلها شبه مخروطية. مقطوعة المقدم. امحادها لافة تقطعها خطوط من التغيرات الدقيقة. قوائمها نشيطة. اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الاسود ومشتقاته والجزوي والكسني || تألف غشاف المناقع ويجاري الماء حيث تنغم في الرمال والاسمال الرطبة. قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام.

٣١٠٤٣ - **بِزْمُومِيَّات** \*  
Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات مقترسة من غدديات الاجنحة. أجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراش صغيرة القد، بيضية الشكل، تطول من ٢ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة، ملحوة. عيونها بارزة. تأثيرها وملاسها نظامية. قربونها الاستشعارية قصيرة، تساعية الفصل. دبسية الاطراف. كواسلها شبه مخروطية الشكل، تلحف الرأس. امحادها لافة. قوائمها نشيطة، اثوابها سوية اللون || تألف الرياض وضفاف المناقع ويجاري الماء. تعيش على المواد العضوية المنحلة وعلى ما تستطيع قتصه من دوبيات وهوام || أشهر أجناسها البزوموم.

٣١٠٤٤ - **بِسْكَار** \*  
Ben (F). هو البسان، اطلبه.

٣١٠٤٥ - **بِسْتَعُور** \*  
« شجر تصنع منه المساويك ومساويكه اشد المساويك إلقاء للفر ونابته بالسرعة وفيها شيء من مودة مع لين. »

٣١٠٤٦ - **بِسْتُورِيَّة** \*  
Ostryer (F). هي القناينة المشهورة بصلابة خشبها.

يسرح في الليل ويبعث في النهار. انثاء تحمل اربعة اطياف وتضع اربعة ادراس مرة واحدة في السنة.

٣١٠٣٢ - **بِرُفِيلِيم** \*  
Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة، معظمها بري وبعضها زربيي. سوقها فروع مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن. اوراقها متعاقبة ورشية مخبرية. ازهارها رؤوسية صفراء اللون. يزورها منجبة بقنبية || أشهر انواعها ما يتبع.

٣١٠٣٣ - **بِرُفِيلِيم عَدِّي** \*  
Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من البروفيليم، عشبته تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه صغيرة القد ثلاثية التفرغ او لخامية. رؤوساته الزهرية كثيفة التجميع، قصيرة الالان، هرية الملق. ازهاره يستمر من اوائل سحران الى اواسط تموز.

٣١٠٣٤ - **بِرُفِيلِيم مَحْضُورِي** \*  
Eriophyllum cespitosum (S). Eriophylle gazonnant (F).

نوع من البروفيليم، عشبته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه السفلى خامية التفرغ. رؤوساته الزهرية كبيرة القد، متوسطة العدد، مستطيلة الالان || ازهاره يستمر طوال شهر تموز.

٣١٠٣٥ - **بِرُفِيلِي** \*  
Yurumi (F). حيوان لبون اردم مشهور باسم مَحْشُورْ اَحْرَفْ، اطلبه.

٣١٠٣٦ - **بِرُؤُون** \*  
Sperme des animaux féroces (F). البرون عصه الحيوانات المفترسة.

٣١٠٣٧ - **بِرُؤُون** \*  
دماغ الفيل.

٣١٠٣٨ - **بِرُؤُونِيَّات** \*  
Spermaphytes (F). تعريف يطلق على جميع النباتات التي تخلف زور حقيقية من اي قسم كانت ان من المستورات او العريانات او التسمجرات.

٣١٠٣٩ - **بِرُؤُونِيَّات** \*  
Bioplane (S). Bioplane (F). جنس حشرات لافظية من فصيلة البشيات ورتبة مفدمات الاجنحة. انواعها المعروفة خمسة مهددا الشرق الاذني يكثر وجودها في بعض مناطق سورية الداخلية || أجسامها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ مم. اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والجزوي والامغر والكسني والني. رؤوسها صغيرة مستديرة. قربونها الاستشعارية دبسية الشكل، كواسلها مخبرية، ناشرة الاطراف الامامية. امحادها غنقدة، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والاعم والاعز. تعيش تحت القش على المواد العضوية والتباينة المنحلة.

٣١٠٤٠ - **بِرُكَّاة** \*  
Scenopinus (S). Scénopine (F). Scenopinus (E).

جنس حشرات من فصيلة البزوميات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ مم. رؤوسها كبيرة. عيونها متقاربة عند الشقين. قربونها



برفيليم



بِزْمُوم

تركب النباتات المروعة والمتغذية || أشهر أنواعها البست  
الفرار ويسف فرموزا .



يسف اثيق



يسف ثاني اللون



يسف فرموزا



يسف هزاز



يسع

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - **بُسْرُوعِيَّة**  
هو الاسروع ، اطلبه .

٣١٠٤٣ - **بُسْرُوعِيَّة**

Triteron (S).

Triteron (F). Triteron (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات بمديات الاريل  
خلفيات الخياشيم وفصيلة البسوعيات . انواعه المعروفة  
كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على  
النبوت البحرية || اجسامها عراطة اعليجية الشكل  
شبيهة بالزقار . رؤوسها قصيرة مقطوعة ، ثنائية اللواس  
الجماحة . خياشيمها ظهريه الارتكاز ، ثنائية الصف ،  
متشعبة . افواهها ثنائية الفكوك القرنية المسنة الاطراف .  
الوانها ملونة يكثر فيها الاحمر والازرق والاصفر .

Triteronidae (S).

Triteronidae (F). Triteronidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات بمديات الاريل  
خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المروعة عديدة  
منتشرة في معظم بحار العالم : اكثرها عبي وبعضها يقترب  
من الشطوط . اسرارها متفارقة العدد || اجسامها متعطيطة  
عادمة الصدف . رؤوسها ثنائية او رباعية الملاص .  
خياشيمها متساوية ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او  
على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرارة  
وغلوكس .

٣١٠٥٤ - **بُسْرُوعِيَّات**

Ortalis formosa (S).

Ortalide élégante, Otile élégant (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسغيات .  
جسمها صغير القد يطول من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ،  
شبه مخروطي الشكل ، حنطي اللون ، اشقر المواج .  
جبهتها برتقالية اللون . خطمها معتدل الطول ، صناعي  
اللون . عيناها مكورتان ، ناشزتان ، ارجوانيتان ،  
مطوئتان بالفضي . زباناها قصيران . رؤشاها كيران ،  
صنابيان ، مبقجان بالاسمر العابق . قوائمها الى الحنطي .  
صدرها صناعي اللون ، فضي الخمل ، تقطبه بعض الخطوط  
السر . بطنها يرمي الشكل ، صناعي الخضاب ، اصفر  
المواج ، تملوه ستة اطواق سم || تظهر الحشرة الجملانة  
من حزيران الى ايلول . مرتها المرعي والاعشاب المتغذية  
حيث تقترس مختلف انواع الارق والحوام || يرقاتها خاضلة  
تركب الارراق وتعيش عليها حتى الاكمال .

٣١٠٤٩ - **بُسْف ثنائي اللون**

Ortalis bicolor (S). Ortalide bicolor (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة اليسغيات .  
جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٧ م . رأسها محدب  
الشكل ، صناعي اللون . خطمها معتدل الطول . زباناها  
قصيران ، دقيقان . عيناها كيرتان ، ذهبيتان . صدرا  
الى الخضار اللامس . بطنها يرمي الشكل ، ازرق اللون ،  
اسف المواج . مرزا الى السمرة الخنطية العابقة . رؤشاها  
كيرتان ، شفان . قوائمها الى السمرة الكتسية || تظهر  
الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول .  
مرسحها يشمل كل مكان حتى الاماكن المأهولة || قوتها  
الحوام . يرقاتها نائلة .

٣١٠٥٥ - **بُسُون**

Pimpinella (S).

Pimpinella (F). Pimpinella (E).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المعروفة  
عديدة منها الحولية والهولة والعمرة والشعره الانسون ||  
سوقها متعصبه فراء . اوراقها مركبة . ازهارها صراني  
التجميع ، ابطي الارتكاز او تاجية . ازهارها بيضاء  
اللون . ثمارها يزور صغيرة || أشهر انواعه :

P. anisum (S).

بسون انيسي ، آنيون

P. cretica (S).

بسون اكرتي

P. viridis (S).

بسون اعصر

P. puberula (S).

بسون زغبى

P. anthriscoides (S).

بسون سرلي

P. eriocarpa (S).

بسون صدقي النمر

P. corymbosa (S).

بسون عذقي

٣١٠٥٠ - **بُسْف فرموزا**

Ortalis formosa (S). Ortalide élégante (F).

ذبابية من اليسغيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧  
الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحنطي الاشقر . عريتها  
فضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول .  
مرتها المرعي الرطة والاعشاب المتغذية حيث تلتهم مختلف  
انواع الحوام || يرقاتها خاضلة تركب الارراق وتعيش  
عليها .

٣١٠٥١ - **بُسْف هزاز**

Seoptera vibrans (S). Ortalide vibrante (F).

ذبابية من اليسغيات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥  
الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة العابقة .  
قوائمها سود . اسرارها حنطية تتميز باستمرار اعترار  
جناحها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاشجار  
والمرعي حيث يكثر الارق والحوام || يرقاتها هاوكة  
وخاضلة عند الحاجة .

Ortalidae (S).

Ortalidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة  
نعا ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشرات ذبابية  
الشكل . اناسها مسلحة بالبرقة حادة تستعملها للوخز . اثنائها  
عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامتة او خاضلة

Jaspe (F). Jasper (E).

٣١٠٥٦ - **بُسْبَب**

حجر البشب حجر صواني التركيب مختلف الالوان  
منه حجر الحك الاسود اي صدق الصافه .

٣١٠٥٧ - **بُسْبَبِيَّة** ، **كُوتَب افریقیة**

Agathaea amelloides, Aster capensis (S). Agathée,  
Aster d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F).  
Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D).  
Aster d'Africa (I).

بجلة زيبينة معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افریقیة  
الجنوبية وقد عمت زراعتها معظم حدائق العالم . ساقها  
فراء تملو من ٧٠ الى ١٢٠ م . اوراقها متعاقبة ،  
حاضنة ، ملثة الاطراف . نصلها يبغي الشكل ، خلي  
الصفحة . ازهارها رويوية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ،  
زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يغّر

هو الجدي والحلام والرغلة .

Diplax, Sympetrum (S).

٣١٠٦٥ - يغروس \*  
جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها اراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٤٢ الى ٦٠ سم . ألوانها المتغيرة الى الخطي الصنابي المائل . اجنحتها وردية الجسم ، صفر القواعد يعطونها في أول زاماتها الاخرة غطوط معترضة صناعية اللون . رقباتها عارية عادمة الهلب مستطيلة الارجل تعيش في وسول المنائق وبحاري الماء .

Orthetrum (S).

٣١٠٦٦ - يغس \*

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسويات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها اراوح من ٣٥ الى ٤٧ سم . وبسطة اجنحتها تراوح من ٥٥ الى ٧٠ سم . ألوانها الى الزرقه . رؤوسها خضر . اناثها ابيض ثوباً وجناحاً . رقباتها زياه الجسم تعيش في الاسمال .

Libellula (S).

٣١٠٦٧ - يغسوب \*

Libellule (F). Dragon fly (E).  
جنس حشرات من فصيلة البسويات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها اراوح من ٣ الى ٤٦ سم . وبسطةها تراوح من ٥٥ الى ٧٦ سم . ألوانها خطية او كستنية اللون . اجنحتها شفافة شرجية الزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يعمل على التحل .

Libellulidae (S).

٣١٠٦٨ - يغسوبيات

Libellulidés (F). Libellulidae, Dragon flies (E).  
فصيلة حشرات من رتبة الرعاشات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المنائق وبحاري الماء . ذكورها اصفر قداً من اناثها وازنق لونها منها . اناثها تقتف بمكنها فردياً على سطح المنائق وعلى صفحة الماء . تقتنف عن دمايص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرسل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم انطباع اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها اليمسوب واليسس واليعروس والكرولون .

Stachyurus (S).

٣١٠٦٩ - يغشيل

Stachyure (F). Stachyurus (E).

جنس جنبات معمرة برية وزراعية تربيته من فصيلة البشليات . سوفا تملو من مرتين الى اربعة اعمار . اوراقها عابلة متعاقبة ، مسنة الحصران ، تظهر بعد الازهار . ازهارها سبلي التجميع . ازهارها صفرة يضاء اللون او صفراء ، رباعية الفصل والبيلات واللياس ، ثمانية الاسدية . ثمارها عنبية صفيرة || اعرف اجناسها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يغشيل بكوري

Stachyurus praecox (S). Stachyure précoce (F).

نوع من البشيل . جنته تربيته تملو نحو ثلاثة اعمار . ساقها منتصبه . افانها قضيفة مرنة . اوراقها اهليلجية طولها نحو ١٨ سم . وتعرض نحو ٩ سم . نصلها رفيقة . مسنة الحصار ، جميلة الحصار الزاهي . ازهارها سبيلة التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط الى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يشم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

Echites (S). Echitès (F).

٣١٠٥٩ - يشيت \*  
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الدفليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية المنبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جبني . سوفا سرسة مالة . اوراقها معنقة ، بيضيه ، متقابلة . ازهارها كبيرة القذ زاهية الالوان منها الابيض والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نميلة القذ || يستخرج من سوفا بالحز عصارة لبنية يضاء اللون ، حريفة الطعم ، جحالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعه واشهرها .

Echites biflore (F).

يشيت ثنائي الزهر

Echitè à feuilles verticillées (F).

يشيت ضميّ الورق

Echitès à corymbes (F).

يشيت عدليّ الزهر

٣١٠٦٠ - يشطورة الباذنجان، ناربة الباذنجان

Euzophora osseatella (S). Euzophore de l'au-bergine (F).

فراشة من الناريات ، صغيرة القذ . بسطها نحو ١٧ سم . ريشها الاماميان الى السمرة يتوسلها تبيج اسود داكن . ريشها الخلفيان مفضاض . رقبها مستدقة الجسم ، غبراء اللون ، كستنية الرأس ، تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصها الباذنجان والقليلة والبطاطا فتشرب السويق وتدخلها مع جوام التربة وتتابع نغرها وأذاها صمداً ما استطاعت .

Raie (F). Troat of the deers (E).

٣١٠٦١ - يعمار  
صوت الأبل . واليادر شجرة في الصحراء تأكلها الابل (السان).

Psophia (S). Agami (F).

٣١٠٦٢ - يشحمي \*  
جنس طير من طوال الساق . انواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين الخلق والقلق . اعطائها ضفاف نهر الامازون . اجسامها ربعة . اعناقها متوسطة الطول . رؤوسها كبيرة . مناقبها غروبية ذرية حادة الملاقط . اجنحتها قصيرة . افانيتها شديدة القصر . ارساغها حجيقة مستطيلة . ارياشها ناعمة رعة . رؤوسها واعناقها وبطنها خلية الريش والزنان || اعرف انواعه واشهرها اليمجي اللجب .

٣١٠٦٣ - يشحمي جب \* ، طائر البوق

Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من اليماجيم صوته كطين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في البار . وهو طائر كبير القذ طوله اراوح من ٥٢ الى ٦٠ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . راسه وصفه وظهروه وصدره وبطنه واغنيكه سود . جناحاه الى الجورة السمراء يعطونها موج ازرق واخضر . صدقة عينه غروبية . زفده ورسناه حر . مقاراه السس || اعطانه ضفاف نهر الامازون اغصها الضفاف الثالية . يعيش زمراً واسراباً اراوح عدد افرادها من ٣٠ الى ٢٠٠٠ وأكثر قوته البار واليدور والحشرات والديدان . يش في الخموس قلدسي الشكل يخلقه بالمشاش الناعمة ويوطوه بجمار المنقش والطين . اثناء تقصم من ١٠ الى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يدين بدن عناء وإذا عاش مع البط والأوز والدجاج والحيش حافظ عليها كالخارس الأمين .



يشيت



يمجي جب



يعروس



يمس



يمسوب



بصوم النجيليات



يقضي



يقوي



بعوض



بغروب

Rhubarbe groseille (F). **٣١٠٨٠ - يَمْعِيْشَا**  
هو الراوند الرياسي، اطلبه.

Callichromus (S). **٣١٠٨١ - يَمْعُوسُ \***  
Callichrome (F). Callichromus (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة طول القرون وصيلة الزعقيبات. انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة. جميعها نائلة ودائمة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنحلة || تتميز باستطالة الاجسام والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية. اجسامها معتدلة التبطيط. طولها من ٢٥ الى ٤٥ سم. كواهلها مكورة مخسورة. عيونها بارزة. اغدها بحزة لاحفة. ألوانها عديدة الالوان السوية، يكثر فيها الاخضر الاسفع والكسني الاشفع المالح.

Coleonema (S). **٣١٠٨٢ - يَمْعِرَة**  
Coléonème (F). Coleonema (E).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة السذابيات. منهايا بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية. سيقانها ترتفع من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها ابيدة متعاقبة خيشة الاتصال المسننة الاطراف الجامدة. اغدها خماسية الفصص والتيلات، عشارية الاحدية، مختلفة الالوان والتجميع || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية:

Coleonema album (S). **٣١٠٨٣ - يَمْعِرَة بَيْشَاء**  
Coléonème blanc (F).

نوع من اليفرة التريينية. ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها طولها نحو ١ سم. وتعرض نحو ١ سم. اغدها بيضاء اللون، فردية التجميع، طرفية الاوتكاز، مهدبة التوزيع والفتابات، مقطوعة التيلات || تنويرها يستمر طوال فصلي الربيع والصيف.

Coleonema pulchrum (S). **٣١٠٨٤ - يَمْعِرَة قَاحِرَة**  
Coléonème superbe (F).  
نوع من اليفرة التريينية. ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها سنانية النصل طولها من ٢ الى ٥ سم. عقصاتها مهدبة شالكة. اغدها ثلاثية او رباعية التجميع، طرفية الاوتكاز، حراء اللون، خافتة العرف السطري || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف.

Hygrobia (S). **٣١٠٨٥ - يَمْعُرُوب \***  
Hygrobie (F). Hygrobia (E).

جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة البغروبيات وربة عذبات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه بيضية الشكل، طولها من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها صغيرة، مستعرجة المؤخر. عيونها صغيرة، بارزة. قربها الاستشعارية خيطية. تأثيرها وكوكوها ولاسها متوسطة القد. كواهلها مستعرجة، قليلة الطول. اغدها مهدبة، لاحفة. قوائمها شديدة النشط. ألوانها وحيدة اللون. تكثر فيها السمرة الحديدية المالح || تألف المناطق والاوهوار والياه الراكدة. تعيش على النباتات المائية وفي الاسمال. قوتها كل ما تستطيع قصه من دوبيات.

Hygrobiidae (S). **٣١٠٨٦ - يَمْعُرُوبِيَّات \***  
Hygrobiidés (F). Hygrobiidae (E).

فصيلة حشرات مائية من عذبات الاجنحة. اجناسها

**٣١٠٧١ - يَمْعَشِيل صِينِي \***  
Stachyurus chinensis (S). Stachyure de Chine (F).  
نوع من البعيل. جنينة تريينية تملو نحو اربعة امتار. ساقها متربة الافناد المنطصة. اوراقها اهليجية، ذلقة الزام الاخير، طولها نحو ٢٠ سم. نصلها جميلة الخضار المالبق، مسننة الحار. اغدها سنبلي التجميع. اغدها بيضاء اللون، صغيرة القد || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

Stachyuraceae (S). **٣١٠٧٢ - يَمْعَشِيلَات \***  
Stachyuracées (F). Stachyuraceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلات الفلقات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهدبا بعض مناطق الفرق الاقصى والجزر. جميع انواعها شجيرات وجنبات معظمها بري وبعضها زراعي ترييني || اشهر اجناسها البعيل.

**٣١٠٧٣ - يَمْعُومُ النَجِيلَات \***  
Isosoma graminicola (S). Isosoma des graminées (F).

حشرة خاضعة من فصيلة السويليات وربة غشائيات الاجنحة المخسورة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمنعرجة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول نحو ٣ سم. رأسها مستعرض. جوشنها مستطيل. يطها ضامر وقصير. زريقيتها الاخرية محزائية الشكل. مرزا مدب وقصير || تتطفل على النجيليات ومنها القمح فتؤذيها.

**٣١٠٧٤ - يَمْعُفِيد \***  
Leontodon (S). Léontodon, Dent de lion (F). Hawkbit, Lion's tooth (E). Löwenzahn, Kuhlblume (D). Tarassaco, Dente di leone (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الحركات. اوراقه كبيرة مفترسة زرعها المائشة وتسن عليها. اغدها رؤوسية، صغيرة القد، كثيفة التجميع، لونيا الى الصفار الكبريتي. عصارتها لزجة، مرة، الطعم، طيبة.

Hère (F). Young deer (E). **٣١٠٧٥ - يَمْعُفُور**  
صغير الايل لا يزال يتبع امه.

**٣١٠٧٦ - يَمْعُفُوب**  
هو الحجل الرومي، اطلبه.

Jacobaea (S). **٣١٠٧٧ - يَمْعُفُوبِيَّة \***  
Jacobée, Herbe de St Jacques (F). Jacoby (E).

Glabocoeba (D). Glacoeba (I).  
نوع من الشرونة من فصيلة الحركات. وهو نبات عشبي بري معمر يملو في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم. ساقه تملو نحو ٧٠ سم. اوراقه حاضنة متعاقبة، نصلها مفترض الصلغة المستطيلة. اغدها رؤوسية صفراء اللون. يقال انه من النباتات النافعة. عصارتها تدمل الجرح. ويؤمن من قال انه يقيد القرعة.

Pragmatisme (F). **٣١٠٧٨ - يَمْعَمَلِيَّة \***  
Pragmatisme (E).

العملية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة من قدر نتائجها العملية.

**٣١٠٧٩ - يَمْعُومُ**  
الجدى والصغير من الفان. ج بعامير.

## ٣١٠٩٣ - يَقْن

اليقن: هو العجل اذا اربع. ج. يقغن.

## ٣١٠٩٤ - يَقْشَة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج. يقشفت.

## ٣١٠٩٥ - يَقَاطُ ٥

Strepera

Strépre, Réveilleur (F).

جنس طير من الجوارثم وفصيلة الغراييات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الغابات وصفات الانهر. ملجئها الحياتي جماعي. افواجها تمد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثار والبذور والحشرات والدويبات || تتميز بكثرة تعيها المزيج الذي تردده منذ الصبح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشوقه او غراب الزرع. مناقيدها غروليه جالسة. اجنحتها لاحفة. اذناها شبه غروليه. اثلواها الى السواد الاسفم وبعضها الى السواد الازرق المالح. اقفاها واجنحتها مبلقة ومطوقة بالابيض || تدئن في الاصحار الباسقة. اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور توفن لها الغدا.

## ٣١٠٩٦ - يَقْصُوم ٥

Solva (S). Solva (F). Solva (E). جنس حشرات من فصيلة اليقصوصيات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه مزوانية الشكل، مستقلة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية القصل. تأثيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كواسلها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة المراتز الدورية. رواشتها تبني الغضاب. افخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الانهار ورحيقها. يرقاتها وأجحة تغترس ما تستطيع من دويبات.

## ٣١٠٩٧ - يَقْصُومِيَّات ٥

Solvidae (S). Solvidés (F). Solvidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحراج || اجسامها متفاوتة القد، تطول من ٥ الى ١٢ م. رؤوسها مزوانية. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية القصل. تأثيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كواسلها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشتها شفاقة عند معظم الاجناس. افخاذ قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها وأجحة، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها اليقصوم.

## ٣١٠٩٨ - يَقْطِين هو القرق، اطليه.

## ٣١٠٩٩ - يَقْطِين أَقْرَع \* ، قَاوُون المير

Cucumis melopepo (S). Pâtisson, Mélépépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melonen-Kürbiss (D). Melopopeo (I).

نوع من القرق وهو نبات عشبي حولي زراعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والارتفاع والتسلق ثماره متوسطة قلنسوية الشكل مستقيمة الخطار التخزين المفترض. لياها جامد المكسر، متوسط الحلاوة، جيد الصنن يطبخ ويربب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المالحين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يقشية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقلة، مستقلة. عيونها ناشرة. قرونها الاستشعارية غيطية، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها مستترضة، قليلة الطول. اغماها لاحفة. قوائمها شديدة النشط || جرمها مفترسة ودائمة تمشي في اسال المياه الزاكمة || اشهر اجناسها القيروب.

## ٣١٠٩٧ - يَقَاق هو القحمة، اطلها.

## ٣١٠٨٨ - يَقْرُود ٥

Aphrodes (S). Aphrode (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة اليزيديات. انواعه عديدة، اصطنها العالم، مرتمها اعشاب المرامي. اجسامها يقشية الشكل تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها مثلبة ازوايا. اثلواها ملونة يكثر فيها التجذيع المعترض. اضرارها زهيدة لا تستوجب المكافئة.

## ٣١٠٨٩ - يَقْرُود الرِيَّاس ٥

Aphrodes histrionicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م. رأسها كبير الجرم، لونه الى الخضار الالسي تملو زعرقه بياض. غططها معتدل الطول. عينها كبيرتان. زباناها قصيران. كوسلها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الخطار كوسلها يتناح الحفظة. حقيقتها عرجسة، بنية مجذعة بالاسود. ظواهرها كامل الحنجية، لاحف، ابيض اللون، بني التجذيع والتدبيج. روستاها غشائيا شفافان. بطنها اسير. قوائمها كثيفة الملب الشاك || تألف الرِيَّاس والمروج. قوتها التسع.

## ٣١٠٩٠ - يَقْعَة

Raphiolepis (S). Raphiolepide (F). Raphiolepis (E). جنس شجيرات برية وزراعية تزينة من فصيلة الورديات. مهدا يمتد من الشرق الاذن الى اليابان. سقها فروع، مبدرة الاقنان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهلجية الشكل او ستانية. نصلها جامدة، حيلة الجفار العايق. ازهارها عطرية العرف، عتقودية التجميع او عتقودية، مختلفة الالوان. ثمارها عنية سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية.

## ٣١٠٩١ - يَقْعَة البَتَحَال

Raphiolepis indica (S). Raphiolepide du Bengale (F). نوع من اليلعة الزينة. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهلجية، مستقلة القاعدة والطرف. نصلها جيل الجفار الالام. ازهارها بياض اللون بعلها تمشيع وردي واجر. اسديتها بنية اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

## ٣١٠٩٢ - يَقْعَة عَيْمِيَّة

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepide à ombelles (F). نوع من اليلعة الزينة. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يقشية منعكة تطول نحو ٩ م. وتعرض نحو ٥ م. نصلها جلدية التسنج، مستديرة الاطراف تبدو كجمجمة من الخيام. ازهارها بياض اللون عطرية العرف، صغيرة القد، قطرها من ١٥ الى ٢٠ م. تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.



يقفود



يَقَاطُ



يقطين اقراع

إبطي الارتكاز أو طرني . أزهارها قرمزية اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

lochroma (S).

lochrome (F). lochroma (E).

جنس جنبتا معمرة من فصيلة الباذنجانيات . مهدا بمغص مناطق أمريكية الجنوبية . سوقها تعلو من متر إلى ثلاثة أمتار . أوراقها كاملة ، متعقبة ، أزهارها زرقاء اللون أو حمراء || تزهر للآزبين في الحدائق وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الأتربة || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

Citrouille, Courge (F).

Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع أو البقطن . اشكالها وأحجامها عديدة شائعة . أوراقها متفاعة تراوح من كيلو واحد إلى ٥٠ كيلو . لبها غذائي يطبخ ويربب ، متوسط ما يحويه من مواد :

ماء ٩٥,٦٠ %

مواد ازوتية ٠,٢٨ %

مواد دهنية ٠,٢٥ %

مواد استخلاصية ٣,٨٧ %

٣١١٠١ - **بَقْلِيَّاتٌ** هي القرعيات ، فصيلة نباتية .

٣١١٠٢ - **بَقْلِيٌّ**

البقي : جبار النخل . القلمة منه يققه .

٣١١٠٣ - **بِكَاَسَةٌ**

Sphaeralea (S).

Sphéralcée (F). Sphaeralea (E).

جنس نباتات جنية أو عشبية من فصيلة الخبازيات . مهدا بعض أصناف أمريكية الجنوبية ، أقليمها اقليم البرتقال . سوقها فروعاً تعلو من ٥٠ إلى ٣٠٠ سم . شكلها شكل الخبازة . أوراقها مهدبة النصال ، حمراء اللون أو بنفسجية || أنواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية .

٣١١٠٤ - **بِكَاَسَةٌ خُمْرَاءُ**

Sphaeralea miniata (S).

Sphéralcée rouge (F).

نوع من البكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدا بلاد الألبانين . ساقها فروعاً تعلو نحو ١٠٠ سم . أوراقها ثلاثية الفلج المنشارية المختار . نصالها خلية البشرة ، بحرية المخضار . أزهارها فردية حمراء اللون زنجفيرية الموج || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني .

٣١١٠٥ - **بِكَاَسَةٌ صِبَايِيَّةٌ**

Sphaeralea umbellata (S).

Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من البكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدا المكسيك . ساقها رفيعة تعلو نحو ثلاثة أمتار . أوراقها خاسية أو سباعية الفلج العادمة التسنين . نصالها بحرية المخضار . أزهارها صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . أزهارها بنفسجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء .

٣١١٠٦ - **بِكَاَسَةٌ قَبْقَبِيَّةٌ الْوَرَقِ**

Sphaeralea acerifolia (S).

Sphéralcée à feuilles d'érable (F).

نوع من البكاسة . جنية تزيينية معمرة مهدا بعض مناطق كاليفورنيا . ساقها فروعاً تعلو نحو ١٠٠ سم . أوراقها ثلاثية أو خاسية الفلج ، قرنية الشبه بوق القيقب . أزهارها فردية ليلية اللون أو بيضاء ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف .

٣١١٠٧ - **بِكَاَسَةٌ مُشْرُو**

Sphaeralea Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من البكاسة . شبة تزيينية سبروتية مهدا بلاد كولومبيا . ساقها فروعاً تعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها ثلاثية الفلج المسننة الأطراف . أزهارها عنقودية التجميع ،



بَقْلِيَّةٌ

٣١١٠٩ - **بِكُرُومَةٌ أَنْبُوبِيَّةٌ**

lochroma tubulosum (S). lochrome tubuleux (F).

نوع من البكرومة . منبتها كولومبيا . ساقها تعلو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقها أهليجية مستطيلة . نصالها خلية البشرة . أزهارها عذقي التجميع ، محوري الارتكاز . أزهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لونها إلى الأزرق الجسلة . توجعها أنبوبية الشكل تعلو من ٣ إلى ٤ م . || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٣١١١٠ - **بِكُرُومَةٌ سَنَائِيَّةٌ**

lochroma lanceolatum (S). lochrome lancéolé (F).

نوع من البكرومة . منبتها بلاد الشيل . ساقها ترتفع من ١٢٠ إلى ٢٥٠ سم . أوراقها سنائية الشكل تعلو من ١٢ إلى ١٥ سم . وترعش من ٤ إلى ٦ م . نصالها كثيفة الخمل الاغبر اللون . أزهارها شبه صيواني الشكل ، محوري الارتكاز . أزهارها بنفسجية اللون ، توجعها تعلو نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١١ - **بِكُرُومَةٌ قَرْمِزِيَّةٌ**

lochroma coccineum (S). lochrome écarlate (F).

نوع من البكرومة . منبتها بعض مناطق أمريكية الوسطى . ساقها مزغبة اللحم تعلو من متر إلى مترين . أوراقها سنائية الشكل مستطيلة الطرف . نصالها خلية الصفحات السفلى . أزهارها شبه صيواني التجميع ، محوري الارتكاز . أزهارها قرمزية اللون متوسطة القد ، قصبية المالحق . توجعها تعلو نحو ٥ م . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١٢ - **بِكُرُومَةٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَرِ**

lochroma grandiflorum (S).

lochome à grandes fleurs (F).

نوع من البكرومة . منبتها جبال البرير . ساقها تعلو من مترين إلى ثلاثة أمتار . أوراقها أهليجية الشكل تعلو من ١٥ إلى ١٧ م . وترعش من ٧ إلى ٩ م . نصالها عادمة الخمل على الصفحات العليا ، مزغبة الصفحات السفلى . أزهارها كبيرة القد ، لونها إلى الأزرق الساباجينية . توجعها تعلو من ٥ إلى ٦ م . || تنويرها يستمر من الصيف إلى الخريف .



بَكُورِي

٣١١١٣ - **بِكُفُورِيٌّ**

Camphorifère (F).

Camphoriferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما ينتج الكافور .

Ullucus tuberosus (S).  
Ulluco, Ulluque (F).

نبات عشبي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمقيات. اعطانه البلاد الامريكية يكثر في الأند وبوليفيا والبيرو وفتراته الجديدة. جذره سقوية. ساقه عشبية جراء اللون. اوراقه متعاقبة معققة، نصلها تلي الشكل غليظ الصفحة. ازهاره صغيرة القد عنقودية التجميع محورية الارتكاز || عساقله تستعمل استعمال البطاطا وهي اجاصية الشكل، جوزية الحجم، وردية القشور، صفراء اللوب. يتكاثر بالزبور وبالصلصال.

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-dove (E). Hohltaube (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران. يقال ان الحمام الداجن تحدر منه ومن الحيدوان. طوله نحو ٣٠ سم. قويه الى الرمادي الخفي. اجنته مخططة بالاسود، قوادعها بيض. رأسه شديد السمرة عايق الموج. صدره جوي. منقاره جالس دقيق. افئدة امر الانتساب، حطلي الطرف. موطنه فسح الارياح يعم الشرق واروية وافريقية. يألف المناطق البعيدة القليلة الانجار. يعيش ارباباً صغيرة يروح عدد افرادها من ٨ الى ٣٠. قوته الحبوب والزبور. يذئن عشه في تجاريف الاشجار وواقاب الصخور. انائه تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنتها بيضتان.

Phascolomys (S).

Phascolome, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة اليمبابيات اي الجرذان الجرابية || انواعها المعروفة ثلاثة موطنها استرالية والجزر المجاورة. اجسامها ربة، قصيرة القوائم والذنب، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، قصيرة الاخطام المقنونة. عيونها صغيرة. اذنانها قصيرة منتصبة. اوبارها ناعمة. اثنواها تراوح من الصفرة الى السمرة السوداء. اعطافها قوية تمكئها من حفر التربة || الاثني تحمل رضيعها في جراب رجب العنبر مركزة في مؤخر البطن || تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل افاق تحفروها في التربة || قوتها الاعشاب البرية والجذور. اما الانواع الثلاثة فهي :

Phascolomys ursinus (S).

Wombat ourson (F).

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

Phascolomyidés (F).

فصيلة حيوانات لبونة جاسة تدعى جرذان جرابية، اعطها.

Abelle mâle (F).

Drone (E).

اليمخور او الرعل الذكر من النحل. وهو كالح الشوار الشقي، عادم الشدائم اللامع، اطول قدماً من النحلة العاملة واعظف جسماً منها. يكوم الملكة، اي الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالاجمل، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تباشر متع المازن، ثم يموت على اثرها. ج يساعير ورسال.

Ortalis (S).

Ortalide (F). Ortalis (E).

يكوس هو الاسم البرازيلي. جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة الغرناسيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق امريكا الاستوائية. تألف الغابات والاحراج الظليلة القريبة من الماء. ملجأها الحياتي جامعي. باعائها لامتسارية البدن الذي يراوح من عشرة اناث الى مئة زوج واكثر. قوتها التار والحبوب والذبور والخشرات المختلفة الفصائل والانواع || اجسامها مستطيلة رشيقة. رؤوسها صغيرة. مناقيدها كبيرة، جالسة، مذبذبة الملاط. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذيالها كبيرة مزروانية الاطراف || اثنواها تختلف مع الانواع، ويكثر فيها الخضار الزيتي والشهية والشفقة || اناثها اصغر قدماً من ذكورها وتحتل بنفس الاثواب || قدئن اعشاشها في الاشجار الرقيقة. اناثها تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الاحول. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع. الذكور تزين الحماية والغذاء || تعتبر من الطرائد العزيزة لحومها فاخرة الصنف، مرغوب فيها || اشهر انواعها واعرفها:

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Lantzia (S).

Lantzie (F). Lantzia (E).

جنس حيوانات متعينة من الرخويات مديبات الارجل وفصيلة اللنبات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض جزر المحيط الهادي. تعيش في المناطق قوتها المواد النباتية والاعشاب || اصداها صغيرة القد، محاذلة، قصيرة اللولب الاثدث. رؤوسها بضيقة مقنونة. لواسها مبطلة سبانية الشكل، اربطها وحيدة مستعرضة.

Fallenia (S).

Fallénie (F). Fallénie (E).

جنس حشرات من فصيلة الفصيصيات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اعطائها بعض المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها ضخمة، شبه بيضية الشكل، كثيفة الخمل، تطول من ٩ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشور، عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشارية صغيرة، ثلاثية الفصل. ملاسها نخلة. اعطاطها صغيرة. كواسلها محدودة. بطونها مستعرضة، شبه مقنونة المؤخر. رؤسها شبه شفافة، بنشها غضاب تبني باحت. قوائمها معتدلة الطول || جيمها واثمة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الازهار. يرقاتها خاضلة ودائمة وبعضها نائل.

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

Unone odorant (F).

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*

٣١١٤ - بُكُوس \*



بُكُوس



يلوكو



يما



يماط

٣١١١٧ - يَلانج

٣١١١٧ - يَلانج

٣١١١٨ - يَلَقَّة

٣١١١٨ - يَلَقَّة

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج

٣١١١٩ - يَلْتَجُوج



Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الارض . والينابيع عديدة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واسرارها . منها المنبجعة والمتقطعة والمستمرة والوقفية والارثوازية ، الخ .

Fontinal (F).

نعت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع او على ما يحويه مياهها من املاح ومواد معدنية .

Lelpoa

جنس طير من فصيلة الشقائيات . انواعه قليلة جميعا كبيرة الجثة قدرها قدر الحبيشة . رأسها قنبري الريش المستطيل . مناقرها صغير وضعيف . اجنتها عريضة مستديرة . ذنبها متوسط الطول . اسافها قوية . اطيها الى الزرقعة الزرقاء . اجنتها الى الزرقعة العابقة بدها تحطيط معرض فيه الابيض والاريد والاسود . ريش عنقها وبسوسها ابيض الانتشاب اسود الجسم || تألف السهل المنبسطة الكثيرة الادغال ، القليلة الشجر . تعيش ذكراً وأنثى كالحمام . اسرارها متوسطة العدد يراوح عددها من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الجبوب والخشرات من نصفيات الاجنحة وتستقيها || اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في محضن من الرمل والورق تحضره على شكل كتلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم . وعلاوا من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . تصرف بيضها في التلة على عمق ٣ او ٤ سم . صفوها متتابعة ابتداء من الاسفل . وهي تبيض في موسمها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بمعدل بيضة واحدة كل ١٣ يوماً . اما البيضة فتفتق بعد وضعها باسبوعين عن فرخ نشيط كاسي الريش يدر امر نفسه بدون عناء .

Onychiurus, Lipura (S).

Onychiure, Lipure (F).

جنس حشرات دائمة من فصيلة النخوريات . انواعه المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، مبررة الهلب ، تطول من ٢ الى ٣ م . اطيها تراوح من المركة السمراء الى البياض الاغبر المواجه . رؤوسها مقلطحة منحرفة الى الاسفل . عيونها طامسة . بطونها مقلطحة ضيقة المؤخر . قوائمها قصيرة . ارسافها ثنائية الاظفار الذرية اللامتساوية || مبدولة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجلالة .

Onychiuridae, Lipuridae (S).

Onychiuridés, Lipuridés (F).

فصيلة حشرات دائمة من رتبة الكهدليات . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مبررة الهلب ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مقلطحة ، مائلة . عيونها طامسة . قرونها الامتعاوية صغيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية المقلطحات الامتساوية ، اصفرها الكليل . بطونها سداسية السكم . قوائمها قصيرة . ارسافها ثنائية الاظفار الذرية اللامتساوية القله || اشهر اجناسها الينخور .

Triton (S).

Triton (F). Trumpet-shell (E).

جنس دوبيات بحرية من الرخويات وفصيلة الينسويات .

Hymenanthera (S).

Hyménanthère (F). Hymenanthera (E).

جنية معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الينسجيات . شكلها قريب الشبه بالبرنج . ساقها تمل نحو ١٠٠ سم . افتنادها مزينة اللحاء . اوراقها صغيرة متعاقبة جلدية الاتصال الخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم . ازهارها محورية الارتكاز ، قصيرة المالحق ، خاسية التركيب ، يبيضه اللون ، يعلوها موج اصفر . ثمارها عتيبة يصعب الحمص ، لوها الى الينسجي الموشح بالابيض || تنويرها ربيعي .

Ormosia (S). Ormosie (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها في بعض المناطق الحارة والامتدادية من القارة الاسيوية وامريكا الجنوبية || سوقها منتصبة ، فروعها فروعه شبه افقية الانتشاب . اوراقها مركبة ، ريشية ، ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة ، حيلة الالوان المتراكبة . مستحبة العرف الحلات .

Anadrome (F).

Anadromous (E).

نعت تعريفي يطلق على الاسماك التي تترك البحر الى التبر في زمن التشرية .

Anadromie (F).

Anadromy (E).

المنهرية غريزة الاسماك التي تهاجر المياه البحرية الى النهرية العذبة في زمن التشرية .

Pélagique (F).

Pelagic (E).

نعت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالبحر كقولك المعلم البحرية والنبوت البحرية .

Pélagisme (F). Deep-sea life (E).

البحرية حياة الكائنات الغضائية في غضم الم .

Anagris (S).

Anagyre (F).

جنس نباتات برية جنية ونجمية من فصيلة القرنيات القراشية . انواعها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويبرز كناربه . الواحدة ينبتة || اشهر انواعها النبوت التين .

Anagris foetida (S). Anagyre fétide, Bols puant,

Podis (F). Bean-clover, Stinking word (E). Stinkbaum, Stinkholz (D). Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetida (I).

نوع من النبوت وهو جنية برية طيبة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اورها مركبة عابلة ، وريقاتها ثلاثية التجميع ؛ فصلها سناني الصفحة ، خيل البشرة ، يطول نحو ٨ سم . ويعرض نحو ٢ . ازهارها عنقودي الترتيب . ازهارها كبيرة القند سفراء اللون . سفاتها خروطية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . يزورها بفسنجية اللون جمالية للمادة || القليل من نفع ازهارها واوراقها ينشط الايلاج والياه ، والكثير منه مقبى .



نبوت تين



ينح

اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدها بقية الشكل ، حلزونية ، ذرة الاطراف ، جميلة الاطراف المرقوشة والمجعدة || اشهر اجناسها اليسوع والهودعة .

### ٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء \*

*Achroia grisella* (S).

*Petite teigne des ruches* (F).

وتدعى أيضاً منطوبة شهباء || فراشة من فصيلة التاربات ورتبة حشرقيات الاجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. روشاشا الاماميان وجوشها الى الصهبة الشهباء الخالية من التنشيش والتجديد . روشاشا الخلفيان وبطنها الى الثغرة الخنطية المواجه || الانثى اكبر قدماً من الذكر || البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في خلايا النحل من ايار الى تشرين وتقلع ما يفعله صم النحل من اذى واضرار || وهي من الحشرات الناهضة المؤذية لانها تدخل المنازل فتفرض الغرام والجلود والقمرطاسية والفلين ...

٣١١٤٧ - يَنْع ، يَنْع (F). *Maturité* (F). *Maturation* (E). *Maturation* (F). هو بلوغ الثمرة كمالها الجسدي وقد يتم هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج .

### ٣١١٤٨ - يَنْع

ضرب من المعقن ، خرته جوية المواجه يملوها توشع اصفر .

### ٣١١٤٩ - يَنْع

*Telopea* (S). *Télopée* (F). جنبة برية وزينية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها فراء تملو من ٢٥ الى ٣٥ م. اوراقها معتقة ، نصلها اهليلجي الشكل ، غروطي الزام الاخضر ، يطول من ١٥ الى ٢٥ م. ويعرض من ٣ الى ٦ م. ازهارها عقودية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون ، كبيرة القد ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - يَنْك هو السط الصنفي ، اطبله .

٣١١٥١ - يَنْمَة *Podanthum* (S). *Podanthe* (F).

جنس نباتات عشبية محولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط . ساقها منتصبه يكثر فيها التضييق . جلورها حزامية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عقودية التجميع او سبيلية ، تاجية الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

### ٣١١٥٢ - يَنْمَة بَيْهَاء

*Podanthum canescens* (S). *Podanthe blanchâtre* (F). نوع من البينة المعمرة ، ساقها دقيقة خالية البشرة تلمو من ٦٠ الى ١٠٠ م. اوراقها لاطئة ، بيضيه الشكل ، سائبة الزام الاخضر . نصلها خلي البشرة عل صفحته السفلى . تاجية ازهارها عقودية التجميع ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

### ٣١١٥٣ - يَنْمَة جَبَّارَة

*Podanthum giganteum* (S). *Podanthe géant* (F). نوع من البينة المحولة . مهدا جزر اليونان . ساقها ملسلة قليلة الفروع تلمو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. جلورها وتدي الشكل . اوراقها معتقة سائبة النصل جامدة الصفحة المسنة الحمار . ازهارها سبيلي التجميع ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصدها بقية مجازنة وحلزونية تطول من ٨ الى ٥٠ م. الوانها جميلة مرقوشة ومجعدة || اعرف انواعها واشهرها اليسوع اليسوعي .

### ٣١١٣٩ - يَنْسُوع

*Tritonia* (S). *Tritonie* (F). جنس نباتات دوفسية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية تزيينية . ساقها شراخسية تنتهي بالازهار الاقاياسي التجميع . اوراقها عصفة سيفية الشكل او غيطية . ازهارها صغيرة القد او متوسطة ، الوانها عذبة تختلف باختلاف النوع || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة وهو يرغب في الارربة المنسوية التركيب ، المعتدلة الاندماج ، الغنية بالمواد الازوتية || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٣١١٤٠ - يَنْسُوع زَعْفَرَانِي \*

*Tritonia crocata* (S). *Tritonie safranée* (F). نوع من اليسوع التزييني . ضروبها الزراعية عديدة . شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ م. عصفه سبي الشكل مستطيل النصل يعرض من ١٢ الى ١٥ م. ازهاره سبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجميع ، ثنائية التصنيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

### ٣١١٤١ - يَنْسُوع عُنُقِي الزَهَر

*Tritonia scillaris* (S). *Tritonie à fleurs de scille* (F). نوع من اليسوع التزييني . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ م. عصفه غيطي النصل محجن الطرف . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، ودية اللون متراكبة البلات الملتفة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

### ٣١١٤٢ - يَنْسُوع مُدْهَب

*Tritonia aurea* (S). *Tritonie dorée* (F). نوع من اليسوع التزييني السبروتي الشائع الزراعة . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ م. عصفه سبي الشكل يعرض من ١٨ الى ٢٠ م. ازهاره سبلي التجميع . ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٦ م. لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

### ٣١١٤٣ - يَنْسُوع مَقُوس

*Tritonia securigera* (S). *Tritonie arquée* (F). نوع من اليسوع التزييني . شراخه الزهري يملو نحو ٤٠ م. عصفه سبي الشكل يعرض نحو ١٦ م. ازهاره سبلي التجميع ، مقوس الشكل . ازهاره متوسطة القد تطول نحو ٣ م. وقطرها ٤ م. لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار .

### ٣١١٤٤ - يَنْسُوع يَنْسُوعِي \*

*Triton tritonis* (S). اشهر انواع اليسوع . يبلغ طوله نحو ٥٠ م. يكثر وجوده في المحيط الهندي .

### ٣١١٤٥ - يَنْسُوعِيَات

*Tritonidae* (S). *Tritonides* (E). فصيلة دوبيات بحرية من الرضويات مديات الارجل اماميات الحياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة .



يسوع زعفراني



يسوع يسوعي



منطوبة شهباء

ازهارها ضام متتابة لونها الى الزرقاء العافية يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٣١١٥٤ - بَيْتَة خُمْلِيَّة النَّاج

*Podanthum trichocalycinum* (S). *Podanthe à calice velu* (F).

نوع من البينة الممرة، مهدا اليونان . ساقها فروع علو من ٥٠ الى ٨٠ سم . جذرها لفي الشكل والمادة اوراقها بيضية ، نصلها لا قياسي التسنين المتباعد . ازهارها عنقودية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خلية التاج ، قصيرة الاهد . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٣١١٥٥ - بَيْتَة عُرْيَانَة

*Podanthum virgatum* (S). *Podanthe à tige nue* (F). نوع من البينة المحولة الطبيعية في جبال لبنان . ساقها عريانة ، غليظة ، مضغلة الزوايا ، فروع ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروعها قصيرة منتصبه . اوراقها ضيقة التجميع ، مركزها في أسفل الساق وفي سانية النصل ، جامدة الصفحة ، متباعدة التسنين . ازهارها بنسجية اللون ، قصيرة الاهد ، فردية او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٣١١٥٦ - بَيْتَة مَشْطِيَّة

*Podanthum pinnatum* (S). *Podanthe penné* (F).

نوع من البينة الممرة . مهدا الشرق الادنى . ساقها منتصبه فروع . جذرها حزائي الشكل ، مأكول المادة . اوراقها مشطية النصل ، ثلاثية او خاسية التفرع من الاقياسي التفرع . عتاقها الزهرية رمله التجميع . ازهارها الى الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

## ٣١١٥٧ - بَيْتُونِيَّة ، بَيْتُونِيَّة ، دَمْبُوز

*Inosite, Dambosé* مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اللوبيا الخضره وفي مسطار النبق وورق الجوز والبنج .

## ٣١١٥٨ - بَيْتُون \* ، بَيْلَانَج

*Canang des Molluques, Unone odorant* (F). *Ylang-ylang tree* (E). *Canangaebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصبه فروع تعلو نحو ٢ امتار . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصل . ازهارها جملة الشكل ، متوسطة القد ، نارية اللون ، فواحة العرف المستحب . يستخرج منها بالقطر ادهان عطرية فاخرة السنت شائعة الاستعمال . ماء ساقها وفروعها لوني التركيب مثير التيلة الناعمة الدقية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .

## ٣١١٥٩ - بَيْتَة

*Antholyza* (S). *Antholysse* (F). جنس نباتات دوصية عشية من فصيلة السونيات . انواعها عديدة ، برية وزيينية . ساقها شراخية تنهي بالاظهار الاقياسي الترتيب . اوراقها شرفانية الشكل . ازهارها قريبة الشبه من ازهار الدلبون || زراعتها لا تتطلب عناية خاصة لكنها تقفل الازرية الدالية الوايزة العنصر الازرقي || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## ٣١١٦٠ - بَيْتَة أَنْبُوبِيَّة

*Antholyza aethiopica* (S). *Antholysse éthiopienne* (F).

نوع من البينة التريينية . شمرها الزهرية يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . شرفانها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ سم .

## ٣١١٦١ - بَيْتَة الْكُفْر

*Antholyza caffra* (S).

*Antholysse cafre* (F). نوع من البينة التريينية . شرفانها الزهرية يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . شرفانها مستطيلة النصل المستطيل . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢ الى ٢٠ زوجا . لونها الى الحمرة الاريجونية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

## ٣١١٦٢ - بَيْتَة عُنْكَوِيَّة

*Antholyza paniculata* (S). *Antholysse en panicule* (F).

نوع من البينة التريينية . شرفانها الزهرية يعلو نحو ٩٠ سم . شرفانها تطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . وترس من ٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظامي الانسجام والتجعين . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها كبيرة القد فردية الارتكاز . لونها مراكب الصفرة والحمرة البنفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

## ٣١١٦٣ - بَيْتَة كُونُو

*Antholyza cunonia* (S).

*Antholysse de Cuno* (F). نوع من البينة التريينية . شرفانها الزهرية يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . شرفانها مستطيلة النصل المستطيل . ازهارها سنبل الترتيب . ازهارها فردية التجميع ، متعاقبة الارتكاز ، لا يفوق عددا ٦ ولا يتقص من ٤ . لونها مراكبة ، انابيبا كبريتية الصفار ، بتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

## ٣١١٦٤ - بَيْق

*Monsonia* (S). *Monsonie* (F).

*Monsonia* (E). *Monsonie* (D). *Monsonia* (I). جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الفروزيات . انواعها عديدة ، مهدا بعض اكوار افريقية الجنوبية اعصها منقطة رأس الرجاء الصالح . ساقها مفصلي مستطيلة . اوراقها متعاقبة سائفة . ازهارها جملة الشكل ، مختلفة الالوان ، ذكية العرف الخافت || معظمها نبات بري وبعضها تربوي يزرع في المراكز والحدائق . يتكاثر بالبذور وبالتعليل .

## ٣١١٦٥ - بَيْهَر \* ٥

*Anomalurus* (S).

*Anomalure* (F). جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . انواعها المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وذانها من ١٢ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة القد . آذانها بيضية الشكل . اذانها جللة الصفو . جوارها قصيرة ، ازهارها حادة مستطيلة . روافلها الجانحية مستعرضة . الالباب سوية اللون تراوح بين الصفه والصفرة || تألف الغابات ، تتسلق الاججار وتطير من واحدة الى اخرى . طيراتها دائم الانحراف نحو الارض ، شوطها لا يفوق ٣٠ م . || قوتها جميع المواد النباتية || اعرف انواعها واشهرها :

## ٣١١٦٦ - بَيْهَر بِل ٥

*Anomalurus pelei* (S).

*Anomalure de Pele* (F). نوع من البير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تقيق مع اقترانها من شبح الظهر .



ينون



بير

٣١١٧٩ - **يُوْكَا**  
 Yucca (S). Yucca, Yuque (F).  
 Yucca, Bear grass (E). Palmenille (D). Iucca (I).  
 جنس نباتات معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها عديدة  
 سويها غشوشية تملو مع المرمر وتوالي السنن . أوراقها  
 جلدية ضمية التجميع . أزهارها عنقودي يرتكز على شاريخ  
 منتصبة مستطيلة . أزهارها كثيرة القد متدلية الارتكاز  
 لا متباعدة الألوان تلبف فيها الفبرة || أشهر أنواعه  
 الزنبقية الممكن غرسها في أقاليم المعتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - **يُوْكَا أَلُوِيَّة**  
 Yucca alofolia (S).  
 Yucca à feuilles d'aloès (F).  
 نوع من اليوكا، منبها البلاد الأمريكية . ساقها نخيلة  
 مستنقة منتصبة تملو نحو ٥ أمتار . أوراقها الوية الشكل  
 تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ٣ إلى ٤ ، فصلها  
 جلدي الصفحة ، باحت الخضر المادي، بحري المقصعة،  
 ينتمي بشوكه جوية اللون سادة الطرف . أزهارها بيضاء  
 اللون تطول من ٤ إلى ٥ سم . أزهارها عنقودي الشكل،  
 كثيف التجميع، يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ثمارها حقية،  
 لحمية السوذة، لا مأكولة . تنورها يستمر من أوائل آب  
 إلى أواخر أيلول .

٣١١٨١ - **يُوْكَا بَحْرِيَّة**  
 Yucca glauca (S).  
 Yucca glauque (F).  
 نوع من اليوكا، منبها أمريكا الجنوبية . ساقها منتصبة  
 قصيرة . أوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، جوية  
 الخضر، تعد من ٢٥ إلى ٣٠، طولها من ٦٠ إلى ٩٠ سم .  
 وعرضها من ٦ إلى ١٢ سم . أزهارها إلى البيضاء الأخضر  
 اللون . أزهارها عنقودي ، كثيف التجميع، يملو من ٦٠  
 إلى ١٠٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنورها يستمر من  
 أيار إلى حزيران .

٣١١٨٢ - **يُوْكَا رَجُلُ الْفِيل**  
 Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S). Yucca  
 pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).  
 نوع من اليوكا، منبها الفزانيتالا . ساقها منتصبة رافعة  
 القاعدة النطيلة، تملو من ٥ إلى ٦ أمتار . أوراقها  
 جلدية الصفحة، بحيلة الخضر ، بيضاء اختار المسنن .  
 فصلها يطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . ويعرض من ٥ إلى  
 ٨ سم . أزهارها تطول من ٦ إلى ٨ سم . لونها إلى البيضاء  
 المساجي . أزهارها عنقودي، هرمي الشكل، يطول من ٧٠  
 إلى ١٠٠ سم . ثمارها حقية لحمية السوذة لا مأكولة .  
 تنورها يستمر من آب إلى أواخر أيلول .

٣١١٨٣ - **يُوْكَا عَشِيَّة**  
 Yucca baccata (S).  
 Yucca à bales (F).  
 نوع من اليوكا، منبها أمريكا الشمالية . ساقها منتصبة  
 تملو نحو ٣ أمتار . أوراقها جلدية النصل ثخينة الصفحة  
 تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهارها  
 جرسية الشكل تطول من ٥ إلى ٨ سم . لونها إلى البيضاء  
 المساجي . أزهارها متبدل العنقود يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم  
 ثمارها بلحية الشكل، قرمزية اللون، تطول من ٨ إلى ١٢ سم  
 وهي مأكولة مستحبة الطعم . تنورها يستمر من نيسان  
 إلى حزيران .

٣١١٨٤ - **يُوْكَا لِيْفِيَّة**  
 Yucca filamenteux (F).  
 راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - **يَهْيَر زَاهِر**  
 Anomalurus fulgens (S).  
 Anomalure éclatant (F).  
 نوع من الهر، موطنه أفريقية الوسطى ابتداء من الصحراء  
 الكبرى . ثوبه يرتقالي اللون . حمرها وحبته بيض .

٣١١٦٨ - **يَهْيَر فِرَازو**  
 Anomalurus fraseri (S).  
 Anomalure de Fraser (F).  
 نوع من الهر، موطنه الفانين . ثوبه إلى الربة السمراء .  
 صدره وبطه إلى الصبهة الصنابية .

٣١١٦٩ - **يَهْيَرِيَّات**  
 Anomaluridae (S).  
 Anomaluridés (F).  
 فصيلة حيوانات لينة قاضية . أنواعها تسمة تلتقي إلى  
 جنس واحد || موطنها البلاد الأفريقية تتميز بزواهدا  
 الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل خوصها من  
 ساعد الجرموز الامامي إلى مفصل رضع الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - **يُوْد**  
 Iode (F). Iodine (E).  
 جسم بسيط من اشياء المعادن شائع الانتشار في مياه  
 البحر وفي بعض النباتات البحرية اعصها الصريع .  
 صفائحها بلورية سريعة الطبع . لونه إلى الجؤرة الكستنية  
 البنفسجية الملوّج . أثره على الجلد اصفر الخضاب . رمزه  
 (I -) وزنه الذئبي ١٢٦,٩٢ . ثقله الذئبي ١٩٨,٤٨  
 ينصهر في ١١٣°س و يغلي في ١٧٥°س . يذوب  
 في الماء بمعدل ١ إلى ٧٠٠٠ و يذوب في الاثير والكحول .  
 يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - **يُوْدَات**  
 Iodate (F).  
 هو ملح حمض اليودي .

٣١١٧٢ - **يُوُوس**  
 Virus (F).  
 هو الفيرس، اطلبه

٣١١٧٣ - **يُوُورِيْنَا** هي القريض ، اطلبه .

٣١١٧٤ - **يُوُوزْبَاشِي**  
 Roi des rougets (F).  
 سمكة بحرية تدعى ملح احمر ، اطلها .

٣١١٧٥ - **يُوُوسْتْ أَفْتَنْدِي**، **يُوُوسْتِي**  
 هو الليمون الافندي ، اطلبه .

٣١١٧٦ - **يُوُوسِي** \*  
 Hieracidea (S). Iéracide (F).  
 جنس طير من عمارة الصقور . أنواعه المعروفة اربعة .  
 واحد افريقي ثلاثة امريكية واسترالية . جميعها من القواطع .  
 اجسامها دبة . اثوابها ثمة الريش، غبراء البطون . سواقطها  
 مستطيلة . مناسرها حادة البهرة الحدية . ارساغها دقيقة .  
 خالبها قوية . تعيش جاعات كبيرة سرها نحو اثمة .  
 قوتها صغير الحيوان والعماء والاواني . تدئن اوكارها في  
 اعلى الاشجار الشاخة . مسختها من ٣ إلى ٤ فقات  
 ترخصها الاثان دون اللأكور .

٣١١٧٧ - **يُوُوغَا**  
 Yoga (F). Yoga (E).  
 اليوغا نمط تهذيب هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية  
 وتمازج عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - **يُوُوغِيَّة**  
 Yogisme (F). Yogism (E).  
 اليوغية مجموعة المصلحات التقنية الصوفية الزهدية والتأارين  
 العقلية والجسدية التي يمارسها اليوفي .



## ٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F). Dally (E).

تمت تعريفه ويطلق على كل ما لا يدوم أكثر من يوم واحد .

## ٣١١٩١ - يوكايات

Ephéméroptères (F). Ephéméroptera (E).

طبقة حشرات صغيرة القد تحية تعيش في المناطق وعسل غشاق الماء . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها عدة فصائل تنتمي الى رتيبتين : الزخرفيات وآلياتوفيات . جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الفراضية أكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها البقية تبلغ الثلاث سنوات . اجسامها دقيقة مستطيلة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، اجنسها الامامية كبيرة القد والخلفية صغيرة . مؤنثها ينتهي بتخيطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث . اثارها الى البياض الاغبر تشوبه خضرة او صفرة كبريتية .

## ٣١١٩٢ - يوكايد

lonidium, Hybanthus (S).

lonide, Ionidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البنفسجيات انواعها المعروفة عشرة ، مهددا البلاد الاستوائية والحارة اخصها ايركية الجنوبية || بعضها اشباح نضادة والبيض الآخر جنات فرعاء . معظمها ينبت في رمال الشواطئ البعيدة عن مرمى الموج || جميعها طيبة جلورها مهددة .

## ٣١١٩٣ - يوكير

Cystoderma (S).

Cystoderme (F). Cystoderma (E).

جنس فطور غشائية من فصيلة الفاروقليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المنسلة . جميع انواعها صغيرة القد ، كاعنة الصنت ، لاساكولة || تتميز باغشيتها التي تلحف الساق كالارن القاعدية حتى اوائل الزمان الثالث || الوانها متباينة منها الالشح والامر والاصفر والالطليل .

## ٣١١٩٤ - يوكيو

Wouwou

هو الجبون الروادي ، اطلبه .

## ٣١١٩٥ - يوكيو\* ، جيتو\* ، جيرادي\* ، صقر

الجيراد ، أبو ريتاح

Falco lithofalco, F. Cesalon (S). Faucon-émérillon, Emerillon, Rochier (F). Merlin (E).

طائر من الكونج وفصيلة الصقريات . كنيته أبو ريتاح ويدهي الجلم جناحيه وسرعة انقضاضه وهو حر المزاج ، قوي الشكية ، بطاش شجاع . جسمه صغير القد ، جميل القالب ، قصير الذنب . ثوبه اغبر اخمر . صدره ويقله الى البياض الاغبر الضفي المورج تملوه رشفة قياسية الترتيب سمراء . رأسه مستعرض الشكل ، عيناه كالباقوت يكتنفها اطار اصفر || وهو من القواطع محبوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي || قوته الطير والقواضم والنفاذ والجبراد . يذئن وكده في اوقاب الصخور وفي قنن الاشجار الباسقة . اناته تفيض وتغصن من ه الى ٦ رفقات . ترغيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

## ٣١١٩٥ - يوكا متجيدة \*

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifique (F).

نوع من اليوكا السبرية الملبولة على شطوط المتوسط . ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الخضار الباهت . حناها قليل العرض ، جوي اللون . ازهارها متوسطة القد ، يضاء اللون تملوها رشفة حمراء . ازهارها لبد التجميع يطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر من تموز الى اواخر ايلول . ضرورها واصرامها عديدة اشهرها القعدة والمقرة والحوض ، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن .

## ٣١١٩٦ - يوكا مشجيرة

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا ، منهاها اريزونه وكليفورنيا . ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ الى ٩ امتار . قعرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، شاذكة المعصنة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ازهارها الى البياض الاغبر المورج . ثمارها حقية الشكل ، جافة السوق ، سمراء اللون ، تطول من ٥ الى ٨ سم . تنويرها يستمر طوال الصيف .

## ٣١١٩٧ - يوكا مشعبة

Yucca radiosa (S).

Yucca rayonnant (F).

نوع من اليوكا ، منهاها بلاد الاريزونه . ساقها منتصبة تملو من ٥ الى ٧ امتار . اوراقها جلدية النصل ، رادية اللون ، تعد من ١٠٠ الى ٢٠٠ طولاً يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم . وعرضها من ٣ الى ١٠ سم . ازهارها جرية الشكل غبراء اللون ، طولاً نحو ٥ سم . يجمعها شراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ثمارها حقية جافة . تنويرها يستمر طوال الصيف .

## ٣١١٩٨ - يوكا منقارية

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا ، منهاها المكسيك . ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار . اوراقها جلدية النصل ، بحرية اللون ، صفراء المورج ، مسننة الحنا ، شاذكة المعصنة ، تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها غبراء اللون غصير المورج . ثمارها حقية الشكل ، جافة السوق ، تنتهي بمنقار غشي المادة احسن الطرف .

## ٣١١٩٩ - يوم

Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى اربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه . وقد يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تنفيذ المهام او اعلان اكثر العقود الا خلاله . وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع :

Jour de planche (F).

يوم الشحن والتفريغ

Jour utile (F).

يوم صحيح

Jour férié (F).

يوم عطلة ، بطاقة

Jour ouvrable (F).

يوم عمل

Jour franc (F).

يوم كامل

Jour fixe (F).

يوم معين



يوكا مجيدة



يوكير



يوكيو




# مُلْحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ أ - ي





# ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. رمزه (Er) وزنه الانومي ١٦٧,٢٠ املاحه وردية اللون.

Synergides

٣١٢٠٣- آزران  
اطلب عومران.

Homozygotie (F).

٣١٢٠٤- إسالة

Homozygoty (E).

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات. راجع جنس.

Strophisme (F). Strophism (E). ٣١٢٠٥- إغيكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الاوراق الى الالتواء الكامل.

Méiotique (F).

٣١٢٠٦- إنفدادي

راجع ميوزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧- إنهدام، إنقراض

Catabolism (E).

الانهدام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد السائلة في الأنسجة الحية الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في معاوضات الايض، الطور المعاكس للبناء.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨- إنهدامي، إنقاضي

Catabolic (E)

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الانهدام او الانتقاض.

Anabolisme (F).

٣١١٩٦- إنباء، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذية الى نسج حية. وهو ما يشكل الطور الرئيسي من معاوضات الايض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧- إنبائي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالإنباء او التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E). ٣١١٩٨- إباله

الانالة حالة تأهب اعصابي يكون فيها وضع نوى الوناف شديد التقارب.

Plasmatique (F).

٣١١٩٩- ألي، بلاسمي

Plasmatic (E).

كل ما هو مشتق من الالة او ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠- أدفي

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح او الروشن او الغند. م. دفواء.

Aragonite (F). Aragonite (E). ٣١٢٠١- أراغونيت

الاراغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات الكلسيوم. تبلوره معيني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ | وهو ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في الزخرفة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢- إربيوم

Protistologie (F). Protistology (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٦ - بِلَيْثِيَّة  
الديليَّة علم يبحث في اول وابسط الكائنات الحيَّة .

Exondation (F). Emergence (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٧ - بَرَاغَة  
البرازغة حصليًّا هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور  
الحضيض او التربة بعد تقلص مياه الغمر .

Exondé (F) <sup>○</sup> ٣١٢١٨ - بَرِغ  
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال  
اراض برِغة وصخور برِغة .

Surrection (F). <sup>○</sup> ٣١٢١٩ - بُسُوق  
هو الشخصوس ، اطلبه .

Psilopilus (S). <sup>○</sup> ٣١٢٢٠ - بَسِيلَاف  
Psilopile (F). Psilopilus (E).

جنس طحالب صرخوبية صغيرة القند تتميز بحوافها  
الحوذبة الشكل || أنواعه المعروفة قليلة العدد منبتها بعض  
الاصقاع الباردة اخضها الشمالية .

Ceratophyllaceae (S). <sup>○</sup> ٣١٢٢١ - بَسَيْثِيَّات  
Cératophyllacées, Cératophyllées (F).  
Ceratophyllaceae (E).

فصلية نباتات عشبية مائية من ثنائيات الفلقة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبية ، مائية ،  
معترية ، عائمة الجذور ، ضمية الاوراق الحافلية .  
ازهارها وحيدة المسكن || اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة  
تعيش في المنافع والاهوار والمغاضب والحقائق المائية  
الماء || اعرفت انواعها واشهرها بشت القرد المعروف ايضا  
بحامول الماء ونخشوش الحوت .

<sup>○</sup> ٣١٢٢٢ - بَعَالَة  
البعالة من الحشرات والنويات هي الائنس التي تقضي  
على بعلمها فور الانتهاء من البعال او الكوم كالمعروفة  
والعقرب والرتيلاء ...

Plasmatique (F). <sup>○</sup> ٣١٢٢٣ - بِلَاسِمِي  
راجع انلي

Bélidé (F). <sup>○</sup> ٣١٢٢٤ - بِلْدُوس  
حيوان لون من الجرابيات الشاجرات يدعى بروس ،  
اطلبه .

Hypopharynx (F). <sup>○</sup> ٣١٢٢٥ - بِلْهَمَة  
Hypopharynx (E).

الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد  
للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشئة عند غددات  
الاجنحة وتستقيمتانها ، يوجد الكثير من العقد العصبية ممَّا  
يدل على انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية  
حتى الآن .

Mésozoïque (F). <sup>○</sup> ٣١٢٠٩ - أَوْسْتِيْبِي  
Mesozoic, secondary stratum (E).  
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف  
ايضا بالابوسط .

Blastoceros (S). <sup>○</sup> ٣١٢١٠ - اَبِل الْفَانِيْسِي  
Blastocère (F).

حيوان لون مجتزئ من فصيلة الابلقيات . موطنه فاني امركية  
الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من  
ذكر مانع وثلاث او اربع اناث مع ارشاهاء || جسمه  
يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم .  
ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقحة الممرء السفعاء الموج  
- عنبه مطوطة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب  
ينصله كل عام || الائنس جماء ، ضرعها ثنائي  
الاختلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من يعفور الى  
يعفورين .

Petaurus, Belideus (S). <sup>○</sup> ٣١٢١١ - بِلُوس ، بِلُوس  
Pétaure, Bélidé (F).

جنس حيوانات لونة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة  
الفلجربيات . انواعه المعروفة ثلاثة . موطنها استراليه  
والجزر المجاورة . جميعها دجوية المسرح . تألف  
الغابات والحراج ، تثبت في النهار اما في تجاوب  
الاشجار النخرة او على قننها || اجسامها صغيرة . آذانها  
كبيرة . اذنانها مستقيمة منعقة الاطراف - قوائمها  
الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة  
الاطراف . اصرفها ناعمة ، لينة . اغشيتها الابطلية جلدية  
تتمد من الايدي الى الارجل . اناثها مجهزة بجراب عند  
اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام || اما انواعه  
الثلاثة فهي :

P. australis (S). - بِلُوس أَسْتِرَالِي  
P. sciureus (S). - بِلُوس سِيْنَجَايْسِي  
P. breviceps (S). - بِلُوس بَرِصِيْر الرَاس

Bathydrique (F). Bathydic (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٢ - بَيْد  
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء ||  
تقول العلم البثدية والنبت البثدية .

Inné (F). Innate (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٣ - بَلْجَوِي  
نعت تعريفي يطلق على ما هو اصيل في المخلوق . وهو  
بذلك يرادف خلقي (Congenital) يقال صفة بجنبة وعامة  
بجنبة .

Bathybius (F). Bathybius (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٤ - بَجِيدَة  
اسم يطلق على كتل ملامية توجد في قاع البحر . يقول  
فيها العالم هوكسلي و بعض علماء الطبيعة انها الحالة  
الاولى من المادّة الحيّة .

Protiste (F). Protiste (E). <sup>○</sup> ٣١٢١٥ - بَوِي  
كائن حي وحيد الخلية . مجمل وسومه المخلقة حتى الآن  
تجعل متارجما بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال  
انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

Isostasie (F). Isostasy (E). **٣١٢٣٨ - تَعَادُلِيَّة**  
نظرية حصيلية تركز على تعادل القوى المحركة النابذة والمماسية.

Sporogonie (F). Sporogony (E). **٣١٢٣٦ - بَوَغَنَة**  
البوغنة، في علم الزوولوجية، طريقة لتلقيح خاصة ببعض التوالبي.

Enkystement (F). **٣١٢٣٩ - تَكْيَس**  
Encystation, Encystment (E).  
التكيس، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطب، هو الالتحاق الكلي بنشاء متين يدعى كيساً.

Sporophyte (F). Sporophyte (E). **٣١٢٣٧ - بَوَغِيَّة**  
طور من اطوار التكوين الشوئي عند النباتات اللاشعوية من ذوات البوغ وهي بذلك تعاكس الغيامة عند النباتات الشقية.

**٣١٢٤٠ - ثَانِي الْأَوَّلِي** <sup>٥</sup>  
Mésozoaire (F). Mesozoon (A).  
كائن مركزة بين الاوولي والتوالي، يتربك من حبيرة مركزية تغلفها حجيرات مسطحة مزارة. أما الرغيلة فلا وجود لها.

Sporose (F). Sporose (E). **٣١٢٣٨ - بِيَاغَة**  
البياغة في علم النبات هي ابراز البوغ ونشره عند السراخس واشباهها.

Loriqué (F). Loricate (E). **٣١٢٤١ - جَدِيم**<sup>٥</sup>  
نعت تعريبي يطلق، في علم النبات، على كل حبة او بذرة غلافها الخارجي جامدة <sup>٥</sup> ويطلق في علم الزوولوجية على كل جسم تغلفه صفائح عظمية.

Hétérothallisme (F). **٣١٢٣٩ - تَبَايُن مَشْرِي**<sup>٥</sup>  
Heterothallism (E).  
التباين المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية متماثلة من غيامات مختلفة الشقية أيضاً.

Troncature (F). **٣١٢٤٢ - جَزْر**  
حالة الشيء المقطوع جزء منه.

Autochtonie (F). **٣١٢٣٠ - تَبْلُك** <sup>٥</sup>، **مُكُود** <sup>٥</sup>  
Autochtony (E).  
صفة الشيء الموجود طبيعياً وأساساً في مكان جغرافي معين.

Lithocranion Walleri (S). **٣١٢٤٣ - جَزُونُوق** <sup>٥</sup>  
Lithocrane, Gazerelle-Girafe (F).  
جزونوق هو الاسم الصومالي. حيوان لون من الغنم، وحيد الجنس والنوع. موطنه يمتد من الصومال الى شرقي الكونغو. ملجنه الحيواني جماعي، اجله يمتد من ١٢ الى ١٥ يراسه ذكر مانع او ذكران وما تبقى فانث وطلّى. قوته الاعشاب خضراء وباسية، واوراق بعض الاشجار احصها المستطوط <sup>٥</sup> شوزنه يشبه الظفارة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم. ارتفاعه ١٠٠ سم. قرنا الذكر منمنقا الطرف المديب. عيناه كبيرتان، متوجتان بهيئة بنشاء. اذناه صغيرتان جالستان. عنقه شديدة الطول. خاروكه ارفع من كفه كما في الظفارة. ذنبه قصير ودقيق، ينتهي بخصلة من الشعر. الاشي جماء، ثنائية الاخلاف، فردية الطلى <sup>٥</sup> توبه الى العفرة السوداء. رأسه وظهره شديدا السمرة. الاشي الى السمرة السوداء باستثناء البطن الابيض الاخير.

Accouage, Accouage (F). **٣١٢٣١ - تَجْرِيم**  
Lighterage (E).  
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء الى السفينة او من السفينة الى رصيف الميناء. لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضاً.

Terrigène (F). Terrigenous (E). **٣١٢٣٢ - تَرِيْبَة** <sup>٥</sup>  
نعت تعريبي يطلق على الرسوب المتركمة في قعر البحار والعمادة الى احتحات وانجحات الانربة القارية.

Homothallisme (F). **٣١٢٣٣ - تَسَاوِي مَشْرِي** <sup>٥</sup>  
Homothallism (E).  
التساوي المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والانثوية ناتجة عن غيامة واحدة.

Placitation (F). **٣١٢٣٤ - تَسْمِيْد**  
هي السخندة، اطلبها.

Anabolisme (F). **٣١٢٣٥ - تَقْيِيد**  
اطلب ابتناء

Anabolique (F). **٣١٢٣٦ - تَقْيِيدِي**  
راجع ابتنائي.

Adéphage **٣١٢٤٤ - جَزُوْر**  
نعت وصفي يطلق على كل مفرس يتميز بالشراعة ان حيوان او حشرة.

Caroténolide (F). **٣١٢٤٥ - جَزْرَانِي**  
Carotenoid (E).  
نعت تعريبي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضاً بالجزرين. الشفاحات الجزرانية شفاحات صفراء وبترقالية وحمراء اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان. وهي غير قابلة الانحلال في الماء إنما تذوب في بعض الشحوم.

Isostatique (F). Isostatic (E). **٣١٢٣٧ - تَعَادُلِي** <sup>٥</sup>  
نعت تعريبي يطلق، حصيلياً، على كل ما له صلة بالتعادلية الارضية <sup>٥</sup> وهو ميكانيكياً الاتزان المتعادل في الخطوط والسطوح.



جزونوق

Abomasum (F). Abomasum (E). **٣١٢٥٣ - حَافِصَة**  
الحافصة الجيب الرابع من معدة المجترّات.

Cénozoïque (F). **٣١٢٥٤ - حَويْث**  
اطلب سنويزي

Monécie (F). **٣١٢٥٥ - حِصَاوَة**  
الحصاوة حالة فيزيولوجية عند المشرّيات تُسمّم بفرديّة الخليّة.

Pédologue (F). Pédologist (E). **٣١٢٥٦ - حِصْلَام**  
هو صاحب الاختصاص في الحصلة اي في علم الانربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها.

Ovula (S). Ovule (F). **٣١٢٥٧ - حَيْدَاء**  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديّات الارجل وفصيلة الدوعيّات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارّة والمعتدلة الحرارة | اصداؤها متوسطة القد، شبه بيضية الشكل، كظرة، مقعرة الظهر، صقيلة الصفحة الخارجية، بيضاء اللون | اشهر انواعها حيداء الزابج Ovula ovum (S). طولها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض العاجي الاسفع المواج.

Charophytes (F). Charophytes (E). **٣١٢٥٨ - حَيَاق**  
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج | حضاها الى الخضار القاتم ويؤخذ منها عند اللبس صلبة كبريه | وهذه الفئة من النبات تشكّل صلة الوصل بين المشرّيات والطحليّات.

Céramiste (F). Céramiste (E). **٣١٢٥٩ - خَزَاف**  
الخزّاف من تعاطي صناعة الخزف من نَحَار ومطلي وصيني.

Céramique (F). Ceramic (E). **٣١٢٦٠ - خَزَف**  
فنّ صناعة الآنية الخزّافية وشيّاها.

Ginglymostoma **٣١٢٦١ - خُفَاشَة سَوِيَّة اللَّوْن**  
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).  
Ginglymostoma concolor (E).

سمكة بحرية من السفنقيّات الاشلاقي. اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي | جسمها وشعيّ الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم. تتميز بزغفتها الظهرية المتأخرة الارتكاز والمقابلة مع البطنية والشرجيّة. ثوبها سوي اللون الاصفر.

Cryptogènes (F). **٣١٢٦٢ - خُفَيَّاتُ الْجَيْن**  
Cryptogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على الفئات الحية، من حيوان ونبات، التي تنصّب بالتناسل اللامتطور.

Caryogamie (F). Caryogamy (E). **٣١٢٦٣ - خِلَاط**  
الخلاط هو اعادة نشاط الاخصاب اللاشعبيّ عند

Dermoptera (S). **٣١٢٦٦ - جَلْبَنِيَّاتُ الْقَوَائِم**  
Dermoptères (F). Dermoptera (E).

مرتبة من الحشريّات. ينسبوا في الزمن الماضي الى الليموريّات ثم الى مجنّحات الادي. ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشريّات | وهذه المرتبة تضمّ فصيلة واحدة تدعى كوبنيّات وجنّسا واحدا يدعى كوبن.

Gymnura (S). Gymnure (F). **٣١٢٦٧ - جِمْنُور**  
جنس حيوانات لونة من فصيلة التفتديّات ورتبة الحشريّات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج | اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم. بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها صغيرة. اذناها مستديرة. اعناقها قصيرة. قوائمها معتدلة الطول. اصابعها مجعّرة باظافير حادّة. اثنائها الى الدبسة الصناعيّة المواج. وبرها لبد ناعم يتخلّله حلب جامد شائك. اذناها جرداء عارية | اثنائها اميز قفاً من ذكورها وابنت ثوبا منها، قوتها الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة.

Paritétienne (F). **٣١٢٦٨ - جُولِي**  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليّات.

Pariétales (F). **٣١٢٦٩ - جُولِيَّات**  
فئة نباتات من نثانيّات الفلقة مشيمتها تاوي الى جدار المدقة كما هي الحال عند البنفسجيّات والالامنيّات وغيرها.

Gymnorhinus (S). **٣١٢٧٠ - جِيْمْنُورِين**  
Gymnorhine (F). Gymnorhinus (S).  
جنس طير من الجوائم سنيّات المناقير وفصيلة الغرابيات. انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج | اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم. مناقيرها مخروطية الشكل. اجنحتها لاحقة، زلقة. اثنائها مزخرفة | اشهر انواعها الجيمنورين الزبّار G. fluteur (F). طولها نحو ٤٥ سم. ثوبه اسود اللون يطوحه تقيح ابيض في القفن والجنّاح | يألّف حياة الاسر ويقلّد جميع الانعام والاصوات.

Ginkgoales (E). **٣١٢٧١ - جِنْكُوَات، مَعَالِي**  
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة الباليوئين من الاباح الاول | كانت، في الماضي الجيد، تعدّ الكثير من الانواع الا انها اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقنّسة عند البوئين.

Actualisme (F). Actualism (E). **٣١٢٧٢ - حَاضِرِيَّة**  
الحاضريّة نظرية حصيليّة تُفسّر المناشع والتطوّرات الارضية الغابرة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطوّرات مستمرة العمل الطبيّ | والحاضريّة بمعناها الحصيلي تعاكس النظرية الجلبنيّة.



جمنور



جيمنورين



خفّاذة سوية اللون

Danaide, Danaids (F).

جنس حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة وفصيلة الدنيسيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطانها المناطق الحارة من العالم القديم باستثناء اربعة انواع، ثلاثة منها تعيش في امريكا الوسطى ونوع واحد اعطانه تشمل حوض البحر الابيض المتوسط وتمتد حتى اورورو الوسطى، يدعى تنيسية خريزيب D. Chrysippus (S) جسمها كبير القد. ووشها الى الصغار الاشعل تلعو زخارف بيض وسود واطار اسود منبج بالابيض | اساريها باقعة الخضار تعيش على اوراق الصقلابيات.

Ptéridermes (F).

٣١٢٧٣ - دُشَرِيَات  
فئة من السراخس المتقرضة التي كانت ثمارها يزور بدقة مجنحة بدلاً من بوعه.

Diatomite (F). Diatomite (E).

٣١٢٧٤ - دِيَاثُومِيَت  
صخور صوانية نباتية الاصل تكونت من تراكم وتكسب روبات الشذيرات العائدة الى المشطورات.

Dinantien (F).

٣١٢٧٥ - دِينَانِي  
ساف من الحقبة الكربونية ويدعى ايضاً كلي، اطلبه.

Melanocetus (S).

Melanocetus (F). Melanocetus (E).

جنس اسماك بحرية لجمية من شائكات الزعائن وفصيلة الكواحيات. المعروف منها حتى الآن نوعان منتشران في لبحر المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط | اجسامها قصيرة، شبه صقية الشكل، طول نحو ٤٠ سم. تتميز برؤوسها المستفخمة وباشدها الكبيرة الفاغرة وبكثرة اسنانها الحادة وبانهاها النافذة المستقيمة. سنها عرياط عادم السفن. عيونها علوية الارتكاز تحتل قمة الرأس. ويعلوها في مقدم خطها ملمس مستطيل، غضروفية العانة ينتهي بشرة صغيرة تستعمله الذخاطة لاجتذاب الاسماك.

Acutangulif (F). Acutangular (E).

٣١٢٧٧ - ذَرِيْب  
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل عضو او شكل ضيق الزوايا.

Germigène (F). Germigen (E).

٣١٢٧٨ - رَاغِم  
راشم او راشمة نعت تعريفي يطلق جسموريا، اي في علم الفيزيولوجية، على غديدة في الجهاز الشقي تحضن خلية الجبلة حتى الانعصاب وذلك عند المهزئات والعقيبات والمنطقيات.

Manubrium (F). Manubrium (E).

٣١٢٧٩ - رُدَيْن  
الاسم الفرنسي والاكليزي من اللاتيني بمعنى ردن وكيم. والردين، في علم النبات، خلية من المشن التي ترتب منه اثيرة الخبيقات من الخبيات الحضر | وهو في علم الحيوان، شبه انبوب ادرم التركيب مركزه في وسط مظلة المنوس يحمل في طرفه قم الحيوان.

وحدات الخلية وذلك باتحاد نوى الوذاف المقاربة.

Dermatogène (F). Dermatogen (E) ٣١٢٦٤ - دُرَيْمَة

الدريمة هي نسج الطبقة الخارجية من غلاف التثيط في النبات.

Desmidées (F).

٣١٢٦٥ - دُوسِيْدِيَات  
عمارة نباتات مائية من فصيلة الدغمات التابعة الى الخبيات الخضرة. اجناسها المعروفة قليلة العدد جميعها من وحدات الخلية تعيش في المياه العذبة | اشهر اجناسها للسديد.

Périlème (F). Periblem (E).

٣١٢٦٦ - دُشِيْلَة  
النشينة: هي نسج الطبقة الوسطى من غلاف التثيط. مركزها بين الدريمة واللبسة.

Acrogamie (F). Acrogamy (E).

٣١٢٦٧ - دُعَاطَة  
الدعاطة، في علم النبات، تطور يطرأ على الانبوب الطلي فيدخل البيضة من السم.

Alléomorphisme (F).

Allomorphism (E).

٣١٢٦٨ - دُعَاشَة  
الدغاشة، في علم النبات، طور من اطوار التناسل الدائي يتميز بالتقابل الشكلي والتخالف الوراثي.

Pérolème (F). Perolem (E).

٣١٢٦٩ - دُكَيْسَة  
الدكيسة هي نسج الطبقة الداخلية من غلاف التثيط في النبات.

Bombyliidae (S).

Bombylides, Bombyliidés (F).

٣١٢٧٠ - دُنَانِيَات  
فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٥٠ منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الحارة | اجسامها مبططة صغيرة القد او متوسطة. رؤوسها صغيرة وبرة، مستطيلة الاطظام الناصبة. كولسلها وبطنها مزورة. قرونها الاستشعاري قصيرة ودقيقة. اجنحتها ضيقة مستطيلة | يرقانها طفيلية تعيش في خشاوات واصقان ومحاجر غشائيات الاجنحة | اشهر اجناسها: الدانة، العتروس، اللمسة.

Danaidae (S). Danaidés (F).

٣١٢٧١ - دُنَيْسِيَات  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة صولجانيات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد اعطانها المناطق الحارة في جميع اقطار العالم | اجسامها رشقة، متوسطة القد او كبيرة. ووشها مزورة، جميلة الالوان، مستديرة الاطراف. قرونها الاستشعاري صولجانية الشكل | اساريها خاضلة تعيش على اوراق النبات | اشهر اجناسها الدنيسية.

Danaïs (S).

٣١٢٧٢ - دُنَيْسِيَة



ذخاطة

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكنبانية منذ تقلص الميك او هبوطه .

٣١٢٨٩ - رَوْدَكِي (F) Ontogénétique, Ontogénique (F) Ontogenetic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالرويدة اي بنشوء الكائنات .

٣١٢٩٠ - رَوَقْشَة (F) Glyptognosie (F) Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

٣١٢٩١ - رَوْمَد (F) Cinérîtes (F).

الرومد رماد بركاني منصّب .

٣١٢٩٢ - رُيْبَنَة (F) Soriculus (S), Soricule (F) Soriculus (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبائيات ورثة الحشرّيات . انواعها المعروفة خمسة اعطائها المناطق الجبلية الاسيوية اخصها الهند والصين | جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والديدان .

٣١٢٩٣ - رُجِين (F) Abortif (F), Abortive (E).

نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

٣١٢٩٤ - رَحَّالَة (F) Pyrrhocoris (F).

جنس حشرات ناهمة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الزحّاليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم | اجسامها اهليجية ، مبططة ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها معتدلة الجسم . عيونها صغيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصّل المستطيلة . بطونها سوداء اللون او حمراء . اجنتها ملوّنة بكثّر فيها التبقيع والتجذيع | تألّف بمعظمها الحياة الجماعية . شراندها تعدّ بعض العشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه من حشرات وهوام .

٣١٢٩٥ - رَحَّالِيَّات (F) Pyrrhocoridae (S), Pyrrhocorids (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة | اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها اهليجية او بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، تطول من ٧ الى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصّل . اجنتها مستطيلة ثلاثية العقل | اجنتها متقاوطة الطول ، معظمها نصفية وبعضها يلحف اكثر من زامين | قواصمها نشيطة معتدلة القد | معظم انواعها ناهم قوته النبات وما يستطيع اقتراسه من حشرات | اشهر اجناسها الزحّالة .

٣١٢٩٦ - زَكَوَاة (F) Diécie (F).

الزكاوة حالة فيزيولوجية عند المشرّيات تسمّ بازواجية الخلّة .

٣١٢٩٠ - رَيْبِس (F) Métabstable (F), Metastable (E).

نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من دقّة الوجوب .

٣١٢٩١ - رَصَيَّات (F) Lycopodiales (F).

فئة من النبات عاشرت بانواعها العديدة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلية منذ الحقبة الديفونية | انواعها المنقرضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكّل معظم غابات مناطق الحقبة الكربونية | وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنصودة | اما الانواع المعاصرة فجميعها عشبية تجمعها فصيلة الخدرّيات .

٣١٢٩٢ - رَصِيْمَة (F) Batholite, Batholithe (F).

اسم يطلق في علم الحصلية على كل كتلة من الطّح او الصخور الثّائرة لا تيسية الشكل انما مستعرضة القاعدة .

٣١٢٩٣ - رَغِيل (F) Périgyne (F), Perigynous (E).

نعت تعريفي يطلق على توجع الزهرة واسديتها عندما تكون متدججة في الكأس حيث تشكّل طوقاً يحوق بالمبيض .

٣١٢٩٤ - رَغِيلِي (F) Périgynique (F), Perigynic (E).

نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال انماج الاسدية في كمّ الزهرة او حول المبيض .

٣١٢٩٥ - رَيْلَة (F) Enicurus (S), Enicure (F), Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سبّات المناظير وفصيلة الذعريّات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها نعتاً من الهند الى ماليزية | اجسامها معتدلة القد ، تطول من ٢٥ الى ٢٨ سم . بما فيه الذنب الفارق المستطيل الرّفال | انثواها سوداء اللون ، مبلّقة بالابيض | تألّف ضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان | تعدّن افاحيصها في المواقع الوعرة المنيمة الشارّة على مجاري الماء . انثاها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوماً .

٣١٢٩٦ - رَقَّاش (F) Glyptographe (F), Glyptographer (E).

الرقّاش من تعاطى الرقاشة اي علم الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

٣١٢٩٧ - رَقَّاشَة (F) Glyptographie (F), Glyptography (E).

الرقاشة هي علم الحجارة المنقوشة او المحفورة القديمة العهد .

٣١٢٩٨ - رَكَاجِي ، رَكَاجِيَة (F) Epirogénique (F), Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض اجزاء الكتل القارّية . مثالنا على ذلك الارتفاع المستمر .



ريلَة



زينة

Étiétiens (F).

٣١٣٠١ - سَحْجُوجَة

اسم يطلق على رياح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وصفات حوضه. مصدرها تناوبي من الشمال ومن الجنوب، يحركها التبخر الشديد فوق الماء ووغرة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

Placentation (F). سَحْخُدَة

Placentation (E).

السخدة في النبات هي كيفية انجراح السخد داخل العض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: محورية أو جولية أو مركزية.

Aboral (F). Aboral (E).

٣١٣٠٣ - سَرْوِي

نعت تعريفي يطلق في علم الزوولوجية على ما هو كان في الناحية المقابلة للثم عند الحيوانات الدنيا.

Géothermie (F). Geothermy (E).

٣١٣٠٤ - سَعَارَة

السعارة هي حرارة الأرض.

Géothermique (F).

Geothermic (E).

٣١٣٠٥ - سَعَارِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

Sphenophyllum (S).

Sphénophylle (E). Sphenophyllum (E).

٣١٣٠٦ - سَفَنِيل

جنس نباتات متحجرة من فئة السفنيليات. جميع أنواعها جذمورية، عشبية، موقرة. منبتها المنافع والغدران.

Sphénophyllées (F).

٣١٣٠٧ - سَفَنِيلِيَّات

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة الباليوينة وانقرضت في البرمية من الأياح الأول إلى بالان ان الأمسوخيات سوية البوغ تتحضر منها ذلك لأن نطق الشبه بينها لا تفل عن ٨٥٪.

Pinnule (F). Pinnule (E).

٣١٣٠٨ - سَلْفَة

السلفة ورقة لا تياسة الشكل، غالباً مستطيلة.

Sapropel, Sapropèle (F).

Sapropel (E).

٣١٣٠٩ - سَپِيل

السيل حمأة ننتة تنود إلى بقايا حيوانات مجهرية رست في قعر البحار ففسختها البكتيريا.

Sapropelique (F). Sapropelic (E).

٣١٣١٠ - سَپِيلِي

نعت تعريفي يطلق على المادة العضوية المعادة إلى العلم والنبت التي فسختها المياه الناعمة.

Cimbex (S). Cimbex (F).

٣١٣١١ - سَبِيلُ

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وفصيلة السبيليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تألف الغابات والحراج الظليلة أجسامها كبيرة، شديدة النشط. اعطاطها ماصة، قرونها الاستعارة صلبة الأطراف. اثوابها

Melipona (S). Mélipone (F).

٣١٢٩٧ - زُعمَة

جنس حشرات عسالة من غشائيات الأجنحة وفصيلة الزمعيات. أنواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها المناطق الاستوائية والحرارة أجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محببة البطون، خملية القشار، عادمة الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. نولها يتكون من ثلاث فئات: الأولى ثم الذكور ثم فئة العاملات العامة الشوار الشقي. اثابها تطول، حسب الأنواع، من ١٢ إلى ١٧ مم. ذكورها تطول من ١٠ إلى ١٤ مم. أما عاملاتها فتطول من ١١ إلى ١٥ مم كوارتها أو محاجرها محرسه، شبه هرمية الشكل، نواعدها سطوحها. نخاريها صفوف افقية الارتكاز تستعملها الأولى لمتح السرة. أما رحيق الأزهار التي تجنيه العاملات فتخاربه اجرة بيضية الشكل مركزها في الزام الاول اي الاسفل من الكؤارة عسلها يختلف مع اختلاف الأنواع والمراعي. أما الإنتاج الحولي فيراوح من ٢ إلى ٦ كيلو أعرف أنواعها واشهرها الثلاثة التالية:

Melipona scutellaris (S).

زُعمَة السَّرَّاريل  
أكبر أنواع الزُعم وأعما انتشاراً. عسلها جيد الصنف، غني بالعرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

Melipona fluviipes (S).

زُعمَة البرافواي  
متوسطة القد والانتشار. عسلها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

Melipona enxui (S).

زُعمَة أنكسوي  
متوسطة القد. ترعى في كؤارات خاصة تعلق على الأشجار. عسلها طيب، مقو، ناعظ، مستحب الطعم. انتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

Meliponidae (S). Méliponidés (F).

٣١٢٩٨ - زُعمِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من العالمين القديم والجديد أجسامها شبيهة اجسام النحل لكنها اصغر قد ولا شذام لها. جميعها عسالة. معظمها يقيم كؤارته في جذوع الاشجار النخرة | ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. نولها يتألف من اثنى كاملة الشوار الشقي وظليقتها منح السرة. ومن بعض الذكور وظليقتها كوم الاثنى المالكة. ومن عاملات عادمة الشوار الشقي تشيد الكؤارات وتبني فيها النخاريب وتجني الرحيق والطلع | أشهر اجناسها الزُعمَة والصَّواعة.

Spermatie (F).

٣١٢٩٩ - زَبَيْف

الزيف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الخطي الشكل، عند بعض الفطور والخليات.

Sigillariées (F).

٣١٣٠٠ - سِجِلَّارِيَّات

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسوقها الضخمة الكبيرة وبأوراقها المركبة المنتظمة التنسيق الطولي.

الزيمية عن رباطه الخنّي في بعض الالبيات اخصها المشطورات.

Stèle (F). Stèle (E).

٣١٣٢٠ - شَطَاب <sup>○</sup> الشطاب، في علم النبات، هو الجزء الداخلي من الجذر او الساق الذي يشمل الاعوية الخشبية واقنية النجب.

٣١٣٢١ - شَمَاح <sup>○</sup> Acrogène (F). Acrogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فطر نوعية ساقه واروسسته رأسية الشماخ.

٣١٣٢٢ - شَيَاكَة <sup>○</sup> Hétérozygotie (F). Heterozygosity (E).

الشياكة هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات || ومنهم من قال اختلائية الازدواج. راجع اشيب.

٣١٣٢٣ - صَالُوج <sup>○</sup> Travertin (F).

حجر من الغليس الجصّي يصلح للبناء.

٣١٣٢٤ - صَتَام <sup>○</sup> Pétrographie (F). Petrograph (E).

الصَتَام من تعاطى الصنامة اي علم الصخور.

٣١٣٢٥ - صُفْر <sup>○</sup> Halistur (S). Halistur (F). Halistur (E).

جنس طير من الكواسير وفصيلته الصقريات. انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها الهند وآسية الشرقية واسترالية || اجسامها شبيهة باجسام العقبان إلا انها اصغر قدًا. اطوالها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اناوبها ثنائية اللون. رؤوسها واعناقها وصدرها بيض. ارجلها وساقها واطراف بطونها وافخاذها واذنابها الى الشقعة السمره، مواجهها يختلف مع اختلاف الانواع || تألف الشطوط البحرية والمواني. تغطس في الماء كالنورس. قوتها الاسماك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية.

٣١٣٢٦ - صَوَاعَة <sup>○</sup> Trigona (S). Trigone (F).

جنس حشرات عسّالة من غشائيات الاجنحة وفصيلته الزيميات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الاستوائية || اجسامها شبيهة باجسام النحل لكنها اصغر قدًا ولا شدام لها انما تعض وعضتها مؤذية || ملجئها الحياتي جماعي كسائر انواع الزيميات. تشيد كوّاراتها على الاشجار وعلى الصخور. تبنيها بالطين وتغلفها بمختلف المواد النباتية. مداخلها فردية انبوية الشكل، تسمح بمرور صواعة واحدة. نخاريها افقية الارتكاز. اجرة العمل بيضية الشكل، صغيرة القد، تحتل الزام الاول والثاني من الكوّارة || عملها دون الوسط. اتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

٣١٣٢٧ - صَوْغِي <sup>○</sup> Phylétique (F). Phyletic (E).

نعت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات.

ملونة، يكثر فيها الاصفر | يرقاتها خاضلة لتلثم اوراق معظم الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات. وريقاتها هذه تنفذ، عند الدفاع عن النفس، بسائل اخضر اللون كاو. طور الاكمال ينقص ضمن فيلجة سمره اللون تحببها على الافئاد او على الاوراق العروة.

٣١٣١٢ - سَبَكِيَّات <sup>○</sup> Cimicidae (S). Cimicidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة. يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبلية || اجسامها متوسطة القد أو كبيرة، مخاطمها ماصة. قرونها الاستشعارية معتدلة الطول، صفة الاطراف | يرقاتها خاضلة، مؤذية عند كثرتها || اشهر اجناسها السبكب.

٣١٣١٣ - سُنُقُس ، سُنُور <sup>○</sup> Suncus (S). Pachyure (F).

جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطائها بعض مناطق العالم القديم اخصها الهند وافريقية وجزيرة مدغسكر || اجسامها صغيرة القد تطول من ٧ الى ١٢ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها خرزية. اذنها صغيرة. جرمها معتدلة الطول. اصابعها مجهّزة باظافر حادة. اذناها طويلة. اناوبها متباعدة الاوان السوية تكثر فيها الذبسة والسمة القاتمة || اناها اميز قدًا من ذكورها وابنتها ثوبًا منها || قوتها الحشرات والديدان.

٣١٣١٤ - سُنُورِي <sup>○</sup> Cénozoïque (F). Cénozoic (E).

نعت تعريفي يطلق، حصليًا، على برهة من الزمن تشمل الاحقاب التي توالى منذ الحقبة التثوية الى المعاصرة.

٣١٣١٥ - سَوِي اللَّون <sup>○</sup> Concolore (F). Self-coloured (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد.

٣١٣١٦ - سَوِيل الْبَرُغ <sup>○</sup> Isosporé (F). Isosporous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوجه متجانس الشق والشكل.

٣١٣١٧ - شَاوِخ <sup>○</sup> Atypique (F). Atypic (E).

نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل تسلسل خلويّ يشذ عن القبس المثالي.

٣١٣١٨ - شُخُوص <sup>○</sup> Surrection (F). Upheaval (E).

الشخوص، حصليًا، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض.

٣١٣١٩ - شَذِيرَة <sup>○</sup> Frustule (F). Frustule (E).

جسيم صوّاني التركيب. شديد الصفر، فصلته العوامل



سفر



الالوان المزخرفة الجميلة || مسرحها بحار المناطق الحارة. يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والرجان.

٣١٣٢٨ - صَبْوَة (F). Tobacco-pouch (E).  
الصَبْوَة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ المفروم، صغير القد يوضع في الجيب.

Pangium (S).

Pangie (F). Pangium (E).



ضجرة

٣١٣٣٦ - طَهَب °  
جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهباء. منبتها البلاد الحارة، يكثر وجودها في جاوا || سوتها فراء. اورثاها متعاقبة، متباعدة. ازهارها ثنائية السكن. ثمارها عنبية لوبية || اشهر انواعها الطهبة المأكولة (S). P. edule  
منبتها جاوا. جميع اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثمار جعالي المائدة وافر الحامض السانديريكي || ثمارها مأكولة بعد تقمها ٤٨ ساعة في الماء. ويستخرج من يزورها بعد تقمها ايضا مادة زيتية مسهلة شائعة الاستعمال || اما اغشائها فتشدية الصلاة فاخرة الصنف.

Enicognathus (S).

Enicognathe (F). Enicognathus (E).

٣١٣٣٩ - صُجْرَة °  
جنس طير من المتصلات وفصيلة البغاوات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارة اخضها الهند وامريكا الجنوبية || ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البرية وبعض الحشرات || اجسامها معتدلة القد. تتميز بمناقيرها المستطيلة الالاف العليا المخروزية الشكل || اشهرها ضجرة الشيلي نوبها الى الخضار الاسفح الموج. قمة رأسها واطراف قوامها الى الزرق العافية. محصرها وذننها الى الحمرة القرمزية.

Pangiaceae (S).

Pangiaceés (F). Pangiaceae (E).

٣١٣٣٧ - طَهَبَات °  
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد الحارة والاستوائية من العالم القديم || اعرف اجناسها واشهرها الطهبة والعصرة.

٣١٣٣٠ - صُرَّاسَة °

Delphinula (S). Delphinula (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الصُرَّاسَات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم || اصداها شبه مخروطية الشكل، للؤلؤة الصفحات الداخلية، كثيرة التضاريس والتلويحات الشائكة من الخارج || اشهر انواعها الصُرَّاسَة المعروفة (S). D. lacinata التي يكثر وجودها في بحار الصين.

Andrena (S). Andrène (F).

٣١٣٣٨ - عَذْرَيْن °  
جنس حشرات حبوبية من فصيلة العذريبات. انواعه المعروفة بكثرة معظمها من عظم المناطق الشالية. ملجنها الحياتي فريدي. اوكرها محاجر تحفرها في التربة || اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. ألوانها متباينة منها السوية اللون ومنها المخضبة والمجعدة || قوتها رحيق الازهار وطلعها تختزن بعضه في تخاريب ورتبة المائدة تقمها في محاجرها كغذاء لدها قبل ان تتحول الى حشرات جميلة سارحة || اشهر انواعها واعمها انتشارا - العذرية اليرمانية Andrena cineraria - والعذرية الصفراء Andrena fulva

Delphinulidae (S).

Delphinulidés

٣١٣٣١ - صُرَّاسِيَّات °  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم الجعنية. اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه مخروطية الشكل، كثيرة التضاريس والاطانات والتلويحات الشائكة. فوهاتنا مستديرة. اجسامها صغيرة، رحية الاربية، معتدلة الارجل || اشهر اجناسها الصُرَّاسَة.

Andrenidae (S).

Andrénidés (F).

٣١٣٣٩ - عَذْرِيَّات °  
فصيلة حشرات من الحبوبيات ورتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطائها المناطق الشالية وبعض الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. ألوانها ملونة تكثر فيها السمرة المختلفة الماجاة وبعضها اصفر او مخضب بالاصفر الاخضر || ملجنها الحياتي فريدي. الذكر يعيش حتى زمن النحاح فيكوم الاش وبتلاشي. الانثى تمتع مكانها في تخاريب خشاهما التي تقمها في محجر تحفرها في التربة || اعرف اجناسها واشهرها العذرين والسكود.

Stationnel (F).

٣١٣٣٢ - طَدَائِي °  
نعت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل هجين سقتر الصفات.

Paralique (F). Paralic (E).

٣١٣٣٣ - طَلِّي °  
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالشطوط البحرية.

Glyptogénèse (F).

Glyptogenesis (E).

٣١٣٣٤ - طَلَّاسَة °  
طور من اطوار المناشع الحصلية حيث العوامل الطبيعية الناقضة، اخضها المياه والرياح، قوّضت معالم القشامة الاولى.

Pluricellulaire (F).

Pluricellular (E).

٣١٣٤٠ - عَدِيمَاتِ الْخَلَايَا °  
نعت تعريفي يطلق على كل كائن حي مركب من كتلت الخلايا.

Acronuridae (S).

Acronuridés (F). Acronuridae (E).

٣١٣٣٥ - طَلَّرِيَّات °  
فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد، زاهية

Lipotyphla (S).

Lipotyphles (F). Lipotyphia (E).

٣١٣٤١ - عَدِيمَاتِ الْمَرْغَةِ °  
مرتبة من الحشريات تتميز بخلو اعمالها من المعرفة وشبه

طَرِيَّةٌ. ثمارها عَنَبِيَّةٌ لَبِيَّةٌ || أشهر أنواعها العصرة السامة H. venenata ثمارها سامة ذائعة.

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة ° Gonochorisme (F).

Gonochorisme (E). العنَاكة هي الانفصال الشقي. وهي بيولوجيًا عكس الخنثية.

٣١٣٤٩ - عَيْكٌ. Gonochorique (F). Gonochoric (E).

نعت تعريفي يطلق، بيولوجيًا، على كل كائن وحيد الشق أن في الحيوان أم في النبات.

٣١٣٥٠ - عَوْس ° Eos (S). Eos (F). Eos (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية إلى جزر الزلابج. ملجنها الحياتي جماعي. افواجها تراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ زوج || أجسامها معتدلة القد. أنواعها تراوح من الحمرة الأرجوانية إلى البرتقالية || اعرف أنواعها واشهرها:

Eos rubra (S). - العَوْسُ الْبَاثُونِي  
Eos Cochinchinensis (S). - العَوْسُ الْكُوْشْنِيْنِي

٣١٣٥١ - عَوْزْمَان، آزْرَان Synergides (F).

العومران أو الأزران اسم يطلق على خليتين توجان فصّ الملك أو ينتهي بهما جراب الطلع.

٣١٣٥٢ - عُشَارِيَات ° Psilophytales, Profilicales (F).

فئة من النبات تنتمي إلى مستورات الزهر الوعائية. مركزها التسلسلي يأتي بعد المشريات وبين الخثيات والطحليات || وهي من النباتات البسيطة التركيب العادة الجذور الحقيقية.

٣١٣٥٣ - عُجْجِيَات ° Galeidae (S).

Galéidées (F). Galeidae (E).

فصيلة أسماك بحرية من السفنجيات. أجناسها المعاصرة المعروفة ثلاثة، جميعها من الاشلاق الوشعية الشكل || تتميز بنسائها المغلوفة بغشية سادة متحركة. أشهر اجناسها وأعما انتشارًا الفطروس.

٣١٣٥٤ - غُلَيْبَتُون ° Glyptodon (F).

Glyptodon (E).

جنس حيوانات احفورية من اللبونات الدرد. احافرها تعود إلى الياج الرابعي. جميعها من المفترسات الامريكية المهة || اجسامها ضخمة، كبيرة، مغلقة بذبال عظيمة سمسة الزوايا. اطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة أمتار || يقال أنها كانت تعيش حياة التاتو أو المنزوع.

٣١٣٥٥ - عُثْلِيل ° Dentalium (S). Dentale (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات وفصيلة الغليليات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصداها بقوة الشكل أو مردنته. منها الجالسة والمنعطفة والمحججة. صفحتها الخارجة مخددة السطح.

اتعدام مرتفعها الحوضي. وهي تضم سبع فصائل الزبائيات والظوبنات والبيبات والمقنذات والمذائيات والمكسبات والعسرنيات.

٣١٣٤٢ - عُشْرَب ° Chrysochloris (S).

Chrysochlore (F).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة العسرنيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية والجنوبية || شكله قريب الشبه بالخط. جسمه يطول من ١٢ إلى ١٦ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم. عيناه صغيرتان مغلوفتان بغشاوة من الجلد متحركة. اذناه صغيرتان، ماسحتان، لا قومية التركيب. عنقه شديدة القصر. ذنبه جدعة. جرامزه قصيرة، مسلحة باظافير ضليعة، جاسئة. الامامية منها رباعية الاصابع. الخلفية خصاستها. ثوبه قسطناني اللون كثيف الوبر الناعم القصير. الاثنى ابرز قدًا من الذكر || قوته الحشرات والبدان والزحافات الصغيرة || أشهر انواعه:

Chrysochloris aurea (S).

Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).

موطنه افريقية الجنوبية. ثوبه قسطناني اللون، ذهبي المواجه.

٣١٣٤٣ - عُشْرِيَّات ° Chrysochloridae (S).

Chrysochloridés (F). Chrysochloridées (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة من عديمات المعرفة ورتبة الحشريات. انواعها المعروفة عديدة جميعها جنس واحد العسرب || اجسامها مكدرمة، اسطوانية الشكل، صغيرة القد. رؤوسها مستغلطة، مخروطية، ذلقة الاخطام. عيونها صغيرة مغلوفة بنشاء جلدي متحرك. اذناها صغيرة، ماسحة. جرامزها الامامية مسلحة باظافير تشبلة، جاسئة. الاوها قسطنانية اللون، جميلة الماچات المتراكبة، كثيفة الوبر الناعم القصير. اثنائها اكبر قدًا من ذكورها.

٣١٣٤٤ - عَصِيم ° Holométabole (F).

Holometabolous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تامة التطور الاكالي. م عسمة.

٣١٣٤٥ - عُثِيد ° Tractus (F). Tractus (E).

اسم يطلق على الخيوط والحزم اللبغية الموجودة في وثن النسيج النباتية والحيوانية.

٣١٣٤٦ - عَصَبُون ° Nevraxe (F). Nevraxe (E).

اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

٣١٣٤٧ - عَصْرَة ° Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات. انواعها المعروفة ستة. منهاها البلاد الحارة والاستوائية || اشجارها كبيرة دائحة. اوراقها متعاقبة. ازهارها محورية الارتكاز،



عسرب



عوس



غليبتودون

Gal. tigrinus (S). **فُطْرُوسٌ بَرِّيٌّ**  
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.  
ثوبه بين الصهبة والشفقة المرفوشة بالسمرة العابقة. بطنه  
الى الشهية العاجية.

Phyllite, Phyllithe (F). **٣١٣٦٣ - فِلَيْت**  
Phyllite (E).  
ورقة متحجرة او حجر نقشته الاوراق بوسوما.

Astrophysique (F). **٣١٣٦٤ - فِيزِيَاءُ كَوْكَبِيَّة**  
Astrophysical (E).  
الفيزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي  
المناهج والاساليب التقنية الخاصة بها.



فطروس

Bathyal (F). Bathyal (E). **٣١٣٦٥ - قَاعِي**  
نعت تعريفي يطلق في علم الحصبلة (الجيولوجية) على  
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م  
[من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتلقفها.  
استقرار الحرارة وتساوبها. عدم نفاذ التور. قلة وجود  
النبت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى  
والسفلى. عظمها محصورة بالرخويات رأسيات الأرجل  
والقشريات والاسماك المقترسة والسامة التي تعيش على  
المواد العضوية العائنة الى البحث الراسية] اما الانثربة  
الكثائية او الشسئية المنتشرة على سطح الارض فهي  
بمعظمها تولى الغفار او الصلصال القاعي الذي كان  
راسياً على هذه الاعماق في الاباح الاول.

Xérophilie (F). Xerophily (E). **٣١٣٦٦ - قَتَانَةٌ**  
القَتَانَةُ منمش طبيعي يقود النبات القتن، الذي يرغب في  
المناحات الجافة، الى تكاثف الائمة واغوار الخلايا  
السفوية في داخلها.

Dryopithecus (S). **٣١٣٦٧ - فِرْدُ العُصْص**  
Dryopithecus (F).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد العُصْص. جنس قرد  
مقرضة تعود احافيرها الى الزمن الميساني من الحقبة  
النويوجينية [هيكلها العظمي شبيه بهيكل الغوريلى وشبه  
البعامة من حيث القد] وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين  
السلالات البشرية.

Crossopus, Neomys (S). **٣١٣٦٨ - قُرُصُوب**  
Crossope (F).  
حيوان ليون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبابيات  
ورتبة الحشرجات. اعطاه تيمت من الصين الى اروية.  
يألف صفات الانهار، ويوم وبطن في الماء فيقتنص  
الحشرات المائية واساربها والاربابين والاسماك  
وبلاعيها [جسمه صغير القد، شبه الزبابة. طوله بما  
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، ولثق  
الحطم، عيناه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.  
تواضع كنية الاطراف، عاندة الاصابع، خنارها حلب لب  
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه مجاني  
الشكل، يطوقه خنار من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. اردنبها قليلة الرحابة. ارجلها  
قصيرة، ثلاثية القلق [تعيش متغنية في الرمال والاسمال.

Dentalidae (S). Dentaliids (F). **٣١٣٦٩ - غِثْلِيَّات**  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات.  
اجسامها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.  
اكبرها قد ابعدها غوراً [اصداها كلسية المائدة، متباينة  
الاشكال والحجوم، منها المرنينة والوقية والانويوية  
والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صفحانها  
الخارجية مخددة السطوح او ماسلة، الداخلية صقيلة  
اشهر اجسامها الغمليل.

Gamétophyte (F). **٣١٣٥٧ - غِيَامَةٌ**  
Gametophyte (E).

الغيامة، في علم النبات، طور من اطوار الانخصاب  
الشري، يبتدى مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند  
الانخصاب.

Anisotrope (F). **٣١٣٥٨ - غَيْرُ مُتَسَاوِي الْإِتِّجَاه**  
Anisotrope (E).  
نعت تعريفي يطلق، فيزيائياً، على كل مادة صفاتها  
الحكمية او الميكانيكية لانتساوية الاتجاه.

Chlamydé (F). **٣١٣٥٩ - فَحِيث**  
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق أيضاً على  
كل عضو ينفشاه غلات خارجي.

Tuniciers, Urochordés (F). **٣١٣٦٠ - فُصْيِيَّات**  
Urochordata (E).

صفت حيوانات بحرية ركنية او طوحيّة ملحوقة ببناء يشبه  
الثقلية [فصائلها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد.  
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها  
العصبي الظهري الاكناز وهو مؤلف من مكاش شوكي  
يمتد امتداد الجسم. اما التنفس فتؤتمنه فلولج خيشومية  
مركزها في جانبي البلعوم.

Interstellair (F). **٣١٣٦١ - قَفْصَاءُ حُسْنِي**  
Interstellar (E).  
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocerdo (S). **٣١٣٦٢ - فُطْرُوس**  
Galeocerdo (F). Galeocerdo (E).  
جنس اسماك بحرية من السفنقات وفصيلة الغلجيات.  
انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اما المقرضة المتحجرة في  
الاراضي الطباشيرية والثلاثية فأربعة [اجسامها وشبه  
الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بانسانها  
المحززة والتساوية العدد في الفكين] اشهر انواعها  
المعاصرة فطروس الشمال والفطروس البوري

Gal. Arcticus (S) **فُطْرُوسُ الشَّمال**  
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء.  
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

Bittacidae (S).

Bittacidae (F). Bittacidae (E).

فصيلة حشرات قانصة من رتبة شارات الاجنحة  
عصبيات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشمالية  
اجسامها قضيعة متباينة الطول. قوائمها دقيقة مستطيلة.  
اجنحتها ضيقة، مستديرة الاطراف | قوتها كل ما  
استطاعة قصه من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها  
بأكثريتها دائمة نائلة ومنها الواجبة والقِرْصَامَة | اشهر  
اجناسها القِمَاصَة.

Xenophora (S). Xénophore (F). ٣١٣٧٤ - قِمَاصَة

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل  
اماميت الخياشيم وفصيلة القِمَاصَة. انواعها المعروفة  
قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها  
شبه مظلة الشكل، كلسية المادة، متراكبة الاطراف  
المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واشهرها :

X. lithophora (S).

X. corrugata (S).

- القِمَاصَة المَحْبِيَة  
- القِمَاصَة المَصْفُودَة

Xenophoridae (S).

Xénophoridés (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل  
اماميت الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة  
العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداها  
صغيرة القد، مظلية الشكل أو صوانية. صفحاتها  
الداخلية عادمة المادة اللؤلؤة اما الخارجية فمُتَبَجَة  
بالزخارف والاطراف المتباينة الاشكال والالوان | اشهر  
اجناسها واعرفها القِمَاصَة.

Nomade (S). Nomade (F). ٣١٣٧٦ - قِمَاصَة

جنس حشرات حموية من غشائيات الاجنحة وفصيلة  
القِمَاصَة. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع  
اقطار العالم | اجسامها رشيقة هيفاء متوسطة القد أو  
صغيرة. اوائها متباينة تغلب فيها الشقحة فالصبة  
والتنجين بالاصفر أو الزنجري | الحشرات الجملانة  
تمشي على رجليها الاقدام وظلها. يرقاتها طفيلية تعيش في  
محاجر العذريّات والنّارِيات وغيرها.

Nomadidae (S). ٣١٣٧٧ - قِمَاصَة

Nomadidés (F). Nomadidae (E).

فصيلة حشرات حموية من رتبة غشائيات الاجنحة.  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع  
العالم | نظامها الحياتي فردي. انائها تتمتع الممكن قرب  
مداخل محاجر غيرها من غشائيات الاجنحة اخصها  
العذريّات والهكوتسيّات والنّارِيات، فتصرح البرقات  
فور نفقا الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها  
البرقية على ما تنجيه العوائل | اشهر اجناسها القِمَاصَة.

Phénotypique (F).

Phenotypic (E).

٣١٣٧٨ - قَيْسِي

ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له  
صلة بالقنيس. التناسل القنيسي لا وراثي.

الشبهة السمراء تشدّ سمرتها في الظهر وتغير في الصدر  
والطن | الاثنى اميز قدا من الذكر وتحلّي بالتوب نفسه.

Crocidura (S). Crocidure (F). ٣١٣٦٩ - قِرْصَامَة

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبائيات ورتبة  
الحشرّيات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد  
الحارة والمعتلة الحرارة من العالم القديم. جميع انواعها  
جاسّة قوتها الحشرات والنباتان | اجسامها تطول من ١٢  
الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطية، ذلقة الاخطوم. عيونها  
صغيرة، مستديرة. اذانها ماسحة. جرامها معتدلة القد،  
خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظافر الحادة. اوائها  
تراوح من السمرة الحديدية العواج الى السمرة العابقة |  
انائها اميز قدا من ذكرها، يعتقد ان مجلها يوم نحو  
٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ادراص وذلك  
حسب الانواع.

Embletonia (S). Emblétonie (F). ٣١٣٧٠ - قِرْط

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنيت الارجل،  
خلقيات الخياشيم، جلديات التنفس. انواعها المعروفة  
قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة  
الأرضية | اجسامها صغيرة، عريضة، عادية  
الاصدا، مستطيلة الشكل | عبيدة اللوامس القموية  
الاهليجية، المبطلة. | معظم انواعها يعيش على  
الصخور البعيدة الغور.

Xyridaceae (S). ٣١٣٧١ - قِسُورِيّات

Xyridacées (F). Xyridaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة  
متوسطة العدد. مهدا بعض الاصقاع الاسيوية  
والامريكية. جميعها من ثوب المنافع والمواقع الرطبة |  
نباتاتها جنموية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب عصفية  
الشكل أو منصلية. تنويرها شعراخي. سننلي التجميع،  
هامي الارتكاز. ازهارها خنثوية، كبيرة القد، ملونة.  
اكمامها منغصة الراسات. ثمارها جراء ثلاثية الفلق.  
بزورها آحية، نشوبة المادة.

Bittacus (S). Bittaque (F). ٣١٣٧٢ - قَمَاصَة

جنس حشرات قانصة عصبية الجناح من فصيلة  
القِمَاصَة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم  
اقطار العالم | اجسامها قضيعة مستطيلة القوائم والاجنحة.  
بكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء |  
جميعها مقترسة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دائمة وثلاثة  
تعيش في الجلالة وتحت المدر.

B. tipuloides (S).

B. capensis (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).

B. blancheti (S).



قِرْصَامَة

Colloïde (F). Colloid (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا ينفص في الماء كالمصاعق شبه المتبلورات.

Prothalle (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُثْمَة

تنوء صغير، صفحي الشكل غالباً، يعلو بويضة ستورات الزهر الوعائية، تنمو عليه الاثيرة والسبين.

Condylura (S). Condylure (F). \* كَنْدُل

حيوان لئون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبينيات ورتبة الحشرات، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد، اسطوانتي الشكل، يطول نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بقنطرة صلبة يطولها اكليل من الشعاع اللامعة الغضروفية التركيب. عينا حريتان. اذناه طامستان. ذنبه مبعر الهلب القصير. جرابه خماسية الاصابيح المجهزة باظفار قوية، مستطيلة. ثوبه انبس اللون، اشقق المواج | الانثى اميز قداً من الذكر واهتت ثوباً منه. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من درصين الى خمسة ادراص | قوة الحشرات واليدان. يعيش في ثقق يخلده على عمق براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غيرة مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

Exothermique (F).

Exothermic (E).

٣١٣٩٠ - لَاحِش

تعت تعربني يطلق على كل تفاعل كيمائي ينبد الحرارة الناجمة عن تفاعله او تركبه.

Brassolis (S). Brassolis (F).

٣١٣٩١ - كَجَائِيَة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرون من فصيلة الكجائيات ورتبة حشرقات الاجنحة | انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة اجسامها كبيرة القد. رواشنها ملقعة جميلة التخضب. قروها الانتشاعارة صولجانية الشكل | اساربها خاضلة. ملجنها الحياتي جماعي. مجموعاتها تعدد بعض المئات. تعيش في جراب واحد غشائي المائدة. تسرح في الليل وتعود الى جرابها في النهار. ثلثم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤذبه اشق الأذى.

Brassoliidae (S).

Brassolioides (F).

٣١٣٩٢ - كَجَائِيَات

فصيلة حشرات من رتبة حشرقات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة الانريكية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد، جميلة الالوان والتقيح والزخرفة | اساربها خاضلة فتوزع اوراق النبات. جميعها غرضمية الملجن الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة غشائية المائدة تبثت فيها من

Bathymétrie (F).

Bathymetric (E).

٣١٣٧٩ - قِيَاسِي

تعت تعربني يطلق على كل ما له صلة بالقياصة.

Castnidae (S).

Castnides (F). Castnidae (E).

٣١٣٨٠ - كَسْتِنِيَّات

فصيلة حشرات فراشية من حشرقات الاجنحة مختلفات القرون. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اعصها الامريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة. تتميز بجمال رواشنها الخملية القشار الساطعة الالوان. وتتميز ايضاً باسترسال رواشنها، عند الراحة، على شكل جملون | أشهر اجناسها الكستينية.

Castnia (S). Castnie (F).

٣١٣٨١ - كَسْتِنِيَة

جنس حشرات من حشرقات الاجنحة وفصيلة الكستينيات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد تطول من ٣٥ الى ٤٥ سم. وبسطلها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ سم. رواشنها خملية القشار جميلة الالوان الساطعة المواج يكثر فيها الاسمر الحنطي يعلوه تجذيع وتقيح براوح، حسب الالوان، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اساربها مؤنبة تخلخ سوق الموز والانناس والصبار وغيرها من النباتات اللينة.

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٨٢ - كَطْبَة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة النمليات. انواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها امريكية المهد. ملجنها الحياتي جماعي. كسائر انواع النمل | اجسامها معتدلة الجرم لكنها تتميز بكبر وبغلاظة رؤوسها، فكوكها حادة فاضمة، حماتها ذرية تهريق مادة مخترة.

Calamariées (F).

٣١٣٨٣ - كَلَمَارِيَّات

فئة نباتات متجذرة يعود ظهورها الى الحقبة الكربونية. نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات. سوقها ليفية، مخشوشة، مجنونة، تطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حلقية الانتساب، عصية الشكل، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكليمات والبصريات.

Culm, Dinantien (F).

Culm, Dinan (E).

٣١٣٨٤ - كَلِمِي، نِيَّانِي

كلمي من «كولم» اسم موقع في المانية. ونباني من «دينان» اسم موقع في بلجيكية | ساق او طبقة من الحفبة الكربونية تتميز بشسها الكثير المائدة النباتية.

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٨٥ - كَلِمِيَّات

جنس نباتات متجذرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تعتبر من الاسوخيات الجبارة المنقرضة. شكلها قريب الشبه بالبوص. ارتفاعها براوح من ٧ الى ٨ امتار.



كندل

٣١٣٩٧ - لَوْرَنْتِيَّة <sup>٥</sup> (E). Laurentien (E).  
نعت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحبة السحبية  
العائدة إلى الأباح ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - لِيُتُوْرِيَّات <sup>٥</sup> (S). Lithosidae.  
(F). Lithosidés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. أجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الجبلية  
والاقاليم الباردة من العالم القديم || اجسامها كثيفة الخمل،  
شبه اسطوانية الشكل، تطول من ٢٢ الى ١٨ مم. سبطنها  
تراوح من ٤٢ الى ٥٢ مم. رؤوسها مزوانية الشكل.  
عيونها صغيرة. ملاسها ومراشفها دقيقة. قرونها  
الاستشعارية خيطية. رواشنها الامامية ضيقة. اثوابها  
عامة الزخرفة، الوانها تختلف مع اختلاف الانواع  
|| اشهر اجناسها الليتوزية.

٣١٣٩٩ - لِيُتُوْرِيَّة <sup>٥</sup> (S). Lithosia (S).  
(F). Lithosia (F). Lithosia (E).  
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات. انواعها  
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحرارة  
من العالم القديم || اجسامها متكاثفة الخمل الناعم تطول  
من ١٥ الى ١٨ مم. سبطنها تراوح من ٤٥ الى ٥٢ مم.  
رؤوسها معتدلة الجسم، صغيرة العيون، دقيقة الملاص  
والمراشف. ازبنتها خيطية الشكل. رواشنها الامامية  
ضيقة. مقطوعة الأطراف. رواشنها الخلفية رحيّة  
الانفراج، مستديرة الأطراف || اساربها تعيش على  
الحزاز.

٣١٤٠٠ - مَاحِش <sup>٥</sup> (F). Endothermique (F).  
(E). Endothermic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة  
الناجمة عن تفاعله || معظم المتفجرات من العناصر  
الماعشة.

٣١٤٠١ - مَتَبَيَانِ الْمَشْرِ <sup>٥</sup> (F). Hétérothallique (F).  
(E). Heterothallic (E).  
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي  
يجاري منشع المتباين المشري.

٣١٤٠٢ - مَقْصَاوِي الْمَشْرِ <sup>٥</sup> (F). Homothallique (F).  
(E). Homothallic (E).  
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي  
يجاري منشع التساوي المشري.

٣١٤٠٣ - مَقْلُوت <sup>٥</sup> (F). Triquètre (F).  
نعت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير  
تعلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة.

٣١٤٠٤ - مَحَاخ <sup>٥</sup> (F). Vitellogène (F). Vitellogen (E).  
محَاخ او مَحَاخَة نعت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية  
على غشية تنشأ منها الخلايا المحيية المزودة بالمواد  
الغذائية عند المنطقيات والمغقيات.

المصباح إلى الغروب لانها تسرح في الليل سعيًا وراء الزاد  
|| اشهر اجناسها للَحَاذَة.

٣١٣٩٣ - لَحَاذَة <sup>٥</sup> (S). Cuterebra (S). Cutérébre (F).  
جنس حشرات من رتبة نوات الجناحين وفصيلة  
الحَاذَات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض  
اقطار العالم اخصها امريكة الجنوبية والشرق الاقصى ||  
اجسامها مكرمة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها وعيونها  
ناشزة. ازبنتها نحيلة وقصيرة. اعظامها قسيحة. اثوابها  
ملونة، مجذعة الكواسل والبطون || انائها تمتع المكن على  
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فينقت عن  
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها  
البرقي. طور الاكمال ينقضي في التربة وينتهي بظهور  
الحشرة الجملانة.

٣١٣٩٤ - لَحَاذَات <sup>٥</sup> (S). Cuterebridae (S).  
(F). Cutérébridés (F). Cuterebridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة نوات الجناحين قصيرات  
القول. أجناسها وانواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج  
والغابات والمراعي. معظمها امريكي المهد وبعضها  
اسيوي || اجسامها صغيرة مكرمة. رؤوسها معتدلة  
الضخامة، ناشزة. عيونها كبيرة. قرونها الاستشعارية  
قصيرة ونحيلة. اعظامها صغيرة القد، قسيحة. اثوابها  
مجزعة || انائها تمتع المكن على جلود الحيوانات البرية  
والالهيّة فينقت عن يرقات صغيرة، دقيقة تنغتن في جلد  
المائل فتصّيب له قروح ونمايل وتبقى حتى يحين زمن  
الاكمال فتخرج عوائلها إلى التربة حيث تتحول إلى  
حشرة جملانة || اشهر اجناسها للَحَاذَة.

٣١٣٩٥ - لَدَاسَة <sup>٥</sup> (S). Gracilaria, Caloptilia (S).  
(F). Gracilaire (F).  
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الأجنحة وفصيلة  
الدَاسَات. انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم  
اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة نحيلة  
تطول من ٤ الى ٦ مم. سبطنها تراوح من ١٠ الى ١٤  
مم. قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة. مشرفها  
وملاسها نشيطة. رواشنها جميلة التخضيب الزاهي،  
مستعرضة التهذيب المختاري || اساربها تعيش على اوراق  
الاشجار العائلة اخصها البليك والحوور والمزيزفون  
والبتولا.

٣١٣٩٦ - لَدَاسِيَّات <sup>٥</sup> (S). Gracilaridae (S).  
(F). Gracilaridés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. أجناسها  
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق  
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد، مستطيلة  
الزباني الخيطية الشكل، مهذبة الرواشن الجميلة  
التخضيب. تتميز برؤوسها المزوانية الشكل وبمراشفها  
النشطة وبملاسها الدكيّة القويّة || اساربها تعيش على  
اوراق الاشجار النفضية اخصها الحرجية والتزيينية ||  
اشهر اجناسها الدَاسَة.

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة ااجسامها مستعرضة، مبطلة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستديرة، جاحظة. اخطامها ناشزة الفك الاسفل. اوابها فضية اللون يعلوها تعصيب ممتدس اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شائكة. زعانفها الذيلية فارقة ااحومها مأكولة.

Ginkgoales (F).

٣١٤١٣ - مَعَابِل

اطلب جيנקوات.

Bathomètre, Bathymètre (F).

Bathometer, Bathymeter (E).

٣١٤١٤ - مِقْيَاح

المقياس جهاز يرتكز على الثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.



مطادة

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَكَاغِمَة

المكاغمة في علم النبات هي اتحاد الاشعاج في التناسل اللثني.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَكُود

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F).

٣١٤١٧ - مَكِيس

Solenodon (E).

جنس حيوان لبون من فصيلة الكيسيات. له نوعان يعيشان في جزر الانتيل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد ااجسمه بطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجرد الا انه اسفني الرأس عري الذنب االسنجنه الحياتي فردي. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الثمار البرية والجنود ااما نوعا فهما مكيس الانتيل S. Cubanus (S) ومكيس كوبا S. Paradoxus (S). مكيس الانتيل كان كثير الوجود في جزيرة مايني الى حين ادخلوا على الجزيرة بعض الثموس للقضاء على الاناعي فقتض على الاناعي والمكيس.



مكيس

Enkysté (F). Encysted (E).

٣١٤١٨ - مَكِيس

المكيس، في علوم البيولوجية والطب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَكِيسِيَّات

Solénodontidés (F). Solenodontidae (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات عنيبات الممرغة ورتبة الحشريات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشتمل على نوعين مهدهما جزر الانتيل الكبرى والصغرى.

Menotyphla (S).

٣١٤٢٠ - مِزْجِيَّات

Ménotyphles (F). Menotyphla (E).

مرتبة من الحشريات تتميز حيواناتها بوجود الممرغة

Endothermicité (F).

Endothermicity (E).

٣١٤٢٥ - مَحَاشِيَة

المحاشية، كيمائيا، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام او العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢٦ - مَقَاة

الزغامة، بيولوجيا، نظرية افتراضية تبحث عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب الى القافة العلمية الحديثة تنفي هذه النظرية ذلك لأن اشعة ما وراء البنفسجي التي تهيب على الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiaceae (E).

٣١٤٢٧ - مَرَرِيَّات

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشربيات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغائرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من ثبوت المناطق الحارة ااسوقها قصيرة، دونصية الشكل، منتصب. اوراقها صمغ الاركتاز، تاجية الانتشاب، كبيرة القد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصلها مستعرضة يقلب فيها التفريض الريشي ثم الكفي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَرَرِيَّات

ججر من الجنس المتبلور تختزنه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مِيسَاس

تفاعل او ارتكاس الخلقة الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، كيميائية، حرارية، كهربائية، الخ... تأثيرات قد تكون جاذبة او دافعة فتدعى ايجابية او سلبية.

Thalloïde (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَشْرِي

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossoptérygiens (F). Crossopterygii (E).

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الديفونية. اجسامها مستطيلة الشكل تتميز بزعانفها الخوضية والبطنية الشاذة عن القنوس المألوفة وذلك بانتشابهها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حشيشية فاصلة. زعانفها الذيلية معددة ومصلبة اافصالها واجنسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها من متحجرات الحقبة الديفونية وما يليها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لاتيمرية» وهو من عظم ارتخبيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصحور وفي تجاويلها على اعماق براوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَطَاة

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E).

31427 - مُيُوزِي <sup>○</sup> ، إِنْجِدَاكِي Méiotique (F).  
Meiotic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقسام.

31428 - نَاجِدٌ <sup>○</sup> Propodite  
اسم يطلق على الفصلة قبل الأخيرة من قوائم القشرينات عشاريات الأرجل.

31429 - نَاسِيعٌ <sup>○</sup> Allométrique (F). Allometric (E).  
نعت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوهة لا تنسجم مع نوهة سائر الاعضاء الأخرى.

31430 - نَبِيثٌ <sup>○</sup> Coccolithe (F).  
النبيت جسيم مجهرى من كربونات الكلسيوم مشبع بالمواد العضوية يرسب في قاع البحر.

31431 - نَبِيلُ الْبُوعِ <sup>○</sup> Hétérosporé (F).  
Heterosporous (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية كمنته متباعدة البوغ المختلف الشق.

31432 - نَثَاةٌ <sup>○</sup> Gamétangie (F). Gametangy (E).  
النثاة طريقة إخصاب شائعة عند الفطور وبعض العنقيات. قوامها التحام النثاك الذكورية بالانثوية وانماجها فلتاتها وإخصابها.

31433 - نَبِيدَةٌ <sup>○</sup> Gamétange (F). Gametange (E).  
النبيدة في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العنقيات.

31434 - نَسَاجٌ <sup>○</sup> Histogène (F). Histogenous (E).  
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الانسجة الحية.

31435 - نَسَاجَةٌ ، هَيْسُوتُجِيَهْ <sup>○</sup> Histogénèse, Histogénie (F). Histogenesis, Histogeny (E).  
قسم من النجارة، علم الاجنحة، يبحث في تكوين النسج الحية وفي تطورها.

31436 - نَسَاجِيٌّ <sup>○</sup> Histogénique (F). Histogenic (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة.

31437 - نُسُوعٌ <sup>○</sup> Allométrie (F). Allometry (E).  
خاصة جسمية تتمتع بها عضو من الاعضاء فيسرع نشاط نوهته أو بانتقاصها بالنسبة الى سائر اعضاء الجسم. وهو ما يميز عنه بالنسوع الإيجابي أو السلبي.

31438 - نُسَيْلَةٌ <sup>○</sup> Chète (F).  
زائدة دقيقة إبرية الشكل تملو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة. يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يملو الفصل عند بعض الحشرات.

والمرتقن الغامى أو الحوضي. وهي تضم فصيلة الحاديات وفصيلة الطواجيات.

31421 - مُتَدَوِّلَةٌ <sup>○</sup> Monedula (S). Monédule (F).  
جنس حشرات قاصدة من الحويطات وفصيلة الوراشيات. انواعها المعروفة نحو 30 معظمها امريكية المهد اجسامها متوسطة القد او كبيرة، قربة الشبه بالزنابير. اثنائها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذعة بالاسود او الاسمر تقم اصفاها في مجازر تحفرها في التربة الرملية على اعماق تراوح من 5 الى 7 سم قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات اخصها الذباب والهوم ولا تعف عن العناكب والنحل.

31422 - مِيَزُورُونٌ <sup>○</sup> Mésozoaire (F).  
راجع ناتي الاوالي.

31423 - مِيَكْرُوْجَهْدِيَّةٌ <sup>○</sup> Microénergétique (F).  
Microenergetic (E).  
علم من علوم الفيزياء يبحث في بُدَد (كوانتا) الطاقة او الجهد.

31424 - مِيَكْرُوْفِيْزِيَاءٌ <sup>○</sup> Microphysique (F).  
Microphysics (E).  
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة.

31425 - مِيَمَارٌ <sup>○</sup> Mymar (S). Mymar (F).  
Mymar (E).

جنس حشرات مطفلة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الميماريات. انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها شديدة الصغر طول نحو 0.6 مم. تتميز باجنحتها المتباعدة الشكل والحجم، الامامية منها مجدافية مهذبة الاطراف، الخلفية ضيقة، معلاية الشكل، عادمة التزين. زباني ذكورها خيطية، زباني اناثها صولجانية جميع انواعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل.

31426 - مِيَمَارِيَّاتٌ <sup>○</sup> Mymaridae (S).  
Mymaridés (F). Mymaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصورة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها شديدة الصغر طول من 0.5 الى 0.8 مم. رؤوسها مستعرضة، مقطوعة الاقنفة. قرونها الاستشعارية مستطيلة، عديدة الفصل، من 8 الى 13. زين الاناث صولجانية الاطراف. اعناقها دقيقة، صودرها شبه بيضية، خصوصها انبوبية، مستطيلة عند معظم الانواع. بطونها شبه مردنية. اجنحتها الامامية مجدافية الشكل، مهذبة الاطراف، مستطيلة الاهداب. اجنحتها الخلفية معلاية، ضيقة. قوائمها مستطيلة جميعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والرتب. ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية يرقاتها مرقاة وعادمة الرؤوس والمنافذ القوية، تتدنى بالانتافذ اشهر اجناسها واعرقها الميمار.



جنس حشرات من الحُمُوتِ وفصيلة الهلكتوسيات. انواعها المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة حتى في جبالها || اجسامها مستطيلة الشكل، متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها اميز قداً من انثاهي. اوائها قليلة التباين بين الانواع، تكثر فيها الشهية والشحقة والتزيرير البطني بالاصفر او الاطحل او الاسمر || جميعها تصغر في محاجر تحتفرها في التربة. قوتها رحيق الازهار وطلعه || اشهر انواعها الهلكتوس السداسي الزناتير H. sexcintus. ائويه الى السمرة السوداء الموج، زناتيره البطنية طحلاء اللون، ثلاثية الأزواج.

### ٣١٤٤٨ - هَلِكْتُوسِيَّاتٌ (F). Halictidae (S).

فصيلة حشرات من الحُمُوتِ ورتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها اغلظ من انثاهي واطول منها. قوتها رحيق الازهار وطلعه || تقيم اصنافها في محاجر تحتفرها في التربة || اشهر اجناسها الهلكتوس.

### ٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّاتٌ (F). Heliconiidae (S). Héliconidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من علم امريكة الجنوبية || اجسامها نيفة مستطيلة او معتدلة الطول. رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة الالوان الزاهية والزخرفة المنسقة || معظم انواعها يفرز عند الدفاع عن النفس مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة || اساريها تعيش على اوراق النبات || اشهر اجناسها الهلكونيوس.

### ٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيُوسٌ (F). Heliconius (S). Héliconie (F).

جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الهلكتوسيات. انواعها المعروفة نحو ٩٠ اعطائها امريكة الجنوبية || اجسامها نيفة تطول من ٢٢ الى ٢٨ مم. بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكررة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية خيطية معتدلة الطول. رواشنها كبيرة، مستديرة الاطراف، جميلة التخضب والزوزقة || جميع انواع هذا الجنس تفرز، للدفاع عن النفس، مادة سائلة صفراء اللون، كريهة الرائحة تهدد عنها الطير والحشرات المفترسة || اشهر انواعها واعها انتشاراً هلكونيوس البرازيل H. eucrate. ائويه اصفر اللون صنابي الموج مجنوع ومزخرف بالاسود.

### ٣١٤٥١ - هَلَوَازِيَتٌ (F). Halloysite (E).

تشيليكيات الالومنيوم الطبيعي المتشوه.

### ٣١٤٥٢ - هُورِيٌ (F). Lacustre (F). Lacustrine, Lacustrian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يعيش في الاوار والبحيرات والغدران || ويطلق حصلياً على تكوين خاص او تربة خاصة فتقول تكوين هوري وتربة هورية || ويطلق اركيولوجياً على الساسكر والقرى التي كانت تشاد فوق الماء على ركائز واوتاد مفروزة في القاع.

### ٣١٤٣٩ - نَشْ (F). Bipartition (E).

النش في علم النبات هو التقاسم الى شطرين متساويين.

### ٣١٤٤٠ - نَشُوءٌ ذَاتِي (F). Abiogenèse (F). Abiogenesis (E).

النشوء الذاتي نظرية بيولوجية قديمة كانت تسلّم بنشوء الحياة من مواد طبيعية خام.

### ٣١٤٤١ - نَقْلَةٌ (F). Pénéplaine (F).

نقطة ج نقاف اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي قضت عليها العوامل الارضية السحيقة فاصبحت منبسطة كالسهول || اشهر هذه القاف وارجحها اتساعاً سهول فنلند في شمالي اوروبة ونجد البحيرات الكبرى في كندا.

### ٣١٤٤٢ - نُكْلَةٌ (F). Nucléus (E).

اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحبيرة الحيوانية او الخلية النباتية.

### ٣١٤٤٣ - نُبَيْقٌ (F). Inlandis (E).

اسم يطلق على كُمة الجليد التي تلحف الاراضي القطبية || النُبَيْق الذي يلحف بعض اجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون كيلومتر مربع || النبايق التي تلحف اراضي القطب الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربعة || اما سماكة هذه النبايق فتتراوح من متر واحد الى ٣٠٠٠ متر واكثر.

### ٣١٤٤٤ - هُبُوسٌ (F). Vellia (S). Vélia (F).

جنس حشرات قانصة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الهبوسيات. انواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع انظار العالم || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٩ مم. رؤوسها مخروطية الشكل، قليلة البروز. عيونها صغيرة ناشزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطلمها معتدلة الطول ثلاثية العقل. اجنتها متباينة الاشكال والحجوم. قوائمه الخلفية مستضخمة الانخفاف. اوائها ملونة || يكثر وجودها في المناطق والاوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت اليه سبيلا من حشرات.

### ٣١٤٤٥ - هُبُوسِيَّاتٌ (F). Veliidae (S). Véliidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع اصقاع العالم || تألف النماذج ومجاري الماء وضفاف الانهر. تسرح على سطح الماء برشاقة الشايرات. قوتها الهوام والحشرات الصغيرة || اشهر اجناسها الهبوسية.

### ٣١٤٤٦ - هِرْسِيْنِيٌ (F). Hercynien (E).

نعت تعريفي او اسم يطلق على اقدم التضخيمات التي حصلت في القشرة الارضية وما نجم عنها من سلاسل جبلية.

### ٣١٤٤٧ - هَلِكْتُوسٌ (F). Halictus (S). Halicte (F).

### Enzoïque (F). Enzoic (E). ٣١٤٦٠ - يُحْفُورِي

نعت تعريفي يطلق على كل موقع أو ارض تكثر فيها الاحافير الحيوانية أو النباتية.

### Ammomanes (S). Ammomane (F). ٣١٤٦١ - يُرْمَل

جنس طير من الجوامث مخروطيات المناقير وفصيلة القُثْرِيَّات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار وبعضها يرغب في البراري القاحلة || اجسامها شبيهة باجسام القُثْر، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية نرية. اجنتحها معتدلة الطول ذلقة. اذنانها فارقة. اتواها الى الصهبة المنمشة والمروشة بالاطحلال والاسمر || ملجنها الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار || افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف السرب من عدة مئات || اناها تثنى في التربة بين الاعشاب المتراكبة. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترخيها يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها البرملة الانيقة

Am. cinctura (S). Am. élégante (F). اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس، تجوبها كل عام.

### Cassia (S). Casque (F). ٣١٤٦٢ - يَلِكَة

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنّيات الارجل مشطّيات الخياشيم وفصيلة الخونويات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجّرات الاراضي الثالثية، المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تتميز بشخانة اصدانها الخونوية الشكل المتراكبة الاطناف والزخارف والالوان.

### Lilliales (F). ٣١٤٦٣ - يُسْفِيَّات

اليسفّيات مجموعة نباتية من وحدات الفلقة تضمّ خمس فصائل وهي الزنقيّات والزمزاريّات والوعلاتيّات والقصورسيّات والزغفليّات.

### Corynantha Yohimba, Pausinystalia Yohimba (S). Yohimbé (F). Yohimbehe (E). ٣١٤٦٤ - يُوَهْمِيَّة

شجرة حرجية طيبة، كبيرة الحجم، دائحة، من فصيلة الفوفيات. منبتها بعض مناطق البلاد الاستوائية اخصها الكامرون والغابون والكونغو || ساقها منتصبه، رفيعة، عتية الاغصان. اوراقها معتقة، متقابلة، اهليلجية النصال. ازهارها عنكولي التجميع، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء شبه بيضية الشكل تغلف العديد من البزور الصغيرة || يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادّة اليوهيمين المشهورة بخواصها الشاققة.

### Lépidodendrées (F). ٣١٤٥٣ - هَيْشُومِيَّات

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالخدريات. اجناسها المحققة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقيقة البيفونية والكريونية العادة الى الاباج الاول || تميّزت هذه النباتات بضحامة سوقها المستطيلة ان كان قطرها يراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ متراً.

### Achlamydée (F). ٣١٤٥٤ - وَالِيَّة

اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها وزيم وعطيل.

### Monodelphes (F). Monodelphia (E). ٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرُحْم

اسم يطلق على جميع الثدييات التي تضع اولادها كاملة الخلفة بخلاف نوات الرحمين او الجراييات التي تنتقل اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف ايضا بالجرب حيث تقيم فيه حتى الاكتمال فالظالم.

### Bembecidae (S). Bembécidés (F). ٣١٤٥٦ - وَرَاشِيَّات

فصيلة حشرات من الحمويات ورتبة غشائيات الاجنحة المنصورة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة، جميعها قريبة الشبه بالثحل والزناهير. اتواها ملونة بكثر فيها الاصفر المجزغ بالاسود || جميعها تصفن في التربة. محاجرها رداء فسيحة تغور نحو ١٠ سم. مداخلها انفاق انبوبية الشكل منحرفة نحو السطح. اصغانتها متراكبة التخاريب المستسة السطوح || قوتها الذباب والهوم والصغير من نوات الجناحين تقتنصها فتخترها وتنقلها الى اصغانتها زاداً لها وليرقانها || اعرف اجناسها واشهرها الوراشة والمثولة.

### Achlamyde (F). ٣١٤٥٧ - وَلِيَّت

نعت تعريفي يطلق على كل نبات عتي من نوات الالياف المحضونة بخلاف واحد بدلاً من غلافين.

### Ytterbium (F). Ytterbium (E). ٣١٤٥٨ - يَتْرِيُوم

عنصر معدني بسيط. رمزه (Yb) وزنه الانومي ١٧٣,٠٤ رقمه الانومي ٧٠ يستخلص من الاثربة الاربية. اول من اكتشفه مارينلاك عام ١٨٧٨.

### Yttrium (F). Yttrium (E). ٣١٤٥٩ - يَتْرِيُوم

عنصر معدني بسيط. رمزه (Y) وزنه الانومي ٨٨,٩٢ رقمه الانومي ٣٩ اول من اكتشفه غاولان عام ١٧٩٤.



يرمل







*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature  
se compose de quatre volumes, dont le dernier  
comprend les lexiques des termes  
allemands,  
anglais,  
français,  
grecs,  
italiens et  
latins.*



Edouard Ghaleb  
Ingénieur agronome

---

# **ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE**

## **ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES**

---

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,  
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,  
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

**Volume III**

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE





---

**ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**







**Dar el-Machreq sari**  
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



**Librairie Orientale** - Boîte Postale 1986  
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX  
en arabe, anglais, français  
allemand, italien, latin et grec


Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles  
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



**DAR EL-MACHREQ**  
BEYROUTH